

DOMINI
PETRI FORESTI
ALCMARIANI
MEDICINÆ DOCTORIS

EXPERIENTISSIMI, INCLYTÆ REIPVB.

Delphensis Medico-Physici ordinarij,

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM,

LIBRI DECEM POSTERIORES,

IN QVIBVS

OMNIVM ET SINGVLARVM AFFECTIONVM
corporis humani causæ, signa, prognoses & curationes graphicè depinguntur.

TOMVS SECVNDVS.



ROTHOMAGI,

Sumpt. IOAN. & DAVIDIS BERTHELIN, Fratr.

M. DC. LIII.

OBSERVATIONVM
ET
CVRATIONVM
MEDICINALIVM.

SIVE

Medicinæ Theoricæ & Practicæ,

TOMI SECVNDI,
LIBRI DECEM POSTERIORES.

- XI. *De morbis oculorum & palpebrarum.*
- XII. *De aurium morbis.*
- XIII. *De nasi affectibus.*
- XIV. *De ægritudinibus labiorum, gingivarum, dentium, oris ac lingua.*
- XV. *De faucium, gutturis, gula, & asperæ arteriæ affectibus.*
- XVI. *De pectoris pulmonisque vitiis & morbis.*
- XVII. *De cordis ac quibusdam mammillarum affectibus.*
- XVIII. *De stomachi & ventriculi affectibus.*
- XIX. *De hepatis malis ac affectibus.*
- XX. *De Lienis morbis, vitiis ac affectibus, & de Scorbuto.*

IN QVIBVS EORVNDEN CAVSÆ, SIGNA,
prognoses & curationes graphicè depinguntur.

ROTHOMAGI.

M. DC. LIII.

DOMINI
PETRI FORESTI
ALCMARIANI
MEDICINÆ DOCTORIS

EXPERIENTISSIMI, INCLYTÆ REIPVB.

Delphensis Medico-Phyfici ordinarij,

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM,

LIBRI DECEM POSTERIORES,

IN QVIBVS

OMNIVM ET SINGVLARVM AFFECTIONVM
corporis humani causa, signa, prognoses & curationes graphicè depinguntur.

TOMVS SECVNDVS.



ROTHOMAGI,
Sumpt. IOAN. & DAVIDIS BERTHELIN, Fratr.

M. DC. LIII.

stans, quæ *ἐννομεν*; Latinis, Agnata seu Coniunctiva dicitur, cum neque cerebro aut aliqua eius membrana, sed ex ea, quæ exterius os calvariae ambit, pericranio dicta, originem ducat. Nuncupatur autem Agnata, propterea quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumscripta ossa, ut constat. 4. De compes. medic. secundum locos, & 10. De usu partium. Alij vero tres istas proprias oculorum tunicas in sex diuidunt. Quibus etiam non reclamamus, cum ad hanc rem tractandam nec obstat nec conferat, ut etiam Donatus annotavit: sciamus quod prænominata tunica, & agnata, quæ simul moventes ipsos musculos (qui numero sunt, & totidem oculorum motus,) operit; Deinde etiam dicti humores, ut perfecte visio ipsa absolatur, à natura conditi sunt. Quo fit, ut ex triplici vitiorum genere (teste Galeno, primo De causis symptomatum) videndi actio lædi potest.

quod triplex
est vitiorum
genere videndi
actio lædatur.

3

Primo sentiendi instrumento quippiam perperis, nempe crystallino humore: Secundo: pars aliqua primo instrumenti sentiendi administrans affecta, nempe tunica iam dicta: Tercio: cum ipsa sentiendi potentia, quæ à cerebro per nervum opticum in oculum ipsum descendente procedit, quoquo modo fuerit impedita. Verum exempla ponemus, primo ab iis oculorum malis (ut iam vnum proposuimus) quæ tunicis evenire solent, nempe partibus ipsis vnum aliquem præbentibus; initium fumentes ab Agnata seu coniunctivæ tunica affectibus, utpote quæ exterior magis sit, ac frequentissime ab affectione *ἐκταρα* Græcis proprie dicta Latinis Lippitudine, afficitur. Ophthalmia nomen ab affecta sede sumpsit, scilicet ab oculis, quasi oculi morbum dicas. Latine lippitudinem ab accidente, scilicet excremento, minus proprie nominarunt, quod multos quoque alios affectus lippitudines appellent, quod eo excremento abundant: Vnde & diuturnis quidam oculorum morbis affecti Lippi dicuntur, ut apud Horatium videre licet. Græci vero (ut Iacchimus doctissimus annotavit supra Rhafem.) velut Antonomastichos dixere oculi morbum, nomen generis speciei adaptantes, quod hic gravissimus omnium esset. Caterum, ut recte interpret Holerij c. 17. De ophthalmia dicit, Morborum oculi, ut infinita prope multitudo est, ita in illis distinguendis maxima confusio, præsertim in his, qui ad ophthalmiam similitudine quadam accedunt: quales sunt, *ῥινοειδής*, *χλωμός*, & *ἐκταρα* proprie dicta. Montanus vir aliqui doctissimus ceteris accuratius hæc distinxisse epistola quadam videtur: à veterum tamen sententia; ut Galeni, & Pauli Aeginetæ, longe discedens. Scribit enim *ῥινοειδής* palpebrarum inflammationem esse, licet aliquando partes cæteras in consensum trahat. At Paulus Aegineta tumorem albi oculorum esse vult, quam sequitur inflammatio, & palpebrarum contorsio. Vidius quoque (ut doctissime D. Corneus amicus) negligenter *ῥινοειδής* interpret legit *ῥινοειδής* aut *ῥινοειδής*. Sed his prætermittis omnia facillime sic distinguuntur. Si levis quadam inflammatio, & veluti phlegmones principium sine discrimine partes oculi invadens primo intuitu appareat, cum rubore quidem, sed exiguo, quem dolor mitis consequatur, *ῥινοειδής* erit duntaxat, id est, oculi perturbatio. Hæc enim certissima signa sunt, quod hic affectus, neque phlegmone sit confirmata, neque vnius magis quam alterius partis proprius, neque vehementem dolorem habeat, aut tumorem.

unde ophthalmia
dicitur: unde
lippitudo.

5

ῥινοειδής.

ῥινοειδής.

6

Quibus si adiciat à causa externa excitatum

fuisse, ut sole, fumo, pulvere, oleo, radiis solis, vi-
no, esu caparum, eruce, alliorum, sinapi, icu, (quæ
omnia ab ægro diligenter exquirenda) tum nulla in in-
dicanda dubitatio esse poterit. Paulus à manifesta
tantum causa fieri vult: quare etiam inquit occa-
sione ipsius cognita, promptissime soluitur. Ex-
perientia tamen constat non raro ab interna exci-
tari; præcipue vero ventriculi, & post egregiam
potationem: neque tamen proprie esse ophthal-
miam, licet aliquando in corpore cacochymo, & si
negligatur, in eam facile degenet. Si vero pal-
pebræ tantum inflammationem patiuntur, atque
in sese concidunt, ut oculus aperiri nequeat, *ῥινοειδής*
erit, id est præclusio quadam, & quasi ligatio
eorum, quæ secundum naturam aperta & reclosa
esse debent, siue cicatricæ, aut carnis incremento
partes coalescant, ut labra vteri; siue inflamma-
tione, ut palpebræ oculorum. Contra si oculus
apertus maneat nec claudi possit, albi nimirum
oculi sublato atque eminente, nigro vero sub-
sidente, & veluti hiatum quendam efficiente, &
velut *ῥινοειδής* est. Idem & Fernellius dicit, quod album ru-
bescens nigro sublimius evadat, ipsumque vero
contegat. In qua præter ruborem & inflammationem
nem pathognomicum signum est, palpebrarum
ut ait Paulus, *ἐκταρα*, id est, conuersio, quia addu-
ci non possunt. Sic & Fernellius, & Ectropion pal-
pebræ est inuersio, quæ pars eius interior rubra
prominet. Oritur autem vel ob cicatricem, vel ob
subditi carnis exuperantiam, qualis sæpe ex chi-
mosi relinquuntur. At si coniunctivæ tunica sue
adnata, phlegmone laboret, cum tumore, tensio-
ne, dolore, calore & rubore, ophthalmiam esse
non dubitandum. Ergo *ῥινοειδής* (quam ophthalmiam
non veram vulgo appellant) affectio est omnium o-
culi partium externarum communis: *ῥινοειδής* pal-
pebrarum: *ῥινοειδής* albi oculorum: Ophthalmia
adnata membrana propria. Sæpe tamen omnia
inter se vel plures commiscuntur, ut exemplo osten-
dimus libro septimo De symptomatibus febrium: atque alio
etiam paulo post demonstrabimus. Interea ophthal-
mia magna similitudo est cum Epiphora. Sed in-
ter se distant, Fernellio auctore: quod in ophthalmia
oculi album; in epiphora solum palpebræ cilium
rubeat. Sed de Epiphora postea suo locotum de
aliis: nunc de ophthalmia. Neoterici vero Ophthal-
miam in veram & non veram distinguunt, & vaci-
lacionem, nos Taraxin appellauimus. Veram vero
in eam quæ phlegmonem habet admixtam, & di-
cunt esse simplex apostema non pertransiens ter-
minum: Deinde in aliam, quæ magis transit terminum
in magnitudine, quæ nos diximus esse Chir-
mosam, Arabes vero alguardenegi. At nunc loqui-
mur de ea quam Græci veram ophthalmiam esse
volunt: quæ nihil aliud est quàm tunica agnata seu
coniunctivæ inflammatio vel phlegmone, ut nunc
diximus. Satis igitur constat quæ sit vera lippitudo
vel vera ophthalmia, & quæ pars sit in ea affecta:
nam ad sensum liquet oculum quidem affici, quan-
vis iuxta Galen. lib. de differ. morb. ex accidenti vi-
deatur esse oculi morbus, interea proprie pars af-
fecta est ipsa agnata tunica. Non enim totius in-
strumenti morbus est, quæ similis existit: & si
miliarium corporum morbi ex accidenti (testem
dem Galeno loco citato) ad totum instrumentum
referuntur, etiam si compositi sint ut lippitudo
Cumque è numero inflammationum sit lippitudo
do vel ophthalmia, morbum esse compositum in
secundo, ac soluta continuitate forte tertio, ut de
phlegmone

phlegmone apud Galenum colligitur. Signa facile etiam
ex prædictis habentur, concurrunt agnata tunica
color ad rubrum, adest eiusdem tum oculi tumor
adolor grauians. Sæpe autem ita in tumorem at-
tollitur, ut tunica agnata, nec non partes quæ vi-
cinæ sunt, admodum tendantur, imo aliquando
vsque ad malas intumescant & attollantur: la-
chrymæ etiam secundæ ex oculo resudant, deci-
duat à vehementi dolore expressæ: tanta enim
aliquando punctio occurrit oculi, tanquam acu
stimularetur. Arteriæ quoque circumlitæ, ut in
alia phlegmone, valide pulsant. Venæ quoque
exiles, quæ in albo oculi antea latebant, iam tumi-
de apparent, rubescitque quod album esse sole-
bat: prout hæc signa intenduntur, maior erit affe-
ctus, si mitiora, leuior. Et quod ad signa temporū
attinet, quod in nulla alia phlegmone animadu-
tere possis, hic manifeste visitur: initium scilicet
influxionis & augmentum ipsius, & cum est ma-
xima. Etenim non per notas ut in aliis, sed ipsis
oculis usurpamus: ideo & principium ipsius no-
tare possumus, cum venæ distendantur: mox aug-
mentum, cum in carnosam tunicam substantiam
sanguis funditur, & iam intumescere incipit: Sta-
tus vero, cum ad suam magnitudinem peruenit
influxus; quæ modo maior, modo minor est, prout
humor affluit in corpore, aut remediis à medico
est obuiam itum, quibus cessit morbus. Maxima
vero tunc est, cum non modo ipsa tumuit, sed &
palpebræ crassæ & inuerti videntur: & vna oculi
orbita phlegmonem omnis pati videtur. Sic igitur
morbi tempora distinguemus, ut & Rhafes facit.
Alij tamen ex mente Galeni tempora ex coctio-
nibus ponunt, si materia ab humore oculi proue-
niens, aquæ & tenuis fuerit, tunc est morbi prin-
cipium: si crassescat & ad album tendat, erit mor-
bi incrementum: vel si sordes inhærescant subse-
quentes in maioribus oculorum angulis, erunt in-
crementi testes. Si palpebras, quas Græci *βλεφαρόν*
vocant, agglutinent, vel sordes ita incrassent,
ut oculos quasi glutin oblinant, erit morbi status
vel consistentia, præsertim si lachrymarum copia
præcesserit: si vero hæc omnia minuantur, erit
morbi finis. Alij tamen, ut Iacchimus, potius hæc
signa desumi volunt ex symptomatibus ipsis, cum &
iudicium à coctione inefficax sit, nec perpetuum,
vel symptomaticum. Vide pulcherrima apud ipsum
de hac re in commentario suo supra Rhafem de
ophthalmia. Causæ autem veræ ophthalmiæ vel
agnatæ tunica phlegmonis, vel ex plenitudine
totius corporis, ob quam agnata tunica repletur,
distenditur: vel ob acres humores influentes acri-
monia sua & morsu erodentes: vel propter aliquam
extensionem eius, ex crassis succis, spirituve fla-
tuoso, atque ex his causis excitantur dolores infi-
ni, ut 3. meth. med. Et ita sit ex congestione humo-
rum, in ipsa tunica permanente, ex superfluitate
alimenti, vel non bene concocti. Vel per modum
fluxus à capite per venas & arterias, musculos, ac
nervos opticos intrinsece siue extrinsece ad adna-
tam tunicam sese conferentes, aut ab aliis parti-
bus ad oculum debilem ob eius temperaturam,
vel à generatione existentem, transmissos. Causæ
igitur antecedentes sunt humores ipsi, ut sanguis
præcipue venis & substantiæ tunica impactus,
non tamen semper solus, sed aliquando & bili, imo
pleurique, admixtus: nam pituitosus vix credo
potest, ut faciat in eo corpore tumorem præter
naturam; ut Galenus de pleuritide argumentum 4. De
pleuritide ex pulsa. Attramen alijs frequentius ex fan-
phlegmone

guine, & acri humore erodente, tum ex crassis suc-
cis pituita abundante fieri volunt, & ex spiritu
flatuoso. Alij & ex pituita falsa. Nonnulli quoque
fieri volunt ex succo melancholico, quamvis ra-
rissime. Sed hæc exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO II.

De Ophthalmia ex acri humore bilioso.

Solent autem quædam præcedere Ophthalmiam
Sex acris humoribus; ut crapula, ebrietates,
& vsus vinorum potentium, & esus ciborum a-
crium, ut alliorum, ceparum, & porri ac similibum
tum aromatum, quæ sua acrimonia & mordaci
qualitate humiditates capitis fundunt & atte-
nuant, & fluxione facta ad oculos, acutas & acres
lippitudines gignunt, præcipue in biliosis, qui
fluxione acri lapsum tentantur, & oculos debilio-
res habent. Ita iuuenis quidam, temperaturæ bi-
liosæ, cum longa tristitia, & quidem curis affice-
retur, & diu vigil perstitisset, ob obitum paren-
tis, ut sollicitudines illas mitigaret, cum amicis
vina potentia largius sumebat: aliis & acris ci-
bis delectabatur, sæpe in sole versabatur, media
astate; vnde acris humoribus collectis, in
ophthalmiam incidit, ex rodente & acri hu-
more, subito catarrhi instar in oculos prolapsus,
cum ingenti dolore. Ad quem cum subintraf-
sem, & plane biliosus esset, & animaduertentem
totum corpus minime plethoricum esse, sed po-
tius præditum vitioso humore, lachrymamque
rodentem adeo oculum infestare, ut anguli ocu-
lorum simul & genæ tali influxu roderentur, ita
ut ager vti videretur, & rosionem non tolerans
exiliret, facile intellexi hanc ophthalmiam à bi-
le erodente originem sumpsisse. Cum hic igitur
rubor paucus in oculis adesset, & punctura ac
dolor vehementior, & lachrymæ tenues acutæ,
& tumor exiguus apparet, & signa totius ple-
nitudinis abessent, & biliosa humorum prauitas
in corpore satis macilento superaret, curationem
auspicari sumus ab iis, quæ totum corpus purga-
rent, & à recrementis liberarent, statim hanc po-
tionem exhibui: *℞. cassia recens ex carnis extrac-
te 3vj. pulpa ramarind. extracte cum aqua violar. 3ij.
symp. ex infuso rosarum pallid. syrup. viol. ana 3b. dis-
solue cum 3iij. feri lactis. Quibus ter alium depo-
suit. Deinde propinaui ad humores acres & mor-
daces contemperandos, syrupos refrigerantes, in-
crassantes, hoc modo: *℞. syrapi rosarum, ex rosis sic-
cis, syrup. amygdalæ, papav. ana 3j. aquæ solari, plantag.
cicborij ana 3ij. misce, pro 3j. dosibus. Postea etiam pur-
gavi cum infuso rhubarbaro adiecto syrupo violarum.*
Oculis vero candidum oui liquorem instar aquæ con-
cussum, infundebam; hoc enim modo acris fluxio
sine offensa eluitur, iuxta Galenum 13. meth. ac Pau-
li cap. 22. lib. 3. Et cum dolor vrgeret, accipiebam
aquæ albuminis oui 3ij. lactis mulieris 3iij. succi plan-
taginis 3j. misce; panni duplicati ex lino in eo infu-
si oculis imponebantur. Interea & collirij albi Rhaf-
is 3b. modo cum lacte mulieris solui, modo cum aqua
rosaceæ oculis instillabam. Fovebam etiam oculos
cum decocto foliorum malvæ, violarum & fenug-
ræci prius loti à pulvere ad sedationem doloris.
Sic & puellæ post vniuersalia remedia etiam ve-
næ sectionem cum portio sanguinis vna cum bile
mixta esset, præscripti, cum similiter purgata esset,
cum 3i b. syrapi ex infuso rosarum pallid. cum rhubarb.
3j. cum 3iij b. aqua violarum, elect. de succo rosarum
3i b. misce. Cum hæc oculis apposuissem, melius
habuit;*

A 2

habuit: ℞. medulla panis optime trita ℥j. medulla
ponorum dulcium, bene tritorum, ℥ij. lactis mulieris,
℥i. olei rosae. (cum palpebra inflata & rubra esset)
℞. mixta emplastri modo oculo affecto apponebantur.
Et cum dolor vehementior esset, addebam croci,
oꝝ ana ʒ iij. modo albumen oui agitarum & despi-
ciatum cum aqua rosarum, modo cum decocto papau-
albi cum corti infusato insillabam: In principio cum
aqua rosarum, oui liquore tenui & lacte muliebri
aut asinae simul mixtis.

Fouebam autem cum decocto tepide , deinde
cottum madefactum in liquore supradicto lin-
teolo lineo inuolvebam : similiter linteolum in-
succatum oculo ita infernebam, atque fascia alligabam ; Ita tamen, ne oculus graueretur aut dole-
ret. At dolore virgente cataplasmate utebar croci
& opij granis tribus adjectis, sed ab eius usu tum
etiam collyrio albo cum opio , vbi necessitas vr-
gebat, oculos deinde decocto meliloti tepido fo-
uebam. Sed non utebar collyrio albo cum opio
confecto in lacte muliebri soluto, nisi crescente
morbo & dolore augeſcete: alioqui ſape in prin-
cipio, & etiam poſtea, vbi dolor eſſet, commod-
oque ſine opio utebar, & ita paratum abſque
opio in officina fieri iubebam; quo in multis com-
modiſſime uſus ſum. Vbi enim dolor tã vehemens
non erat, vel leuiſ, ſublato opio. In augmento ad-
debam ſarcocolla nutrita in lacte muliebri, j. &
precedente morbo & in declinatione augebam
doſim ſarcocollæ, ac tandem ſola ſarcocolla in lac-
te vel aqua ſeniculi , vel euphragi diſſoluta
utebar. Et in fine ſotu cum ſpongia ex malua, meli-
loto, ſennigræco, vel cum panno lineo duplicato,
poſtea etiam expreſſo, & oculis alligato. Qui-
bus remediis, antea adhibitis ſubinde venæ ſec-
tione & cucurbitulis, & purgationibus, mox ad
localia dicta deveniens, hunc iuuenem tum puel-
læ & alios plurimos curavi.

SCHOLIÆ

6 **O** Phthalamia veta pluris & minoris differentiam in se recipit: modo enim bilioso sero magis participat, modo pituitoso, & quamuis phlegmone dicatur, alia enim tenuiore sunt sanguine, alia crassiore, vnde multa sit in ipsis symptomatis differentia, quibus significatur morbus. Etenim alia, quae crassiores constant, diffinitione magis cruciant, quod fluxio est tunica perhibetur externi. Contra alia multum excernunt, quae acriserum, mordax, aut salsum habent: vnde & morsus, & rosione dolorem faciunt. Alia mitius excernunt, quibus serum pituitosum est & tenue. Sic & color magis euariet, rubens magis & mi-

7
Si ex sanguine fiat, signa.

Considerandum igitur diligentè ex quo humore fiat : si propter totius corporis plenitudinem sanguineus humor, aliter quoque curatur, quam si bilis aut crassus succus aut spiritus flatuosus. Si sanguis, ea aderunt, quæ diximus iuveni in prima observatione adfuisse : quoniam cuncta (ut etiam Trallianus, tum alij, testatur) rubra & sanguinea erunt, nedum agnata ipsa tunica; sed & facies rubens & humidior erit. Venæ latiores, sensus grauitatis aderit, functiones solitæ segnius perscipientur, lachrymæ neque mordaces, neque acres, temperamentum, ætas, anni tempus, regio, victus ratio præcedens, sanguinis plenitudinem attestabuntur. Bilis notas iam posuimus in hac secunda Observatione de iuvene bilioso. Adest biliosum temperamentum, tum reliqua præce-

[illegible]

Lib. XI. C.

est. Si siccus quidem, scâ cum dolore est, fere exulcerat: et nonniamquam ex eo casu fit, ut palpebra cum oculo glutinetur. Hæc autem Celsum apud Hippocratem eadem quoque legitur. Galenus etiam admonuit lib. 3. method. lippitudine affectos diligenter esse curandos; cum ex curationis errore, quosdam agrè confuseque confet vidisse: modo suffusionepupilla nimia dilatatione vel tæbe aut corruptione fuisse occupatos, potissimum ex visu stupescientium medicamentorum. At tumore itaq; magno, sicco, parumque dolente nullum periculum impendit. A tumore autem magno, sicco, multumque dolente, periculum est, ne oculus exulceretur. Interea quanto magis lachrymæ in se habent mordacitatem, tanto citius reducitur ophthalmia ad statum. Periculum autem est exulcerationis ipsius pupillæ, cum falsa fluit lachryma multumque calida. Si ophthalmia laborantibus continuo diuque doleat oculus, periculum cæcitatis adfert. Facilius quoque curatur est reliquis phlegmonis, quando magnitudo eius, & incrementum & vigor, oculis quoque discernuntur. Hippocr. aph. 6. aph. 17. lippientem alui proflauio corripibonum: materia enim deorsum vergit. At hyeme sicca, & aqulonia existente, vere autè pluuiofo & australi, præcipue mulieribus & viris natura humidioribus, ætate lippitudines fieri necesse est; Hippocrate dicente aph. 11. lib. 3. Quidam vero volunt, quod in regionibus meridians multiplicetur, & remouetur velociter lippitudo; superueniente autem eis frigore, difficile eandem ipsi fieri: propterea quod in regionibus & temporibus frigidis lippitudo minoratur, verum ea, quæ oritur, praua hæc. Lippitudines pueris & senibus curatu difficiliores & maligniores, ob capitis imbecillitatem & excrementorum abundantiam: hinc fluxio maior in oculis distillans, ut constat apud Galenum 3. de sanitatè tuenda. Tales igitur agros persequendos suscipiamus, vsque quo morbus inliculo tractabimus. Etenim domi in obscuro cubile, ut æger loco obscuro cubet; sic vt etiam à sermone ablineat: nam visionis instrumentum citra molestiam splendorem tolerare non potest, Galeno teste libro primo. De causis symptom. & 10. de visu parum (quo loco exemplum illud comprobauit, tum militum Xenophantis, qui cum per multam diuinem iter fecissent, oculis læsi fuerunt: tum Dionysij Sicilia tyranni, qui super carcerem domum clarissimam, ac longe splendidissimam construxerat, in quam diutissime in fumo, ac caliginoso loco carceratos educebat, atque ita cupidè lucem intuiti occurrabantur.) Recreat autem potissimum nigro, cateleuo aut viridi. Continebimus igitur hos in cubiculo obscuro: à quo calor omnis excedens, & fumus absint. Attamen frigidus aut calidus eligatur aër, non tamen immodicè, pro causa ratione. Somno moderato vtantur ægri, & præsertim nocturno. In principio quidem & augmento conuenit; in declinatione minus, cum visionem, sonum inducendus. Capite eleuato dormiant: alii; supinè minus nocere volunt, vt materiaz partem posteriorem conuertatur, idque in augmento ophthalmia ac causa calida in principio & augmento phlegmonis. Exercitium vitent, quietè elata exerceantque singulis diebus alui excrementis glandibus. Cumq; humores quietos esse cupimus, quietem corporis, tum animi eligemus; à furore, metu, tristitia, ira, coitu abstinemus. Ægrum

Pet. Foresti. Tom. 24

quoque in integra inedia seruabimus, vsque quo fluxior exstiterit. Et sic parco vtetur cibo ac potu, praesertim inter initia: imo, si fieri potest, nullum cibum (*Celso auctore*) sumere debent, ne aqua quidem; sin minus, certe quam minimum eius: nam prima omnium, (*vt ipse testatur*) in eiusmodi casu sunt quies & abstinentia. Vel si quid dare cogimur, id erit frigidum actum & potestate, & exiguum, vt farris vel pitisana cremor. Tenui etenim prorsus vtendum victu ciboque parciore, vt inanita partes auidius, quos habent humores retineant, ne ad oculos cōfluant. Qualitas autem cibi eligatur eius, qui humorem generat laudabilem; eos vitando, qui vaporosi sunt, ac tardae concoctionis: & proinde carniū, potissimum quadrupedum animalium, lactisque vsus vitandus erit: cauendum ab acetosis, falsis ac acribus. Pro potu, abstinentiū a vino est circa initia, & ab omni potione vaporosa. Et quidam vsque ad declinationem ab eo abstinentiū volunt, etiam a veteri & vinofo: sed aqua eius loco vtuntur, in qua coriādrorum preparatorū semina, seu hordeum aut cinamonum fuerint decocta. Alij vero sola aqua excocta, aut multa permistionis, aqua mulsa, praefertim cum ex crassioribus humoribus lippitudo fiat ac tempore anni frigidus. Rhases autem a dulcibus abstinentiū putat, quae in bilem vertuntur. Sed vbi humores ad sunt crassiores, & tempus frigidum sit, tunc quidam vinum quoque admittunt; album tamen & adstringens, tene & aquosum.

Quod vero ad medicamentorum rationem attinet, curandi methodus eadem est, quam Galenus proponit 4. *De medicina secundum locos.* Cum ophthalmia phlegmone sit in extrema, & alba oculi tunica, scopos curatiuos ab ipsa phlegmone sumere oportet, & primo ab ipso phlegmonis natura, mox ex partis natura congruum medicamentorum vsum & specialem electionem. Scopos autem curandi phlegmonem est, ipsius augmentum inhibere; atque id quod factum est persanare: inhibetur præcedente causa ablata, sanatur conjuncta simul amota; mox & propriis ipsius morbi contrariis. At cum phlegmone compositus sit morbus, & complectatur intemperiem & solutionem continui; Ex his dolor, qui aliquando mitis existens, nullam operam priuatam desiderat; aliquando grauis vt operam postulet: non tam propria ratione, quod vires destruat, tum totius, tum partis; quã quod fluxionem, id est, morbi causam auget, & somnum auferit, cuius ratione morbus leuatur, enim intemperiem creat, & soluit continuũ. Materia autem, quæ influxa est, ac venulis hæret & exiguis meatibus illius corporis, tolli non potest, nisi ea, quæ continue influit inhibeatur. Rursus fluxio inhiberi non potest, nisi plenitudo humorum in vires tollatur, & vna excrementa omnia vitiosa. Quare si ophthalmia magna fuerit (in qua scilicet omnis hic affectionum complexus adsit, & vna in multam molem creuerit) vena secanda est: nam si leuis sit (*inquit Rhases*) hoc auxilij non exigit. Sicut enim Galenus in leui pleuritide 6, Epid. non secat venam: ita neq; nos hoc loco. Nam magnitudo morbi est, quæ id exigit, virtus vero permittit. Sat igitur erit in leuibus alium subducere, & a cibo abstinere, & frictione vti & cucurbitulis, & demum oculariis medicamentis: quoniam causa morbum faciens exigua est & debilis. Verum ubi grauius malum est, venæ sectio, arteriotomia; cucurbitula, sanguisuga, scarificatio, purgatio, cauterium, paracentesis, fortiora colliria & localia remedia instituenda sunt. *De quibus vide Holo-*

Medica-
mentorum
ratio.

16

In ophthalmia graviori, quid faciendum?

dentium torqueretur, vt ex dolore decumbere coacta fuerit, temperatura sanguinea, facie admodum pulchra, imprudenter, nescio cuius mulierculæ consilio, (corpore nequaquam repurgato, neque medico aliquo adhibito,) aquæ vitæ gargarismo cum vsa esset, ac nodulos quosdam staphide agria repletos in ore deinde detinisset ad dolorem dentium mitigandum & pituitam ab ore eliciendam, in febrem satis acutam, eamque continuam incidit, & ex impetu vehementioris fluxionis tota maxilla subito inflammationem passa, etiam in ophthalmiam non simplicem tantum collapsa est & admodum grauem, verum etiam in oculi ac palpebræ inflammationem, cum ingenti inflatione earundem partium, vt oui magnitudinem excederet, adeo vt nec palpebram ipsam aperire posset.

Erat enim palpebra ad oui gallinæ magnitudinem inflata, similiter inflammata cum rubedine quadam purpurascens, & ad nigrum colorem quodammodo inclinante, anthracis instar. Primo enim intuitu de carbunculo pestifero seu anthrace dubitabam. At originem huius mali cum intellexissem: quod ex acerbis medicamentis, toto corpore pleno existente, tum capite repleto enensisset, aluo per balneum solutæ cum clystere non admitteret, sanguinem satis copiosè detrahente iussi ex cephalica vena in brachio è directo oculi affectu. Nam malū dextram ferè partem faciei, potissimum verè oculum dextrum & palpebram, occupauerat. Et statim à venæ sectione propter febrem acutam syrupum istum vt ebiberet iussi: *℞ Syrup. rosar. de end. cichorea ana ʒ ss. aquarum cichorea, end. boragin. ana ʒ j. misce.* Adeo enim post hæc subito in sudorem aliquo modo prorupit, quem per quatuor horas meis monitis seruauit; ita vt febris deinde minus eam affligeret. At tumore circa oculum & palpebram remanente, rursus syrupum propinaui, & cucurbitulas cum scarificatione scapulis admoueri præcepi, vt cumque etiam sanguine extracto. Oculo vero tum palpebris ipsis inflammatis continuò applicabam linteolum duplicatum aqua rosacea & lacte muliebri, tum liquore albi oui, idque ter quaterue in die; quo dolor mitigari cepit ac palpebræ inflatio, vt tandem oculum aperire potuerit: & inspecta tunica coniunctiua omnino rubra apparebat; quare liquorem albi oui cum aqua rosacea in oculum stillabam, & postea facta fomentatione cum decocto foliorum maluæ, semin. cydon. & scænuigræci seminis prius abluti, paulatim inflammatio oculi, tum palpebræ cessauit; maxilla tamen inflata ac inflammata permanente. Prescripta victus ratione tenui, cataplasma sequens apposui: *℞ rad. alibæ mund. ʒ ss. foliorum maluæ m. iij. coquantur in aqua, ad mollitudinem pistentur. Addi farina seminis lini, hordei ana ʒ ss. olei amygd. d. l. c. quantum sufficit sit cataplasma.* Et assumpto medicamento leuiori in hunc modum concinnato: *℞ Cassie recens extracta, diacatholici ana ʒ iij. diaprum, simplicis ʒ ij. cum ʒ iij. aquæ casci; fiat potio, qua aluum (distu mirum) decies deposuit, & intus in faucibus latens abscessus per se ruptus est, pure ex ore defluente satis copiosè, ac maxilla detumescens. Vires tamen tunc nonnihil prostrata erant: ideo victum restaurantem nonnihil qui conualescentibus utilis est, præscripsi, cum haec tenus tenuiori victu, vt ratio postulabat, vsa fuisset. Vtebatur tunc gargarismis nonnihil materiam attrahentibus, ex sicibus, hyssopo & ruis pascis paratis; Deinde magis mundificantibus, & abstergen-*

tibus, ex hordei communis decocto, melle rosaceo adiecto; Postremo vero magis consolidante, ex lacte cui plantago incocta erat. Et istis præsidis rectè habuit.

SCHOLIA.

OMnia ista symptomata, ac omnes isti affectus ex gargarismo calido & nodulo ex staphide agria, in corpore plethorico, ante vniuersalia remedia adhibitis, originem habuerunt: nam præter abscessum, qui tandem ruptus est ophthalmiam incurrerat, non tamen simplicem, sed phimosim coniunctam habebat, & etiam taraxim. Sape enim, vt diximus antea, etiam Chemosis atque omnes isti affectus inter se vel plures commiscuntur. Et licet hic ophthalmia erat non omnino vera, quia à causa procata ætica inceperat, grauius tamen erat affectus; & cum oculum aperire posset, videbatur inclinare ad veram ophthalmiam, cum adnata tunica alba rubedinem haberet, & inflammata spectaretur: Deinde & reliqua signa quæ aderant, non leuem inflammationem indicabant: & ob hoc commodè sanguinem detraxiimus; deinde & ad alia remedia deuimus, quæ etiam ophthalmiam conueniunt. Verum quomodo ophthalmia vera curetur, iam diximus. At Taraxim, quam perturbationem antea oculorum appellauimus, si ex fumo aut æstu aut puluere vel alia causa externa contigerit, facile iuxta Aëtium libro septimo, capite tertio curabimus, modo ophthalmiam admixtam non habeat. Primo quidem iubendo ægri à causa ledente abstinere, veluti sole, fumo & huiusmodi. Oculos tepida primo, deinde & frigida ablueri auserimusque à lumine conuenerit: Ita enim, nulla alia ve adhibita, salus parabitur. Parior tantum cibus offerendus, potusque augendus, si ob æstum affectio contigerit, nam & somnus profundior occupabit, & formidat lippitudo digeretur: ideo ne à balneo quidem abstinendum, si modo reliqua victus ratio diligentius obseruetur. Persistente morbo, quies adhibenda, illinendaque collyria generis aut ex croco, aut ros. confecta, & præcipue collyrium Nili. Sordes vero ac gluten noctu circa palpebras collectum, repurgat & probe exterit posca diluatur, vel aqua frigida priuatim inspersa. Sic in exigua inflammatione maioribus remediis non est opus. Sape enim rosarum succo, cui liquore tenui, aqua rosarum aut plantagine, lacte mulieris aut asine, curatur. Sed ubi grauius malum est: ea adhibenda, quæ de ophthalmia vera & magna diximus. At Taraxim, quæ leuis est, remota eius causa, facile remouetur, & ipsa. Ad phimosim, post vniuersalia remedia, si vna cum inflatione etiam adit inflammatio, palpebrarum oclusio, valent fomenta ex malua, foliorum viol. sem. scænuigræci & similibus. Vel cataplasma ex puluere lini decocto, cum lacte bubulo & modico oleo liliorum; quo commodè vsusumus libro septimo De symptomatibus febrium, in illo qui ophthalmia & phimosi laborabat cum febre acuta. Curatur vero Chemosis, iuxta Paulum, venæ sectione, medicamento purgante, collyrio diarodon albo, & quod à cinereo colore vocatur apud eundem ophthalmia cum lacte vel oui aquato. Eodem vero palpebras, tempora & frontem illinire oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus vt: cum remittit inflammatio, acrioribus; quale etiam est viride diarodon. In quibus vero chemosis fortis contingit, oui luteum cum melle carno fuerint, linteolo excepta imposito, & confectum sedant.

sedant, Galeno teste 4. De composit. medic. secundum locos.

OBSERVATIO IV.

De Ophthalmia non vera.

ANO 1565. tribus integris mensibus, nempe Octobri, Nouembri, & Decembri, cum constitutio austrina permanisset, multæ inflammationes oculorum cum rubedine, & ophthalmia non verè populariter grassatae sunt, & palpebrarum pruritus; adeo vt integras familias instar morborum epidemiorum occuparent. Quibusdam vero & acres, cum lachrymis vrentibus & dolore: & plurimis hæc affectiones diuturnæ admodum erant. Omnibus fere præcipue purgationes profuere, postea & cucurbitula scapulis appositæ cum scarificatione. Quibusdam vero, propter pruritum & acres humores, purgationibus tum cucurbitulis præcedentibus, collyria ex aqua albuminis ouorum cum aqua rosarum egregie contulerunt. Aliis autem ex aqua rosarum & saccharo candi confecta, aloes exigua portione adiecta. Erat autem hæc ophthalmia quasi contagiosa, vt si quis ophthalmicos istos intueretur, mox eodem malo corripere. Quibus vero inflammatio aderat, iis missio sanguinis admodum profuit: Quibus vero aciores fluxiones, purgatio magis utilis fuit, ex senæ & rhubarb. infuso, aut pilulis lulis deuoratis, tum aliis ad hanc causam magis appropriatis. Caterum inflammationibus magis acrioribus hoc collyrium sequens, præ aliis omnibus, valde commodum fuit: *℞. cera rosa ʒ j. anagyris ʒ vi. gumi tragacanthi, sarcocollæ, turtiæ præparatæ ana ʒ ss. campisora, opij hebraici m. ʒ j. aquæ rosar. q. s. fiat melle, vsui reservanda.* Atq; huius portio exigua dissoluebatur cum aqua rosarum, vbi vsus postulat, & collyrii instar pluma in oculum affectum stillabatur, præcedentibus tamen purgationibus. Insistit hoc solo remedio conualuere. Et propterea in officina paratum seruatur. Attamen iis qui simul catarrho obnoxii erant, minus conueniebat, ob opium: alios autem, quibus acres fluxiones erant & oculi rubicundi cum pruritu palpebrarum, egregie iuuabat.

SCHOLIA.

Dictum est prius ophthalmiam non veram à causis procata ætice originem suam habere: hic vero ab austrina constitutione. Est enim ophthalmia non vera, Intemperies tantum oculi calida cum paucò rubore; vt dictum est prius; citra tumorem, nisi à casu aut percussione initium habuerit. Et cum Taraxim, seu perturbationem ophthalmia non vera, eodem modo curatur: prout causæ procata ætice variæ sint, eadem semper si à vento vel constitutione maligna, vt hic ab auriâ, domi (modo liceat) manendum. Si ob radios solares vel lunares (quemadmodum anno 1567. in Aprilis cum eclipsi solis fieret, ob intuitum eiusdem solis oculis affliciebantur) caput contegendum, ne habebant, etiam nunc (vt diximus) ophthalmicos insipientes facile eo malo statim corripere. Si ob æsum capparum, alliorum, erucæ, caparum, sinapi (hæc sua acrimonia fluxiones in oculis concitant, & lachrymas fundere faciunt:) ideo hæc erant vitan-

da. Si ex percussione, vel ictu, statim sanguis mittatur; si metus sit de inflammatione, sedetur dolor, & liquor oui albuminis cum aqua rosarum oculo instilletur, & tandem sanguis columbæ ad huc calidus ad Tarfatî sanguinis resolutionem. Et si dolor instet, præmissa venæ sectione oculi fiat fots cum spongia panno subtili lineo inuoluta & infusa in lacte & oleo rosar. tepidis vel moderate calidis bene expressa oculo dolenti sape applicata. A venæ sectione & doloris sedatione ad ecchymosim factam in oculo, quam Barbari Tarfatî vocant, sanguis columbæ, vel turturis, calidus instilletur, ad sanguinis illius digestionem. Si vero cum aliis causis aliqua materia contineatur in capite, si sanguis, venæ sectio adhibenda; vel si pauca; cucurbitula spatulis admoenda: & si sit pituita coquenda, purganda, deinde embrochæ, cataplasmata, collyria, tum alia localia admoenda. Ita quoque de bile vel melancholia, quæ tamen raro in causa est. De his vide Rondeletium. Idem iubet, si ventriculus causam præbeat, vt vomitus leuis excitetur, modo excitari possit sine magna perturbatione: nam morus vehementes materiam exagitant, & humores exagitati facilius in partes imbecilliores fluunt. Quod vero ad Xerophthalmiam attinet, (quæ genus aride lippitæ rudinis existit, quæ neque tument, neque fluunt oculi, sed rubentes dolent, grauescent, & vultu præ graui pituita inhaerescunt) quanto minor humorum in ea impetus est, tanto minus inexpedita curatio habetur: in hac multa inambulatio, exercitatio, balnea, & in ipsis defudationes, frictionesque necessariae sunt. Cibi ex media materia quærendi sunt. Mane post stomachi concoctionem ex sinapi gargarismata valent. Deinde capitis & oris defricationes. Paulus vero oculos fouere alternis spongiis ex aqua calefacta, & dormituris ouum ex rosaceo imponi tradit, an aserinum adipem; & capiti quoque pinguis infundi: Frigida, inquit, & quæ inducunt, vitanda; caput velandum vngendūque; alius ducenda. Hæc valere scribit ad sclerophthalmiam, quæ apud ipsum durities oculi & difficilis motus est, cum labore ruboreque circa humiditatem. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est sine fluore dispositio. Curatur apud eundem, balneis, inunctionibus, & victu prohi succi. Vtrisque vero communiter conueniunt medicameta acra, at etiam lachrymas pro uocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoque pancrestus, & quod dicitur dicenteton: Item cui nomen est stratorico. Vide Aëtium de duritie ac ariditate oculorum libro 7. capite 76. Ego autem ad ariditatem sæpissime commode vsus sum decocto maluæ, viol. hordei mundati: vel solo fots decocto maluæ. Alij tamen, (vt Fernesius) Xerophthalmiam ad pruritum palpebrarum referunt ex humore falso & nitroso, quæ etiam nostris sicca lippitudo dicitur. Interpret vero Pauli appellat Pterophthalmiam pruriginosam palpebræ scabiem ex falso & nitroso humore contractam. Verum de pruritu palpebrarum latius dicturi sumus, cum de palpebrarum vitiis agemus.

OBSERVATIO V.

De Dolore oculorum.

Mulier vtcunq; biliosa, cui & sanguinis portio admixta erat, de oculi dolore ingenti, cum rubore conquerebatur, & palpebræ non solum

solum inflata, sed inflammata ac rubedine affecta conspiciantur. Ac optimo victus ordine, post ventris lenitionem, huic vena cephalica in brachio è directo oculi affecti secta fuit: postea etiam cucurbitula cū scarificatione in parte colli qua iungitur cranio, appositae fuerunt: etiam sanguis post aures applicata; & medulla panis, simul & pomorum dulcium, cū lacte muliebri & aqua rosarum macerata oculo apposita sunt: atque oui albumen concussum cum collyrio albi Rhasis instillatum, quod opium recipiebat. Pilulas quoque lucis deuorauit, & à dolore liberata est. Quemadmodum & alteri, quæ ex dolore ab humore afficiebatur, (præmissis vniuersalibus remediis,) caseus recens ouillus pluries in aqua frigida lotus, & tandem albumine oui permixtus, & oculo appositus, sanguine calido grauante, mirifice profuit. Altera quoque, cum acerbæ ab ophthalmia consistere, pommum coctum cum aqua rosarum & lacte muliebri mixtum cum oculo continuo apposuisset; Deinde collyrium Rhasis album cum aqua rosarum solutum instillasset, tandem ab omni dolore liberauimus.

Vir quoque cum pilulas sequentes deuorasset: 2℥. pilul. sine quibus, lucis, rh. ab. pulv. an. 3 j. diag. 3 ij. cum aqua fœniculi, sunt pilule v. denarij post mediam noctem. Cæterum iis optimum egressit, sed non quod hac de causa dolor aut rubedo discederent: sequenti vero die scapulis cucurbitulæ cum scarificatione cutis sunt applicatæ: tandem quinto die, vi etiam apud Amatum Centur. 4. Curat. 45. Iosephus quidam, cum oculum aqua rosacea tertia præparata excepisset, & per manicam traiecit lauare, breui sanitatem obtinuit. Adrianus Milius vir prudens ac pius, Hollandiæ Præses, narrauit mihi, cum aliquando iuuenis Coloniae agens inflammationem ingentem & oculi inflationem pateretur, ei à medico consultum fuisse, vt albumen oui ad dimidiam horam concuteret, mox adiecta aqua rosacea panno lineo in eo humore intincto ac continuo oculo imposito; deinde & radice chelidonie contusa, addito panis fermento & nuchæ appposito, & foliis eiusdem vna cum radicibus simul contusis pedibus admotis. Quo facto egregie conualuit. Sed & Laurentius Vlimmius Baccalaureus iuris, Alcmarianus, anno ætatis suæ vigesimo septimo 24. Martij mensis die, anno 1555. cum ex nimia vini potione in oculorum dolorem leuem & rubedinem quandam cum exigua inflammatione incidisset, & vna catarrhum & dolorem capitis, non tamen grauem, incurrisset; sequens decoctum eisdem præscripti: 2℥. cort. rad. cicchorij, fœniculi an. 3 ℔. foliorum fumariæ m. ij. betonicæ m. j. acerosæ, saluæ, euphrasie an. m. ℔. sem. anisi 3 ij. sem. coriand. præparati 5 j. foliorum sen. 3 ℔. sem. sileris montani 3 ℔. vuar. pass. ab. arill. repurgat. p. j. prun. damasc. numero nouem, fiat decoctio in libris trib. aqua communis ad consumptionem medietatis. Stent per noctem supra herbas infusa, mane coletur cum forti expressione, & aromat. cum 3 j. cinnamomi selecti, & saccharo dulcoratur. Bis in die ex eo sumebat. Postea has pilulas sumpsit: 2℥. pilul. lucis v. aioris, pilul. biere simplicis Galen. (hic erat aliquo modo piruitus) an. 3 ℔. cum succo fœniculi, sunt pilule vij. quibus circamediu noctis sumptis quinque aluum deposuit, & dolor capitis magna ex parte euauit. Ad oculi ruborem hoc collyrio utebatur; 2℥. aqua fœniculi, ros. an. 3 ℔. lactis mulieris lactantis mellam 3 ℔. misc. victuque attenuante vtens statim fuit curatus. Ad idem post mensem largius vino vtens, denuo incidit in catarrhum & columellæ ac tonillarum leuem inflammationem.

Sed nunc post vniuersalia remedia, garg. ex aqua plâtag. floribus ros. rub. incoctis, & semine cydon. cum dianuco & diamoro, fluxus catarrhi facile cessauit, & pristina sanitati restitutus fuit.

SCHOLIA.

Sciendum est omnes morbos oculorum in triplici esse differentia, scilicet ex phlegmone, fluxu, & ulcerationibus, & in omnibus istis semper adiungitur dolor. Et quia oculorum dolores in primis graues esse solent, ideo seorsum quoque æstimandi sunt. Mouentur autem ab humorum acrimonia, in acri epiphora, ab ardore in ophthalmia, à flatuum vel humorum influentium copia, quæ illorum tunicas distendit, à carbunculo à carcinomate: sed à pustulis & vlcusculis, quæ in corneam incidunt, aut nullus aut admodum levis oritur dolor. Et ideo recte dispositionem doloris, inquit Galenus, in phlegmone animaduertere debemus: aut enim humores acres fluunt ac mordaces, ac multi, quibus tunicæ oculorum supra modum extenduntur, aut humor crassior lædit, aut spiritus intus inflammans. Vnde erodere, compungere, extendere, comprimere, vel astringere sentiuntur, ex timiscerebri destillationibus, vt de ophthalmia vera ostensum est, aut forissecus euenientibus, aut ab ipsis arteriis venis descendunt. Vt igitur in aliis multis, ita in oculorum quoque vitiis (teste Alexandro Tralliano) primum docere conuenit, quomodo vniuersa internosci debeant, deinde curationem subiungere. Nihil enim adeo excruciat, vt urgetque artem ad curationem, vt vehemens dolor oculis affligens. Si igitur vehementes dolores, & intolerabiles, oculos comprehendunt, vager ferre nequeat, ne collyriis ad torporem inducendum efficacibus, vt plerique, confidas.

Multi namque opium quoque instillare ausi, præterquam quod nihil prius dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt. Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eam deinde considerando, ita quoque curationis speciem designare. Non enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. Sola materiæ copia influens doloris rem potest incitare, nec non qualitas: subinde vero etiam vtrumque, & qualitas simul & quantitas. Videndum porro est, vnde id quod influit, procedat; num ex toto corpore, an ex solo capite: Item vtrum per arterias, an à venis, vel ab utrisque profluat: adhuc quale vtique sit, quod influit, vel sanguis, vel pituita, vel humor melancholicus, vel spiritus flatulentus est, quod influxerit: præterea humor noxius, vnus sit an duos commixti; fieri enim potest, vt vnus tantum influxus inflammationem doloremque vehemens, & duorum simul etiam compositum tumorem excitarent. Cum igitur differentes causæ sint, artificem ad singulas se accommodare oportet. Præcedat igitur internotio, quæ ad rectam curationem deducit. Verum cum de his prius dictum sit, & de singularum notitia & curatione, si plenitudo aut sanguis dolorem faciat, aut bilis aut pituita, aut flatulentus humor, eadem erit curatione. Si plura de his desideres, vide Trallianum lib. 1. De curatione doloris oculorum: nam vbi à plenitudine dolor sit, nihil profunt topica remedia seu anodyna, nec reprimantia, aut repellentia. Nam quæ repellunt, ob plenitudinem non possunt humores retro pellere; & distensionem maiorem faciunt, ob idque dolorem potius augent. Digerentia quoque magis attrahunt, quam digerunt, & sic morbus potius

potius augent. Talis itaque dolor, vt iam dictum est, soluitur sanguinis missione, clystere cucurbitulis & sanguifugis, demum fomentis, de quibus dictum est prius. Si humor adsit, ille purgandus cum pilulis aureis, cochiis, lucis: si pituita, curatur, vt iam exposuimus. Si dolor fiat à flatibus, licet status non euacuentur medicamentis, sunt tamen danda quæ pituitam euacuant, Rondeletio auctore: mox partes relaxandæ cum foru. Collyria vero quæ ad acrimoniam valent, dicta à nobis sunt. Vide Trallianum & Rondeletium, & Aetium quoque: Et præcipue Benedictum Fauentinum præceptorum nostrum, & toni primi seclentis secunde cap. 3. De doloribus oculorum & de eorum curatione. Qui de his rebus ad longum agit. Hæc inquam diligenter notanda, cum mulierculæ apud nos sine ratione ocularibus remediis vtentes, plurimos misere exacercent. Non ita pridem puer apud calcearium extra portam Diui Georgij habitans, ac fossam aqueam distam, cum oculi inflammatione ac dolore afficeretur, & ab empirico male tractaretur, cum postquam cum syrupo ex infus. ros. pallidarum euacuasset, & cucurbitulas scapularis admoisset, cum venæ sectionem minus toleraret, ac oculos fouisset cum foru folior. malua, viol. bordei mun. sem. cydon. & fenugr. exiguæ, sem. papau. adiecto, dolor mitigabatur, etiam aliis remediis aptis adhibitis. Verum hic puer à manibus nostris tractus, ad muliercularum consilia, cum suo damno deuenisset, ulcerationem postea incurrit, & cæcus factus est. Non sine ratione conqueritur doctissimus ille Benedictus Veronenis medicus, suo tempore paucissimos ocularios medicos in Italia reperiri, eos quod literas non didicerint. At apud nos multo minus, cum hæc curatio modo ad mulierculas modo ad quædam imperitos tonsores, redierit; qui vno collyrio omnes oculos curare nituntur: Hinc quoque innumeri apud nos oculis orbi cernuntur. In Asia vero, & in Syria ac Media, præstantissimi ocularij medicis hac ætate inueniuntur; apud alias nationes paucissimi. In Græcia quoque deperire non solum ocularij, sed & chirurgi, vel ex tertia medicina Clinici: quoniam ætate nostra Turcarum feritas Græcorum imperia & regna cum literarum studiis sustulit.

OBSERVATIO VI.

De Oculorum panno.

Villicus quidam iuuenis, Cornelius nomine, in pago Ryfviickio dicto, non procul ab vrbe Delpheni habitans, cum exanthemata incurrisset, & mediocriter ab iis curatus esset, intempestiue & nimis subito cū sese acri exposuisset, atque ad nundinas illas famosas equorum Valckenburgenses profectus esset, domum rediens inflammatione oculorum haud exigua correptus est: & cum temporis medicamenta non adhiberet, tandem pterygion seu pannum vel sebel oculorum incurtebat. Hic autem cum ad me deuenisset, ac ambobus oculis inspectis, cum viderem in corpore repleto & potissimū capite, quod etiam venæ replebantur in tunica adnata, quæ circa inuicem tenebantur, veluti fumus intertextus, totam coniunctiuam fere paniculi instar cooperiebant, ab ocularib. nostris medicis pannus dictus, ab aliis sebel, & à doctioribus pterygion dictus, quamquam alij inter se differentes passiones tunicæ adnatæ esse velint, de quibus latius in scholio. At nos statim deposita aluo

prius, altero die sanguinem ex vena cephalica in brachio dextro, cum oculus dexter magis affectus esset, detrahère iussimus. Deinde vt alius laxior quotidie haberetur, apozema longius descriptum, ex sumaria, malua, euphrasia, feniculo, solis stria, rhubarb. primis & myrob. Idque in sero lactis ad aluum molliorem reddendam. Postea eundem purgauimus cum pilulis sine quibus, & lucis. Iisque aliquando in villico reiteratis, simul etiam appositis cucurbitulis natibus ad scapulis cum scarificatione, sanguine satis copiose extracto. Quibus licet inflammatio sedabatur, pannus tamen non tollebatur, adeo vt nihil videret, imo vt cæcus longo tempore ad nos deduceretur. Cæterum cum hic pannus durior esset, factis prius fomentis emollientibus & inflammationem tollentibus, ex decocto malu. foliorum viol. seminis malua, cotoneorum, papau. sem. fenugr. diligenter loti, & similibus, dolor quidem sedatus est; & licet mollior videretur, durior tamen postea euasit, & magis inueteratus. Primo igitur commodis remediis vsi sumus emollientibus, deinde detergētibus, postea etiam iis quæ ad pterygion confirmatum valent; similiter fomentis, sacculis & collyriis vsi sumus, qualia descriptimus in lib. de febr. pro iuvene quodam Nicolao Halsio, cui post variolas pterygion accessit. Quamuis in hoc villico ad fortiora detergentia coacti fuimus accedere, præter collyria frequenter adhibita, ex succis chelidonie, rutæ, felle bubulo, anguillæ, postea etiam aris ærugine & vitriolo adiectis: quale hoc sequens erat, quo sæpius utebamur 2℥. succi fœniculi 3 iij. succi chelidonie 3 iij. succi rutæ 3 ij. succi malua 3 ii ℔. aloes 3 vj. vitrioli 3 iij. æruginis aris 3 j. zinzib. cinnamomi an. 3 ℔. fellis anguillæ 3 ℔. fellis tauri (vel eius loco si haberi non possit, fellis bubuli aut porci 3 ij. sacchari candi 3 iij. mellis optimi 3 ℔. ebulliant succi, addendo reliqua, & depurentur, & fiat collyrium secundum artem. Quæ cum sæpius bis in die in oculum stillarentur, licet cæcus per integrum fere annum paulatim visum recepit, & tandem integre pterygion liberatus est, magno cum nostro honore, at Dei benignitate.

SCHOLIA.

Morbi ad tunicam agnatam pertinetes, præter ophthalmias veras & lippitudines, che-
moses, perturbationes, (teste Aetio lib. 7. cap. 2.) seu coniunctiuæ
etiam pertinent ædemata, id est, tumefactiones, pterygion, vlcera, carbones, cancræ affectiones. Gordonius
autem 13. passiones tunicæ coniunctiuæ enumerat,
vt ophthalmiam, pterygion seu vngulam, maculam ru-
beam, pannum, Arabibus sebel, tumorem, duritiem, prur-
itum, apoplexiam, vlcera, saniem, carnis diminutionem,
& excrecentiam, fistulam lachrymalem, lachrymas cur-
rentes, & puluerem cadentem in coniunctiuam. Addit
Valescus & dolorem oculorum & borbor seu vesiculas
paruas. Verum pannus vel sebel Arabibus, & pte-
rygion vel Vngula maximam affinitatem habent,
& parum aut nihil in curatione differunt. Hinc
quidam, vt Rondeletius, pterygion Græcorum, Ara-
bum Zeber vel Zebel esse putarunt; quam pas-
sionem alij Vngulam vocant. Differt tamen pan-
nus seu Zebel ab Vngula, vt Barbari distinguunt, sebel, & vna
etiam teste Arculano: cum Vngula seu pterygion,
sit nerueum quid sine venarum repletionem, oriens
à lachrymali domestico, nec cooperit oculum
nisi in forma sagittæ: At zebel seu pannus à Bar-
baris descriptus, cooperit totum oculum, vel
quasi totum, seu tunicam adnatam, vel etiam
corneam.

corneam, instar panni rubei viscosi cum venulis intertexti vel diffusi; unde & nomen suum ab ocularibus medicis recepit, non quod panniculus sit, sed quod similitudinem cum eo habeat. Ha-

5 bétque in se plures differentias, vel quod sit mollior duriorque, minoris aut diuturnioris temporis vel per viam defluxus, aut paulatim ibidem con-

Causa sebel. gessa, modo etiam coniungitur cum aliis oculi affe-
ctibus aut palpebrarum, cum inflammatione, vlcerebus vel scabie palpebrarum quandoque sine iis reperitur; & causa generalis est ipsa fluxio vel congestio. Hic vero post variolas ex fluxione, postea etiam congestione facta originem habuit. Et plerumque fit à sanguine solo vel cum aliis humo-
6 ribus permixto, bilis enim puta tenuis in panniculum congelari non potest, ita neque pituita sola aut melancholia, cum alba sint & fusca; & ideo zebel rubrum progignere nequeunt. Fit igitur à solo sanguine vel à sanguine cum aliis humoribus permixto. Signa per se manifesta sunt, cum visu pateant; apparet enim panniculus ex inflammatione venarum rubeus, carnosus in coniunctivæ superficie. Quod ad sit caloris aestuatio, sit propter humidum retentum, quod non euaporatur, neque spiritus neque calor naturalis eueantur. Oculi præterea laeduntur potissimum à lumine candente & solis & ignis, cum lumen & ignis dilatent & exagitant humores ac spiritus; unde nocuumtum. Visus debilitatur, & in totum aliquando aufertur ob panniculum cooperientem. Ob contactum cuiuslibet rei imprimentis seu calida seu frigida oculus offenditur, quia debilis est; & præter naturam venæ extensa, & sic à leuissima causa, ut vento, fumo, pulvere, oculus patitur. Signa distinguunt differentias & species ipsas: si à sanguine puro, color purpureus tum ruber adest: si cum bile permixtus, rubedo ad citrinitatem inclinat, dolor vehementior, lachryma plures & acriores: si cum pituita, color rubeus ad album vergit; ita cum melancholia, ad fuscedinem. Si in principio vel statu eadem signa cum ophthalmia, & si fluxio per pericranium descendit, supercilia, frons magis intumescunt, & dolor externus, venæ externæ magisque rubentes, tum facies ipsa, si per arterias, maior pulsatio in temporibus, si per meningis internas, dolor profundius hæret circa oculi radices, & sternutatio multiplicatur, ut de ophthalmia diximus ex Rhafe.

Signa differentiarum seu specierum. Si materia paulatim congesta, ex multitudine dierum habetur, per pruritus præcedentes, vapores, materias subtiles retentas: per fluxiones, si subito collapsa: Signa vero prognostica cum duplicia existunt, modo indicantia futurum pannum: ita magna ex parte præcedunt ophthalmia, variolæ, morbilli: oculi quoque debiles, calidi, eminentes cum habitudine sanguinea, leui de causa in sebel incidunt, maxime vero in locis calidioribus. Alia mera prognostica sunt: & sic sebel difficulter curatur. Per integrum fere annum hunc villicum curauimus, cum per totum illud tempus nihil videret. Præterea hoc malum contagiosum est, & facile de vno oculo in alium transit, & vapor inde exiens inficit aërem, ac facile in recipientem communicatur, ut in ophthalmia euenit, ut intuitu aliorum quis afficiatur, si oculos debiles habeat & materiam paratam. Hinc & morbum hæreditarium quidam autumant, ut ophthalmiam, vlcera oculorum, rubedines, epiphoras: & ita videmus lippos lippientes progignere: nam ex morbo diuturno spiritus gignitur ex oculo decedens tempore generationis agit

debilitat in imprimendo pro compositione debilita oculi: & si oculus facilius aptus est pati proportionalem dispositionem (ut quidam recte senserunt) quæ fuit in generante. Malum quoque præfagium est in sebel, si oculus minoretur: id enim oculi debilitatem decernit, & quod virtus restauratiua debiliior euadat. Nouum vero ac tenue præscribatur, ut de ophthalmia dictum est. Aërem luminosum declinet, & alia omnia quæ materiam mobilem reddunt; cibum ac vinum admittunt, hendo, licet alij in leui sebel vinum admittunt, tamen qui facile euaporat, non nisi in declinatione, ad materiam resolutionem; dandum. Summum, tenui vtatur victu, abstineat ab omnibus fumosis. Quod ad alia præsidia attinet: si vterque oculus affectus, ex duabus venis fiat, Gordonius venas frontis quoque incidit & in temporibus, vel sanguifugis vtitur, postremo alij vtræque venas in angulis oculorum aperit; quamuis nunc hæc minus fiant. Cucurbitula cum scarificatione etiam adhibenda, & corpus purgandum; deinde ad topica veniendum. Vide Tharantann & Gordonium, ac Rondeletium, qui eodem modo hoc malum curat ut pterygion, post fomenta emollientia, adhibenda supra partem resiccantia exedentia, quorum copiam apud auctores iam dictos inuenies. Addam collyrium, quo quidam Graphiatius, (præmissis particularibus enacuationibus & purgationibus,) fuit curatus à panno seu sebel totam coniunctiuam cooperiente cum carnositate satis crassa, ut aspectu abominabile idem malum fuerit: *℞. lapidis hamatidis ʒ ij. viridis albi, viridis aris vstorum ana ʒ iij. myrrha scordii, ana ʒ j. piperis longi ʒ ss. sacchar. candi ʒ ss. pulueris subtilissimi ut alcohol, & cribrentur, ac pyxide ad usum reponantur.* de isto puluere ʒ j. accipiat & dissoluatur in ʒ j. vel ij. aquæ raphani, & applicetur bis ter in die, prout æger tolerare possit, ad momentum vel tempus exiguum, quibus tandem curatus fuit. Quod si remediis istis non curatur, ad opus chirurgicum deueniendum est: ut Paulus, Celsus & Aëtius libro septimo capite sexto docent.

OBSERVATIO VII.

De puella pterygion in oculo vno habente.

Puella paupercula, cum oculum pterygio affectum haberet, consultandi causa ad me deflectebat. Præmissis vniuersalibus remediis, si dem quoque fere præsidii, quibus Nicolaus Halzius curatus fuit, de quo diximus libro sexto observat. de febribus contagiosis. Inprimis aqua calida oculum fouebamus, deinde vero decocto ex hordeo, malu. althæa, chamamelo, semine lini & fenugræc. quoad oculum calefieret. Deinde abstergentia medicamenta admovebamur, & repurgantia, etiam & hoc collyrium, quod ab initio saepe inuisse accepimus: *℞. lactis muliebris, croci, fellis capræ ana partes æquales; fac aliquantulum ad ignem bullire in oui testa; guttas duas in oculum instillato, multis in quatuor diebus vnguem erodit & pannum abstulit.* Præcepit quoque, ut hæc aqua destillata oculum ablueret lineolo molliori, & guttulas aliquas instillaret: Accipe extra lypis piscis vna cum felle, iecore & reliquis visceribus, in minutas partes concidit, adiecto m. j. foliorum feniculi, & seminis

seminis eiusdem contusi; & in alembicum destilla, ac visum reservato. Visum acuit, & vnguem ab oculo remouet. Atque hac aqua Domina de Hoochstraten in pauperibus frequenter vsa est. Verum hoc collyrio, uti & reliquis, non sine ratione, ut mulicula faciant, vtendum. Empiricus quidam ad pannos & pterygia consumenda hoc collyrio vtatur: *℞. albis gemma ʒ j. aqua ros. & feniculi ana ʒ j. misce.*

SCHOLIA.

Pterygion Aëtio, tum Græcis; Latinis vero, ut Celsus lib. 7. cap. 7. Vnguis dicitur; vulgari-
bus vero Vngula. Estque, eodem Celso auctore, membrana nervosa, oriens ab angulo oculorum: quæ nonnumquam ad pupillam quoque peruenit, eique efficit, sapientia narium, interdum etiam à temporum parte nascitur. Membrana, inquit Paulus, oculis sese obducens, ab angulo orta ad pupillam usque peruenit, eamque, ubi fuerit adacta, obregit. Augmentum capit, iuxta Aëtium, saepe ab angulo magno appellato, iuxta nasum: rarius à paruo; & adhuc rarius à superna vel inferna: extenditur vique ad nigrum ipsius oculi, & cum maior facta fuerit, etiam pupillam contegit, & visum impedit primaria ratione, iuxta Galen. 1. de caus. symp. Estque pterygion proprius & compositus oculi morbus, & primo veluti totius instrumenti, cum eodem tempore multæ partes ipsius in eo afficiantur, ut libro De different. mor. liquet.

Nam licet in agnata tunica primum oriri incipiat, corneam tamen attingit. Ita & Neoterici, ut Gordonius, coniunctiuæ tunica morbum dicunt: Tharantannus Corneri: ita & sebel. & sicut increment, pupillam obscurat visumque impedit, sic & pterygio plures partes laeduntur: primo, agnata tunica; secundo, cornea; tertio, pupilla. Propterea posuit oculi tamquam instrumenti, primo compositus morbus est pterygion, propter eam quam obscurat, & non ex accidenti pupillam in numero videlicet ac in excessu (non tamen toto genere præter naturam) ut est lapis in vesica & lumbrici. Licet signis non opus sit, quibus hoc vitium cum Aëtio dicimus in hoc malo album in oculo amplius augetur, carnemue subcrefcere. Hic autem ex scabra lippitudine, aut lentorum humorum. Recentem, ut ait Celsus, non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: inueteratum vnguem, cui crassitudo accessit, difficile; cum & excidi debeat. Pterygia tenuia, alba, iuxta Paulum & Aëtium, facilius quoque curationem recipiunt. Magna inueterata non nisi manu, resse Paulo, curantur. Recentes vero vngues, & magnitudine media aspritudini elidi possunt abstergentibus, quales & Aëtius. Quæ vero aucta sunt pterygia & ad nigrum se extendunt, manu curare oportet: quæ parua & in albo sunt, ea dictis præsidii concubantur curare. Neque crassa, euerfa, eminentia, indurata facile curabimus, asserit enim talia maligna & cancerata esse.

De iis, quæ curari possunt, vniuersam victus rationem statim præcipimus, quæ crassos ac lentos humores extenuet & excidat, quæ petenda sunt ex cap. De dolore capitis ex pituita & lethargo. Inueteratos vngues curandos chirurgis expertis relinquemus: Recentiores vero vel medicocres abstergentibus curabimus, quæ & cicatrices in

oculis extenuant, corpore prius à crassis lentisque humoribus repurgato, atque iisdem prius purgatis: deinde ad topica veniemus: quorum latissimum campum remedium inuenies apud Galen. 4. de compos. medic. secundum locos, & apud Aëtium & Paulum & Rondeletium, tum alios neotericos. Sarracenus oculus medicus, ut à Giffiberto Horstio præceptore nostro, nosocomij Mariæ consolationis Romæ medico, accepimus, æruginem aris cum lacte in collyrium redigebat, atq; eo lachrymas detergebat, & nubes ac maculas & pterygia discutiebat.

Nihil æque, eodem auctore, ad pannum quoque præstat quam liquor formicarum rubrarum in arboribus habitantium expressus per pannum, & oculo instillatus. Lapis pumicis tritus tenuissime, prius leuioribus tentatis remediis, absumit pterygiori; & arugo vltima mitius erodit, quam non vltima. Quod si remediis non absumatur; ad chirurgiam recurrendum, cuius modum operandi inuenies non solum apud Paulum & Celsum, verum etiam apud Aëtium lib. 7. cap. 6. Rondeletius nouacula aut forcipe abscindi iubet: interea hæc curatio, iuxta Paulum & alios iam dictos, potius chirurgis peritis committenda. Quamquam Rondeletius refert, se in muliere, quæ carbunculum passa erat, ʒ ij. carnis ab oculo detraxisse, abscissione per multas vices facta. Quidam vero pinguedine coturnicis destillata in radiis solis, maculas oculorum debebat. At in pueris, qui fortia remedia non ferunt, mel pelui illinitum ignitisque carbonibus suppositum, ut lente calefeat donec mel viriditatem conceperit, abstergendum: quo liquore oculi inungendi sunt. In inueteratis vtitur Sieff viridi, aut de chalcantho.

OBSERVATIO VIII.

De Sugillatione & oculi macula.

Theodorus Mæderius nauta Alcmarianus, qui ex contusione cranij varia accidentia incurabat, à quibus curatus fuit, ut libro 9. observat. 32. recensuimus. Hic post oculi quoque inflammationem ac tumorem, cum postea oculum aperire posset, sugillatione conspecta lacte recenti calide ab vbere extracto & instillato per vnum aut alterum diem, ut ibidem dictum est: quæ cum non iuuarent, & sugillatio nigrior fieret, collyrium quoque ex ruta, chelidonia, sceniculo, verbena, euphrasia in oculum stillauimus: quibus, uti loco citato scripsimus, cessauit sugillatio; alioqui ad aquam raphani deuenissemus.

Verum alteri iuueni, qui ex ictu vehementiore sugillationem oculi incurabat, post venæ sectionem & purgationem & cucurbitulas scapulis appositas (alij quidam colli lateribus applicant) ne plus sanguinis a vena rupta atque contusa efflueret, leuiter repellentia, ut albumen oui cum aqua ros. concussum, & lacte muliebri, apposui. Palpebra quoque exterius inuncta oleo ros. & myrteo, aliquando etiam puluerem myrtillorum vino inspargimus. At cum sanguis deinde omnino ad locum defluisset, priusquam denigraretur, sanguinem calidum columbarum ab aliis destillantem instillauimus, ad maiorem discussionem. Nonnulli lac muliebrem cum pauco thure infundunt, vel farinam fabarum cum hordeo cocto in oxymelite apponunt. At nobis satis fuit sanguis columbæ vel turturis, alioqui ad magis discutientia venissemus, quæ ad inueteratas & denigra-

tas fugillationes praescribuntur, ut est aqua raphani & similia.

SCHOLIA.

EX genere effusionum, quas Graeci *μυωδεις*, & *μυωδεις* vocant, est affectus is, qui ab eisdem Graecis *μυωδεις* scilicet per *μ* in secunda syllaba & in penultima (nam *μυωδεις* per *μ* & *υ* in penultima, de quo postea, oculus morbus est, cum pus fusu cornea includitur) & *μυωδεις* dicitur; à Paulo & Aëtio *μυωδεις*: Latini autem oculorum *Sugillationem*, recentiores vero oculi *maculam* appellant: Gordonius autem *maculam* *beam*; alij simpliciter, ut Tharantanus, *Maculam*, *Auicenna*, *Aliafat*. Estque punctus siue macula sanguinis recentis rubei vel antiqui mortui in coniunctiva modo rubei coloris, modo subrubei, modo nigri. Vnde & aliqui sanguinem mortuum vocant.

Nonnulli tamen, ut *Holerius*, volunt hypopion, quod est fugillatum, ab hypophagmate differre: quia hoc in oculis, hypopion vero in genis & librum *Gamalis* contendunt, licet remediis conveniant. *Sugillationem* nihil aliud dici asserit Aëtius, quam cum ex ictu seu plaga quadam, potissimum ruptis aut contusis vasculis in oculorum tunicis, sanguis sub tunicam subierit; & statim quidem cruentus oculus fuerit, postea vero liuidus. Afficitur oculus & particulatim agnata tunica, seu cornea dicta, indifferenter. Si videndi functionem non impedit, potest esse symptoma eorum, quae ad visum pertinent. Si vero impedit per se primo, utpote magna existens, & sub cornea potissimum, tunc non erit symptoma, sed morbus in numero, seu quantitate. Si hoc malum symptoma sit, siue morbus, statim visu comprehendere poterit oculi color statim cruentus, progressu liuescens, aut nigricans; putantque aegri rubra omnia, quae aspiciunt.

Causa immediata est vasorum ruptio, aut contusio: externa ex ictu vel plaga: interna, ex nimia vasorum repletionem, vel feruore exuperante. Externas, ex aegri sermone facile percipies; internas ex te ipso perpendes: illique perceptis, confestim ad eius curationem properandum priusquam denigrescat: si in grumos sanguis coierit, difficulter discutitur, & progressu temporis liuescit oculus & denigratur; nam refrigeratus diu manet & multus in pus conuertitur, maxime sub cornea. Venae sectione & purgatione, si opus est, utendum erit; atque ut alij ictus curandi in principio. Quidam initio caseo recenti utuntur. Paulus & Aëtius sanguinem palumbi, columbae, turtur: Celsus vero hirundinis commendat. Tenellae autem pennae extrahuntur plenae suo sanguine, & molliter oculis sanguis infunditur. Alij & succo scenugraeci post initia utuntur, & ad fortiora digerentia deueniunt: de quibus videas Aëtium, & Paulum, & Galenum, loco citato. Inueteratis fortiora discutientia adhibent, ut raphanum, hyssopum, & similia, quae à Galeno petenda: reliqua vide apud Holerium, Rondeletium & alios neotericos. In subnigris & inueteratis, nux rancida & iam oleosa cum melle subigitur, & supine decumbente aegro, ne excidat, tribus horis adhibetur; quae cum excidit, alia reponitur. Succus absinthij cum melle mixtus liuorem oculi tollit: quo nos in pauperibus utimur. Sed & maculam auferit aqua vitis, è ramo vere destillans.

OBSERVATIO IX.

De pustulis, scabie, & oculorum pruriginibus.

Cum plurimi anno salutis sexagesimo sexto supra millesimum quingentesimum mense Octobri, Delphis variis oculorum affectibus corripierentur, quidam ex catarrho in oculos defluerent, in tunica adnata, vel in cornea, pustulas exite, quas incurrerunt: alij oculorum pruritus, aut scabiem passi sunt. Pustulas vero curauimus venae sectione praemissa, vel purgatione, uti nobis velle videbatur. Deinde ob acrem fluxionem commode collyrio albo utebamur cum lacte, aliquando cum aqua rosarum, plantag. vel solatri: subinde cum mucagine cotoneorum, psyllij, cum decoctione sumach vel aqua rosarum solutis. Quod si rumpebatur, utebar mucagine fornugraeci, & veltigia remouebam cum pul. margarit. Si ingens calor esset, utebar collyrio ex cerusa lota, & albumine ouorum subinde. Quibus autem pruritus oculorum contingebat, in coniunctiva ex humoribus acutis, salis, viscosi, corpore prius ab humoribus eisdem repurgato oculos fouebam cum aqua calidissima, modo cum aqua chelidoniae, verbenae & feniculi, & in principio aliquando etiam sola aqua rosarum tepida. Quibus si pruritus aut scabies non recederet, temperabam aloem per nothem in vino, & post colaturam guttam vnam aut alteram instillabam, & etiam palpebras liniebam, si scabiosa & pruriginosa essent.

SCHOLIA.

Pustulae haec paruae sub nomine Bothor ab Auicenna, à Tharantano sub quarta passione coniunctivae referuntur; & sub noua à Gordonio, & appellat apostemata parua ad modum miculae, modo maiora, modo alba, modo rubra, quae etiam, iuxta Auicennam, in cornea tunica fiunt: & tunc est color albus; aliquando in coniunctiva; & tunc est rubens. Fiunt itaque in oculis, potissimum circa corniformem tunicam, quamuis & in eorum albo, & in palpebris interim fieri possint, Aëtio teste: & procul dubio haec vocantur à Paulo Graecis *μυωδεις* à Latinis, utpote à Celso, Paulus & Rondeletius, *Phlyctena* propria, inquit, *siue vesicae paruae aqua plena, quae sunt in omnibus partibus à sero humore, suntque similes bullis aquae feruentis, suntque in oculo supra corneam, quae ex multis membranis compositae sunt, & humor tenuis aquosusque abscedere facit, & tumorem praeter naturam gignit. Suntque excrecentiae quaedam corniformis membranae, orae ex humore quodamque subexcoriant ipsius campaginem: vel à sanguine ob plenitudinem, aut acribus succis, ut idem asserit Aëtius. In hoc affectu afficitur oculus vel tunica adnata, secundum quosdam neotericos, & secundum Graecos corniformis tunica. Estque morbus inquantitate seu magnitudine praesertim: quam & in intemperie & in soluta continuitate simul morbus dici possit, cum sit de numero tumorum praeter naturam. At cum corniformis tunica quatuor habeat membranas densissimas ac fortissimas, modo sub prima, & in superficie fieri possunt, & tunc colorem nigriorem praeseferunt: modo sub secunda aut tertia, & tunc albidior colore existunt: nam licet, eodem Aëtio teste, iam dictarum pustularum color naturalis niger sit, in profundo corniformis tunicae cum*

sunt, occultatur, eo quod tunica conformis alba est, & cornibus simillima. In quantum igitur, ut idem Aëtius asserit, in profundo corniformis tunica pustula occultatur, in tantum colorem affumat, & maiorem dolorem inducit, & molestior est. Ex iis ergo distinguenda sunt pustulae, quae in superficie, ab iis, quae in profundo fiunt. Alij, qui Auicennam sequuntur, dicunt esse coloris albi, si in cornea; rubei vero, si in adnata tunica seu coniunctiva. Sed utrum à sanguine ob plenitudinem vel ex acris humoribus haud difficile cognoscemus, ex doloris qualitate, magnitudine, ipsarumque pustularum colore, aegri temperamento, habitu, aetate, ac eiusdem aetate vita, anni tempore, regione, acribus constitutione, ac reliquis optime animaduertis. Suffragia curatu facilis: profunda, difficilis, & si tunica ipsa ulcerata sit. Si in profundo orta, periculum est ne reliquum corniformis tenue existens rumpatur, & vniuersis prociat, ac effluant oculi humores; praesertim si iuxta pupillam ruptio fiat, ut Aëtius refert: aliudque graue consequitur: nam inducta etiam talibus ulceribus cicatrice, homo non videbit propter inductas cicatrices.

Ceterum in istis pustulis curandis, multiloquium, sternutationes, iram, spiritus detentio, splendorem nimium cauebimus, & inhibebimus deambulationes, & alios motus ab initio. Assument aegri cibos molles, concoctuque faciles, & vino abstinebunt toto curationis tempore, ex Aëtij decreto. Si à plenitudine sint, & cum rubore oculorum, vena secanda humeralis, aliusque acri clystere excitetur: quibus adicienda diuerteria, frictions infernarum partium & vincula, cucurbitulae cum scarificatione. Si humores acres pustulas progignant, purgatione utendum, eis primum domitis ac preparatis: at quae non vehementer purgant, iuxta Aëtium, non danda: quaeque stomacho infesta sunt.

Conueniunt igitur manna, pulpa cassiae, cum thamarindorum decocto: commendantur & à quibusdam syrup. & medicamenta quae ichores & tenues humores, à quibus fiunt, euacuant, de quibus videas Rondeletium. Deinde ad topica deueniendum. Aëtius adhibet leuiter discutientia cum leuiter adstringentibus, cum adhuc recentes & inflammatae sunt, deligationes fortes vitando: cataplasmata leuia lata imponenda supercilij & toti oculo, ut & mala atque tempora comprehendant: sinendaeque quamdiu fuerint madida; siccata tollenda, & alia imponenda. Commendat Aëtius ouorum albuminem ac luteum tritum cum paucis croco moderateque passo & pane, additque opij valde exiguum, si dolor urgeat. At cum phlyctenae fiant cum quodam affluxu, alij mucilaginem psyllij vel cydoniorum extractam cum aqua ros. vel myrti, instillant. Alij poima cocta diligentissime contrita, aut mala cotonea parum vnguento ros. admiscens, palpebris admovent. Si repellentibus non cedat, digerentia magis adtenda, ut scenugraeci mucilago; fomentisque utendum quae magis discutunt, & florum chamemeli, scenugraeci, seminis lini decocto & prociendum ad medicamenta quae ex thure, myrrha, & croco parantur. de quibus vide Aëtium. Si ob multitudinem rumpantur, aut ob acrimoniam pustulae erodantur, aut ulceretur corniformis tunica, earum curatio petenda cap. De oculorum ulceribus; de quo postea. Quod ad pruritus oculorum attinet & scabiem, fiunt aliquando in coniunctiva tunica ob humores acres salios, pungentes, mor-

dicantes, ita & scabies etiam in ipsis palpebris inhibendi aegri ne scalpant oculum pruriginosum, vitentque victum, qui humorem acrem, biliosum salum gignant: qui humores quoque similiter purgentur; adhibeatur venae sectio, vel cucurbitulae cum scarificatione administrentur, bilis expurgetur.

Valent autem, quae leuiter reperiuntur & alterent, ut aqua ros. cum oui albumine, & pro pruritu feliciter saepe utor aqua ros. mixta cum aloë vel vino, & aliquando vino per se. Vel vitriolo cum aqua ros. vel aqua pura collyrij instar. Vel aqua decoctionis sumach sola. Vel hoc quod ad pruritus, lippitudines siccas commendatur, & effluua lachrymarum, pruritus & rubedinem inferentium: *℞. aloës lotae cum aqua ros. vel plantaginis, collyrij albi Rhaf. ana ʒ i. camphora lotae ʒ i. misce cum aqua ros. instar collyrij, vel ʒ aloës succorina subtilissime pul. ʒ i. vitrioli Romani ʒ iij. ponantur in nodulo, & suspendantur in ʒ iij. vini Rhenensis veteris: quo oculi abluantur, vel instilletur: aqua decoctionis sumach sola tollit pruritus, si oculi ea lauentur: aloë soluatur cum succo feniculi, & palpebrae inungantur: aqua ex stipitibus vitis dum comburitur egrediens, oculo instillata confert pruritus & ardori oculorum. Scabiem vero adeffe dicimus, ex Aëtio, oculorum, quando oculi vlcerosi rubei & valde prurientes fiunt genaeque rubescunt, lachrymae salia & nitrosa destillant. Curatione huius habes sub vno capite etiā. Deduritie & ariditate oculorum apud eundem, lib. 7. cap. 76.*

Ceterum filia Nicolai Halziz, annos tres nata (cum haec scriberem) ex lachrymarum acrim fluxu incidit in rubedinem vultus oculi, quam & phlyctenae in tunica adnata mox sequebantur: quae tamen fotu decoct. foliorum maluae, & collyrio albo Rhaf. cum aqua ros. soluto, in oculum instillato, curatae fuere. Idem euenit Heylae filiae fratris mei Nannij Foresti annos nouem nata: aqua albuminis oui instillata, alio prius subducta cum syr. ex infus. ros. pallidarum, deinde collyrio albo Rhaf. sine opio cum aqua ros. soluto ac instillato, breui admodum sanitatem adeptae est.

OBSERVATIO X.

De inflatione & de tumore coniunctivae atque duritie.

Per cum ex vespae morfu oculi inflationem incurreret; micam panis infusam cum lacte apposuimus, & egregie profuit: & puer ab inflatione & leui inflammatione liberatus fuit. Commendatur etiam cucurbita in partes diuisa & apposta, praecipue si inflammatio adfuerit. Verum alteri, qui aetate prouectior erat, & tunicam adnatam tumidam habebat, non sine leui quadam duritie, absque tamen abscessu aut inflammatione, commode pilulas ex hiera cum agarico dedimus: mox fotu vli sumus, aqua calida decoctionis florum chamomillae, meliloti, absinthij & anisi, maluae, bifmaluae, exterius oculo apposto emplastro ex vitellis ouorum duris, mixtis cum oleo rosaceo: quibus praesidiis & hic optime se habuit.

SCHOLIA.

In tunica agnata seu coniunctiva, ut etiam Gordonius & Valescus annotarunt, aliquando euenit tumor ex aquositate, ventositate, phlegmate aquoso, & melancholia. Ex Aëtio quod intelligimus, oculum tumere, quando genae exterius attollitur decoloratior, grauior, admodum

Tumor.

Vide eundem
libro eodem
cap. 14.Lib. 7. c. 2.
de oculorum
inflatione ex
Demosthene.

Durius.

4

Lib. 7. c. 7.
de duriis
oculorum ex
Demosthene.

tum contumacior, pallidiorque reddita, interdum & candidum genæ supereminet nigri quantitatem. Nonnunquam etiam tumor laxus extra genam contingit, qui digito pressus, pari velocitate meat. Estque plerumque indolens ac natio concolor, fere à deflexu aqueo fieri solitus. Quicumque vero tumores circa genas absque oculorum consensu sunt, præinanita per clysterem aluo, solis linimentis curandi sunt; quæ adhibitis primo spongiæ fomentis apponi debent. Ad laxum autem & concolorem tumorem præinacuta similiter aluo, post fomentationem mel interiori genæ illinitur, & reliqua adhibentur ab ipso Aëtio descripta. Aliter tamen œdema oculi apud ipsum curatur, si ad scirrhi formam accedat. Et licet ex morfu apum vel vesparum fiat inflatio oculorum, eodem Aëtio teste, ex Demosthene inflati dicuntur oculi, quando absque manifesta causa intumescunt, decoloratioresque ac magis pituitosi prurientesque cum fluore efficiuntur. Quod quidem senibus maxime enenire scribit, inchoante pruritu ad angulum nasi tanquam musca vel culicis morfu, in astate præcipue redundans. Curatur fomento spongiæ, & interiori genæ illito melle, etiam extrinsecus, aluo proritata, & capite calida temperate perfuso, post balneum vino calefacto epoto. Si adit vehemens pruritus, venam secatur cubiti, & præinollita aluo corpus purgat, & aqua marina in hyeme oculum recte colluit. At Neoterici, ut Tharantanus, si vna cum inflatione aut tumore adsit ophthalmia oculorum, & rubedo; recurrunt ad caput De ophthalmia. Singulare autem remedium est & à multis reperitum ad oculos inflammatos vel lachrymantes & lippiantes, lapis calaminaris in pollinem redactus, & albumine duriter cocto, exiguo huius pulueris immixto, deinde huius humoris expressa gutta vna atque altera, oculo instillata. Si solummodo ob humores & humiditates sine apostemate, quod equidem cognoscitur ex profusione lachrymarum, neque tantus sit dolor aut rubedo excedens. Si est ob ventositatem, adest dolor extendens, & tunc tenui vtantur diata, caput purgetur pilulis aureis vel cochiis, hiera picra. Si adsit repletio, venæ sectio adhibeatur, & balneum intret, & oculorum fiat fotus cum decoct. chamomil. scnicul. absinthij, anethi, & similibus. Si adsit caliditas ab initio, iniciatur collyrium album: sin minus, vtatur alio collyrio apud Tharantanum descripto. At durius etiam contingit in tunica adnata, ita, vt oculus neque recte possit claudire, neque ex crassiore humore, siue acrimonia & caliditate, & sine apostemate repleto coniunctiuam, ita vt oculus lateraliter nec sursum moueri possit, nec palpebræ commode possint claudire, cum humiditas quadam in istis includatur, vnde actio motiua & visiva læditur. Auctores, si opus est, adhibent venæ sectionem cephalicæ, & purgant crassos humores hiera picra, agarico, & similibus, & corpore repurgato vtuntur emollientibus & dissoluentibus, etiam euaporantibus ex decoct. maluar. melil. flor. chamomil. in oculis receptis, & istis fotis. Si adest caliditas, fouent collyrio albo soluto cum lacte muliebri puellam lactante, quod in principio instillant. Aëtius ex Demosthene, quando genæ & oculi ipsi ita indurantur, vt non nisi cum difficultate moueri possint, dolentes rubentesque, sed potissimum post somnum vix aperiantur palpebræ, neque humor vllus destillat, ac fordes quæ in angulis oculorum consistunt,

parua auersaque sunt, & subarida; & si genas ab eis extricare querimus, haud facile ob durtiem extricamus. Ita & ariditatem idem oculorum vocat, vbi oculi subaridi & prurientes sunt, genæque rubescant & leuiter doleant absque genarum durtie. Istis duabus prædictis affectionibus, vt & scabiei oculorum diligens cura adhibenda est: neglectæ enim eodem auctore suffusiones, albugines, lippitudines diuturnas: vlcera & staphylococci inferunt: quibus autem istæ affectiones currentur, sub vno capite idem docet; quem ad longum videre poteritis.

OBSERVATIO XI.

De lachrymis ex vno oculo vltro effluentibus.

Pvella nouem annorum, alioqui pulchra satis, cuiusdam Typographi Delphensis filia, ex vno oculo lachrymæ vltro effluebant, quæ frigide erant, neque oculum corroddebant. Erat autem puella pituitosa & catarrho obnoxia. Præscripti autem ea, cum parentes consultandi causa me accessissent quæ destillationem seu catarrhum humidiore originem habere viderentur: post pilulas ex hiera simplici sumptas pro minoratione materię aquosæ, decoctum sumptis herbarum betonica, feniculi, stachados, embragie, adiecto syrupo de succo melle rosæ, & de betonica, per quatuor dies. Deinde purgata pilulis infra scriptis: 2℥. pilul. mastichinæ ex myrobolanis (ob astringentem, quam habent, fluxum impediunt) ana ʒj. pilul. lucis, ʒss. cum aqua embragie, sicut pilula v. die sequenti dedi ʒi ss. lbericæ optima cum ʒj. conseruæ storum betonica. Sed & hunc puluerem capiti inspergere iussi: 2℥. coryza phyllorum, maceris, mastice, storum rosarum rubearum, betonica exsiccata, ana ʒss. coriandri præparati, corioci citri sicci, cyperi ana ʒj. misce. Postremo, vt sequenti collyrio vteretur, mandavi: 2℥. aleos, nucis cupressi, myrris, mastice, ana ʒss. tuniæ præparatæ, sacrocolle mellei, cellæ nutritæ ana ʒj. myrris ʒss. cum succo feniculi, sicut trochisci, & vnius temporis visu cum aqua feniculi soluantur, & fiat collyrium, quod oculo fluens mane & vespere instilletur. Victu extenuante & exsiccante commode utebatur. Et cum ætas paulatim accresceret, etiam hoc collyrio vsi sumus magis fortiori; adultis quoque conueniens, in quibus malum perseveret: 2℥. aleos, nucis cupressi, myrris, mastice, ana ʒss. tuniæ præparatæ, sacrocolle mellei, ana ʒi ss. sanguinis draconis, berberis, sumach, ros. rub. ana ʒj. pulueris tenuissimi, & excipiantur aqua feniculi, sicut collyrium. Cum menses aperti essent, & hæc præsidia continuaret, ab hoc malo proles peperisset, sana debebat.

SCHOLIA.

Lachrymas inuoluntarias neoterici referunt ad effectus tunicæ adnatæ seu coniunctiuæ, quandoque vtantur eundem ad angulum oculi quandoque vtantur. Hunc autem affectum refert Arculus non nisi ad morbum in via, cum visum impediatur, prohibendo debitam delationem specierum visibilium per corneam. Verum si recte rem inspiciamus, erit potius symptoma immodice excretorij, quod frequentissime oculos infestat: atque hic affectus Græcis epiphora dicitur, seu defluxionis vel tenuis humoris impetus, lachrymarum specie in oculos factus. Is autem humor, alias frigidus ac plane aquosus sine dolore, sine ardore aut rubore molestus;

molestus: alias acer est aut salus, qui & dolore aut acrimonia, & ardore molestus est; vnde & palpebrarum sequitur exulceratio.

Epiphoram vero nonnunquam molestia sola insequitur, aliquando dolor, morsus, pruritus subinde & hallucinatio, præcipue cum ex internis oculi partibus provenit: aliquando & asperæ palpebræ his sunt cum erodent: aliquando callosæ, duræ atque inuervæ: cum à materia crassa sunt repletæ, & velut scirrho laborant. Fit & nonnunquam vlcus in aliqua oculi parte, & malum sibi creat & auget. Nam exeditur aliquando caruncula, quæ in lachrymalibus est; vnde maior fit lachrymarum, & conferta magis fluxio, quod ea caruncula glandulosa, velut operculum quoddam sit; ac aquosam, quæ à venis capitis, fluxionem velut regurgitare faciat in proximas nares, per communem meatum. Et quidem aliquando videtur hic qui fistulis lachrymalium laborant, si actæ eas comprimant, saniem per nares excernere.

Fluxionis huius origo fere (teste Fernelio) è syncope & è summo vertice ducitur, in quo humor extra caluam, & subter cutem congeri solet, qui per pericranium in adhaerentem membranam destillat, ac demum foras per oculos exidit; quemadmodum & ex ea sede destillationes alias in dentes, alias in maxillas procumbere proditum iam est. Quocirca huius eadem atque destillationi causa statuenda sunt. At Paulus vult eas quoque oriri ex partibus internis, hoc est, ex cerebri sede. At lachrymarum materia est ipsa humiditas aquea, quæ in cerebro secundum alios continetur, tenuis & splendida, quæ citra admixtionem aeris, vel refrigerationem per oculos guttatum redditur: ob id à salina differt, quæ spumosa est ob aeris admixtionem; à muco vero, spissitudine ob refrigerationem incrassato: non differt ab aqua, quæ in coryza redditur, nisi quod aliquantulum acris est aqua coryzæ ob intemperatum calidum.

Lachrymæ tamen aliquando calidæ sunt, vt paulo ante diximus, & exulcerant, modo etiam ob canthorum oculi apertionem, vt in his, qui canthem canthi maioris absumptam habent, quæ claudet & replet, magnamque influxum prohibet, non aliter quam pannus, spongia aut bombax obstrictus foramen aliquod. Causæ lachrymarum duplices sunt: externæ, facultate expultrice irritatæ, vt ex fumo acris & odore acris, videlicet caput, aliorum; quæque debilitant, rarefaciunt angulos musculorum dilatatis poris; & quæ rarefaciunt; etiam irritando expultricem, ob cerebri compressionem: sic caliditas solis, ignis, balnei, aer crassius, vaporosus, dilatatis poris vel humectatis, tum ex parte cibi humidis, tum potus sordidus lachrymarum dant, vti frigiditas expultricem cerebri & constringens; idque ex mæore, tristitia, & melancholia.

Ita uxorem noui cuiusdam Pietcellij dicti, quæ ob obitum parentis tantas effudit lachrymas, vt ex inflammatione & vlceratione, oculo vno fuerit orbata: ita quoque fit profusio lachrymarum in profundo visu. Apoplectici leui de causa plorant, ob cerebrum humidum, vti arbitror, vt alias diximus cum de apoplexia loqueremur. Mulieres, senes atque pueri ad lachrymas sunt procliniiores, ob copiam humoris aquosi contenti in cerebro. Qui plurimos serosos humores in cerebro medicorum loquitur: nullæ tamen sunt voluntariæ lachrymæ, quamuis nos dicere possimus inuoluntarias, quod nulla tristitia occasione fluant.

Pet. Forest. Tom. 2.

Hippocrates malum esse signum ait lachrymas ægrorum voluntarias. id enim arguit summam facultatem contentricis cerebri, imbecillitatem, & humoris aquei copiam.

Sed quæ ob timorem vel cogitationem mortis fluunt, aliquid boni portendunt, nec illos mortuos dicimus; quod & notum est mulieribus. Qui enim ob mortis timorem lachrymantur, indicant se sana mente & animo bene constare. Et ita sunt ex casu, percussione, frigore, calore, & ex medici imperitia, cum nimis acris præsidia apponit, vnde ex tristi & doloroso sensu vis expultrice stimulat, & lachrymæ profusius exeunt. Internæ causæ à cerebro sunt per venas interiores & sic etiam fluidi dicuntur oculi apud Aëtium, quando ex vlcere, aut pterygij encanthisve ablatione angulus totus ablatus sit, ne influens lachryma amplius detineri possit, sed ad malas delabatur, quod interdum etiam ob ægilopas male curatos contingit.

Fluidi etiam vocantur, qui assiduam destillationem ratione ingiter lachrymant. Signis præsentibus non opus est, cum ea visui pateant; sed videndum num interna vasa hoc committant, ex Paulo: tunc dolores aliquando intimos sentiri necesse est, & acres sternutationes nonnunquam moleste eliduntur, humorem sub calua teneri censendum est. Fluxiones vero extra caluam, vasa in fronte & temporibus distenta, & caput veluti reuinctum, tum quod ex agglutinationis sicca præsidio sunt, & ab applicitis medicamentis facilius curantur. Estque & affectus distinctio, humoris ratione qui effluit: qui aliquando mitior est, & sanguinis & pituitæ naturam obtinens, aliquando acrior. Hæc facile distinguunt per ægri sensum: qui hinc calorem, mordacitatem, acutos sæpe dolores sentit: illinc quod effluit facile crassescit, atque eorum est expertus. Sæpe vero & hæc mixta reperies, vt in ea lachryma, quæ fæluginem præ se fert, & pruritus excitat.

Calidæ palpebram adurunt & pilos cadere faciunt, oculi sentiuntur calidi. Si frigida, & calor non sentitur. Causæ procatartice ex relatu ægri habentur. Quod ad prognostica attinet, ab externis ortæ causis lachrymæ facilius curantur, nisi vehementem noxam oculis impulerint. Sed per abscessionem carunculæ factæ vel corrosionem à medicamentis, si tota vel maior pars remota fuerit, non curantur. Ex superflua humiditate vsque ad ætatem iuuenilem corrigi possunt: sed antiquæ & in senibus difficile curationem recipiunt etiā natiuæ, cum & diuturniores frequenter fistulam lachrymalem inducunt. Quod alias aggritudines sequuntur, curari poterunt, si eadem aggritudines tolli possint; alioqui non curantur, si ea quoque lethales sint.

Temporaneæ & ex causis primitiuis facilius curantur: at ab internis per venas interiores, difficilior. Galenus 13. method. multo deteriores eas lachrymas dixit, quæ ex cerebro prodeunt male affecto, eo quod & agrius curentur. Quod ad generalem curationem attinet; omnium primo fluxionis causam abscindemus, siue in cerebro sit, & materiam ad oculos debiles transmittat, vel oculi affecti facile fluxionem recipiant: siue quod cerebrum ipsum laborat, & ob imbecillitatem à reliquo corpore suscipit: siue in se ipso generat, ob vitiolam alimenti transmutationem: siue quod totum cerebrum non suscipiat, sed vasa solum circa caput, vt temporum & retro aures. Præcipue vero per arterias solet calidus & vaporosus sanguis ferri, & inde in oculos fluere. Cum igitur dux

B 3 causæ

causae adfint, & imbecillitas partis (vi recte de Epiphora dixit Iacchimus) & multitudo excrementorum in cerebro, vel saltem in toto corpore, non vnus modus curationis erit. Si à toto corpus purgabitur, & caput roborabitur, humore expulso qui huius mali causa sit. Et si in capite lachrymarum materia gignatur, primum ipsam genitam ferre conuenit, mox prohibere ne gignatur: demum oculos roborabimus, ne recipiat prompte. Per quas vias sit euacuandum & deriuandum, iam saepius dictum est, & quomodo intemperiem capitis corrigemus, plenitudine prius ablata per venae sectionem, & humoribus adaequatis & repurgatis, demum ad oculi curationem veniemus. Sed haec exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO XII.

De rubedine oculorum, cum lachrymis calidis perpetuo ex oculis profluentibus.

Inter frequenter oculorum fluxiones, acres vero lachrymas admodum irritant, quae frequenter rubedinem quoque inducunt, atque palpebras ipsas rodunt: ut euenit cuidam honestae matronae, cui cum in vniuerso corpore plenitudo adesset, consului, ut prius vena externa cubiti dexteri incisae, (cum oculus dexter afficeretur,) hunc syrupum sequentem ebiberet, ad acres humores contemperandos: ℞. syrup. end. nymphaeae, viol. ana ℥ i. b. aqua. cythorij, acetosae, euphrasiae ana ℥ iij. misc. & per triduum mane bibatur. Postea ut hoc modo purgaretur mandauit: ℞. syr. ros. laxat. ℥ j. elect. de succo ros. ℥ ij. cassiae recens extractae ℥ b. pulpe thamarind. ℥ ij. dissolue cum aqua euphrasiae, cythorij, sumariae ana ℥ j. misc. & fiat potio purgans, sumenda in aurora. Cucurbitulas quoque scapulis apposuit, sanguine utrumque extracto. Postea adhuc semel illam purgavi cum pilulis sequentibus: ℞. pilul. ex quinque generibus, myrob. pilul. aggregat. sine quibus ana ℥ j. cum aqua end. fiant pilulae v. dentur post mediam noctem. Corpore repurgato, collyrio sequenti utebatur: ℞. trochis. alborum Rhaf. sine opio ℥ j. aquae ros. vel aquae cuscudum ros. (si adfit) quart. j. aquae feniculi ℥ ij. (additur aqua feniculi, ne ob refrigerationem obtundatur acumen visus, in crassata cornea, & spiritibus repulsis: id etiam Rondeletius suadet) misc. fiat collyrium. Si illud collyrium non iuaret, consului ut sequenti uteretur: ℞. ceruse abluta, sarcocollae munita, licij, acaciae, olivani ana ℥ j. essum myrobalan. adustorum, coralli albi rubri ana ℥ b. m. q. vari. aurum ℥ b. succi mali punici, ad dimidij abstempionem cocti, q. s. fiat collyrium. Solus etiam malorum puniceorum succus coctus, donec dimidium absumatur, lachrymas calidas curat.

SCHOLIA.

3 Fluxus per internas venas quomodo curatur.

Lachrymae si à causis externis & primitiuis vel ab animi accidentibus contingant, harum curationem medici flocci faciunt, cum caulis ipsis remotis facile curentur. Quae vero à causis internis fiant, & potissimum per interiores venas fluant in oculum, difficilior, ut dictum est, curantur. interea oportet tum inedia, tum frequente purgatione humores exficcare & concoquere, coctosque pilulis aptis euacuare & eradicare, & cerebrum roborandum, ut dictum est, atque exsiccandum internis & externis. In hac specie commendantur cauteria retro aures, & dissectio arteriarum, sed magis in diuturnis affectionibus iuxta Paulum & Gal. quamquam remota haecenus, quod

sciam, sit ausus. Primum quod nec hoc, ut neque caetera generosa remedia, adhibemus: deinde quod ministris egregiis caremus. Rondeletius in hoc casu potius laudat cauterium supra commissuram. Galenus vero Romanam mulierem curauit libro quinto, capite decimo tertio, calidis per tapsum capiti impositis.

Sic vetula quaedam in Italia, vxor cuiusdam serpentarij, cum oculos haberet lippientes, lachrymantes & saniosos cum intenso dolore & prurigne, cum nullis remediis posset curari, tandem raso capiti emplastrum impositum est, quod constabat ex puluere cantharidum & fermento ac melle, excitatisque vesicis ac ruptis butyro imposito, ac demum caulis folio: quo praesidio perficte curata fuit, ut ex arcanis Gisberti Hostij, praceptoris mei Romae exaravi, medici expertissimi Nolosomij Mariae consolationis apud Romanos. Si per venas extra caluariam descendat fluxus in oculos, post vniuersalia remedia cauterium aliqui in temporibus vel post aures applicant, remedia refringentia & emplastra adstringentia supra tempora & frontem apponunt, prius tamen corpore & capite repurgatis, quorum copiam vide apud auctores & Rondeletium.

Deinde ad collyria veniunt, de quibus vide Aetium libro septimo, capite 87. & quae Paulus libro tertio, cap. 22. ad Epiphoras valere scripsit. Ego sequenti commode vtior: ℞. tutiae preparatae ℥ j. sarcocollae munita ℥ b. thuris, masticeis, spicae, ana ℥ b. fiant trochisci. cum ovi albumine vel succo cydon. cum vltus postulat, dissoluatur cum aqua feniculi, euphrasiae vel aqua peculi ros. prout causa exigit. Si plura desideras, consule praceptorem meum Benedictum Fauentinum in sua Praxi magna tom. 1. sect. 2. cap. 8. De oculorum lachrymis. Sic Margareta Theodori filia Verhochij cereuicij Delaphensis, cum post morbillos oculos lachrymantes retinisset rubros atque inflammatos, hoc sequens collyrio curata fuit: ℞. sumach. parum tritum ℥ j. maceretur aliquandiu in aquae plantaginis calidae ℥ j. fortiter deinde exprimatur, addendo aquae ros. euphrasiae, aquae aluminis, ovi diu concussi ana ℥ b. sacchari candidi subtilissime triti & cum exiguo aquae innotati ℥ j. fiat collyrium.

Habes quoque experimenta egregia de oculis lachrymantibus apud Bayrum libro tertio, capite decimo sexto. Vesicatoria in collo egregie profunt post vniuersalia remedia adhibita, ut euenit Domino de Sprang, cum longo tempore oculorum dolore detineretur, etiam ophthalmia cum rubedine quadam & lachrymis, nec vlla remedia iuuarent, tandem vesicatorium ex fermento & cantharidibus collo impositum est, vesica acu percussa multum aquae flauae reddidit, & vi magna tenebat vesicatorium apertum, materia aquosa crocea multum effluente. Vesicatorio rursus subinde reiterato, ab hoc malo liberatus est, palpebris tamen prius quoque inunctis singulis diebus vnguento rosaceo, quae rubedinem & asperitatem simul conuocauerat: neque vnquam amplius huic malo obnoxius fuit.

OBSERVATIO XIII.

De sanguine per tres sepe septimanas ex oculis lachrymantem instar, copiose emanante & profluente.

Lachrymas vero ab oculis profluere, nihil nouum est; at guttas sanguineas reddere, rarissimum: id tamen vidimus anno 1581. 23. Aprilis die, in vetula quadam annos 80. nata, quae in parte

Maiori vero morbo infestante, cucurbitula cum scarificatione apponenda est.

OBSERVATIO XIV.

De Oculi & canthi maioris rubedine, lachrymis, & prius palpebrarum, ut neceus esset de agilope incurrenda vel fistula lachrymalis.

Vxor mea charissima, cum oculi & canthi maioris rubedine diu laborasset, atque timerem fistulam lachrymalem vel agilopam praesertim eo tempore cum multa vitia oculorum ac palpebrarum per modum catarrhi plures depopulerentur, longa quidem aetate constitutione praecedente, diligenter hoc modo ipsam curare instituebam, nempe decoctis praescriptis ex feniculo, betonica, euphrasia, sumaria & similibus, sem. feniculi, senae & prunis; mox pilulis subsequenter deuoratis. ℞. pilul. lucis ℥ i. b. pilul. coctar. aurear. mastichinar. ana ℥ b. cum aqua feniculi, fiant pilulae v. quibus probe aluum deposuit. Sanguinem ex cephalica vena, cum hyems esset, non detraximus: sed eius loco cucurbitulas cum scarificatione scapulis apposuimus, & pro diuersione balnea pro cruribus institimus, ex decoct. florum chamomilla, hederae terrestri, feniculi, canthium rubr. artemis. sale adiecto.

Primo vero collyrium sequens instillabam: ℞. aquae ros. ℥ ij. aquae euphrasiae, feniculi ana ℥ b. misc. postea ad perfectam curationem ℞. tutiae preparatae, sarcocollae ana ℥ j. vitrioli Romani, sumach ana ℥ b. ligentur in modulo; & aquae infra scriptae nodulus imponatur: ℞. aqua euphrasiae, ros. feniculi ana ℥ j. calefant supra ignem, & nodulus exprimatur, & fiat collyrium, & stilletur in canthum maiorem ubi rubedo aderat; & palpebrae pruriginosae eadem aqua abluantur, & his praesidiis fuit felicissime curata, & plurimi alij qui hoc tempore passim in idem malum inciderunt.

SCHOLIA.

Hoc solo collyrio multi à lachrymis fluentibus, quibus & rubedo oculorum aderat, curabantur. In quibusdam etiam vnguentis commode post vniuersalia remedia vsi sumus, quale illud est, à Rondeletio descriptum ℞. corticum thuris, masticeis, sarcocollae ana ℥ ij. gummi tragacanthi, arab. torrefactorum ana ℥ j. tutiae preparatae, antimonij ana ℥ b. sanguinis draconis puri, acaciae & amurcae inspissatae ana ℥ ij. misc. fiat vnguentum; quo catarrhi oculorum & totae palpebrae inungantur. Si ad agilopa & lachrymale fistulam conficere velis, dosis tutiae & antimonij augenda, ut idem admonet. Verum cum hic metus esset de agilope, profuit collyrium nostrum, antequam malum auergeretur & in agilopem transiret. Agilops vero à Gordonio & Valeco fistula lachrymalis dicta, ad vitia coniunctivae tunicae ab iisdem refertur, licet proprie ad canthi maioris seu anguli domestici morbum pertineat. Nam inter maiorem oculi angulum & nasum, quidam affectus oriri consuevit, qui à Graecis ἀγίλωπ. dicitur. Estque, Galeno auctore 5. De comp. medicamentorum secundum locos, paruum quoddam abscessus simile tuberculum inter nasi os, & magnum iuxta oculi angulum ortum, & rumpitur saepe in angulum, hoc enim tuberculum si disruptum fuerit, siue ante disruptionem, Galenus appellat Agilopam. Paulus vero nominat Agilopa, priusquam in vlcus erumpatur; eo vero in vlcus verso, Agilopa.

Pars quae afficitur, ad sensum patet. Affectus vero pars affecta morbus & affectus.

parte orientali Delphis decumbebat, in domo cui hos calendulae pro insigni erat. Lecto autem incubebat, mente constabat cum ad illam accitus essem, utrumque comedebat, nullum dolorem sentiebat, nisi subinde exiguum in ventre; idque circa umbilicum, quem referebat aliquando ex casu contractum: utrumque dormiebat, non febricitabat, quamquam per totum corpus ictero suffusa videretur. Erat autem mulier procera & valde macilenta, cui & lachrymae sanguinea, imo sanguis, continuo fere per utroque oculos fluxerant. Inspecito lotio, quod croceum & nigrum erat, quale in ictericis apparere solet, interrogavi quamdum hoc malo, nempe ictero, laborasset, & sanguinem ex oculis profudisset respondit, tres septimanas elapsae esse, quibus hoc colore totum corpus infestum fuerat: & statim ab eodem tempore satis continuo in hunc usque diem lachrymas sanguineas ex oculis emanasse referebat: oculi tamen non dolebant, nisi quod mane ob sanguinem profusum difficulter aperirentur, & quod in iisdem sentiret aliquem pruritum. Aluushuic ad 14. dies restricta erat; sed cum clysterem non admitteret, glande imposita probe aluum reddidit. Deinde adhibitis leuioribus medicamentis, qualis est syrup. ex infus. ros. pallid. cum rhab. cum vetula esset & vix aliquid edulij longo tempore sumpsisset: deinde ebibito hoc quoque iulebo: ℞. foliorum acetosae belidis minoris ana m. j. florum viol. p. j. sem. acetosae portulacae ana ℥ j. sem. 4. frig. maior. ana ℥ b. herdei mundati p. j. coquantur in aqua communi pro lib. j. col. adde sy. de limonibus, granat. ana ℥ i. b. misc. tenebat autem, & pro fuit frequenter sumebat ex compositione rob. de ribes dicta. Oculos autem peritentes lauabat lotionem sequenti: ℞. folior. viol. maluae, plantaginis, belidis minoris. ana m. j. se. ℥ i. b. in aqua q. s. decoctio.

Quibus remediis post quinque dies, quod dictum mirum est liberata fuit à lachrymis sanguineis & sanguinis profusione, & praeter omnium spem sanitati restituta.

SCHOLIA.

Tale numquam videram, nec apud praceptorum, nec alibi, quamquam Dodonaeus, medicus insignis idem refert euenisse in virgine quadam carnosa, sanguinea, annorum xvi. cum ad menstruas purgationes idonea esset, neque menstrua succederent, natura per oculos superfluentem sanguinem expellere conata fuit; sanguineis guttis lachrymarum instar frequenter ex oculis produebantur. Cui bene fecit sanguinis e vena talo proxima detractio, quoniam menstrua purgatio non ita diu subsequeretur. Recte quidem dixit Hippocr. lib. De genitura, Mensibus non procedentibus corpora feminarum morbosa fieri: quod quidem intelligendum venit, nisi aliunde sanguis erumpat. nam, ut idem Hippocr. aphorism. 33. sect. 5.

Menstruis deficientibus, sanguis ex naribus, fluens, bonum. Sed virgini non ex naribus, apud Dodonaeum, sed ex vicinis oculis profluxit. At in nostra vetula, aliam causam habuit, forte eandem de qua meminit Aetius, cum dicat ab oculorum angulis, quandoque erumpere sanguinem, potissime in infantibus ob continuos eulais, aperitis genarum valis: quos curari oportet postea frigida infusione, gelida aqua, aut etiam postea infusione super caput. Instillandum quoque est albumen ovi; cui commisceri collyria possunt, quae ad tenues defluxus, conueniunt, inferioraque membra vinculis constringenda, & crassioribus cibibus offerendus.

Causa.

Prognostica.

Methodus
curandi mor-
bos cap. 26.
de Agilope.

morbis est in compositione primo, in magnitudine videlicet; & proprie in excessu: cum quo intemperies, ac soluta continuitas complicatur. Verum eo disrupto, morbus erit in soluta continuitate primo, cum de genere vlcis sit. Fit à viscosis succis ad prædictam partem delatis, aut à toto, vel à quibusdam partibus transmissis. Agre curatur, teste Aëtio & Galeno, & ideo Apollonius, teste Galeno, nulla pharmaca ad Agilopa scripsit; Archigenes vero pauca. Vide reliqua, tum quæ ad curationem valent, apud Altimarum, quæ ab Aëtio, Paulo, Tralliano, Galeno & Archigene, mutauit. Hoc enim tuberculum in cantho maiori factum, facile in fistulam lachrymalem vertitur, & hic tumor à lachrymis retentis, aut ab humoribus corruptis acerbis à capite in eam partem descendentibus fit, & facillime à principio (ut docet Rondeletius) curatur. Verum quum parvus sit tumor, & sensum fiat, negligitur, nisi cum per defluxionem repente fit, & dolorem excitat. Si fiat sine dolore, sine aliqua inflammatione est. Purgatio sufficit & aliqua digerentia supra tumorem apposta; ut emplastrum diuinum, ceroneum, & similia discutientia, & diapalma. Si per defluxionem repente fit, & tumor maior est, tunc mittendus sanguis, & à parte propellendum medicamentis repellentibus, dolor sedandus cum pomo cocto in lacte, si urgeat. Si tumor suppuratur, cito aperiendus, ne materia diutius retenta sinum faciat & os lardat. Reliqua vide apud Rondeletium, & quibus modis fistula curetur. Anchirops antequam succedat Agilops, & ideo ego non libenter me intermitto huic curationi, si ad Chirurgiam deuentum sit. Noui medicos doctos, qui iuenculam generosam præ manibus curandam habuerunt, quæ ex morbillis Anchilope, postea & Agilope laborabat: quam cum auro ignito curare tentarent, in perpetuam fistulam lachrymalem incidit, aspectu horribilem, quam alij chirurgi curare minime audebant. Addam exemplum aliud.

OBSERVATIO XV.

De Agilope & fistula lachrymali.

Chirurgus suo tempore aliqui insignis, cum Louanij mulierem curaret iater lachrymale, & nasum abscessum habentem, eoque aperto angulum maiorem cauendo, (adhibitis tamen optimis remediis,) quamuis vlcus consolidatum, tamen cum denuo reuenteretur, in fistulam lachrymalem incidit; quæ neque Aegyptiaco vnguento, neque alio remedio corrigi aut deleri potuit. Idem aliam domicellam religiosam fistula lachrymali laborantem, hoc modo sanabat, cum nullum os neque panniculum infectum spectaret, neque maligna qualitas vlcis aut vicinis partibus adesset, optima victus ratione præscripta, & pharmacis vniuersalibus adhibitis, tum venæ sectione præmissa pedis ac brachij, orificium vlcis aperuit, tenta (sic enim barbarè chirurgi loquuntur) ex gentiana radice confecta, & orificio successiue satis aperto, pro vlcis mundificatione sequens medicamentum præscripsit: ℞. mellis communis ℥ij. viridis æris ℥ss. aquæ rosæ ℥iiij. as viride pulueris ℥ss. & cum aliis diligenti igne decoquatur ad tertiam partem consumptionem, & colatura vsui referuetur; quæ syringa tepidè suauiter imponebatur; si acrius videbatur, aqua rosæ vlcus abluebat omni die, & post lationem exiguum vnguenti Apostolorum admovebat. Hoc modo tribus

continuis septimanis procedebat, superponendo etiam emplastrum conueniens, ac oculum aqua rosacea defendebat. Postea pro tertia intentione perficienda, nempe incarnandi atque cicatrificandi, vlcere iam satis repurgato, istud collyrium præscripsit: ℞. iburis, sarcocolla, aloës, sang. dracon. balauft. antimoni, aluminis, ana ℥j. flor. gran. p. i. subtiliter pulueriscentur, & cum aqua rosæ fiat collyrium satis liquidum. Imponebatur leuiter cum rutæ stipite, deinde exsiccabat, continuabat tertio in die tribus septimanis; postea bis in die minorando tentam. deinde tantum lauabat diapalma super imposita & panno lino raro loco compressionis. atque hoc modo feliciter absoluebat curationem. Idem commendabat tartarum calcinatum & puluerisatum, & agaricum mixtum cum aqua vitæ, quo tenta oblinata fistula lachrymali imponebatur. Vel hoc, quo etiam utebatur: salis rosi, tartari calcinati, agarici ana ℥j. pulueriscentur subtiliter, & cum melle communi fiat vnguentum. Tartarum autem in hunc modum calcinatur: inoluatur inter stuppas canabinas madefactas in aceto, & ponatur sub cineribus, donec sit calcinatum, ab omni parte ad albedinem transmutatum. Deinde misceatur cum aqua vitæ ad modum vnguenti, utere in fistula lachrymali. Consumit carnem vitiosam, & fistulam mortificat: eaque intacta succedet sanies alba digesta. Deinde imponatur sequens exsiccatium & incarnans: ℞. iburis, sarcocolla, sang. dracon. aloës, balauft. antimoni, aluminis, ana ℥j. & ℥j. flor. aris; fiat puluis, miscetur cum aqua rosæ plantag. vel cum harum decoct. Iacobus de Carpo chirurgus suo tempore expectissimus, ad fistulam lachrymalem sequenti collyrio utebatur: ℞. aloës, myrrha, croci, ana p. a. i. fundantur in aqua vitæ quinquies sexiesve desillatæ, per noctem & diem, deinde colatur; & colatura addantur theriacæ optime & camphoræ q. s. fiat collyrium.

SCHOLIA.

Quomodo Agilops curetur, vide Holerium in commento suo in librum quintum Galeni cap. De Agilope, habes ibidem quomodo per chirurgiam curetur. interea adiciendum, quod aliud vitium oculi, Rhyas, dictum, fistulis fere succedat; quæ est caruncula anguli maioris abscissio vel imminutio, & angulus lauior euadit. Fit tamen & aliis ex causis, velut ab humoribus, & medicamentis excedentibus. Rhyadi opponitur Encanthus, quæ ipsius est caruncula immodice eminentia. Valefcus & Gordonius carnem superfluum adnatæ seu coniunctæ tunice ponunt, quamuis vitia iam prædicta potius ad angulum pertineant. Causas augmentationis esse volunt sanguinem, humores, & repletionem: Diminutionis vero internam, ut siccitatem illius partis, vel indebita incisio sebel aut pterygij.

Signa per se nota. & quod ad prognostica pertinet: Si magna & antiqua, non curatur nisi chirurgica: Si vel eius curatio est nimis longa & periculosa, cum caro superflua nequeat amoueri nisi fortibus & corrodentibus medicamentis, quæ oculum difficile sustinet. Carnis quoque ablatio lachrymalis oculi, ex incisione parui vel pterygij, aliove modo ut in fistula vel cancro, vel vulnere illius loci, est irreparabilis. Curatio hæc est: ut caro superflua amoueatur incisione, vel canerio actuali missa per calammum: cum cautione diligenti, ne diminuat aut superflue abscindatur. Ex superflua autem incisione lachrymae sumit, & iterum ex diminuta accrescit, & ideo post incisionem lachrymali imponatur pulvis croceus dictus, & super oculum vitelli oorum ad perfectam duritiem coactum, si dolor non adsit: alioqui albumen oui coactum.

apparet. Ante incisionem lachrymalis humorem peccantem prius purgat, deinde vitæ collyrii præscriptis ad sebel seu pterygia quibus si non curentur, ad incisionem venit. Diminutio carnis si fiat ab alia causa quam incisione, ponatur in lachrymali medicina carnis generantes, quibus simplicitas cum exiccatione adsit, ut mentha, clocus, aloë cum vino: aut vinum in quo decoctæ fuerint rosæ, nux cupressi: vel hoc collyrium: ℞. aloës, olibani ana ℥ij. sang. dracon. sumach. ana ℥ss. cum aqua rosæ fiat collyrium; gummi Arabicum solummodo decoct. supradictæ generat carnem, lachrymas stringit. Paulus encanthidas, quæ de Ectropiis scripsit; causticis & septicis abluit; sed non totas, ne eius loco Rhyas subnascatur, verum ad naturalem vsque magnitudinem. Ad Rhyadas curabiles collyrio diacrocum inscripto vitur, prodest & alterum in vino coctum impositumque & aluminis ex vino pauxillantes curet Aëtius, vide eundem lib. 7. cap. 61. magnas & maleficas chirurgiam tollit, lib. eodem, cap. 62. Quæ vero Paulus de Agilope & anchilope scripsit, vide eundem lib. 2. cap. 22. De Agilope vera, quæ Aëtius ex Severo collegit; vide lib. 7. cap. 84. Deque eiusdem vitione cap. 85. & de anchilope cap. 86. & de fluoribus oculi cap. 87. ex vlcere aut pterygij encanthidisve ablatione. Benedictus præceptor meus Faudentinus admodum longam & egregiam curationem ponit Agilopis in sua magna Praxi, ad quem accedere poteritis, ne hic longiores simus. Et quum iam absoluerimus affectus fere omnes præter naturam, qui in tunica agnata contingere solent, adhuc duas passiones restant, nempe de pulvere vel rebu extrinsecis in oculum cadentibus, & de vlcere ipsius oculi: quamuis uterque affectus tam ad tunicam corneam quam adnatam referri possit: ut postea latius declarabitur. At nunc prius exemplum adducamus, de pulvere in oculum cadente.

OBSERVATIO XVI.

De pulvere ac culice in oculum incidente.

Qui pulvis in oculum cadebat, fluxionem quandam & rubedinem in coniunctiva tunica postea incurrebat. Iussi ut oculum aqua dulci aspergeret frequenter, ac in oculum sapius proijceret lac muliebri ab vlcere statim multum. Iisque prædictis adhibitis mox à fluxione ac rubedine æger liberatus est. At famule meæ cum culex oculum intrasset, oculum conficabam. Hoc enim modo, si in oculum culex aut alia quavis bestia inciderit (teste Alexandro Veronensi libro 2. capite 24.) sponte tadium illud exilit. At cum hoc modo nondum exiret, leuiter palpebra sursum tracta cum linteo molliori eximebat. Ad idem valet, ut in me ipso expertus sum, ut vna narium parte oclusa digito oppressa, per alteram vehementior fiat exufflatio. Vel anhelitus sternutatione (si leno est, quod oculum intraverit) facile exsilire solet.

SCHOLIA.

Gordonius hanc passionem modo ad tunicam coniunctivam, modo ad totum oculum pertinere affirmat, quamuis iuxta Tharantanum etiam corneæ accidere possit, ut aliqua res extranea in oculum ingrediat, ut festuca, pilus, pilus, calx, gypsum & similia: quibus cito occurrendum, ne diutius inhaereant ac dolorem inferant. ideo

statim os aqua fontana implendum, & subito in oculum apertum sufflenda. Ut lac femine ab vlcere mulgendum, & infundendum; vel vinum album, id enim lachrymas producit, & oculos à sorditie repurgat. Si arena, inquit Demosibenis, aut quodcumque vento sublatum fuerit, alterius oculi conficatione exibat. Si adhuc inhaerit, aqua foueto egelida: vel lac muliebri infundito, vel mullam. At si quippiam tale adhæreat, & occultetur, corrigia gracili remoueat, aut tenaculis paruis, leuiterque oculus aperiatur, & visa festuca corrigia vel penna gallinacea subtiliter extrahatur. Rubinus vel sapphirus oculis immixtus extrahit puluerem & quicquid exterius ingressum fuerit. Seminis lini mucilago extracta cum aqua rosæ in oculos instillata, similia expellit. Palpebra quoque supra aliam posita & inuersa, ad expulsionem facit. Refert Aëtius: si in oculum culex incidit aut aliud perexiguum animal; ocluso sano oculo prius alter aperiendus est, ut animal libere exeat. Si vero palea aut arena quippiamve tale incidit, idem quoque fieri potest: quod si parum succedat, vossella suauiter extrahes, aut aquam, aut lac, aut potius mullam infundes; sin adhuc magis oculo adhæreat, medicamento quopiam viscido minime acri tentabis euellere, quale est, quod è melle conficitur. Si calx viva in oculum incidit, lac quidem aut aqua infusa vlcera & incendit. Qui vero albumen infusum, & magis oleum rosaceum, adurendi facultatem retundit. Cum diuideretur lignum, pars ligni impacta est in oculum filia cuiusdam mulieris. Ipsa autem statim cepit rubrum oui, cerulam & oleum rosarum, ac in circuitu totius oculi posuit hanc mixtionem loco defensiuam, & intra oculum aquam albuminis oui. Alij vero commode imponunt aquam albuminis oui vna cum lacte muliebri & aqua rosæ. Sed hæc priori medicamento sanitati restituta fuit, ac pars ligni hoc modo exiliit.

Lapidis sculptori, frustum lapilli in oculum illapsum est. Factæ sunt fomentationes ex mollioribus, ut malua, anetho, fenugræco, meliloto perbiduum: postea fuit tutia cum saccharo candi imposita, & ab hoc tadio euadens sanus factus est. At si in oculo furculus aut quippiam impingatur, officulum (teste Aëtio) vossella extrahemus, diligenter cauendo ne infringatur. Si veronihil emineat, sed æqualem habeat cum corpore superficiem, bina poma accipito, atque vtrinque eiectione nucleis comprime oculum, ut quod infixum est in medio, intercipiatur; cumque procumbere videbitur, vossella extrahito, deinde sanguinem turturis aut columbæ aut oui albumen instillabis: quæ si parum successerint, curato oculum infusionibus & linimentis, quæ ad inflammationem conficiuntur, post aliquot enim dies suppurata punctione, quod infixum est, fluitabit.

OBSERVATIO XVII.

De vlcere oculorum.

Pvella quædam apud orphanos Delfenses, Heynrica nomine, annos circiter septemdecim nata, vertigine capitis subito ac oculorum suffusione deprehensa, cum operi panificij intenta esset, in clibanum ardentem misera cecidit, ita ut faciem atque vtrumque oculum combusserit. Verum non rectè ab Empirico curata non solum palpebras inuersas retinuit sed easdem cicatrice obducere non potuit, ita ut aspectus horribilis perpetuo ei adhæreret. Hæc sapius doloribus oculorum

De parte li-
gna in oculum
impacta.

Lapidis frus-
tum in oculum
impactum.

Lib. 7. cap. 192

oculorum ac fluxionibus obnoxia, post annum dolore magis ingrauescente, longo tempore rursus male tractata fuit ab eiusmodi medicastra, quæ vno collyrio omnia oculorum vitia curabat. Vnde dolore quasi confecta miserima puella, tandem in utriusque oculi vlcera incidit, præsertim tunica adnatæ: ut postea ed nostris præsidii peruentum esset, ut oculum aperire posset, quod antea non potuerat, ut illa vlcera tunc probe animaduertemus. Ad hanc igitur accitus veris tempore, hoc modo illam curauimus. Omnium primo leuiter corpus purgauimus medicamento infra scripto: *℞. Syrup. ex infus. rosarum pallidarum cum folijs senæ ʒ i. Syrup. ex infus. rosarum pallidarum per se ʒ ss. aquæ betonice ʒ ii. misce, & dabatur diluculo. vnde tres quatuorue sedes habuit. Die vno atque altero intermisso, hoc apozema præscripsimus: *℞. fœniculi viridis, euphrasie, betonice an. m. j. flor. cord. p. j. bordei mundati. b. prim. dam. sc. numero xiiij. thamarind. ʒ ss. vnaum passiarum emulcatarum ʒ j. foliorum senæ Alexandr. ʒ viij. polypod. querc. ʒ ss. sem. anisi, fœniculi an. ʒ i. fiat decoctio in aqua communi pro ʒ vj. forissim. express. adde Syrup. ex infus. rosarum pallidarum, Syrup. de betonice an. ʒ j. misce pro ʒ ij. dosibus matutinis. Postea cum etiam inflammatio in oculis adesset, vena cephalica secta fuit, deinde fluxione & inflammatione utrumque sedatis, pilulas lucis ad ʒ j. deuorauit, & vno atque altero die intermisso, scapulis quoque cucurbitulas cum scarificatione commode applicari iussimus. Quod ad topica remedia attinet, primo hunc fotum aliquot diebus adhiberi mandauimus: *℞. foliorum malus m. ij. florum rosarum rubearum m. j. semin. cydoniorum ʒ i. bordei mundati p. j. coquantur in aqua communi pro ʒ x. addendo aqua rosar. & malus an. ʒ ss. colatur & colatura vsui reseruetur pro fotu oculorum: Chirurgus Theodorus qui in insigni quinque annulorum habitabat, oculus medicus vna tunc aderat, qui bis in die fotum quem præscriperamus adhibebat. deinde hoc collyrium sequens in utrumque oculum, ut præcepimus ac præscripsimus, instillabat: *℞. aqua rosarum ʒ ij. trochis. collyrij albi Rhaf. sine opio ʒ ij. misce, fiat collyrium. deinde pannis lineis mollioribus, duplicatis & in decocto fomenti immersis & moderate expressis oculis appositis, & diligenti adhibita deligatione, per aliquot dies sic curationem instituimus. Postea etiam in principio ante pilulas bis aut ter hunc iulebum sumptit: *℞. decoctionis vltimo præscripta ʒ iij. Syrup. ex infus. rosarum pallidarum. Syrup. de betonice an. ʒ ss. misce. Hunc quoque nodulum in fotu præscripto suspendimus, eundem exprimendo dum fotus adhiberetur: *℞. seminis fenugreci loti prius cum aqua gelida, & vniuersus exsiccati ʒ ij. semin. cydoniorum ʒ j. contundantur crassiuscule, & fiat nodulus in panno lineo raro. Postea cum inflammatio aliquo modo sedaretur, pure iam paulatim ex oculis fluente, fotu sequenti per aliquot dies utebamur: *℞. foliorum m. due m. iij. florum rosarum rubr. ʒ ij. seminis fenugreci à pulvere prius ablui ʒ iij. semin. alibæ ʒ j. bordei mundati p. j. semin. cydoniorum ʒ j. fiat decoctio in aqua communi pro lib. j. pro fotu. Post fotum bis in die adhibendum, collyrium supra dictum instillabatur. Post aliquot dies reiterabatur idem fomentum: quibus per tres septimanas utebatur. postea mutauimus collyrium ut paulo magis abstergeret: *℞. decoct. bordei communis, aqua rosarum aqua euphrasie an. ʒ ss. trochisc. collyrij albi Rhaf. ʒ j. misce fiat collyrium. Et cum pus mediocriter abstersum esset, postremo adieciimus aliquam portionem sarcocollæ nutritæ cum lacte muliebri,********

cum asinæ non adesset; quod melius fuisset; mot & aliquid thuris & croci pauxillum admiscendo & fenugreci mucilag. exiguum. Quibus remediis visum recuperauit, & ab vlcere curata, quod non penetrauerat corneam; ita ut epuloticis opus non fuerit, ut in altera muliere sequenti.

SCHOLIA.

Vlcera oculorum, ut refert Aëtius ex Seuero, sunt circa oculos, vel in ipsis oculis, aut in cantho, vel in adnata tunica, vel in cornea, genis, angulisque oculorum, siue in quauis oculi parte; ideo non vnum genus vlcerum est in oculis, ut et Paulus testatur, quamuis differentia specificæ diuersa sint, ac diuersimode nuncupentur. Etenim in cornea membrana, quæ Græcis *Ceratoides* appellatur, vlcus cauum, angustum & purum, ob vix similitudinem botryo dicitur, quod autem latius botryo est, sed minus altum, *celoma* nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo nascens ambrosia comprehendit, ut etiam in exteriori pupillæ parte rubicundum, in interiori candidum appareat. Epicauma vlcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi effluunt. Iam & aliæ plures vlcerum sunt differentia cum inflammatione cum ophthalmia. Interea in quacumque parte vlcus contigerit, curatur communi consilio, teste Aëtio, quem admodum & reliqua totius corporis vlcerata, vel venæ sectione, vel purgatione, vel clysteri, vel omnibus sine mul adhibitis, si ita occasio postulauerit. Interea sciendum, prout diuersas eiusdem oculi partes exulcerari contingit, non vno etiam modo: namque tunica adnata, ut hic interdum (ut diximus) interim corniformis, aut argulorum aliquis, seu palpebræ eadem affectione laborat. Quæ vero prædictarum partium exulcerata sit hand difficle dignosci poterit, cum prompte sensu visus diuerit dicetur. Ipse vero affectus morbus est, in genere solutionis continui, visionem incommodans, si fuerit notatu dignus, non solum ob id quod redundantem humorem coaceruat, sed etiam quia efficit, ut crystallinus humor ex breui spatio coagatur cum circumfuso splendore conuerteri, *Carleno auctore libro primo, De causis symptom. præsertim si in corniformi genitum sit vlcus & quod præcedens quoque ad interiora vlcus versus pupillam aliquid aquosi humoris foras effundit; & atque hinc eminet periculum, ne sic affectus ad extremam perueniat cecitatem. Causa exulcerationis modo externa est, ab aliqua re in oculum illabente; vel causa procacitica, ut à spina, frusto vitæ, gladio, lapide, aliisque incidentibus aut ruptentibus, ut stylo, percussione, casu, pulvere, ictu, conuassatione, primo vulnus inducentes, ictu, conuassatione, primo vulnus inducentes, postea demum inflammationem aut abscessum, postea vlcus, siue in oculis, siue in tunicis, genis aut argulis. Modo veniunt ab interna causa, scilicet ex acrimia humorum erosione, à qua magna parte vlcus vel ex confluxione humorum ad oculum vel tunicas aut alias partes confluentes & vlcerantes. Et nunquam post ophthalmiam, ob materiam humoris erodentis & cohibiti ab emplasticis, ut *Carlenus ait*: imo aliquando cum vlcere ophthalmia coniuncta est. Quod ad signa attinet, alia vlcera futura præfagiunt: alia vlcus præfens indicant: alia vero species atque causas distinguunt: alia sunt mere prognostica. Vlcus futurum aliquando præfagiunt phlyctænæ iuxta adnatam vel corniformem tunicam, si non recte curentur: ita & ophthalmia,*

ophthalmia, si dolor non mitigetur, signum est materiam inobedientem resolutioni, & quod apostema sequetur, & facile in pus vertetur, præsertim punctione, pulsatione, materia acuta corrodente, ebulliente: dum enim pus fit, sunt dolores magis quam confecto pure: hæc enim signa magis ex parte præcedunt vlcerata. Vbi præfens vlcus est, visui ac sensui patet, ex clausione palpebrarum, si in coniunctiua aut cornea, pure emanante. At signa specierum tum causarum, facile ex agri & altantium loquela percipiuntur, si ab externa causa procedunt; si ab acrimia humoribus & causa interna; ex qualitate doloris, pruriginosa videlicet aut punctoria: qualitas quoque redundantis succi inuestigari poterit, ægri ætate, temperamento, victu, regione, anni tempore, acris constitutione, ac reliquis non prætermittis. Numquid etiam phlyctænæ præcesserint, tunc vix visu comprehenduntur cum exigua sint; percipiunt tamen quasi arenam dispersam per oculos ob contactum à palpebra: quibus & signa adiungere poteris de phlyctænæ prius dicta; nam vlcerata in albis oculorum sunt magis rubra, in nigredine albedineo in tunica adnata rubra cernuntur, in cornea ad album & fuscum inclinant. Si ab apostemate præcedente, facile patent ab remissione accidentium: si ex ophthalmia, præfuit rubedo & dolor ingens ac inflammatio. Vlcera tam in adnata, quam cornea tunica modo in superficie, modo alte descendunt, ut humores quoque effluant: & ideo quod ad prognostica attinet, satis sit nosse, quod vulnus seu vlcus corniformis tunicæ periculosius sit, quam reliquarum partium oculi: si & si ea ipsius pars, quæ pupillæ obiecta est, fuerit vlcerata, si vulnus ad interiora descendit, magna ex parte obsecantur, *Galeno teste i. De causis symptom. Quæ vero in adnata tunica oborta; non adeo periculum adferunt, velut prædicta. Verum in quacumque oculi parte contingunt, semper suspecta sunt, ut medicum valde peritum & instructum in curationibus oculorum semper requirant, ut Rhases medicus ille illustris ac insignis experientior capite decimo sexto De vlceribus oculorum curandi: 9. ad Almarazorem adhibebat.*

Nam à medicis doctis & expertis aliquando committitur error; quanto magis à mulierculis, lippis & tonsoribus! Hinc historia illa apud Græcos nos cantos in curationibus oculorum redolens, quam suo tempore euenisse narrat. *Vidimus, inquit, Papæ medicum aliqui magni nominis, & Venetum, Venetium nomine, de Forlino, qui cum egrotante eundem, quem & nos visitabamus, me tamen ignorante, circa octiduum medicamenta quadam ocularia occhio imposuisset, noctu pessime habuit. Gradus vero summo mane primo cum accessisset, & medicamentum supra oculum positum extreme dolentem vna cum suppa amoveret, oculus totus simul auulsus est extra orbitam, pendens vsque ad mediam genam; parum enim videbatur alligatus mediante neruo optico. Quod cum vidisset Gradus, valde contristatus est: quamquam fuerit oculus sine alio dolore eleuatus, ut pars exsiccata conuassata orbis in totum remanserit ac si oculus ibi nunquam fuisset. Maritus autem hæc videns desperationem ductus, ut infans ense euaginato per totam ciuitatem discurrens, medicum Venetium quærebat interficere. Sed aufugit, & nunquam in vrbe amplius visus est. Propterea recte concludendum idem Gradus, ne nimium audaces essemus in fortibus remediis ac medicamentis circa oculos applicandis. Noui tonsorem iniuriam & arrogantem, qui seni nobili ac generoso ophthalmia laboranti, quotidie ter in*

die nescio quem puluerem corrodentem in oculum sufflaret, vnde facta corrosione vlcus incurrebat, & demum cecitatem cum maximo dolore; quamquam nos in fine ad eundem acciti collyriis aptis aliisque præsidii eundem à dolore liberauerimus. Non est mirum quod medicastra illa hanc puellam, de qua diximus, collyrio corrodente in ambobus oculis dolorem intolerabilem & deinde vlcus induxerit, quod & alteri mulieri ab alia empirica etiam euenit, ut exemplum sequens demonstrabit.

OBSERVATIO XVIII.

De muliere ophthalmia laborante, & ex mala curatione in vlcus vnius oculi incidente.

Mulier, quæ in insigni arboris Buxæ Delfis commorabatur, sub finem æstatis anno sexagesimo tertio supra millesimum quingentesimum, in oculi dextri acutissimum dolorem incidit vna cum ophthalmia. Empirica ocularia ad hanc ingressa rasuram ex lapide Talck dicto (prima fronte cum vide. em. gypsum esse sic. ab. am. cum hic lapis gypso admodum simillimus sit, de quo vide Pandectas) capiebat, atque eam, nescio qua aqua destillata immixtam, collyrij modo in oculum stillabat: at non diu postea dolore ac ardore ingenti subsequente, etiam vlcus subsequutum est, acrimia humoribus adnatam primo, deinde etiam tunicam corneam corrodentibus. Cum igitur ad hanc vocati essemus, & vlcus vna cum ophthalmia & inflammatione spectaremus, atque venæ sectio prætermittenda esset, alio prius inanitate cum cassia recens extracta & pulpa thamarindorum, sanguinem in brachio dextro oculo affuso correspondente detrahente iussimus; cum & eadem hic conueniant, quæ de ophthalmia diximus, atque hic locum habeant, si à causa interna vel à fluxione originem sumpserit: quamuis ab externa causa, nempe collyrio corrodente, malum per empiricam augmentum ceperat, & fluxionem concitauerat, & humores aciores reddiderat. ideo & corpus ab acrimia humoribus erat expurgandum, & recurrendum ad victus rationem, quæ acrimoniam humorum obtunderet, ad purgationem dolorisque mitigationem, tum ad ea quæ de ophthalmia scripta sunt. Cum itaque illam purgasset cum infuso rhabarb. & decocto senæ, cucurbitulas spatulis admoimus cum scarificatione. Deinde pilulas lucis ut deglutiret imperauimus; nam ab acrimia humoribus frequenter purgandum: pro qua intentione complenda Rondeletius quadam opiata solutina vitur. Interea & humorum defluxum non solum cucurbitulis iam dictis, ad inferiores partes, etiam vinculis iniectis & frictionibus auertebamus. Istic inquam præsidii dolor, qui vehementissimus erat, tum inflammatio cessauit, qui albumine omnium primo in oculum instillato, ita ut ab vltiore curatione abstineret. Verum paulo post cum chirurgum nescio quem vocasset, is collyrium quoddam, ex aqua chelidonie, fœniculi, euphrasie cum succo rube confectum in oculum mittebat, quo denovo & dolorem & calorem ac fluxionem auxit; ut rursus me reuocaret: & imposito iterum collyrio ex aqua rosea & albumine oui, dolor paulatim mitigatus est; cum enim vlcus simul cum inflammatione infestabat, curationem ex iis, quod ad topica remedia auspicabamur quæ inflammationem lenire poterant & concoquere; nō neglectis iis quæ ad vlcus proprie pertinent: idque ex Pauli

Cap. 29. &
33. lib. 7.

Prognostica

Lib. 1. c. 22.

Cura.

Topica.

Vide de his plura apud Aetium. Quatuor itaque veri prolapsus sunt differentiae, quae ex dictis facile distinguuntur; cuius causa erosio aut ruptio corniformis tunicae existit. Ex quacunque ergo causa oculi procidentia ad *muonéparon* degeneraverit, si medicamentis rite adhibeatur, curari poterit: quemadmodum etiam, licet aegre, recentia *sz- quonéparon*: verum ubi alborem aut callum contraxerint, nullus remediis locus est, ex Pauli sententia.

Si vicia exierit, visus deperditur: si minus, curantur quidem remanente albugine: si vero sit timor de corneae ruptura ob apostema, vlcus, vel corrosione, curetur ut de vlcibus dictum est: praemissa venae sectione & purgationibus: si rupta est, & quae ad *muonéparon* aut ad recentia *sz- quonéparon* degenerant, tunc repellentibus & astringentibus simul pharmacis opus est, ut Galeno placet 4. De compos. med. quem & Paulus & Aetius sequuti sunt: & eligenda quae nullam asperitatem faciunt: ea sunt, folia rosae, flores, succus, nardi spica, crocus, lycium & hypocistis, spongia leniter posca aut vino adstringente aut rosae decocti imbuta applicetur. Quorum medicamentorum copiam habes apud auctores iam dictos & Donatum. Tharantanus & alij qui Avicennam sequuntur, applicant emplastrum oculo affecto, aegris supine decumbentibus, vniuersalibus remediis prius adhibitis, ex cotonicis lentibus vel addita farina lentium cum melle, aut mullum granatum, cum toto coctum, pistum, adiecto exiguo aceto. Si ruptura sit magna, vicia extra oculum prolapsa, supine jacent aeger, ut in loco redeat; repellentibus dictis appositis. Si tamen utrique oculo tale quippiam eueniat, nihil auxilij restat, teste Tharantano, quam ut caniculus egregie doctus tales per calles deducere possit. Nam eiusmodi vnius aut duorum annorum incurabile Avicenna habetur.

OBSERVATIO XXV.

De Staphylomate.

Mercator quidam Delfensis cum in capite vulnus accepisset, & iam quasi curatum videretur, cicatrice obducta, cum sese aeri subito commisset, incidit in tumorem magnum totius capitis, & facie ex phlegmone erysipelatoza, ita ut defluxio ad oculos processerit, unde vlceratione subsequente, in vno oculo tunica corniformis erosa fuit; & tandem Staphyloma subsequutum & exaceratio. Chirurghi licet magnam experientiam jactarent de staphylomate curando, vnius eorum acu pungebat vnationem, toto humore effluente: sed quam perperam illi egerint, recte constat: cum huic vitio manum admoueamus, non ut visum abolutum restituamus; verum ut moderatum agrotanti decorem conciliemus. Hinc factum quoque est, ut dum ita male chirurgi vterentur, id minime praestarent, cum potius ita manum adhibere debuissent, ut Paulus Aegineta docet libro 6. capite 19. scilicet acu ab inferiore parte sursum per basin staphylomatis traiecit, deinde alteram acu duplex linum ducentem ab angulo, qui ad manum spectat, ad alterum per basin staphylomatis transmittere oportet, manenteque prima acu, lini plexu amputato, staphylomatis aliam partem sursum, aliam deorsum filis deuincire: atque tunc acu detracta lanam oui liquore imbutam imponere: post solutionem blandis infusionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylomate decidant.

SCHOLIA.

Aetius staphylomatum plures differentias conscribit, utpote cum corniformis ipsa tunica fuerit eleuata, & eminentiam acino viciae similem fecerit, aut ab humoribus intra ipsam collectis, aut ex pustula quadam satis profunde inter eius partes consistente: quae duae differentiae licet tunicam ipsam corniformem eleuent, & incuruari faciant, non tamen ipsam rumpunt, seu exedunt. Et propterea eiusdem eleuatio sola, quod non ruptura, existit: quo fit, ut neque id, quod prolapsum est, caruleum, aut nigrum appareat, quemadmodum in vero staphylomate; in quo disrumpita iam est corniformis tunica, & magnus vniiformis tunicae prolapsus factus est. Cui etiam sententia adhaerere videtur Celsus, dum dicit: In ipso autem oculo neminumquam somma attollitur tunica, siue ruptis inus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit; unde id *sz- quonéparon* Graeci vocant. Verum cum has duas differentias non liceat (Paulo teste) vera *sz- quonéparon* appellare, & insuper earum curatio diuersa existat, cum vera inflammationis & pustulae curationem similem requirat, ut apud Aetium videlicet. At nunc loquimur de veri prolapsus differentia, quas quatuor praecedente scholio esse diximus: & quomodo verum staphyloma recens curetur, nempe repellentibus & astringentibus, docuimus. Si vero recentia non sunt, & praedictam curationem respuunt, chirurgi indigent potius, ut decorem conciliemus, ut in Observatione ex Paulo ostendimus. Habes & hanc curationem apud Aetium & Celsum. Neque opus est hic victus rationem addere, quum non alia indigeant, quam ea quam alij oculorum affectibus laborantibus in praecedentibus nos institimus, & alij auctores; praesertim cap. De vlcibus & fistulis.

OBSERVATIO XXVI.

De oculi clauo.

Puella septem annos nata, cum vlcus in oculo haberet, a tonsore pessime tractata, qui oculo affecto frequenter oleum nescio quod calidum infundebat, adeo ut perrupta non solum corniformis tunica, sed etiam vniiformis tunica procedente, adeo ut callum obduerit, praeter id quod extra palpebras transgredebatur. Haec cum ad me conuulsum veniret, conspexi illud malum esse quod a Paulo & Aetio dicitur, clauum vocari; & Graecis vero *sz- quonéparon* dicitur, nam per omnia clauum capiti similis existeret. Illud enim vitium sine sensu stupet; estque callosum in albo oculi tuberculum, cui nomen à figura similitudine habetur. Ceterum cum in hoc affectu oculus duobus dispendiis, cecitati inquam & deformitati subiceretur, eum quidem ad naturalem habitum velle reducere, vnum est ex iis, quae ab arte fieri nequeunt: forma enim aliquod studium impendi potest, quod maxime à chirurgia sperandum est: Quare hanc puellam ad chirurgos peritos relegauimus.

SCHOLIA.

Quamquam scribit Paulus eadem remedia quae ad staphylomata recentia conueniunt, clauum quoque prodesse, priusquam in albescentem; ubi vero alborem & callum contraxerint, nullis remediis locus est. Absolutis corniformis

corniformis tunicae malis, nunc ad vitia vniiformis tunicae descendamus; quamquam etiam haec que laedatur & egregie efficiatur. Nunc igitur ad Mydriasm seu pupillae dilatationem accedamus, in qua secundum Rhagoidis foramen, hoc est, pupillam, oblaeditur.

OBSERVATIO XXVII.

De Mydriasi seu pupillae dilatatione.

Lizabetha Ebaldi, vidua honesta, supra triginta annos nata, in insigni aquila aurea Delphis habitans, oculis nigriusculis habebat: huic cum paulatim oculi absque dolore tenebrescerent, ac in dies obseciores fierent, visusque adeo efficeretur, ut cecitatem metueret; initio mensis Februarij anno 1581. consilij causa me accessit. Quum autem Rhagoidis seu vniiformis foramen, quod pupillam appellant, diligenter inspicere-mus, inuenimus ampliatum: quod quidem malum Graeci *sz- quonéparon*, Latini vero pupillae effusionem seu dilatationem vocant. Cuius causa cum humor excrementitius existat, qui aut acruatim, aut paulatim affluit; ab eo citra sensum, ut Aetio visum est, (quod eundem virum mulier haec paulatim sustinere narrabat, absque sensu ac sine ulla dolore,) vniiformis tunica distenditur & pupilla amplius dilatatur. Cum itaque pro re certa haberemus hoc malum initium sumpsisse ab humorum defluxu, & ad tunicam Rhagoidem eiusque foramen peruenisse ac impleuisse, mandauimus, ut vici attenuatorio imprimis vteretur, & in prandio cibo parciore, in cena paucio vel nullo contenta esset, nihilque excrementitij haberet: ut sunt carnes volatilibus, aucularum montanarum, perdicum, phasianorum, mardonum, merulorum, columbarum, non omnium sed in turribus versantium, & ut cuniculos subinde gustaret; & quantum posset ab aliis quadrupedibus abstineret, potiusque assa sumeret quam elixa, vinumque vitaret & cereuisiam crassam & quaevis alia, quae facile ad caput transmittuntur & euaporant: praecipio quoque ut quotidie operam daret aluum deponere, per se vel arte; & ut frictionem in diluculo infernarum partium adhiberet, ventris saburra prius exonerata. Venam non secumimus, cum in asperima hyeme essemus, & illa venae sectionem abhorreret; quare post purificationes paulo inferius descriptas, cucurbitulas scapulis admoimus, & collo & in occipitio circa collum vesicatorium applicuimus, & in eodem loco, atque post aures, folia feniculi trita apposui-mus: à quibus praesidiis, purgationibus prius assumptis, se multum iuuari ipsamet profitebatur. Omnium primo hoc apozemate utebatur: *sz- quonéparon*, euphrasia, feniculi ana m. j. flor. rosinae ana p. j. seminis anisi, feniculi ana z i b. sileris montani z b. folior. senae à stipitibus repurgatorum z vj. xababarb. z i. agavici semini, albi lenis z b. schenanthi, zinzib. albi ana d b. ruar. passav. enucleat. z j. prun. damasc. numero xiiij. coquantur in aqua communi pro z i. vel viij. stent infusa per noctem: mane fortiss. expressi adde syrup. de betonica z ij. mife. pro ij. dosibus manentibus. Postea & has pilulas sub noctem cepit: *sz- quonéparon* pilul. lucis z j. diag. gran. iij. cum aqua feniculi ana p. iij. quibus satis aluum deposuit, quamvis per intervalla adhuc bis easdem cepit; syrupo de betonica ad cochlear vnum aut alterum saepius quoque deglutito, antequam pilulas sumeret; idque stomacho ieiuno. Quod ad topica remedia attinet, marina aqua ut frontem & oculos

ieiuna perfunderet tepide, cum in hyeme essemus, imperauimus. Deinde ut hoc collyrio ute-re-tur, vel simili, quo praceptor meus Benedictus Fauentinus feliciter utebatur, ut in eius libro de morbis curandis constat 2. sect. capite duodecimo, de pupillae dilatatione; in quo loco remedia egregia inuenies: *sz- quonéparon*, rosae siccae, membra, siccae, spica nardi ana z ij. corticum iburis, mirrhae ana z b. croci d j. prompholygos, acacia, spody, omnium lotorum ana z j. aloes lotae z b. omnia puluerisato & cribrato cum cremore tragacanthi: fiant trochisci, & dissoluatur vnus cum aqua peculi rosae & fiat collyrium. Et quia hoc malo non diu laborasset, etiam fiebat fotus ex feniculo, floribus rosae & myrti & euphrasiae, chymis rubi adiectis: & fuit haec egregie curata, antequam malum ad statum peruenisset & confirmatum esset, tunc enim difficulter curatur, ut in scholio latius diximus sumus, eo quod pars illa rugata suam contractionem amisit, ob distentionem internam.

SCHOLIA.

Licet Rhagoidis, seu vniiformis, foramen (inquit Donatus) quod pupillam appellant, quatuor modis à naturali statu immutari possit, Galen. teste libro primo, De causis sympt. nempe vel ampliatum, vel imminutum, vel ruptum, vel in aliquam partem detortum, seu diuulsum: cum eius ampliatio (de qua nunc loquimur) siue à nativitate sit, siue postea, semper visui incommodet. Cum igitur pupilla ipsa colore quidem nihil euariet, multo vero latior, quam pro naturali modo efficitur, ut aliquando ad iridis circulum accedat, Aetio teste quid sit mydriasis seu pupillae dilatatio. Censendum est oculum ipsum quidem hic oblatum esse, non tamen totum, sed secundum rhagoidis foramen, hoc est, quae pars pupillam; ea namque à naturali statu accessit, & pro quantitate declinationis increvit iterum ipsius visionis noxa, & est morbus iuxta Galenum in genere conformationis, quoniam immodice pupilla dilatata, pro cuius recessus quantitate, quandoque in totum visus impeditur, interim vero vident aegri, verum obscure, & quae videntur ab ipsis, omnia minora quam sint putantur esse, Paulo & Aetio testibus. Vniuersus spiritus ipsam pupillam (ut ait Galenus) implere non sufficit, unde ipsum distendi dissiparique necesse est. Causas iam diximus: cum fiat ab humore excrementitio: quamquam etiam à causa externa (ut ad longum docet Benedictus Fauentinus praceptor meus) euenire possit, ex percussione, casu, ictu, & obuiatione rei durae, ut ex exemplo in subsequenti Observatione etiam ostendimus. Barbari volunt, & qui Avicennam sequuntur, tum Arabes, etiam ex desiccatione vniiformis tunicae fieri: sed hoc rarissime contingit, & aegre curatur, quamvis & illa quae paulatim vel coarctatur, sit ab humoribus collapsis, non facile curetur, nisi in principio. Volunt quoque, si à capitis vehemēti dolore fuerit, curationem non recipere, praesertim si maxime dilatetur; sicut & parturientibus. Accidit quoque haec affectio magis pueris propter debilitatem: insuper & his qui ex natura nigros habent oculos (ut & haec vidua habebat) quoniam magnas etiam pupillas habent, & propterea facile in hanc affectionem delabuntur. Quae utique curari potest, victu attenuante & ventri commodo, teste Aetio, vtendum. A vino abstinentum, donec affectio fuerit soluta. Balnei vsus fit rarior: deambulationibus lentis ac plurimis in locis ymbrosis vtendum, clysteribus aluus humectanda.

Prognostica

Cura.

res ad caput & oculos emittunt. Antecedentes vapores esse dicunt ab humoribus cibisque crassissimis, imperfecte concoctis, resolutis: vel à vino, ut ebriis accidit. Et sic causam coniunctam cataractæ non confirmatæ volunt esse vaporem non incrassatum: confirmatæ vero, vaporem conuersum in aquam. De his quidem causis videas Benedictum Fauentinum, præceptorem meum, qui ad longum easdem explicat. At qui Galenum & Aëtium ac Paulum sequuntur, suffusionis veræ causas ad frigidos, crassos seu lentos succos referunt. Hinc Iacchius existimat in ea minime conuenire sanguinis missionem contra Paulum & Aëtium, & sequaces: quia morbus tardus & longus est, & prorsus frigidus, & ex causis omnibus frigidis euenit: & damnum magna debilitate & euacuatione spirituum potest inferre: ideo purgatione vitur, per cochlias & fetidas pilulas, apparando humores oxymelite, & decocto siccante & extenuante, & electuariis variis. Postea etiam propria reuulsione, ut per posteriora ex vesicatoriis inustionibus: demum caput exsiccat pulueribus & ablutionibus: deinde adhibet oculis ea quæ diximus. Alij tamen omnes velex media aut externa vel humerali in cubito sanguinem demunt: deinde clysteribus acrioribus vtuntur; demum purgatione. Rondeletius etiam ex cephalica sanguinem mittit, si signa plenitudinis sanguinis adsint. Cæterum quum sæpe inter initia suffusionem curandam suscipiamus, quando alteri affectui assimilatur; ideo probe illam distinguere est necessarium, tum ob prognosticum (quoniam altera est deterior affectio altera, & plus periculi inuehit), tum ob curationem, quæ multum est diuersa. Est autem affectus suffusioni similis, de quo sæpe Galenus meminit: quando non in ipso oculo est mali radix, sed aliunde fumi elati per arterias, atque humorem oculi afficientes, speciem faciunt imaginum, ac si in ipso oculo malum foret, & humor noxius. De hac 4. de locis affectis. Debet enim humor ille esse quam purissimus & maxime diaphanus: ideo siue diuisa corpuscula, siue etiam tenuis quasi fumus obducatur, hæc visa facit. In hac igitur falsa suffusione, potius fumosa corpora; in vera potius corpuscula crassiora innatare putandum est. Prouenit autem falsa hæc suffusio ex cruditate, quæcumque sit: præsertim vero nidorosa. Prouenit & cum bilis in ventrem confluit, vnde euaporat ad caput. Rondeletius tam à pituita quam bile fieri scribit. Rhases igitur non accipit, ex repletione deterius habere; tempore vero famis melius. Galenus enim velle videtur, accidentia hæc potius ex mordenti humore fieri, ut qui magis effumet; ideo in cruditate nidor est: ideo potius negative argumentatur: Non est par lassio igitur suffusionis initium, sed non affirmatiue: Est par; ergo non suffusio: soli enim conuenit, non omni. Sic enim falsam à vera distinguas, 4. de locis affectis. Nam ubi à ventriculo ambo oculi similiter afficiuntur, & affectio in ambobus est similis, (quod in vera suffusione non accidit), neque simul in utroque incipiunt, neque similiter apparent, dicit Galenus; vel secundum Iacchium, raro accidit. Nec enim dici potest euenire non posse simul: sed hoc admodum contingens est rarum, ut simulprehendantur, & eodem modo: multo vero euidentior est nota, quod vera continua est, utpote perpetuo manente eadem causa: at altera intermittit aliquando: modo maior est, modo minor; prout causa maior vel minor: etenim in vitiosa concoctione augeatur; cessat, ea optima existente. Si & contem-

Iacchius
cur sanguinem
non mittit
in vera
suffusione.

Signa.

11

12

planti tibi pupillam, nihil tenebrosum habere videatur, ab ore ventriculi affectum procedere inuenies, deinde tum talia apparuerint visa, mordicus in ore ventriculi doluit: maxime vero, si post hæc vomendo eiccta re mordente, mitigata fuerint symptomata. Evidentius quoque detegit, ut dictum est prius, cum in vero diuiciis protrahatur & pupilla conturbetur. Vbi enim altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut non exacte pura videtur, suffusionis esse initium censendum est: & certius id indicare valeas, tum ciborum minus tamen quam consueuerat assumptorum, & nihil mali succi habentium; tum etiam ex alio medicamento, quod quidam picram, alij hieram picram appellant, assumptionis experientia, Galeni auctoritate, eodem 4. de loco affectis. dignoscere tentabis. Cerebri quoque cognatione similia suffusis symptomata accidere solent in quibusdam phrenitidis speciebus, primario scilicet affecto cerebro; quod eiusdem phrenitidis indicia percipi poterit. Sed quoniam tam si dicta symptomata ex ventriculo, quam si ex cerebri consensu oriuntur, veram suffusionem non indicant; curabitur affectio partibus primario affectis diligenter curatis, ut paulo post exemplo suffusionis non veræ à ventriculo ortæ ostendetur: quæ etiam facilius curatur quam vera suffusio, licet vera quoniam suffusio, teste Galeni, 14. method. iam incipiens digeritur; ubi vero diu constitit, digeri nullo pacto potest. Suffusiones si incrementa susceperint, difficilior curantur, & si ad vigorem contingunt: quare curatio non est protoganda, donec ad tempus consistentiæ peruenierit: & licet per initia curari malum possit; ubi tamen inueterauerit, teste Celso, non nisi manu curandum. Ita & Paulus curari quidem posse affirmat; non tamen omnes. Propterea vult Galenus, priusquam eius curam incipiamus, distinguere oportere num sanabilis sit an secus. Hoc fiet, inquit 1. de caus. symp. si quidem altero oculo clauso, iusserit ut altero te intente aspiciat: statim enim ægrum oculum videbis clariorem reddi: quod sane significat, plurimum lucidum spiritum eo fieri atque oculum illustrare, & caliginem illam obductam nonnihil euincere posse. Nam si contra turbida permanet, signum est non ferri visui spiritus copiam in oculum, aut ob nervi obstructionem, aut ob oculi debilitatem; vel cum turbidum crassumque esse. Iam etiam suffusio tolleretur, adhuc visus clarus non recuperaretur. Et ita cognoscitur ex Paulo lib. 6. c. 27. quæ ex Galeni doctrina etiam accepit: pariter & ex eis quæ confirmatæ sunt, quæ ad educationem manus idoneæ reddantur, quæque non; quo pacto cognoscantur, suffusi, si compuncta suffusione vitæ recepturi sint, an non. Nam quibus altero oculo coniuuentibus, alterius pupillam dilatari contingit iis, si compunctio administratur, recipiendi visus fiducia est: quibus non dilatatur, horum nemo vnquam reuidit: neque si minimo cum dolore, ac commodissime iis est administrata compunctio. Arabes quoque addunt (quod & Benedictus Fauentinus præceptor meus non præterit), si digitis, aqua pupillæ suffusa ab eius loco separetur insigni quadam frictione, & postea modico intervallo ad eundem effluxerit locum, punctio exacte administrata curatum iri: quod si id non contingat, vana erit ac inutilis compunctio. Plura videas de his apud eundem Benedictum Fauentinum. Neque à causis primitiuis, vulnere, percussione recipit curationem; neque gutta serena dicta, in qua oculi videntur clari, in nervo optico apostemate, humore, duritie existente: ut in nauta illo

illo Mæderio, de quo aliis diximus. Quod ad colorem attinet, Tharantanus albas tendentes ad colorem perlæ, viriditatem ac cineritatem scribit curationem suscipere. Illud tamen, ut mihi videtur intelligendum, modo non fuerint congelatæ & inueteratæ: nam increbrescente ægritudine (inquit Aëtius) accidentia quoque increbrescunt; quæ ubi ad summum peruenierit, æger excæcatur, & pupilla ad candidum colorem (ut prius dictum est) siue villo penitus splendore mutatur. Gypsea autem, iuxta eundem Tharantanum, & nigra & plumbea, & multum citrina, non recipiunt aliquam curationem, neque cum medicamentis neque cum acu. Inter eas vero quæ omnino incurabiles sunt, ab Aëtio connumerantur, quæ glaucescunt suffusiones: cum ex fiant ab humore iuxta pupillam vehementissime congelato, ut ipse testatur. Quomodo vero Glaucoma differat à suffusione, dictum est: quæ etiam apud Aëtium & Galenum 10. de vlu partium inuenies. Quomodo autem suffusio curentur, maxime in principio, nunc dictum est; scilicet iuxta Aëtium, venæ cubiti sectione, acris clysteribus purgationibusque, etiam cucurbitulis occipitio cum scarificatione affixis, apoplegmatisinis, & iis quæ per nares repurgant, optima victus ratione obseruata. Et quibus topicis, etiam dictum est: quorum medicamentorum campum inueniet apud Galenum, Trallianum, Aëtium, Paulum, & Neotericos, Rondeletium, & præceptorem meum Benedictum Fauentinum. Donatus valde commendat aquam quandam socialem dictam, quam Neapoli Pharmacopœi patratam habent, ex descriptione libri, qui Rosa Anglicana nuncupatur.

OBSERVATIO XXXII.

De suffusione non vera ex ventriculi vitio.

Iuuenis debiles oculos habens, per intervalla suffusionem in utroque oculo experiebatur, tamquam muscas, culices & alia spectra videret, & eo potissimum tempore cum largius potasset, vel cibaria cruda sine ordine deuorasset: nam concoctione peracta ructibus emissis, aut leni subsequente vomitione, simulachra dicta non spectabat. Iisque animaduersis, falsam esse suffusionem intellexi: quamobrem me ad curationem accingens, quæ inter initia nihil distat, quod ad apparentiam, à curatione veræ incipientis, cum omnis cura consistat in vacuatione: & ideo in non vera suffusione causam abscindere oportet, concoctione procurata, & per aloem aut hieram picram purgare: nam ea sola iactitat Galenus multos in Asia per literas Roma missas se curasse. Quare & nos semel in hebdomada 3 j. pilul. hieræ simplicis exhibuimus; & iuxta consultationem Montani 45. de oculorum debilitate & suffusione ex consensu ventriculi, victu frugali ut vteretur mandauimus, abstinendo à vino nigro crasso, cibisque fumosis omnibus & crassis, lacticiis, piscibus, fructibus, & frictis, quibus & hic optime conualuit. Sed quia oculos debiles habebat, præcepi ut collyrio ex succo feniculi, aqua rosæ, & vino vteretur subinde, & ut à lectione nimia, cum studiosus esset, abstineret, præcipue parari iuberet, & cænam: & ut sibi duo ocularia vteretur; alterum ex vitro viridi, quo in legendo continuè, sed per certa intervalla, quo spiritus recreentur. Tertio ut sibi iuberet componi pyramidem rotundam in acumine, non

perforatam ex vitro densiori viridi, cuius basis tam lata sit, ut utrumque oculum recipiat; intus vero concavam: in quam intuens colligeret spiritus, & radios ad inuicem adiunaret.

SCHOLIA.

Arculanus suo tempore medicus insignis suffusionum principia & quæ per communiter à toto, aut à ventriculo, aut à capite vel nervis opticis fiunt, quinque intentionibus curatiuis absoluit, euacuando, diuertendo, membrum mitens corroborando; deinde membrum suscipiens, nempe oculum, confortando, ne aliunde suscipiat materiam: postea receptam resoluendo & euacuando; adhibita quoque victus ratione commoda. Si à toto suffusio sit, videndum num sit repletio totius: tunc vena incidenda, hæmorrhoides aperienda; menses educendi si constricti sint. Si alius humor sit, ut plerumque esse solet; is repurgandus: & si à capite, eius ratio quoque habenda: si in ventriculo, & fluctuat, vomitus imperandus: tamen cum cautione, ne materia ad nervos opticos vel oculos præcipitetur: alioqui procuranda in ventriculo proba concoctio, & recrementa in eo collecta repurganda: quam curationem cum is ac Rondeletius describant, non opus est his diu inhaerere; cum non vera ex ventriculo, facile curetur vomitu in facile vomentibus, & frequenti purgatione cum hiera, pilulis aromaticis, mastichinis ex myrobalanis. Et si morbus per proprietatem fiat, habes ibidem egregia remedia: & nunc diximus antea quibus prædictis curetur propria & vera suffusio, ut non opus sit eadem repetere.

OBSERVATIO XXXIII.

De suffusione vera & confirmata.

Mulier generosa vetula de Greenesleyn, in campo regio religioni dicata, cum in utroque oculo (quod rarius enenire diximus) cataractam confirmatam haberet, & cum per multos menses cæca esset, & nos consuleret, ad ocularium medicum expertum eam relegauimus; & ita cataractam deponi fecit in vno oculo, & quasi visum recepit. At non diu post rediit malum, neque vllis modis curari potuit cataracta iam indurata.

SCHOLIA.

Suffusio quæ confirmata est (sicurari possit) manus administrationem requirit: quæ quomodo perficienda sit, consule Paulum & Celsum, nam hæc ad chirurgiam pertinent. Sed diligenter annitendum, ut Tharantanus consuluit, ut quis de probro & iuvene chirurgus huius artificij gnarus & expertus sibi prospiciat: sunt enim multi oculistæ qui per vrbes vagantur & fraudulentè agunt, pecuniam extorquentes ab agrotantibus, multa que promittentes quæ tenere non valent; cum probi quidem recta viâ incedentes eas tantum aggrediantur, quas ex Galeno, tum aliis præcedente scholio, sciunt curabiles esse: & acu cataractam non deponunt, nisi corpore prius per medicum repurgato, & victu commodo præscripto die sereno sine ventò & nubibus, tempore vernali vel autumnali, luna plena non existente; nec in coniunctione, neque arietem aut geminos peragran- te, Tharantano consulente.

OBSER:

OBSERVATIO XXXIV.

De visus debilitate.

DEbiles & imbecilli appellantur oculi, vt Aëtius ex Demosthene annotauit libro septimo capite quadragesimo quarto, qui neque splendidum neque igneum colorem spectare possunt, sed à quauis leui causa superata videndi acie lachrymas præcipue inter legendum effundunt: differuntque hi à Rhyadicis, id est, à fluentibus & emanantibus oculis, quod fluentes absque causa extrinseca assidue lachrymant: imbecilli vero causam quampiam requirunt. Ita Iodoca Teylingia, matrona prudentissima valde prolifica (nam ex marito suo Angustino Teylingio viginti proles susceperat,) vetula septuagenaria, mater vxoris meæ, cum in senectute oculos debiliores haberet, & leui rubedine cum affectu essent, atque dolerent, lachrymas leuissima ex capsula profundeabat: aqua rosacea oculos vt aspergeret frequenter, iussi; & quod nuper pro puero eodem malo correpto præscripsi vtilissime, sumach parum contuso & in nodulo ligato & cum aqua ros. expresso, & in oculum stillata aqua, & aluo repurgata cum decocto foliorum senæ & herbarum quarundam oculariarum, lachrymæ & rubedines cessarunt: mox collyrio ex aqua ros. euphrasie & feniculi, postea aqua feniculi sola vtens in balneo maris per me destillata, omnis rubedo ablata est, & melius videre potuit, & legere ocularibus vtens. Aëtius vero tales curat, deambulationibus, curionibus & superiorum partium exercitationibus, cum frictione, spiritus detentione, capitis abrasione, leui oculorum frictione post exercitia & aquæ frigida aspersione in caput. Aquæ etiam potio, & mediocris victus ratio, & sonora lectio adhibenda est: nec astringentia, refrigerantia, emplasticaque medicamenta recusabimus, si fuerint necessaria.

SCHOLIA.

DE debilitate visus videas Arculanum, & Matthæum de Gradi, qui de hac re longiorem sermonem habent supra Rhafem: quamquam debilitas largo modo sumpta à medicis non tantum ad diminutam visionem se extendat; verum etiam ad alterationem, ablationem & corruptionem eiusdem. Strictius vero sumpta pro diminuta tantum operatione visiva, proprie debilitas dicitur. Quocumque modo sumatur, semper est symptoma actionis læsæ, diminutæ vel quasi ablata. Et ita distinctio varia erit à generatione contracta, vel postea adueniente: & per causas suas, per communitatem, vt à toto, particulari membro, ventriculo, vel cerebro; vel per proprietatem; vel à causa primitiua, vel à corporea, vel diuturna vel breuiter contracta, alia tantum in oculo, nullo præcedente morbo; vel in sene debili per naturam: vel in forti ac iuuenili corpore. Atque rursus hæc causa esse possunt ratione spirituum vel tunicarum, vel humorum, vel nervorum opticorum, & harum omnium signa & differentias & curationes apud eundem Arculanum inuenies longiori sermone, vt non opus sit hæc reiterare. Hinc recte Rondeletius inquit, *Debilitas visus à multis causis fit, & pro varietate causarum varia sunt remedia.* Si sit debilitas visus post aliquam insignem euacuationem vel sanguinis vel aliam quamlibet, tunc curare oportet per restaurantia

humiditatem natuam. Cum enim prouenit ab inanitione, id accidit ob penuriam spirituum; ideo reficiendi optimis alimentis, optimo vino. Si ex nimia siccitate, vnde cornea corrugatur, humectetur totum corpus & oculus cum lacte mulieris, & aliis de siccitate dictis: Si ab humiditate, vturi nedia, & fugiat humida, & siccantia adhibeat: si humores, purgentur: adhibeantur reliqua quæ visum roborant, & vniuersiue causa suis prædiis tollatur & curetur; vt ad longum apud eundem Arculanum inuenies. Holerius ad debilitatem visus refert Myopas à Græcis dictos, qui à primo naturæ ortu non nisi admota oculis cernunt; & Nyctalopes, qui interdiu magis vident; etiam amaurosim & amblyopiam, obscuritatem visus & hebetudinem: alij vero seorsim de istis tractant, vt nos quoque faciemus; primo de hebetudine & obscuritate visus.

OBSERVATIO XXXV.

De visus obscuritate, & de viuis oculi quasi cecitate.

Mulier quædam apud Delfenses multis quidem obsequiosa, cui Weyna Gerardi nomen erat; hæc quinque annis cum ex dolore femoris laborasset, multosque dolores perpessa esset, à plurimis tonforibus male tractata; etiam per medicamentam quandam tunc temporis in nobis diuæ Barbaræ habitantem: eo tandem malum deductum est, vt nouem fistulas in crure ac femore incurreret, easque valde magnas cum vlcerebus malignis & inueteratis: quamuis postea nostra industria, ex hagioxyli decocto herbarum sanguinem depurantium, foliis senæ adiectis, & hellebori nigri exiguo adiuncto, tum vltus ratione debite obseruata, omnia vlcera tandem consolidata fuere, atque fistulæ omnes sanatae. Verum non diu post cum vlcera cicatrice ducta forent, & sanitati restituta esset, quædam euasit, vt ex vno oculo præcipue videre non potuerit, cum tamen in oculo nihil mali apparuerit, neque inflammatio, neque suffusio aut aliud quippiam, quamquam capitis dolor antea præcesserat, illa narrante. Qui equidem dolor vniuersalibus remediis adhibitis & venæ sectione & cucurbitulis cum scarificatione scapulis appositis, caulis vna cum sapone & sale pedibus suppositis, cessauit. Attamen ex oculo videre non potuit; & cum pilulis lucis deuoratis visum non recipere, neque collyriis aptis, vltra quatuor menses cæca permanisset: sed sequenti experimento vna, tandem visum recuperauit. Ex icore cuiusdam pisciculi, vulgari lingua à nostris dicti *aelpnyck*, liquor quidam desluit, experimento certo obscuritati visus admodum commodus & vtilis. Capitur autem hic piscis in aquis Veenlandiæ prope Delfhem vrbem. Est vero hic piscis mollis & valde lepideus subnigriusculus, & aliquantulum latior anguilla: cuius icor, quod valde album est ac pingue, tegula alligatur cyatho subiecto vel vitro in sole, vt ab eo pinguedo olei instar destillet. Vel icor tegula filo alligetur, vitro capaci imponatur & supra hoc aliud vitrum magis & solius instar galæ seu capitelli superponatur, & solis exponatur: exhibit autem liquor albus & clarissimus, ad modum olei puri destillant, & visui refovetur. Hoc liquore cilia tantum inungantur, & lachrymæ ex oculis exibunt, & is qui visum & lachrymæ ex oculis exibunt, miraculi instar illico lucidum & luminosum recuperabit. Oportet autem minime hunc liquorem in oculum stillare;

larem verum satis est si cilia & palpebræ superiores eo inungantur: quo remedio hæc mulier satis lumine orata visum recuperauit, ita vt hoc arcano felicissime in aliis multis visus fuerim: palpebris inunctis humores tenues lachrymarum instar ob oculis fluebant, quibus profusus visus diminutus & satis abolitus restituitur. Sed & puellæ decem annorum, huius cognatæ, cum obscuritate visus laboraret, continuus visus conseruæ euphrasie nitrum in modum contulit.

SCHOLIA.

DE offuscatione seu obscuritate, (quem affectum Græci ἀμύρωσιν vocant) & hebetudine visus, Græcis ἀμβλυωπία dicta, Paulus sub vno capite tractat, vt & alij fere omnes auctores & Neoterici, cum hæc affectiones tantum differant secundum magis & minus, actionis noxa crescente, pro quantitate declinationis, ac affectus magnitudine, vt 1. De causis symptomatum par, cum & similem fere, eodem Paulo teste, curationem habeant, quamuis in obscuritate cernendi sensus deperditus sit; in hebetudine vero, non omnino aufertur visio, sed notabiliter. Si paulatim fiant, læduntur in iis oculis, quamuis non manifeste; aut secundum eius visum spiritum, dum incrassatur; aut secundum tunicas, dum densantur aut crassæ fiunt, aut secundum humores, cum crassi aut viscosi redduntur: interea visus spiritus imminuitur, & debilis fit dum netui optici & tunica corrumpantur, vt senibus accidit. Si confertim inciderint, fit ob visus nervos tantum, vt scholio præcedente diximus, quod alias euenisse in Mæderio nauta demonstrauimus. Estque igitur symptoma in genere noxæ functionis visivæ, modo diminuta, modo ablata: neque ex vno tantum genere morborum pullulat, imo ex quouis signi poterit, ex intemperie, mala compositione, aut vniuersali solutione prænominatarum oculi partium, quorum morborum causa non pauca esse possunt. Si paulatim fiat hæc affectio, vt Aëtius ex Galeno annotauit, ex incrassato visuo spiritui, in tunica densatis aut crassatis seu rugosis redditus, ex ingenti tristitia, ex morbo præcedenti, spiritibus imminutis, paulatina obscuratio, ex senio, frigidityte, humorum spirituumque crassitie, vel tenuitate spirituum & vniuersali inopia. Hinc & Rondeletius obscuritatem multis de causis, vti & hebetudinem, fieri dicit: vel enim affectus est in humoribus, vt in glaucedine, quia densior est, non bene recipit spiritus visorios aut species: aut in cornea, propter morbos superiores enarratos; vt ob albuginem vel cicatricem, vel rhagoidis dilatationem quibus affectibus quomodo sit occurrendum, iam diximus. Repentina causa, quæ confertim incidit, iuxta Aëtium, sunt nervi ipsius visui vel optici obturatio, à crassis ac viscosis humoribus confertim in ipsum illapsis; aut eiusdem nervi resolutio. Hanc agritudinem præcedunt, eodem Aëtio teste, cruditates assidue, vini meri potio, moraque sub sole, capitis calefactio aut refrigeratio; post cibum continuæ lectiones, vel balnea; vomitus, concubitus importunus & immoderatus, violenta spiritus detentio; quod tubicini derata, hebetudinem efficiunt, immoderatam obscuritatem. Quandoque vero obscuritas accidit ob vehementem capitis percussione, aut

casum à sublimi loco, nervo optico resolutio aut contractio (que citimum benignissima est) ob ingentem concussione delapsa humorum multitudine & nervum opticum obstruente. Signa causarum hæc sunt, eodem auctore: nam nervo resolutio, aut tarde, aut nihil mouetur oculus. Sed si ob violentam capitis percussione, vel casum à cerebri connexion abscindatur, primo quidem oculus redditur prominentior; postea etiam non alitur. At vbi propter crassorum lentorumque humorum multitudinem, absque alia causa nervi cauitas obstruatur, grauitas capitis necessario, præcipue in radicibus oculorum, consequitur, & ita quoque si ex plaga, casu ab alto, vel resolutio nervo contingat, vel ex humorum copia præter iam dicta etiam intelliges ex ægrorum & astantium sermone & assertionem. Ex quibus iam dictis etiam signa prognostica facile percipies: Si enim paulatim hebetudo aut offuscatio fiat, non admodum difficulter curari poterit, nisi senioribus accidat: nam à moderatis causis, & non ab immodicis ortum ducit: quæ confertim fiunt & à plaga, difficulter; quamquam illa mitior est, quæ ex humorum copia illa propter vehementem concussione, secundum eundem Aëtium; nervum opticum obturante. Paulus autem breuibus verbis vtriusque curationem absoluit, cum in suffusione scribit sanguinem mittere ab angulis; hucudines admovent temporibus, inferiores partes perficere. Procedente tempore etiam iis quæ sternutamenta prouocant, vtendum est, tum vomitu ante cibum, deinde topica addit exigua. Aëtius magis distinguit, & longiorem curationem describit: Si enim, inquit, repentina obscuritas inuaserit, & æger plethoricus fuerit, cubiti venam secato; deinde, aliquot inuiculis diebus, fasciam collo netens constringito, venisque tumefactis iterum exsoluto, idem terio repetemlo, ad spiritus agitando & humorum obstrucliones violenter concutendo: scribitque postea tres quandoque beminas à tumefactis angulorum venis naso adiacentibus vtriusque sanguinis extraxisse, cucurbitula cum scarificatione protinus affixa; saepeque ea adhuc inhaerente hominem repente visum recuperasse: deinde defectis viribus post tertiam diem purgat, & ad victus rationem commode conuertitur. Est enim his aer eligendus moderatus, ad siccum vergens; somnus moderatus, sed non diuturnus; alius per cibos facilis, arte vel natura: cibi attenuantes, boni succi & optimæ concoctionis, minimeque flatulenti aut crassi. Vini potus vitandus, & toleranda viriliter aquæ potio, vt de debilitate visus dictum est, aut aquæ mullæ aut aquæ decoctionis cinamomi. A coitu abstinendum, insolatione capitis & vehementiore motu à cibo, lectione, scriptura, balneis, ira, indignatione, & curis perturbationibus. Iuxta eundem deambulationes in vmbrosis locis, & exercitia infernarum partium conceduntur. Quibus autem plurimo tempore paulatim obscuritas accidit, recta viuendiratione corpus præparante præscripta ab angularibus venis, vt prius, sanguis mittendus: si pauci sit sanguinis, deinde cucurbitula adhibenda; mox purgationes, vomitusque assidui fugiendi; tum cætera iam dicta. Postea, capite quoque repurgato & perseverante morbo, per apophlegmatismos & errhina primo collyriis simplicioribus vitur: postea & his quæ ad suffusiones conficiuntur, vt apud ipsum legere poteritis. Nos hæc addemus, si humor aliquis in tunicas receptus, corpus euacuandum, & vtendum collyriis detergentibus.

D tergens

Et crassus
vapores.

13

Et paucitate
spirituum
sine obstru-
ctione quo-
modo cure-
tur.

14

Et crassitie
spirituum
curatione.

tergentibus descriptis ab auctoribus capit. De sus-
fus. & oculi macula. Si à crassis vaporibus, tan-
tum pilulis utemur de aromatibus, de hiera cum
agarico sine croco, ut Rondeletius consilii: etiam
clysteribus; nam vidit puellam repente factam
cacam, cui iniectione clysteris visum statim re-
stituit præter expectationem. Vnde credit etiam
meatus visorios posse obstrui à crassis vaporibus,
sicut ab humoribus crassis; præsertim iis qui
alui diutius excrementa retinent, vel qui male
concoquant. Si autem ob vulnus illatum & des-
cendens in partes profundas oculi & nervum
opticum, nullo pacto curantur. Et si diutius du-
rauit visus obscuritas ob aliquam obstructio-
nem, non curatur, propterea quod partes con-
cidunt, cum spiritus amplius non recipiunt;
quæ cavitates, postea difficilime dilatantur: à
crassis humoribus crassis, pauci & turbulentiores
sunt spiritus: hic humor purgandus est. Si sine
obstructione id fiat, ut post morbos qui fuerunt
cum magno fluore sanguinis, aut alui aut sudo-
ris, vel in senibus ob paucitatem spirituum &
instrumentorum siccitatem, quæ ea corrugat.
In tali casu oportet sanguinem resumere opti-
ma victus ratione, assumendo ea alimenta, quæ
bene & probe nutriunt, neque corpus multitu-
dine recrementorum replent. Hos vinum aqua
dilutum plurimum iuuat, album, & tenue, &
quod caput non tentet: optimum quoque erit
cinnamomum vel semen feniculi, alimentis ad-
miscere, ut priscane vel iusculis. Gradus refert se-
puerum 13. amorem in curatione habuisse, qui post agri-
tudinem sex mensium cæco evasit, licet in oculi substan-
tia nulla læsio appareret, ita ut cecitas enervit ex dimi-
nutione spirituum: nam post duos menses facta restau-
ratione puer visum recepit. Si autem à spirituum cras-
sitie, tunc victu attenuante utendum erit, &
alimentis attenuantibus, nec moliemur eua-
cuationes magnas, quæ substantiam spirituum
dissipant. Si ob tenebrationem humorum fiat ob-
scuritas, collyria tunc detergentia & quæ sunt
prescripta ad dilatationem pupillæ à statibus, hic
erunt ex usu. Vide pulveres & aquam egregiam
apud Rondeletium; & apud Holerium, aquam,
quam scribunt restituisse visum cæco 9. annorum,
cap. 18. De debilitate visus.

OBSERVATIO XXXVI.

De quodam qui longinqua optime videbat, propius
vero admota hebetius.

Generosus vir & Dominus de Benthuyfen
anno 1567. Mense Maio cum ad eum acci-
tus essem, conquerebatur se propius admota he-
betius videre, longinqua vero optime. Hic cum
longo tempore victu crassiore & lautiore usus
esset, & vino rubro Gallico, atque in otio vive-
ret, ego existimaui, humores crassiores & tur-
bulentum spiritum induxisse; cui & oculi paulo
humidiores spectarentur. Huic autem vinum ru-
brum interdixi, & ut à vino omnino ad tempus
abstineret, vel tenui & aquoso admodum parce
vteretur; & victum tenuiorem eidem prescripsi.
Cui cum libenter sanguinem ex cubito detrudere
voluisset, noluit omnino admittere; quare ut pi-
lulas has singulis septimanis sumeret iussi: 26. pi-
lul. mastichinarum pilul. lucis, pulveris rhab. optimi ana
3j. cum succo feniculi, sicut pilula vij. dentur unica vice.
Deinde feniculum viride vino immergebat; quo
sepe oculos detergebat: quibus præstidiis tandem
hoc vitium cessavit, cum paulo frugalius viveret,

& à vino abstineret, & exercitiis matutinis deam-
bulationibus uteretur.

SCHOLIA.

OB superfluum crassitiam & turbulentiam
spirituum, visus debilis erat, ut propinqua
non videret; remota magis: ideo victum atte-
nuantem & exsiccantem prescripsi, ventriculo
quoque repurgato, & sanguine depurato cum de-
cocto feniculi, fumarie & senæ & myrobalanis,
quibus etiā usus est, ante pilulas sumptas & post.
Vnderecte hic nobilis & generosus vir se habuit.
Quamquam alium noverim qui oculos utcumque
eminentes haberet & valde humidos. (uti etiam
M. Iacobo Musio Prætori Dordraceno contigit,
ut antea dictum est,) qui propinqua magis videret,
ut Myopes solent, huic consului ad visum debi-
lem restaurandum, ut vino euphragato vteretur,
quo se valde iuvare professus est.

OBSERVATIO XXXVII.

De Myopia.

Myopes appellantur, ut Aëtius testatur lib. 4.
cap. 45. qui à natiuitate, pusilla quidem pro-
pe conspiciunt; procul vero magna aspicere ne-
queunt, legendisque literis oculos admovent:
quod cuidam expansis oculis fiebat, (ut Dominicus
Heermans Bredens contigit;) cuidam moderate aper-
tis (ut Florentio Teylingio sororio meo) fieri solebat.
Hunc morbum Aëtius & Paulus tamquam imme-
dicabilem derelinquunt. Verum in his nihil præ-
stantius est, quam ocularibus cauis ad oculi for-
mam, uti; ut in Scholio subsequenti Latius ostendimus;
& ideo eiusmodi ocularia ut sororio meo contice-
rentur consuluimus.

SCHOLIA.

Myopiam Hollerius lib. 1. De internis morbis
cap. 18. ad debilitatem visus refert, dicens
hoc contingere ex raritate tunicarum oculi; vel ex
humoris tenuitate & subtilitate spiritus visorios,
qui priusquam angulum faciat, dissolvitur atque
evanescit. Sunt qui eo nomine vespertinam Myopiam
etiam aciem appellant: cum interdiu obscure, nocte
autem & sine lucerna, acutius videant. Rara affe-
ctio hominibus ab eadem causa: nisi quod illis
infirmas maior est; his luce quidem dissolvit spi-
ritus, nocte cogitur atque temperatur. Contra quæ
in Nyctalope, de quo postea. Summatim in his
quæ natura ad legitimam videndi facultatem esse
stuit, spiritus neque crassior neque tenuior esse
debet, sed æria tum natura, tum substantia,
tum qualitate moderata, iusta etiam quantitate,
quæ omnia pendent à natura sanguinis & pitui-
tis, in quibus substantia est spiritus. Tempera-
tus enim sanguis eundem spiritum gignit; intem-
peratus vero vitiosum reddit. Subtilior spiritus
obscurum loco melius habet, ut in vespertina acie.
Tenebris enim colligitur, crassescit & frigidior
redditur. Idem efficit, ut & minima cernamus
& pingamus calamo: sed tantum ea quæ in pro-
ximo sunt. Contra vero crassior spiritus, ut in
senibus, remotius posita intueri potest, tantum
cernit mauseula, eademque calamo pingit. Ex
quo inuenta est ratio Opticorum in specularibus,
ut convexa, minores: concava maiores: ut enim
æquales formas & literas representent. Ut enim
oculares radij maiorem minoremque angulum de-

scribunt, ita formæ oculis proponuntur. Ob hoc
Myopia affecti ocularibus cauis ad oculi formam
vident. Nullum enim, si ab ortu contractum
sit malum, præstantius remedium adferri possit
quam ocularibus ad oculi formam cauis uti, &
circumferentia densioribus, quo spiritus in cen-
trum, tamquam pupillam cogantur, & confertim
prodeant. Quod in multis medici excellentio-
res & nos experti sumus. Ex his enim cauis oculi
lorum varij affectus sunt: Quidam propinquo-
ra non cernunt, alioqui longinquiora difficulter:
nam quanto magis irradiatas literas perlegunt,
eo deterius oculis subiectas literas cernunt: pro-
pterea niger oculus ea natura existimatur. Qui
vero sine multo lumine legunt, ij acutius propin-
qua cernunt: propterea qui oculos glau-
cos habent, propinqua melius respiciunt, quo-
niam exiguum luminis appetunt: ob eam ratio-
nem seniores, quibus spiritus tenebrosior reddi-
tus est, plurimum luminis exquirunt: literas ob
id ab oculis submovent, quum legunt, & specil-
lis evidentiis cernunt, quoniam species visibiles
ex literarum singulis elementis crassiores red-
duntur, nec spiritus facile resoluuntur. At acie
oculorum prævalentes, huius specillis læduntur.
At oculi emissitij hebetiores sunt: nec remotio-
ra conspiciunt, quoniam eorum acies super-
ciliorum umbra dumtaxat fouetur: è diverso
caui oculi remotiora acutius cernunt: quoniam
vis circumsepta in vnum redigitur, ex Aristotele.
Inter ea Platonis sententiam & Galeni subtex-
imus, qui ex oculis spiritus radiantes eiaculari
esse ferunt, & ad obiecta pertinere; ita visibilia
cernunt: nam equi ob eam causam, capræ, &
etiâ refugient, noctu cernunt: ita quod ex oculis
motus spirituum radiantium quum pervenit ad
obiectum longinquum, attenuat spiritus radian-
tis crassitudinem, & eo motu suppetentibus ra-
dijs, ad longinquiora protenditur. Eadem ra-
tione in brevi spatio spiritus crassus attenuari ne-
quit, neque radij nisi iusta distantia diffundi
possint, ob id oculis admota non cernimus, sed
ad longinqua paulo remittimus obiecta. E con-
trario subtilior spiritus, ac exiguus quoniam
modicus est, protendi non potest ad remotiora,
subtilitasque plurimum resolvable atque evani-
bilis nequit extendi. A Platone vero Peripateti-
corum schola imagines rerum visibilibus à cry-
stalloide suscipi, & ære puro, ac limbo eius
modi species representari asserit. Quæ cum à
longinquo in aciem deferretur, vehementiori mo-
tu regitur in spiritum in instrumento conten-
tum, unde acies laborare videtur, si spiritus exi-
guus fuerit: verum idem multis facilius fere vi-
detur: si vero crassus fuerit, difficili motione
extenuari, & nihilominus longinquiora bene
conspecturi: quemadmodum diximus evenisse Ben-
thuyfo, quin longinqua optime videbat, propius
vero admota hebetius. E diverso, si tenuis &
exiguus fuerit spiritus, dum vehementiori motu
longinqua conspici conatur, dissipatur, resolu-
tur prius, tenuis spiritus: contra oculis admota,
sicut nyctalopibus contingit, clarius cernit. Ari-
stoteles vero lib. De generatione animalium, non in-
tuit, in eo præsertim qui oides dicitur. Siqui-
dem dem visus. (inquit) non igni, sed aquæ tribuendus est:
nam humoris copia transpici satis non potest; crassus qui
parum humoris habet, satis transpiciatur: ut in mari
etiam cernitur; quantum enim eius transpiciatur, ca-
sum apparet, quantum minus aquarum; & quantum
per. Forest. Tom. 2.

præ gurgite alto non præstatur, id opacat, & nigrum
aut exarilem sentitur magis minusque ita consistit.
Eandem causam esse putandum est, ut cælij acu-
te interdiu cernere nequeant: nigri noctu. Cæ-
lij enim præ sui humoris exiguitate moventur
magis à luce & rebus visibilibus: quoniam cælie-
tas imbecillitas est; nigri vero ob humoris copiam
minus moventur, lux enim nocturna exilis est,
nec humor per noctem facile moveri potest. Vi-
sus autem optimus, qui inter multum & parum
humoris medium possidet, quoniam neque per
exiguitatem vincitur, ut colorum motiones im-
pediat, neque per nimietatem præbet mouendi
difficultatem. Myopes à nostris dicuntur luscio-
si, tales enim à natali die propinqua vident, remo-
ta non item. Budæus quoque lusciosos & luscio-
sios & nusciosos vocat; quales fere cum pau-
lo diutius legerint, aut oculos aliquo coniectos
habuerint, exhausto spiritu tenuiore cæcitant,
aut limis semiclusis oculis volitantia quadam
in ære corpuscula sese intueri putant. In myopia
vel myopiâ visus est diminutus, non sublatus
aut hebes, ita ut propius admota tales tantum
videant: ita novi lusciosos, quod eos non videant,
qui eosdem prætereunt, nisi admodum propin-
qui sint: novi tamen rursus aliquos myopia labo-
rantes qui vix lusciosi viderentur. Differt tamen
myopia à strabismo, videlicet convulsoria (resse
Paulo lib. 3. cap. 22.) musculorum, qui bulbum mo-
vent, dispositione: quamquam ut idem refert,
oculi infantium ab origine distorti sanescunt re-
bus faciei circumpositis, ut in rectum videant.
Et sic lucerna in conspectu ponitur, quæ non ex
obliquo appareat.

OBSERVATIO XXXVIII.

De Nyctalopia seu nocturna cæcitudine.

Aliud quidem vitium (quod Græci Nyctalopiam,
Latini nocturnam cæcitudinem vocant,) in o-
culis oboritur, in quo videndi functio læditur, ita
ut oculus hic sit pars affecta: cum enim fieri non
possit, ut cernendi functio oblata sit, ipso o-
culo nequaquam affecto, cum actionis noxa
qualiscunque sit, cuiuslibet partis proprium
sit symptoma, ut patet 2. De locis affect. Hic vero
affectus præter naturam ad symptoma noxæ
functionis animalis sensibilis, nempe visus,
non ablata nec depravata, sed debilis pertinet.
In quo vitio, teste Paulo & Aëtio, per diem homo
cernit, sole deinde occiduo obscurius, noctu
omnino nihil. Videturque id, ut Aëtius sentit
lib. 7. cap. 46. ob capitis imbecillitatem confin-
gere, præsertim ob visorios spiritus, reliquorum-
que humorum ac tunicarum oculi crassitudi-
nem. Quod equidem malum istis diebus cum
viro circiter quadraginta octo annos nato conti-
gisset, ab humorum crassitie spiritibus quoque
incrassatis evenisse verisimile fuit: nam gravi-
tatem in capite & similiter circa radicem o-
culorum sentiebat: qui cum boni habitus esset, à
sanguinis detractione in cubito è cephalica cura-
tionem instituimus, facibus prius ab alio expur-
gatis (Aëtius & Paulus etiam ab angulis oculorum
idem præstant) mox putigatione, vel per clysterem
inanitione adhibita, egregie profuit. Deinde
post communem euacuationem apophlegmatif-
mos & sternutationes quinque diebus aut se-
ptem adhibuimus, & hyssopi decoctum: id quo-
que, vel ruta aut origani, ante cibum auctores
prædicti exhibent; victu attenuatorio etiam præ-

scripto: & si non succedat his curatio, rursus catharticum propinant; & postremo ad collyria & linimenta procedunt, oculos melle despumato illinendo: deinde iubent ut claudantur oculi premendo humores, continendoque: *aluminis scissilis part. 2. salis fossilis part. 1. vira cum melle sublinunt.* Verum ego huic viro sanguine detracto etiam hoc decoctum propinaui: *℞. feniculi, betonica, origani, hyssopi, ruta, euphrasiae ana m. j. fiat decoctio in aqua communi pro ℥ j. colatura adde syrup. de betonica, mellis ros. colati ana ℥ i. b. misc. & cum paucis cinnamomi aromatizetur, pro 3. dos.* deinde ita illum purgavi: *℞. pilul. cochiar. de biera simplici, lucis ana ℥ j. cum succo feniculi, sunt pilule v. rursus reiterato decocto, paulo vehementius illum purgavi: ℞. pilul. cochiar. ℥ ij. pilul. lucis ℥ j. trochisc. albandat. ℥ ij. diag. ℥ j. cum aqua feniculi, sunt pilule v. dentur longe à cena.* Postea etiam, cucurbitulis scapulis cum scarificatione impositis, masticatorium quoque ex pipere, pyrethro, cubebe, & semine feniculi prescripsi. Postremo, ad hoc collyrium devenimus, ex succo feniculi & anagallidis: nam anagallidis succus tertio quoque die oculis iniectus egregie prodest; cum & pannum in oculo consumat: sequens etiam egregie huic, tum aliis, vtile fuit: *℞. mellis depurati ℥ ij. succi feniculi ℥ j. fellis accipitris ℥ i. b. misc.*

SCHOLIA.

4
Cause.

Huius causa eadem est cum his qui parum acute vident ob crassos spiritus vel humores vel crassitiam instrumentorum & tunicarum. Fit autem quia pauca illa spirituum quantitas, non sufficit ad illuminandum oculum, aliqui crassum, aut nimia humiditate obtenebratum, quæ maior esse solet noctu quam interdiu, ob lunæ influxum, quæ sub calore moderato humores liquefacit: oculus enim (ut prius dictum est) ex Aristotelis sententia aqueus est. Id etiam experimur in hominibus eiusmodi, quod in novilunio melius vident & minus acute in plenilunio. Signa huius mali per se nota sunt, cum per diem cernant; sole occiduo deinde obscurius; actu nihil. Signa quoque causarum facile ex iis quæ de debilitate oculorum dicta sunt à nobis tum ab aliis auctoribus, etiam habentur. Habitus enim corporis indicat, si ex multitudine humorum, si ex spirituum sola confusione corpus habile est. Si ex crassitie tunicarum, signa iam prius dicta sunt: si cerebri vitio contingat, vel capitis dolor & gravedo aderit: ita in meningibus dolor ad radices oculorum pertingit: si impetu, ex humore in nervum opticum, facilius excantur, ut *Holierius* vidit in pignore intra furnum ignitum repente cæco facto: sed illa potius ad amblyopiam & amaurosim pertinent, cum in hoc affectu tantum visio debilitatur, ob aliquam capitis imbecillitatem & maxime visui spiritus crassitudinem, itemque reliquorum oculi humorum ac tunicarum. Celsus refert in feminam bene respondentibus menstruis non cadere. Curationem ex Paulo & Aëtio iam diximus, & si illa, quibus nos vsumus, non satisfaciunt. Vide reliqua apud præceptorem meum Benedictum Faentinum, quæ de Nyctalopis curatione scripserit. His autem, ut Paulus & veteres commendaverunt, iecur hircinum assatum, aquosus inde humor collectus inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctique vapor oculis excipi apertis præcipitur. Antiqui licet fere omnes commendaverint iecur hircinum multis modis præparatum, primo asium

Signa.

5

Prognostica
Curatio.Iecur hirci-
num.

6

& cum sale comestum, vel saniam, quæ excidit, dum assatur in veru, appositam oculis, vel nido-rem oculis apertis exceptum: hoc tamen remedium Rondeletius imbecillius invenit, nisi cum felle torreatur. Tunc enim illius sanies est efficacissima. Vel si feniculi folia vel ruta vel chelidonia affigantur. Qui vero Avicennam sequuntur, secant, & piper longum infigunt, aut sal indunt, reponuntque ad furnum in vase lapideo, ut distilletur sine vitione liquor: vel exsiccatum in pulverem redigunt & in oculum coniciunt, quod valde exsiccat & deterget. Alij sanguine columbino illinunt, aut felle capræ; Aëtius addit agrostis, vel felle buglossi piscis, quod præ cæteris iuvat. Similiter hepar caprium coquito: obvelato capite & in ollam aduerso, fumum oculis excipere solent: ipsum vero hepar assidue edendum præbet. Cuiusdam refert Alexander Veronensis, qui noctu neque stellas neque lunam cernebat, spodi exiguam violaceo admiscens in naribus sæpe contiecit, lumenque restituit: succus hieraciæ herbæ prodest, ab accipitre nomen habens apud Gal. 4. De medic. secundum locos. & Cornelium Celsum reperitur hieracium collyrium ad obscurum nomen & scabras affectiones. Inde etiam rustici herbæ, ut interpres *Hollerij* anno: aut, quam rustici chithorem luteam vocant, à florum colore, in prætis frequentem. Accipitres aiunt scalpendo eam, succoque oculos tingendo obscuritati visus mederi; ob idque vocant Hieracium. Contingit aliquando sed rarius, ut quidam (teste Aëtio) noctu quidem melius cernant, interdiu peius; & si luna noctu appareat, nihil cernant: in quibus multum attenuari spiritum ac tunicas rarefieri, & propterea spiritum dissipari, ac visum obscurari fatetur; noctu vero crasse fieri, colligique ac sensum mouere: alij dicunt quod igneos quasi habeant oculos, ut experientia in quibusdam animalibus observare liceat, in equis & felibus, ut antea dictum est. Cum spiritus hic in die dissipatur, soli robori reparando insistendum proponit Aëtius: & scribit Herophilum quibusdam remediis contra eos uti, iecur hircinum comedendum præbens: quæ magis congruere arbitrat uti: qui noctu non vident: sed potius ea proderunt, quæ ad spiritus dissipatos valere scripsimus; cum & Avicenna tales humectet, & in iis sanguinem infuset, videturque probe instituat; atque nos istidem uti possimus, quæ antea ad paucitatem spirituum valere diximus.

OBSERVATIO XXXIX.

De milite quodam qui duo semper cernebat.

Anno 1545. mense Aprili, cum ex Italia Litetiam venissem, & in ea civitate ad tempus aliquod praxim exercerem, nobilis quidam miles Flandrus stipendium agens Parisius sub Francisco rege Gallorum, mirabili vitio oculorum correptus fuit. Apertis enim oculis ambobus, quicquid videbat duo esse apparebant. Sed sinistro aperto, & dextro demum clauso bene cernebat; neque tunc duo videre se affirmabat. Hunc autem quidam medici Parisienses non imperiti variis medicamentis, ut sanguinis missione, purgatione, pilulis, aliisque prædictis optimis frustra tentabant curare. Et inter reliquos quoque Franciscus Gandavensis medicus atque chirurgus expertissimus, magnique nominis, & multis nobilibus notus, ob insignem experientiam quam habebat in lue Gallica curanda, cum

ipsem noctu dieque destitulationes ac decocta per balneum maris tam guaiacani, quam ligni Chini (nunc temporis inveni) faceret. Hic cum mihi valde familiaris esset, me ob rei novitatem ad militem deduxit. Oculis diligenter inspectis, nulla rubredine præfente aut dolore, neque capitibus graveline; cerebrum tamen eius tum caput frigidum & humidum erat naturaliter, ut ex operationibus animalibus constabat, ideo hoc vitium minime contractum ex plenitudine, cum & Veneri plus æquo indulgeret, ita ut neque plethora neque cacochymia laboraret: hinc neque venæ sectionem neque purgantia medicamenta iuvare existimabam, & malum ab humiditate soluta ortum iudicabam; dextro oculo magis humido apparente, & quasi prolapsio ac madente: ita ut spiritus visorius ex tali madore impeditus ob reverberationem limpiditatis aquei humoris, duo semper cernebat, licet vnum quid existeret: quemadmodum iis evenit qui diutius solem inspicunt; & oculi eorum madore corripuntur ex nimia solis claritudine, ut duos soles videant, quamvis vnum tantum sit, denique aliam rem quampiam subito cernentes duas esse autumant: nam oculus humectatur madore quasi expresso, neque limpiditatem sustinet, unde facile in visu hebetatur. Hæc ratio & militi & medico præfenti valde ardebat. Ideo rogabant quid remedium adhibendum, ego proposui illam humiditatem esse exsiccamandam & oculo robur addendum victu magis exsiccante, & assis potius quam elixis vendum, auriculis montanis, cuniculis, & similibus, & ut à Venere abstineret & largiori victu quo milites sese oblectant, & ut vitaret omnia illa, quæ proprietate quadam oculis sunt infesta: ut est fumus, allium, sinapi, & similia. Præterea consultum dicebam ut medicamentis exsiccantibus, resolventibus & oculum roborantibus tam intus quam extra, ut conserva florum rosmarini, betonica, pulvere euphrasiae exsiccatæ infuso, adiecto syrup. de betonica ad modum conditi, uteretur: ideo & hæc subsequenter præscripsimus: *℞. florum betonicae exsicce, florum chamomilla, florum ros. rubr. exsiccat. euphrasiae sicce cum florum ana m. j. seminis coriandri præparati, cumini præparati ana ℥ i. b. coquantur in aqua feniculi, chelidoniae, ros. rubr. euphrasiae ana q. s. pistentur & panno lineo interluta & expressa sub noctem leviter oculo magis affecto apponantur, & debita ligatione moderate stringantur, ne inter dormiendum excidat. Mane, facibus prius depositis, hic focus sequens fiebat, peccinatione capitis commoda præcedente: *℞. florum chamomilla, florum ros. rubr. florum euphrasiae, chelidoniae ana p. j. coquantur in aqua ros. euphrasiae, chelidoniae, & vino Piclaniensi ana q. s. pro usu.* Interea & hic sacculus futuræ coronali imponebatur, quem continuo sub tegmine portabat: *℞. florum chamomilla, florum rosmarini, mannae salviae, florum ros. rub. ana p. j. m. j. torrefact. ℥ i. b. inciduntur & conqussentur, fiatque sacculus raiundus interfectus, ut artis est, pro capite. His prædictis ad mensem vltus, & ex condito superscripto omni mane sumens, tandem, ut prius, optime videre potuit.**

SCHOLIA.

Quia autem hic oculi aliquo modo erant madidi, & temperies cerebri frigida & humida, unde hic æger, ex oculorum debilitate, si vna res ab eo videbatur, putabat duas esse. Id quoque duobus aliis modis fieri potest, ut Gradus ex Avicenna supra Rhafem annotavit, ex

malo situ crystalloidis. Si equidem non opponatur crystalloides directe secundum partem planam vix, tunc quasi in totum aboletur visio, ut *Avicenna* cap. De visus destructione. Aliquando fit eius declinatio ad superius vel inferius: & tunc, dicebat Azaravius, sequitur, ut vna res videatur esse duæ: sicut etiam aliquando secundo modo à turbiditate spirituum, à vaporibus crassis maxime vini hoc accidens contingit, ut vnum videatur duo: quemadmodum Aggregator Brixien-sis historiam ponit de sacerdote avaro, qui cum habebat unum lumen in manibus, credens esse duo lumina, sacerdos propter avaritiam extinxit vnum existimans remanere aliud, & ita remansit in tenebris. Hic autem miles, ut intelleximus, vinum largius, ut milites solent, frequenter ingurgitauerat; unde spiritus turbidiores redditi ex crassis vaporibus: antea ab aliis medicis purgatus, & nunc à nobis cerebrum magis exsiccatum, roboratum, & oculis similiter corroboratis, & tanta molestia liberatus est. At Gradus ponens curationem læsionis visus propter malum situm crystalloidis ex mente Azaravij Arabis medicis præstantissimi, dicit: Si fuerit antiquus, non curatur, sed in pueris aliquoties, ex parte opposita ægri tudinis candela accensa posita, quam puer continuo inuenerit. Eodem modo strabismus seu oculi convulsio, ut diximus scholio obser. 37. huius libri, curatur, Pauli quoque auctoritate.

OBSERVATIO XL.

De oculi exitu.

Cui ex istu oculus nonnihil eminebat, tamquam exiturus videretur, licet nondum omnino ex sede sua procideret, apposita aqua rosacea cum albumine oui lana molli excepto & leviter ligata, intro redibat. At mulieri cui ex nimia humiditate oculi quasi exprimerentur, corpore & cerebro repurgato, & cucurbitulis cum scarificatione occipitis apposis, deinde oculum fovimus fotu ros. rubear. myrto & nuce cupressi, topicis iisdem alstringentibus exsiccantibusque ac roborantibus supra oculum positis & leviter alligatis.

SCHOLIA.

Exitum Græcis, Latinis expressio oculi dicitur: estque malum, in quo oculi (teste Aëtio) exitus solent; ita ut eminentes persistant. Recentiores exitum oculi appellant. Accidit autem iis, eodem Aëtio auctore, qui in athleticis certaminibus suffocantur, aut mulieribus nimio pariendi dolore afflictis: sitque propter vehementissimum conatum, aërisque suppressionem; ut cum mulieres difficulter pariunt, vel cum reddimus urinam cum magna difficultate, excremeta alui admodum dura, vel cum vomitione difficili. Vidimus tibi cinem militem, qui tuba canit, hoc malo affectum; quamvis in principio optimis remediis curatum: de quo antea quoque mentio facta est. Tunc enim expressione illa facta in cerebro, ob retentionem spiritus attracti, ad extra expellunt; potissimum iis, qui molles & laxas partes habent circa oculum. Fit etiam, secundum eundem Aëtium, ob plurimum defluxum confertim à capite irruentem. Alij exitum oculi duplicem esse volunt: hunc quem diximus; deinde alium, quando ob vulnus illatum (ut Rondeletius sentit) adnatæ tunice, quæ oculum intra retinet, excidit, & ob vulnus septimi musculi, qui vtrumque transversus est, in inferiori parte

四

5

6

7

cul. & palpebr.
Verum cum etiam visus impedi-ri possit ob vitia
genarum, cili-orum, palpebrarum: nunc ad palpe-
brarum mala ab aucto-ribus enumerata, & quibus
modis ea curentur, defendamus & enucleemus,
ne quid huic libro desit.

De inuersione palpebrarum vel euerfione, seu Ectropio.

EVersiones genarum seu palpebrarum seu inuerſiones (*Græcis vocantur Ectropia*) ſunt, teſte Paulo & Aëtio, exulceratione præcedente, & carne ipſarum ſuperaucta, vel ob duritiorem cicatricem. Huic vitio cum ruſticus quidam, cui nomen Leonis erat in pago Schago dicto habitans laboraret, multos conſuluit medicos: qui etiam ad nos venit: habebat autem palpebras inuerſas ſupra ſe ipſas & extra, vt carnis fruſta ruberent: ego ex materia falla malum contractum exiltimabam: facta ſectiōne venæ & per pilulas bis aut ter purgatus hoc modo: *Recipe pilul. ſine quibus lucis maior, an ʒiſ. diagridij ʒiſ. ſiut pilulæ viſ.* deinde vt oculum lauaret præcepi vino albo, cui alumen de rocha, in exigua quantitate ſemel bullitū erat. Deinde de palpebram linimento ſubſequenti inungeret. *iuſſi: Recipe axungie porcine colatæ ʒiſ. iuris præparati ʒiſ. camphoræ ʒiſ. miſce ſimul & lanetis noctes in aqua roſ. ſomni tempore inungatur.* Hoc modo Giſbertus Hoſpii præceptor meus Romæ Hoſpitalis Mariæ conſolationis medicus, nobilem matronam Romanam curauit, cum multis annis ex cataracho calido falſo & inuerſione palpebrarum laboraſſet, neque lumen ſolis aut candelæ ferre poſſet. Alioqui & hoc vt vteretur præcepi, quod ſæpe experti ſumus ad oculorum rubredinem: *Recipe binyſſeritis noctis loti in aqua communis, poſtea noctis loti in ſucco plantaginis: deinde ter in aqua roſ. ʒiſ. iuris præparati lota ſemel in aqua roſ. & aloes lota in aqua plantaginis aut ſolari, ſeſ. albi cum opio an. ʒiſ. camphoræ loti ʒiſ. miſce ſiut vnguentum; veſperi inungatur, & aqua calida abluatur, quibus & hic plurimum adiunbitur: alioqui ad remedia illa conſugiſſem, & apud Tharantanum deſcripta lib. 2. cap. 6. de inuerſatione palpebrarum cum rubore & tuberoſitate oculorum.*

SCHOLIA.

IN quibus Ectropiis ex crescentia inueteraerit, & aruginem rasam ex Pauli decreto torrefactam conterito, & admouito, vel plumbo vsto cum sulphure viuo & loto vtor; vel vtriusque paribus, seu arugine & plumbo. Nam ex cicatrice proficiens habet Ectropion, si in totum curare studueris; id manu faciendum est, quibus etiam id fiat, docet Aëtius ex Aetulo c. 71. lib. 7. Verum si ad sit carnositas in palpebris, antequam ad chirurgiam accedamus, tentandum nunquid hoc Gordonij medicamentum absorberi possit: Recipe aloes, mēica, serecolle, vitæ, lithargyr. an. d. ij. flor. aris d. s. conficiamur cum succo chelidonie. At quibusdam callosæ & duræ sūt palpebræ & asperæ. Aspritudo apud Paulum palpebrarum interiorum dicitur *trachoma*. Harum intensio, vt veluti inci furas habeat, scylosis dicitur; contraxit, Tylosis, vel, vt postea idem Paulus dicit; ptilosis, palpebrarū crassities est callosa, rubicunda; quibus accedit pilorum defluxum. In ptilosis, inquit Aëtius, palpebræ crassescunt callum inducunt, ut affectus sit ex glabritie & oculorum ardoris compulsus, glabritium vocat tantum defluxum pilorum ob acrem destillationem contingentem; de qua id postea.

In asperitudine collyrio vtiur Paulus,
 quod ex vino constat & hæmatide lapide; cal-
 los duos inuertia pumice radit, aut sepiæ testa
 aut foliis sicci, vel instrumento quod à palpebra-
 rum rasura *blepharoxifion* Græci appellant. Vide
 Aëcium quæ ad pilosæ palpebrarum scripserit.
 5 Huc spectat crassities palpebrarum, quam Arabes
 & barbarâ medicinam facientes appellant *silach*.
 Causa eius est materia crassa, nitrosa, inquali-
 tatis ruborem, vlcationem, & casum pilorum
 inducens, qui non renascuntur, antequam passio
 curetur, eo quod pori eorum ab vlcibus sint cor-
 rupti. Hæc passio, Tharantano referente, toti
 oculo nocet; inde & visus debilitatur, & si ista
 materia sit subtilis enaporans, solum generat prur-
 itum: si maior & crassior, scabiem & ruborem:
 si multa, crassa, nitrosa, vlcationem & casum
 pilorum, succedit ophthalmia perperam curata.
 Recens & exigui temporis facilius curatur; inue-
 terata difficilis. Si ad sit repletio, vena cephalica
 incidatur: materia digeratur cum syr. de fumo
 terre & aliis aptis: & purgetur iis, quæ ad falam-
 pituitam faciunt, & quæ ad scabiem conferunt
 balneo vtatur aquæ dulcis. Fomententur oculi
 aqua rosa, in qua ferrum ignitum extinctum est
 fiat fons ex rosa, lapathij acuti rad. vel acetosa
 sumach & similibus; victu adhibito de ophthal-
 mia dicto, & pruritus ac scabies remoueantur, far-
 cocolla nutrita cum lacte asinæ & cum succo che-
 lidoniae linito supra palpebras, vel immisso. Si
 durities sit inueterata, post venæ sectionem
 purgationem adhibeatur collyrium viri de: *Recip*
gloriz æris 3 j. calcantini rssi 3 ij. arsenici rub. niri 3 iij.
ma maris an. 3 j. salis ammoniaci 3 ij. dissoluantur in
succo rub. & Galb. simul incorporetis linitur palpebras.
 Hoc remedio Tornamira consequutus est ma-
 gnum honorem in antiqua scabie, duritie cum ru-
 bore in ipsis palpebris. Plura & egregia præstid-
 vide apud Tharantanus *lib. 2. cap. 35*. Eade-
 fere curatio est, eodem auctore, inuersionis pal-
 pebrarum cum rubore & tuberositate oculorum
 libro eodem cap. 36. vt apud eundem ad longum legi-
 mus. *lib. 2. cap. 36*. Hæc etiam spectat nodus, lupia, petrifica-
 tio palpebrarum pro quo vitio Gordonius vti-
 tur hoc emplastro emolliente & relouente: *Recip*
ammoniacci, cæpoponacis, galbanii ana 3 j. temperentur in
aceto fortissimo per diem & noctem, & fiat emplastrum.
 Si eo non curetur, ad chirurgiam recurrendum
 vt istis diebus consuluit Bredentodius cuidam con-
 siliario, adolefcenti nondum nupto, qui eiusmodi
 lupiam supra palpebram habebat, quæ paulatin-
 agebatur, quam Guilhelmus de Dalen familiar-
 noster lithotomus manu curauit, facta incisione
 & lupiam extrahendo, & deinde vulnus decen-
 ter curando.

De pruriginosa scabie, cum rubedine palpebrarum.

Mulier quædam ingentem pruritum palpebrarum & scabiem habebat cum rubedine præmissa purgatione ex pilulis de fumo terræ & lucis, & cucurbitulis cum scarificatione scapulis admois; huic iussi vt aqua ros. aloë exigua inmixta, collyrijs instar palpebras sæpius oblineret, si neque iuuaret, vt myrtham cum lacte muliebri miferet, quo palpebras inungeret, & exiguum in angulum oculorum qui etiam pruritu inficiebatur, stillaret. Sed & hoc linimento ad pruritum palpebrarum & ruborem commodè sæpe vsumus: *Recipe cadmiæ lota in aquæ ros. ʒ. ʒ. sing. drac.*

*z ij. viridis aris d j. aloes opatica z iij. fiat pul. vt al-
 kabol. adde olei communis z iij. laridi sine sale z ij. in-
 ceporentur omnia, postea addendo capbura subtiliss. pul.
 z j. fiat vnguentum. Ita & alia multo palpebras in-
 flammatas cum defluxione, rubore & scabie, vn-
 guento vtens ex capbura, cerusa, cum mucilagine
 gummi tragac. confecto, premixtis vniuersalibus, feli-
 cissime curata fuit, etiam hoc quod sequitur ad-
 hibito: Recipe pomata z b. vitrua, i. ochis. albor. Rha^g.
 ana z b. vitriol. Romani d b. fiat vnguentum pro palpe-
 bris, licet oculi non sustineant olea nec pingui-
 a. hac tamen vnguentum commendantur à Rondele-
 tio, quæ non solum ad curationem cornæ scribit
 conuenire, sed potissimum ad palpebras affectas,
 ad genarum scabiem & vlcera. Magister Iacobus
 Rosa, amicus noster, cum palpebras inferiores ru-
 bras exulceratas haberet, vniuersalibus remedijs,
 tum alijs multis præscriptis, cum curari non pos-
 set, linimentum sequens parauit ex vng. rosaceo,
 pauca adiecta tota præparata, apponendo cum
 petijs lincis ad hoc aptatis. Vnica nocte tantum
 apposita (quod mirabile fuit) ab illa molestia men-
 se Aug. anno 1590. liberatus fuit.*

SCHOLIA.

Inter vitia palpebrarum, quæ multa recensentur, est illa quæ à Paulo *pteryophthalmia*, pruriginosa eiusdem scabies ex salso nitroso humore contracta, cui prodest posca, lenticula decoctum, ex rosæque fomentum. Quando materia salsa, inquit Gordonius, nitrosa, aut adusta, ad palpebras defluit, primo generat pruritum; deinde si continetur, scabiem; postea asperitatem; mox ruborem; vltimo ulcerationem. Materia prius è corporeeducta, repurgata iuxta humoris peccantis naturam, deinde ad opposita retracta, palpebræ hoc linimento illinantur: *Recipe aris yssi, cadmie lotæ, cerise lotæ an. ʒ j. aloes, myrrhe ana ʒ b. salis ammoniaci floris aris an. ʒ b. pulueriscentur, & consiciantur cum melle.* Ita & Valescus: Materia salsa nitrosa acris in exigua quantitate efficit pruritum, ad quem sequitur frictio; & ex illa maioris materie attractio, ad quam scabies & asperitas; ad hæc rursus sycofis, & ad illam grana duriora & ulcerationes cum pruritu semperiterno, *vi dicit Auicenna*, deinde crassities palpebrarum seu *slach*, quæ Auicenna à Paulo accepit, *de quibus prius dictum est.* Hoc à Tharantano commendatur ad pruritum, scabiem, ulcerationem, & casum capillorum, si malû leuioribus non cedat: *Recipe aris yssi ʒ iiij. piperis ʒ j. cadmie ʒ i b. myrrhe, croci ana ʒ b. floris aris ʒ j. gummi arab. ʒ v. pulueriscentur subtilissime, cribrentur, & cum aqua pluuiali reddatur mediocriter liquidum, cum radio in clausula palpebrarum administretur.* Si hæc sint exigua fiat fortius cum aqua ros. tepida mixta cum aceto exiguo, vel cum decoct. rad. lapathij acuti, acetosa & malua. Si pruritus fiat ob pediculos latos sub pilis palpebrarum affixos, curentur, vt postea de pediculis palpebrarum dicemus.

OBSERVATIO XLIII.

De ulceribus palpebrarum.

Puella cum ulceratas palpebras haberet, & à me consilium peteret, humoribus calidis acribus & salis prius è corpore eductis, & scapulis cucurbitulis cum scarificatione admotis, iussit, ut vlcera leniter liniret vel ablueret cum pidiis, & balaustis puluerisatis, & decoctis in aceto. per

D 4 aliquot

aliquot dies, deinde ut crocum puluerisatum oui vitello mixtum apponeret, hæc enim secundum Auicennam, ut Tharantanus refert, consolidat dicta vlcera. Si hæc non iuuarent, imperavi ut collyrio ex thure, cap. De vlcere & sanie in coniunctina apud Valescum descripto, vteretur.

SCHOLIA.

Ad vlcera
& fissuras
palpebrarum.

Chalazion
vitiis humo-
ris in palpe-
bra collu-
mies.

Vlcera & fissura aliquando in palpebris oboriuntur & ophthalmia aliisque oculorum vitiis male curatis, vel ex defluxione humorum acrim & salforum. Imprimis decoquantur lentes, & cortex malorum granatorum, in vino albo debili, & abluatur vlcus; deinde apponatur collyrium, iuxta Gordonium de vitello oui, croco & olivano, & si ibi est sanies, abluatur cum aqua falsa. Est & aliud vitium à Paulo Chalazion dictum, scilicet otiosi humoris in palpebra collumies: in qua ammoniacum aceto detritum, simul cum galbano inungitur. Facit etiam Terebinthina pariter cum cerato excepta: si ita non curetur, docet libro 6. capite 16. quomodo chirurgia curentur. Idem videtur esse malum, vel huic proximum, quod Barbari azarnac vel arnafac Arabes insequentes vocant, (teste Tharantano,) estque materia pinguis vel pinguedo quædam grauius palpebras, atque impediens ne perfecte aperiantur claudanturque, easque molles reddens. His quidem adest tumor palpebræ expansus sine dolore, nec in vna parte palpebræ, ut quando aut hordeolum, de quibus postea. palpebra quoque si stringatur inter duos digitos, & subito remoueantur, remanet vestigium compressionis, & eminentia in medio compressionis existit, auctore Auicenna, estque secundum eundem coniuncta, non mota sicut nodus. Et plurimum quidem accidit infantibus & humectatis, in quibus multiplicatur lacrymæ & ophthalmia. Curatur fotu decoct. absinthij, chamomillæ, feniculi & anisi: deinde apponatur emplastrum de ammoniaco soluto in aceto vel diachylo, adiecto sale ammo. & rad. ireos. Si palpebræ non detumescant, pinguedo est in caula, & viscositas, & non ventositas aut aquositas. Gordonius pinguedinem palpebræ curat illinitione aloes, acaciæ, croci, & aceti simul commixti. Quibus si non curetur, palpebram modice incidit, ut pinguedo effluat: similiter paulatim hinc inde comprimendo, donec pinguedo exeat, desuper deinde apponit pannum aceto intinctum & aqua falsa. Si totum extrahi non possit; Tharantanus ut residuum consumatur, apponit puluerem affridillorum, vel vnguentum apostolorum; & postea cum triapharmaco vel diapalma consolidat. Quo modo manu vel compressione curetur, vide Auic. lib. 3. sen. 3. tract. 3. cap. 19. Huc spectant ganglia, atheromata, steatonia, & faui genarum, extra genas seu palpebras, teste Aetio, Ganglion enim nerui contritio est: curatur ceratis & malagmatis, & fomento aqua calida. Fauis vero paruaque steatomata, & atheromata, nonnunquam curantur, si fastigiis corum adurens medicamentum applicent, donec adiacens cutis vsque ad profundum incrustetur: deinde post crustæ casum spicillo cyathisci tuni- cula humorem continens excidatur: quæ si nequeat, subscripto medicamento putrefiat: Recipe smidracibæ 3 ij. auri pigmenti 3 j. squame aris, elaterij ana 3 ij. ellebori nigri 3 j. chara vsta quantum ad color indurum suffecerit, confice & vires cum rosaceo. Quæ vero super excesserint, curabuntur chirurgia; quemadmodum in reliquo fieri consuevit, ad ba-

lib. 7. c. 81.
De gangliis
atheromatibus
& fauibus
genarum.

5

sim excidendo simul cum tunica humorem continente, postea labijs futura coniunctis medebimur, sicuti cæteris vlceribus quæ suntur: obseruandumque in chirurgia, ne fasciola cutis incidenda late incidatur, alioqui leporini oculi efficiuntur. Lagophthalmi secundum eundem dicuntur, & Paulum; qui reuulsa superiori genæ oculo aperto sicuti lepores dormiunt: generaturque effectus is quandoque ob futuram, quæ genæ plus æquo retrahitur, ita ut oculus contegi nequeat: quandoque ob vlcus spontaneum, quod præcesserit veluti carbones. Et iuxta Paulum ori- tur hoc vitium, aut naturaliter, aut ex cicatrice vulneris, & vel sua sponte fit, vel ex futura vel vitione. Quo modo per chirurgiam curetur, vide eosdem. Præterea quomodo futura palpebrarum sit administranda, docet Aëtius ex Leonita lib. 7. cap. 69. tubet idem ne varices genarum curemus, sunt enim maleficæ, inquit lib. 7. c. 83. neque curabimus earundem appendices tumidas, dolentes, multas subrubras, & in se ipsas pressu digitorum redeuntibus, quoniam hæc quoque maleficæ sunt & insanabiles. Huc forte etiam spectat separatio palpebrarum, quæ aliquando à natiuitate (ut Gordonius refert) modo postea oboritur, ob vulnera male curata, ut iam dictum est; vel ob excrecentiam carnis; & similia; aut inanitionem, spasmus, vel resolutionem musculorum mouentium palpebras, à natiuitate non curatur. Si ob vlcera, vulnera, aut ob excrecentiam carnis, curentur illa prius: si ob spasmus ex inanitione vel aliter, humectetur totum corpus cibis, balneis; & fomentetur caput, oculus cum humectantibus. Si ob repletionem ex spasmu, curetur, ut de spasmu ex repletionem dictum est, corpore prius repurgato. Si ex mollificatione musculorum, purgetur caput, ut de paralyti dictum, & desuper ponatur exsiccantia, & roborantia. Palpebræ etiam contrahuntur, ut oculus non rectè cooperire possint; Auicenna vocat palpebræ inuersionem, cuius causa praua species est, ut non cooperiat album oculi inferius, ut superior non cooperiat inferiorem: Et hæc ad lagophthalmiam pertinet à natiuitate non curantur, nisi forte in infantia, easdem causas, tum curationes Tharantanus refert; quas de separatione iam diximus.

OBSERVATIO XLIV.

De difficultate aperiendi & claudendi oculum cum inflatione palpebrarum.

Iuuenis cum ophthalmia afficeretur, & oculos aperire non posset, palpebrasque inflatas & nonnihil inflammatas haberet; huic lecta venæ, & aliis vniuersalibus remediis adhibitis fotus præscriptus est, ex decocto folior. malux & hordei mundati, quo frequenter spongia immersa tepide oculos, tum palpebras fouebat, donec aperirentur. Alter quoque cum præ siccitate & crassissimis humoribus viscosis palpebras aperire non posset, aqua tepida spongia imbuta cum frequenter oculos fomentasset, rectè deinde palpebras aperire potuit.

SCHOLIA.

Oculi difficulter aperiuntur ob multas causas, vel ob siccitatem, vel ob humores crassos, viscosos, vel ob inflationem atque tumorem claudendi palpebrarum vel ob conglutinationem, quamvis Tharantanus

Tharantanus seorsim tractat de difficultate aperiendi & claudendi oculum, quod vitium gesse appellat. De inflatione quoque palpebrarum seorsim scribit: ita & de conglutinatione. Si vero materia sit crassa, viscosa, digeratur & purgetur. Si calida, subtilis, biliosa, ea purgetur cum myrob. citris vel aliis: fiatque vena sectio, si adit repletio, ut de ophthalmia dictum est, & spongia aqua intincta frequenter super oculum ponatur: vel albumen oui cum aqua ros. Si sit materia multa & crassa, fiat fotus ex decocto seminis lini, fenugreci, cum lacte muliebri, vel mucilago ab his extracta apponatur, vel adiecta & oleo ros. fiat linimentum pro palpebris: dolorem remouet, etiam adipe gallinæ adiecta vel sola. Si palpebræ inflantur vel tument, quod multis modis fieri potest, ob materiam subtilem vel vaporem in his contentum, vel ex causis internis, aliquando ex debilitate coctionis, ut in Hydrops vel cachexia, quod malum pertinere posset ad illud, quod Empyema appellat Paulus, & palpebræ tumor est, cedemati similis, & plerumque ex abundantia picuitæ fit. Fit etiam ob apostematata phlegmatia, vel humida, vel ob lethargum; vel alia calidiora, ob ophthalmiam: contingit etiam aliquando in conualescentibus, in quibus recidua expectatur, vel hydrops ob debilitatem coctionis. Fit quoque in flatu à causis externis primitiuis, ex percussione, pugno, baculo & similibus, ex punctura araneæ, apis, vel vespe, vel nimia frictione cum herbis, vrtica, ruta, laureola, tithymallo, persicaria & similibus oculis admotis; similiter ob superfluas vigilias, aut somnum prolixiorum: & ideo curatio varia existit, pro causarum varietate. Si itaque propter causas intrinsecas, ob vigiliam, nimium somnum, lethargum, suberth, hydropem, cachexiam; curentur illa ut in propriis locis habetur, adhibeantur fotus resolutiones, præterquam in vigilia; in qua & somnus promouetur, in somno vero vigilia inducatur: si ita propter causas internas corpus euacuetur. Si ab apostematibus, eadem curentur & remoueantur. Si abscessus palpebrarum aut genarum in causa sint, vel etiam veniant sine inflatione ut qui abscessus: & si interiores quidem genarum partes inuertendæ, secundæque sunt, humor exprimendus; deinde muria infundenda lanæque ouo madefacta superliganda. Postridie foueri oportet, & melle illini & reliquam mordicationem astringenti collyrij infusione perficere. Exterioribus vero partibus si eueniant, post sectionem humidique expressionem linimenta melle illita imponemus, lanæque alligabimus. Abscessus autem qui genarum cartilaginem simul corruperint, si exterius quidem contigerint, fieri potest ut ouo & melle purgentur; deinde cum medicamento incarnentur, quod aridum cephalicon vocant. Sin locum intrinsecum occupauerint, partem cartilaginis denudatam circumrademus, atque contritissimò arte inspergemus: in tertia mel illinemus, postea astringentibus collyriis vtamur. Si vero inflatio palpebrarum fiat ob causas externas, propter percussione, & adit rubor in oculo & palpebræ inflatio, curetur ut ophthalmia ex percussione, albumen oui cum aqua rosacea in oculum ponatur: & post triduum fiat resolutio cum faculis chamomillæ in vino bullitis, vel decocto chamomillæ, meliloti, anisi, cumini, vel aliis, modo etiam frigidioribus, si adit simul inflammatio. Si à vespa, ape, aculeo remoto lanina ferrea desuper ponatur, donec dolor, &

punctura euanescat: deinde resolutiua ad tumorem dicta apponantur. Si ex aranea punctura aut alterius animalis venenosi; theriaca vel mithridatum cum sale gemmæ: si ob contactum ruta vel aliarum herbarum seu rerum calidarum, apponatur oleum ros. cum albumine oui; vel succus sempervivæ, plantaginis, & oui albumen concussum; vel panno inculcato apponantur, & facies tum palpebræ populeo inungantur. Si palpebræ vero conglutinantur & inuisantur, abluatur oculi inprimis aqua decoctionis feniculi, cumini & salis, & imponatur medicamen de fenugræco, semine lini, aloë & sarcocolla, & si ex his non separentur ad manum chirurgicam, ut postea dicemus, recurrendum. Conglutinantur (inquit Tharantanus) interdum vna palpebra cum alia, & subinde cum vno oculo incarnatur, & aliquando contingit post vngula incisionem seu panniculi sebel dicti, vel aditæ carnis in lachrymali: quando intus medicina ibidem dicta non ponuntur. Genæ (inquit Aëtius) albo oculi vel nigro, vel sibi inuicem conglutinantur vel vlcere præcedente. Quando vero albo agglutinantur, hunc affectum ancylosin vocant. Quæ igitur agglutinationes vtriusque genæ in angulo factæ fuerint, eas vossella extendi discicarique oportet, ac linimento separari, deinde ut reliqua vlcera curari. Si vero genarum extrema cum tunica oculi glutinentur, hamulo quem cœcum vocant genæ externa, glutinationem scalpello incidemus, deinde carnis excrecentias arido quopiam contrahemus, atque ac contritissimum genis ipsis sublineamus vsque ad exactam curationem, obseruando ne oculis illigetur. Habes etiam apud Paulum, quibus palpebræ commissæ manu curentur. Et apud Valescum cap. de conglutinatione palpebrarum. Gordonius post incisionem iubet lauare aqua salis & cumini panno lineo in medio imposito, & emplastro de vitellis oui cum oleo ros. desuper appposito & ligato. Tharantanus aquam decoct. fenic. & cumini instillat, vel pannum lineum mollem albumine oui madefactum post debitam incisionem vel penna separatam interponit, ne de nouo conglutinentur; & omni die hos inuist: post quartum si carnositas aliqua ibidem remaneat, intus aliquid cap. de panno ex distis collyriis ponit: vel viride dictum, donec in totum euanescat superfluum.

OBSERVATIO XLV.

De hordeolo palpebrarum.

Crithe, paruulum, inquit Paulus, abscessus tuberculum, oblongum palpebræ cilio obuenit: res enim Græcis hordeum dicitur: item tuberculum in palpebra nascens ad eius similitudinem, hordeolum vulgo appellatur, vulgares etiam suo idiomate een styge vocant. Id quidem cera alba foueri oportet, vel hordeo diluto perfundi. Matrona quædam in palpebra dextri oculi versus lachrymale hordeolum habebat: de quo abigendo cum me consuleret; purgatione præmissa cum pilulis cochii, aureis & lucis, à sectione venæ abstinuimus ob hyemem: consuluimus ut adipe gallinæ calida liniret, & oculum saepe foveret aqua calida decoctionis hordei & camomillæ: postea cum sanguine columbi, vel perdicis aut turturis etiam liniret. Verum cum axungiam gallinæ nec taponis ferret, cum quandam falsedinem in oculis se sentire diceret, sub noctem hordeolum cernis colluebat, & mane salina ie-

Palpebræ
inflationes
quomodo
curentur &
causis exte-
nis obortæ.

Gordonius
de congluti-
natione &
inuisatione
palpebrarum.

Lib. 7. c. 76.
de genarum
agglutina-
tione quam
trophosin æt
ancylosin
vocant.

Lib. 6. c. 12.

iena inungebat: quo remedio cessabat falsedo, quam ex adipe caponis contractam existimabat: existimo axungiam prius lotam aqua rosac. falsedine amota melius hordeolum curare. At nostra matrona continuando lotionem ceruicis, & mane inungendo cum propria salina, ab hac molestia sanata fuit.

S C H O L I A.

Lib. 7. c. 81.
de Hordeolo
genarum.

Hordeolum appellamus (inquit Aetius) quando in gena prope palpebras, potissime exterius, contingit suppuratum quoddam tuberculum figura hordei grano simile: quod facile curabis si fomento ceræ candidæ super nucleo specilli calefacto materiam discories; aut abscesso capite muscæ reliquo corpore hordeolum fricabis. Vel galbanum cum modico nitri subactum, vel sagapenum ex aceto tritum appones; quod etiam ad grandines facit. Locus quoque spongia & calido pane fouendus est, ac post humidi excretionem melle inungendus est: deinde ad collyria vlcera accedendum. Hinc Fernellius inquit, Tuberculum calidum est in abscessum fere desinens, quod è palpebra margine atque cilio prorumpit. Quo cum ego aliquando laborarem, sed paulo duriore grandinis instar, tamen similitudinem habente cum hordeo; simul aderat rubedo quædam in ciliis, quæ & hoc tandem collyrio cessauit: Recipe tuiæ præparata, saccocollæ ana ʒj. vitrioli Romani, sumach ana ʒss. puluerisata ligentur in nodulo pami linei vari, & ponantur in aqua euphrasie ros. sanic. ana ʒj. nodulo expresso vtebar pro collyrio. egregie facit ad rubedinem & pruritum palpebrarum: quibus cessantibus, pustula tamen illa dura quatuor fere mensibus mihi adhæsit: & cum postea ad abscessum tendere videretur, hoc collyrio vsus sum: ʒ. aque ros. ʒij. vitrioli ʒj. cum pruritus rursus adesset, guttula vna aut altera per diem vnum in oculum instillata, dolor ubi grandio vel hordeolum erat, ingens subsequutus est, pustulamque corripit, & dirupta est sanie exeunte; qua expressa per se consolidabatur: attamen ob calorem quem adhuc sentiebat, aqua rosacea tantum oculo instillata & palpebris ac ciliis præsertim lotis, paulatim cessauit rubedo & calor: quamquam sæpe idem malum reuertitur, si qui eo prius laborauerint, ut experientia quotidianam vidimus; quod & mihi post tres menses rursus contigit, facta defluxione grandinem seu hordeolum rursus in ciliis cum rubedine & inflammatione passus sum: & cum remedia iam dicta quibus multos curaueram, me ipsum non iuuarent, collyrio vsus sum ex sola aqua ros. & pauca aloë: quo quidem cessauit rubedo, inflammatio & pruritus: quamuis plurimi hoc remedio ab hordeolo curati, mihi tamen durities permansit, licet liquore albi oui cum aqua ros. dolor & calor leuarentur: atque hoc modo fluxio cessauit. Tandem, ad exsiccationem & deterfionem, etiam aqua rosac. & vino partibus æqualibus pro collyrio vtebar, at cum durior euassisset grandinis instar vel lithiasis, axungia caponis vtebar ad maturationem: sed cum oculo falsedinem ex ea contractam ferre non posset, & calor ac pruritus accederet; rursus ab eo remedio abstiniui, & sola salina ieiuna mane cilia abluebam: sub noctem dormiturus hordeum masticabam cum salina miscens, & oculo ac ciliis per totam noctem applicabam: qua masticatione tandem hordeolo maturato, perruptum est, deinde curatum: & quia postea adhuc rubedo & calor permancebant, vsus sum collyrio descripto prius de ophthalmia non

vera (quod incipit: Recipe ceruicæ lotæ ʒj. &c.) cum aqua rosacea soluto & instillato: per intervalla tamen opij dosi minorata, eo quod catarrho obnoxius essem. Anno 1566, cum vitia oculorum & palpebrarum passim multos apprehendebant, hoc modo ab eiusmodi molestiis curati sunt. In terea cum Grandines magnam similitudinem habeant cum hordeolo; tamen quia parum aut nihil differunt (quamvis hordeolum esse volunt tumorem vel apostema exiguum magis molle & variabile, saltem ante eius durationem, & grandinem in se complexi magis materiam induram, petrosam & quasi in lapidem conuersam,) ideo seorsim de vna quaque hac passione tractant, ut apud Tharantano videre licet: quamuis eadem fere sit curatio, quod ad emollientia & resolutia; licet grandinem si non emolliatur & resoluatur, chirurgi etiam sanent. Ut Aëtius quoque testatur; sic inquit: Quandoque si palpebra inuertatur, supereminet rotunda & translucida quædam tubercula speciem grandinis imitantia. Quod si medicamentis ad grandines uti volueris, ista eligito: ʒ. pollinis tritici ʒij. sulph. vini ʒj. cum aqua subigito, ac pastillos confice & vtere. conferunt & quæ ad hordeolum scripta sunt. Si neque hoc modo curantur, dissectis effluit humor albumini oui similis: quomodo sectio fieri debeat, idem docet, & quid post sectionem faciendum. Huic vitio haud dissimile est, ab eodem lithiasis genarum appellata, quando inuertis genis existunt quædam tophis simillina in speciem varorum candida & aspera. Idem lithiasim manu curat, ut apud eundem videre licet lib. 7. c. 79. De lithiasis genarum: quam operationem nunc præterimus, cum ea ipsis chirurgis sit committenda. Præterea quoque adhuc quædam vitia oboriuntur, teste Celsus, quæ vesicæ appellantur, pingues & admodum graues, maxime in palpebris puerorum, de quo malo neoterici videntur tractasse sub nomine pinguedinis palpebrarum; quod malum etiam diximus vocari ex Tharantano Asarnac vel arnasac apud Arabes: cuius signa & curationem etiam ponit Auicenna lib. 3. fen. 3. tractat. 3. cap. 17. 18. & 19. Huc etiam spectat apostema durum in palpebra, cuius meminit Gordionius particula terribis rubrica 10. inquit. Aliquando apostema durum, in beum in palpebra: postea denigratur & aspectus turpe est. Repurgetur corpus sectione venæ & pharmaco, & repercutiatur materia cum acacia & bolo arm. & succo plantaginis, deinde abluatur cum aqua & aceto: Postea malaxetur cera cum oleo chamomill. & desuper apponatur. Iam & verrucæ palpebris innascentur duræ & sicæ ex melancholia; purgetur melancholia: alia sine duritie rubræ & mori instar ex sanguine; quos & venæ sectio iuuat. Remouendæ, cum lacte ficus, cum farina tritici pisto, vel lacte tithimalli mixto cum farina hordei. Vel constringatur cum pilo equino, vel absindatur, deinde locus cauterifetur. Palpebrarum verrucis, & in maiori angulo euphathidibus appellatis, palpebras parum deduci patientibus, inquit Paulus, lib. 6. c. 17. vultella præhensis, scalpelloque amputatis chalcididem leuigatam imponemus.

OBSERVATIO XLVI.

De Phthirasi & Madarosi palpebrarum.

Pedicularis morbus, qui à Græcis ob oculum dicitur, ab aliis pediculario, non solum in capite, verum etiam in toto corpore fieri potest, ut scholio obs. 14. lib. 8. diximus. Verum hæc ipsa affectio similiter

similiter in palpebris & ciliis fieri potest; quem admodum & lentes, ut constat apud Aetium lib. 7. c. 69. De pediculis palpebrarum & lenticulis. Pediculi (inquit) in palpebris generantur, lati, pusilli, multi, ab ingluvie, stridibus, & piano vultu trahentes originem. Ita iuuenis quidam non solum pediculos communiter & lentes habebat in palpebris, sed latos cum longis pedibus, quales etiam nos diximus antea circa pectinem aut barbam generari, pilorum radicibus palpebræ inhærebant (ut etiam quibusdam militibus euenire solet, qui curam corporis non habent, neque habentis vultum aut sudorem abstergant:) Ut autem palpebras lauaret iussimus, cum aqua marina salata, vel muria, & aqua decoctionis betæ, staphidis ægriæ: & linimento ex alumine, staphidis ægriæ, & melle, palpebræ illinantur, aloës, myrrhæ æqualib. partibus tritis cum lardo mixtis fiat inunctio. Quum durum coctum abiecto vitello, albumen in aceto optimi vini albi per sex horas dimittatur, demum ab eo extrahatur: sub noctem supra oculos ponatur, ac tota nocte dimitatur, mane remouendo etiam pediculi eidem inhærentes remouebantur. Verum alteri, qui madarosi, hoc est, deflusio pilorum in ciliis atque superciliis laborabat, repurgato corpore, ut hoc vnguentum palpebras liniret, præcepi: Recipe stercoris leporini, & stercoris hircini, an. ʒj. corticum ouellana, adustorum ʒij. pinguedinis vrsi, vel si desit caprine q. s. f. vnguentum. Auellana enim adusta, & cum adipe vrsina vel caprina incorporata nasci facit pilos, & eos denigrat, quibus remediis etiam puellas hoc malo affectas curauimus.

S C H O L I A.

De pediculorum ortu, causis satis luculenter diximus libro octauo & de eorundem curatione egimus: verum cum etiam generentur in palpebris & ciliis, auctores de iisdem seorsim scribunt: ita Paulus, expurgatis prius pediculis, mamento egelida palpebras colluit, deinde medicamento subscripto cilium attingit: aluminis fassii partibus duabus, herba pedicularia parte vna, tritis vititur. Pediculis primo diligenter extersis, idem præscribit fere Aëtius ad pediculos & lentes, adhibita quoque bona victus ratione, quæ bonum succum asferat. Neoterici & qui Auicennam sequuntur, ut Gordionius & Tharantano; putant materiam & antecedentem digerunt: purgant totum corpus, & præcipue caput: deinde lotiones, linimenta præscribunt ad pediculos: quale hoc est Aetij, quod habet aluminis fassii ʒij. vnae taminæe obolum vnum piperis duos, & vrsi ʒss. ʒj. myrrhæ, duos obolos lapidis fassii tritolum, melle confice, cum aceto scyllino: potest etiam puella conficere, cum aceto scyllino: loco cui inhærent pediculi extrahere. Ad madarosin vero, nempe pilorum palpebræ defluuium, cura prius vniuersi corporis habita: Paulus vititur smegmatis, quibus ab hostandis palpebris nomen est Calliblephara. Terræ ampelicitidis, croci gallarum ladani ana pari portione contrita vititur. Vel stimmeos tosti lotique ʒj. plumbi combustii & eloti ʒij. croci rotidem, nardi indicæ ʒij. in puluerem redactis vititur. Vel palmarum ossium combustorum ʒij. nardi gallicæ ʒij. lenigatis vititur: hoc etiam scabiosis oculis medetur. Aliud Neapolita ad palpebrarum defluuium (quod quædam stimmeos cadmiæ, chalcididis, misyos, ana pares portiones, minutim contendantur, & melle vespertillæ torrefiant: lenigata vsui sunt. Quamuis plusquam satis de pro-


fluuiis & casu pilorum diximus libro 7. quæ in barba & capite, tum aliis corporis partibus eueniunt; sciendum, quod etiam casus pilorum fit in palpebris & ciliis ob materiam acutam nitrosam in palpebris contentam, modo truncantur, etiam cadunt ob materiæ priuationem; etiam ob corruptionem, ut in lue gallica, ut sæpe etiam in nobilibus matronis conspeximus, quæ supercilia glabra omnino haberent: & ita causa defluuii pilorum in superciliis, palpebris, vel ciliis potest esse crassities palpebrarum ab Arabibus silach dicta, & propter glabritiem, ut auicenna ex Aetio retulimus, ob acrem destillationem contingentem; vel ob ptilosism cum palpebræ crassescunt callumque obducunt: simul ex duritie & ariditate, vel ex scabie aut vlcibus palpebrarum. De quibus omnibus satis dictum est: & ad horum curationes recurrendum. Si itaque contingat ob materiam acutam rodentem & nitrosam, ea ipsa prius euacuetur, ut de pruritu tum scabie dictum est. Si propter alias iam dictas aegritudines, ut crassitiem, pruritum & ruborem, ob glabritiem, ptilosism, curentur illæ prius; & bonam victus rationem teneat. Habes egregia veterum remedia ad glabritiem & ptilosism apud Aëtium loco citato, ad ptilosism & palpebras erosas, & ad milphoses affectusque diuturnos. Si est ex crassitie palpebrarum aut humoris materia prius expurgata hoc medicamine locus inungatur: Recipe nardi, stercoris muris, ladani, osian dactylorum vstorum, stercoris hircinis ana ʒj. confice cum melle. Si absit rubedo, Gordionius illinit cum malo granato integro cocto, vel apponit: Auicenna coquit in aceto, & liquore expresso illinit palpebras: quod præcipue valet si vna cum deflusio pilorum palpebrarum adsit rubedo, pruritus, & corrosio palpebrarum. Si fiat ex defectu materiæ pilorum, humectetur corpus, caput & oculus, & calida attractiua imponatur, & resiciantur: si ex lue gallica, curetur eo modo ut de alopecia ex lue gallica diximus lib. 8. Iam & pilis palpebrarum, ciliorum, multa alia vitia oboriri possunt: quale illud est, ut pili inuerti oculum irritantes molestia hominem afficiant, & visum impendant: cum enim inuertuntur versus oculi substantiam, oculum ipsum pungunt & lachrymari faciunt; & in eorubedinem inducunt ratione frictionis. Nam aliquando extra aciem ciliorum vel ordinem versus interius, aliquando ab acie in longum non protenduntur, sed versus oculum reuertantur; aliquando multiplicantur & sunt plures quam sit necesse. Quando pili palpebrarum inuertuntur, & oculum irritant & pungunt, hæc passio à Paulo & Græcis vocatur *rephras* *rephras*. Pilis qui oculum pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ inungitur, iuxta Paulum; vel cum cinere chamaeleontis albi: vel sanguis cinicium, vel fumarie quæ in hordeo nascitur succus cum gummi; vel muscæ caninæ sanguis admodum ad id efficax est. Plus itaque qui inuersione sua oculo nocet, euellatur; & si iterum enascitur, dento euellatur, & sanguine pediculi vel vespertilionis inungatur, aut ouis formicarum contritis. Vel locus euulsus acu ardente cauterifetur; deinde inungatur locus oleo ros. & oui albumine, vel pilis circa radicem per acum, siue eius foramen deductus, in rectum ordinem deducatur, alij id faciunt per incisionem eius secunda rugas in longum. Sed omnibus leuior est euulsio pili, magisque secuta. Solet præterea & hispiditas in genis euenire, & pili deprauato ordine innasci; ut Aëtius lib. 7. cap. 66. meminit, sic scribens: Hispiditatem dicimus, quando sub ipsis natur

Aetius li. 7. c. 66. De hispiditate genarum & depravato pilorum ordine, phalangosi & distachiasi.

valibus genarum pilis non suboriuntur, qui interius ver-
gentes pungunt tunicas, & oculorum defluxus provocant:
idem cum superiori malum esse videtur. Dicitur etiam
iuxta eundem hispiditas, quando genae relaxantur; vel
quando palpebrae ita introsum declinant, ut pili haud fa-
cile appareant, nisi extensis diductis genis. Medici vero
isfarum genarum relaxationem phalangosim seu casum
appellam; pilorum vero suborientem propaginem dista-
chiasim, id est, ordinis praunitatem. Eueniunt hi morbi, ac
praecipue ordinis praunitas, ob humoris redundantiā; si-
cuti etiam tellus aquarum copia plurimas herbas produ-
cit, quod quidem facilius fiet, si defluens humor sine ero-
sione fuerit: si enim illi salsedo inerat, pilos etiam natura-
les eradicabit: perfecta ergo asperitatis curatio est gena-
rum consuetio. Quoniam vero nonnulli ob molitiem animi
se chirurgico praestare non tolerant, his succurrendum est
eo modo quo possimus. Talia itaque praesidia ad hunc
morbum antiqui tradiderunt. Haecenus Aetius qui-

bus deinde addit medicamenta ne pili euulsi res-
nascantur cap. subsequenti nempe 77. lib. 7. quod
perlegere poteritis. Fraetios interius praeter na-
turam palpebrarum pilos, mastiche calido spi-
cillo illita glutinat, in pristinumque ordinem re-
digit. Idem praestat, iuxta eundem & Paulum, bitu-
men, mastiche, color bonia, gummi, cochlear pars
men, mastiche, color bonia, gummi, cochlear pars
glutinosa. Et ita absoluius omnes affectus oculi
lorum & palpebrarum: in quibus curandis, ut per
Aetium, veteres multo diligentiores fuerunt, quam
quam nostri neoterici, tam ex variis compo-
sitionibus collyriorum, quam aliorum praesidio-
rum, quorum latissimum campum lib. 7. apud eun-
dem inuenies: quae a veteribus desumptae, & li-
bro suo inseruit ad omnia vitia oculorum & pal-
pebrarum, genarum ac ciliorum pertinentia.
Quamobrem hoc libro absoluto, nunc ad au-
rium mala transeamus.

Libri undecimi finis.



OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber duodecimus.

DE AVRIVM MORBIS.

OBSERVATIO I.

De auri dolore intensissimo.



UAM ingens malum sit auri dolor, experientia quotidiana con-
stat, adeo enim aliquando excedit
ut hominem illico e medio tol-
lat, aut lipothymiam, conuulsio-
nem, deinde subitanam mor-
tem inferat, quod equidem famulo ceruicarij
cuiusdam Delfensis contingit; qui cum tribus
mensibus dolore auri conficeretur, ac in lipothy-
miam incidisset, deinde in phrenitidem & conu-
ulsionem (cum antea varijs empiricorum remedijs
usus esset, & me prius in mortis auge vocaret,) ante-
quam remedia parata applicari possent, post
phrenitidem illico conuulsus periit. At mulier
illa Maria nomine, patris Divae Barbarae soror,
duabus integris septimanis dolorem insignem in
aure sinistra cum perpessa esset, una cum dentium
dolore eiusdem lateris totam maxillam occupan-
te, ita ut neque dormire neque comedere ob do-
lorem acutissimum & intolerabilem posset; va-
rijs muliercularum & empiricorum medicamen-
tis cum vsa esset, postremo (ut apud nos fere fieri
solet) me vocavit: pilulis cochiis & aureis cum il-
lam purgassent, & cucurbitulas scapulis cum sca-
rificatione, & ventosam in nucha apposuisse,
hoc cataplasmate sequenti imposito miraculi in-
staur ab omni dolore liberata est: 2℥. cape vnum sub
cineribus feruentibus decoctum, olei chamomellini ʒi. B.
butyri recentis, olei anethini an. ʒ. B. croci ʒ. j. confusa
emplasivri modo auri sinistra apposta sunt.

SCHOLIA.

HAecenus de oculorum morbis dictum est; at
nunc non minor aurium subit cura; quarum

usum proximum a luminibus naturae humane
Deus largitus est: quo sern onis gratia ac intel-
ligendi vis omnis constat. Vicia enim, quae dixi-
mus oculorum, ipsos tantummodo laedunt: At, auri
sordi, ab infantia praesertim, rationem & loquen-
di usum non admittunt, sed pecorum more blas-
terant: unde animi explanatio, quae nos a feris dis-
tinguit, magno naturae incommodo tollitur: &
quod deterius est, in earum vitis maius pericu-
lum est, ex quarum inflammatione, ac dolore de-
mentes saepe periclitantur multi; alij intereunt,
ut huic famulo euenit: nam & animi deliquit,
deliria, febresque acutas, & mortem, teste Hippo-
crate, ob consensum, quem cum cerebro habent,
inferunt. Afficitur auditus membranis laevis, quae
de facili laeduntur, frigore, vento, aqua, bestiola-
rum ingressu; argento viuo periclitari hominem
certum est: ea intrinsecus eueniunt. Ex humori-
bus aurium inflammationes, doloresque oriun-
tur: ulcera sordida, fistulae, purulentiaeque innas-
cuntur, & graecolentia sentitur, sonitus incerti,
tinnitus, murmurque, auditus grauis, tarditas
surditasque percipiuntur: verminosa & aures
fiunt; sub ipsisque auribus p. rotides oriuntur.
Habent autem aurium affectus minus promptam
& facilem curationem, tum ob ipsius situm & si-
g. ram organi, quae partes praecipuas habet admo-
dum absconditas, ut aegre illis remedia adhibean-
tur. Praeterea quo ingenio, qua dexteritate, quam
blande tractari debeant, hi sciunt, qui non erunt,
quam acri sensu particula praedita sit, & quam
mollis laedique facilis. Quare praeter ceteris in hac
cura laborandum nobis est, ut feliciter procedat.
Primum itaque de dolore auri agemus, & de do-
lorosis affectibus, qui dolorem inferunt. Dicitur
autem Graecis *auritis*; Latinis *aurium dolor*: estque
trifilis ac molesta auri sensatio a contraria impi-
pente ac violenter simul, & vehementer impi-
mente

mente facta. Cuius species enumerantur potissi-
mum quinque: dolor punctior, stimulus, tensus,
gravis, & pulsivus; quamvis & aliae species dolo-
rum recenscantur, de quibus videas Galen. 2. de
loc. affect. & 3. ca. 7. De quibus & vide Arcula-
num, 9. ad Almazorem; & de speciebus dolorum
fusus tractavit Montanus Lectione 2. supra 1. ca-
pit. de Cephaea in Ichusum. Meatus vero audiendi
ubi nervo dilatato coniungitur, proprium ac pri-
mum est audiendi instrumentum; ceterae autem
earum partes eidem usum praestant, ut i. de caus.
symp. liquet. Et licet haec affectio nomen sumpse-
rit cum ab affectu ipso, tum a parte affecta, (cum
dolor hic in evidentibus auribus infestare pos-
sit, nec minus in profundo auditorij meatus non
longe a cerebro existens; qui proprie a veteri-
bus aurium dolor appellari solet, teste Galen. 3.
progn.) aurium tamen dolorem dicimus in quacun-
que parte iam dicta est quavis causa oriatur:
namquam potissimum de eo, qui in profundo sit.
At nunquid sola circa meatum cutis, seu eviden-
tes auriculae affecta sint, vel ipse auditorius me-
tus in profundo; ex ipso doloris sensu, tum etiam
ex eiusdem vehementia discere licebit; vehemen-
tior namque erit si in profundo fiat, ut eodem 3.
progn. patet. Quis sit affectus dolor, de capitis do-
lore satis dictum est. Hic dolor insuper insequi-
tur non aliter, quam ceteri ad earundem aurium
inaequalem intemperiem, interdum ad solutio-
nem continui earundem; aut utroque modo af-
fecta sint pro diversitate causarum, quae earun-
dem aurium dolores excitare solent: quas omnes
Galen. 3. de compos. medicam. secundum locos
conscriptis, docuitque simul modum dignoscendi
eas, a quo ceteri auctores Graeci, Paulus Aegine-
ta, Aetius, Alexander ceperunt. Auribus itaque
acris sensus a natura datus, descendente nervo a
quinta coniugatione, cum dura meninge, si quoque
atque disperso in meatum auditorium; ideo levi
quoque de causa afficitur. Et causa dolorum in
genere sunt intemperies, morbus instrumentalis,
solutio continui: particulatim refrigeratio, cale-
factio, densatio, obstructio, spiritus flatulentus,
humor crudus, frigidus & viscidus illic inclusus,
humor mordax, sanies acris, inflammatio, tum
propaginis membranae; tum nervi auditorij vl-
tus. Intemperies itaque tam calida quam frigida,
cum materiae adventu & sine ea dolorem infe-
runt. Soluta vero contiguitas sit aut a flatu ex-
tendente, aut ab humore corrodente, siue putre-
faciente, aut ab aliquo tumore, abscessu vel in-
flammatione. Rursus hic dolor aut sit primario
affectu, vel in auri cartilagine, aut in meatu, aut
in auditorio nervo. Per consensum aut a toto, ut
per crissim, per febres, aut a parte, ut a capite, cere-
bro per defluxionem vel ut alij addunt, a stomacho
vel utero. Sed haec exemplis lucidiora evadent.

OBSERVATIO II.

De aurium dolore ex frigore contracto.

Vir senex cum tempore frigido, niuoso, ven-
toso, in hyeme curru ab Hagha-Comitis
Alcarniam in litore circa Oceanum veheretur,
in aure sinistra, cum ea parte magis ad mare sede-
ret, insigni dolore correptus est. Ad quem acci-
piationem, & alte agrum infestaret; etiam ex
praegressis causis facile intellexi simplex malum
esse, & dolorem ex nuda intemperie frigida a ven-
to & frigore circa mare contractum, cum neque
Pet. Forest. Tom. 2.

capitis dolor adesset, neque grauitas. Primum
itaque causam externam, si adest, tollere oportet,
ut in frigida, ventos & externum aërem cauere.
Verum cum iam se in domum propriam recepisset,
ut in cubili calido permaneret praecipi, & si
domo ob alias causas egredi necesse esset, impe-
raui, ut meatus aurium praemuniret bombice oc-
clusa. Deinde cum intemperies frigida concalsa-
rienda esset (dolores enim a frigidiore obortos calsa-
rienda medicamenta quam celeberrime curant, Galeno
auctore 3. de compos. medicam. secundum locos:) oleo
itaque rutaceo & amygd. amar. lanæ molliori
imbutis, atque tepide per aurem gutta una atque
altera infusa, deinde ut dolens auri cotone clau-
deretur, ut vocant, muscato, iussu, & ut pileolis
consuetis omnino via ad aures frigori praeclude-
retur. Capam quoque rubram sub cineribus mo-
derate calefactam excauatam & oleo irino imple-
tam accipiebam, eiusque mixtura expressa leuiter
in aures stillabam, quibus tandem praesidiis do-
lor sedatus est.

SCHOLIA.

Cum varia causa sint quae auribus dolorem
inferunt, diligenter indaganda sunt; cum si-
ne harum cognitione recte curare non possumus: sicut
nam sicuti intemperies frigida sine materia facile
ex praegressis causis, nempe peregrinationibus sus-
ceptis, tempore frigido, ventoso, balneis frigidis
praecedentibus, cognoscitur etiam ex agri sermo-
nibus & astantium; ita & calida intemperies,
quamvis ab externis causis frequentius frigida ad-
uenit quam in calida. Etenim non facile intensus
solis ardor aures potest afficere, ut frigus externi
acris: cum saepe a frigidissimis ventis iter facien-
tes percussamur; ita ut sua tenuitate ad ima usque
penetrent. At non aequè ut reliquum caput, solis
ardore premitur: ideo dolores capitis ab ardore
eueniunt: dolores aurium hic euenire rarius videt;
a frigore autem vidi saepissime laesos. Idem sentit
Iacchus doctissimus. Quod si quid forte cali-
dum actu, vel potestate excedens; in aurem inci-
dat, nihil obstat dolores hinc quoque excitari:
Eos, inquit, esse putamus, qui per aquas medicamentosas
natantibus eueniunt; si quando in aurium meatum inti-
mum quippiam earum incidit, breui enim excitata
earum facultate ex ardore dolor excitatur: quam-
quam & alia ratione ab eis excitari possit; cum
erodunt membranam internam, vel sua acritu-
dine naturali; vel quum ex mora acquisuerunt
putrescentes; & ita continuum solvunt. Igitur
utraque harum intemperierum dignotio facilis
est, tum ex iis quae praecesserunt, tum ex agri sen-
su, statim enim procatactica causa manifestata.
Ex frigida itaque causa praegressa ex agri aut astan-
tium sermone intelliges: praesentia quoque ex
teipso, quoniam dolor alte infestabit, fixus qui-
dem citra grauitatem; vel distensionem, vel ar-
dorem. Si ex calida intemperie dolor oriatur, ut
insolatione seu aestuatione aut ventis calidis; seu
aquis medicatis, in quibus aliqui ob delicias se
lauant, id ab astantibus quoque perdisces: nam &
dolorem feruidum sine grauitate seu tensione sen-
tient agri, ut sequens exemplum docebit.

OBSERVATIO III.

De aurium dolore ex calore contracto.

Iuuenis cum in sole capite nudato diu ambulat-
ret ventis calidis perflantibus, dolore auri cum
tentaretur.

tentaretur, consultum eidem fuit ut oleum amygdalarum amararum calidum instillaret, quo dolor magis auctus est: qui cum me accessisset, & huius mali originem intellexissem, quoque calorem in aure sine gravitate & tensione sentiret, lac tepidum muliebrem cum oui candido instillari iussi: quo remedio dolor consopiebatur. At Melchior quidam nomine, subsecretarius (ut ita dicam) apud Delfenses, cum ex dente insigniter doleret, mulierculæ consilio auri è regione dentis dolentis particulam allij imposuit: hoc quidem modo dolor dentium sedatus, sed particula allij auri inhaesit, ut extrahi non posset. Accito chirurgus qui ebrius erat, cum allium auriscalpio eximere teteret, allij particulam seu globulum allij non recentis, magis ad intimum intrusit, adeo ut sanguis etiam ex aure emanaret, dolore ingenti auri, tum calore subsequente. Dicebant autem allij odorem nocte dieque se in ore ac naribus sentire, non sine magna molestia, ut illi & somnū impediret, qui odor ab astantibus similiter percipiebatur. Cum autem ad me accederet, quæ circa illum gesta essent narrabat, & inter alia signa referebat se caliditatem igneam quandam in aure sentire, ac in toto capite, sed in aure multo magis. Ut autem hominem ab illa molestia & dolore leuarem, aurem frequenter tepide foveri iussi cum lacte muliebri & oleo rosæ, iisdem sæpe instillatis, præterea & hoc sequens instillatum, cataplasmate quoque imposito: *℞. olei amygd. dulc. ʒ. ʒ. olei ros. ʒ. ij. olei amygd. amar. ʒ. ij. mucilaginis seminis malvæ extractæ cum aqua malvæ ʒ. vj. in aurem tepide imponatur, & cum bombyce huic liquori intincta occludatur. ʒ. radice altheæ mundatæ ʒ. i. fol. malvæ, viol. meliloti an. m. ʒ. se. malvæ, altheæ an. ʒ. ij. coquantur in aqua communi pro fori; quo tepide spongia immersa & leniter expressa auris fomentetur, & reliqua cum fecibus suis pistentur, addendo farinæ hordei, farinæ seminis lini an. ʒ. ʒ. pulv. flor. chamæmell. ʒ. ij. vel p. ʒ. butyri recentis, olei amygd. dulc. an. q. s. fiat cataplasma molle: quibus remediis emollita est pars allij: atque ea amota, cum auris tepide supradictis foveretur, atque iam dictis remediis instillatis, ab illa molestia, tum dolore, curatus est.*

SCHOLIA.

Procathartica causa in utroque agro facile manifestabant dolorem à calore originem habuisse. Cum autem recens malum esset in secundo etiam agro, nihil periculi erat affixam esse materiam. Nam si protraheretur fuisset, non modo humoris aliquid affluisset, quod ex dolore coniecissemus, sed etiam ex eo quod aliquando species morbi mutetur, in utraque intemperie: nam hic cum calida esset affectio, affluente ex dolore sanguine, cum etiam chirurgus ita intrusisset allij particulam, ut sanguis ab aure emanaret, mista potuisset fieri affectio quod aliquando evenire vidimus: imo non intemperiem solum, sed apostema phlegmonode, quemadmodum & in frigida affectione, quæ vel mista fiat ex intemperie & solutione continui, quæ sit ex flatibus partis calore refrigerato. Caterum dum simplex malum est, facilis curatio erit. Primum enim causam exterram, si adest tollere oportet: ut in frigida ventos & externum frigidum aërem cauere, ut ostensum est. *Observ. 2. præcedente; & calefacientia applicare, modo per vaporatoria, per spongiā lanamque adhibere si leuior sit affectus, ita & lanam oleo de spica madentem vel rutaceo, aut de castoreo supra aurem applicabimus. Paulus lib. 3. cap. 23. uti-*

Dolor si ex
nuda intem-
perie, facile
soluitur.

Ex frigore.

tur & laurino oleo calido, vel amaracino, vel spicato, vel liquore balsami, aut oleo in quo allium aut capra incocta est. Idem facit & Aëtius libro 6. cap. 75. qui & exiguum euphorbij portunculam plurimo oleo immixtam vel piper cum oleo subactum infundit: quæ & à Galeno mutuantur. Si malum magis contumax; aliquid ex oleis prædictis infundemus, & tepide instillabimus. Materia vero varia est (ut apud Hælevium videre licet in libro 3. Galen. & alius quæ refrigerata auri conferantur) iuxta affectus magnitudinem, quam coniicimus, tum ex causa quæ præcessit magnitudine, tum ex doloris modo. Vaporatoria quoque seu fumum per infundibulum aure excipiuntur. Si ex calida intemperie, ouum crudum rosaceo subactum Galenus infundit. Arabes liquore oui tenuis subactum ex aqua rosæ, nenupharis, viol. lacte muliebri, succo parietariæ, vel cum rosaceo utuntur. Possimus etiam uti in intemperie calida & in dolore ex aqua medicatis, oui cado in aurem demisso: egregie dolorem mitigat; magisque si tepidum paulatim (ut nos fecimus) cum lacte muliebri infundatur. Interea si calida affectio sit, ex iis quæ inciderunt, primum tentare oportet, vel id quam primum educatur, ea ratione, qua omnia liquida, quæ in aurem incidunt, educi solent. Nihil autem præstantius, Aëtio teste, quam oris exsuctio ad aquam evocandam, quæ etiam per arundinem veluti per tubulum quandam exsugipotest; deinde succum capæ cum adipe instillari. Si quis etiam alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affectu capite parumper declinā saliat, aquam facile excutiet. Alij per fistulam quam penitissime iniecerant ore aquam attrahunt. Galenus, tum Aëtius quoque, si ex aqua medicata excitatus fuerit dolor circa auditorium meatum, assidue oleum infundunt, & aurem irrigant, mollique lanam fovant, deinde lana molli extergunt, rursusque instillant idem sapius repetendo: innabit & siccat spongiā, quam molliissimā immittunt, & paulo extrahunt, & rursus immittunt. Similiter, ut etiam Paulus inbet, qui aquatim immittunt, & lac muliebrem, cum quodam collyrio, quod dolorem lenit, & quæcumque ad oculorum phlegmonas usui erant, molliter refrigerantia & vim medicamenti retundentia, vel succo peredici herbarum cum modico rosaceo. Hic etiam, eodem Paulo teste, iuvabit olei usus, quod ex assellis hydryarum (*Græci ὀρεὺς καλινδύς appellant*) conficitur; quo ad dolores sedandos, præsertim à calida causa ortos, nullum est efficacius. Oportet autem eos vigentes capere, & ex oleo cum aqua coquere, quousque aqua absumatur. Paulus simpliciter in oleo videlicet dulci coquit. Galenus etiam, uti dictum est prius; oleum dulce per se ingiter infundebat. Paulus etiam oleum amygdalinum per se: vel buccina viva numero tria, in oleo decocta, mirifice proficiunt. Solet etiam in auribus incidere, non modo calculus, sed etiam vitæ trum, faba, teste Paulo & Aëtio; etiam festuca, semina siliquæ, cerasorum. Hoc quidem memini, cum duobus pueris colludentibus factum esse, cum unus lapillum cerasi in alterius aurem intruderet, qui difficulter deinde extrahi potuerit. Nam & alius puer 10. annorum cum non bene per chirurgum tractaretur, referente Matthæo de Cradigum non solum insignem dolorem perpeffus est; sed & mortem incurrat. Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt, Paulus specillum lana involutum in resinam aut gummi aut aliud quoddam glutinosum medicamentum demittendum esse scribit: idque in aurem iniiciendum, ibique vertendum est.

est, ut quæ enim sic protrahes. Si hoc modo nihil efficitur, oleum feruens meatui continuo instillato, ac si ne sic quidem inciderit aut comprehensum fuerit aliis quoque vitior modis: ut in parte chirurgica apud Paulum docetur; & apud Aëtium, Adhibent sternutamenta naribus imposita, ore ac naribus denique clausis: ita enim ob vehementem spiritus intensionem exsufflatur quod inciderat. Neque id prius desistat facere quam liberetur: si enim persisterit, auris inflammatio orietur: reliqua vide apud eisdem auctores. Pulex si in aurem caute inciderit, lanæ compressæ pessulo in specilli modum sæpe extrahatur, vel resina involuto liquida vel terebinthina, specillo, aut hamulo retuso paulum recurvato; nam & sternutamenta eadem commovent. oriculi clystere (ut tradit Celsus) aqua vehementius sicut compulsa extrahimus. Si lapillus aut semen non egreditur, abscessus, inquit Galen. vel nervorum distentiones imminuit: tum auris tota nocte amygdalino perfundenda, demum mane insequenti balneum ingredi debet ager; & laxato auris meatu, sternutamenta ellebore concitanda sunt, ore & naribus compressis, ut Galenus & Archigenes tradunt; atque ita per se quicquid inest elidit. Aquam etiam aurem ingressam, si suctu auriculari non eximatur, putrefieri tradidere: unde dolores & abscessus oriuntur: si exciderit (eo modo quo iam dictum est, apud Paulum & Aëtium, & Galenum) auditorius sensus oleo amygdalino iniectione fouetur ac recreetur. Contingit aliquando pueri decem annos nato, filio Nicolai Mentij Delfensis, quod concha exigua in littore maris reperta aurem subintraverit. Pueris enim colludentibus & eiusmodi exiguas conchas auribus admoventibus propter sonitum quem ex iis percipiebant, puer hic ita intrusit concham in aurem, ut eam extrahere non possit; & accedens fororeni natu paulo maiorem, sed iuvenulam; quæ cum spinther eximere tentaret, magis ad interiora detrusit, ut nullis instrumentis à chirurgis concha extrahi potuerit, neque medicamentis relaxantibus à me præscriptis, aut fori: ita ut per semiannum in aure remanserit, tandem humore aliquo per se ex aure emanante, cum puer ex schola domum venisset, ac de maximo auris dolore conquereretur, & concha conspici posset, eandem mater spinther recurro extraxit. Tamen post male loquebatur etiam per nares, ut vix puerum intelligerent; at sæpe infuso oleo amygd. amar. meo consilio in aurem humore cum foratit, exeunte, post quatuordecim pluresque dies optime loquebatur, & sanitati restitutus, nullo dolore in aure permanente: qui & nunc optime audit, & nihil mali sentit.

OBSERVATIO IV.

De aurium dolore à materia frigida, per modum catarrhi, cum insigni dentium dolore.

Aurium dolores non solum à nuda intemperie sunt, ut iam ostendimus; verum magna ex parte etiam materiam coniunctam habent, frigidam præcipue: quod sæpe ex defluxu à cerebro evenire solet, ubi post meridionales ventos caput replet, repente aquilo flaverit; duplici enim ratione nocet ac dolorem excitat. Primum enim intemperie, quæ afficit; sed multo magis, cum propria sua substantia distendit sensibiles partes, & rursus maxime, quando elatus ab ea flatuofus spiritus

ritus membranam, & nervosas partes ipsius internas extendit, atque conuellit; facile enim hoc iuxta Galenum artificij coniectura, causas prægressas considerando, discernemus. Ita mulier quædam Maria Adriani nomine, Delphica, annos circiter quadraginta compleas, albi coloris, pituitosa, in Autumno, frigido aëre & ventis meridionalibus flantibus, pluuiis deinde subsequenteribus, capitis fluxionem incidit, atque in partes subiectas catarrhus fluxit, & caput pituita repletum est: victu quoque humido & pituitoso cum ad tempus videret, adeo ut per duas integras septimanas intensissimo auri sinistra dolore detineretur, facta fluxione ad dentes eiusdem lateris, totam maxillam sinistram quoque occupante cum levi inflatione & duritie quadam sine rubedine, cum tanto dentium dolore ac auri sinistrae intus in meatu auditorio inhaerente, ut neque per totum illud tempus dormire neque edere posset: malo semper, cum muliercularum & empiricorum experimentis sine ratione vteretur, augefcente. Tandem cum per duas integras septimanas ita dolore conficeretur, me ad curationem vocavit. Cum autem præter causas prægressas, animaduertem frigoris sensum adesse, & simul gravitatem quandam tensioni adiunctam esse, & quod calidis magis gauderet & iuvaretur: ex fluxione frigida cum materia frigida, & ex catarrho totum hoc malum inductum esse cognovi. Quamobrem vtile duximus vniuersum corpus prius purgare, & omnem redundantiam prohibere tum totius tum capitis. Quare post syrupum de betonica & oxymel exhibitum, illam purgaui cum pilulis sequentibus. *Recipe pilular. cochiarum, assaeter, & de biera an. ʒ. j. cum aqua betonica, sicut pilulæ v. duntur sub nocte; ter quaterue alium deinde deposuit; interea victum attenuantem præscripsi, ut etiam vino abstineret & à crassiore ceruicia & eius loco ut sumeret hydromel in quo cinamomum incoctum esset. Postea rursus pilulas cochias exhibui, & cucurbitulas scapulis imponi iussi cum scarificatione, & ventosam vnam ceruici: purgato corpore, etiam capite, per pilulas dictas, ad errhina & masticatoria deuenissem, quæ proprie caput vacuant, sed non audebam iis uti quæ multum commouerent (cuiusmodi sunt quæ per nares traiciuntur), ne materia maior attraheretur, ideo potionibus potius utebar quæ pituitam absumerent & extenuarent; quales in doloribus capitis à succo frigido viscoso conuenire scripsimus: & post pilulas sumptas, & cucurbitulas appositas ad topica deuenimus, nempe olea & cataplasmata dolorem sedantia, quæ cum non satis iuvarent, emplastrum quod sequitur auri apposui, & miraculose ab omni dolore liberata est: *Recipe capam vnam rubeam satis magnam sub cineribus feruentibus coctam; adde olei chamæmell. ʒ. j. olei methini butyri recentis an. ʒ. ʒ. croci ʒ. j. ducatur in mortario ad emplastri formam, & calide auri apponatur die nocteque. Illud enim auri dolorem tollit, apostema soluit, & si ad suppurationem tendit, hoc ipso iuuatur. Sed dolor his cessauit, abscessu non subsequente.**

SCHOLIA.

Si ex frigidis glutinosis crassisque succis proritatur dolor, qui obstructione potius cum conuenit, eodem modo ut supra coniectura deprehendimus, prægressa, & præsentia percontanti: cum cibi pituitosi & mali succi, ac potus frigidiores, humidioresque præcesserint: temperamentum ac ætas frigida, similiterque anni tempus, & regio, ac

Signa doloris
ex materia
pituitosa
vel succo
frigido glutinoso.

Curatio.

Signa doloris auris à spiritu flatuoso.

Curatio.

Curatio ex flatuoso spiritu auris à gidiis succis.

10

Curatio.

11

aëris cōstitutio: capitique ac aurium gravitatem argri sentiunt. Toto itaque corpore repurgato, materia prius preparata, deinde & capite repurgato à succis frigidis glutinosis, factisque diversionibus & reuulsionibus, & cucurbitulis in ceruice & scapulis adhibitis, vitæ ratio præscribenda, ut de dolore capitis à pituita dictum est, & remedia topica eadem quæ in dolore aurium frigore præscripta sunt, his adhibenda: nisi quod debent seligi quæ detergent & attenuant, & dolorem proprie sedant, quamvis primum leuiores utendum, ne calore materia plus fluat. Verum ubi succus glutinosus in causa est, plerumque etiam adest spiritus flatuosus; quamvis & is propria signa sua habeat: uti enenit cuidam mihi admodum familiarj, qui cum supra tectū domus tempore admodum ventoso cum tegulæ perruptæ essent, nouas apponeret, insigni dolore aurium correptus est. Cum autē huic distensio adesset, gravitatem vero in capite, vel aure nentiquā perciperet, antegressa frigidity, & ventis admodū spirantibus. spiritum flatuosum & crassum transitum nō habentem doloris causam esse ratus sum, qui haud aliter quam inflammatio partes distendens dolorem excitat. Cum a. febris nulla adesset, iussu fieri euaporarium, quod nonnihil materiæ & status crassitudinem discerneret, & ipsi exitus viam aperiret; toto corpore tum capite prius repurgato: *℞. ruta, beronica, folior. lauri, meliloti, chamemill. summitatum anethi an. m. j. cimini, sem. fenugreci ana 3 ij. coquantur in aqua communi, & fiat euaporatio.* Sacculi quoque ex milio calefacto auri apponebantur. Aliqui etiam torrent in testa, & sal adiungunt; siccant enim sine morfu & discutit. Apponi quoque mandauimus emplastrum ex fenugraceo coctū in lixiuio. Nonnulli apponunt radicem agrestis cucumeris. Refert n. Paulus quod strenue conferat cucumis ex aqua calida fota, aurique demissa. Deinde imperauit, si is non cederet malū, ut fortioribus vteretur, & liquore aliquo macerata in aurem iniicerentur, & capam excaueret, & oleo repletur cavitatem, & super carbones excoqueret; & mox eo oleo vteretur. Extrinsecus quoque ad affectam partem (quod eandem vim haberet) deligaret, lanam scilicet nardino oleo vel spicato imbutam, & eam fordianā. Quibus remediis hic bene habuit. Vtuntur itaq; auctores in doloribus qui ex flatuoso spiritu aut crasso, lentoque humore fiunt; medicamentis quæ obturatione liberant, absterunt, atque incidunt, citra tamen vehementem rosionem; præferunt in quibus dolor magnus & copiar suspicio subest. Ita Paulus in ambobus vitiis, capit aphroditrum cum aceto & melle. Item fel ouillum cum oleo communi, vel amygdalino. Præterea porri & capæ succum tepidum cum melle, aut origanum cum melle & lacte muliebri instillat. Ad vehementiores aurium obstructions, fel caprillum cum succo porri indit. Verum quos amplius labor vrget, & grauis simul auditus existit, hæc quoque commode usurpat, cuiusmodi dracunculi succus est, ari, bryonia, & similia infundit, quæ strenue auxiliantur. Eadem fere habet Trall. lib. 3. c. 1. & Aëtius lib. 6. c. 77. qui & amara commendant: ut etiam Gal. 3. De compos. medicamentorum facit, quæ mordacitatem & absq; molestia expurgant meatus, disjiciunt & difsecant obturata. Oportet autem hæc sæpius injicere calientia, eo vsque, ut ager voluptatem capiat. Deinde & de sensu medicamentorum sæpe est rogandus ager, ac calore intendendo. Sæpius vero hoc facere oportet, ut vna si quid pituitæ detersum est & extenuatum, effundatur. Conducit etiam vaporatio ex ruta, samplu-

cho, castoreo & milio. Verum si in toto corpore, aut saltem in capite prædictorum crassorum humorum adsit redundantia, priusquam modo dictis medicamentis vtaris, corpus totum aut saltem caput purgante medicamento exonerabis, præcedente tamen eorum coctione ac præparatione; ut de doloribus capitis à succo crasso dictum est: alias maioris fluxionis causam præbunt, & dolor amplius irritabitur. Plura & egregia remedia videas apud Rondeletium cap. propriis.

OBSERVATIO V.

De auris dolore ex materia calida & inflammatione.

Iuuenis robustus intensissimo auris dolore afficiebatur, non sine febre, adeo vehementi ut delirium ferè incurreret. Ad hunc accitus, ex phlegmone etiam partis interioris auris eum laborare intellexi, ex humore sanguineo, cui tamē plurimū bilis esset adiunctum, cum non in densas partes crassior sanguinis pars penetrare possit. Cuius quidem causa est repletio aut solius capitis, aut partem corporis totius: porro cum phlegmone, aut partem quæ auditorij instrumenti compositionem ingrediuntur, occupat; aut eas quæ iuxta sunt posita. Rursus, ubi instrumentum vel extimas solum partes afficit, vel intimiores: adeo ut inflammatio ad neruum vsq; auditorium pertingat. Etenim hæc omnia distinguere oportet, quod & multum periculi magnitudine distat & curatione. Ceterum quod hic inflammatio esset, grauitas distensioque simul ac color & dolor pulsantis & febris ostendebam; cum & inflammatio causa efficiens sit doloris, qui sanguinis calfacti influxu intendebatur, & originem suam habebat: quod & bonæ ratione affirmare licet; quemadmodum Paulo & Alexandro quoque visum est. Excitantur a. inter dū ex ichoribus, seu saniosis humoribus in aurium corpore genitis, consimiles dolores; quemadmodum ex mordacium humorum illapsu forinsecus facti contingunt, Gal. teste 3. De compos. medicamentorum secundum locos. Verum quod hic phlegmone erat, id signa communia, quæ ceteris phlegmonis adesse solent, sensu indicabant. Etenim rubere eius proprium est: protenditur vero rubor magna ex parte ad malas & tempora, quod ad partes vicinas fluxio quoq; communicat; ut & calor, & aliquas inflammatio, quemadmodum huic iuueni eueniebat. Quod autem interna pars magis affecta esset, id grauitas doloris demonstrabat, & pulsus magnitudo. Quanto enim ad intima magis perueniat inflammatio, eo maior pulsatio; quoniam arteriæ maiores: sed & dolor quoque maior, & febris vehementior, ob primi principij nobilitatem; hinc & paraphrenesis. Omnia enim hæc aderant in hoc iuueni annorum 28. tempore verno: deinde interna pars aliquo modo rubere & tumere videbatur, maxime ad lumen (ut fieri plerumque solet; nisi valde penetrans & abscondita sit phlegmone.) Hæc cum adesse spectarem, simul & febre, caputque calidum simul & inflammatum; ne vniuersum fluxio in cerebrum raperetur, ac magnitudine sua melum & ob prauitatem partis delirium magis per consensum accederet (cum & delirium ac morbum minetur ex febre continua & acuta teste Hippoc. 3. Prognost.) statim hic sanguinem esse detrahendum astantibus proposui; præmisso tamen clysteri & emolliente & refrigerante, ob febre, ad reuulsionem & fecum expulsionem: cum aluum stricte haberet. Quamobrem, is expulsus, hora vna atque altera intermissa statim ex vena cephalica eiusdem lateris, è regione auris dolentis pro reuulsione & simul

simul euacuatione, sanguinem in cubito detrahere mandauimus. Cum u. methodus curandi generalem phlegmonarum curationem habeat, atque eadem auri sit accommodanda, sumptis indicationibus à partis præstantia, figura, situ & sensu: igitur phlegmone dū in generatione est, monstrat nobis, ut primum eius augmentum inhibeamus, postmodum quod ipsius factum est, tollamus. Inhibetur autem maxime, si fluxionem, quæ in partem fertur, sistamus. Siftitur fluxio, partem roboremque ne prompte suscipiat; dolorem sedantibus, cuius gratia fluxio excitatur; reuellentibus, ad alias partes humorem fluentem. Quoniam vero fluxio ipsius ex aliarum partium plenitudine excitatur, siue vna sit, ut caput, siue plures, siue vniuersum corpus: ideo præcedere abundantie vacuationem oportet; quamquam & iisdem præsidij etiam reuellendo nonnihil fluxionem inhibeamus. Quod hic sanguinem mittere oportuerit, nemo est qui dubitet, qui eorum quæ sæpius diximus, satis meminert. Etenim acutissimus & maximus morbus cum sit, maximam & celerem opem exigit. Hæc autem est venæ sectio: quæ etiam aliquando, ut dictum est à Galeno, ad animi deliquium fieri debet; cum & Hipp. dixerit, extremis morbis extrema remedia esse adhibenda. Verum cum hic tanta non esset plenitudo, & quæ caput magis tentabat, & plethora quidem adesset, non sine bile in iuueni etiam bilioso, ideo ex cephalica sanguinem mediocriter vel satis copiose extraximus. Iubet n. & Paulus in tali fluxione calida cum inflammatione & febre, ut statim sanguis emittatur. Et quamvis non meminert, quæ vena sit secanda; media indicari possit, si totum corpus sanguine abundet; vel cephalica, si caput: de qualitate in Scholio. Rondeletius cephalicam iubet incidere eiusdem lateris. Intra cephalicam & aliis reuulsionibus vti sumus: frictionibus inquam, vinctulis & cucurbitulis, ac aliis clysteriis & biliosis sanguis inter emittendum appareret, & postea magis iam refrigeratus; à venæ sectione vno ac altero die intermissa, etiam purgatione vti sumus, quæ vim haberet leniter bilem educendi: videlicet ex infuso rhab. & diaprūno simplici. Statim igitur à reuulsorio hoc præsidio & vna vacuatio, nempe sanguinis detractione, præscripta prius optima victus ratione, ut vix tenui vteretur refrigerante & humectante, etiam horum deo: cui & semen papaueris incoctum esset ad febrem; à vino & aliis calidis abstinendo (ut in omni phlegmone ab auctoribus declaratur.) Aliæ quoque ratione fluxionem inhibuimus, tum partem roborando, tum dolorem sedando: & cui magis intendemus, id ex doloris magnitudine coniecimus. Cum enim hic vehemens esset, & pulsatio valida, huic sedando magis incubuimus. Verum cum dolor bifariā sedetur, tum sensum hebetando his, quæ stuporem inducunt, tum iis quæ relaxant nonnihil, & ita causam tollunt; elegimus potius illa omnium primo quæ nonnihil relaxarent dolorem; sedarent & simul causam tollerent. Quare ex præscripto Aëtij cum feruens inflammatio esset, qui candidum tenue cum lacte muliebri tepidum infundebam; etiam assellos in oleo violaceo infusus & expressos subinde & ros. leuiter stillabam. Modo etiam rosaceo solo utebar: modo lacte admisto, aut oui albo: similiter & rosaceo, momento aceti admixto, idque tepido. Similiter extrinsecus iam dictis lanam imbutā imponebam; cauendo tamen ne calefieret. Vnde & super aure viaceret iubebam, nisi cum mens esset expurgan-

Pet. Forest. Tom. 2.

di. Imperauit quoque ut & hic maxime illisum aut duri corporis contactum caueret: sed ut potius ex lana madida, specillo appenso guttatim aliquis ex astantibus instillaret & rite administraret, quod & ipse cum inuiserem faciebam. Pars quoque dolens fouebatur hoc fotu: *℞. malua, bismalua, viol. lactuca, salicis an. m. j. sem. cydon. malua an. 3 i b. florum chamemill. meliloti an. p. j. florum resub. p. b. fiat decoctio, qua pars leuiter & tepide cum spongia madefacta & expressa foueatur.* Talis fotus optime conueniebat, ut materia digeratur. Postea cum dolor etiam reuulsorio præsidij iam dictis, & purgatione leui, remitteretur, ac febris paulatim cessaret; ad opium non deuenimus, tum alia quæ stupefaciendo dolorem consopiant: de quibus postea suo loco. Ideo remediis iam dictis contenti fuimus: & postea ad magis digerentia deueniendo, fomentis superscriptis adieciimus semen fenugreci, & lini. Et materia fuit paulatim resoluta sine abscessu; ut non opus fuerit ad suppurationem deuenire: sed cataplasmate appposito ex folijs malua, viol. & radice liliorum, adiectis floribus chamemill. & meliloti, cum farina bordei, oleo amygd. dulc. & pinguedine anseris farinæ seminis lini immixti fiebat cataplasma exiguo puluere flor. ros. & nenupharis inunctis. Quibus remediis hic sanus factus est.

SCHOLIA.

Cum dolores aurium ex variis causis contingant (quas nunc ex parte enucleauimus, tum earundem causarum signa, in præfatis Observationibus, tum scholiis) si ij contingant ex inflammatione, satis etiam eundem percipies ex hac iuuenis curatione. Si de his iisdem plenior explicationem desideres, perlegas ea, quæ Benedictus Fauent. præceptor meus cap. proprio. De causis doloris aurium & signis demonstratiuis scripserit. Restat tantum ut signa prognostica hic addamus. Quod a. maius periculum in aurium affectionibus imminet, quam in oculorum vitiis; id testatur Celsus: nam vitia oculorum intra ipsos nocent; aurium inflammationes doloresque etiam interdum ad dementia morientemque præcipiant, ut in libris Observationum nostrarum de febrib. ostendimus. Propterea inter initia protinus magis succurrendum est, ne maiori periculo locus sit, ut ipse inquit. Non absque ratione Hipp. 3. Progn. refert, quod aurium dolor in febre continua (ut & antea diximus) ac vehemēti, difficilis est: periculum n. delirij mortisque imminet: nam natu minores, septimo die, aut citius, ab hoc morbo interimuntur; natu vero maiores, multo tardius. Febris n. ac delirium minus eos infestat; & aures eis ob id ante suppurantur: sed per has ætates recidivæ euenientes morborum, plurimos interimunt: minores vero natu priusquam suppurentur aures, interimuntur. At si dolor in eidentibus partibus infestat, minus periculi existit, ut ex Gal. commento 3. Progn. constat. Si vehemens sit & in profundo hæreat, necis periculum imminet: tunc enim nervus auditorius oblaeditur. Hinc magnitudo periculi distinguitur primum natura. Hæc aucta tum magnitudinem morbi significat, tum prauitatem, quæ est altera magnitudo sibi partis ratione eueniens, si in profundo ad auditorium meatum phlegmone fiat, non ubi in externis quæ apparent partibus. Gal. n. quoddam ait per colensum deliros fieri ex dolore cum feb. acuta; quoddam vero attonitos mori, cum vniuersum fluxio in cerebrum permittatur. Alex. autem, siue meatus auris (dicebat) siue alia quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret, acutissima

E 3 particula

Ad concus-
sionem.Ad dolorem
ex igne.Plerum in
aurib. diffi-
cilia.

Aliæ causæ.

Differentiæ
inter sanie-
mque ab aliis
ichor dici-
tur, & pus
concoctum.

cussione, casu, contusione, sanguinis missio vel ite-
rata iuuat; & reliqua quæ materiam confluentem
auertant adhibenda; & deinde quæ ad vulneris
curationem necessaria sunt ex propriis indicatio-
nib. fumenda, quæ ad chirurgiam pertinent. At si
autis concussa fuerit, nec os collisum, iuuant myr-
rha, thus, aloë, cerusa cum rosaceo, aut myrrha cū
cochlearum carne contrita, aut aloë cum sapa &
rosaceo. Ab ictu dolorem sedat lac mulieris cum
anserino adipe tepefacto; aut fel taurinum cum
eodem lacte vel caprino si ibi aliqua sint rupta.
Contusis auribus, blattæ trita imponitur cochleæ
cum melle. Si adsit phlegmone, cataplasma ex ha-
lica cum aceto. Verum si hæc omnia (vix & inflam-
mationes apostemata) male curentur, in abscessum
transeunt, ac suppurationem, deinde in vlcus: ali-
quando quoque etiam si nacti fuerint peritum
medicū. Et sic vlcerata quæ in auribus sunt, alia
quidem recentia, alia inueterata, nonnulla sanio-
sa, alia vero sordida: quædam ita profunda, vt in
fistulam transeant; alia a sensui manifesta. Quæ-
dam etiam, in humido corpore & puerili; quæ-
dam in sicco, vt senili aut melancholico, nam &
hæc curationem variant. Præter causas iam di-
ctas euenit sæpè à materia ad aurem delapsa ob
debilitatem digestiua ipsius auris, aut humidita-
tem aliunde ad aurem confluentem; vel à materia
ex cerebro ad aurem delapsa: quæ cum non possit
ab aure digerī, fit sanies, & exulcerat. Vel effluit
sanies ob tres causas: vel quod apostema vel abs-
cessus in aure recens perruptus sit; vel ob vlcera-
tionem in eis factam ex humore acuto, pungente,
mordicante pelliculam vel loca interiora; aut
quantitate vel corruptente & alterante vlcus in-
ducente. Aut fit per pustulas in iisdem generatas
atque ruptas: aut ob mundificationem non fa-
ctam à multis humoribus malignis ibidem coa-
ceruatis, aut congregatis. Humor n. interdum è
capite in aures defluit molestus primum & pluri-
mus; qui deinde putrescit, ac consuetudinem fa-
cit, vt iam nihil molestiæ inferat. Vlceris vero &
pustularum causæ sunt, vt iam paulo ante diximus,
humores acuti, pungentes, mordicantes, vel quan-
titate vel qualitate corruptentes, alterantes:
postquam enim locus vlceratus est, concurrunt
perpetuo humores vel ob dolorem, vel ob loci de-
bilitatem: & ideo faciliè recipit humorem, qui fa-
ciliè in sanie conuertatur. Quamuis, vt alii volūt,
sanies euenire possit sine vlcere, à cerebro & par-
tibus circumiacentibus: quia natura purgando cere-
brum ab humiditate superflua & excrementosa
per aurium meatus, conuertit ipsam in eoriam
vel virulentam sanie; eo quod via sit longa ac
tortuosa, & non possit tum cito à natura expelli,
& ibidem moram contrahendo, talis humiditas
sanie quandam acquirit. Et talis aliquando sa-
nies, inquam virulenta, à natura expellitur post
antiquum capitis dolorem: vel post ictum in ca-
pite sine vulnere; & hoc per viam mundificatio-
nis. Medici doctiores sanie tamen seu ichora à
pure concocto differre volunt: quamquam sæpè
nonnulli illa confundant. Sanies autem de sangui-
ne dicitur (quod & nostri quoque pus appellant) eo
quod à massa sanguinea generatur. Et sanies à
vulgaribus medicis in apostemate vel vlcere aut
pustula generata, dicitur innaturalis; digesta qui-
dem à calore, imperfecta digestionem. Humor
enim veniens ad membrum vt ipsum nutriat, si sit
in se acutus, mordax, salsoque, aut alio modo ineptus
nutritioni, vel si membrum in se sit intempe-
ratum; non fit vera nutritio aut assimilatio: sed
potius calor volens ipsum assimilare seu digerere,

non potest: & dat ei colorem album, sicut est co-
lor membri: sed non formam, quia calor facilis
datur quam forma. Et per illum modum fit sanies
vel pus in membris vlceratis vel vlcerantibus. Sed
in apostemate ante vulnerationem seu eruptio-
nem pus aut sanies generatur, quia humores con-
culcati & congregati in vno loco per modum su-
pradictum à calore corporis ad sanie vel potius
pus conuertuntur. Sanies tamen proprie dicta à
medicis eruditis, dicitur ichor, vt alias diximus.
Hic a sanie communi modo cum prædictis pro-
pure accipimus, vel pro materia illa virulenta
Præceptor meus Benedict. Fauentin. cap. proprio
De aurium vlceribus & de sanie & sorde ex his excrementis.
Sanie dicit esse excrementum tenuius quod ab
vlcere profuit; aliud vero paulo crassius, quod
& sordem appellat, & vlcus sordidum reddit, in
Osser. præcedente diximus. Interea tamen (vt docet
Aetius) etiam ad aures humentes absque vlcere,
seorsum sanie veluti exundantem fluere com-
pertum est. Ad quod malum ipse mysi panno in-
uolutum & sub prunis crematum simul cum pan-
no terit atque per arundinem insufflat: vel gallas
in linteo vltas ac tritas simili modo applicat, vel
alumen in fistili combustum terit, oleoque prius
insuffuso insufflat. At neoterici quidam hanc sanie
à cerebro ad aurem absque vlcere auris defluente,
curant euacuatione propria, phlebotomia si opus
est; vel pilulis caput expurgantibus, humoribus cum
syrupis prius digestis, & per caput purgia & gar-
garismos deinde cerebro corroborato, ne humo-
rem ad aures transmittat: intus etiam assumptis
odoratis, vel prout causa calida, nempe saccharo
rosæ, vel frigida, diambra, & extra ad motus calidis
vel frig. corroborantibus. Quibus si non curetur, ad
cauteria deueniunt. Interim & aurem repurgant
à sanie, & roborant; non tamen stipticis: sed pro-
hibendo aurem ab vlceratione; lotionem cum vi-
no, decoct. mellis & rosæ rub. & si timeant vlce-
rationem, insillant duas vel tres guttas si se me-
mitha cum pauco aceto, & similib. Et si timeatur
obturatio, mundificetur cum specillo bombace
inuolutum, & oleum amygd. quandoque in aurem
stilletur. Verum aurium vlcerata proprie dicta
quomodo curentur, ex Obseruatione præcedente
satis constat: & exemplis sequentibus curatio ad
huc clarior fiet.

OBSERVATIO VIII.

De quibusdam aurium vlceribus curatis.

V Ir quidam supra an. 30. natus, vlcus sanio-
sum habebat in aure sinistra, cum dolore ex
mordaci humore. Ad quem curandum cum acci-
tus essem cum altero medico, quæstio suborta est,
nuncquid venæ sectio hic conueniret. Cui respon-
di, quod Benedict. Fauentin. præceptor meus hanc
quæstionem cap. proprio De aurium curatione sol-
uit; sic inquit: Quod si vlcus nondum sanie vel pu-
rulentiam emisit, sanguinis missionem nequaquam so-
lere debes: ea enim tunc temporis vlcus magnificari colli-
bet. At ubi quicquam sanie aut purulentia effluxerit, sa-
guinis detractionem nequaquam admittes; quoniam tunc
temporis peracta, concoctioni vlceris & eius maturatio
impedimento est: nisi dolor fortissimus vlceris etiam sanie
mittenti admittendus foret. Tunc admodum idonea sangui-
nis detrahitio existit, iuxta Galenum primo aph. com-
ment. 23. sic dicentem: In fortissimo dolore nullum me-
dium magis aptum inueniri potest quam sanguinis mis-
sio. Et paulo post: In curatione vlceris prope mem-
brum principale, ab initio materia calida existens, &
vires

SCHOLIA.

verer (inquit) sanguinis missione; deinde vero si expedi-
ret, euacuatione: sanguinis enim missione materia vlceris
tolletur, & eius nimia caliditas remittetur, auctore Gal.
in lib. 3. De curatione per sanguinis missionem. Nulla enim
inquit, euacuatione magis infirmitas, quam sanguinis mis-
sio. Quare conclusum est, ob dolorem in viro opti-
mi habitus, cum etiam in vere essemus, & hoc ma-
lo non diu correptus esset, vt post alui deiectionem
cum syr. ros. solut. die subsequenti ex vena cepha-
lica in cubito sinistro auri sinistrae respondentem
sanguis extraheretur: non tamen multus, ob ma-
teriam acrem & biliosam; sed tantum ob dolo-
rem. Postea etiam ventrem largius deiectionibus
cum pilulis sequentibus: ʒ pilul. aurearum ʒ ij.
rhod. optimi ʒ j. diag. ʒ. ij. siant pilule vij. deinde &
scapulis cucurbitulas affigere iussimus, & masti-
catoria imperauimus ad reuulsionem. Propter
acrimoniam primum infundere iussimus per vñ
aut alterum diem lac muliebre cum oui candi-
do. Et acrimoniam nonnihil ablata, cum hordei
decocto (pauco iniecto syr. ex infuso rosæ rubrarum)
ad detersionem sanie abluimus. Deinde vt plus
detergeretur, sanie magis glutinosa apparente, vt
nulla ablueretur vlcus, mandauimus. Post ablu-
tum vlcus succum parietariæ, anagalli dis, bugle sa-
nicule centinodæ, plantaginis, burse pastoris millefolii
cum melle coximus: atque eo commode vsi sumus.
Primo enim (vt præstat) vsi sumus collutioni-
bus in hunc modum: ʒ vini Rhenani albi & anti-
qui vel Pissaniensis, mellis despumati ana ʒ ij. aquæ
dulc. limpidæ lib. ij. hæc simul bulliant, & vlcus ea
aqua eluatur. Secundo id quod sequitur instilla-
uimus: ʒ mellis ros. cremoris hordei, laetis mu-
liebris propter calorem an. ʒ j. ʒ. ʒ. vini albi ʒ j.
bulliant leni ebull. & vire. Postea ad succos iam di-
ctos cum melle deuenimus. Et ultimo, vt magis
siccaret, alumen vsum ex vino egregie contulit;
alioqui ad fortius venissemus ex aceto tritū. Qui-
bus remediis bene se habuit. Auanzoar vero cum
absterfuis apponit exsiccatia: nam postquam in
filio suo Haly patiente apostema & dolorem au-
tis cum vlcere ita vt mortem appeteret, & ab
aure sanies exiret, ex oleo infusionis de vitellis
ouorum infudit: postea aquam mellis, in qua de-
cocta erat herba cauda equina; deinde iussit la-
uari cum eadem aqua, in qua decocta erat arugo
ferri. Et cum his sanatus est. Hoc modo & alius
quidam curatus est ab aurium sordiditate cum vlce-
ribus antiquis. Decem diebus materia digesta fuit
cum syr. ʒ. stœchade, oxymel. & syr. de rad.
cum aqua calida infusionis nucis muscatæ contri-
tæ. Deinde purgatus est cum pilul. cochis Al-
mazoris. Postea omni mane exhibita est ʒ j. pilul.
sequentium: ʒ cimanomi, ʒ xijberis, ʒ xylobalami,
carpobalsami ana ʒ. ʒ. ʒ. spica, croci ana ʒ j. ros. rub. ʒ. ʒ.
ebul. turbit. an. ʒ j. ʒ. aloes succotrinæ & epatici ana
ʒ ij. confice cum succo fœniculi, & sumantur in inui-
tu lesti, parca cena præcedente. Et aliis temporibus,
quando non fumebat pilulas, hanc mixturam ca-
piebat: ʒ. specier. plinise, dianarg. calid. for-
mentum in tabul. pro ʒ ij. dosis ʒ ij. pro aure hoc abstergen-
te utebatur: ʒ. vini albi subtilis dulcis, vrinæ pueri an.
ʒ j. bulliant leniter cum ʒ ss mellis. Postmodum cum
non sufficeret, adiectum est parum vnguenti A-
gyptiaci desc. Mesuræ. Et post mundificationem
vlceris, hoc medicamento sequenti utebatur:
ʒ. oliban. sarcocolla nutritæ an. p. dissoluantur cum
vino rubeo, & cum licinio mittantur in aurem.
Quibus & hic quoque curatus est.

Cum de causis & differentiis vlcerum in au-
ribus satis dictum sit, à quibus indicationes
curandi sumuntur; operæpretium est vt vniuersu-
iusque differentiam notis suis distinguamus, an-
tequam curationem incipiamus. Quamobrem dili-
genter prius considerata sunt signa vlcerum præ-
sagientia, vt iisdem quam citissime succurrere
possimus. Apostemata calida in aure, vel inflam-
mationes, magna ex parte ad auris vlcus termi-
nantur: frigida quoque longo tempore perduran-
tia, si non resoluantur, vel non fuerint nacti peri-
tum medicum, etiam permittuntur in vlcus, vt
frequenter vidimus in iis, qui muliercularum &
empiricorum diuersis consiliis, vel nullis, vtun-
tur. Præterea & illi qui cerebrum debile habent
& magnum; & quibus sordes in auribus retinen-
tur, quæ consuetæ erant exire: quibus quoque
adest repletio fastidiosa, & frequenter dormiunt
post repletionem, vlcerata auris incurrunt. Verum,
quod ad signa vlcerum demonstratiua & præsen-
tia attinet, per se manifesta sunt, ex sanie vel
puris apparentia, vel sanguinis saniosi. Hoc tamen
signum non est sufficiens, cum etiam antea dixe-
rimus sanie quoque posse ad aurem sanam deri-
uari, siue in cerebro sano genita sit, siue ab apo-
stemate seu abscessu rupto in cerebro ad aurem
profluat. Frequentius tamen decidit ab vlcere
auris, siue vlcus istud sit factum ab apostemate
aut sine eodem, aut nullo præcedente abscessu. Id
equidem hoc modo cognoscitur: si enim fuerit
sanies ab apostemate rupto in ipso cerebro aut in
aure, primo sanies in magna quantitate effundit-
tur; deinde paulatim, donec consumpta sit. Præ-
terea præcesserunt signa inflammationis, aposte-
matis cerebri: quod etiam ex cerebri præcedente
grauitate & dolore cerebri & allouatione eorum
cum apparet sanies, & cum priuatione doloris
auris, etiam habetur. Si vero ex apostemate auris,
dolor fuit in aure & mias in capite præcedens.
Si autem sanies genita sit in cerebro sano, adeit
cerebri incolumitas, & auris; & illa sanies fluit
in primis diebus atque pluribus in magna quan-
titate: postea vero paulatim, donec consumpta
etiam sit. Et postea aliquando iterum coacerua-
tur & denuo fluit. Imo ipsius violenta retentio
facit vertiginem aut alia cerebri symptomata in-
ducit ac morbos. Si vero sanies sit ex vlcere facto
in aure, ex vulnere, aut humore, aut ex aliis eius-
modi paulatim corrodentibus aut putrefaciendis
bus, sanies illa paulatim fluere incipit; & deinde
sicut vlcus excrescit & augetur. Sanies quoque
illa augetur quousque vlcus sit proximum conso-
lidationi: tunc enim incipit diminui. Sed vera
signa vlceris auris sunt, dolor, ardor, punctio cum
sanie: & proprie ad tactum & immisionem ali-
cuius rei dura & acuta magis dolet, & irritatur,
& aliquando sanguis simul cum sanie exit. Si a-
vlceratio auris inceperit per se; tunc nulla signa
apostematis præcesserunt, neque dolor excedens
aut febris; sed tantum pruritus aurium præces-
sit: vt quotidiana experientia sæpè edocuit sumus.
Causæ interea vlcerum ex ipsarum præcessionem
declarantur, iam quoque (vt antea docuimus) ex-
terna vlcerata sensui subiacent: interna vero si in
nervo fuerint, abscondita sunt; & simul adeit do-
lor intensissimus, vel præcessit. Si vero in osse, co-
gnoscitur ex sanie quæ subtilis est, & tendens ad
citrinum colorem, & ex morbi antiquitate co-
gnoscitur. Quod si stylus posset immitti, certius
ch

Signa prognostica.

Cura.

Cura.

Ad vlcera recentia.

Fleus simplex quomodo curatur.

Fleus cum symptomaticis quomodo curatur.

ob duritiem ossis id perciperemus. Verum hoc minime tutum est, ne dolor inde augeatur & nervus comprimatur aut lœdatur, & eiusdem temperies corrumpatur. Quæ vero profunda sunt instar cavernæ, ex multitudine eius, quod egreditur, declarantur. Sordida (ut prius quoque dictum est) ex crassitie & multitudine eius, quod effunditur. Virulenta ex sublimitate saniei putrida, & ex pure ac sanie fetente. Corrosiva, quia aliquando post saniem egreditur sanguis, fistula cognoscuntur ex vlcis diuturnitate, sanie virulenta, carne callosa & magis solito indurata, percipiuntur. Circa signa prognostica hic & pus & sanie animadvertere oportet; quæ & vlcis fraudulentiam demonstrat: pus enim album vel sanies alba malitiosum vlcus minime designat; alterius vero coloris, eiusdem malignitatem decernit. Vlcera quoque munda & superficialia facile curantur: profunda & ad nervum devenientia, difficulter; & consolidata relinquunt post se nocuum auditus. Et quæ os attingunt, raro aut nunquam curantur, non obstante, quod quibus sanies per septem aut octo annos ex auribus fluxerit, cum maxima diligentia curati fuerint, ut Thavanius testatur se plurimos in vita curasse. Sunt autem inueterata & diuturna peiora quam recentia, cum facile in fistulam abeant. Fistula quoque non curantur; quemadmodum & ea vlcera, quæ profunda, corrodentia & putrida fuerint: nam & hæc ipsa magna ex parte sunt perniciofa, cum frequenter sese insinuant ad cerebrum vsque. Sanie vero iam recens effluente ab vlcere, prius astente dolore capitis & sensuum perturbatione, & iisdem symptomatis statim ab exeunte pure vel sanie, remissis, bonum signum est, & quod vlcus cito curabitur. Iam etiam in parte externa existens, & sanies laudabilis coloris & substantiæ & odoris fuerit, etiâ presentibus bonis signis, pro optimo signo habetur. Et contra sanies mali coloris, & foetidi odoris, ab apostemate profundo & diuturno procedens, malum portendit: quoniam eiusmodi vlcera, teste Avicenna, ad ossium detectionem pervenerunt: hæc diligenter prius scrutanda; deinde pro vlcum varietate curationem instituere oportet. Si itaque sit sanies à cerebro absque vlcere auris, quomodo curetur, prius dictum est. Si vero ab apoplemate cerebri rupto effluat pus, doloribus statim sedatis, aliquando per se curatur: si non, opus erit deterfione; & vlcus eluendum, & pus repurgandum, cum melle rosæ aut mulsa instillata, ut diximus: quæ etiam sæpius innovanda; multum enim interest, si probe expurgetur. Et sic ad vlcera recentia mulsa infusa prodest, aut oxymel simplex, vel scillinum, vel mulsum. Si igitur vlcera auris munda sint, & in corpore puro; præter vlcis rationem, duas tantum intentiones curandi auctores ponunt; primo vlcis mundificationem; secundo consolidationem. Si vero vlcus auris fuerit cum mala intemperie, apostemate, dolore vehementi, prius intemperies auferenda: & inflammatio seu apostema si adsit, similiter propria curatione tollenda: & omnium primo dolorem auferemus si is urgeat; deinde vlcus curabimus. Quod si post saniem emanantem ab apostemate, vlcus non statim probe repurgetur, & inde vlcus diuturnum fiat, communi vlcum curatione erit utendum; ac primum si rupturam tumoris sequatur, & sine dolore consistat, iam ut fordidum vlcus curandum erit, & vna cauum. Duplicem igitur hunc affectum, ad hoc ut glutinetur, ac iuxta methodum supra positam & traditam, ad hoc ut carne vlcus replatur, necesse est

prius sordes abstergi. Mitius erit marrubij succum cum melle aut apij succum cum melle leniter coctum. Similiter & cyclaminis succus cum melle coctus. Et ita detergenda sanies, & siccandum vlcus. Sed primum, ut & Holerius admonet, lenioribus utendum est. Veteres remediis utebantur, quæ vlcem exoleta sunt; quorum hic ordo est: primum glaucio ex aceto; deinde pastillo Polydæ; post Andronco, tum Bithyno, vel è charta; postremo è scoria ferri, de quibus vide ad longum Gal. 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

crassiores; & iuuenem sanatum fuisse. Idque refert lib. 4. cap. 30. Verum illud minime nouum est, cum illud non solum ex Galeno, Paulo & Aëtio constet, sed etiam in Diosc. de calamintha facultatibus; sed tunc præcipue quando diuturnis vlcibus laborant; ut in Euphoris Dioscoridis plane ostenditur, his verbis; Vermes in diuturnis vlcibus generatos interimum hæc: oleum amygd. calaminthe succus, &c. Idem non minus apertis verbis 7. de simpl. med. facul. Apud Galenum etiam habetur. Aëtius lib. 6. c. 86. Vermes aurium (inquit) vel innatos vel advenas, ut summum dicatur, omnia amara & acris interficiunt, ut foliorum cappari succus, lacium humanum antiquum virumque cum melle mixtum, succus calaminthe, & aristolochie pulvis insufflatus, succus centaurij, albi, absinthij, vel earundem herbarum decocto: quo & aures iuxta Paulum eluuntur. Oleum quoque meatui inditum sursum versus remeare ipsos compellit.

OBSERVATIO IX.

De dolore auris cum sanie post supurationem & abscessum permanente, per modum consultationis, pro Christophoro Boetio.

CAsum, mi cognate Christophore, quem Machibela Zuria socrus tuas diebus mihi cum in Haghaba Comitibus ageret, narrauit: & quantum ex dictis eiusdem intelligere potui, cum sanies longo tempore ex aure sua ex vlcere post supurationem & abscessum perierit, proculdubio vlcus ibidem relictum fuit. Sed quod ad dolorem (quem dicit te adhuc habere intensissimum; contra quem dolorem tollendum & mitigandum eadem prote perit consilium: quod quidem libentissime feci, ut hac in re tibi cum amicis gratificaretur) attinet; admiror eundem post abscessum ruptum, pure per aurem excreto non fuisse sanatum, iuxta illud dictum Hippocratis libro sexto, aph. 10. Caput dolenti & circumdolenti, pus vel aqua, vel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit. Vereor itaque materiam aliquam ibidem relictam esse: quæ dolorem capitis & auris augeat: quam forte medicus non satis purgavit, vel vlcere in aure existente in meatu auditorio satis profunde, non satis à sanie repurgato, dolor circa aurem maneat, vel diuturnitate malam qualitatem sanies acquirat, ut rotundo dolore in aure adferat: vel capite multum debili existente adhuc materia cruda indigesta excrementosa à capite in aurem desinat. Sed quia dolorem inferi, potius mordacem saniem in aure diuturnis persistendam dolorem inferre puto. Vel sanies ipsa posset esse crassior, quo minus effluat: vel sordes nimia caliditate indurata, aut alia de causa auri inhaerent, vel trombi aut sanguis conglobatus, Græci Τρομβες vocant. De quibus omnibus prius mihi coniectandum est, quam certi quid scribendum, cum à medico presente non sum edoctus. Unde forte & difficiliter in commune consulere possum, cum parum medice omnia mihi à matre fuerint narrata. Hinc quoque à medico diligenter inquirendum existimo, nequid horum quicquam, de quibus diximus, aut humor biliosus acris vel sanies mordax vel crassa viscida obstruens dolorem inferat, necne. Si sordes, auri repurganda oleo amygdal. amararum infuso, vel mulso, & felle tauri adiecto. Si trombi sanguinis, ex Apollonio acutum tepesactum cum melle Attico aut oleo laureo & succo porri cum mellebri lacte & rosaceo. Si materia ex capite in aurem fluat, & capitis ratio habenda & auris: si mordax, biliosa, contemperanda post evacuationes & topica adhibenda, si crassa, viscida & incidenda, detergenda, si sit sanies seu aliud quippiam. Si pus minus effluat, tale vel simile cataplasma apponendum, cum non dubitem vniuersalia remedia iam dudum fuisse adhibita: 2. rad. alibæ munda 3. j. florenum chamæmilla, meliloti, malua ana m. j. coquantur in aqua.

conicimus: nempe ex sorde & sanie, vel crusta, vel calloso & duro. Coniectura quoque hæc fiet ex præcedente victu quo conicimus caput esse repletum, & quo humiditatum genere repletum sit. Scimus vero vniuersum potius crassos & viscidos humores obstruere. Si vero obnubilatio interni aëris, percipies, quoniam victu plenior est vltus: quo sapius cruditates incidit, & meracius bibit, & in aëre nebulo est versatus, a quo etiam spiritus alterantur, nempe ab iisdem causis: defectus vero ipsorum alimenti defectus est; ideo aut longus morbus, aut siccatibus nimirum causæ præcesserunt. Sed & in præfens iugitur his macies faciei, & pallor. Curatio vero eius, quæ ex obstructione fit, est remouendo obstructionis causam, & fountem & conferuantem; quam prius tollere oportet: si crissimus morbus sequatur aut vltus, non necessario prospicere alteri affectui debemus; sed nec totum nec capiti: sat est localia deobstruentia adhibere, vt supra diximus; nisi post crissim, ubi natura corpus vacauit. Si sanies sit, deterforis vtendum, iis, quæ antea in vltus curatione descriptimus. Si crusta adsit, ea tollenda; mox vltus sanandum, vt prius præcepimus. Si à crassis succis, eadē erit curatio de dolore auris ex crassis succis, vacuando corpus, & caput; mox localib. vtendum extenuantib. vt prius mandauimus de tinnitu aurium quoque ex vaporibus crassis seu succis frigidis glutinosis. Quod si ex mala intemperie frigida & humida, cuius notas habemus 2. technī, tunc ea est propriis remediis corrigenda. Verū, vt summam dicamus, cum quidam prædictorum morborum ex propriis eorum indicibus prompte dignoscatur, vt in præcedentibus ostendimus; seorsim propriamque curationem requirunt: nam non auditus duntaxat læsionem, sed aliam quoque cum ea offensionem præstare solent: veluti est vltus, abscessus, quiuis præternaturam tumor, obortus in aure calidus, surditas, tuberculum. Illa prius curanda erūt; de quibus satis superque dictum est. Si spiritus oblaesus sit, aut aëris obnubilatio, remotis externis causis, siccatibus vtetur, tum ad caput tum ad aures. Profunt & aromatum suffitus. Si defectus & & siccitas, iubet Rhafes & somnum conciliari, & victu humectante vti, & aquam tepidam capiti superfundit: & id optime; sic enim siccitas temperatur, & spiritus regeneratur. Et sic si surditas aut grauis auditus à debili facultate auditoria, vel spirituum inopia sit, diæta resumptiua opus erit; vt ad longum egregie docet præceptor meus Benedictus Fuentinus c. proprio. De graui auditu & surditate. Aliter enim curatur à plenitudine: aliter vero ab inanitione, vt apud eundem perlegere poteris. Et quia frequentius duo hæc vitia fiunt ex frigidis succis & crassioribus, aut calidis biliosis; ideo de iisdem præcipue agunt auctores: de quibus & nunc alia exempla proferemus, ad maiorem huius affectus declarationem & curationem absoluendam.

OBSERVATIO XIII.

De surditate ex materia calida & biliosa.

Quamquam surditas à causa calida & potissimum à biliosis humoribus sursum ascendentibus oriri soleat, quæ & facile aboleri possit, præsertim si post febres contingat, ita vt nonnunquam hoc malum sua sponte soluitur, bile inferius descendente, quemadmodum Hippoc. testatur, aut sanguine ex naribus fluente; vt sæpe in communi praxi obseruauimus. Quidam vero per medicamenta bilem ducentia eis exhibita facilem curationem re-

ciunt, Alexandro & Paulo testibus. Fit tamen etiam citra febrem: vt euenit in iuvene quodam satis macilento; ad quem nos cum acciti essemus, & bilioso sanguine abundaret, qui sursum ascendens auditus meatus obstruxerat, & surditatem quandam induxerat; quamobrem cum vna auri magis altera affecta esset (nempe dextra) alio somnitu prius per cassiam, die sequenti venæ sectionem in cubito lateris eiusdem ex vena humerali institimus, cum in vere essemus, sanguine ad vncias fere sex extracto. Postea materiam paratā prius, cum syrupo infra scripto, quem per triduum bibebat, eundem purgauimus hunc in modum: ℞. syr. ex infus. ros. rub. viol. nymphae an. ʒi. b. aquæ cichorij acetose, end. an. ʒiij. misceantur. & à ieiuno bibantur in diluculo per triduum: ℞. elect. trium fantal. intabul. ʒi. capiat ʒij. vel iij. post syrupum. Proportione purgante: ℞. syr. ex infus. ros. pallid. cum rub. ʒi. b. electuarij de succo ros. ʒij. aquæ cichorij ʒi. b. f. hæc brevis: & egregie ventrem deposuit. Deinde fumus ex hoc decocto per infundibulum in aurem recipiatur: ℞. folior. malu. viol. fol. salicis, albæ, la. Eruca an. m. j. decoquantur in aqua: in aurē verolactis mullebris cum oui albo permixto, duæ tresve guttæ tepide mane & vespere instillantur. Et egregie curatus fuit.

SCHOLIA.

Omnia causa grauis auditus vel surditatis vel est essentialis secundū alios, vel per comparationem tēdi rationem. Si essentialis, aut auris pars aliqua læsa est, aut cerebrū: si pars, vel instrumentalis est, vel similis: si similis, tunc est vel ab intemperie, vel à soluta continuitate. Si instrumentalis, tunc est ab obstructione aliqua, aut tumore aliquo præter naturam innato, aut ab aliquo aduentitio; vt puta, callo, tuberculo, carne, aut sorde in auribus genita, vermibus, calculo aurem obstruente, vel ab humoribus crassis, vel à flatuoso spiritu. De quibus omnibus prius dictum est. Si per consensum, tunc est vel à toto, sicut in febribus, ex quibus vapores ad aures deferuntur: vel à crisi iam facta, vel à membro particulari, propinquo & remoto sicut à cerebro & à stomacho: ita quoque sit ex paucitate & crassitie spirituum, vel à consumptione corporis, vt dictum est. Quorum signa & curationes iam diximus. De quibus omnibus susius perlege Avenazium supra 9. Al. m. n. c. De surditate. Signa eius sunt quoque; manifesta per se neque aliis indicibus indigent, cum palam sit quod diminute vel nihil audiāt. Per essentialiam si nulla adsit dispositio totius, aut alterius membri, sed in auri in nervo eius aut foramine. Si per consensum, ex totius & partis prægressa ægritudine, qua aucta, surditas augetur, & remota, remouetur. Obstructio vero tantum ex intuitu sub radiis solaribus: A materia frigida crassa, ex grauitate & loci frigiditate, & quia frigidis læduntur, à flatu ex sonitu & tinnitu. Ex crisi, per præcedente morbum ad aures terminantem, & quod crisi finita remouetur. Si ex causis primitiuis vel externis, ex relatione ægri. At quis sit humor replens, quibus putant affectum semper esse pituita sobolem: cum Galen. videatur perpetuo curam statuere ex dissolutis, & extenuantibus, & exsiccantibus. Hippoc. tamen de bile meminit, cum ait lib. 4. aph. surditas biliosas deiectiones conferre. Et rursus de sanguine vna meminit: Solui dicens surditatem, ubi sanguis è naribus fluxerit, aut alius large deiecerit. Respondet Iacchus, has surditates esse eas, quæ crisi antecedunt: & sunt critica symptomata: quæ sæpe vidimus; ideo excretionem facta soluntur.

Fiunt a. repleto vapore, & humore in capite: ideo contingit obstrui meatum, aut potius obfocari aërem congenitum in auditorio. Sed si sine alio morbo, cuius impetu caput repleatur, malum accidat, & sit passio diuturna, procul dubio ex frigido & crasso succo erit. Huius curam quidam ponunt solum; quoniam alia curam non exigit; nam sponte sua cessat. Etiam dicendum secundum quosdam, ex sola bile non fieri obstructionem: sed vna à sanguine, qui simul per venas fertur. Si tamen à biliosis humoribus surditas vel subfinitas acciderit sursum vergentibus; derepente potissimumque in febribus infestare solent; natura, ætas, ac habitus biliosis quoque erunt: similisque præcessit victus ratio, tempus anni, regio ac aëris constitutio. Si à crassis humoribus, cum aurium tum capitis grauitas aderit, vt dictum est: ac reliqua, quæ pituitosos humores indicant. Eadem signa quæ sonitum aurium præfagiunt, surditatem futuram prænuntiant, vt omnes causæ primitiue & præparantes: & qui aures debiles habent, aut valde sensibiles, vtentes malo victu, & quibus præcedunt cerebri morbi diuturni: & hi magis grauitatem auditus incurrunt, ventis austriuis flantibus. Quamobrem, nisi quis tempestiue & probe subfinitati occurrat, cum illud symptoma valde suspectum sit, paulatim augetur, cum & temporis progressus surditatem inferat, auctore Gal. 3. de compos. med. localium. Quæcunque autem ab origine, vel paulo post, sed longissime & absolute surditates constituuntur; nullo remedio (teste Paulo) eliduntur. Quæ vero non absolute, sed diuturnæ, curationem non recipiunt, vel admodum difficillime. Surditas quoque lib. 1. Prædictæ Hipp. in morbis acutis & turbulentis consequens, mala est. Sed à bile ad superiora tendente, & vacuationibus bilem ad inferiora ducentibus, facile aboletur, vel sua sponte bile inferius descendente, in x. aph. 28. lib. 4. Quibus biliosa deiectiones, superueniente surditate cessant: & quibus surditas, superuenientibus deiectionibus cessat, & eodem lib. aph. 60. Quibus in febribus aures obstruuntur, sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum, 1. Prorrh. 31. Surditas in morbis acutis, vrina rub. absque residentia existente, & in iis crassiora quædam sublimis petentia, mentis aberrationem portendunt. Nam surditas, inquit Gal. cerebrum affectum indicat & vrina rubra inflammationem & jecur excelsam. Et crassiora in vrinis superiora petentia, materiam acutorem ad superiora conuerti præfagiunt. Et surditas ex audiendi facultate extincta difficile curatur, teste Gal. & Hipp. 1. Prorrh. commen. 31. Quæ vero repente fit, repente soluitur: quæ per consensum. Inueteratis surditatibus nulla est spes salutis: scribunt auctores de duobus annis. Ego vetulam mulierem quandam habui in curatione, apud templum Alemarie habitantem, quæ septem annis non poterat audire campanas sonantes: hæc frequenter post purgationes vtens localibus incidentibus, tandem post septimum annum me accedens, lætabunda dixit se campanas audiuisset: & fuit aliquo modo curata; quamuis semper grauem auditum retinuerit. Quibus in febribus continuus cum virium imbecillitate surditas superuenit, lethalis vt 4. aph. 49. ex Hipp. & Galen. constat. Si à spiritu ventoso, facile sanitatem æger consequetur; cum intermittat & causam si iam non habeat. Ex bile itaque facile fit curatio, modo per medicamenta bilem ducentia, Alexan-

dro & Paulo testibus. quorum materiam cum studiosi ex præcedentibus facile requirent, non opus est his diu inharere; cum & victu is humor contemplandus sit, vt iam sæpe demonstratum est. Quomodo vero ex succis frigidis & pituitosis curetur, satis liquet ex Obs. 12. præcedente: attamen ad maiorem explicationem, addemus aliud etiam exemplum.

OBSERVATIO XIV.

De surditate contracta ex crassis crudisque humoribus.

Pvella Delphia, circiter 22. annos nata, pituitosa, crassa & obesa, an. 1567. cum in hyeme, aëre nebuloso, ventoso, humido ac frigido extra urbem more solito, vt famula solent, linteamina exposuisset, & deinde lauasset; dolore capitis cum grauedine incurrerat: cui cum non tempestiue occurreret, neque medico vteretur, in vehementem surditatem deuenit, vt neque campanas sonantes audiret. Hæc misera famula me accessit, vt ab hac molestia liberari posset. Cum autem adhuc capitis grauitas simul adesset, ab humorum concoctione; & simul euacuatione humorum crudorum & crassorum à quibus hæc surditas orta erat, curationem auspici sumus in hunc modum, cum tempus hybernium esset & decoctis vti non possemus: ℞. oxymellis scillini, syr. & stachade, mellis ros. colati an. ʒi. b. aquar. beronica, samplici, hyssopi an. ʒiij. mis. fiat syr. pro iij. dosibus, & vltimo bibantur in diluculo. Deinde purgationem hanc sumpsit: ℞. electuarij indi, maioris, diaphenici, catholici an. ʒij. aquæ salsa ʒiij. syr. & stachade ʒi. b. fiat potio hora matutina sumenda. Postea die vno atque altero intermisso has pilulas sumpsit: ℞. pil. asaiet, cochiar. sine quibus an. ʒi. trochisc. alhandal. ʒiij. fiant pilule v. quæ circa dimidium sumantur: quibus egregie alius soluebatur. Postea ℞. theriacæ veteris ʒij. confer. florū saluæ ʒi. b. misceantur. & postmodum sumantur sex horis ante pastum. Postea fiat apoplegmatisimus: ℞. masticis ʒi. piperis, pyrethri an. ʒi. b. sinapi ʒi. b. fiat pul. & includatur vltimo ex lino vato, & fiat masticatio mane, idque ante pastum per horæ seve dimidium, semper spueno. Postea die vno atque altero intermisso, irritabatur sternutatio ex pul. elebori albi, pyrethri, & xij. idque etiam longe ante pastum. Deinde vt singulis hebdomadibus etiam vteretur præcepti pilulis infra scriptis: ℞. pil. ex hiera simplici, agarici, trochisc. asaiet an. ʒi. cum oxymelle, scillino, fiant pilule xvij. dentur tres in introitu lecti. Deinde ad topica deuenimus, & primo ad aures fomentum & euaporationem: ℞. foliorum lauri, origani, hyssopi, maiorana an. m. j. rad. altheæ ʒi. b. bacar. lauri num. vij. absinthij m. b. florum stachados p. j. coquantur in aqua ad tertias q. s. in fine adde aceti parum, & fomentetur auris cum spongia, & vapor per embotum recipiatur. Postea illud quod sequitur, in aurem stilletur: ℞. olei rutacii, nigellæ, anag. amar. an. ʒi. b. misce, duæ vel tres ex istis commissis guttæ mane & vespere in aurem stillentur. Et medicamento immisso tepide quidem, quiescat per horam vnā aut alteram supra aurem sanam, vt ad interiora virtus medicamenti traducatur: postea per totidem horas supra ægrā quiescat, vt excrementa commodius effluent. Deinde post sex vel septem horas ægram in loco lucido collocabam, vt auris melius à sordibus inibi collectis repurgaretur. Postea iisdem oleis adieci suci capæ ʒij. cassorei ʒi. quibus & hæc tandem à graui auditu & surditate liberata est.

SCHOLIA.

4
Corasio sex
frigida ac
erassis suc-
cis fiat.

Paulus surditatem & grauem auditum ex cru-
dis crassisque humoribus, venæ incisione cu-
rat, aut purgatione; tum medicamentis quæ per
os & nares pituitam eliciunt, Græci apoplegma-
tismos & errhina dicunt. Id quidem si recens ma-
lum sit; & vna si sanguis cum pituita abundet,
tunc venæ sectio conuenit ex media vel externa
vena cubiti; alioqui purgatione vtendum, hu-
moribus tamen prius concoctis. A purgatione
Alexander quoque & Paulus sternutamenta ad-
hibent, & balneis sua sponte scaturientibus vel
aqua marina vtuntur, caputque vii & Gal. 3. De
comp. medic. secundum locos, exsiccant & roborant.
Eaque Paulus instillat in aures quæ ad sonitus
prius tradita sunt. Priuatim vero & hæc conse-
runt: vrina & fel caprinum, aut seorsim fel; aut
ruta succus cum melle, aut castoreum cum oleo
anethino, vel caprillum fel cum galbano. Ita &
Aetius lib. 6. c. 80. de audiendi difficultate & surdi-
tate. Primo hiera vtitur; postea pilulis ex aloë &
coloc. Deinde apoplegmatis, & caput radit
& illinit, firmat, & victum attenuatorium adhi-
bet. Apollonius ad difficultates auditus repente
obortas ob capitis dolorem, absinthij decoctum
per embotum in aurem euaporare facit: mattu-
bij succum, deinde cum vnguento irino tepidum
vna mixtum in aures infundit: Vide apud eundem
& alia remedia: & apud Holerium de graui auditu, in
lib. 3. Galeni & nonne. Primum itaque leuiter pur-
gabimus corpus, & frequenter; vt bis in hebdo-
mada capiendos pilulas sine custodia, vt de hiera
simpl. vel comp. & de assaieret. Deinde humorem
concoquemus, mox pilulis fortioribus vtetur, &
post easdem theriaca, methridato; & intra au-
rem ponemus olea iam dicta, vel raphaninum, de
scorpionibus, nucum, oleum vetus, in quo deco-
cta sit colocynthis, vel cucum, agrestis, vel lau-
rinum, vel balsamum, petroleum & omnia quæ
sunt tenuium partium. Sed duo vltima sunt po-
nenda cum maxima aduersione, cum facile pene-
trent, inflamment, & dolorem excitent. Miscen-
da est igitur pauca eorum quantitas cum oleo
imbecilliore, vt amygd. amar.

OBSERVATIO XV.

De graui auditu ab apostemate relicto: & de aliis
à surditate curatis.

Famula Bartholomæi Simonis Alcmariani,
annos sexdecim nata, anno 1547. in autumnno
post abscessum ruptum in aure dextra, sanie non
amplius fluente, diuturna surditate detinebatur;
ita, vt quasi de auditu restauratione recuperanda
desperaret; me consilij causa adibat. Assumpta
cassia pro alui solutione, cum & capite doleret, ad
humores pituitosos concoquendos, hoc sequenti
decocto vltima est: ℞. decoct. herbarum capital. seu de-
coct. capitalis lib. ij. oxymell. simplicis, mellis ros. colati
an. 3. ij. syr. è stœchade 3. j. misce, hoc decocto ebibito
has pilulas sumpsit: ℞. pilul. aurear. cochlearum, ag-
gregat. an. 3. b. di. ag. gran. iij. cum syr. è stœchade fiant
pilule v. quibus copiose sexies aluum deposuit,
cum facilis solutionis esset. Postea & cucurbitulas
cum scarificatione scapulis admoimus. Deinde
adhuc semel deuoratis pilulis, vt circa aurem
inungeret vnguento alabastrino, imperauimus;
atque oleum sequens cum aliquo tempore bis ter-
ue in die in aurem tepide instillassemus, ab omni

surditate liberata, sana euasit. ℞. olei amygd. amar.
3. j. olei rutæ 3. b. misce. At altera mulier Delphen-
sis vidua, cum ex diuturno morbo conualuisset,
incidit in surditatem, anno 1559. in fine hyemis,
satis diuturnam: quæ cum satis purgata esset, &
deinde à medicamentis abstineret, & longo tem-
pore adhuc surditate laboraret; vetula quædam
eidem consuluit, vt granum vnum vel alterum
mosci optimi in bombace misceret, & auri per-
petuo imponeret. Hoc remedio, præter omnem
spem ab omni surditate liberata est. Ego multos
quidem, quibus auri sanie longo tempore mado-
ret, curauim solâ imposita bombice vel cotone, in
quo moscus reseruatur: quod & aurem exsiccaret,
& simul surditatem tolleret. Vide de puero surdo
post variolas Obseru. 7. huius libri. Mulier quæ-
dam oleo murino (mures enim recenter natos
sine pilis macerabat oleo) utebatur cum miracu-
lo ad aurium surditatem. Gislebertus Hortius
præceptor meus Romæ, aquam ex illis destilla-
bat, & eam in aures immittebat.

SCHOLIA.

AReulandus, medicus suo tempore insignis, ca.
39. in nonum Almanz. scribit molcum in
causa frigida cotto inuolutum, & in aure reten-
tum vel positum, egregiam prærogatiuam habere
in curando surditatem. Sed in mulieribus iuuen-
culis suffocationi vteri obnoxiiis, nequaquam
conuenit: & si graui auditui vel surditati conser-
ret, aliud vitium non minus malum (nempe vteri
præfocianem) induceret: alioqui viris tum mu-
lieribus minime huic malo obnoxiiis, vtilissimum
remedium est. Interea si surditas à sanie, vel vl-
cere proueniat, sanies abstergenda erit, & vlcer
exsicandum, & corpus euacuandum. Ideo ini-
cienda sunt quæ vim habent abstergendi; vt est
succus capæ, porri, cucum. agrest. cum melle; vel ex fel-
libus mitioribus quale est porcinum vel agninum.
Postea tuto adhibentur, quæ vim habent exsic-
candi, vt vlcer ducatur ad cicatricem, vt de vlce-
ribus dictum est. Ita trochil. albi Rhas. sine opio,
& alia quæ ex cerula, pompholyge seu tutia pu-
rantur, dissoluantur in succo vel decocto. aliqua
medicamentorum abstergentium, vel exsiccan-
tium. Vel hoc remedium quod præstantissimum
est, adhibeatur: ℞. scoræ ferri 3. j. decoque in vino:
quod postea iniiciatur in aurem. Fit etiam decoctio in
aceto: sed cauendum est, ne acetum nimium acce-
sit; nam sua acrimonia irritat vlcer. Alia quoque
quæ fortiter exsiccent, plurimum valent, siue in
forma vnguenti, siue iniectionis. Sed non sunt
probandæ (inquit Rondeletius) iniectiones ex oleis
in hac specie. Nam oleum est vlceribus inimicum,
& maxime aurium vlceribus. Quod si ponatur
oleum, id fit, vt obtundatur acrimonia aliquo-
rum exsiccantium cum vehementiorsu: alio-
qui numquam ponendum est. Quod nos in famu-
la vlti sumus oleis, nihil saniei, cum nos ad illam
veniremus, emanabat; alioqui detergentibus vlti
fuisset, & deinde vlcer exsiccassemus. Sordidum
tas quæ post istum prouenit, si post aliquot menses
perseueret, incurabilis est: quoniam cum fractu-
ris vel diffensione nervi & tympani est. Quæ au-
tem à catarrho fit, curatur auertendo in aliam
partem fluxionem; & consumendo quod parti
impactum est, vt de catarrho dictum est. Plinius
secundus (vt etiam citatur à Donato lib. De medic. ca-
pit. 12.) inquit, quod succus hedera mundissimus cum
vino instillatus plurimum facit: item allium & capulas
cum adipe aseris; si coles & infundas. Quæ quoque sur-
ditatem

micarum (vt idem refert) contra surditatem aurium,
quoniam versissimam sit, sanabunt. Capillum item fel in-
stillaui graniter audientibus; & prodest: ac bubulum
lac cum felle caprino mixtum, & infusum auriculis gra-
uiter audientibus, restituit auditum; eodem auctore.
Libro autem De medicamentis quæ ad manum
sunt, Galeno ascripto, legitur, quod leporis fel recens
cum puri mellis porione mixtum, & in æpa corio repes-
sa n, in aurem immixtum, si qui nihil audiat, auditum
restituit. Ad cōpressa aurium foramina, quæ apud
Paulum hæc dicitur, Hippoc. quidem nihil ipsis
adhibendum præcipit: cum vero sæpe (inquit Pau-
lus) ab ægrotis cogamur; vtendum est hic myr-
rha, aloes, thuris, acaciæ pari singulorum modo:
aceto vel oui candido illinuntur, vel panis calidi
mela cum melle in pila tusa admoetur. Attritio-
nes auricularum in infantibus inflammatas, oleo
quod in æneo vase æuginem ab ipso ære contra-
xerit, ingit Aëtius inungit, & sanat. Plura vide
apud ipsum lib. 6. c. 89. De affectibus extra meum
aurium contingentibus. Si fissura in auribus fiant, sic-
cantia vnguenta magis conferent; quæ ex mala-
ctis componuntur, pompholyge, lithargyrio,
axungia addita vel seuo arietis, vel hirci. Nunc
ad eos affectus accedamus, qui in adenibus iuxta
aures adiacentibus oriri consueverunt; nempe
parotides.

OBSERVATIO XVI.

De parotidibus.

ANno 1567. tempore verno, Delphis febris
quædam pestilens vna cum parotidib. ap-
parebat, sed & in aliis locis quibuldam & bubo-
nes & anthracis cum peste suppurabant. Sunt
autem parotides abscessus glandularum, sed auri-
bus sæpe numero pestilentes, & omnino pestiferi;
nonnunquam maligni. Quales nonnulli scribunt
(cuius & meminit Holerius) viguisse anno 1570. mul-
tosque rapuisse. Nonnunquam vero clementes
sunt, quales viguerunt anno 1545. & præcipue
vere. Nonnunquam sunt critici: qui si intro re-
deunt, sunt lethales, nisi alui profluuium vel infi-
gnis excretio subsequatur. Nam si in altum (inquit
Paul. lib. 3. c. 33.) recurrat colluuiis, periculum
hæc mediocriter subsecuturum est. Parotis enim
(inquit) glandularum sub ipsis auribus affectus
est; materia morbi illic emanante: modo à capi-
te, humoribus videl. in eo obstructis; modo à reli-
quo corpore, in febrib. crisi expertis, oritur. Alij
tardius erumpunt, alij celerius: quidam cum odo-
re & inflammatione: quidam sine his; de quibus
postea suo loco. Verum de iis nunc loquentes, quæ
se ferebant; & pestilentes erant. Qualis illa erat
anno 1567. apparebat, aliquid malignitatis præ-
se ferebant; & pestilentes erant. Quis illa erat
parotis, quam vetula mulier Maria Dama nomine
habebat. Ad hanc cum sexto die prius accitus es-
lebat, & circa corangebatur; & parotides non
tantum aurium glandulas occupauerant, sed &
fere totum guttur ac collum. Cum autem ibidem
ante me vocatus erat, & nunc quoque præsens el-
set; locum affectum inunxerat cum vnguento nu-
tricio ex lithargyro, aceto & oleo ros. confectio: &
hæc quidem: cum hic non deberet materiam ve-
nensolam repercutere, sed potius foras euocare.
Si enim alre (inquit Paulus) adhuc delitescens parotis
in remorem non tollitur, natura debet adiuuari præsidij
que coactas sordes extrahant, vel etiam cucurbitula ag-
glutinata, vel crebro forum vsu. Atque hæc in prin-

cipio faciendâ; etiam venæ sectione præcedente
(cum hic inflammatio adesset) ex cephalica; quæ
prætermissa erat: & quia iam sextus dies, & in
vetula; id iam tentare non fuimus ausi; sed eius
loco, aluo prius soluta, cucurbitul. cum scarifica-
tione scapulis admoimus. Et cum parotis inflam-
matione tentata in tumorem erumpebat, non re-
pulsorij aut eiusmodi frigidis exsiccantibus, sed
e contrario, iis quæ leniunt & concoquunt, vt en-
dum erat; cataplasmatis, ex farina hordeacea aut
triticea, aut semine lini cum mulla; aut fenugra-
ci, aut althææ, aut chamamelorum diluto inco-
ctum. Nos autem imperauimus, vt cataplasma
imponeretur ex foliis maluæ, radice althææ, bu-
tyro & farina hordeacea confectum. Et ventrem
purgauimus cum infuso rhab. & senæ; addito syr.
ros. solutiuo. Interim ad roborationem & mali-
gnitatem febris frequenter capiebat ex syr. de li-
monibus, & de acetositate citri. Et non diu post
febris cessauit: & tumore ex cataplasmate matu-
rato, abscessus ruptus est; materia multum putri,
non tantum circa aures, verum etiam circa collum
effluente. Aperta itaque parotides, teste Gal. vlcer
fit: cuius curatio perficitur medicamentis mun-
dificantibus & abstergentibus; vt est mel ros.
succus apij, terebinthi lachryma, & similia. Qua-
re chirurgo qui vna nobiscum erat, iussit vt sordes
hoc vel simili modo ab vlcere repurgaret; eoque
absterfo vt consolidaret. Quæ equidem intentio
consolidandi cum perficiatur medicamentis fa-
cultate generandi carnem & vlcera implendi,
præditis; qualia sunt diapompholygos, aloë, &
myrrha ac thus & ros. Atque vlcer consolidato,
succedebat vltima intentio, nempe cicatricem
pulchram inducendi: quam chirurgus in fine ab-
soluebat. Præceptor meus ad cicatrizandum in
hoc casu capiebat pompholygis, cadmiæ, lapid. hæma-
rit. cerussæ omnium dilutorum an. 3. j. myrrhæ, aloës, thu-
ris an. 3. b. olei luteorum qui 3. j. pulueriscentur om-
nia in tenuissimum puluerem, & inserta conca-
uato citri pommo, succo citri adiecto, omnia appo-
nantur: & pomum iis plenum, ignitis cineribus
appositum lenta ebullitione ebulliant; continuo
agitata baculo, donec linimentum perficiatur: &
vtitur. Et ita hæc vetula præter multorum spem
fuit curata.

SCHOLIA.

Nominant autem hunc affectum Græci παρο-
τίδα: à Latinis quoque parotis nuncupatur. Parotides
Sunt autem parotides ex inflammationum gene-
re: quæ glandulis circa aures affectis fiunt, Galen. parotides
teste 3. de comp. medic. secundum locos. Ex quarum
descriptione liquet quæ partes in eis afficiantur;
quia adenes iuxta aures: quod absque alio indicio
sola inspectione patebit. Affectus vero (cum & ge-
nere inflammationum sint) erit morbus in quantitate;
proprie in excessu primo sicut reliquæ inflamma-
tiones, vt Donatus annotauit, secundario vero in
intemperie & soluta continuitate; id quod di-
gnoscere ad sensum licebit; absque alia signorum
inuestigatione. Prouenit autem bifariam: Vno
equidem modo per viam crisis: & illud fit per
motum naturæ, præsertim in febribus: Altero
modo per rationem symptomatis seu accidentis;
vt in pestilentia ex malefica materia sursum: mo-
ta ad molles & laxas partes aurium glandulosas.
Et ex natura mala febris pestilentis & veneno cor-
di communicato, ægrum perimit: vel ob vicini-
tatem, quam habet ad cerebrum, sua venenositate
ægrum necans. Sed de eiusmodi tuberculis vene-
nosis

affecto prius inuncto hoc linimento: ℞. axungia porcina, anseris gallinae an. 3 ℔. olei liliorum 3 j. misce. Deinde magis digerentia apposui, in hunc vel similem modum. ℞. farina fabarum, farina bordei an. quar. j. mellis communis quar. ℔. leuiter coquantur simul, & fiat cataplasma. Postea cum materia resolueretur, & remaneret aliquid indigestum, dolorem tamen non faciens, diachylon apposui mag. iracundum ad modum cerati: quod egregie iuuabat; & sine suppuratione tandem delinuit tumor. Alioqui ad suppurantia deuenissemus: uti in altera fecimus, cum non digeri posset, ob materiae multitudinem & crassitiem, & in pus verteretur. Tunc maturantia & suppurantia apposimus, in hunc modum: ℞. malua m. j. rad. albica 3 iij. caput liliorum alborum, siccum mm. xv. coquantur & pistentur diligenter, & per colum tr. mittantur: quibus adde axungia porcina 3 iij. farina frumenti seminis lini an. 3 i ℔. olei communis vel lilicci q. suf. reducantur ad formam cataplasmati. Postremo, ut fortius esset, adiccimus 3 ℔. mucilaginis seminis sanngiaci: deinde, ubi incipiebat materia suppurari, ut magis traheretur ad circumferentiam, fermentum acre posuimus in cataplasmate dicto. Quod si hoc non sufficeret, ad vnguentum basiliconis cum pice, deuenissemus. Et cum iam satis maturum esset, & non rumperetur ob cutem durior, accito chirurgo, ferro id aperuimus. Qui & vlcus deinde detergebat, implebat, cicatrizabat, ut in aliis partibus fieri consuevit.

SCHOLIA.

5 Eodem fere modo curantur parotides ex materia melancholica, adiectis iis quæ melancholicum succum respiciunt, ut est syr. de spithymo, de fumaria, bugl. & fiat purgatio cum elect. lenitico, confectioe hamech, & similibus, & quod ad topica attinet, sicut magis emollientia ob duritiem, cum facile in schirrum mutantur. Et si ipsæ parotides inueteratæ ac induratae fuerint,

Libri duodecimi finis.


OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus tertius.

DE NASI AFFECTIONE.

OBSERVATIO I.

De lesione olfactus.

1 ORATOR sensus, cum in prioribus cerebri ventriculis, seu sinibus perficiatur, teste Galeno, elatis ad ipsos per coli foramina (id est per Græci appellant) vaporibus, cum natura in fabricandis cuiusque sensus instrumentis, similitudinem sensibilibus secuta sit, & propterea vaporis quodam modo simile proprium odoratus instrumentum esse oportebat, ut lib. de instrumento odoratus liquet. Sic Magister Petrus Bassius presbyter Alcmarianus, vir admodum doctus & valde senex, nobis familiaris, narrauit mihi aliquando nullum se odorem persentire. Et quia

vox oblata non esset, intellexi vitium in prioribus cerebri ventriculis harere, cum foramina narium minime obstrusa erant. Pars itaque hic affecta ad cerebri ventriculos pertinebat: alioqui si vox quoque mali contagium senserit, laboriosior quodammodo reddita, colatoris ossibus oblatis affectio tribuenda erit, quemadmodum Paulus testatur. Et cum hic cerebri ventriculi priores affecti erant, id ex intemperie sola contingebat, quanquam etiam ex humorum copia oriri posset. Sed erat hic nuda cerebri intemperies frigida & humida, cum neque capitis grauitas vlla hic adesset, neque materia de capite ad nares aut os per modum catarrhi deflueret. Consului igitur, ut frequenter globulum sindone obuolutum pulvere maioranæ & origani ac seminis nigellæ repletum olfaceret, & ut odoramentum fieret ex cumino

mino & aceto. Hic tamen cum senex esset sedens in vestibulo post aliquot annos, cecidit; ac illico & repente mortuus est. Verum ex apoplexia, ignorem, an tequam ad illum subito accitus peruenire, animam exspirauerat.

SCHOLIA.

6 **A**bsolutis aurium affectibus, ad eos qui olfaciendi facultati ac naribus contingunt, transiendi esse censui. Solent autem hic auctores nisi anatonem proponere. Verum cum hoc præceptum meum Benedictus Fauentius fecerit in sua præxi magna, ad eum locum lectorem relegamus. Hoc tantum addentes, quod aer exterius attractus intra nares, qua ad palatum foramen patet, distribuitur: atque eius plurimum in pulmone trahitur, reliquum in cerebrum abit, & hinc nasi quidem cavitates iter quoddam est, qua iter ad cerebri, ac discendit: neque alia rector via accedunt, præter nasi foramina inueniri potuisset, quæ cerebri purgamenta educeret, & olfactu similes odores admitteret: nam cerebri sordes non fluide modo sunt, & exiles, sed etiam crassæ & purulentæ, ut in destillationibus, & grauedinibus videre licet: eas mucus appellamus. Et ita notum est olfactus modo est in ventriculis prioribus cerebri, modo in carunculis mamillaribus, modo in foraminibus nasi obstructis. De quibus latius videas Alex. Fauentium Veronensem lib. 4. c. 3. Ex iis quoque quæ diximus patet, quæ pars sit affecta: si priores cerebri ventriculi, vox non est oblata, sed incolumis manet; quod in olfactoris oblatis non contingit, nam ibi vox læditur. Nares enim olfactui, & spirationi officium subministrans; propterea & voci non nihil conferunt. Admittitur olfactus cum angustia narium supremæ, quæ isthmoides vocantur, populo aut carcinomate tentantur, aut carunculis, aut continuante rheumatismo; his enim viæ ad cerebri ventriculos opplicantur: qui cum male habeant, olfaciendi vim adimunt; nihilominus vox canora est & liquida. Ex istu quoque aut vulnere intus coalescente callo vitatur olfaciendi potestas: ea vitia à natiuitate, vel si diuturna fuerint, nunquam sanantur. Olfactus igitur læsus (inquit Paulus) si vox seruetur incolumis, ad cerebri ventriculos morbus referetur, ex intemperie, aut mali humoris exsuperantia. Si vero colatorij meatus affecti sint, obstruuntur, & non intemperies sola, causa esse videtur. Et proinde licet odoratus oblatio perpetuo symptoma sit in genere noxæ functionis sensibilibus proprie olfaciendi, siue ea functio diminuta sit, ablata seu deprauata, non ad vnum tamen morborum genus sequitur: sed si colatorij meatus affecti sint, utpote obstruati, morbum in se anteriores ventriculi oblatis sint ob intemperiem aliquam, eadem via innotescet, & ex notis, quas de dolore capitis diximus. Si odoratus olfactus ob consuetudinem narium excrementis, mucos succis obstruentibus qui & propriis indicibus haud difficile est comprehenduntur. Grauis hæc affectio est, minimeque despicienda, ubi anteriores cerebri ventriculi nedum intemperie affecti, sed humore oppleti sint; ob spiritus animales in ventriculis contentos ac latos, facile in earum, apoplexiam, comitalem morbum, humoribus diuturnis auctisque ut pleni ventriculi sint, commutatur hic affectus, præsertim iis, qui tota nocte

supini cubant, Gal. teste lib. de instrumento odoratus. Ita hic Petrus Bassius cum hoc malum non magni faceret, & remedia deinde rideret nostra, post tres quatuorue annos, uti metuebamus, subito (ut diximus) extinctus est. Vbi functio odorandi plane ablata est, sanitati (ut præceptor meus Bened. Fauent. sentiebat) restitui non potest: & quibus deprauata est, magna ex parte periculosa exiit, præsertim si in acutis morbis accidat, & dolor quispiam putridus ac fortidus sentiat. Si ab ineunte ætate & natalis sit, curari nequit. Si à catarrho, eo curato curari potest, & ab obstructione, meatibus reteratis. Verum si ex sola cerebri intemperie olfaciendi facultas oblata sit, contrariis dumtaxat remediis curabitur: calidis, si frigida fuerit intemperies, & frigidis, si calida; si sicca, humidis; ut in cura doloris capitis ostendimus. Summatim, curatio consistit in causarum remotione. Si ex oppilatione isthmoidum, aut ex humore, à catarrho defluente, catarrhus prius curabitur. Si caro addita est in naribus, vel verruca, vel hæmorrhoids, incidente cultello, vel ferro vrente, vel secante, laqueo manuum opere per chirurgos curabitur. Si ex humorum copia, cerebri ventriculos opplente, vel colatorios meatus obstruente sanguinis missione aut purgatione vacuanda erit, iuxta Paul. prout ipsa humorum copia exigit, deinde ad topica veniendum. Sed perunque ex succis frigidis læditur, iuxta eundem, ideo & pituitam (ut in destillationibus fieri assolet) quoque modo de capite deduci tradit & sternutamentis & odoramentis, vniuerso tamen corpore prius repurgato. Eadem & Aëtius ferè præscribit, auctoritate Archigenis, victu attenuante præscripto, infirmis in scioribus locis degentibus & gymnasio pro viribus vtentibus somnoque moderato & nocturno, nam diuturnus & diurnus, incommodus eis existit: iubetque inter dormiendum, ut ceruicalia sublimia habeant, & in latus reclinentur, non tamen secundum affectam partem, præsertim si contingat vnum ex colatoriis meatibus esse obturatum: per intervalla etiam aerium rerum esum adhibent. Nigellam tufam cribratamque & oleo vetustissimo addito probe tritam per nares infunde & pharmacum per inspirationem vehementius attrahere iube: aquam adesta in ore, agro continendam exhibe. Hoc modo Gal. adolescentem curauit à diuturna tum grauedine, tum destillatione odorandi sensum lædente, ut patet lib. de instrumento odoratus. Vide plurima remedia apud Aëtium & præceptorem meum: quibus si malum non cedat, caput radunt, sinapismum adhibent vsque ad frontem, faciem & nasum, postea lauant, & theriacam ex Pauli consilio sapè assumunt. Præceptor meus etiam adhibet cauteria in futura coronali, vel in prima aut secunda vertebra colli, candenti ferro, alioqui si non fert, ad loca maritima vel balnea mittit, & cadentem aquam supra futuram per mensem suscipere iubet.

OBSERVATIO II.

De narium grauedine.

1 **A**dolenti cuidam circiter 20. annos nato non solum ex naribus spiritus solidus prodibat, verum etiam ex ore, ita ut vix aliquis illi assidere posset. Hic consilij causa cum ad me venisset, animaduerti huic gingiuas coruptas esse, & scurbutto nialo (de quo alias dicemus) laborare, exhibui syrupum meum sceletyrbicum, tum ea quæ ad scurbutum

stomatibus cancris in narib. Demum quoniam ex cap.
in naves acrim, ac viciatorum humorum defluxu pro-
terit, quamprimum caput sicetur, ac roboretur oportet;
Gal. auctore 3. de compos. medic. secundum locos:
coq. siccatu ac roborato, ad naris purgationem veniendum
erit, scopo hoc in ozanis proposito, ut affecta pars per per-
missa facultatis pharmaca, tum repellentia, tum dissen-
sientia resicetur. Caput itaque tondetur, assidueque ac
vehementer perficitur: demum qua siccandi ac firmar-
di facultate praedita sunt sincipiti ac toti capiti peraso
(ut dictum est) imponatur, veluti est oleum myrtinum,
rosaceum, pulvis corallor. ac santalorum, ros. rubea. sac-
cer. mastiches, manna thuris, acetum, & alia huiusmodi.
Cunctae quoque sint cotone intertextae & consperse pulvis-
culis, qui siccent & roborent: quales sunt ligno aloes,
gargophyllis, maceve, moscata nucis sicchade, salvia, ma-
iorana, mentha, yoremarino, betonica, lavendula, & aliud
id genus: quorum solum medicus praesens capere potest
ea. de dolore capitis. Aetius & Alex. applicant myrrha,
thuris, an. 3. j. coctiles integras v. quibus ceram, & al-
bumina ovorum duorum addito, commiscetoque, capiti que
cum linteis diebus novem inducito. Topica vero deinde
naribus applicabis repellentia: repellunt enim aufera
tum acerbis, & dissentientia, dissentiant vero calida &
sicca facultate praedita. Celsus in narem infundit vel in-
jicit mel cum exiguo resinae ceribinthinae, quod specillo
quoque lana involuto sit: attrahaturque spiritus is succus,
donec in ore gustus eius sentiat: sub his enim crusta
resolvuntur, quae tamen per sternutamenta elidi debent.
At prorsus ulceribus, idem vaporem aquae calidae subij-
ciendum tradit, deinde adhibendum huiusmodi ex vino dis-
tillatum, aut mentha seu marubij succum seu omphacium
melle adiecto, specillo lana involuto & in ea medicamentis
intinctis ulcera implenda. Rursumque linamentum in-
volutum & oblongum eodem medicamento illinendum,
dimittendumque in narem est, & ab inferiore parte leniter
deligendum: idque per hyemem & per bis in die, per aesta-
tem & autumnum, ter fieri debet. Gal. auctoritate Ar-
chigenis, succum calamitae naribus infundit, vel aridam
per fistulam insufflat: ex succo malorum puniceorum
in aeneo vase cocto medicamentum parat. Tum ex cerusa,
genti spuma simul contritis, vinoque & oleo myrteo
admixtis linimentum paratur ad mellis crassitudinem. Sed
veteribus ulceribus (qualia hic sunt) adijcienda myr-
rha, plumbumustum, alumen, sutorium atramentum
mel & acetum vnguento praedicto: quod ozanas tum
alia ulcera narium egregie curat. quib. & tu vii positis.
Interea & decocto bagioxili, quo ego malum alias, ad-
hibitis etiam topicis dictis vel similibus, curavi. Hac
ego spero profutura, modo dextre a medico tuo praesente
subibeamur. Vale, ex nostro Musaeo.

Petrus Forestus reipubl. Delphens.
Medicus.

SCHOLIA.

9
Narium
ulcerum
variae dis-
ferentiae.

10

Non omne vlcus in naribus ozana est: nam
saepè à pituita falsa vlcera concitantur in na-
ribus, quae crustulas ducunt, & facillè curantur.
Ozanis malignitate respondent vlcera in lue ve-
nerea suborta, quae ut aliquando ut ozana can-
cerum referunt: quod ubi fit, magna desperatio
est neglectis eiusmodi vlcerebus. Os nasi cariem
ducit, atque corrumpitur, unde forma naturalis
nasi deprimitur & deperditur. Neoterici qui-
dam vniuersaliter de vlcerebus & escharis na-
rium tractant, variasque distinctiones faciunt in
ea quae externa sunt & visui manifesta, & inter-
na quae in parte inferiorum narium sunt, quaeque

intus magis latent, nec ita manifesta, eadem &
prava quae in ethmoide aut colatorio existunt,
praviora vero & prauissima quae ad carunculas
mamillares, & usque ad cerebri substantiam
perueniunt: quae vero superficialia, leuiora, ca-
uernaosa & absconsa valde difficilia, quae diffi-
cillime sumuntur ex parte membri affecti, ex par-
te vero vlcerebus, alia crustosa, & quibus nihil
emanat: alia saniosa & humida: alia munda:
alia sordida, virulenta, putrida, corrosiva, can-
crofa, fistulosa, recentia, diuturna. Hisa. & va-
rias causas adiungunt, vel quod fiant ab apostemate,
à pustulis corrodentibus, vel à causis primitiis, vel
nere, percussione, casu, male curatis demumque exul-
ceratis, ab humoribus acutis falsis, ut dictum est à cata-
rho, aut à vaporibus eleuatis & corrodentibus. Quod
ad signa attinet, externa visui patent: interna
occulta & profunda, ex sanie & virulentia ef-
fluente dignoscuntur ex crustis egredientibus &
dolore intus percepto. In ethmoide obturant
nares: in colatorio sanies foras per os egredi-
tur, & si ab osse corrupto subtilis est, si ex car-
tunculis mamillaribus, olfactus impeditur: si
ad cerebrum anteriùs perueniat, sensus comuni-
nis laeditur, & febris adest, profunda & am-
pla ex multa saniei egressione innoscunt: munda
ex laudabili sanie, sordida, ex crassiore, vi-
rulenta, ex subtiliore, putrida, ex calore poris,
corrodentia, ab exitu sanguinis cum sanie, aut
post saniem corrosione tendente ad partes sa-
nas: cancrofa, ex cancri signis praeparis, ex do-
lore cum vehementi ardore, cum sanie olida
egrediente ab vlcere: fistulosa à diuturnitate &
sanie subtili, modo pauca, modo multa profu-
sante. Causae vero specierum & potissimum causa-
rum se ipsas ostendunt plerumque, & sic si ab
apostemate praecessit apostematum febris: à ma-
teria catarrhali; ab ipso sensu: à profusio san-
guinis vel ruptura venarum, arteriarum, aut
causticis medicamentis admotis, haec tum simi-
lia ex relatione infirmi habentur. Prognostica
diximus. Externa quidem superficialia, munda
da recentia, facilius curantur: occulta profun-
da, immunda, ossibus narium & colatorio por-
tissimum communicata, difficillime: putrida,
corrodentia, cancrofa, praecipue mamillari-
bus carunculis & cerebro communicata, perni-
ciosa existunt. Diuturna quoque difficulter san-
nuntur, & fistulosa vix ad sanitatem perueniunt.
Vniuersalem curationem horum diximus: sed
quod ad vlcerebus particularem curationem atti-
net, praecedentibus vniuersalibus remediis, de
quibus antea dictum est: Si vlcus sit crustosum, &
emolliendum cera & oleo ac adipe gallinaea, & vapore
aque calidae vel decocto emolliente naribus admoto: &
ex proprijs remedijs est butyrum recens. Sic nos anno
1563. cum pueri variolis laborarent, crustasque
circa nares haberent (ut in lib. nostrorum Obser-
u. de febris diximus) ita ut anhelitum per nares
trahere non possent butyro recenti saepius loto-
cum aqua ros. vsi sumus: quo omnes crustae de-
cidiebant. Illud experimentum ponitur à Guai-
nerio diff. 3. de peste cap. 6. de variolis circa fin. alij
vero caliditate praesente miscent cum oleo violae.
Alioqui, si non adsit caliditas, deponunt crustas
cum oleo zizaniro, amygd. dulc. pingued. galli-
nae, muccag. althaeae, lini, fenug. & his similib.
Postea remota eschara si simplex sit vlcus con-
solidant cum vnguento de cerusa, vel vnguento

de tutia narib. immisso. Si vero vlcus fuerit hu-
midum & immundum, cum aqua mellis nempe
subquaduplo aquae repurgetur. Alioqui si adsit
signa frigiditatis cum vino decoctionis mellis,
vel si sit mundum, post ablutionem caro regene-
retur cum iam dictis, & sigilletur tetrapharma-
co ex litharg. aceto & oleo, pauco alumine im-
mixto. Si sit sordidum, maiori eget absterfione,
ut oxymel. simplici vel scillino, postea caro gene-
retur & cicatrifetur, ut alia vlcera. Verum in vi-
rulentis maiori egemusexsecatione, ut sang. drac.
scoria ferri, tutia cum succo plantag. aquae alu-
minosa, quae puluerifata cicatricem simul indu-
cant, ac si tutia cum thure aut sarcocolla & oleo
ros. & cera misceatur, carnem quoque generabit.
Si putridum existat vlcus, cum carne aut osse
corrupto, aut corrodens, aut fistulam vel sinum
habens, corrosio cauterifetur, ut Arculanus docet,
cauterio ignito ad partis figuram, si malitia fue-
rit magna, vel vng. Egyptiaco, de his vide Ar-
culanum: & repurgato loco caro regeneretur, &
tandem cicatrifetur. Si os sit coopertum, torru-
pitio alumine & vitriolo corrigatur. Si vlcus sit
occultum & profundum, ad colatorium vsque
mundetur attractione hydromelii per nares, &
si indiget exsiccatione, oxymelite simpl. aut
composito, & ubi caro putrida adsit, aliquid vn-
guenti Egyptiaci per nares instillatum, capite
ad posteriora conuerso, fortiter fugatur. Reli-
qua vide apud Arculanum & alios. Interea acci-
dentia corrigenda: ut si adsint dolores, cum lacte
maribus imposito aut vitello oui & oleo ros. De
victu iam dictum est. In ozanis quoque crustam
abiciemus pingui aliquo ut humefeat, neque vi-
exrahemus eam, ne plus vlcus augeamus distum-
pendo carnem. Si recens sit, satis erit ros. ger-
minib. aut floribus lentis in aqua & vino austero
decoctis saepe ablueri: si non sit satis, adde alu-
men. Sciendum enim in ozanis alia quidem re-
media leuia esse, alia acria, quibus in rebelli malo,
serpente & putrido vtendum. Leuia sunt, rosa
secca inspersa, plantago secca, aliaque apud Hol-
lerium de compos. med. cap. pro vicio de narium affectibus.
Fortia sunt, metallica acria in leuibus sine morfu
siccantia, ut recementum plumbi, pompholyx, cerusa.
Repurgant, hydromel. decoctum marubij, centaury,
guaiaci, mixto aliquando sero lactis, ut acrimonia retun-
datur, reliqua apud eundem videas. Si in conspectum
non veniat, arida inspergantur, ut pul. ex tutia,
thoris cortice. Si exedit ac fardet, puluerem praeci-
pitati alij apponunt specillo: quidam admissi-
cent succum plantaginis, ut minus mordeat, reli-
qua ad chirurgum pertinent. Si vero vlcera na-
rium sint maligna ex lue gallica, vtendum reme-
diis, quae contra hunc morbum adhiberi solent:
etiam illitu emplastris mercurialibus.

OBSERVATIO VI.

De navium carcinomate.

Carcinoma aliquando narium partes vexat:
quod ex nimia aut tempestiva polypi saepe
curatione fit, aliquando & per se oritur, serpit,
& spiritum impedit & nares dilatat, nec attingi
nec irritari vult, sed solo mitigatorio medica-
mento indiget. Quod empiricus quidam imperi-
tus non animaduertens, cum ad illum infans ni-
stri Ecclesiae in Pynacer (sic enim pago nomen erat)
narium vlceratione laborans & polypum, quasi
in nares habens, deferretur Delphos, consuluit,
ut oleum aliquod calidum, nescio quod, paren-
Pet. Forest. Tom. 2.

tes quotidie calide in nares pueri infunderent.
Quod cum aliquot diebus fecissent, miser infan-
tulus anno 1581. non solum vlcere narium corro-
dente cancrofa, verum etiam totius faciei corre-
ptus est: ac tandem cum nasus ac tota facies quasi
depasta & comesta essent (res irruentia & aspectu
horribilis) ad me & chirurgum defertur, ut ali-
quod solatium infanti tum parentibus accederet.
Sed viso infante mortem praediximus: interea ad-
hibebantur leuia remedia & diapompholyge, &
quae ex succo solani constabant. Quibus vita qui-
dem protacta est ad tempus quanquam tandem
puer totam faciem exesam habens (procedente car-
cinomate, ad labia & mentum, quae callola erant & du-
ra: frontem quoque occupante tum oculis) miserime
obierit.

SCHOLIA.

Carcinoma narium (ut refert Benedictus Vero-
censis, c. 17. lib. 4. aliquando ad palatum re-
pit: & quanquam tantum mitigatorio medica-
mento indigeat; tamen in magis adultis prodest
sanguinis missio, ventrisque deiectio, ac victus ra-
tio inptinis iuuat, quibus atra bilis expurgetur.
Interea rosaceum modico camphorae adiecto, na-
ribus inditum conuenit, vel solani succus. Anti-
quiores tamen (eodem teste) dracontij semen con-
tritum ex melle vtilissimum putabant: addereq;
hanc mixturam per specillum in nares suadebant:
quae habent minij sinopici, chalciditis, sandarache
p. 3. atramenti suauij p. 2. Verum quod hic infans
carcinoma incurrit ex oleo calido, non fuit mi-
rum, cum vlcera narium facillè in aliud malum
transeat, cum per se satis maligna sint, & facillè
in carcinoma mutantur, & ex carcinomate exagi-
tato non diu post mors subsequatur, cum lenio-
ribus tantum medicamentis huic malo blandiri
oporteat. At Iudocus quidam Cornelius apud
Delphenses Carpentarius, cum nasi rubedine in-
star cancri aliquot annis vexaretur, ac frustra chi-
rurgorum ope vltus esset, ad nos tandem venit ora-
tum, ut si quo modo possem, huic turpitudini
opem ferrem. Huic consului, ut secta vena ce-
phalica & corpore repurgato ab atrabile, à cibis
atram bilem pignentibus abstineret, & hoc lini-
mentum praescripsi, cum in fine vetis ad me ve-
nisset. 2. succi solani 3. iij. pulu. diapompholygos 3. iij.
cerassa abluta cum aqua ros. & iterum exsiccata 3. i. b.
discantur panco oleo rosaceo adiecto & cera alba liqua-
ta, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec
ad spissitudinem linimenti concresecant, quo opti-
me postea se habuit; & miraculi instar cura-
tus est.

OBSERVATIO VII.

De muliere polypo laborante.

Velut ex vlcere genere ozanae, sic quoque
ex genere tumorum praeter naturam, affe-
ctus quidam in naribus generantur, qui à Graecis
μαρμαρις, à Latinis (veluti à Celfo) polypi quoque
nominantur. Hoc malum, nomen à similitudine
ad aliquid extra positum accepit (teste Gal. 2. merb.
med. & 3. de compos. medic. secundum locos) velut
elephantiasis, cancer, Thymus, Myrmecia, ficus,
cum quibus similitudinem habent. Proprietate
substantiae pisci sic nominato, ut scribit Gal. si-
milis est, quam similitudinem esse ait in colore &
consistentia. Paul. lib. 6. aliam similitudinem ad-
dit: & est à scyrthis, quos etiam pedes vocant,
G 3 quibus

quibus inniti & inhære, ac quodammodo pēdere videtur. Intelligit pedes non quales in cancri, sed quia tunica angusta, & corrugata, velut pediculo amplectitur nares. Rhafes etiam hæmorrhoides appellat: non quod diuersum sit malum, sed quoniam duplici nomine est nominatum, quoniam ani excrecentias (*ut doctus etiam Lacchius annotauit*) imitatur, quas hæmorrhoidas dicere solent. Et sic delineatum polypum habemus.

6 Tumorem nempe præter naturam, velut ex initis quibusdam exilibus pendente, atque in latum sese pendente, ac si polypum scirrhis è lapide pendente videres: quo alligata est nasi interna tunica, quæ sensim humore repletur, & extenditur, 4. *met.* Ex his patet, qui vere polypus dicitur, mollis substantiæ est, pendens in nares, aut etiam extra, si multum excrecat, & situs sit imis partibus quod si in summis, magis vergit aliquando ad palatum, & in os descendit, communes meatus obstruens. Vnde Celsus c. 8. lib. 6. recte dixit, quod polypos est caruncula, modo alba, modo subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modo ad labra pendens, nares implet, modo retro, per id foramen quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increfcit, ut post vnam conspici possit, strangulatque hominem, maximè austro, aut euro flante, fereque mollis est, raro dura: distatque polypus, iuxta eiusdem Celsi sententiam, à reliquis carunculis (*quod & Domatus animaduertit*) quæ naribus nascuntur: quoniam illæ similes sunt muliebribus mammis, ac in imis partibus narium, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent, etsi eiusdem naturæ sint polypi & carunculae, quas Græci *ἀρτία* appellant, Paulo auctore. Iam quoque tumores, qui duri fuerint, & tetti colore; & omnino cancerum referentes, non proprie polypi aut hæmorrhoides dicuntur. Et de his loquitur Gal. aph. 6. lib. aph. 36. occultos cancri circa palatum euenire dicens, scilicet in ea parte quæ naribus communis est: ibi n. *apparent visui, quamuis & sedem habeant in naribus.* At polypus, ut dictum est, mollis est: è naribus pendens, etiam aliquando prolapsus per palatum in os descendit: ut mulieri cuidam contigit tenuioris admodum fortunæ, quæ in platea D. Petri Delphis habitabat. Hæc a. circiter 3. annos (*ut ipsa se referebat*) materiam spongiosam veluti sanguinem concretum; vel potius humidam, mollem & carneam, corruptam, in nares propendentem habebat, modo albam, modo rubram polypi instar: quæ ex deflutione materiæ crassæ viscidæ à cerebro ad nares proculdubio originem sumperat: nam hæc mulier cum paupercula esset, supra caput portare solita erat vasculum satis ampla & magna, ceruicis tenuiore repleta, quæ ceruicem aliis rursus exiguo nummulo vno atque altero vendebat, hoc modo inopem vitam cum proliis sustentans. Auctor huius mali cerebrum erat, tanto onere oppressum & debilitatum, materia crassæ & viscidæ deinde ad nares confluxa, quam & proximam causam esse vult Gal. nempe pituitam sanguinis portioni admistâ, quæ & tempore crassescit prius in cerebro debilitato coaceruata, deinde ad nares fluxa. Ideo recte dixit Auic. accidere plurimum post capitis defluxiones, à materia minime acris, nam si acris fuisset, exulcerasset. Ad hanc vna cū tribus chirurgis accitus, an. 1567. Maio mense, & ad tempus non amplius ex nares propenderet tanquam delitisset sursum quasi retractus polypus, ad maiorem magnitudinem qui columbini excrefcens, & latior ac longior factus, per palatum decidit, ad vnam perueniens, gulam quasi præcludebat, ita ut miserrima mu-

lier neque cibum deuorare aut deglutire posset, neque tantillum potum subinde ebibere: interim polypus aliquando ab expiratione & exsufflatione altius ex gutture prodibat, mox intus in gulam magis delitescbat, ac pene suffocationis symptomata inferebat. Cum nihil per os lumere posset, gutture hac mole intercluso, mandari vti cassiæ molliem in interstitiis suis coherentem ex canna oblatam suctu linguæ, eaque sæpius paulatim ac continuo exsugeret, præterea vti saccharum candi dictum in ore aliquandiu detentum donec liquefceret deglutiret ad deterfionem & nutritionem similiter accommodatum. Chirurghi vero sanguinis fluxionem metuentes, incisionem adhibere non audebant, neque commode poterant: quare communi consilio hæc molles carnea sanguinolenta modo alba, modo rubra, paulatim filo serico benè cerato intercepta, ac deinde forti ligatione conficta, & liqore vitrioli sæpius inuncta, tandem miraculi instar paulatim pars consumpta excidit, & præter nostram ac omnium opinionum hominū, qui eam videbant misere torqueri, breui euasit, & sanitatem consequuta est. Verum ne malum à nouo denuo accresceret, totum corpus decenter purgauimus, ac capite roborato optime deinde habuit. Verum post integrum an. elapsum rursus an. 1568. 9. die Maii, dum ceruicem rursus in vasculis super caput portaret, iterum in idem malum incidit, ac in polypum denuo guttur occludentem, Theodor. chirurgus qui antea vna in curatione fuerat, amicus noster, habitans in insigni 5. annulorum Delfis, denuo ad illam curandam accitus fuit, sed cum ligatione quidem ut prius cum filo serico cerato strinxisset, pars quidem decidisset (*nam rursus ad magnitudinem cui columbini excrefcere*) & denuo augmentum paulo post cepisset, penicillo seu scopula intincta arlada (*nempe acano Paracelsi, cuius secretis in vlcibus & malis externis, magis quam internis fidem habemus*) semel tantum attigisset, polypus in se contrahebatur, & ita curatus est, ut amplius nunquam redierit.

SCHOLIA.

Pvat Rondeletius doctiss. *ozanas* ab aliqua specie polypi dictas esse, & miratur illam speciem graueolentem esse, cum tamen piscis ille musci odorem referat, & ozana ingratum & foetidum, quamquam ab illo nomen acceperit; scribitque ozanam, nihil aliud esse quam exulceratum polypum, aut vlcus illius partis fungosæ, quæ inter partes reperitur. Tamen si proprie loqui volumus, partes differunt hi affectus inter se forma sua ac figura, & etiam causis, quibus fiunt, & curatione, ut Holerius recte quoque sensisse videtur, licet vtrumque malum partem vnam affectam habeat: nam sicuti in ozana, ita in polypo nares quoque afficiuntur, quamuis subinde polypus per palatum vsque ad guttur descendat. Interim ozana ad vlcus pertinet, ut dictum est, polypus vero ex genere tumorum est præter naturam iuxta Gal. Paul. Acetium & Alex. Et ita polypus tumor est præter naturam, similis substantia carunculae polyporum piscium. Ozana (*ut dictum est prius*) est vlcus malignum, quod ab acris fluxione, & aliquando putridagione nascitur, atque putredinis signum est, quod grauius olet, quamuis neque omne vlcus narium vlcus (*ut antea adnotauimus*) ozana est. Sic causa differunt, cum ozana fiat ab humore acris, polypus vero à crassis & viscosis humoribus & quia ad sensum patet, non est multum laborandum, ut

notas eius repetamus. Et quamuis ozana & polypus quædam communia in curatione habeant, ut est totius corporis euacuatio, venæ sectio, & purgatio, & capitis ressecutio & corroboratio, in medicamentis tamen topicis differentia est: quia ozanis conueniunt, quæ repellant & discutiant, in polypo (*qui ab humore crasso & viscido nascitur*) quæ adstringant, incidant, tergeant, discutiant. Græci ob crassitatem polypum duriusculū esse volunt: Arabes modo durum, modo mollem, modo paruum, modo magnum, vel valde elongatum, aliquando nouum, aut diuturnum, radicem fixam habentem, aut minus inhaerentem, modo in parte inferiori, modo ad superiorem retractum, cum fluxu sanguinis, vel sine eo, cum dolore vel absque dolore, modo foetentem, putridum, qui facile ad cancerum tendat; modo habet figuram rotundam, & facile in varios colores mutatur polypi modo, nunc albus, nunc cineritius, nunc liuidus aliquando dorubeus apparet. Et quamquam polypus, ut præceptor meus Benedic. Fauent. cap. proprio refert, iuxta Hipp. ex sola pituita fiat, id tamen magna ex parte fit, licet etiam ex atro humore fiat, quamquam rarissime, cum ex polypo etiam cancer aliquando generetur. Sic albi polypi materiam pituitosam arguunt: rubri etiam sanguinis portionem: citrini, si adsit dolor & punctio, bilem: fusci, melancholicum humorem, qui vero albi & aliqua rubedine præditi, & ad tactum molles, facilius & celerius curantur, ruber quoque, salubrior, & celerius curatur, cum originem habeat à sanguine: liuidus durisque difficile admodum, cum facile transeat in cancerum: absconditus etiam deterior manifesto confirmatus chirurgiam requirit: Qui totus simul pendet, præcipue extra nares, curatu facilis est: contra difficilis, qui summo, & ad palatum communicat. Rursus qui naturam cætri refert (*quem polypi nomine non comprehendit Gal. nec Paul.*) pessimi generis est, & incurabilis: quamuis aliquam illi prouidentiam adhibere opus sit; ut Gal. ait aph. 6. lib. aph. 38. Ideo si contingat polypus in homine melancholico, hæc intemperatura curationi resistit. In aliis vero temperaturis facilius curatur. Et qui antiquus est, potius præcautione indiget quam curatione: verum cum hic affectus ex crassis & viscosis humoribus, plerumque generetur, proinde nõ abs re Celsus asseruit moriuntur hunc fere ferro curari; quamuis interdum medicamentis quibusdam inarescat. Verum si cancerosus fere polypus fiat (*ut dictum est prius, quod & idem Celsus testatur*) attingi non debet; quamuis magis spiritum impediatur, & nares dilater, raroque talis polypus fiat, cum sapius mollis sit. Considerata natura cuiusque corporis (*si nihil impediatur*) auctores hic sanguinem mittunt: Rhafes quoque phlebotomat, lacchino tamen videtur non necessarium; cum corpus excrementis liccat possit & caput longiore tempore, cum celeritatem non tantum exigat malum: ideo vltimum extenuantem præscribit & siccantem, ne excrementa gignantur, aut materia gignens aut fons generetur aut augeatur. Alexan. medicamentum purgans exhibet; nos catapotia coctia & foetida dare poterimus. Caput siccabimus lorionibus, pulueribus, frictionibus, cum caput rariū siccari ac roborari debeat, medicamentis appositis: nam hæc communis cura & ozanis & polypis, auctore Gal. de comp. med. conuenit. Et hic quoque vile est pituitam per os educere, apophlegmatismis videlicet. Neque ad topica propria in polypis conuenientia deueniendum, ni prius vniuersalia remedia iam dicta præcedant, caputque resiccetur ac cor-

roboretur. Verum in polypo curando distinguendum ex facilitate, vtrum vero eligibilis sit vti chirurgia aut medicamentis. Qui enim tenui pediculo inhaerent tunica narium, statim cum ipsa cuticula excinduntur. Postea, ut cruentum vlcus, sola posca curari potest, ut Paul. facit. At nos deligatura potius vsu sumus, cum per palatum penderet, & ob sanguinis fluxum excindi non poterat. Et sic optimum erit, si id fieri possit, vti deligatura, qua vtitur Gal ad abscindendas venas. Sic etiam lacchin, doctiss. hæmorrhoidas ani & ortas puel-
la in capite, & sæpe plurimum sanguinis fundentes sanauit. Nam hæc deligatura omnem excrecentiam abscindit, ubi ad radicem deligetur, & sine vulnere, aut profluij periculo: imo proflus sanam cutem dimittit: sit ex serico filo maxime (*ut nos fecimus*) vel ex pilis equinae caudæ. Nam intra 7. vel ad plus 10. dies arefcit tumor, & excidit, destitutus alimento. Reliqua vero chirurgiæ ratio à Paulo petatur: ab hoc enim alij auctores, ut & Auicen. omnia ad verbum mutuauerunt, id ex lib. 6. cap. 25. Curatio vero per medicamenta, post venæ sectionem, purgationem & alia, nempe capitis roborationem & exsiccationem. Scopus curandi est, ut diximus, polypum extenuare, incidere, siccare, & durare vel densare: particulatim vero confert ceratum ex cera rubra cum oleo myrtillorum, adiecta sexta, octaua, decima, duodecima parte ægyptiaci vel æruginis; vel psoricum Mesue, Macerionis emplastrum, tum reliqua apud Holerium descripta, tum apud Aëtium, lib. 6. c. 93. de curatione polyporum. At exemplis hæc clariora erunt.

OBSERVATIO VIII.

De polyporum, medicamentis curatio.

V Ir quidam an. 48. natus polypū in nares dextra habebat admodum sedum & aliquando ex nares propendentem. Hic viduus erat: quamobrem ut ab hoc malo liberaretur, consilij causa me accessit. Ut a. huius mali incrementum inhiberem, cum in vere essemus, imperavi præcedente medicamento leniente, ut altero die accito chirurgo venam cephalicam in cubito dextro incidere, mox toto corpore repurgato, & capite cucurbitulisque in scapulis cum scarificatione appositis, iussu, ut guaiaci decocto vteretur cum tenui victu: nam multis guaiaci vsus profuit. Partem deinde attingeret fortiter astringentibus, & parum causticis; qualis est hæc aqua vtilissima in principio adhibita, auctore Rondelet. ℞. vna. immar. lb. iij. corticum mali gran. balaustr. sumach. an. lb. ij. dissillentur, omnib. maceratis in aceto. deinde adde alumi. lb. j. vitrioli 3. iij. dissillentur iterum omnia simul, & aqua illa angustur pars affecta. Quidam vtuntur aqua separat. auri. Vel si nimium vehemens sit, viere experimento seu medicamento ex punice malis confecto, ipse enim probatissimum inuenit ad polypos & ozanas conferre. Sint a. ponica (*ut etiam Abrus lib. 6. c. 93. ex Gal. annotauit*) trium generum numero & magnitudine æqualia, austera, dulcia & acida; quæ adhuc recentia contundere oportet, totaque penitus infringere, ut succus exprimi possit; quem ubi lento igne decoxeris, & modice quidem, ut densetur, in stanno vase seruabis vel æneo. Ita enim coctus melius inhaerebit. Quod vero crassum solidumque dereliqueris, vel faciem ipsam expressam, rursus diligenter contundes; & deinde ex eo pastillos vel collyria oblonga conficies crassitie & longitudine differentia: deinde

exsiccabis, atque vsus tempore eliges ex iis, quod meatui narium agri magis accommodabitur, in quo polypus fuerit. Temporis enim progressu absque erolione polypum auferet. Quod si tibi humidior molliorque videbitur polypus, plus austeriorum puniceorum iniicies: si aridior, plus acidiorum. Quoniam vero collyria huiusmodi haud facile tolerantur, poterunt quandoque intermitteri, atque interim succum prius expressum in nares infundi, simulque ore hianti illini, qua parte palatum versus nasum perforatur, aut penna aut lana spicillo inuoluta. Facit hoc medicamentum tuto, quamuis longiore tempore, Quo tandem & hic, victu attenuante vtens & guaiaci decocto, conualluit. At aliter pueri ac molliores tractandi sunt; qui nec purgationes ita ferre possunt aut tenuem victum. Si puer 5. annorum in nare altera polypum habebat. Carpus ille insignis chirurgus hoc etiam remedio Galeni vsus est, & pueror habebat. pulu. 3j. exhibuit; & quia erat sauius alba parum nigricans, vsusest vnguento suo ad polypum valente. 2. cera alba 3iij. olei ros. 3ij. butyri antiqui 3vj. simul liquefiant ad ignem, deinde extrahas, & pone in aqua communis, & bene lauentur duobus vicibus: cui addantur ona num. ij. cum 3b. sublimati, misce: nimis forte est, fortasse 3b. imposuit. Præterea tangebatur aqua vitrioli; & curatus est.

SCHOLIA.

Ad polypos inueteratos. Ad polypos inueteratos Alexander præcipue commendat puluerem ex quatuor metallicis compositum, chalcantho, chalcitide, ære cremato & mysi æquali pondere seorsim tritis ex acetos, postea omnibus simul mixtis ex vino subactis, donec glutinosum fiat ad mellis spissitudinem: deinde in ollam recentem coniectis operculo imposito, lutoque oblitam in furnum demissis, vt in carbonibus illa redigantur: deinde furno exempta cum vino teras, atque ita iterum similiter torrefacias, redigatque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, vtare. Iisdem ferè rebus, quibus polypi curantur, reliqua narium sarcomata tolluntur: at si polypus in cancerum transeat, ne attingi quidem debet. At vlceratus continue abluatur succo solani densato in vase plumbeo, cum plumbeo pistello: aut ex succo foliorum salicis: demum medicamento vtendum quod siccet citra calorem. Huiusmodi est, quod ex tutia conficitur. Et sic polypus cancerosus curatur cum vnguento de cerula cum mineralibus propriis, vt tutia, cerula, cadmia, pompholyge, in mortario plurimo pistelloque plumbeo, & succo solani, diuissime agitatis.

OBSERVATIO IX.

De obstructione narium admodum diuturna, cum variis symptomatibus.

Adolens an. 20. natus, filius illius Ruisviki, qui febre ardente obiit, de quo egimus lib. 2. obseruat. nostrarum de febr. diuturna admodum & ab ineunte ætate obstructione narium laborabat, vt nulla pituita per nares exiret, neque anhelitus per nares trahere posset, nisi per os, etiã cum loquela per nares, tanquam iurus in osse ethmoide corruptio latuisset, sanguinemque per nares saepe reddebat, sanguine subinde copiose admodum fluente: frequenter etiam capite dolebat, quod & graue ac vertiginosum & valde debile erat, aderatq; totius corporis debilitas, eratq;

macilentus & rara constitutionis, frequenter catarrhis obnoxius, saliuam per os saepe exspuebat. Hic cum Lugduni Batauorum studiis operam daret, ad me missus est, vt curari posset, cum eius auunculus esset, inuito satis suo præceptore, curam dehortante, rato illum variis medicamentis oppressum iri aut moriturum. Curationem itaq; aggressus, cum paulatim expurgandus esset, & caput roboratione indigeret, vt ad bonam intentionem deduci posset, dietam commode obleruandam eidem proposuimus, ac in hunc modum cum 7. Iun. die ann. 1580. cum in ædib. Theodori Clutij pharmacopœi cognati sui ac nostri ageret, istis subsequenter remediis egregie præter opinionem non solum ab obstructione narium, sed ab omnibus aliis symptomatibus curatus fuit: 2. casia recens ex camis tracta, elect. leni. an. 3b. pul. sem. anis. 3j. pulu. cima. elect. 3b. sacch. candi dicto asperso, fiat bolus, quo probe aluum deiecit. Eo enim tempore satis lubricam & facilem aluum habebat. Die subsequenti sanguinem detrudere iussimus, ex media vena brachij dextri, sanguine moderate extracto, ob eius debilitatem & raram constitutionem; ad diuertendum & aliquo modo inhibendum profluuium sanguinis narium, quo frequenter etiam detinebatur. Deinde apozema infra scriptum eibit. 2. fumaria, beton. borag. bul. summitatum lupul. agrim. scabiose, chamæd. ebamæp. 2yos, an. m. j. flor. cord. p. j. sem. anis. 3i b. folior. senæ alexand. 3j. prun. damas. an. xij. vuar. pass. ab arill. purg. 3j. glycyrr. rase 3ij. coquantur in aqua com. pro 1b. cola. adde syr. de betonica, de fumoterra, de epithymo, m. 3j. misce, fiat apozema pro 4. dosibus matutinis: quotidiè ex eo quater vel quinquies aluum reddebat, neque debilitabatur. Postea omni die mane accipiebat cochlear vnum syr. de beton. Deinde ad decoctum sequens hagioxyli venimus. 2. betonica, fumaria, acetos. borag. bugloss. summitatum lupul. agrim. chamæd. chamæp. an. m. j. flor. cordial. p. j. hagioxyli cum corice limati 3i b. folior. senæ alexand. 3j. vuar. pass. 3j. glycyrr. rase 3j. prun. damas. num. xij. coquantur in aqua com. pro 3ix. sicut insus per noctem: mane cola. adde syr. de fumoterra, de epithymo, de betonica, syr. de insus. ros. com. an. 3b. misce, fiat apozema pro iij. dosibus matutinis. Hoc apozemate eibito, dietam moderatam, (vt fieri debet) obseruauit: sumens ex decoctis sequentibus, vt moris est. 2. betonica, fumaria, borag. bugloss. acetos. summitatum lupulorum, agrim. an. m. j. capill. ven. chamæd. chamæp. an. m. b. flor. cord. p. j. end. cichor. demis leonis (habebat enim hepar calidum, eratque valde macilentus, tanquam tabidus: vnde etiam per nares, antequam ad nos veniret, & nunc semel aut bis, sanguis biliosus & calidus effluebat) rad. feniculi, apy. aspar. an. 3ij. sem. anis. 3ij. hagioxyli 3i b. zaltæ pavilla selectiss. 3ij. hordet. mund. p. j. vuar. pass. enucl. 3j. (propter maciem) vuar. corimb. 3b. rad. China 3i b. glycyrr. rase 3b. hæc omnia infundantur in lb viij. aquæ communis, & puræ, per noctem integram ita macerentur, vt deinde coquantur in duplici vase, lento igne, vt artis est, ad lb iij. pro prima decoctione mane hora vij. & hora iv. pomeridiana loco syrupi bibenda: Supra residuum deinde proiciantur aquæ lb viij. & coquantur ad lb v. arom. cum. 3ij. cinnam. select. pauco adiecto saccharo, fiat potio clareti insus, pro secunda potione, qua vrbatur in prandio & cena. Et quamuis debilis esset ex natura, optime ferebat, & quotidie bis, aliquando ter aluum deponebat, &

SCHOLIA.

Adolentem hunc multo nitidiorem & crassiores & perfecte curatum ad præceptorem, vt literis rursus imbueretur, cum admiratione remisimus: cum aliqui sinistre de lue Gallica ob loquelam infectam à narium perpetua obstructione, suspicati fuerint; quanquam nunquam eo malo adolescens laborauerat. Nam & decocta hagioxyli & zaltæ quamuis eiusmodi malis sint appropriata: non minus valent quoque ad quasvis narium obstructions, catarrhos, vlceras, ozanas, & polypos, & ad cerebri malam intemperiem corrigendam: imo ad bonam temperiem reducendam, & ad reliqua symptomata supradicta curanda. Quod vt tyrones & assequi & sequi possent, longiores in eiusmodi decoctis describendis fuimus. Nam & huic adolescenti post curationem, non amplius etiam sanguis (vt solebat) à naribus fluxit. De quo profluio & nunc deinceps agemus.

OBSERVATIO X.

De fluxu sanguinis narium.

Vidimus Pithueris anno 1545. puellam annorum 18. pauperulam, mense Octob. per quatuor integros dies sanguinis fluxum è naribus adeo enormem habuisse, viribus prostratis, mensibus ad longum tempus retentis, humi prolapsam, vt nulla spes salutis superesse videretur. Ad quam vicini cum omnia tentassent remedia, me ad eam perduxerunt. Habebat autem circa collum nescio quas herbas, quos lapides, quibus credebatur sanguis listi, appensa. Statim arrepto vtroq; brachio circa carpum, vbi pulsus tangitur, aquam frigidissimam ex poculo stricti orificij embrochæ seu riuli instar continuo stillabam, firmumque porcinum naribus obieci, & vt ore repleto aqua frigidissima succum vrticæ per nares attraheret, mandauit. Nucham autem aqua plantaginis frigida lauare permisi; quamquam hoc remedium febricitantibus suspectum sit. Hæc autem non febricitabat. Iisque remediis fluxus cessauit, quamquam viribus paululum recreatis, vt venam saphenam secaret postea, consului ad mentes reuocandos, nouilunio instante: quod cum fecisset, recte deinde habuit, mensibus statuto tempore fluentibus, neque sanguinis fluxus è naribus amplius visus est. At alteri puellæ ac famulæ insigni trium columbarum ad forum pontium vel cespitem habitanti Delphis, cui & menstruæ purgationes ad quatuor menses restrictæ non precedebant, sanguisque è naribus per continuos tres dies cum fluxisset, neque vllis remediis muliercularum ac tonforum restringi posset, foliis buxi tum aliis pulueribus nescio quibus, naribus iniectis, cum ex dextra nare sanguis efflueret, saphena dextri pedis incisa nihil prodesset, neque anacolemati fronti ac naribus, quibus vti solebamus, iuuarent, neque vllis aliis medicamentis per os sumptis iuuantibus; tandem vt ventosa magna absque scarificatu sub mammilla dextra ad hepatis regionem applicaretur, mandauimus. Quibus fluxus enormis cessauit, cum pro mortua satis & deplorata haberetur. Verum altera mulier Amstelrodamensis, cui tamen menses restricti non erant, cum profluio sanguinis narium admodum vehementi ac diu perdurante detineretur, neque vllis remediis restringeretur, tandem cinere carparum albarum combustarum naribus demisso, præter

præter spem sanata est. Addam & indubitatum experimentum ad sanguinem è naribus fluentem cohibendum ac restringendum; quod ipsimet vidimus sapius expertum in nobili matrona Domina de Baerwiick mense Iulio anno 1585. Hæc a. cum sanguis è naribus supra modum fluere, frustum cretæ albæ digito annulari vel minimo digito proximo continebat, è regione naris sanguinem fundentis: si è dextra, dextro; si è sinistra sinistro, donec incallescere: statimque sanguis supprimebatur; vt diuersis vicibus in eadem Domina spectauimus.

SCHOLIA.

Hæmorrhagia. Inter narium affectus, quæ ex ipsis sanguinis eruptionibus fiunt, à Gal. 3. de comp. med. secundum loci, connumerantur; à Græcis *ῥίνοις* & *ῥινορραγία* dictæ: licet Græcis hæmorrhagia peculiariter intelligatur profluuium sanguinis, si per se ponatur, non expressa particula, vt Gal. etiam testatur I. *ῥίνοις* & *ῥινορραγία* apud Hipp. Alioquin nomen generale est in omni sanguinis euacuatione, siue per crisin fiat, vt in libris nostris Obseruat. de febrib. multis in locis ostendimus, siue symptoma sit læsæ arteriæ aut venæ, quod ex vocabulo quodcumque sanguinis profluuium intelligi potest: quale est è sede, vtero, ore, aliisque partibus sed ex poro fluxisse, rarius, imo miraculosum cuius historiam habes apud Beniuennum, de abditis morbor. causis c. 4. rarum quoque est, si ab oculis fluat: cuius exemplum quoque antea posuimus. At nunc loquimur de fluxu sanguinis narium, qui & frequentissimus est: tamen aliquando periculosus, si non reprimatur: vt etiam mortem inferat, vt de prognosticis signis alias latius. Quod a. hic nares affectæ sint, cunctis liquet: non tamen per essentialiam semper afficiuntur. Similiter affectus est symptoma in genere excretorum immodice, toto genere præter naturam. Non tamen vnum morborum genus sequitur, teste eodem Gal. 5. meth. modo vasorum diuisionem, modo orificiorum refectionem, quandoque eorumdem & tunicarum rarefactionem sequitur: quamuis non modo vasis ipsis male affectis, sed etiam ipsi sanguini, aut denique facultati interdum occasio tribuenda sit, ex eiusdem Gal. sent. 3. de caus. sympt. Et sic dicimus vasa ipsa male affecta: vt cum molliora, vel duriora seu tenuiora fuerint, à natura, seu aliqua eueniens causa extra vterum vitiata: sanguinem vero male affectum appellamus, vel cum adeo vitiosus sit, vt vasa, quibus continetur erodat, vel cum adeo est auctus, vt à vasis contineri non possit, vt interdum ea disrumpat, interdum eorum ora referet: tribus igitur causis sanguinis è naribus eruptio tribuitur: aut vasis ipsis male affectis, venis scilicet aut arteriis, aut eorum ore referato per anastomosis, teste Gal. lib. 5. meth. propter eorum imbecillitatem, tum etiam propter sanguinis copiam, qui impetu quodam ad os vasorum ruat: aut propter eiusdem sanguinis acrem quampiam, quæ illi extrinsecus incidat, qualitatem. Vel per Diarefin seu diuisionem vasorum, tunc ex vulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione fit. Aut per Diapedesin, ex ipsa quidem tunica rarefacta, sanguine vero tenuato, idem Gal. oriri fatetur: quamquam etiam ex gracillium vasorum ore aperto fieri potest. Si igitur maiora vasa aperiuntur, anastomosis vel simpliciter osculorum apertio dicitur: nam confertim sanguis effluit, cum & causa apertionis sit copia sanguinis confertim irruens & distendens;

accidit enim vt è maioribus in minora vasa fluat, primo fusione à causis calfacientibus. omnibus ira, furore, motu, calore: secundo vi naturæ expellentis, vt in crisi vera, & vtili; & tunc non est restringendus, nisi vires deiciat, vt de signis prognosticis dicemus. Aut quando natura venarum proritata excernit. Tertio contentricis imbecillitate, cum ora aperiuntur, non præ copia, sed quia venæ vim continendi imbecillum habent: ideo à mediocri copia aperiuntur. Proritat vero excretrix, aut copia, quo ad vires, aut praua sanguinis qualitate. Hæc iam dicta facile dignoscuntur, num aliqua causa tunica secans præcesserit: nam huic quoque confertim fluere oportet. Sed quæ sit apertionis causa, ex tribus sic coniectabis, vt egregie Iacchin. etiam docet. Si enim copia fusi sanguinis sit, necesse est & signa copiose adesse & fundentem aliquam causam præcessisse, quæ omnes procatartica sunt: ideo notæ, si ex vi expultricis venarum, si crisis bona sit, eius signa aderunt, tum præcedentia, vt coctionis notæ in die iudicatorio & præsentia vt critica symptomata. Si vero proritatione, signa erunt cacochymia, præcipue biliosa, vel melancholica, vel etiam corruptionis sanguinis alicuius, vel putredinis: quæ ratione & in sanis & in regis hæc apertio contingit. Quod si ex imbecillitate contentricæ (quod tamen rarius est) videbimus per breuia intervalla ex leuissimis occasionibus effluere sanguinem, sed non multum, nec confertim adeo, vt in aliis causis. Ceterum in istis duabus puellis erat ex anastomosi, cum menses retenti essent, plenitudine potius, quam exinanitione, & ideo quamquam in principio in vtraque non erat restringendus sanguis; nam menses deficientibus iuxta Hipp. sanguis è naribus fluens, bonum: attamen in vtrisque, quia vires deficiebant, restringendus erat, ex quacunque enim causa sanguis è naribus profluat, non est despiciendus: nam cum superfluit, & longo tempore perseverat, timendum erit, aut animi deliquium, aut iecinoris imbecillitas, ac infrigidatio, & demum cachexia & hydrops, cum & eiusdem Hipp. auctoritate 6. de morbo. vulgarib. iis qui decolores mero modo sint, parum prodest, quibus vero colores rubicundi non similiter, & quibus copia sunt, quam facile tolerant, prodest, quibus secus, non. Verum cum ad desperationem vtraque laboraret, restringendus erat reuulsoribus præditiis, quæ maxime conueniebant in anastomosi, & ob menses retentos ex saphena venæ sectio: hoc enim modo sanguis ad vterum rursus deriuatur. Sic etiam ad reuulsionem ventrosam regioni hepatis apposuimus, non quidem inter initia, cum corpus esset plenum: ne phlegmonem accerferet, sed postea vt in famula fecimus, cum & alia remedia, quæ sanguinem costringunt non iuuarent; idque in fine. Signa vero diapedesis, ex sequenti exemplo magis patent.

OBSERVATIO XI.

De fluxu sanguinis narium ex refectione venarum.

Diapedesis vel exsudatio cum sit, id est, exsudatio, aut sit tunica rarefacta, aut sanguine tenui exeunte; & sic per oscula tenuium venarum è naribus effunditur: ita quoque è pulmone, ex ore, gingiuis (vt euenit cuidam in nosocomio Delphens decubenti, qui multum sanguinis per intervalla valde tenuis ex gingiuis profundebat) quibuldam & per cutem. Lewis etenim & lenta sanguinis educio diapedesin

diapedesin demonstrat: quoniam sanguis peccat à natura per tenuitatem: igitur dilutus apparet, & tenuis velut aqueus. Quod istis diebus mulieri euenit, quæ & cachexiam patiebatur, quæ & in pallido colore albicantem haberet, iam quasi hydropes inchoante. Hæc signa, cum spectassem, facile ex iisdem conieci, hunc sanguinis fluxum per diapedesin fieri. Et quamquam hic fluxus sanguinis narium, ex diapedesi in principio non videtur aliquod præsens malum minari, ratione tamen causarum, id est, ex accidente, difficultatis non nihil habere videtur: præsertim si sanguis aquosus sit (vti quoque istis diebus in inuene euenit, qui per intervalla sanguinem è naribus fundebat). Significat enim malum habitum iecinoris & venarum; ex quo breui totum corpus afficitur. Habet tamen diapedesis seu exsudatio (vtpote affectus rarefactionis tunica venarum, vna & tenuitatis sanguinis) leuem curationem, si sanguinem crassorem gigni procuremus, corpusque sicemus, vt qui genitus est, crassior reddatur: & postea adstringentibus ad partem vtamur. Sæpe enim post serolos humores educos cum diacarthamo & aliis ad hydropem facientibus & decocto ligni vtentes, quæque totum corpus exsicarent, & optimum sanguinem gignerent, eumque in crassarent, & hepar corrigerent roborarentque, solis adstringentibus adhibitis ad partem, vt posca simplici aut succo polygoni curauimus. Sic etiam huic mulieri applicuimus, corpore prius purgato ab humoribus serosis, naribus non solum alstringentia, sed etiam fronti anacoemata seu agglutinamenta adhibuimus ex bolo armeno, farina volatili, & vnguen. Comitisæ, albumine oui soluta. Subinde cum aqua ros. vel plantag. mixta epithematis, modo fronti lino panno inculcata & circumducta prius leuiter expressa, etiam cum spongiis naribus admota, vel ex succo solo plant. & polygoni, vel herbarum sanguinaria. At quæ vehementius restringunt, & naribus insperguntur, ad ea non venimus nisi necessitate coacti, vt latius postea dicturi sumus. Hoc itaque modo hæc mulier curata est: vti & iuuenis, cum aliis plerisque.

SCHOLIA.

Quomodo a. Anastomosis & diapedesis fiant & cognoscantur, facile ex iam dictis colligebitur: atque Diarefis similiter, quæ ex omnibus causis fit, quæ possunt solutionem continui facere: rumpi, diuidi, contundi, erodi, quodque facile cognoscitur ex causa prægressa; vt si ex alto quis cecidit, vel plagam circa illas partes accepit, vel cum vlcus pateretur antea crustula extracta est, vel ferro inciso peracta est, aut pars vulnerata, vel circum partem medicamento mordicante sit vsus, erosione patiatur ea parte, vel acris destillatio præcesserit. Rumpuntur & vasa ex feruente sanguine, non secus atque dolia & vtres ex musto. Dum in status soluitur (inquit Iacchinus) calore dissendi vehementius ac perumpit. Sed hoc maxime viscerum venis euenire solet, quæ tunica tenuem habent & mollissimam: vt pulmo & iecur, vt in lib. De optimo habitu Galenus ait: quo loco de hac causa disputat. Et ita signa fere omnia percurramus. Si itaque ad maiorem declarationem signorum, ex partem vasorum aliquo modo affectorum, sanguinis è naribus profluuium fiat, facile dignoscemus si externa aut interna fuerit causa: nam neque indicia aderunt sanguinis redundantia, neque is, qui profluit sanguis vitiosus apparebit, nec corpus cacochymum erit, aut crisis tempore in acutis

morbis excernitur. Si autem ex aliqua externa causa affecta fuerint vasa, vt casu ab alto, ictu, exercitio vehemente, mora in sole, ac reliquis eiusmodi, ex agri aut astantium sermone percipies. Si ex nulla externa causa affecta sint vasa, interna perquirenda erunt, numquid molliora videlicet fuerint: id quod à redundante humiditate percipies: aut duriora, ab ariditate, aut tenuiora ab inedia reddita sint vasa; seu à natura talia constructa fuerint: & proinde eorum ratione fuerint rupta, referata, seu rarefacta. Si vero nullum istorum adsit, videndum (vt etiam Donatus Alimarus docet) erit, nunquid adeo auctus fuerit sanguis, vt vasis contineri non possit; & propterea ea, umpat, aut referet, id quod dignoscet ex signis, sanguinis redundantiam indicantibus, aut ipsemet sanguis non valde auctus, sed vitiosus adeo sit, vt vasa quibus continetur, erodat. Id vero percipies, cum ex qualitate eius, qui profluit, sanguinis, tum ex reliquis signis cacochymum corpus indicantibus & pronatura diuersa ipsius cacochymia: poterit etiam qualitas vitiosi sanguinis indagari, num pituitosus videlicet, biliosus, aut melancholicus fuerit, quæ de re profluuii causa erit sanguinis vitium. Verum si neque affectorum vasorum, aut affecti sanguinis indicia adsint, præcesseritque acutus quispiam morbus. ipsi facultati, seu naturæ, quæ ea quæ sibi molesta sunt excernit, ora vasorum aperiendi tribuenda occasio erit, profluuii sanguinis: quod, vt ex prædictis elicere poteris, quandoque fit cum functionis alicuius noxa: interrim vero ipsis viribus haudquaquam oblatis, sed robustis existentibus: quamuis hoc profluuium toto genere præter naturam sit, respectu excretæ substantiæ: præter naturam tamen dici non debet, si in tempore expellatur, hoc est, si id quod molestum est expurgetur, id quod pulchre decretum reliquit Gal. lib. 1. de diff. sympt. Si tamen perduret viresque deiciat, & mala symptomata inuehat & metas egrediatur, non est despiciendus, vt antea diximus, cum & aliqui ex nimia sanguinis profusione mortem incurrerunt. Vidimus (inquit Benedict. Veronenis) aetate nostra Veneris, cum tonsor quidam in naribus pilos incommodos forcipe incidere, venulam incaute secuit, tamoque impetu sanguis erupit, vt sistendi modum medici plurimi non adinuenerunt, & ille misere vitam finivit. Et quod ad signa attinet prognostica, præter ea, quæ antea diximus, & de anastomosi & diapedesi, quod scilicet anastomosis ex debili contentia facile sanetur, similiter quæ ex fusione post profusionem cessat: nec instat periculum. Interim sciendum diarefin maxime esse periculosam, quæ ex continui solutione fit, si in magnis vasis præcipue arteriis. Nam arteriarum difficillima sanatio est, præcipue earum, quibus medicamenta non applicantur. Venarum etiam sanguis hac ratione non facile sistitur: vnde profusio nocere potest. Si qui igitur non periere, neque valde læsi sunt ruptione hac, signum est exilia ea vasa fuisse. Qui vero ex erosione, vix curam accipit: quinimo sæpe decedente crusta reuertitur. At illa, quæ ex vi expultricis sit, distinguenda: vel enim à natura sit; propriis legibus operata; & tunc nihil periculi habet. Dico propriis legibus cum Iacchino, vt crism tempestiuam faciat, id est cum optimis signis præcedentibus, in die optimi iudicii, & sine magna fluctuatione. Et erit maxime expetenda, quoniam à morbo liberabit, vt de febribus multis exemplis ostendimus. Statim vero ex iis morbum esse videbitis, qui plurimum & salubriter ea via iudicantur, vt synocha febres, & phrenitis, caustion, & viscerum

viscerum inflammationes, & pleuritis. Hinc & Hipp. Quibus capitis dolores & cernicis labor, atque totius corporis cum tremore infirmitas, hæmorrhagia soluit: sect. 1. prorrh. 58. Talia namque sunt hora crisis circa statum Gal. 3. de crisib. c. 5. & 10. & Hipp. 2. aph. 3. circa initia & fines omnia imbecilliora; cum vero consistunt, fortiora, & 3. de dieb. decret. ca. 11. cum crisis fiat per fluxum sanguinis narium, de quibus abunde diximus in lib. nostris obser. de febrib. acutis & ardentibus, & aliis, ac synoch. quibus indicia sanguinis profluuium è naribus futurum dignoscatur; magnæ enim imperitiæ est, imo & periculose, si id à medico non dignoscatur. De his quoque videas Gal. 1. de arte curat. ad Glau. circa finem. Fluxus itaque sanguinis, quem natura tentat non excitata neque irritata, bonus est: cum talis decretorius sit, id est, iudicatorius: & si fiat (ut dictum est) in die optimi iudicii & sine magna afflictione. At si hæc absint, maximum aliquando inflat periculum ex profusionis multitudine, siue vnum eorum siue plura desint ad bonam crisin expectandam. Si etiam decretorie factus, & plus exsuperet, quam natura ferre potest, inhibendus, ne ad deliquium animi æger perueniat. ut Gal. 1. aph. 21. dixit, medicum ob hoc naturæ motum debere animaduertere: & si quidem idoneus fuerit, subministrare & adiuuare: si a. contrarius, ac noxius, prohibere, transferre, atque diuertere oportet. Etenim cum sanguinis è naribus profluuium multum fuerit, & plusquam corporis natura postulat, malum: consulsionem n. excitat, auctore Hipp. 1. prorrh. corpore exsiccato & nervis, & cerebro plusquam oportet refrigerato. Si adolescentibus biliosis eueniat, malum est symptoma, & ad malas ægrotudines deducit, si sanis nimirum profluat. Anastomosis quoque, quæ sanis euenit excreticis vi, non qualitate molestata, sed quantitate solum, ut ex vtero vel hæmorrhoidæ, ita obesse non potest: nam copia vacuata sistitur, & villis erit: lædit tamen aliquando ex loco, unde profluat, ut si per vomitum, vel sanguinis screatum, vel urinas. Externi n. per eas partes eligendum non est. Ex his quoque apparebit, quando natura in profluuiis his sanguinis, sinenda sit, vel aliquid molendum. Et rursus si molendum, num sistendo prorsus, an retinendo nonnihil, an aliud traducendo. Qui n. ex copia solum, si per malas vias, traducere alio oportet & auertere: ita ex mensibus suppressis commodè venam saphenam secamus, ut sanguis è naribus profluens, ad vterum traducatur & auertatur, & mox solito ab vtero fluat. Si ex irritatione, ut in crisi aliqua, aliquando retinere, si excedat, excessus vero non pondere, ut Auic. est examinandus, sed vitium lapsu. In aliis casibus, semper persistere oportet: quoniam prorsus sunt præternaturam. Primo Prædict. Hipp. dicebat: Ex naribus erumpente sanguine cum exiguis sudoribus per frigescencia maligna ac praua: item quod post sanguinis eruptionem nigrorum per aluum transitus, malum; praua etiam sunt valde rubra. Eiusdè auctoritate Aëtius lib. 5. c. 124. inquit fluxum sanguinis è naribus in 4. die in febribus fluentem, pessimum signum esse: multitudinem n. significat in toto corpore aut in capite, addit a. Hipp. in coactis prænotionibus, si non aliud quid boni coinciderit; verum quinta minus periculolum esse: quamquam fortè ea sententia potius de narium stillicidio veritatem habet, cum in ardentissimis febribus, iuxta eundem Hippoc. & Gal. nares stillicite prauum esse signum, ut etiam vnius exemplis ostendimus in lib. nostris obser. de feb. ardentibus, sed largius fluere in minoribus infra 35. annum familiaris est, tum 1. tum 3. prog. in talibus etiam magis

narium sanguinis profluuium expectatur. Fluere quoque sanguinem ex naribus tecto itinere commendauit Hipp. è contrario vero culpauit, cum eodem lib. 1. Prædict. dixit: Sanguinis eruptiones ex contrario male sunt: velut in splene magno, si ex dextra naue fluat: pariter ex jecore ad sinistram. Hanc quoque Benedict. Faustin. præceptor meus malam dicebat euacuationem & symptomatica esse cum contrario tramite fluere. Vultque idem, ut medicus neminem assuescat sanguinis profluuium, ex quacumque parte corporis etiam idonea fiat, cum sanguis vitæ thesaurus existat: sua enim effrenitate hominem facile perdere posset. Et ideo rectè dixit Gal. 4. aph. comm. 25. vbi ait, neminem assuescendum esse ei euacuationi sanguinis, quæ sit per hæmorrhoidas: quoniam periculosa. Sic & de narium fluore sanguinolento intelligere possemus; cum nec euacuationi per pharmaca aliquis assuescere debeat, ne in naturam transeat, ob transitum in malam consuetudinem: Gal. teste 3. aph. comment. 15. Iam quoque fluor sanguinis sequens debilitatem virtutis contentiæ, deterior est: indicat enim virtutem regentem totam validam fore, virtutis contentiæ membri succurrere nequeuntem. Hæc de signis prognosticis.

OBSERVATIO XII.

De fluxu sanguinis narium enormi, post missum ebibitum.

Vir quidam non ex infima plebe, cum missum in cæna largius bibisset, in multam faciem noctem, atque in fine etiam vinum Hispanicum: die subsequenti mane in fluxum sanguinis narium enormem incidit, ita ut continuo ultra sex libras fere sanguinis è nare sinistra profuderit. Qui cum debiliior fieret, & frustra quibusdam præsidiiis à consoribus vsus, ut sanguis restringeretur, me tandem vocauit. Cum de vena incidenda mentionem facerem, amici qui astabant, id omnino ægro dissuadebant, cum sanguis è naribus largius profusus esset: nos a. ad diuersionem id fieri debere, cum faciem rubicundam infirmus haberet & sanguine repletus esset, & demum pulsus satis constaret; tandem ad hoc persuasus eo præsidio vsus est. Næ scilicet vena lineari in manu brachij sinistra, & sanguine moderato effluente, hoc anacolema cum fronti circumligassem, & stercus porcinum recens cum bolo arm. mixtum, ne perciperetur quid esset, ab enormi sanguinis fluxu, præter astantium sententiam curatus est. Anacolema vero tale erat, seu epithema. 2℥. aqua ros. 3 iij. aceti ros. 3 i. b. boli arm. 3 j. misce, frigide cum panno linco inculcato fronti alligabatur, & vbi incalesceret, denovo nouum idque frigide apponebatur, neque aliis remediis uti necessarium fuit.

SCHOLIA.

Causa varia sit, varia quoque præsidia posuident, vel rumpente, ut à vulnere; illud occludi non potest, cum profluuium sanguinis id non admittat. Ideo fluxum inhibere oportet, & vulnus glutinare. Primo auertendo sanguinem ad contraria & longinqua, & deriuare ad proxima: atque huius instrumenta sunt multa, sanguinis missio, vincula, frictions, cucurbitula ceruici vel hypochondriis è directo appositæ. Ab his ad localia deueniendum, quæ & fluxum prohibent & vulnus glutinant.

glutinant. Et horum materia simplex multa est; ut etiam sunt emplastica, terra lemnia, gypsum, zematites, hypocist. citynus, balauft. de quib. vide nos sectio. auctores, Rondeler. & Holler. in puluerem redacta cum liquore aliquo conuenienti per licinia naribus immittuntur, fronti applicantur. Et ita in maximo profluuium vena secanda; ut hic nos fecimus, neque in hac solum causa, sed in omnibus quoque aliis, anastomosis scilicet omni, & ideo Gal. 5. meth. ante topica in cubito venam secat, bis quoque aut ter, si opus est, modice. Quidam in talo hoc faciunt, sed non nisi in mulieribus quibus ob defectum mensium sanguis è naribus fluat. Alij in cubito id faciunt, vel in manu. Sic in febribus sanguine vehementer effluente, vel constrictione postea opus esset, commode ex basilica missimus, etiam in manu. Ita Heynoni Ioanni rustico, cui per multos menses sanguis è nare dextra fluebat, ex vena jecoraria in manu sanguinem detraimus, & liberatus est: Rhafes ex cephalica mittit ita, & Hollerius: sic in dextro cubito sanguinem missus ex cephalica, cum è nare dextra sanguis flueret, cum capitis dolore in Barthol. Teylingio fortior meo, & sanguis restrictus est, & dolor cessauit. Benedictus Veron. lib. 4. c. 5. de curat. sanguinis profluuij è naribus venam quandam secat sub scapula, & validissimum remedium esse asserit. Præter auersiones alias iam dictas, cucurbitulas scapulis vel furis apponunt, sanguisugos post aures: sed quoque si hæmorrhoides suppressæ, vel regioni aliquando hepatis sine scarificatione, statim post vincula, vel loco lienis si è sinistra fluat. Sed cauius ne ventosam vmbilico applicemus: ne nobis accidat, quod mulieri acciderat, Gatenario referente, quæ obiit ventosa pinguedine repleta. Alij strictionem testium laudant, vel potius eos oxyerato vel aqua frigida perfundunt. Opus est ante topica aliquando etiam purgatione, sanguinis vitioso existente & effluente ex myrob. citrini, syr. ex infus. ros. vel manna cum rhab. si bilis si pituita, ex agar. & myrob. cheb. & syr. ex pluribus infus. ros. perfic. si atra bilis, ex decoct. epith. myrob. ind. Si ratione vlcis sanguis profluat, cruda quidem agglutinationem exigunt cum frigiditate & siccitate, multumque astringentia. Si vero copia irruat, proritatione facultatis expulsiuæ (si quidem laborantem morbo acuto curemus) conuulsiuæ crisis morem, qualis sit. Hoc n. melius est dicere, quam, ut Auic. non est restringendus, nisi superfluat. Statim n. ut Gal. remedia sistencia (inquit Lacch.) in promptu habebamus, nec expectauimus superfluitatem illam: sed vbi, ut dixit Gal. de vena sect. quod iustum est, & moderatum effluerit, remedia sistencia adhibuimus. Hoc vero euentum à natura conicere est: quoniam crisin agnoscant fore multa demonstrant. Si in sano contingat, idque sola abundantia grauant, dimittito, si per nares: est n. commoda excretionis via. Si vero ex mala qualitate; primum symptomati occurrendum, mox causa tollenda. Occurrimus tate conferunt, ut jaspis: & tollimus ea, quæ ex proprietate movent, ut motus omnes, vel animi inspectionem. Causa vero tollitur, sanguinem attenuando contraria qualitate, quæ est frigida & humida, quæ tum medicamentis tum cibis perscitur. Ad topica igitur non venimus, nisi præcesserint auersiones iam dictæ; & ideo anacolemata & quæ induntur naribus quæ & magna ex parte refrigerant & constringunt, horum vsus post alia supradicta remedia tempestius est, iam reuulsa

in partes contrarias materia, id est, in partes inferiores corporis, aut posteriores capitis. Alioqui vsu refrigerantium plurimi quidem deterius habuerunt inde conuulsi, aut oborta spirandi difficultate, suffocati. Et hæc remedia infirma omnia comperit Gal. præ maioribus illis remediis supradictis, ex 5. meth. à prorrh. ex lib. de sang. miss. Anacolematis ergo & aliis topicis post reuulsiones vtendum erit, habita ratione naturæ capitis, & partium quibus admoventur. Sic fronti ex aqua frigida, seu rosacea (spongia madida adhibenda, aut succus caudæ æquinæ, vel herba trita ex Aëtio, vel posca fronti vel scinipiti apposita, & per nares attracta. Aliqui iubent frigida caput perfundi; præsertim ex insperato: vbi territa natura fluorem omnem ad cor trahit: sed hoc ego minime laudo. Aëtius cochlearum carnes tritas cum aceto vel vltas imponit: & Apollonius cum thure tritas naribus indit Gal. 5. meth. mannam thuris & aloem candido oui liquore confectam per contortum linamentum imponit exterius & cum pilis leporis naribus admovent. Vide plura apud Aët. qui & stercus asinum vltum insufflat, vel recens cum porri succo & aceto per linamentum indit. Gal. aures linteola obturat, & in ore aqua frigida continet, caputque non in sublime leuat, sed alias partes, quæ infra caput sunt, sublimes facit. Hanc obturationem aurium à Gal. diligenter commendatam, Rondelietius existimat solum prodesse forte ob sinum primum ramorum venarum & secundum duræ meningis, per quos potissimum cerebrum sanguinem recipit; cum hoc modo comprimantur, ex quo obstruantur, & sanguis consequio quodam retineatur: nisi forte legendum sit, nares esse comprimendas; quibus compressis sanguis sistitur, paulo superius versus oculos: hoc enim modo narium ibi digitis duob. comprimentes longo tempore, sanguis saepe sistitur & minus fluit, ut nos saepe experti sumus in multis. Vide plura de his, quæ sanguinem constringunt apud Galenum, Paulum, Aerium, & apud Neotericos, vides 26. Rondeler. & Holler. apud hos præcipue, cum alios multos videris. Interea vniuersa victus ratio sit pro eius curatione (si vitio vascorum aut ipsius sanguinis fiat) infrigidans & adstringens; tenuis quoque vbi ex sanguinis copia fiat bonique succi, & concoctu faciles cibi exhibeantur, potissimum vbi vitiosus fuerit sanguis, sintque contrariæ qualitatis redundantis succi in sanguine. Verum is sanguinis fluor, qui à facultate efficitur, quo ad iudicium sit, nulla particulari indiget victus ratione aut curatione. Vbi vero concitata natura mediocritatem non obtinuit, sed immodice sanguis fluxerit, ita ut vires imbecilliores reddantur, simili victus ratione vtendum erit, ac curatione, quibus in prædictis vtitur: & propterea velut frigida & astringenti victus ratione, sic quoque frigidis & astringentibus medicamentis pro eius curatione vtendum erit. Hipp. decreto cum aph. 23. 5. num. 37. 7. lib. Ob id alimenta actu frigida danda sunt, & quæ citra masticationem deuorari possint: ut amyllum paratum in decoct. pedum veruecis, hordeum mundatum, cremor ptisanæ ex sacch. & aqua ros. sine amyg. quibus addi possunt emplastica ad sanguinis inspissationem: ut albumen oui crudum fortiter agitatum, gummi tragac. aut arab. vel emplastica frigida, quæ nullum odorem aut saporem ingratum habent, ut est pul. corall. Vino interdantur, nisi valde debiles: quibus austerum valde conceditur, dilutum multa aqua cisternæ vel fluuiorum. Ager itaque omnibus modis refrigeretur, aëre frigido, potionibus, herbis & potentia & actu frigidis. Imperanda est quies totius corporis,

corporis, & animi potissimum, linguae & maxillarum: nam si frequenter loquantur, aut maxillas moucant, fluxum sanguinis continuant. Et praecipue cauendum à victus regimine sanguinem multiplicante, attenuante, exacuate mordenteque ac erodente: qualia sunt piperum genera, & omnia aromata, vt egregie, tum reliqua ad sanguinis profluvia facientia, apud praecipuum meum Benedictum Faentinum in sua magna Praxi de curatione sanguinis è naribus profluij, enarrata.

OBSERVATIO XIII.

De fluxu sanguinis è nare dextra copiose effluente.

Bokellus Iudoci Francisci filius, qui apud Diui Georgij ædem Delfis habitabat, iuuenis an. 30. natus, ad 4. dies continuo è nare dextra ita copiose sanguine profundeabat, vt pro deplorato satius haberetur. Multa praesidia tentata sunt, vt venæ sectio ex cephalica cubiti dextri, scapulis cucurbitæ cū leui scarificatione appositæ, vinctulis digitis tum brachijs iniectis ad diuersionem: totus quoque ex aqua frigida, plantaf. ros. & aceto, testibus adhibiti: pulueres quoque astringentes narib. inditi per chirurgum: sed naribus obstructis, sanguine per gulam intus fluente, vt ahelitum trahere non posset, & pene suffocaretur, ideo naribus repurgatis, ore frigidam cōtinēbat, etiam lac acidum frigidumq;. Naribus paulo superius digitis ad tempus cōpressis, subinde fluere desinebat, sed rursus impetu multo magis fluebat, tempore tamen hyberno ac frigidissimo: nam cū 27. Ian. die ad eum essem accitus, supradicta praesidia adhibebantur, sed frustra: sequenti quoque anacolemate frigide fronti sapius appposito: *℞. aquæ plant. ag. 3. viij. aceti ros. 3. j. aquæ ros. 3. lb. duo oī album. boli. arm. veri 3. i. lb. concussa cum panno lineo fronti apponantur.* Hoc quoque ceratum panno lineo inductū hypochondrio dextro impositum est, *℞. vng. ros. cerati, santal. an. 3. lb. misce.* Naribus saepe ad olfaciendum obiciēbatur finus porcinus recens, quamquam asuinus, si reperiri posset, magis laudatur: subsistebat aliquando hoc praesidio, quamquam omnino non restringeretur. Succum granator. acidorū ad refocillationem saepe dedimus, & amygd. sequens; tum iuleb. quibus tandem fluxus delit, *℞. amygd. dul. depilata. 3. ij. sem. 4. frig. maior. mund. an. 3. j. sit. amygd. ad 1b. j. saccharo perlato iniecto ad saporem.* Iuleb. vero tale erat, *℞. sem. portul. (nam herbæ deerant) sem. pl. m. pap. albi, end. aceros. an. 3. j. rad. torment. cōsolidida maioris, an. 3. j. sit. decoct. in aqua comm. pro 3. j. coletur, colatur & addendo syr. amygd. granat. pap. anemph. an. 3. lb. misce, fiat iuleb.* Vinum, sed acerbum; cum aqua cisternæ mixtum, ob virium deiectionem concessimus: cum animi deliquio fere tentaretur. At sanguine tandem restricto post quartum diem, cum sanus existeret, neque febre tentaretur, optime deinde habuit, victu restaurante, infrigidante & astringente vtens.

SCHOLIA.

Quidam hic proponebant pannum lineum aqua frigida infusum toti collo iniiciendum, quod vulgares aliquando faciunt: verum cum hæc suspecta sint, vt & frigida, si supra caput fūdatur, cum in vno (scilicet Grado) metus sit ne viæ constringantur mediæ inter cor & ipsum cerebrum: in altero, ne cerebrum valde infrigidetur & apoplexia subsequatur. At minus suspectum, quod & vulgus conuenit si corallum è collo suspendant, & lapidem hamaritimem frigidam quoque mammas, testiculis, collo, nuchæ, occipitio, adhibita in febribus

suspecta sunt: quemadmodum quidam temerariè remedio, cum reliqua omnia non iuuarent, aggrauantem, cui sanguis è narib. profluebat, in balneum deduxit, atque demersit ad collum, & ita restitit sanguis. Ab hoc quoque remedio certum exitum est, si vires vehementer laborent. Cæterum hinc iuueni, quod & aliis multis euenire aliquando solet, cachexia superueniebat: quemadmodum & Patri Thomæ Almar. aliquando euenit, post immoderatas sanguinis euacuationes factas, licet tandem cohibitis. His conueniunt aperientia, & quæ colorem bonum præstant: vt est dialacca, diu. curcuma, quæque ad cachexiam valent. Quibus & hic iuuenis optime habuit, vt etiam pater Thomas prædictus, cui & crura in tumorem attollebantur, appetitu mediocriter remanente, vrina quamvis cruda existente cum hepatis obstructione. Hinc vinum Rhen. concessi, atque decoctum sequens præscripsi. *℞. marub. agrim. cessur. scolop. absinth. Rhen. menth. rub. cap. ven. an. m. lb. sem. anisi 3. ij. lb. coquantur in aqua & vino Rhen. ad 1b. j. colat. dulcor. sacch. & cinam. condiantur vt artis est, sumebat bis in die.* Huic decocto deinde adieci mus rad. petros. sanic. apij. cichorij (qui paulo antea febricitauerat narib. quoque tum sanguine fundentibus sed per crisin, quæ tebris delit, sed etiam sano antea sapius sanguis è naribus fluxerat) *an. 3. lb. folior. senæ ad stipitib. repurg. 3. j. epith. 3. lb. polyp. querc. 3. lb. hab. selesti 3. j. spica 3. lb. hab. & sit. ligatis in puppa seu modulo, cum a. vris ratione cum super dictis decocta fuisse ad 1b. i. lb. bis in die ex eo sumebat, cum facili solutionis esset, & quotidie bis tertio ventrem deliceret: vnde & facies tum pedes detumuerunt, & oppilatio hepatis consopita, & vetriculi coctione magis aucta, melius habere cepit. Sumpto quoque per os elect. specier. arom. rosa. in tabulis concinnato, & cum pro pedibus in flatibus, aqua salsa marina eosdem prius fouendo hoc fomento sequenti probalnatione, & iniectione vteretur, pedes mox detumuerunt, & sanitatem consequutus est, fluxu quoque narium amplius non redeunte. Fotus his viridibus constabat. *℞. folior. lauri maricaria, artemisia, caulium vulvarum, bellid. terrestris, flor. meliloti; ch. anam. furfuris, sals. commun. an. m. iij. coquantur in aqua communi pro 1b. viij.**

OBSERVATIO XIV.

De nobili quodam cui circiter xij. lb. sanguinis è naribus fluxerunt.

Vir generosus, Dominus de Benthuyssen, qui in pago Ryfsvueckio dicto, non procul ab Hagha-comitis, eo tempore commorabatur, sanguinis narium profluvio cum extreme laboraret (eo enim malo frequenter afficiebatur) neque remedia commode adhibita iuuarent, circiter 12. lb. sanguinis ex vtraque nare per vices effluxere. Cum ad dominum accitus essem, & per integrum diem sanguis effluxisset, vt duas ventosas absque scarificatione, vnam supra hepatis regionem, alteram supralienis locū poneret, mandavi: quibus parum videbatur fluxus subsistere. Verum post meum excessum, vxor cum videret sanguinem, iterum ex vtraque nare cum impetu erumpere, & quod ventosæ hypochondrijs impositæ nullo modo iuuarent, alias duas, vnam supra pedem dextrum, alteram supra sinistrū affigi iussit; & dictū mirum sanguis præter spem subito restrictus est. Verum cum aliquāto tempore ventosæ cuti adhærerent, æger in animi deliquium incidit. Quare iussim ventosis detractis, aqua in faciem conspersa excitatus est: mox odore vini recreatus ad se rediit, & à fluxu sanguinis narium per ventosas miraculi

aut incantamenti instar, præter omnium hominum opinionem, vir nobilis ac admodum bonus, multisque casus, pristinae sanitati restitutus est.

SCHOLIA.

Diuersiones quo magis remotæ, eo modo fluxionem auertunt; quod vnico hoc exemplo docetur, cum ventosæ hypochondrijs impositæ non ita, vt pedibus applicatæ iuuarent. Id quidem non solum obseruatione dignum, sed in aliis quoque imitandum. Si è nare dextra, pedi dextro: si è sinistra sanguis fluxerit, sinistro pedi imponenda magna ventosa: vel vtrique, si ab vtraque nare sanguis copiose & diu erumpat, ea tamen cautione adhibita, ne diutius ventosæ in loco maneant, animi deliquio subsequente; ideo citius tantum detrahendæ. Duodecim libras sanguinis huic generoso viro intra triduum fluxisse, minus aliquis mirabitur, cum apud Amatū Lusitanum Antonio cuidam Corree nobili Lusitano Capitaneo, quartana laboranti xx. lb. è nare sinistra fluxerit: cuius rei doctissimus ille medicus Andreas Lacuna, qui libros Galeni in compendium traxit, luculentissimis testis est, qui eundem Capitaneum cum Amato curabat. Cui ægro inter cætera opitulatia remedia incurbitula splenis regioni admota est, & gelida testib. applicita & sapius innouata. Idem se nonnisi tradit Dianam Estensem illustrissimam mulierem, & cuius naribus sanguinis 22. lb. prodierunt, & taurice valet cuius & Brasauola in comm. aph. 3. quoque meminit. Scribit & Gradus de monacha quadam exili natura, macilenta, pituitosa, cui non ex abundantia humorum, neque ab aliqua causa primitiua, vt à casu, percussione, vndeque per spiritum, & per nares & vrinam, vltra 18. lb. sanguinis emanarunt, curationem quidem attentabat, sed ob debilitatem venæ sectione omissa ventosas siccæ in spatulis posuit: verum immediate facta cutis ruptione, ventosæ impletæ sunt sanguine. Quare nō habens aliud remedium, tandem dedit 3. j. philonij perfici cum metu quodam, quamquam monacha hoc praesidio pro Dei gratiam ex tali casu, quasi desperato intra duas horas sanata est. Refert quoque Arculanus suo tempore insignis medicus, mulierē similiter euasisse, postquam ab ea per vterum tribus diebus 25. lb. sanguinis profusa sint: vix videtur illud verisimile, cum 25. lb. sanguinis parum plus vel minus, reperiantur: ita vt etiam quidam dixerint, quod vno die aut per vulnus, aut alio modo aperta vena effundi possint septemdecim sine interitu. Quod si verum est, oportet id corpus excedere frequentem hominum magnitudinem. Nam pauci sunt, qui detractionem librarum decem vna emissionem ferre possint in vita: sed vno toto die amitti libras decem refecto corpore cibo, & praesertim fortilli, id nonnullis contigisse vidit Botallus (qui & liberalissimus est in vena secanda, vt eius libellus ostendit de curatione per sanguinis missionem) & multos vna hebdomada amisisse supra libras viginti. At facilius est homini mediocri (vt idem asserit Botallus) & conuenienter nutrito ferre effusionem triginta librarum sanguinis octo dierum spatio sine interitu. In illust. Principe Orangia ex vulnere, quod in gutture Antw. scilicet in inflicto erat, vt excellens ipsamet mihi narrauit Delfis existens, effluxisse 12. lb. sanguinis lb. quod & postea mihi ipsi confirmauit Iosephus Michaeli medicus insignis, qui perpetuo illi adfuit in curatione. Sed per in-

terualla nutrito corpore ac refecto cibo sobili, cū solida ob vulnus deglutire non posset. Insuper retulit mihi idem Princeps quod post vulnus consolidatum, primo bolo sumpto dolorem vel potius quandam molestiam semper sentiret, sed ab alio cibo quocunque, quem deinde sumebat, nihil quicquam doloris aut molestiarum in gutture aut faucib. persentiscere. Hæc quidem cum vera sint, alia quædā exempla insuper narrantur à Botallo, quæ minus vera esse putat, vt de quodam Aduocato, qui per hæmorrhoidas vno die plusquam 20. lb. sanguinis amiserit, quodq; medicus die sequenti mane ad illum accessit, vt si amplius fluxisset, venam illi aperuisset; sed reperit illum profectum in senatum ad litigandum: cui cum diceret Botallus, hanc tam grandem euacuationem ab homine viuentē sustineri nullo modo posse, scilicet vno die factam: ille statim insit; Crede mihi, Botalle non minus profudisse quam peluis hæc (quæ ante stabat, & quæ capax erat triginta librarum) continere posset. Sed iis omisis, existimat idem auctor mediocrem hominem sine magno vitæ periculo vno integro die ex secta vena sex aut ad summū octo nouemve sanguinis librarum euacuationem, & hanc item intra mensem repetitam ferre posse non dubitat; sed non sine manifesta virium imbecillitate: verum tamen non tanta, quanta succederet quantitati longe minori, puta medietati vel etiā tercia parti, guttatim & in multis dies exeundi per hæmorrhoidas, vel vterum vel nares. Putat n. sanguinem sponte solum plus adferre in commodi, quam ante emissum. Rationem addit, quam quilibet videre poterit, licet ab aliis contrariæ adferantur. Verum istis omisis, quamquam Arculanus vir fide dignus refert per vterum tribus diebus, viginti quinque libras sanguinis effluxisse, idq; multa quantitate, nam quibus paulatim fluit & in pluribus diebus, debilitatur hepar, & ad hydropem peruenitur, vt euenit mulieri cuidam prope templum nouū Delfis habitanti, quæ tamen à me tam à fluxu, quam symptomatis fluxum consequentibus curata fuit. Verum cū tanta copia si subito cum impetu è naribus fluat sine constrictione, mortem subitanam inducit: At 25. lb. sanguinis effundi mihi nequaquam sit verisimile, cum in homine plures, iuxta celeberrimos medicos, non inueniantur, nec placet mihi Botalli tantæ sanguinis quantitatis emissio per venæ sectionē, & à multis medicis expertissimis pro paradoxo habetur. Memorant tamen omnes, fluxum iudicarium, nisi animo æger linquat, sistendum non esse: & iuxta Auicem. etiam, si quatuor libras fluxerint, neque retinendum esse, donec vehementer superfluat: hinc recentiores quidam modum esse existimarunt ad libras sanguinis quatuor. At nos pro viribus ægri modum statuimus: quæ vires etiam in venæ sectione considerandæ, tum vehementia morbi ac plenitudine considerata, & corporis habitu, cum Germani atq; nostri homines magis albi minus, quam Itali vel Galli venæ sectionē ferant; quamquā & hic aliqua corpora quoque inueniamus, quæ multam sanguinis detractionem sustinent, prout vires tum morbus ipse indicat, vt ad longum Gal. de venæ sect. docuit, cum alij medici hoc repore illustriores. Hæc de venæ sectione per transfennā dixisse satis est, quæ etiam subinde adhibetur ad auersionem in sanguinis profluvio è naribus, licet in exigua quantitate, vt nunc exemplis antea ostendimus: quamquam contingere potest, licet rarissime ab aliqua causa occulta, vt Gal. sagacissimus medicus aliquādo animaduertit in iuvene integra valetudine, qui cum crurum emungeret & exfluere (inquit Gal.) ipso narrante.

audiri, cum rure, æstatis tempore, in stagno quodam cum cæteris iuuenibus iuuenili ludo, qualem adolescentes in aqua ludere solent, exercitatum: tum ego sciens in eo stagno sanguisugæ esse, duxi laborantem ad splendorem, conuersoque directe ad solis radios narium foramine, in eo meam latentis caudam conspexi. Ita & (vt idem narrat loco citato) alius quidam vir quum nocte quidam sifteret, misso puero; qui aquam afferret ex immundo fonte bibisset, similem cruorem emouebat. Quibus auditis, inquit Gal. sciscitatus sum, apparuisse aliquando sanguisugæ in ipso fonte: qui cum id quoque faceret, epoto subinde idoneo pharmaco, hircudinem vomitione eiecit. Tales enim historiae perquam conducibiles sunt. In naribus si lateat, extrahenda, vel aqua frigidiss. ore retenta allicienda: extracta os colluendum decocto astrigentium vel puluis in nares sufflandus. Nam educta sanguisuga remanet vulnus ex morfu stipticis consolidandum. Et ita omnia vitia narium absoluiimus, excepta coryza, quæ etiam nares aliquando offendit, de qua diximus etiam lib. 10. obs. 133. cum de catarrho loqueremur, addemus hic adhuc vnum exemplum.

OBSERVATIO XV.

De Coryza.

Defluunt sæpe humores acres ac salsi è capite ad nares (Græci vero *ῥίνας* vocant; Latini *Græuedinem*, vt alias diximus) quas etiam sæpe rodunt & exulcerant: quemadmodum nuper cuidam ex nostris familiaribus euenit, cui cum à me consilium peteret, corpore repurgato cum infus. rhab. & syr. ros. solut. mandauit vt fumigio illo vteretur, quo Rondelet. se scribit se ipsum ab hoc malo curasse, nempe vt laminam ferream, donec omnino candesceret, igni subijceret, calidam aceto rosac. illic sensim irrigaret insillaretque; mox vaporem ex eo elatum per nares reciperet. Verum si non iuuaret, inbebam efficaciori remedio, cum opus esset, vt rosas ipsas siccas simul cum aceto supra laminam ipsam ferream conjiceret, & in fine fabas integras & aceto insperfas, aut dum vruntur, laminam ipsam rursum aceto irrigaret, quæ ad horum symptomatum leuium curationem plerumque sufficiunt. Nares quoque cum ex defluxu acris eidem exasperentur & rubescerent, non sine rosione atque exulceratione, vt pomato quoque inungeret imperaui: nam & hoc remedium commodissimum existit.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus quartus.

DE ÆGRITVDINIBVS LABIORVM, GINGIVARVM,

Dentium, Oris ac lingue.

OBSERVATIO I.

De Labiorum fissuris.



VMENT sæpe labia ac finduntur, sicut & narium extremitas ex acutis destillationibus; quæ difficulter interdum persanantur, vel etiam ex causa procatacrica vel externa, à puluere, vento, calore, frigore, casu,

SCHOLIA.

Græuedo & Coryza easdem causas cum catarrho habent, & communem scopum curandi, nempe vt causa tollatur, corpus repurgetur; tum caput, & intemperies auferatur, de quib. cum 10. lib. egimus abunde circa finem; nunc solum breuiter hic medicamenta topica, quæ particulatim coryzæ conueniant seu grauedini, pauca quædam adiciamus. Repurgato itaque corpore ac capite, & intemperie ablata, siccare ipsas nares oportet, quoniam nocumentum fit inde odorati, & prohibet cerebri calorem per aeris inspirationem euentari. Aliquando vero & respirare agrum cogit, hiant ore, cum causa frigida præcipue oriatur, & nares pituita obstruat. Potest & fieri à causa calida & acris, vt nunc ostendimus ideo delectus medicamentorum localium quoque habendus: nam si calida defluxio ad nares decumbat sola aqua tepida (vt lib. 10. Obs. 113. docuimus) per vaporem ad nares excipiendo. Ita & Paulus, fluxione frigida potissimum existente, melanthij vel nigellæ quoque, tum cumini vsti odorem suscipere commendauit: nec minus conuenit pulegium odorari: demittantur a. in serico aut linteo: Passio hæc si puerulis eueniat: vbi siccante puluere sine calore multo vltus fueris, suffumigiis ex thure vtare, & ex nigella aceto infusa. Aliquando & acetum calidum olfaciat, & cardomomum, & alia huiusmodi, quæ crassa extenuare, & siccare possunt. Idem possunt & alia suffimenta suffita: nam odores & causam proximam siccando abscindunt, & remotam (vt recte etiam dicebat Iacob. supra Rhab.) id est, intemperiem, sanant. Præter coryzam, alij etiam his adiungunt. Caput desternunt, licet affectus plerumque veniat à capite per modum catarrhi, modo à causa exteriori ex radiis solis, vel penna intromissa, vel pulu. aut ab interna causa ab humore, ventositate, eo quod ex motu cerebri narium carunculas pungit aliqua res moedicana etiam ad nares referunt, vt Gordonius de ea tractat post sanguinis narium profluium. Verum cum nos lib. 10. de cerebri morbis ageremus, de ea tractauimus Obs. 127. ita vt non opus sit aliud de eadem re nunc exemplum adferre: Absolutis itaque narium morbis ac nasi affectibus, ad labiorum, vitia, gingiuarum, dentium, oris, atque linguæ decimo tertio hoc libro finito, transeamus.

Finit Libri decimi tertij.

à causa externa vento boreali fissuras labiorum & siccitatem incurrebat. Cui consilium dedi, vt vng. pomato albo omni vesperi, cum cubitum iret, labia inungeret: quo præsidio vtens, alio non indigebat. Quemadmodum altera mulier vng. sequentem commode illinuit, quod ex recent. axung. gall. cera alba & aqua ros. sæpius lotis constabat. Aggigneta labra disrumpit illinit amurca cocta, vel adipe anserino. cum melle, terebint. aquali portione, ros. floris, hyssopi rosacei singulorum momento. Aët. qui pelliculam internam fissuras labiorum agglutinare tradit, & quæ circa palmar. ossicula adhæret, & texturam albam araneorum à trabib. dependentium. Fissuræ vero, quæ in altum magis se extendunt, adipe anserino vel caprino perstantur, aut medulla bouilla aut ceruina, & cum semperuina atque terebint. vnita illinas.

SCHOLIA.

Labia ab opifice maximo, nō sine ratione creantur: os n. claudunt, ne fiat inspiratio per os sed per nares: nisi tempore necessitatis, naribus occludantur. Neque ob hanc causam os claudunt, verum ne externa, quæ nocere poterunt, ingrediantur, vt musca, aranea & similia. Iam & dentibus ac gingiuis propugnaculum est valde decorum, vt patet in iis, quibus dentes quasi nudi cum labris curtis aut discopertis cernuntur. Efficiunt quoque labra sic occlusa, ne aer externus continuo dentes, tum gingiuas, contingat, & consequo citius lædat. Iuuant similiter ad saluam retentionem, ne continuo defluat: sed voluntarie, prout honestum est, expellatur: similiter & sputum. Iam etiam magnum iuuamentum ad formationem loquelæ habent. Comodius quoque cibus in ore continetur dentib. anterioribus, adiuuantibus labris, si qui molares amiserint. Iuuant deinde ad potum etiam brutis. Sunt a. cōle subtili ac multum tenui à parte interiori, & crassiori ex parte exteriori. Labrum quoque inferius sepe tremulū apparet metu, vel ira interdum. vt Francisco Vario Veneto Patrio, vt scribit Alex. Veneriensis, dum loquitur, semper tremat. In nausea fere semper, vel ex humore mordaci, vel oris stomachi nimia agitatione, magna inter se communicatione, tremat. Hinc cum labrum inferius tremat, vomitum plerumque futurum præagitur, vt auctor est Gal. 3. de crisi ca. 13. Interdum ex cerebri aliquo ingenti affectu, illæ vomitiones profunt: hinc quæ cerebro & occipitio imponi diximus, omnino cōferunt. Interim causæ distinguendæ, quibus labra finduntur, apostemantur, inflamantur, exulceranturve (quatuor n. labiorum ægritudines ab Auic. & ab alijs, vt Valesco, qui eum sequuntur, narrantur: fissuræ, apostema, hæmorrhoids, & tremor, (de quo nunc diximus) licet fere easdem causas habeant cū narium pustulis, fissuris, apostematibus, & vlcere. & fere eodem modo vt hæmorrhoides narium, vlcera & apostemata sicut alia, curentur: Causæ a. facile distinguuntur: nam causæ procatacricæ facile ex ægri sermone habentur atque cognoscuntur. Interna vero, vt si acres humores à capite ad labia decumbunt, manifesta caliditas & siccitas in labijs ac anteriori parte capitis sentitur, sæpe & fluxus catarrhi calidi ad nares. Ita quoque, si à frigore, humoribus frigidis vel salis aut pruritus, qui falsedini inest. Quæ si non adfuerint, à partibus inferiorib. vapor eleuatur, vel à iecore, vel stomacho, iis membris aliquo modo affectis. Si vero per viam crisis febris præcessit, & vt pluri-

Pet. Forest. 1. tom. 2.

mum veniunt cum alleviatione ægri. Vlcera vero & hæmorrhoides & apostemata, signa per se nota habent, & ex quib. humoribus irriterentur, vt etiam de narib. dictum est. Et quod ad prognostica attinet labia vlcera, fissura vel pustulis infecta, sicuti in febrib. post signa coctionis; bonum quid significat: ita in lingua, membro nobili ac multū sensibili (respondeat Gordonio) vt potius symptomatis quam natura expulsa, semper quid mali adferunt, cum insignem calorem in spiritualibus membris & stomacho adesse significant, vt 6. aph. com. 32. de transis colligitur. Fissuræ in labio inferiori in muliere frequenter apparentes ob siccitatem matricis, salacitatis signum præbent. Quouis modo itaque labia findantur, vel vlcerentur, si vitio sanguinis id contingat, cum dimittere necesse est; ex iecore vel capite, vel ex menti parte, vt quidam volunt; ex vitio stomachi, id deiectione vincit: ex his quæ alium emolliunt, & in pituita cum hordeacea aqua laudatur, vel cucurbita in elca vel similia. Si ab humore adusto, salso, bile adusta, vel atra, digeratur materia oxyfac. syr. de fumoterra, & purgetur cum myrob. rhab. fissuræ & vlcera inungantur. Si causa calida, oleo rosa. viol. axung. gallinæ recent. mucag. tragac. extracta cum aqua rosa. pluma illinitur. Si à causa frigida, vento boreali, in aqua rosa. mel. rosa. gum. trag. mastix & thus temperentur, cum adipe gallinaceo, vel anserino. 2. c. 7. adips. anatis, & sypi. rosac. an. p. j. trag. amyli, succi fissuræ & vlcera labiorum, quomodo curantur? Sem. cydonior. an. p. iij. gallæ, farinæ, cineris equine cat. de emulsa, fursuris, plumbi vsti, an. p. v. mētum confice. Sanat illud omnes fissuras & equorum suffragines. Si propter causas externas, corpore repurgato. 2. c. 1. e. use lora lihaog. an. p. j. confice cum mucil. tragac. vel cum axungia recent. gallinæ. & licet talia humida, vt axungia, putrefaciant, tamen quia anodyna est, & dolorem mitigat, conuenit in vlcerebus labiorum (vt dicebat Gordonius) hoc enim modo siccitas nimia lithargyri temperatur & humectatur. Cætera labiorum vlcera, iis quæ oris vlcerebus profunt, perfanari dicuntur. At vlcera labiorum ex lue venerea, aliter curantur, vt exemplo sequenti docebitur.

OBSERVATIO II.

De Labijs vlceratis, inflatis, subnigris, tumidis, plumbeis & duris carcinomatis instar, ex lue Gallica.

Iuuenis quidam annos 18. natus, lue Gallica infectus, præter labia vlcera, inflata, nigra, tumida, plumbea, dura, carcinomatis instar, etiam bubonem venereum in inguine habebat, cū varia tentassent remedia medici & chirurgi, cumque parum proficerent, medico peregre profecto & diutius extra urbem morante, ad eundem iuuenem curandū accitus fui. Chirurgus hoc tempore non alio remedio quam topico utebatur: labia solummodo ea feditate infecta, solo vnguento nutrito dicto inungebat. Quo medicamento cū nihil proficeret, & tempus verum esset, curationem hoc modo institui. Pharmaco leniente ex cassia deuorato, altero die venam communem in brachio dextro secari fecimus, sanguine valde corrupto (qualis esse solet plerumque in lue Gallica) ad librā vnam fere exeunte. Deinde illum purgauimus cū decocto senæ, tū cassia, ac confectioe hamech adiecta. Demum, ad maiorem sanguinis seu ichoris depurationem, hoc decocto utebatur. 2. c. fumariæ, summatum lupul. borag. bugloss. agrim. an. m. j. flor. cord. p. j. rad. cicor. 3. ss. sem. anisi 3. j. sem. end. 3. i. ss. prm. dr. 2. sc. anm. xiiij. vuar. passul. enucleat. 3. ss. rad. enula cap. 3. ss. H 3 3 3

3 ij. folior. senae 3 ij. myrob. indorum, cirin. chebul. an. 3 ij. glycyrr. rase 3 ij. polyod. querc. 3 b. epib. 3 ij. fiat omnium decoctio in aqua communi sumaria lupul. q. s. ad lb j. stent supra herbas per noctem; mane fiat colatura, decocto prius manibus diligenter confricato; mox colatura addendo syr. de fumoter. 3 j b. syr. borag. de epib. ex infus. ros. an. 3 b. misce pro apozemate. Postea eundem purgavimus cum confectioe hammech, dissolvendo 3 j. cum aqua sum. 3 ij. syr. de fumoter. 3 j. Deinde iterum decoctum sumpsit: eoque ebibito, denuo purgatus est. Tandem ad decoctum ligni guaiaci pervenimus. Ante huius usum cubiculum eius ad hoc paratum erat, & rimae ac fenestrae vndique ocluse, ut commodius sudaret; victu conuenienti, ut decet, observato; pane biscocto cum passulis sumpto in cena, & prandio carne exigua non salita, agro ad sex septimanas in cubiculo permanente; quo quidem tempore decocto utebatur, cuius haec ratio descriptio. 2℥. bagioxyl. optime de rasi lb j. aquae communis & aquae endiu. an. pint. vj. nostras committes: ponantur in olla stricti orificij & fictili vitreata per noctem & integrum diem bene cooperta: deinde in duplici vase coquantur ad tertiae partis consumptionem ut artis est, ac vsui referretur in poculo quoque vitreato stricti orificij. Mane huius decocti bibeat 3 vj. in lecto sudans si possit, quinque horis ante prandium, manens in cubiculo suo vaporario. Sex deinde horis a prandio 3 vj. & postea portioni magis assuetus etiam noctu cyathū paruum ebibeat. Supra residuum decocti superscripti, pintae xij. affundantur aquae purae, & ad quartae partis consumptionem bulliant: eo pro potu quotidiano & loco ceruiciae utebatur, & horis intermediiis a potu, si sitiret. Sexto die April. diatam hanc inibat. His bubo veneris delituit, & curatus fuit chirurgi opera, remanente aliqua duritie, quae emplastro diachylo cum gummis, etiam cessauit. Quod ad labia curanda attinet, imperavimus, ut chirurgus a nutritio abstineret, atque labia ulcerata prius etiam dura, nigra carcinomatibus instar, aspectu horribilia, decocto sequenti sapinus laueret, & panno lineo in eodem conculcato & labiis apposito curaret. 2℥. bagiox. optime de rasi p. ij. bulliant in pinta una aquae solar. deinde colo exprimantur, addendo alu. min. 3 j. rosaeque ebulliant semel. antequam tamen colentur, maneat supra residuum. Istis labia fuere persanata, cum alius medicus neque chirurgus per integros tres menses iuvenem in curatione habentes nullo modo curare potuerint. Interea dum hoc decocto & vitae genere uteretur, singulis 8. diebus, si alius non satis responderet, tali portione utebatur. 2℥. fol. senae 3 ij. sem. anisi 3 b. infunde per noctem in aqua sum. borag. lup. an. q. s. facta leni ebullitione prius, mane huius express. accipe 3 ij. cassiae mund. cum manna 3 ij. b. confect. hammech. 3 b. syr. de fumoter. 3 b. misce. qua optime aluum deponebat. Eo die a decocto primo abstinerebat, pro potu tamen secundo utebatur. Die vero sequenti more solito, ut prius primo quoque utebatur, tum secundo. At 8. die Maij gutture dolente hoc gargarismo utebatur. 2℥. an. plant. lb i b. sem. cydon. sumac. an. 3 j. ebulliant & colentur, colat. adde mell. ros. colati diamori. an. 3 j. misce, quo praesidio illud accidens quoque cessauit. 9. die Maij rursus cum alius resisteret, sequens portio propinata est: 2℥. fumar. summizatum lupul. borag. bugloss. an. m. j. folior. senae 3 b. sem. anisi 3 b. prun. dam. nu. vij. vuar. pass. enucl. 3 j. bulliant in sero lactis, & huius fortiss. express. accipe 3 ij. b. confect. ham. 3 ij. b. cassiae mund. 3 ij. syr. de fumoter. 3 b. sumpsit mane hora v. altero die rursus reuersus est ad decoctum

guaiaci, usque in finem eiusdem mensis. Cum iam videretur sanatus, & postea debiliior factus, crassiores dietam concessimus, colophonemque curationi imponentes, hoc apozema praescripsimus. 2℥. bagioxyl. 3 ij. rad. enulae campanae 3 b. fumar. cir. chor. dem. leon. summit. lupul. borag. bugloss. aceros. scabios. ana m. b. sem. anisi 3 b. end. 3 j. prun. dam. num. vij. vuar. pass. enucl. 3 j. rad. glycyrr. rase 3 b. folior. senae alex. 3 b. polyod. querc. 3 b. epib. 3 ij. rad. ellebor. nigri 3 j. myrob. omnium an. 3 ij. rad. lelii agerici trochisc. an. 3 b. schenan. 3 j. fiat omnium decoctio in aqua communi sumaria, lupul. borag. pro lb j. sicut infusa supra herbas per noctem: mane manibus diligenter fricetur decoctum & colatur. addendo syr. de fumoter. 3 ij. syr. ex infus. ros. syr. de epib. an. 3 j. misce pro 4. dosibus manibus. quotidie septies vel octies aluum deponebat; & cum debilis euaderet, diem vnum aliquando interposuimus. In fine Maij hanc portionem quoque ebibit. 2℥. bagioxyl. 3 ij. fumar. m. ij. scabios. agrim. viol. acetos. borag. bugloss. summit. lupul. cichor. endiu. an. m. b. sem. anisi 3 b. sem. citri 3 b. fol. senae 3 b. epib. 3 ij. myrob. indor. cirin. an. 3 j. vuar. passul. enucl. 3 j. glycyrr. rase 3 ij. rad. enulae campanae 3 ij. fiat omnium autis ratione decoctio in aqua communi & sumaria q. s. ad lb j. sicut supra herbas per noctem, mane colatur, addendo syr. de fumoter. de epib. an. 3 j. misce pro 4. dosibus. Deinde in principio Iunij iam exacte curato agro, ne labia rursus inficerentur, sanguine rursus & brachio dextro ex vena basilica detracto ad 3 ix. cum color ad rubrum mutaretur, vena rursus oclusa, hic a lue Gallica & labiis ulceratis durisque curatus fuit.

SCHOLIA.

Vide Consultationem 67. Montani doctissimi mi sub finem, de morbo Gallico, in quo agro fere similia imperata sunt, sed de lue venerea alius latius. Sed quia hic labia ulcerata, postea etiam nigra, inflata carcinomatibus instar haberet, ex lue Gallica contracta, & quia nunc de laborum vitis agimus, obiter & hac inferere volumus; cum aliter ex lue Gallica orta curentur, aliter vero, quae sine contagio sunt. Ad magnas & profundas fissuras labiorum, primum confert vinctio ex ad. & pe hodi: deinde anseris; etiam adiuncto melle ros. opus est, terebinth. abietis, adiectis floribus rosyssopo & mastiche. Alij intungunt cum melle folia solo aut cum succo bryoniae & sale, etiam folia bryon. apposita conueniunt. Vel: 2℥. amyli. perid. an. 3 ij. aquae ros. 3 ij. misce, & unge. hoc enim vinctio & fistulas sanat in labijs, & ea quae in febrib. contingunt. Si plura de his desideres, lege lib. 6. Petri Bayni cap. 3. de fissur. seu sciss. labiorum. Hoc & vnice commendat. vinctio nem & ulcera labior. 2℥. litharg. cerussa, plumbi vss. sem. l. yosiciani a. bi. an. olei ros. cere q. s. fiat vnguent. & unge. Praeter haec vitia, etiam curta, sicuti in aq. ribus, ita & in labris eueniunt: Graecis Colobomata, auctore Paulo lib. 6. cap. 26. vocantur. Porro iuxta eundem sarcini possunt; & hac ratione, curantur chirurgia. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox ore vulnere contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Deinde luetur illis injici debent, & conglutinantia. Non ad dentium mala progrediamur, & omnium praemo de dentium dolore.

OBSER.

OBSERVATIO III.

De dentium dolore.

Inter dentium affectus, is praecipuus esse videtur, qui a Graecis δονταλγία, a Latinis dentium dolor dicitur, a symptomate & parte affecta nomen sumens, ut patet 2. meth. medend. Hic namque maximis tormentis annumerari potest, inquit Celsus lib. 6. cap. 4. Id multi norunt, qui hoc malo affecti fuerunt, inter alios nobis occurrit vxor Lucae Andreae Cellij mercatoris Alcmariani; quae anno 1547. mense Maio ita dolore dentium afflicta erat, ut fere ad insaniam redacta fuerit. Vtebatur autem diuersis topicis remediis, sed ante vniuersalem euacuationem & purgationem. Inprimis nodulum quandam staphide agria inclusa, ex tonsoris consilio masticabat, pituita plurimum saliali ab ore continuo defluente. Cum neque haec iuuarent; magisque dolebat, collationi aquae vitae vel quintae essentiae (ut vocant) vsa est: sicuibus quoque per medium scissis denti dolenti applicitis. Interim maxillam quoque circa dentem dolentem inunxit oleis admodum calidis nescio quibus, etiam saponem, tum aliis infinitis empiricorum medelis impositis. Vtrum mulier aliqui distillata sordidie quadam innata non consuluerit medicum, ignoro. Vtrum dolore magis magisque supra vires aucto, me tandem consuluit. Cum autem faciem supra modum inflatam & rubram haberet, atque eandem plethora affectam esse animaduertentem, illico chirurgus accersito, ut in cubito è directo dentis dolorosi è vena cephalica sanguinem copiose mitteret, mandauit. Quo factum est, ut dolor ex incontinenti ita sedatus sit, ut nocte subsequenti plus dormierit, quam aliis quinque praecedentibus. Altero tamen die eucurbitulas cum scarificatione scapulis apponi iubeo, sanguine denuo utcumque extracto, & hunc syr. propino. 2℥. syr. de end. 3 j. oxym. simpl. 3 b. aqua end. beton. bugl. an. 3 j. misce. dulcia his nimis conueniunt, nisi fuerit mel. ros. oxymel. vel scilinum: nihil enim aequè dentes offendit uti sacchar. & quaecumque dulcia sunt, cum & eisdem corumpant. Huius exemplum nobis praebent Pharmacopoei, qui cum syrupus cum alia dulcia semper gustant, fere omnes dentes corruptos & excisos habent: sicut idem praestant; quibus & haec mulier perperam vsa fuerat. Et cum sicut per se dolorem dentium inducant, quanto magis dolore nunc praesentem auxerunt? Sequenti mane hoc leniens pharmacum sumpsit. 2℥. diacath. 3 vj. diaprun. simpl. seu lentis. 3 ij. pulu. hyssopi sicci, absinthij sicci, an. 3 j. fiat bolus, quo quinquies aluum deiecit. Mox ad topicum medicamentum deuinimus ad dolorem reliquum depellendum. 2℥. mastice. staphid. agria, an. 3 j. se hyssop. an. 3 j. fiat iij. & loabatur. & pituita ex ore defluente, ab omni dolore liberata, cum quadam admiratione, hoc remedio nunc iuuante, prius vero dolore inferente, idque ob causam antecedentem nunc per euacuationes (ut huius respondebam, cum huius rationem expecter) ablatam, cum in iis adhibendis remediis ordo obseruandus sit, quem empirici ignorant. Et ut huius curationi finem imponerem, oleo chamamelino & liliaceo exterius maxillam inungebat. Et his omnibus iam dictis sanata est, ac ab omni dolore liberata. Hoc exemplo omnes medicis remediis semper esse praeposenda, si ex defluxu

humorum vel eorumdem copia dolor aliquem locum occupet. Sic nobilis puella, annos circiter 22. nata, dentium dolore laborans, ex pyrethri masticatione magis afflicta est, tumore oborto in maxilla, guttur occupante, ut deglutire non posset. Huic aluo soluta per glandem, & sanguine demisso ex vena basilica cubiti dextri: (nam in dextra maxilla tumor erat, non sine febre) apposito cataplasmate. Deinde emplastro de mucilaginis: quod cum ferre non posset, ob odorem, ut dicebat, appositum fuit diachylon cum gummis: & intus ruptum est apostema. Exhibita vnc. i b. mannatis cum iure carnis, tunc prius demum curata fuit.

SCHOLIA.

Dentes viris fere 32. mulierib. 28. Maxilla 5
utrosque dentium ordines cum sedibus suis, ^{Dentes quos}
quas Graeci παρρία, nos praesepia dixerimus, conti- ^{Pharynia.}
nent, earum singula 16. dentes exigit: ex iis qua- ^{Praesepia.}
terni primi, quia secant, a Graecis τομαί, nominan- ^{Incisores.}
tur. In vtroque dentium ordine (inquit Holler.) qua- ^{Incisores.}
tuor acuti & lati, ut prehensum cibum solidum incidant, ^{Incisores.}
vnde τομαί & τομαί, iisdem παρρία, quod in visu sese ^{Incisores.}
maxime proferant. Inter quos duo medij & praeci- ^{Incisores.}
pui Columellares, exoriuntur fere primi septimo ^{Incisores.}
mense; quamquam aliis tardius. Hos ad latera ^{Incisores.}
Canini duo sequuntur: acuti quidem, sed non ^{Canini.}
lati, ac potius in cuspidem acuti, quales in canib. ^{Canini.}
cunantur. Hi ad dura ossa conterenda apti sunt, ^{Canini.}
duo numero in vtroque ordine. Ultra quos ab ^{Canini.}
omni parte Maxillares, quos & Molares vocamus. ^{Maxillares.}
Canini vero ad 10. fere mensem aut nonum enas- ^{Molares.}
cuntur. Maxillares, lati, duri, asperi, grandes, ^{Molares.}
plani, firmis radicibus defixi: in quibus, qui ge- ^{Molares.}
nuini vocantur & postremi erumpunt, tardissime ^{Molares.}
apparent vix anno 20. ut Arist. voluit, aut post ge- ^{Molares.}
nituram profusionem, ut Auicenna: Varro anno 7. ^{Molares.}
Reliqui maxillares ante secundum annum & se- ^{Molares.}
cundo anno producuntur. Primores, vulgus An- ^{Molares.}
teriores & Latcos appellat: Caninos vero, Oculares: ^{Molares.}
Maxillares parum deflexa voce Maxillarios. Cres- ^{Molares.}
cunt dentes, quia nutriuntur, & assidue teruntur ^{Molares.}
mansu. Excidunt omnes aetate: sed postremi ma- ^{Molares.}
xillares, nervos substratos habent a tertia coniu- ^{Molares.}
gatione: qui affecti imaginem praeserunt labo- ^{Molares.}
rantis dentis, quomodo & gingivae. Refert Va- ^{Molares.}
lescius de quadam Priorissa, cui per multum tempus ^{Molares.}
propter senectutem defecerunt menstrua, & tempestiui ve- ^{Molares.}
nerunt in vertice canis, & fere omnes cecidere molares, ^{Molares.}
vberum vero paruum aut nullum apparebat vestigium, & ^{Molares.}
vix in facie profundissima apparebant. Factum est ita- ^{Molares.}
que ut quicquid de capillis & pilis oriebatur & crescebat, ^{Molares.}
totum nigrum pellularet: & exibant dentes & molares, ^{Molares.}
sicut mos est infantibus fieri: sic etiam virebantur men- ^{Molares.}
strua, ac ut in iuueniculis, abundanter fluebant. Mam- ^{Molares.}
milla vero velut in virginibus eleuata fuerunt, montuosa: ^{Molares.}
rugae euasuerunt, & facies pulchra in tantum quod illa ho- ^{Molares.}
nesta & religiosa monialis Priorissa verecundabatur, & ^{Molares.}
vixit per multum tempus in religiosa vita. Et hoc fuit ^{Molares.}
quasi mysterium raro contingens. Refert quoque Bene- ^{Molares.}
dict. Veronensis. Victoria Febriensis cuiusdam feminae ^{Molares.}
octogenariae dentes quoque renatos fuisse, & a desinitio ^{Molares.}
capillos citros. Historiam dentium scribit Aristot. 4. ^{Molares.}
cap. 8. lib. 5. de gener. animal. cap. 1. lib. de partib. ani- ^{Molares.}
mal. cap. 1. 2. 3. 4. lib. 2. De hist. animal. Gal. 11. de ^{Molares.}
usu partium. Plin. cap. 37. lib. 11. Celsus cap. 1. lib. 8. ^{Molares.}
quos tyrones legere poterunt. Dentes autem in ^{Molares.}
propria substantia & sentire & dolere contra ^{Molares.}
multorum sententiam affirmat Gal. 16. de usu part. ^{Molares.}
& 3. de compos. medicis secundum locos. Vel propter ^{Molares.}

Si ab humi-
ditate cura-
tio.

7
Si a seccita-
te curatio.

Si a multi-
tudine den-
tium cura-
tio.

8
Si ab aliis
humoribus.

aceto tritum in ore retinendum prebet: senecta
serpentes ex tota essentia confert in aceto cocta,
ut patet in *simyl. med.* Exulta quoque & trita cum
oleo ad mellis solidi spissitudinem redacta, &
denti dolenti imposta, *iuxta Gal. & Archig. lib. 5.*
de comp. med. secundum locos succurrit. Si ex humidi-
tate dentes doleant, ac vacillent, sicca victus ra-
tione utendum, & diuturniore ciborum abstinencia.
Valent cibi sorbiles, alica, panis ex iure pul-
lorum madidus, similia aut oryza seu polenta
cum aqua mulsa, milium & lenticula, volucres
montanae & sicciore, ex oleribus brassica, pro
potu mulsa prodest, vel aqua modico vino mixta,
fotus cum milio & sale, & collutiones adstringen-
tes exsiccatelque, quales apud *Alexand. Tral-
lian. & Aetium* inuenies: Quaecumque etiam infrascripta
sunt ad mobiles & vacillantes dentes, qualia
& Donatus ex iisdem quoque auctoribus recenset.
Si a seccitate, ex cibis confert succus ptisanæ, mi-
ca panis ex iure gallinarum, cucurbitæ, malua,
ona forbilis, & quaecumque humectant. Potus,
vinum album, aquosum, dilutum aqua, medica-
menta acerbæ & austera vitanda, utpote his con-
traria, collutiones minimum adstringentes, me-
diocriter humectantes, aqua calida per se, vel
furfuris aut rad. dulc. extrinsecus admota: cum
sporgia, vel collutiones ex malua, ptisanæ succo,
amylo cum sapa, *iuxta Aetium*. Si autem ex multi-
tudine humorum doleant, venæ sectio adhibenda
ex humerali vel media è directo laborantium
dentium sita, *iuxta Aetij decretum*, & ex vena sub
lingua: & cucurbitulæ scapulis affigendæ, & si
venæ sectio prohibeatur, tenui victu humor con-
sumendus: & euacuato corpore ad topica deueni-
endum: de quibus postea latius. Si ex defluxu ca-
lidorum humorum, vniuersi corporis tum capitis
quoque ratio habenda, & bilis expurganda, deinde
iisdem utendum, quæ valent ad caliditatem.
Ita quoque si ex succorum frigidorum confluxu
dolor oriatur, toto corpore repurgato à pituita
& capite per apophlegmatismos, astringentibus
mediocriter utendum, & validissime discutientibus
& calidis: ut est ruta, polium, pulegium, ori-
ganum, hyssopum, capparis radix in aceto aut
vino cocta, & ex his collutiones paratæ, atque ea
adhibenda, quæ & frigida & humida intempe-
rici valere diximus.

OBSERVATIO VI.

De puella multis annis, dolore dentium afflicta.

Puella annos 18. nata quæ Delfis in insigni No-
la habitabat, plurimis annis dolore dentium
afflicta, variisque adhibitis remediis, tum iis
quæ empirica dicuntur, nullo modo sedari potuit.
Tandem ex mulierculæ neſciæ cuius consilio, duo
noduli vel parvæ puppæ lineæ ad pisorum magni-
tudinem confectæ sunt, quibus inclusa erant, pi-
per puluerisatum, sal, medius cortex sambuci, & filo con-
strictæ ne soluerentur: per vices denti doloroso ap-
positi sunt, & mox dolor cessauit, postea & alij
plures hoc eodem medicamento sanati sunt. Non
placet tamen mihi hoc remedium, si & humorum
adit defluxus, nisi corpore prius repurgato. Nam
anno 1558. cum eodem præsidio vteretur, in eun-
dem dolorem collapsa, nec illud præsidium iuuaret,
me vocari iussit. Corpore expurgato cum pi-
lulis infrascriptis. Recipe pilul. coctiarum, aurearum,
an. 3 ss. sicut pilula 7. ex quibus vicinque purgata.
hyperauri, ut supra dentem dolorosum radicem
lapathij acuti poneret per taleolas concilam, quo

remedio dolor illico sedatus est, cum tanto suc-
cessu ut eodem remedio in aliis quamplurimis
(præcedentibus tamen vniuersalibus præsidij) prospere
usus fuerim. Habui illud à rustico quodam: a
quo vero ille habuerit, ignoro, cum illud reme-
dium à nullo auctore scriptum inuenerim, quam-
uis apud Alex. Veronensem, medic. in doctissimum lib.
6. c. 5. scriptum repererim, quod lapathij sylue-
stris radices decoctæ succus in aceto, si percole-
tur, & eo colluatur os, dentis dolorem compescat.
Quemadmodum acaciæ cortex interior in vino
decoctus, dentium dolori confert, si os eo collu-
atur. Remus Astrucius Mathematicus insignis, ami-
cus noster, se pluribus experimento comprobasse
mihi fassus est, folia lappæ, sale adiecto, in aceto
decoctæ, ad dentium dolorem miraculose contu-
lisse, si decoctum tepide in ore supra dentem po-
situm dolentem frequenter deineatur. Idem
præstare dicuntur à Plinio radices plantaginis in
aceto decoctæ, quo remedio Ericius collega meus
uti solebat. Amatus, radices hyoscyami ramentum
supra dolentem dentem admoit, ac intra horam,
qui dentis dolore infestissime torquebatur, ab
omni dolore liberatus est. Verum ex causa calida,
vel bile dolorem ortum traxisse, patet. Noui
chirurgum, qui collutione decocti huius radices
modo in vino, modo in aceto aut aqua in omni-
bus utebatur, sæpe cum maximo iuuamento. In-
terea tamen ad stupefacientia medicamenta, nisi
summa urgente necessitate, deueniendum nequa-
quam erit: eisque paulatim utendum, & non nisi
in humorum calidorum defluxu. Sed de his latius
in scholio.

SCHOLIA.

Dentes si propter inflammationem gingi-
væ doleant, oleum lentiscinum recens *ex Hippo-
crate* (Gal. auctore 5. de comp. med. secundum
locos, & Paulo cap. 26. libr. 3.) prodest: & post ipsorum
lac asinum, sapa & palmarum stillamento
iuxta Aetium, aqua calida affusa, propter eius efflu-
silem, sed hæc post humore detractum adhi-
benda. Ita si in propria substantia vel in substi-
tuto nervo, fortiora adhibenda, ut collutio galla-
to aceto decoctæ. Si ex defluxu humoris frigidi,
is cohibendus est, etsi dolor perseveret, sed non
admodum urgeat, pilulis pituita euacuanda, &
collutionibus ex vino, in quo pyrethri radix, vel
capparis, vel folia ebuli, vel cucumeris asinini
cocta fuerint. Aliqui emplastrum ex sola pice ap-
ponunt. Teda ex aceto cocta, vel tithymali ra-
dix in vino apud Trallianum, apud quem & plura
remedia inuenies, & Alexandrum Veronensem,
qualia ipse ex aliis auctoribus collegit: vide etiam
Praxim magnam Benedicti Victorij Fauentini
præceptoris nostri. Sed delectus habendus est
iuxta mali causam. Noui quendam Guilelmum
Klockium nomine, qui cognatus meus erat, cum
nulla remedia iuuarent, cucurbitam cum scarifi-
catione suomet consilio maxillæ apposuit, &
dolor liberatus est. Non desunt (teste Alexandro
Veronense) qui initio tormenti sub mento cucurbitæ
securerint. Alij & sanguifugas gingivæ apposuerunt.
Nonnihil ob dolorem vehementem, pilonum
dentibus imposuerunt, quoniam opiatum esse di-
cunt: & ob id dolorem sedare quamvis opio non
vtantur, nisi ob dolorem insignem coacti. Exem-
plum Iacobi Iustiniani patritij Veneti, qui in
dentis dolore Patauij imposito oleo opiato (ut
refert Alexander Benedictus Veron.) sopore perse-

tuo extinctus est. Hipp. 7. Epid. castoreo, pipere
in vino coctis diuque in ore retentis. Aspalij con-
tingit à dolore dentium & gingivarum libera-
uit. Aceto scillino etiam os colluitur, & in frigi-
dis causis prodest: ut in calidis collutio ex aqua
ros. & caphura: aut decoct. pap. vel rad. mandrag.
& hyosc. & pilulæ è cynoglossa leuiter cum bu-
tyro soluta, & denti impositæ.

OBSERVATIO VII.

De quibusdam dentes corruptos & corrosos & fistulas
habentibus, & quomodo extractione den-
tium curati fuerint.

Dentes putrescunt ob humiditatem putredi-
nem inducentem, quæ putredo eosdem alte-
rat, & totam eorum substantiam corrumpit. Iam
quoque corrumpuntur sæpius post eorum corro-
sionem, & fistula tandem suboriuntur nonnullis,
si tempore non prospiciatur. Corroduntur a. ut
diximus est prius, ab humoribus acris & salis à
verberis ad ipsos defluentibus, à qua etiam dentis
dolor (ut diximus est prius) subinde oritur: ut
etiam cariosi fiant dentes aut foetidi, nam & his
etiam accedente corruptione raro dolor abest,
quin tales sæpiissime dolore fatigantur, quibus si
non statim vel admodum tarde succurratur, ple-
runque in fistulas abeunt curatu admodum diffi-
ciles, ut nos in aliquibus fieri vidimus. Ita maro-
na quædam nobilis, nomine Kerckverui, in su-
periore maxilla vel parte gingivæ fistulam quan-
dam habebat continuo virus eiaculante, ut
etiam foetorem ex sanie effluente in ore (quod mo-
destissimum erat) sentiret, quæ cum nullo modo cu-
rari posset, duos dentes caninos ex continua flu-
xione perforauerat fluxio, & insigni corruptio-
ne infecterat. Hæc an. 1567. mense Iunio è Brielis
Delfos accedens me ac Cornelium Ericium seu
Leydium collegam meum in consilium adhibuit.
Consultum est ut duo illi dentes & corrosi &
corrupti radicitus euellerentur, alioqui fistulam
curari non posse, & quod ossa maxillaria simili-
ter & alui in quibus dentes conduntur simul pu-
rescerent, ac carcinoma oboriretur aut aliud ma-
lum multo peius, quod totam maxillam inficeret
& corrumpere. Quibus rationibus persuasa ac
inducta est, duo dentes non pellicano instrumen-
to (ut chirurgi vocant) dentato extracti sunt, ne
dentes rempererent, ut sæpe fieri solet, sed alio
instrumento potius incuruato (quod tonfores vul-
gares pedem bouinum appellant) per eundem
collegam meum extrusi & exëpti sunt: mox cum
radicitus decidissent, os colluebat vino & non
aqua, & post vini ablutionem sale in loco fistula-
to posito, deinde ad maiorem puris educationem
solo decocto malua fiebat oris collutio, & ad ali-
qualem mundificationem sequenti lotionem & a-
bluebat & subinde colluebat os. 2. hordei non ex-
cocti an. 3. folior. malua, viol. an. m. ij. flor. ros. rub.
m. ss. fiat decoctio in aqua comm. pro lb i ss. col. adde syr.
ex infus. ros. rub. 3 ij. misc. Deinde ne fieret inflam-
matio, sequens administrabatur ad refrenandam
quoque & inhibendam fluxionem. 2. aqua malua
an. 3. i. aqua selari, ros. an. 3. iij. syr. viol. 3. iij. syr.
myrrid. 3. j. misc. Postea ad mundificationem, ex-
siccationem, consolidationem quæ sequuntur
prescripta sunt. 2. balsam. sumach aluminis vsti
an. 3. i. flor. ros. rub. m. ss. cernu cerui vsti 3. i. ss.
myrrid. albi vsti 3. j. fiat pul. ut alcohol. 2. melis ros. co-
lor 3. ij. misc. cum medietate pul. prescrip. Altera me-
dicata per se vsti referuerunt. Puluis cum melle ad

tempus admovebatur: deinde pulvis per se ad ma-
iorem consolidationem gingivarum inspergeba-
tur. Extractis enim dentibus non solum dentium
dolor (cui perpetua obnoxia fuerat) cessauit, verum
etiam fistula perfanata est, hoc quoque pulvere
ad consolidationem & sigillationem insperso.
2. aristolechia longa, sem. plantag. gallar. cornu cerni
vsti an. 3. ss. mastice, coralli albi an. 3. j. coralli rub. 3. ss.
boli an. 3. ij. summatum centaurij exsiccati 3. j.
flor. ros. rub. sic. 3. ss. fiat pul. ut alcohol. lauabat prius
vino cum pulvere admixto prius ebullito, facta
residencia. Deinde puluerem quoque siccum in-
spergebat, vel digito subinde cum vino intincto
puluerem admovebat, & egregie curata fuit, at-
que nobis vtrisque liberaliter soluit. Eodem
anno paulo post mense Septembri vicina nostra
& soror Rectoris Hieronymitanorum, cum diu
fistulam intus vsque ad nasum & genas ascenden-
tem, & excavatam haberet, ex qua perpetuo vel
ex dente atque gingiva virus stillaret, ita ut de
corruptione ossis maxillaris metus esset, cumque
dens non solum corruptus, verum vsque ad radi-
ces quasi exesus & cariosus ac consumptus esset,
radicibus ipsius dentis intus corruptis permanen-
tibus quibus tandem eductis eodem instrumento,
reliquæ dentis tum radices extrusæ & exemptæ
sunt, sanguine post dentis extractionem bene
profuso, & loco affecto cum vino loto, saleque
imposito, lotionem adhibuimus ex decocto flo-
rum, ros. rub. agrimonie, betonica, centaurij
minoris, plantaginis, melle rosaceo adiecto, at-
que aliis remediis supradictis vtens, à fistula &
dentium dolore hæc in totum liberata est. Memi-
ni quoque Ioan. Sasbotum iuniorem Delfum,
patricium qui in parte externa musculorum fistu-
lam habebat, cuius origo ex radice dentis corru-
pta procedebat, vel à nervo ad dentem corrosam
& corruptum perueniente, ita ut inde virus quo-
tidie in barbam manaret: cumque frustra pluri-
bus mensibus vsus esset diuersis remediis per chi-
rurgum, quibus consolidare non potuit (nam ci-
carice subinde obducta fluxione irritata malum vediba-
t, sordidum denno eructante) huic etiam consilium de-
di, cum illud à me peteret, ut dens corruptus ex-
traheretur, eoque extracto vlcus, deinde optime
curatum est, nempe in remediis quæ & vlcus re-
purgant, consolidant & cicatrice obducunt.

SCHOLIA.

Cum dentium (ut præceptor meus Bened. Fauci-
dicebat) quandoque ab humoribus acris *Ad dentes*
salisquæ à cerebro defluentibus in ipsos, corrosio *corrosos.*
exoritur, à qua deinde dentis dolor exoriri po-
test, ideo corrosione curata, simul & dentis dolor
curatur. Inprimis hoc præstans est remedium, ut
dentem corrosam diluamus hoc decocto: 2. rad.
lentisci, rad. quinquæfolij, lapathij acuti an. 3. j. bulliant
in aceto acerrimo donec tertio pars absintat; colatur
vsui referuetur salis 3. ss. iniecta. eoque dentem col-
luito & fricato, mox pilulam accipies ex sequen-
tibus qua cauernas dentis corrosi implebis: 2.
succei papau. albi, succei lapathij acuti, succei hyoscyami an.
3. j. piperis albi optime vsti & cribrati 3. ss. myrrid. sty-
racis an. 3. j. galbani 3. ss. fiant cataplasma cum passo, &
vno eorum dens corrosus tegatur, & eius cauerna im-
pantur. Dentes erosos Aëtius ex Gal. qui ex influxu
acrii humorum & erodentium generantur, ut
vlcera in cute citra aliquam externam causam, *Ad dentes*
curat per exsiccationem influentis vitiosi humo- *erosos ex*
ris; qui si paucus fuerit, sufficiunt localia remedia *Aëtia*
ex desiccantibus pharmacis conflata: si vero mul- *Gal.*
tus

us influens humor, totius corporis & capitis ratio habenda; deinde remediis topicis vtendum, quale hoc Archigenis: fori resina terebinth. exceptum denti circumlinito, atque in cauernam indito: vel veratrum nigrum tritum, cum melle: vel melanthion torrefactum, & acri aceto affuso tritum, cauo denti indito ac circumlinito. Habes a. syluam horum remedium apud Aët. lib. 8. c. 33. Paul. styracem cum opio imponit, vel sulphur viuum cum lycio lib. 3. c. 26. Habes ibid. & alia plura remedia Alex. Trallian. ad dentium erosionem hoc puluere vtitur: 2℥. cornu ceruæ cremati, salis ammoniaci an. lb. j. mastice, iunci odorati an. 3 ij. pip. 3 j. costi 3 iij. folij 3 iij. in puluerem redigito & vire. Vtrum sciendum dentium corrosionem in putrefactionem corundem sæpius terminari: ideo studendum (vt idem præceptor meus Bened. Fa-

9
Ad dentes
putridos.

uent. suadebat) ne dens corrosus in putrefactionem transeat: ad hoc præstandum valet experimentum Gal. 5. de comp. med. secundum locos expertum, vt melanthij 3 j. nitri 3 b. simul torrefiant exstinguanturque acerrimo aceto, teritoque & cauernas dentium impleto; atque hoc continuato, ne vltra erodatur dens, & in putrefactionem transeat. Valefcus, prima, inquit, intentio curandi circa dentes putrefactos est, vt eos custodiamus, ne amplius putrefiant: id quidem præstat per purgationem materię antecedentis, sicut de dolore dentium dictum est: secundo per euacuationem materię coniunctę. Atque omni hora post cibum foramen dentis corrupti repurgetur à cibis ibidem retentis: & deinde vino colluatur os. Medicamenta, quę putrefactionem & dentium corruptionem prohibent, sunt exsiccantia; vt lycium, thus, mentha, myrtus, mastix, cyperus, myrrha: quę non solum corrosionem & corruptionem prohibent; verum etiam dolorem sedant. Plura vide apud eundem. Si vero excus est dens, festinandum est ad eximendum eum: nisi res cogat, non est necesse: sed prius tentandum, nunquid supradictis prædictis dolor discuti possit, adiectis iis, quę vitiatis eiusmodi dentibus profunt, & in dolore. Sic quidam ad dentes erosos succos ex ligno hederę inciso emanante vtuntur. Dolentibus imponitur ephemeridi radix, quę eorum cauis imprimitur: vel chelidonię radix ex aceto illinitur vel ore continetur. Si carioli & fœtidi sunt, centum ranarum corda, in furno arefieri per noctem; postea tantundem salis addi, atque fricari prodest. Dentes a. & corrumuntur & corroduntur non solum à pituita falsa vel bile, aut aliis humoribus (ita, vt medicamentis eundem humorem purgantibus prius sit vtendum) potest enim fieri vitio totius corporis, vel assidua fluxione ex cerebro (vt diximus) nonnunquam & hepatis & præcipue lienis vitio, vt in scurbutis: de quib. suo loco dicemus. Sal cum alumine vsum aceto exstinctum & dentibus impositum, vel sal solum retentum sub lingua, vt liquetur, prohibet dentes putredine & corrosione, vel acetum cum iisdem rebus exstinctum prodest, si eo colluatur dens, vel eidem applicetur. Si adsit fœtor, adde moschum, si putredo, myrrham: & opple cavitatem, vel repleatur bombace, qui odorem musci habeat: solet enim moschus in eo asseruari. Sed ab eo abstinere debent ij, qui dolore capitis facile tentantur, aut mulieres obnoxie malis vterinis. Solent & vermes sub dentibus nasci vel subnasci, quos & arrodere certum est, à quibus dolor subinde non ita fortis, sed pruriginosus oritur, vel corrumuntur atque fœtorem emittunt. In dentibus enim vermes nasci non mirum est, quoniam & in ventre, intestinis, sedif-

12
De vermibus
qui dentibus
inascuntur.

que partibus auribusque oriri videmus. Vidimus & nos ex umbilico vlcerato erumpere, vt de febribus diximus; sæpius quoque è naribus proicctos; vomitu vero sæpiissime. Scribit & Benieu- nius ex pectore & pulmone cussi eictos: addit etiam Dodonæus in vesica natos & cum urina emictos; cui insignis dolor prius aderat, qui sopitus est post vermis expulsionem. At in dentibus existentes, necat hyosciami albi semen, cape porri que si cum nitro in trochiscos digerantur, ex senu caprino: carbonibus conijcitur pastillus, cuius vapor per fistulam in dente recipitur. Idem facit plantaginis radix commanducata, aut chelidonię in aceto decocta colluto ore, succus foliorum centaureę & persicę arboris, & his similia, quę intestinorum animalia necant. Quidam laudauerunt, aqua ardente seu vini sublimatione os colluere. Sed quod de fumigio feminis hyosciami scribitur ab antiquis medicis scriptum, quod & vulgus sibi periuadet, Holerius fabulosum esse tradit: nam inde aiunt manifeste vermes excidere. Reuera incenso semine euolant tanquam vermiculi, etiamsi non attingat fumus vermiculosum dentem. Is vtitur decocto colocynthidos, pilul. communibus, aloë, myrrha, & puluere contra vermes. Quocunque modo corruptela dentium sit, idem trahit quod tribus generibus remedium curetur: Nam dens corruptus & vitiosus medicamentis acribus sic catur, tabescit, vt deinde sponte sua excidat; vel ferro extrahitur, atque tertium remedium est, quod est incolumis, relinquatur. Sed de extrahendo dente non satis conuenit inter medicos veteres: quanquam magna pars vitiosum & corruptum dentem extirpandum credidit. Erasistratus non temere extirpandum putat: eiusque rei testimonium adducit, quod in templo Apollinis idem magis, forceps dentarius plumbeus suspenderetur, quo significaretur non esse tollendum dentem, nisi vacillet, vt plumbeo forcepe excludi possit, id est nulla vi: qui si qua parte carioli fuerit, id est vitiosus, vitium scalpro atteratur, relinquatur quod sanum est. Ac reuera non temere euellendus dens est; sed si corruptus, totus tabidus, vacillans; si nerui subiecti inflammatio, à qua periculum imminet: sic enim excluso dente liberatus nervus, iam non apprimitur, sed transpirat, & remedia conuenientia admittit. In corruptela videndum quanta ea sit: aliquando enim superficialis est, aut extremę parti insedit: quomodo in ossibus asperis & cariis non os totum excindimus, sed aspredinem & cariem scalpro deradimus; ita in dente pars quadam deciditur lima, radice incolumi. In medicamentis a. quę hæc faciunt, exsiccant & tabefaciunt, acria sunt omnia; lac tithymalli, exuium serpentis. Gummi hederę vulgo cognitum est remedium, quod religione quadam colligitur post medium August. & intra Id. Sept. eoque vtuntur ad dolores dentium. Exuium vero serpentis, remedium est memoratum ab antiquis Gal. 11. de simpl. med. fac. decocto eius vtitur contra dolores. Archigenes comburit, miscet oleo & melli, illinit ægro denti, munitis cera, vel re simili dentibus vicinis. Idem quoque non vsum denti admovent, vt excidat: pyrethrum, aut radicem cucumeris agrestis in aceto acerrimo triduo maceratam teres: inde purgato denti: id ad 3. aut 4. dies repetes, vt dens excidat. Adeps ranę vitiis dentem quoque depellit. Licet vi cauteriis per canaliculum denti impositis: atque cauteria modo è ferro, modo è testa nucis, radice gentianę, & similibus comparantur. Sunt qui oleum calens vel aquas fortes denti immittant, vt exci-

dat. Quisiam etiam peninā denti admovent aquam fortem ad tollendum dolorem: quod nobilis quidam mihi familiaris facere consueuerat: quo quidam præsidio dolorem subinde sedabat, sed dentes corrumpebantur & frustatim excidebant, vt aliquos dentes absque extractione ita amitteret. Præceptor meus Bened. Fauent. in summo dolore iubeat, vt dens dolens stylo vel terebello subitur, si res ita exigeret. Quo perforato & à superfluis mundo, & vacuo foramine peracto, stylo theriaca magna & recente foramen implebat, & ter die noctue id peragebat; è vestigio dolotis (vt etiam in sua Praxi magna amotuit) à multis causis prodierit: tollitur: præsertim si à vermiculis dolor excitaretur. Quod si perforato dente dolor infestissimus æque vrgeret, foramen lacte vel succo tithymalli implebat: cauendo ne alios dentes attingeret: vel stylo acutissimo vltionem peragebat. At nos in istis ægris, cum ad fistulas malum processisset, ferro dentes eximendos esse consuluimus. Interea antequam ferro extrahantur; animaduertendum est, ne propinquitate loci, vntis incaute eximatur pro alio dente, neue rheumatismi eruptiones maiores eueniant, neue maiores eueniant cruciatus, & apostemata periculosa. Ideo tutius præstat post corporis inactionem ac doloris mitigationem, ferramento eximere, circumscissato ad imas radices dente, vt mobilior reddatur, aliquam maxillæ adhaerentis pars sequitur: vt nuper illud tonsori cuiusdam fortiter attrahenti contigit, qui tamen æger magno cum labore maxilla prius existente corrupta & corrola, præter spem multorum curatus fuit. Quibus enim hæc eueniunt, rheumatismi magno dolore ac non exigua inflammatione effusim erumpunt: quæ de causa multi interierunt. Et ita si dens cum ossis frusto eximitur, dolor sequitur vehementior, ac febris interdum. Propterea conuulso dente ab intrepida manu, si dolor per se deo, rofaceum cum mastichis & rosæ aridæ decocto, si ore contineatur, dolorem leuat: alias aceto cum gallæ immatura & balaustiorum decocto os colluere conuenit. Hinc Paulus recte admonet Chirurgo & Dentarios medicos, quod dens, qui eximitur, vsque ad receptaculum suum circumradi debet, inde forcepe paulatim concussus, extrahatur: vel nostro instrumento quo vti solent, si timeatur dentis fractio, extrudatur. At replendum, ne contractus sub forcepe confringatur. Eo exempto, sale tenuissimo inperso reliquas carunculas consumemus, postea vino, aut posca os colluatur, dum sanescat.

OBSERVATIO VIII.

De dentitione infantium.

Circa mensem fere septimum, inquit Paul. lib. 1. c. 9. pueris dentes plerumque erumpunt: quamquam quidam (quod rarissimum est, & miraculi fere loco habetur) cum dentibus nascuntur; M. Cuntio exemplum. Aliqui & vice dentium conuulso osse vno geniti sunt. Seruum Æthiopem (inquit Bened. Veronens.) infansito veluti omne, quod omnes dentes ferratos veluti caninos habebat, olim emere nolimus. Cum vero canini, quibus discriminant, erumpunt, maxime cruciati- bus afficiuntur infantes, alioque cita tentantur. Quo quidem tempore cum erumpunt dentes, teste eod. Paulo, gingiuarum, maxillarum, tendi-

Per. Forest. 1. qm. 2.

numque phlegmones, id est, inflammationes, non raro etiam conuulsiones infestant, sic etiam Hipp. dicente, aph. 25. lib. 3. In progressu vero cum iam dentire incipiunt, gingiuarum pruriginis, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maxime cum caninos dentes edunt, & his præsertim pueris, qui trassissimi sunt, & aluos duras habent. Quod cum infantibus sæpe accidat, cum ad eos vocor, cerebello leporino pauco adiecto melle, vtor. Auctores etiam (vt & Paulus) cerebello leporis emolliori tradunt. Sic & Bayrus. Fricare gingiuas cum cerebro leporis, facit nasci dentes infantum sine dolore. Verum vtrum crudo vel cocto vtendum sit, non dicunt. Coctum non bene permiscetur melli: ideo mulierculę crudum accipiunt, & cum cochleari vno mellis concutunt. Sed valde fluidum est: ideo minus mellis accipio, vt in crassius linamentum coeat, meliusque frictione gingiuas adhareat. Attamen cerebrum leporis attritum & esum vtile esse Gal. se didicisse fatetur lib. 11. de simpl. med. fac. pueris dentientibus: capite videlicet toto elixo, vt & ipse facere solebat: non enim minimam vim ei inesse, sed similem melli & butyro & aliis, quę ad pueros dentientes conueniunt. Quem forte Auicenna imitatur, cerebro leporis post decoctionem de capite extracto, aut cum alcanna & oleo liliaceo vtitur. Nos etiam commode vti sumus adipe gallinaceo, iuxta Paulum: & vbi dentes emicuerint, lanam delatiorē atque sinceram ceruici ac capiti & maxillis applicamus.

SCHOLIA.

Pueris vero cum difficultate, & accidentibus vehementioribus dentes exeunt: nonnullis tardius, vsque ad 3. vel 4. annos ob debilitatem virtutis, teste Valesco; vel ob impedimentum materię, modo ob fluxum, aut à vermiculis materiam eorum consumentibus. Alij ex cerebri nimia humiditate difficilem dentitionem fieri credunt; vel ob caloris natui inopiam: nam quibus cito egrediuntur & dentunt, calidioris cerebri esse existimantur. Rhales ex Gal. auctoritate dicit, dentitionem citam esse leniorem minusque dolorificam; tardam vero durioris robustiorisque productionis, vehementiusque dolens: vernalet vero velociorem esse, & dolore carentem; hyemalem a. fieri modo contrario, sine gingiuarum consumatione. Neoterici in dentium productione gingiuas omni die cum butyro perungunt, & cum hordei grano interdum perfricant, pro leuiori dentis eruptione. Aliqui mel infantibus ministrant; quo eorum palatum, gingiuas & linguam perungunt, adiecto thuris exiguo & glycyrrhizę & lacte canino gingiuas abluunt. Si dolor sit immodicus & intolerabilis, succo solani tanquam narcotico, & oleo rosæ calefacto easdem inungit. Lac quoque maternum illitum prodest, aut cerebrum ouillum in cibo datum, vel eo gingiuas confricatis, aut gallinaceum ortum festinant. Dens caninus crematus & in gingiuas impositus sine dolore ortum promittit. Dentientibus quoque ex Plin. iris rufa valet, & corallorum cinis, & Delphini dentium cinis cum melle; & ouis cerebrum illitum. Pueris quoque subinde dentium stridor etiam mente commotis contingit; noctu præsertim cum ventris animalibus cruciantur; Si ex conuulsione sit, comitialē morbum vel apoplexiam præfigit; qui & in adolescentia liberantur, quoniam materia arefit nimium, ac lacerti & mouendi vires robustiores sunt, stridunt vel tremunt dentes

Facilis dis-
scilioque
dentitionis
causa.

Dentium
stridor in
pueris vel in
mente com-
motis aut
adnatis.

Ex nervo
emollito ci-
ratio.

Ex radici-
bus dentium
corrosi.

Dentium re-
laxatio ex
carne gingi-
varum ab-
sumpta.

& ceruini cornu cinis doloresque eorum mit-
tigat siue infricentur siue colluantur. Sed in ner-
uo, qui multa pituita mollior ac infirmior est,
omnibus modis vacuanda pituita est pharmaco
purgante, erichinis, masticatoriis. Deinde ad col-
lutiones siccatentes & astringentes veniendum:
alioqui adstringentia excepta melle rosato, syr.
myrtillor. conferua ros. cornorum, & similium
adhibentur denti. Acetum scilliticum confirmat
dentes, & constringit gingiuas: lac asinum simili-
ter, vltimi cortex & ramuli in vino cocti, vt inde colluas.

Potest aliquando causa esse mobilitatis dentium
corrosio in radicibus dentium. Tunc etiam mate-
ria vacuanda est medicamento purgante, quod
vel bilem flauam, vel atram, vel pituitam falsam
purget, vt dictum est prius de corrosione. Valet nigella,
Romana torrefacta trita ex aceto acri denti im-
posita: vel collutio radicis angelicæ, tormentil-
læ; vel sapathi acuti in aceto prius coctæ: quo
aceto os colluitur, & denti vna radice apposita:
alumen quoque cum aceto. Relaxantur etiam den-
tes carne gingiuarum absumpta, quæ replebat &
firmabat interualla dentium. Huic affectioni oc-
currimus toforum vel cariei, quæ est supergenita
ablatione: deinde aceto scillitico dentes frica-
mus. Postea vtimur puluere ex alumine, corallo
rubro superscripto, ad siccationem; adiectis iis,
quæ sarcotica sunt, thure eiusque cortice, aut ireos;
aristolochia vel farina orobi, nisi amaror prohi-
beat. Pistolochia radix & ireos id præstat, & odo-
rem gratum & iucundum spirat. Alex. Trallian.
ad dentium relaxationem & gingiuas erosas digi-
to cum salua hunc puluerem imponit: Salis am-
mon. aluminis rotundi an. 3 ij. myrrhæ 3 j. in puluere re-
ductis vtior. Alij ad dentes commotos ex carne
diminuta gingiuarum, puluere sequenti dentes
fricant: Aluminis de pluma, balauft. sanach, an. 3 ij.
liqui aloes cyperi an. 3 j. fiat pul. Etiam sequenti vtun-
tur quidam ad dentes commotos & gingiuas cor-
rosas: Gall. cupul. glandium, aluminis Romani, corr.
gram. an. tere subtiliter, & applica. Fit aliquando vt
caro illa, quæ est in internallis dentium, super-
crescat, & sanguis inter mandendum reiciatur.
Tunc frigidis & astringentibus caro illa duranda
est, vt aqua aluminosa, quæ repellit sua frigidita-
te & astringit. Prodest etiam colluere os sacco
cydoniorum, aut alicuius herbe, quæ sit prædita
simili facultate: vel mandere pyrum, vel malum
cydonium. Postea vtile fuerit, corall. rub. & spon-
gie bedeg. & rad. bislorie inspergere. Aët. ad laxatos
dentes & gingiuas humectas vtitur aluminis sciss.
in fictili vti 3 vij. xij. 3 iij. gall. flor. ros. iridis an.
3 ij. croci 3 j. Ac alumen rotundum cum duplo sa-
lis pondere tritum dentibus ob humiditatem in-
spersit. Quæ ad dentes dolentes & simul laxa-
tos valeant, vide eundem lib. 8. c. 29. & quæ Be-
nedict. præceptor meus capite proprio de iisdem
scripserit.

OBSERVATIO XII.

De quodam, qui elongatione dentium laborabat: & de alio
cui vnus supra alterum oriebatur & crescebat.

Solent fere dentes (teste Aetio lib. 8. c. 30. moti
faciliter reliquis esse prominentiores, maxi-
me cum ex verbera hanc affectionem incurrerint.
Quod cum iuueni cuidam euenisset, lima eos at-
terendos esse duxi, in quantum scil. præ aliis pro-
minent, ne in loquendo, vel etiam manducando,
eos qui obiciuntur, offendant. Tali n. remedio
etiam mulomedici vti solebant in equis nimis an-
tiquis, vt iuniores apparerent. Ideo si hoc præsi-

dio vti vellet, ad chirurgum eundem remissum
vt illud ipsum dextre ab eo fieret. Nam noui puel-
las quibus frusta dentium eminebant, locolima
digitali ea ipsa lima atterebant. Attestatur a. &
experimentum ipsum, quantum sane ego (inquit
Aetius) eius rei periculum feci. Ferream namque
limulam ad hanc rem apparui, quo citius ac effi-
caciùs res procederet, si modo aliqua spes esset
moti dentis firmandi. Si a. caput ipsius limæ ob-
tusum, forma nuclei, & quam leuissimum. Itaque
aliquando quidem inæquales quædam dentium
eminentiæ apparent, in quibus partes tantum ali-
quas lima atterere opus est. Aliquando a. æquali
planitie extremitates prominent: quare æquali
et ac plana per limam attritione indigent. Opor-
tet a. molle quoddam linteolum gingiuis ipsis vsu-
que ad dentium radicem adhibere; deinde leniter
sinistræ manus digitis apprehendere, cauteque ac
citra offensionem limam adfricare, ne sub manu
ipsa doloris impatientia affectus ager concitior
tut. Quod si omnino dolorem percipiat ager
dum lima adhibetur, aut ob id quod vehemen-
tius digitis dentes apprehendantur, quiescere sta-
tim conuenit, interimque collutiones dolorem
mitigantes offerre: deinde, vt dictum est, rem ag-
gredi, & paulatim lima deterere; atque hoc non
prima saltem die bis aut ter conari, verum & se-
cunda repetere, ita vt ægro imperes, vt neque se-
cunda nimium vtatur, neque vllum aliquem duri-
orem cibum adsumat. Et ita iussimus, vt cibus
forbilibus vteretur, aut pane madefacto, tam diu
donec chirurgus opus suum compleuisset. Alter
vero iuuenis dentem vnum supra alterum enati-
centem habebat, alioqui facie honesta. Huic con-
sului, vt is, qui eleuatus erat supra alterum, à
dentario medico vel tonsore extraheretur; idque
dextre, ne alius laderetur.

SCHOLIA.

Quod si citra laxitatem quibusdā etiam præ-
sint, eos similiter lima atterere oportet, ac collo-
de elongatione & augmento dentium, stringatur
dens & cum serra, id est, lima, auferatur quod su-
perfluum est, & illinatur cum alumine & baccis
lauri & radicem aristolochiæ longæ. Indebita,
inquit Valesc. elongatio dentium fit, vt plurimum
in dentibus anterioribus & in aliis etiam quando
suum par deficit. Nullumque aliud remedium
aptius est, nisi vt lima auferatur, & post serrato-
ram iuxta Auic. dentes sæpius fricentur puluere
ex granis lauri, alumine & aristolochia. De gene-
ratione dentium idem inquit: Vidi aliquando
dentes nasci supra primos caninos, ita, vt quatuor
nascerentur; super primos duo superius, & duo
inferius. Is qui superfluum est, forcipe, vt dictum
est ex Paulo, auferatur, vel medicinis eradi-
cetur, gingiuas à carne nudatis, cum lacte tithy-
malli vel puluere esulæ, vt scholio Obser. 7. diximus,
reliqua vide apud Valesc.

OBSERVATIO XIII.

De dentibus male coloratis.

Empiricus Dentarius dentes nigros & male co-
loratos penna intincta oleo vitrioli, amoris
prins tosis, albos reddebat, penna oblique scissa,
vt commodius dentes detergeret: nos etiam cum
oleo vitrioli gutta vna aut altera aquæ admixta, vt

vt matronæ dentes fricent iubemus: hoc n. modo
& flauis & nigris albisque euadunt, cum & oleum
vitrioli vacillantibus dentibus prodest, modo non
fiat ex fluxione humorum; qui prius expurgandi
vt scholio sequenti latius dicemus. At pumex
ignitus vinoque albo bis exlinctus, & tertia vice
ignitus relictus, donec refrigeretur absque alia
extinctione; demum tritus & ablutus albisimos
facit dentes, nec eo magis celebre experimentum
inuenitur; imo si dentes eo quamuis non combu-
sto sed trito, fricentur, albisimi euadunt.

SCHOLIA.

Dentes colore tradit Gal. melongia infici, h.
e. nigrescere, vapore malo taliter inficiente:
sed quæ sit melongia, paucis ex Bened. Ver. attin-
gam. Tradunt eam herbam ætate nostra peregrina-
nam ad hortos peruenisse, duorum generum, al-
bam & nigricantem, cucurbitulis Aug. mense de-
pendentibus, iam familiarem, & in fenestris col-
locari. In cibus nonnullis grata est; humorem me-
lancholicum generat. Matronis quoque id vitium
quibusdam smegmatis faciem venustam reddentibus
oriri solet, argento sublimato imposito, quæ
& animæ grauitatem facient geminata cura. Ni-
grescit & vniuersa intus materia, subeunte dira ta-
be, quæ interna causa est, dentes viridi aut nigro
colore inficiens, vel aliunde prognata in dentes
irruens ex fluxione, & tosi que innatis dentibus.
Alia quoque externa causa est, vt linimenta in-
lue Gallica, vel ex cibus dulcibus masticatis fa-
piusque syr. sacch. tum aliis gustatis, vbi phar-
macopoeos dentes nigros habere ceruimus, &
alios qui cibus dulcibus vescuntur, vel putamina
necium viridium gustant, aut pomorum punico-
rum & fructuum mororum nigrorum & rubi, aut
edulia fumunt, quæ in vasis metallicis condun-
tur, vt in vase plumbeo vel stanneo. Horum me-
dela facilis est per causæ illius denigrantis remo-
tionem: quoniam sicuti facilis est impressio ac-
debilis, eadem ipsa causa procacitè à dentib.
facile expurgabitur. Non defunt quoque qui ex
contactu rerum fetidarum dentes nigros & cor-
ruptos habeant: vbi contingit illis qui coria præ-
parant quibusdam pinguedinibus tingentibus vt
sutores, calcearij, cerdones, aut qui elixatis cibus
in cupreis aut æneis vasis vtuntur. Omnia enim
metalla exceptis sole & luna (quod chymici norunt)
in se se abstruunt & rubedinem habent, qua citi in
iis preparati dentes inficiunt, qui ex natura albi
& lucidi sunt. Harum orantium causarum, si sint
externæ, facile cognoscuntur ex ægri sermonibus
signa. At internæ egent maiori distinctione, quæ
ex cacochymia, vel fluxione fiunt ex humore præ-
dominante, vt de doloribus dentium nunc satis
explicatum est. Causæ externæ vt iam diximus,
remouendæ sunt: ita & tosi remouendi, dentifri-
cibus & abstergentibus ac mundificantibus,
dentib. sæpè lotis vino albo, & sale vltro confrica-
tis, illud n. tosis absument. In omni a. causa pingua
vitabimus, potissimum si ex dira tabe, ex materia
constitente virides aut nigri fuerint: & somnum
protinus à cibo, vomitum acetosum, cauebimus:
& ne in cibus fungi, aut seclami semen sumatur: à
longis n. sumptis, vt à cibus corruptis, hoc malū
aliquando contrahitur: ideo stomachi ratio ha-
benda est, & iis vtendum, quæ proprie ad fungos
faciant, & eorum venenositatem reprimant & cu-
rent. Ita quoque si ex cacochymia aut corruptis
humoribus ad dentes confluentibus dentes male

colorentur, materia illa antecedens prius parata à
corpore toto & capite, si per modum defluxionis
originem malum trahat, purganda: tum etiam à
ventriculo. Et ideo (vt recte dicebat Aet.) liuent
aliquando dentes per vniuersam ipsorum substantiam,
non dissimile quiddam inflammationi pa-
tientes, ob influxum videlicet vitioforum humo-
rum. Quare consimili cum his, qui erosionem passi
sunt, indigent curatione. Humoribus itaque flu-
xionem concitantibus repurgatis, ad dentificia
veniendum, quæ exsiccant & abstergunt: qualia
sunt sal torrefactum cum melle, puluis parietariæ,
amygdalæ amaræ, cornu cerui, margaritarum,
pulu. eboris, & coralli, iris Florentiæ, marmor
tritum, pumex vltus, os sepiæ. Et quibus denti-
fricia consiciuntur. Quorum copiam inuenies apud
Rondel. in methodo sua. De curandis morbis, c. 75. de
dentium dealbatione. Habes etiam smegmata varia
apud Aëtium ex Apollonio & diuersis, quale hoc
est: Sal fissile melle subactum in fictili vase torreo, ac
tritum modica myrra misceto, eoque dentes conspicio.
Talos ouillos exure, ac contritis vttere. Ad eadem
pollent buccina sale expleta & vsta, conchæ vsta,
sepiæ testa vsta. Singulis odoris commendandi
gratis parum iridis Illyricæ, aut floris iunci odo-
rati, aut calami Indici aut spicæ nardi miscetur.
Archigenes ad dentes à dolore præseruandos, tum
ad gingiuarum erosionem, atque etiam decorem
dentium, pharmaco hoc vtatur. Lanæ succi-
das linteolo illigatas vre, & salis torrefacti ter-
tia earum parte admixta contere, & pro denti-
fricio vttere. Illud quoque Pauli ad candorem
dentium facit, & oris suauitatem, gingiuas re-
primens: Pannicis, salis tosi an. 3 iij. iunci odorati
angulosi 3 v. spicæ nardi 3 j. piperis 3 vj. tritis vtior.
Hæc satis de dentium affectibus: quos omnes
nunc absoluius: hinc ad gingiuarum mala tran-
seamus.

OBSERVATIO XIV.

De gingiuarum dolore atque inflammatione.

Gingiuæ cum etiam vna de oris partibus ha-
beantur, post dentes de iis quoque agendum
censuimus, cum ad ornatum oris & dentium crea-
ta sint, tum ad firmitatem, fixationem & stabilita-
tem eorumdem: vt etiam eorum opera recte per-
ficerentur, à Deo rectè ordinata sunt. Sane persi-
stentes dentib. admodum commodæ sunt. Verum
cum à suo habitu naturali collabuntur, plurimas
affectiones pati possunt: quas etiam operæ pre-
tium est, vt non prætereamus: vt tyrones sciant
quib. modis corrigendæ & curandæ sint, si aliquo
affectu lædantur. Ex qualibet leui ac facili causa
afficiuntur: dolent n. inflammantur, apostemata
incurrunt, vlcérantur, corroduuntur, in cancrum
transcunt, vel fistulas: corumpuntur, & fetent
putredinis ratione, intumescunt ac flaccidæ &
molliores fiunt, & ex facili causa exsanguinan-
tur, sanguinemque fundunt: eo quod humidæ &
humorosa sint, modo iisdem accedit augmen-
tum carnis & diminutio eiusdem. Ita quidam
iuuenis tempore verno sanguine prædominante
cum gingiuas dolentes haberet, non sine inflam-
matione, cum & rubedo & sanguinolentia in
gingiuis apparerent, cassia prius in bolo assum-
pta, die sequenti, vt venam cephalicam aperiret,
mandauit. Quod si neque ea sectione dolor
mitigaretur, & gingiuæ detumescerent, vt ve-
nas labiorum interiores chirurgus etiam secaret,
id quoque vtile est. Estque illud generale præ-
sidium

fidium gingivarum, tum oris aegritudinum, si ex sanguine superfluo oriantur, vt prius secta vena ex cephalica, mox sub lingua aut ex labiis interioribus vena secetur. Eaque vena secta in labiis dolor, tum inflammatio plurimum mitigabatur. Deinde, vt os tum gingiuas collueret decocto ros. virgæ pastoris, plantaginis, herbæ sanguinaria & portulacæ. Quibus si non sedaretur inflammatio nec dolor, vt ad remedium Aëtij lib. 8. c. 20. ad inflammatas gingiuas cum dolore (quod ex Gal. accepit) accederet, consului, nempe oleum lentiscinum conduplicato linteo calefactum, ac in ore circa gingiuas detentum. Sed oportet recensere: inueteratum nociuum existit. Illud enim caliditate temperatum, in quacunque alia oris parte dolor ex inflammatione oriatur, eundem sedat: repellit enim absque molestia, & discutit citra mordacitatem. Et supradicta remedia egregie contulerunt: alioqui ad aliud remedium Gal. quoque valde familiare peruenissem, nempe oris collutionem crebram ex aceto decoctionis hyoscyami: nam & hoc in dolore urgente etiam confert.

SCHOLIA.

3 AD dolores & inflammationes gingivarum, tum apostemata, quæ vt plurimum sunt ab humoribus à capite in eadem defluentibus vel à stomacho sursum ascendentibus ex vaporibus eleuatis, acetosis, correptis & fumosis. Quod si à stomacho, ibidem sentitur grauitas, uti & à capite. Quæ a. sit materia facile per tactum & visum dignoscitur: per paruum dolorem & remissum, quod significat humorem frigidum: sentitur n. frigiditas, discoloratio gingivarum & minoratio doloris. Per magnum vero dolorem & intensum humor calidus sanguineus vel acris notatur: calor enim sentitur, rubedo & punctura. Inflammationes hæc si non statim reprimantur, ad apostemata transeunt, vel parua vel manifesta, & ista citius rumpuntur & curantur: vel in profunda & magna, & tardius rumpuntur & sanantur. Interea & illud adiciendum ex Gordonio, quod gingivarum passionibus minime sint contemnendæ: si enim diu durauerint, transeunt in cancrum, cum materia fuerit sicca & melancholica & adusta: alioqui si humida, pituitosa, salsa, in fistulam: & talia sunt valde mala. Quod ad curationem attinet, Neoterici, vt Valescus, si ex calore & materia sanguinea, sanguinem mittunt ex cephalica: deinde ex venis sub lingua, vel sub labiis. Præceptor meus in dolore cum inflammatione etiam post aures cucurbitulis etiam scapulis impositis vtitur. In bile purgat cum succo ros. in pituita cocta materia cum iis, quæ ad dolorem capitis ex pituita valent. Valescus si à pituita crassa, cum hiera, cum diaturbith. ita & de atrabile, vel succo melancholico, vt cap. de dolore capitis ex melancholia. Deinde ad topica deueniunt. Veteres ex causa calida, vt Aët. lacasinum in ore detinebat, præter oleum lentiscinum iam dictum, ubi dolores maxime infestarent: quo dolores mitigabant, & ex tempore sedabant: etiam succo portulacæ: abstinebant ab aceto, acris, acerbis & salis, quæ infensissima sunt inflammatis gingiuis. Valescus in apostemate calido frigidis prius utebatur & stipticis: postea oleo rosaceo vel mastichino, in quo bullierant spica & rosa sicca. Si frigidum esset apostema, immiscebat iisdem aliqua calida resolutentia, vt alumen, vel sal, & eiusmodi. Postea si videat ad maturationem tendere, butyro iungit

gingiuas, & cum succo ireos & melle illud aperit, & facit effluere saniem. Post rupturam exsiccat, & sanat. Quod si nec iis modis aperitur, cum decocto caricarum vel lini & iam dictis phlebotomo aperit; & statim dolor cessat gingiuæ & dentium & maxillæ. Si apostema est profundum, cautione quadam applicat repercussiuæ, maturatiuæ, & resolutiuæ; deinde cum phlebotomo aperit, & lauat cum melle exiguo, & alumine vltio, collutoriis commode adiectis. At si in loco apertionis vlcus virulentum remaneat, vel fistula vnguento ex viridis æris 3 b. & gallar. 3 ij. & aceto quantum sufficit vtitur, & subtiliter tum vlceri ac fistulæ administrat. Eadem quæ in sanie aurium valere scripsimus, his conferunt. Si nec isto modo curentur, cauterio cum ferro vtendum est. Sed præstat nunc exemplum de corrosionis & ulceribus gingivarum adiacere.

OBSERVATIO XV.

De vlcere gingivarum corrodeute, & in fistulam transeunte.

Matrona nobilis nec infimæ sortis, cum vlcere gingivarum corrodeute laboraret, & tandem in fistulam transisset, & me consultandi causa accessisset, consului, vt prius repurgato corpore, medicamento vteretur Gord. quod equidem scribit valere ad vlcera gingivarum & oris, & ad fistulas & cancrum, & ad malas humiditates oris. Quod ita conficitur: ʒ. aluminis v. r. i. s. q. u. e. salis communis an. ʒ. j. p. l. i. d. i. a. b. a. l. a. u. s. i. a. g. a. l. l. a. r. u. m. c. u. p. u. l. o. r. u. m. g. l. a. n. d. r. o. s. v. u. b. r. a. d. a. r. i. s. t. o. l. p. i. p. e. r. i. s. l. o. n. g. i. c. i. n. a. m. o. m. i. a. n. i. ʒ. i. j. s. p. i. c. a. ʒ. j. b. g. u. m. a. r. a. b. & t. r. a. c. a. c. a. n. ʒ. i. j. b. a. l. u. m. i. n. i. s. & g. u. a. m. m. i. a. s. s. e. n. t. u. r. & s. i. a. p. u. l. Vna pars bulliat in aceto, addito melle, & redigantur in formam vnguenti: altera pars puluerisetur. Vnguento vlceri inungantur, & cum radio fistulæ indantur, & puluis inspergatur, vel cum radio immittatur. Si illis non curetur vlcus, iussi vt procederet ad cauterium: sed antequam eo perueniret, vt vlcus sanem per fistulam effundens solo decocto agrimonie & aluminis (quo vlus est Valesc. in quadam Comitissa) collueret: quo præsidio sanies suppurrata non amplius fluxit. Quod si neque iis remediis malum cessaret, consului vt dens corruptus prope fistulam, extraheretur: sicuti fecimus in domicella Kerckweruia, de qua diximus Obs. 7. huius lib. hoc est, quod nobis etiam veteres scriptum reliquerunt, atque Aëtius ipse lib. 8. c. 26. De gingivarum fistulis, sic scribens: Gingivarum fistulas dissecare ac explanare conuenit, atque post excisionem vlcus curare. Vbi vero vsque ad radices propinqui dentis fistula ipsa extendere, conandum est, vt quantum possibile sit, per fistulam colluyria explanentur, & per siccum quod flauum appellatur, melle exceptum coletur, & con simili modo id quod constat ex eruo, postea adhibeatur. Quod si confusio & perturbatio ægri comiserit, tum ubi iam melius habere incipit, prius eum deinde afflicto. Hocque modo erueretur & fistula, & confidit gingiuæ: atque omnino facilis erit ea, quæ deinceps requiritur cura. Hac ratione persuasa, vt dens auferretur, admisit; & fuit hoc modo curata; vt altera domicella, de qua antea diximus.

SCHOLIA.

Causæ horum ulcerum sunt humores acuti, salis, vel alterius malæ qualitatis corrodeutis, quæ in gingiuis per eandem viam sunt, per quam vlcerata oris, vel à capite per modum fluxionis,

nis, vel à stomacho, vel à partibus inferioribus per vapores sursum elati: atque eadem curatio horum ulcerum, vt oris & linguæ, de quibus postea dicturi sumus, quantum pertinent ad medicamentationem & apostemate paulo ante gingivarum recensimus, vel secta vena, vel humore expurgato. Sed hoc addendum, quod in duplici sint differentia: quædam incipientia simplicia sine corrosione, putrefactione vel corruptione, & sine fistula: alia sunt antiqua, quibus & corrosio copulatur vel putrefactio vel fistula. Simplicia vero curantur desiccantibus & stipticis medicamentis, sepe colluto ore lacte asinino, si adsit calor, vel aceto scillitico, vel decocto folior. oliuæ, vel sequenti: ʒ. ros. lentium, gallarum, cupulorum gland. capium ros. p. l. i. d. i. a. b. a. l. a. u. s. i. a. n. ʒ. j. s. i. a. t. d. e. c. o. c. t. i. o. i. n. a. q. u. a. i. n. c. a. u. s. a. c. a. l. i. d. a. i. n. f. r. i. g. i. d. a. v. e. r. o. i. n. v. i. n. o. p. u. l. u. i. s. q. u. e. g. a. l. l. a. r. u. m. & m. y. r. r. h. a. i. n. s. p. e. r. g. a. t. u. r. Si vero profunda, & dentes carne discooperiti fuerint ob gingivarum corrosionem, puluis balaustriarum, aluminis de pluma, quater in die & in nocte inspergatur, vel superponatur, & Dei auxilio sanabitur: vel p. l. i. d. i. a. b. a. l. a. u. s. i. a. a. c. e. t. o. & m. e. l. l. e. c. o. c. t. i. s. c. o. l. l. u. a. n. t. u. r. at si adfuerit fistula vel vlcus profundum, superponatur & immittantur, & caustica & desiccantia, vt est vitriolum. Ad gingiuas corrosas lana specillo inuoluta, & oleo feruente intincta, & gingiuis corrosis admota valet, donec albæ fiant gingiue. Siftitur a. nome, hoc est, depascens vlceris, ʒ. i. j. g. a. l. l. e. & m. y. r. r. h. a. ʒ. j. l. e. u. i. g. a. t. i. s. c. a. u. i. t. a. t. i. c. o. r. r. o. s. i. o. n. i. s. a. d. i. b. i. t. i. s. prius colluto ore & fricatis gingiuis cum aceto scillitico, deinde inspergo puluerem dicto, flor. ros. adiectis. Ad gingiuas exefas ex Paulo, ros. flor. ʒ. 38. gall. ʒ. i. i. j. m. y. r. r. h. a. ʒ. i. j. valent & ad flaccidas: sic & oliuæ foliorum decoctum, & arugo ferri, cytini, arida admota. Aëtius ad corrosas gingiuas cum tumore & dolore & serpentina vlcerata, vtitur galla tenuissime trita & myrrha, & illud quod ex chalcitide & cadmia constat siccum. Vel prius affusis aceto: post ambobus exsiccatistisque & cribratis. Sicis vtitur, sed cum cautione, ne hoc deglutiat. Et quod ex carta combusti constat, siccum siue per se, siue cum melle. Ad vlcera serpentium gingivarum, aluminis scissilis, flor. ros. an. ʒ. i. j. salis fossilis ʒ. i. i. j. croci ʒ. i. j. v. t. e. r. e. s. i. c. c. o. a. u. t. m. e. l. l. e. c. o. c. t. o. Ad gingiuarum abscessus ac vlcerata profunda ac cruenta, aluminis scissilis, cyperi, cuiusque ʒ. i. j. gingib. ʒ. v. i. j. sandarachæ ʒ. i. i. j. iris ʒ. i. j. croci ʒ. j. v. i. e. r. e. s. i. c. c. o. v. e. l. c. u. m. m. e. l. l. e. p. u. t. r. i. d. a. s. g. i. n. g. i. u. a. s. c. u. r. a. t. a. c. e. t. u. m. i. n. q. u. o. m. e. n. t. h. a. e. s. t. d. e. c. o. c. t. a. e. x. e. o. g. i. n. g. i. u. a. s. c. o. l. l. u. e. n. d. o. R. a. d. i. x. i. r. e. o. s. p. u. l. u. e. r. i. f. a. t. a. a. p. p. l. i. c. a. t. a. c. u. r. a. t. p. u. t. r. e. d. i. n. e. m. d. e. n. t. i. u. m. & gingivarum. Gutta ammoniaci facta sicut collyrium, gingiuis putridis & cancriosis optimum remedium est. Peculiare tamen hoc ad caherum est, quo Gordonius vtitur: ʒ. e. l. l. e. b. o. r. i. a. r. i. s. t. o. l. l. o. n. g. e. & t. a. r. t. a. r. i. f. i. l. t. r. i. c. o. m. b. u. s. t. i. s. a. l. u. m. i. n. i. s. a. s. s. i. s. t. e. r. c. o. r. i. s. c. o. l. u. m. b. i. n. i. f. a. c. i. s. f. e. r. r. i. c. o. m. b. u. s. t. i. s. g. a. l. l. a. r. u. m. b. a. l. a. u. s. i. p. u. l. & c. u. m. s. u. c. c. o. f. o. l. i. o. r. u. m. o. l. i. u. a. r. u. m. & m. e. l. l. e. c. o. n. f. i. c. i. a. n. t. u. r. & g. i. n. g. i. u. e. c. a. n. c. r. o. s. e. i. l. l. a. n. t. u. r. Ad vlcerata profunda & fistulas vtitur trochiscis de calce: vide apud eundem descriptionem.

OBSERVATIO XVI.

De gingivarum excrecentia & epulide.

Gingiue interdum præter modum luxuriant & excreunt, adeo vt dentes prope intendant: iis potissimum quibus molles & spongiosæ sunt, & qui locis aquosis humidioribusque, vt

nautæ, degunt: Græcis dicuntur ʒ. a. m. a. d. a. e. x. gingiuæ molles. Possunt tamen esse molles & flaccidæ humidæque, ita tamen, vt adeo carnem superexcrecentem non habeant: & propterea Neoterici diuerso modo scribunt de gingivarum carnis augmentatione, vel de carne superflua, & de eiusdem diminutione, vt in scholio latius dicemus. Malum hoc plerumque in iis contingit, qui scurbuto malo afficiuntur, vt de lienibus magnis alias dicturi sumus. Si vxor mea carissima Eua Teylingia, an. 1567. cum tempore Quadragesimæ halecibus salis tum fumo induratis in cibo vsa esset, iisque supra modum delectaretur, in scurbuto malum incidit, atque gingiuæ supra modum sanguinem fundebant; subindæ & fœdæ & corruptæ euadebant, cumque lotione ex decocto cochleariæ bekabungæ, malicorij & aluminis non persanarentur, nec succo cochleariæ, alumine vltio inspergo, quibus alias per me alij infirmi curati fuerant, epulide supra gingiuas excrecente; coacti fuimus accito chirurgo carunculam illam vlceratam forcipe excindere, vel potius vullella aut hamulo eleuatam præcidere, vt Paulus iubet, & colluto ore ac gingiuis vino post abscissionem: deinde os tum gingiuas colluimus cum decocto hordei communis, & flor. ros. cum melle ros. & syrupo nostro sceletyrbico dicto, ex succo cochleariæ & bekabungæ confecto ad vlceris abstersionem; mox alumine vltio inspergo: idque crebrius reiterato, epulide ablata, flaccida illa caro gingivarum vicina detumuit, & mollificatio repressa est & curata.

SCHOLIA.

Sicuti enim phlegmone manifesta tentantur gingiuæ, vt paulo ante diximus; ita quoque parulide appellata, specie quoque phlegmonis, afficiuntur ad dentium radicem intro forasve adeo prominente, vt etiam vicinæ partes distendantur, rubeant, caleant, ac dolent: in superiore maxillam ea procumbere solet, ex oculorum canthi maiore; inferiorem vero per tempora è venis eo tendentibus: abscessus hinc sequitur, cuius pus non ad faciei cutem, sed dentium radices exili velamento testas irrumpit. Similia quoque huic tubercula sunt, teste Celso lib. 6. quædam dolentia, quæ etiam interdum solent iuxta dentes in gingiuis oriri, Græci ʒ. a. p. o. d. o. n. t. i. d. a. s. appellant: ita, vt idem tumor videatur cum parulide, cum fere iisdem remediis tam à Celso quam ab Aëtio curentur. Post parulidem subsequitur ʒ. a. u. d. i. s. quæ differt à parulide etiam iuxta Aginetam, cum parulis apud Paulum lib. 6. c. 27. exiguus abscessus sit gingiuas infestans: & lib. 3. c. 26. Parulis inflammatio quædam est in aliqua gingivarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem conuertitur: Epulis vero est excrecentia carnis à parulide seu inflammatione consequuta iuxta interiorem dentem molarem, aliquando cum febre (teste Aëtio) & vehementi dolore internarum mandibularum, vt neque os aperire liceat, contingens. Nam in parulide vlcus si non curetur, vel si male curatum fuerit, caruncula exstat & prominet epulis nuncupata. Curationes tamen horum trium tumorum parum inter se differunt. Celus inquit: Parodontidas initio leuiter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mixtis sale fossili combusto, cupresso, nepeta: Deinde eluere os cremore lenticulæ: & inter hæc hiare, donec pituita satis profluat. In maiore vero inflammatione iisdem medicamentis vtendum est.

est, quæ ad vlcera oris valent: & mollis linamen-
ti paulum involuendum, aliqua compositione ex
his, quas Antheras veteres vocant, demittendum
que id inter dentem & gingiuam: quod si durior
erit, & id prohibebit, extrinsecus admouendus
erit spongiæ vapor calidus, imponendumque ce-
ratum. Si suppuratio se ostendat, diutius eo va-
pore vtendum, & ore calidum mullum continen-
dum, in quo ficus decocta sit. Itemque suberu-
dum incidendum, ne si diutius ibi pus permanse-
rit, os lædat. Dente vero corrupto, fracto aut vi-
tiato, si ad fistulam veniat, locus aperiendus, dens
eximendus: testa ossis si qua excessit, recidenda
est: si quid vitiosus est, radendum; demum vt alia
vlcera curandum. In parulide in principio, vt sub-
mittatur, iuxta Aët. studendum; per dissoluentes
videlicet collutiones: quales sunt succus ptisani,
decoctum seminis lini, aqua mulla calida, aut
mullum. Deinde siccis deprimentis est eminentia
carnis sulphure viuo, pipere, alumine scissili, par-
æqualidem præstat omne alumen vltum, aut fori,
si trita adhibeantur. Si suppuretur, ferro venæ
incisorio distractam & excisam linamento im-
posito desiccato, aut cum linteoli rasura. Paulus
quoque parulidi in orbem exsectæ linamenta in-
ferit. Vidit a. & scalpello, quo venas secamus,
ipsam duntaxat punctam, & pure vacuato con-
nuisse: id quoque nos sæpe vidimus. *Amant a. ma-
gis*, inquit Aëtius, excisionem gingiuarum abscissus.
Post excisionem medicandum est ipsum vlcus per
collutiones: & cauum quidem eius, eo quod ex
eruo constat, sicco capitali impleto: vbi vero ad
æqualitatem peruenit, eo quod floridum ap-
pellatur, vtitor. Paulus post ferrum vino colluit.
Die sequenti mulla. Tertio antheram aridam vul-
neri inducit, vsque dum curatio perficiatur. Idem
si putredo gingiuæ oborta sit, & medicamentis
congruis non curetur, candenti ferro ipsam adur-
it. Carnis excrecentiam in epulide reprimat
cum arugine rafa priuatim, vel cum pari galla,
vel cum pfori combusto, vel alumine quolibet
cremato. Alioqui, vt paulo ante dictum est, ha-
mulo eleuatam præcidit. Aët. in principio collu-
tionibus iisdem vtitur in parulide dictis, totam-
que maxillam cataplasmate ex semine lini & a-
qua mulla integit. In inflammatione soluta, vt hiera
posset æger, epulidem sicco deprimat cum iisdem
paulo ante dictis de parulide; vel eo quod ad fer-
pentia vlcera valet ex chalcitide, & cadmia: im-
ponitque rasuram linteolorum. Vbi serius caro
consumitur, siccum quod carnem exedit, apponit,
aruginem vel gallam, aut quod flauum appella-
tur: deinde rursus rasuram linteoli imponit. Quod
si adhuc moram traxerit epulis, forcipe arrepta
excindit cum tenui scalpello, aut ensiculo paruo.
Sequentibus diebus curat vlcus collutione aquæ
mullæ, capitali sicco & rasura linteoli imposita.
Postremo florido sicco totam curam complet.
Quibus vero Neoterici vtantur ad carnes gingi-
uarum auctas vel diminutas, postea dicemus:
Nunc exemplum aliud interponamus de gingiuis supra
modum cruentis.

OBSERVATIO XVII.

De gingiuis tumidis, cruentis & excrecentibus.

Refert Rembert. Dodonæus Latomus cuidam
æthymatis laboranti, non per naves, sed e
gingiuis sanguinem erupisse: quod cum in primis
molestum esset, ore assiduo sanguine repleto, re-
medium adhibet, quod sanguinem illic manan-

tem reprimeret: qui repressus aliam viam quasi-
uit per vrinarios meatus, vrina cruenta suble-
quente: atque eo fluore rursus restricto, ad gingi-
uas natura sanguinem denuo pepulit. Ex his a. nec
prius desit prodire, quam ab æthymatis curatis
æger esset. At Delphis iuueni sanguis per multos
dies adeo ex gingiuis fluxit absque febre & sine
æthymatis, vt vix ad sanitatem reduci potuerit,
multis adhibitis remediis & oris collutionibus
adstringentibus, & farina aluminiis vlti insper-
sa, & venæ sectione cephalicæ, atque hoc vel simili
epithemate, quo Aët. vtitur ad sanguinem ex gin-
giuis erumpentem: *℞. farinae partem vnam, aci-
norum vna tantundem, succi sanguinariae quan-
tum satis est, contere: & ad cerati crassitiem im-
pone ad sanguinolentum locum: aut simul cum
succo tam diu tere, donec arefiant; atque hoc
modo trita insperge.* Sed ille cui in nosocomio
gingiuæ supra modum sanguinem funde-
bant, etiam carnem supernatam habebat tumi-
dani putridamque; adeo sanguinem emittebant
gingiuæ, vt ex sanguinis profusione moriturus
videretur. Gallarum decocto & citinorum & cor-
ticis mori gingiuas abluebat: & ad excrecentes
gingiuas & putridas varia adhibita sunt prædicia
tam colluta, quam in ore retenta: qualia sunt
illa, quæ ab Aëtio adhibentur, oleum ex immatu-
ris oliuis expressum, oliuarum colymbadum mu-
ria, rubigo ferri, chalcanthum assatum; malico-
rium, tritaque insperfa: & alia infinita. Verum
cum & idem scurbutio malo laboraret, in quo ab-
fectu cruentæ gingiuæ sæpe apparent, tum alia
supradicta, corpore repurgato ab humore melan-
cholico & pituita falsa, decocta ad hunc mor-
bum destituta, vt cochleariæ, bekabungæ, nastur-
tij aquatici, fumariz, cum syr. felecyrbico no-
stro, & linamento ex succo cochleariæ cum alumine
vlti & syr. iam dicto ad crassitiem mellis per-
frictis gingiuis, putredine ablata, reliquis quoque
remediis ad cruentas gingiuas iam superscriptis,
tandem & hic quoque pristinam valetudinem
recepit.

SCHOLIA.

Vidimus, inquit Alex. Veronensis, ex gingiuis
sanguinis profusum incredibilem, qui supra
modum profusabat; præcipue vero in quadam
ægra, quæ vix sanitati restituta fuit. Scribit Aët.
tius cruentis gingiuis ob bilis acredinem, præter
opinionem valde vtilem esse folio hyoscyami succum
aut decoctum cum sapa aut cum palmarum stillamento
calidum ore retentum; vel eius loco radix eiusdem
decocta. Alumen quoque scissile cum myrto. Aliud
Asclepiadæ ad cruentas gingiuas: balastiorum stor.
ros. ramorum myrti, an. cum posca diluore, & liquorem
inde percolato, ac cum in ore retinendum exhibito. Vel
spongiam nonniam siccam in sanguine taurino madefactam
in v. se sicili exure, contere ac repone. Vbi vero vi-
velis, cineris ipsius 3 iij. thuris 3 ij. chalcitidis crude
3 ij. simul trita insper. e. Istis veteres vtuntur ad
gingiuas cruentas. Ad excrecentes vero tumidas
que gingiuas, iuxta Paulum, valet portulacæ succus in
ore retentus, muria, oleum ex colymbadibus oliuis, vel
immaturis expressum, vel lenissimum, vel melinum amon.
caque. Sicca a. ærugo ferri, vel aris, aristolochiæ
radix, anoglossi semen, dyphryges, atramentum
sutorum, tostum, cytini, iisdem quoque vtitur &
Aëtius ad excrecentes gingiuas putrescentesque
ac tumentes; & siccum floridum inspergit ad
gingiuas depastas, cruentatas & putridas, quod
Græci antheron appellant, cyperi 3 iij. gingiberis,
croci 3 j. sandarach. 3 iij. permixti vtire. Valet quo-
que ad putredines oris, glandulas, columellam, &
ad gingiuas depastas, cruentatas, gallarum ompaci-
tidis, aluminiis scissilis partes æquales. Plura vide
apud Aëtium lib. 8. c. 22. Neoterici ad mollifica-
tionem dentium & debilitatem descripta sunt, rebus
stipticis in vino vel aceto decoctis, cum humidi-
tas huius causa existens remouenda sit, psidiis,
balaustis, alumine vlti de pluma, ros. siccis, su-
mach, cupulis glandium, & similibus decoctis in
aceto vel vino, vel in puluere gingiuis admotis;
quale illud Auicennæ. existit expertum: *℞. stor. ros.
rub. pipere an. 3 vij. capulorum glandium myrti balaust.
an. 3 iij. sumach, fol. menthe, an. 3 v. fiat pulu.* post
collutionem gingiuis inspergendus. Ad gingiuas
laxas egregie confert aqua aluminosa sua frigidi-
tate & astringione repellens. Si vero in gingiuis
fuerit superflua caro, ponatur chalcanthum siue
vitriolum mixtum cum myrtha, & amoueatur
vel vtire iisdem prædiciis ad polypurium def-
criptis. Addam historiam Petri Bayri quamvis
barbaram, tamen vtilem: *Dum essem (inquit) in
Sabaudia cum illust. Duce Carolo II. in loco amefaci,
vix locatus in domo Pachaleri apothecarij, qui habebat
digito excreuerat enim carnositas multum deformis. Ro-
gavi si quid haberem, vt sanitati consulerem, quia multi
tam amari erant, quod ab illo morbo vexabatur cui dedi bo-
nam spem salutis. Accepi aquam qua vtuntur amfibri
(vulgo da partire) & aptavi duos baculos: in quorum
vni summitate ligavi cotum carminatum, & in alterius
summitate ligavi paruum petiæ. Accepi postea aliam pe-
tiæ duplicatam, & cum manu sinistra posui petiæ su-
per inferiorem labio, & traxi inferius, vt discooperirem to-
tam illam carnositatem. Carne discooperita, accepi manu
dextra baculum, in cuius summitate erat cotum, & im-
mersi in illam aquam fortem: & cum cito fricavi di-
gitum gingiuam superincarnatam, vt supra: & effecta est
ultra perinde, ac si calce dissoluta linuissim: deinde in-
frudi petiæ, quæ erat ligata super alio paruo baculo, in
aquam frigidam, & tunc carnositatem illam, tegendo alias
partes, vt auergeretur ab aqua forti. Iterum modum præ-
dictum per octo dies: & Deo fauente, restituta fuit sani-
tati pristina, nulla remanente deformitate; perinde ac si
nihil passa fuisset.*

SCHOLIA.

AVicen. ad diminutionem carnis gingiuarum
sequeuti pharmaco vtitur: *℞. thuris, masti-
cis, aristolochiæ rotundæ, sang. drac. farine orobi, rad.
ni carnis gingiuæ, quæ confecti
vnt.* Diminuitur
ni carnis
gingiuæ,
quæ confecti
vnt.
Ex sola farina orobi cum melle conficiuntur tro-
chisci: siccentur in furno in testa, vt possint pul-
uerisari. Huic pulueri addatur sanguis draconis,
thuris masculi, ad pondus dicti puluer. aristolo-
chiæ rot. iteos ante mediam partem; dentibus
& gingiuis inspergantur frequenter, atque cum
iisdem fiat aliquando levis fricatio. Hæc de vitis
gingiuarum dicta sufficiunt. Nunc ad reliqua oris
vitia progrediamur.

OBSERVATIO XIX.

De fætoze oris ex abscissu vitis in ore latente.

Vidam pictor cum fætoze oris admodum
molesto detineretur, & chirurgus causam
mali non animaduertens, multas collutiones aro-
maticas frustra adhibuisset; ad hunc cum ingres-
sus essem, ore aperto & speculo oris immisso, re-
peri circa maxillam interuam prope gingiuas tu-
morem quandam putridam, pituitosum & mali-
gnum ac fætidum esse: Quare cum aluum non
deponeret, præscripsi apozema, in quo folia senæ
& polypodij radices incocta erant; ex quo bis
sumens, cum aluum probe deieceret, vt abscissus
rumperetur & maturesceret, & apertionem per
ferrum vel sectionem non admitteret admodum
tamen conuenientem, hac sequenti collutione se-
cundo die abscissus ruptus est, sanie admodum
fætida & olida emanante satis copiose: *℞. fol.
maluæ cum toto fol. viol. iacæ nigra, scabiosæ flor. meli-
lori, chama. an. m. j. rad. alibæ mundatæ, rad. fen. an.
3 ss. sem. lini, fenugr. maluæ, an. 3 ij. sem. anisi 3 j. si-
cum pinguium nu. v. coquantur in aqua communi pro tñ
j ss. mellis ros. colati 3 ij. misce, eo sæpe os colluebat;
& in ore tenebat. Sanie iam effluente, ad deter-
sionem os colluebat cum melicrato seu aquamel-
lis: deinde aliquo gargarismo magis constringen-
te & consolidante vtens, atque hoc modo libera-
tus est ab oris fætoze.*

SCHOLIA.

Causas varias esse diximus male olidi spiritus
scholio Obs. 2. lib. 13. iuxta quas etiam cura-
tio variatur: nam sicuti ex ozænis & polypo oris
grauæolentia fieri potest, vt diximus; ita etenim
ex labiis vlceratis & gingiuis, tum aliis oris par-
tibus, de quibus nunc agimus, vt in scurbutio malo
quoque vidimus, os male olet. Propterea præcep-
tor meus Fauent. omnes causas ad duos modos
referebat, ex omni inquam genere superfluitatum
in corpore abundantium, quæ ab opere facultatis
concoctricis derelictæ in putridum odorem &
molestum vertuntur, qui odor in cerebrum dela-
tus sensum mouet odoratus, (vt pictori illi euenit)
si per foramina palati ad os perueniat, & nares
extraque expiret, tam ægris ipsis, quam vicinis
molestus. Alius modus est causarum particula-
rium, à propriis membris corruptis putrefactis
aut vlceratis prodeuntium; à gingiuis erosis vl-
ceratisque vel putridis, aut in extima dentis su-
perficie, aut in intima eius substantia vel radice,
vel ex inflammationibus vlcerebusue gurgulionis
&

OBSERVATIO XVIII.

De gingiu. carne nudatis, siue carnis gingiu. dimin.

Sicut gingiuæ caro aliquando supercrescit: ita
carne etiam nudantur, & destituntur: vnde
facile dentes à frigore læduntur, & facile dentes
relaxantur, carne gingiuarum absumpta, vt dictum
est scholio Obs. 11. huius lib. Præter ea, quæ diximus
huic malo conferre, vtilis est trochiscus ex orobo.
Quo malo cum quidam patritius Delfius afficeretur,
& me consultantem causa accederet, iussi in of-
ficina parari pharmacum illud Aëtij lib. 8. c. 23.
quod gingiuas carne implere tradit. Seminis ro-
sæ, non antiqui partes duas, calami odorati Indici
partem vnam cum cera liquida adhibe. Oportet
a. tofos in dentibus adherentes prius tollere:
deinde aceto scyllino dentes & gingiuas confric-
care: postea ea adhibere, quæ carnem gignunt.
Tale autem est iuxta Veteres quod ex eruo con-
stat, siccum capitale. Relatum autem est in his ab
Aëtio, quæ vlcerebus adhibentur, remediis.

& tonsillarum, aut ex pulmone ulcerato vel tabe, iuxta 5. aph. 11. & 7. aph. 16. Sic Laurentio Adriano cuidam Alcmariano euenit, qui tandem multis mensibus vitam trahens partes asperae arteriae corruptas extulsiat antequam moreretur. Ita & tabida iuencula admodum formosa vlcus vel vomica in pectore habenti, ita os ferebat, vt nemo adesse posset: haec tamen a me, praeter opinionem multorum, fuit curata. Male quoque olent ora siue narium spiritus gibbosis, quos aliqui strumulos vocant, quoniam aer reclusus non meabili canali, sed pectoris incommoda curuitate contentus diutius quam par sit, vnde spiritus vapore olido infectus emittitur. Ex putrido quoque stomachi humore nascitur, aut pituitoso, vel bilioso: quod quidem vitium ieiunantibus graue sentitur: a cibo vero minus graue: quoniam cibus oris halitus vniat, ieiunis vero aer in stomacho immotus calidior redditur, tum spiritum & humores qui in eo sunt, ad putrefactionem mouet; quies enim putrefactionem sponte excitat, motus a. ne putrefiant tueretur: quod autem ieiunitas calefaciat, sitis indicio est. ex Arist. Sic ego quendam noui doctum iuuenem, qui stomacho imbecilliori erat, ex cibo corrupto in ventriculo, etiam catarrho saepius obnoxium, calidi hepatis & frigidioris ventriculi, hoc vitio affectum, cui pilulas ex hiera picra praescripti cum rhubarb. ob caliditatem hepatis. Consului quoque, vt ex hac potione omni mane cochlearia tria lumeret: *Vini alb. odoriferi lb j. nucis muscatae, garyoph. cinamomi, maceris an. 3 j. mosci 3 j. pulueris infundantur in disto vino per duos dies naturales; eique colato a speciebibus, addas aqu. ros. 3 ij. ob calorem hepatis, aquend. 3 ss. specier. diaro. abbat. trionfant. an. 3 j. misce, egregie contulit, quemadmodum & hoc electuarium ad 3 ij. mane sumptum, ad coctionem perficiendam valens: 2. spec. diagal. 3 ij. diacimamomi, aromatici ros. di. ab. abb. an. 3 j. diamosci dulc. trionfant. ana 3 ss. cortic. citri condita 3 ij. nucis myrsificae condita 3 ss. stomach. gallinar. prepar. 3 j. cum succo pomorum dulcium & saccharo addito, fiat electuarium liquidum seu opiatum. pro catarrho circa noctem dum cubitum iret, deuorabat gr. iij. olibani lucidi: & sequentem puluerem crinibus capitis dormiturus inspergebat ad catarrhi suspensionem, & mane pectine excutiebat: 2. garyoph. 3 iij. ss. maceris, beronice sicca, ros. rub. cinam. santal. citrin. an. 3 j. misce. fiat pul. Similiter nigellae semen aceto infusum nodulo in oleum odorabat ad cerebrum exsicccandum & odorem oris ac narium emendandum. Praeter has causas si caries in ossibus narium vel putridus humor inhaeret, vt in lue Gallica, summi per palati foramina in os ac nares foetidi exhalant. Ita quoque bibonibus & cereuisiariis & vinolentis ex crapula frequenti, & ieiunis maxime aquam vitae (vt vocant) mane bibentibus os foetet: quemadmodum & salacioribus halitus corrumpitur; vel quibus sesaminum frequens in cibo fuerit, aut allium vel cape, & similia. Et huius cause procatartica facili habetur cognitio ex relatu aegri, tum curatio; nam ea ablata facile cessat hic affectus. Et ideo diligenter causa sunt perscrutanda per sua signa si vera methodo hanc passionem curaturi sumus. Si enim ex affectu gingiua, vlcere vel putredine fiat & tactu ac visu percipitur, & ex sanguis gingiuis; ita & a dente corrupto: si ab vlcere pulmonis ex tabe: si ex concavitate pectoris, ex spuito corrupto & sanioso: si a ventriculo, vt iam diximus, ieiunos magis molestat: quanquam matrona nobilis ex vlcere ventriculi & narium foetorem exspirante, tandem*

et vita decessit apud Rembertum Dodonaeum siue ante cibum siue post, foetor ex ore exspirabat. Ab vlceribus nasi, signa iam dicta sunt. At affectus in profundo corpore harena, vt a pulmone, vix vel difficile curatur; in partibus oris, facilius; magis molestus a bile vel salsa pituita, & difficilior. Ex aphthis in febribus acutis, malignitatem habet. Variatur curatio iuxta causam, quae malum induxit. Si ab vlcere vel abscessu, vel a tabe, illa prius curanda sunt. Si a bile, quidam exhibent aloem cum melle: laudant persica si in stomacho bilis haereat, syr. cotoneorum: si phlegma, dant aloem cum agarico, etiam mulsam, syr. absinthium, catapotia ex aloë & citri semine. Si ex dentibus corroditis, dentes tollendi. Reliqua per se satis patent. Si plura desideres, legas caput proprium Benedicti Faurentini praepitoris mei, & Benedicti Veronensis De oris granulencia, & Rondeletian.

OBSERVATIO XX.

De oris inflammatione.

Inflammationes oris, quae cum febre molestae, periculosiores & difficilioris curationis exsunt: de quibus satis diximus in lib. nostris Obs. De febrib. At ex solo sanguine etiam mitiores, bili vero permixtae & molestiores & difficiliores quoque. Quidam cum aliquot diebus sine febre tamen in partibus interioribus oris in palato & faucibus continuum ardorem pateretur cum inflammatione, ac variis collutionibus oris ex portulaca, & aliis refrigerantibus admodum distultra vlus esset, consului, vt venam secaret, & totum corpus purgaret, sic Aetio suadente lib. 8. c. 42. de oris inflammationibus. Quam, inquit, vniuersum corpus multitudine humorum abundat vel redundat, aut vnius tantum alicuius noxii humoris multitudo in corpore augebit, conuenienter vniur incisione venae, aut purgatione, aut clysteri & abstinentia ciborum. Quod si neurum horum adfuerit, ad localium auxilium quod adstringimus in principio quidem reprimendo per ea quae adstringunt & refrigerant. Sic ex nimia vini potatione quibus ob calidum est & inflammatum sola collutione feri lactis a quo extractum est butyrum, in quo decoxerint cimæ seu extremitates vitis, saepe curauimus. Nos vero imperauimus, vt os collueret cum decocto plantaginis, solati semper uiuæ & aquae lenticulae, vel aquis destillatis ex iisdem herbis diu in ore retentis, adiecit diamoro. Alteri cuidam quoque profuit, post venae sectionem & purgationes succo lactucae saepe in ore retento, vel panno madefacto & lingua imposito.

SCHOLIA.

Veteres ad oris inflammationes multa praedia composuere, vt videre licet apud Aet. quibus & stomatica pharmaca appellare, quorum tamen delectum habere oportet iuxta dispositionem corporum, sexum & aetatem: nam feminis & mollioribus, & pueris & eunuchis alia conueniunt, quam robustioribus vt est confectio ex moris ab Hera. medico compositis, & ex malis punicis Gal. & Asclepiadae. Et de succo vuae acerbae. Sorani, & confectio ex nucibus, Gal. de quibus vide eundem Aetium in loco citato. Inflammatio oris, vt affectus indicat post habitam rationem totius corporis initio eget repellentibus medicamentis, in incrementis & vigore, quae concoquunt & quae discutunt, vt videre licet apud Euell. in lib. 6. Gal.

Gal. de oris affectibus. Et quia vlcerum atque inflammationis oris fere eadem est curatio, vt liquet apud Bened. Faent. praepitorem meum de inflammatione oris & eius partium curatione, eundem perlegito: interea tamen distinctione vtrius, cum inflammationem oris ad phlegmone referat. Vlusa a. oris cum possit esse per modum incisionis vel erosionis, facit etiam differentiationem inter membrum ulceratum & aphthas: nam priusquam pus emittat, aphthae nuncupantur: ubi vero ipsum pus emisit, non amplius aphthas vocari vult, sed tantum vlceris nomen secundum genus sibi vendicat, vt etiam ex Gal. elicitur 6. De compos. med. secund. locos. Interea tamen (vt Alom. vult) quidam aphthas a Graecis ita dictas, a vulgo medicorum Alcolas, referunt ad ulcerationes quasdam ignitas, quae in oris superficie sunt. Illud idem sentire videtur Iacchius sic scribens supra Rhafem: Frequentissimum malum est oris exulceratio, atque omni aetati eueniens & naturae corporum: sed praecipue pueris, qui etiam nonnunquam eo affectu pereunt. Eueniunt etiam in acutis morbis, & sunt infestissima; adeo vt saepe vniuersas fauces, imo internas gulae partes offendant. Sunt a. maxime familiares morbo Gallico affectis; sed his praesertim, qui praecipitem illam curandi rationem, quae per argentum viuum obitur, susceperit. Interea nos saepe vlcerationem eiusmodi lue affectis vidimus, quae talem spurtiorem, qualem in aphthis cernere licet, non haberent, quamuis admodum maligna essent vlcerata: non obstante quod ex tali curatione statim vniuersae oris partes terra sanie manant atque exulcerantur. Et quanquam de oris inflammationibus & istis vlceribus atque aphthis in libris sparsim de febribus egimus, tamen hic quadam adicieamus. Quibus adiungere poteris ea, quae Benedictus Faurentinus praepitorem meum, de oris vlceribus, & oris inflammationibus, ad longum scripserit in sua magna praxi.

OBSERVATIO XXI.

De Aphthis & oris vlceribus.

Aphthae morbi familiares sunt pueris (nostri lingua vulgari die Spron appellant) vt ex 3. lib. aph. colligere licet. A gingiuis saepe incipiunt: serpunt in palatum, descendunt in vnam & fauces: periculosissima sunt pueris, adeo vt saepe eos constant. Occupant autem superficiem oris, vel subiectam carnem exedunt, praecipue si maligna fiat ob humoris prauitatem, acie enim & tenuem omnem carnem molliorem peruat, & cutem a summa cuticula exulcerat: & crassum cutem exedit remoratum: & si adhuc crassius, atram bilem sapiens, carnem & ossa exedit. Prauitas putredinis causa malignitatis est, quae etiam naturam humoris sequitur, qui putrescit: de qua re latius in scholio. Ceterum in pueris aphthae seu vlculcula in partibus internis oris sunt, ex lactis acrimonia vel putredine. Sic ad infantem vocati, iuxta Galenum, prius consideramus, num lac nutriciae vitiosum sit, quod non paruum in se serosam contineat partem: hinc ob molliem oris summam partes lactentium vlcerantur, ex Gal. sententia in comment. lib. 3. aph. 24. Id quidem facile lactis qualitate inspecta percipimus. Sic vero lac vitiosum non fuerit, propter id, quod ipsum non probe concoquunt infantes lactentes, ideo & exulcerationes oboriuntur, vt testis est Gal. lib. 6. de compos. med. secundum locos: quare nos rationem nutriciae

habemus in ipsa curatione. Lac vitiosum, iuxta Paul. lib. 1. c. 4. corrigimus tum victu, tum purgatione. Veteres vero nutricem ambulationibus coegebant, atque iis operibus, quibus superiores mouerentur partes, & cibus lenibus, qui non facile corrumperebatur, ali iuebant: etiam in balnea ducebant, ac calida perfundebant mammas. Nos exhibemus hordeatum cum sacch. ros. etiam puliculam ex farina tritici, lacte & sale: id enim mulierculae coquunt pro pueris, si mandere possunt: & nutricia bonam procuramus concoctionem. Cibaria condiri iubemus acetosis, acerbis vino granatorum, ac vuae acerbae acore. In calida materia etiam damus nutriciae syrupum, acetosum, de granatis acidulis, syrupum citreum, etiam in potu cum aquis destillatis alterantibus, in frigidantibus, si materia sit calida: alioqui mel. ros. vel oxym. si frigida sit. Celsus, si puer febricitat, aquam exhibet nutriciae: alioqui vinum dilutum, si sit infans sine febre. Interea si videmus ex mala concoctione in infantibus fieri, ea, vt probe fiat, in nutrice procuramus: tum quantitatem moderando, tum alterando lac ad frigidum, si ex calore nimio fiat; vel ad calidum moderate, si ex frigiditate vel pituita. Galen. iubet, vt nutrix mandet puero astringentia, vt cotonea, punica, pyra. alij mespila & sorbas in cibo coquunt portul. & similia, & seminanfa pueris propinant. Nos licet utimur ex diamoro, suc. granat. & melle; aliquid quando & syr. ros. gran. vel mel. ros. modo mandere possint. His vel similibus praesidiis infans os infantes curauimus. Sed hoc vnum addam, quod a pharmacopoeo accepimus: multi infantes cum Antvverpiae ex aphthis morerentur, ex vetulae consilio ranulam viam ori puerorum admovebant, functione malignitatem attrahentem: eaque defessa & mortua, alteram ori imponebant: deinde rursus aliam, si opus esset. Quo praesidio & pueri & infantes euadebant. Idem in pueris suis, tum aliis expertum narrabat.

SCHOLIA.

Aphthae Graece dictas, quidam Latini vertunt serpentia oris vlcerata; Arabes vero Alcolas vocant: Latiniore vero lactucimen appellant, vt Amatus refert cent. 1. curat. 17. Haliabati Calaba dicitur; Plinio vero oris vlcus. Aphthae, inquit Fernelius, vlcerata sunt admodum caua, in quamuis partem oris serpentia, in palatum, in gingiuas, in linguam latera; in eiusque radicem. Cum itaque summa oris pars & interna afficiatur, pars affecta nota est, agrotantis ore aperto, tam visu quam etiam tactu, cum & calidiores, quam conueniat, tumidioresque summae oris partes sentiantur. Affectus quoque liquet, cum adsit exulceratio. Causae sunt (vt nunc diximus) acres fluxiones ex bile, pituita putrida, & salsa, serosa, & sanguinea a cerebro transmissa, vel ab aliis partibus fluxionem suscipiente, ex mala euaporatione, praua putredine, ex ventriculo, pulmone: etiam in febribus pestilentibus & malignis, vt sparsim in lib. Obseruat. de febrib. ostendimus, in quibus vt res exigebat, curationem earundem scripsimus, & harum multa exempla annotauimus. Ad has procreandas iuuant causa externa, vt constitutio humida, pluuiosa & calida, humores putridos progignens, cibique in ventriculo corrupti, vel lac corruptum, vt de infantibus diximus; etiam fungorum ac aliarum rerum corruptionem & malignitatem in se habentium. Vel sunt causae internae corporis, humores corrupti per communem

Signa.

3

4

Prognostica.

5

Celsus cum
de alio con-
siliatur.

mitatem è ventriculo, cerebro, pulmone, vel euaporatione, & in prægnantibus & hydropicis ex vaporibus eleuatis, ut *Auicenn. ratiocinatur*, vel per modum defluxionis ex catarrho, vel ex acrimonia lactis, ut in pueris: vel ex excrementorum acrimonia copia, vnde & maligna vlcera depascuntia sæpè commouentur. Et sit Gal. duplex genus facit 3. Epid. quoddam mitius, quoddam malignius. Rhaz. leni pede hanc rem transit, qui nulloquam adeo aridus existit: melius autem *Auicenn.* & *Aëtius*, qui à Gal. eadem acceperunt: *Galen.* vero omnium optime, qui multa cum arte horum curationem tractauit. Signa vero, quibus hæc dignoscimus, sunt primum ex colore, ut *Galen.* inquit: nam rubra sanguinea sunt: flaua biliosa: luescentes, melancholica: albicantes pituitosa. Tactu quoque multam deprehendimus differentiam: multa enim inflammatio, quam æger sentit, biliosum humorem significat: contra quæ non inflammata ex pituita sunt. At sanguis & atra bilis medio modo se habent, plus tamen inflammationis sanguinis inuehit, plus malignitatis atra: seu à principio talis erat humor, seu tempore euasit. Ex corporum insuper temperatura, ætate, habitu ac præcedente victus ratione, plenius id coniicias. Ortus quoque aphthas ex eorum, quæ comeduntur, & bibuntur acrimonia, prompte ex ægotantibus, seu astantium sermone, ipsis interrogatis, percipere poteris. Hinc variæ differentia exsurgunt: quædam summam cuticulam exulcerant: aliquando profunda sunt, & carnem ipsam linguæ exedunt, vel palatum vsque ad ossa, imo & integram columellam absumunt (ut nos sæpe speculauimus in lue Gallica) ita ut & ossa ipsa sentiant cariem aliquando ob putredinem ibi exortam. Hinc alia maligna sunt, alia simplicia & mitia, ut diximus. Maligna, quæ exedunt multum, neque curationem admittunt facile. Et ideo hic affectus curatu difficilis est, non modo, quoniam multam distinctionem in inuestigandis remediis habere oportet, sed & quia ori non facile applicari possunt: quoniam à saluæ multitudinem facile eluuntur, & breui multum incrementum malum facit ob loci naturam, inquit *Galen.* quæ calida est & humida: vnde & putredinem facile sentit, vnde depascens fit vlcus, quod esthiomenon Græci dicunt. Præterea, ut etiam *Iacch. ex Galen.* citabat, pars sensilis maxime est, & facile ab acerbis medicamentis irritatur: quibus tamen aliquando nos uti suadet. Neque omnia sane medicamenta, quæ in aliis vlceribus adhiberentur, hoc loco adhiberi possunt, quod facile in fauces & ventrem; aut in guttur, & asperam arteriam quippiam ex iis dilabatur. Cum igitur tot difficultates in hac cura adsint, non sine magna cautione curatio aggredienda est. Quamquam ex eis facilius curantur, quæ pueris lactentibus sunt, *Gal.* auctore: iis quoque ætatis ratione maxime contingunt, ut inquit *Hipp. præcit. aph. 24. lib. 3.* quæ vero accidunt iis, qui ad perfectam ætatem perueniunt, non ita facile; potissimum ubi ob vitiosorum humorum defluxum excitentur, quamuis *Cels. lib. 6. c. 11.* (ut etiam *Altimar. annotauit*) velit, longe periculosissimas aphthas esse in pueris; in viris autem idem periculum non esse & mulieribus, cum non ita facile ab eis consumantur: quibus suis verbis cum *Gal.* conciliatur, qui voluit facilius curari eas in pueris, utpote quia ex moderate astringentibus sedentur, id quod in adultis nequaquam fieri potest, aut per quam rarissime: mitiores enim sunt in pueris lactentibus, quia ex mitiori causa sunt, quamuis ætatis ratio-

ne ab eisdem facilius quam viri consumantur, ut inquit *Cels.* at si ab affluente vitioso humore fiant aphthæ, ut inquit *Gal. 3. de morb. vulg.* id quod facilius prouectioribus accidit, semper prodeunt ca-coethes. Harum omnium periculosissima exi-stunt, quæ ex atra bile originem duxerunt, pro-pter humoris malignitatem: quæ vero diuturnæ sunt, & progressu temporis putredinosum quid acquirunt, ac malignæ euadunt, ægre solubiles sunt, à medicisque Nomæ appellantur, hoc est, paret eodem lib. 6. de compos. med. secundum locos. In febribus acutis pessima tum sæuis accidentibus, & in corpore debili.

OBSERVATIO XXII.

De inuene bilioso aphthas flauas habente, cum
maximo seruire.

Iuuenis biliosus, cum in aphthas intideret valde ignitas & flauas, postquam ex infuso rhaz. purgatus esset; collutiones præscripsimus, quæ refrigerarent & feruorem refringerent, cum leui adstrictione, in hunc modum: *℞. plantaginis bellidis minoris, portulacæ, semperniui, solani ana m. j. flor. ros. rub. p. j. semin. cydon. ʒ i. ʒ. fiat omnium decoct. in aqua communis pro t. j. col. adde diamori ʒ ij. suc. mali punici acidi ʒ ʒ. misc. fiat collutio.* Postea etiam ad maiorem refrigerationem, adieci succum solani & acetum modicum. Deinde ut magis abstergeretur in decocto adieci hordeum non excorticatum, etiam mellis rosati nonnihil, ut citra mordacitatem magis discuteret. Interea iulebis utebatur ex aqua acetosa cum syrupo de limonibus, granatorum, de ribes, ad putredinem arcendam. Os quoque subinde colluebat cum aqua peculi ros. solani & acetosa, adiecto syr. granatorum & diamori. Modo cum aqua decoct. sumach. ros. granorum myrti, lentum excorticat. cum aceto, extremitatum rubi & vitis: postea sola aqua hordei & mel-le ros. ad absterfionem.

SCHOLIA.

Curatio aphtharum (ut iam dicere cepimus) multam distinctionem exigit: Primum enim ex affectus natura: alia enim remedia recentibus & simplicioribus; alia inueteratis & malignis: rursus alia inflammatis, alia his, quæ inflammationem paucam habent. Iam etiam indicatio curandi exorde & putredine sumitur: similiter ex natura corporum: alia enim tenella mollia, ut puerorum; alia vero contra dura & sicca. Porro nisi quis has proprias naturas distinguat, non rite procedit vlcerum curatio. Verum notas iam diximus. Quomodo vero infantes curentur, etiam diximus: quibus, iuxta *Aëtium*, nutricis prius ratione habita, in principio sufficit flos ros. ipsæ ros. sicce cū mulso, aut mel ros. Inueterato autem iam malo, in iunioribus quidem pueris, gallas contusas aqua decoque, & cum decocto percolato parrem mensuram mellis permisce. Moderata vero remedia hæc sunt ad recentes aphthas: omphacium dissolutum mulso, thus culinaris eodem modo. Inflammatis quæ leuiter restringant & refrigerent adhibenda: ut sunt collutiones ros. vitium, rubi in aqua decoctorum. Et inde pulueres vlceribus inspersi. At in igneo seruire addenda lactuca, intyb. solanum, portulacæ, plantago, centummodium.

tummodium. Flauæ quoque & rubentes refrigerantia desiderant & astringentia. Interea tamen flauæ & biliosæ plus egent refrigerantibus; non tamen sine adstrictione sunt inter initia: alia rubentes & sanguineæ, minus his refrigerari, plus sicari & adstringi desiderant: pituitosæ sicari & adstringi multum: melancholicæ his vna, quæ discutiat. Biliosis & flauis itaque initio solanum, portulacæ, acetosa, plantag. semperniuum confert: nam refrigerant strenue, siccant, adstringunt, nec insuauia sunt. In sanguineis rubris, lentisci, rubi germina, vitis, cotonea mala, corna, mora, austera punica, hypocisthis, equisetum. Ex his fiat collutio oris. Si albescentes pituitosæ, mel rosaceum, galla acerbæ cum melle rosato; si falsa, etiam alumen cum ros. melle illines. Optime facit & fol. ligustri, decoct. & myrti & sylvestris oliuæ, & horum succus efficacior, in vino subastringente, vel aqua cisternæ decoctis. At si liuidæ, atræ, nigrescentes, magis discutientibus opus est: ex vna passa exacinata, & aniso tritis cū mel. ros. albuenda. Si depascentes sint, succum ligustri cum melle admiscebimus, & lingendum dabimus: oportet a dextensionem panno molli vel spongia moliri. Si autem pura sint & rubent, tunc astringente solo & frigido utemur. Caterum si in maioribus pueris aut ætate perfectis aphthæ oriantur, eiusdem quoque generis pharmacorum facultatibus, auctis tantum viribus, utendum erit; verum non æqualliter omnibus: sed maxime eorum corporum naturas considerabimus: num molles sint & humidae, velut eunuchis, mulieribus ac pueris, debiliores, & aridæ, veluti in nautis, venatoribus, agricolis; istis robustioribus fortiora adhibebimus, iuxta *Gal.* Et antequam ad localia veniamus, si copia ad sit sanguinis, venam cephalicam secabimus in magis adultis. Si quid prohibeat, Donatus eucurbitulas scapulis affigit, vel hirudines apponit, vel cubito admouet, ut Neapoli fecisse consueverunt. Amatus etiam in puero 4. annorum, sanguineo, aphthas habente, brachij venam aperuit, vulnere hirudine admoda. Alij ex venis sub lingua sanguinem demunt. Quod si totius corporis plenitudo non adsit, sed quispiam vitiosus redundarit in corpore succus, is primo euacuandus erit, bilem educente pharmaco, si bilis; pituitam, si pituita; nigram bilem, si succus melancholicus redundarit. Deinde corpore euacuato, topica iam dicta adhibenda. Imo quidam etiam statim localibus medicamentis esse utendum existimant inter initia, tametsi corpus aut caput vacuatum non sit, ut *Iacch.* sentit. Nam incrementum mali etiam his sistere oportet. At in duris corporibus, tum in aliis iam malo inueterato præstat prius etiam in principio vniuersalibus remediis uti: de quibus consulas *Gradum* & *Arculanum*, qui certis intentionibus, ut in aliis vlceribus, curationem perficiunt. Interea hos gradus quoque animaduertere oportet, num exulcerentur, sordida sint, & prauam putredinem præ se ferant, vel exedant vsque ad os, vel etiâ os ipsum. Nunquid etiam simplices aphthæ sint, vel complicatæ. De simplicibus satis dictum est. Si vero gradus & inueteratæ, etiam ad fortiora procedendum. Si sordescunt extergere oportet, ut paulo ante diximus, cum panno & spongia, tum medicamentis ex melle, vini facce vel alumine: aut salicis oliuas mandere. Quod si iam putredinosam qualitatem acquisierint, & male coloratæ sint, & virore, & sanie praua, & acri manante, fortissimè tandem remediis utemur: quæ prauos humores consumant, & extergant etiam carnem putridam, *Per. Forest. Tom. 2.*

idque cum farina erui, & melle, vel lupinorum, aut ex his oris collutio. Alij ad chalcanthum perueniunt: quamuis enim talium vsum non facile admittimus; ubi tamen necessitas urget, victi affectus malitia, his quoque utimur: cauendo semper, ne aliquid in fauces dilabatur. In exedentibus & putredinosis, Aëtius utitur cinere centauri minor. exusti cum mel. & æris æruginæ cum melle. Nostri vero in nigricantibus & cariosis vlceribus, quæ ad palata & os sæpe accedunt, ut in lue Gallica, vnguen. *Ægyptiaco* vtuntur: ego dissoluo cum aqua plant. adiecto mel. ros. hodie & præcipitato vtuntur quidam felicissime; sed cauendum, ne in guttur hæc, tum supradicta dilabatur. Ast aphthæ, quæ in febribus & in morbis acutis, & in pestilentia, & quæ frequentius in pestilentia, & in pestilentia apparent, ex flagrantibus exhalationibus etiam in peripneumoniciis, ut sæpe vidimus, raro non diro augurio spectantur. Febres in his curandæ sunt, & interea aphtharum curatio minime negligenda: quibus inter alia etiam refrigerantia & astringentia, præcipue conueniunt propter malignitatem syr. acetos. ex mal. granat. de limon. etiam collutiones refrigerantes & astringentes, præcipue in materia calida & pestifera: sed harum curationum cum plurima exempla posuerimus in libris nostris de febrium obseruationibus, non opus est, hæc eadem repetere. Ad aphthas vero & serpentina oris vlcera, & ad nomas, quæ vetustate contrahuntur, summe facit sceniculi radicis vltæ cinis per se, & cum melle illita: vel amurca in æreo vase, donec in mellis crassitudinem cogatur decocta, & illita: & gal-larum, aluminis, balaustrorum pul. par. equal. per se aut cum melle illitus. Reliqua vide de oris vlceribus & aphthas, quæ *Gal.* scripsit lib. 6. de compos. med. secundum locos.

OBSERVATIO XXIII.

De quibusdam pyralismo laborantibus.

Vir ille, qui ex mala ventriculi concoctione & cruditate laborabat, & perpetuo saliuam in ore habebat, ut continuo exspuere cogerebatur, pyralismo admodum molesto diu multumque detinebatur. Est n. pyralismus, teste *Hipp. & Gal.* in *Prophet.* vel pyralismus (iuxta *Aëtium*, ut etiam annotauit *Rondelet. lib. 2. meth. capite* de pyralismo) nihil aliud, quam saliuæ frequens & immoderata reiectio. Saliuæ autem nomen humorem omnem, qui per os sine tussi aut excreatione vel vomitione rejicitur; saliuæ speciem referentem appellamus: cuius frequens & molestum symptoma est, quod ob expellentis facultatis irritationem, aut retentis imbecillitatem consequitur. Ventriculo igitur prius cum pilul. de hiera & mastichinis repurgato, exterius etiam inunximus cum oleo nardino; maceris & mastichino. Ac cerotum ex mastiche apposuimus, & chebulos conditos mane stomacho ieiuno exhibuimus, atque iis vsi sumus, qualia ad cruditatem & ventriculi imbecillitatem valere scribuntur. De quibus latius capite proprio dicemus. Victu attenuante & exsiccante utentes, ut minimum potus sumeret, utque pane biscocto & assis uteretur, ob nimiam ventriculi humiditatem; & tandem saliuæ illa copiosa in ore desit. Verum anno 1565. mense Octobri, & Nouembri, ac Decembri, cum longo tempore constititio austriana permaneret, plurimi non solum in oculorum affectus ex defluxione inciderunt, verum etiam in

K pyralismum

nervis mollificatis vel apostemate calido, aut frigido lingua sit infecta, vel initio nervi tertij pars obleso, idque per se, vel aliorum membrorum communicatione, ut diximus. Signa quoque facile considerabimus; nam gustum facile laesum esse percipimus, quando eger parum, aut nihil sapit, vel alterum saporem extraneum. Interea signa causam ex sapore quoque deprehenduntur: ducebo sanguinem aut phlegma dulce, ut vocant, in toto corpore vel à capite, vel alijs membris provenire (prout pars linguae quam alia sit laesa) indicabit: vel si affectus in lingua ipsa habeatur, reliquis membris iam dictis sanis existentibus. Sic amaritudo bilem; salsedo pituitam salsam indicant. Si sapor sit abominabilis, malos humores in orificio stomachi herere decernit, cum ventriculis, lingua & palatum una tunica vestiantur. Si sapor censetur stypticus, acidus, acerbus, melancholicum humorem designat. Iam quoque ut alias diximus, ex parte coloris linguae signa desumuntur: lingua alba, frigus superare notat in stomacho & hepate, vel pituitam: rubedo sanguinem humoresque calidos: color citrinus bilem: ater vero melancholiam; nisi ex calore adurent in febribus contingat. Sic linguae molles, lenis, humiditatem arguit: sicca, contracta, aspera, siccitatem. Si aditu solutio continui, ut pustula apostematata, tumor, visus indicabit. Si lingua sit sana & medio-criter rubea, aegritudo est in capite vel in nervis, à quibus sit sensus & motus. Diminutio itaque gustus eiusque ablatio, vel corruptio curatur causis prius ablati, & passionibus à quibus proveniunt prius sanatis, ut patet in febribus acutis, & interitis. Si itaque medicus praesens percipiat nocumtum esse gustus à mala intemperie simplici calida vel frigida, adhibeantur contraria, quae nudam intemperiem illam auferant. Si vero sit cum materia, ut plerumque fieri solet, vel apostemate calido, sanum abundante, ex vena cephalica sanguis detrahatur: deinde ex vena sub lingua, vixit etiam praescripto causae contrario. Si sit ex bile digeratur syrupo ros. laxat. & purgetur cum infuso rhab. si autem conveniunt sanguine abundante prius detracto; & in bile magis refrigerantia, succus lactucae, portulacae, mucedago psyllij, cydoniorum, in ore retentis; gargarismus ex succo end. solari, decoct. ros. herb. myrtill. & similibus: tum linguae frictio cum carne melonum, cucumeris, cucurbitae, pomi citrei; quibus & vi poterit ad appetitum & gustum renovandum. Si autem fuerit ex cacochymia & pituita frigidi humores digerantur cum oxymelite diuretico psyllino, decoct. hyssopi, origani, maioranae, salviae, stechados. Purgetur materia cum pilulis coctis, de biera; & adhibeantur gargarismi, qui in paralytici linguae valent, ex hyssopo, caryeis, melle & similibus. Si vero sit ex solutione continui ob vicium rimas, fissuras linguae, adhibeantur ea, quae ab antiquis describuntur proprio capite. Nam eiusmodi maus per sanatis, etiam febribus, si inde gustus laedatur, facile redibit. Atque haec sunt, quae consideranda erunt, ut gustus depravatus corrigatur: ita ut ne petitioni me satisfecisse arbitrer. Vale.

SCHOLIA.

5 **L**ingua vero non movendo tantum, sed & gustu afficitur, ut Galenus exposuit; aut utroque modo: eodem enim nervo (qui mollis appellatur, ab anteriori cerebro tertiae coniugationis) gustandi vis ac potentia defertur: sed ex nervo septimae coniugationis, quae durior ac longior est, movendi officium praestatur: sed is qui per summam linguae cuticulam ambientem dissipatur, gustum nitidiorem explicatioremque praebet. Et ita gustus perit aut imminuitur nervis mollioribus affectis: depravatur gustus membrana linguam vestiente, vitioso atque tetro humore imbuta, vel liquore eorum, quae eduntur vel bibuntur diluta; isque humor vel vapor, saepe ex inferis sedibus elatus,

Gustus a-
blatus di-
minuitur.
Gustus de-
pravatur.

esophagum linguamque proluat: nonnunquam è cerebro defluit. Sic in febre omnia amara iudicantur. Quae omnia ex communicatione tum stomachi, tum pulmonis fieri possunt, ut diximus. At quare lingua est sine putredine? an ut sensibilibus quare agibilior fieret? nam pingue & seuum sensum prohibet, cum & sensu careat, & graue membrum reddat. Ideo & spongiosa lingua est facta, ut mobilior esset: eadem enim & salua temperate maret; quoniam ariditas & sensibus & motibus officit. Naturaliter autem dulcibus & pinguibus oblectatur: quia naturae ij gemini sapores proprios sunt. At si gustus aegrotat, contraria adamat: acria amara; frigida calidus; humentia aridus; styptica dissolutus. Et quoniam stomachus viscerum & venarum dispensator est, vicariam sibi linguam constituit: ut quibus oblectaretur, de saporibus ea dijudicaret. Haec dulcedine plurimum cum palato oblectatur: quoniam Mesagoras & Philoninus (ut Galen. refert) linguae subesse dulcem humorem congenitum tradiderunt, qui bili in febricitantibus quibusdam infectus, & calorem & affectum pariter immutat, tum enim dulcia odio sunt.

OBSERVATIO XXVIII.

De linguae magnitudine.

Relico in pago Piinacker dicto, adeo tumefacta est lingua, in eamque magnitudinem subito excrevit, ut in ore contineri non posset. Huic sanguis extractus est ex vena cephalica: ex lingua etiam venas aperuimus, sed non potuit linguam extendere; deinde succo lactucae pannolineo molli inculcato, & saepius ori imposito lingua detumuit & convaluit. Venit mihi tunc in mentem, quod Gal. scribit 14. lib. meth. medend. Sane linguam ita tumefactam (inquit) euidam vidimus, ut ore hominis contineri non posset. Is nec venam incidereat vnquam, & sexagenarius iam erat, horaque dici fere decima cum ad eum primum accessi & vidi: ac visus mihi est vitatis mihi pilulis, quae ex aloë, scammonia & colocynthide constant, vespere datis purgandus. Ipsi tamen particulae afflictae suavi refrigerantium aliquid imponere, saltem in initio: post enim, inquam, applicabimus, prout suadebit euentus. Verum id vni medicorum non placebat: ac propterea pilulas quidem sumpsit; de locali tamen remedio in diem posterum est dilata, quo tempore etiam efficacius aliquid praestitutum quicquid probatum fuisset, sperabatur, & purgato iam scilicet toto corpore, & humoribus ad inferiora reuulsis. Ceterum ea nocte euidentissimum per quietem insomnium, nostrum homini consilium approbavit: ac materiam ipsam medicamento finiuit; lactucae succo collui iubens. Quo ille solo usus, prorsus est sanatus, nullius alterius egeus. Ita & hic rusticus noster. At alius colonus Liranus, cui etiam sanguis ex cephalica vena detractus fuit, eo modo curatus fuit. Quamvis hic post dissolutionem nostrum paulo post etiam angina laborauerit, & ad rem attentus neque me vocaverit, neque alius commodis remediis usus fuerit, mortem incurrerit, ut mihi postea relatum est. At Adrianus Toorneburchius, cui in febre subito lingua aucta esset per modum catarrhi, ut illico suffocationem sese incurrere putaret, optimis remediis per nos curatus fuit. Cuius exemplum posuimus lib. 2. Observ. 32. De febr. continua quotidiana cum variis symptomatis.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Vidimus (inquit Gal. lib. 1. De diff. morb.) linguam cuiusdam mirum in modum auctam; idque citra omnem sensum doloris, ut neque oedema, neque scirrhos, neque phlegmone videri posset. Nam neque excavaia erat sub premente digito, neque sensum amiserat, neque dolebat. Sed hic affectus incrementum erat quoddam partium: ita tamen, ut ipsa partis essentia ab omni noxa videretur immunis. Sic testiculos quoque & mammas, alijs vtrosque, alijs alterum duarum immodice increvisse compertum habemus, ut strumas & oculorum angulos à iusto modo recessisse. Tum Nicomachi Smyrnaei corpus adeo immodice auctum, ut ne movere quidem seipsum posset: quanquam illum sanitati restituerit Asclepiades. Verum hic lingua fuit aucta subito ex defluxione: quae si augeatur ex sanguine, aut materia calidiore, sentitur caliditas, & adest rubedo; etiam plenitudo, tam in facie, quam in ipsa lingua: sapor dulcis, & salia dulcis copiose promanans. Si pituita, albescit lingua, etque tumet & alba apparet, & maior salivae fluxio & sapor insipidus adsunt: Vbi enim subito in magnitudinem excrevit, illico occurrendum ne iter subito suffocetur. In sanguinea sanguis demittendus ex cephalica & vena sub lingua, & fluxio avertenda ventosis cucurbitulis cum scarificatione, clymate & tenni vinctu euchymo; etiam purgatione cum pilulis aureis, adiecto diacridij momento, modo pilulas denotare possit; alioqui cum eleet. de succo ros. collutionibusque acidis, & stypticis cum succo lactucae, syr. citrin. de ribes, succo puniceorum in ore detentis vel gargarisatis. Si à pituita, ipsa purganda pilulis coctis, de agarico, clysteribus acutioribus; & adhibendo ea, quae materiam à capite deturbant. Deinde vtendum fritione linguae ex sale tosto, ammoniac & sale gemmae, aliisque gargarismis pituitam educentibus cum catarrhi suspensione ex melle, tosto sale, florib. chamemillae. Scribit Bened. Veron. linguam prodigij more excrevisse, in quam femina ex lue Gallica, quam vidit, praecipiti cursum affluentibus corruptis humoribus ad id membrum: ex quo tum sanguinea & crassa pituita octo diebus incessanter profluebat. Id nos saepe in iis, qui inunctiones argenti viui experiebantur etiam spectauimus. His vero, ut alias diximus styptica collutiones profunt.

OBSERVATIO XXIX.

De Batracho seu Ranunculo sub lingua.

Batrachum seu Ranunculum sub lingua patiebatur quidem iuuenis studiosus Phriso, qui Delphis apud Adrianum Leoninum virum doctissimum, & Delphensium Pensionarium habitabat, & filium eiusdem instituebat. Is ad me venit ostendens in ea oris parte molli & laxa, quae sub lingua est, & cui ea incumbit, atque vinculo quasi alligatur, se tumorem collectum habere: quem cum inspiciebam, Batrachon esse cognoui: barbari autem Ranulam vocant. A Graecis vero tum Paulo Aetrio dicitur, seu tumor cum inflammatione sub lingua maxime pueros infestans. Aetius quoque tumorem praecipue venarum sub lingua esse descripsit. Corpore repurgato, pulvere sequenti tumorem fricari iussimus: ℞. corricum granatum, hyssopi sicci, salis communis an. 3 ij. fiat

paluis: aliquo modo detumescere cepit. Hoc eodem modo Ioan. Tiengius medicus Amstelrodamensis senior ante me curavit iuenculam 12. annorum, ranulam quantitatis nucis maiusculae sub lingua inflatam tensam & mollem habentem, intra duos dies: Puella autem puluerem sub lingua tenebat. Id autem medicamentum Nicolo Florentino tribuitur, qui tamen in adultis loco salis communis vitur sale ammoniaco. Paulus utebatur misyos, aruginis rassa, pari pondere sicco: quo locus perficandus; sed cauendum ne transglutiat. Nos & cum sale tosto & gemmae fricari iussimus; & tandem delituit absque incisione. Hoc etiam decocto vsi sumus sub lingua saepe contento: ℞. balast. aluminis galle an. 3 ss. fiat decoctio in aqua communi, absque chirurgi opera fuit curatus. Vxor autem Cornelij Francisci de Bodegen sub mento cum durum tumorem haberet, & prius in gutture ex catarrho doleat & simul febricitaret, cum sanguinis detractionem non admitteret, toto corpore tunc capite repurgato, etiam cucurbitulis cum scarificatione scapulis impositis, tumori, qui sub mento erat, ne ibi fieret suppuratio, potius studuimus resolutioni & emolliitioni: nam si in abscessum abiisset, isque dirupus in loco decliuiori, timor fuisset de fistula. Illud praescripsimus, quod Aetius totos resolvere scribit: ℞. furfuris, frumenti exalissime comminuti & cribrati 3 j ss. guttatur nunc olei vini modico in mortarium infuso, vicissim pulueris paucillo immisto diligenterissime subigantur & reducantur in formam linimenti crassioris: quo tumor ille paulatim euauit. Sed rursus ex noua fluxione dentium dolore lassata etiam in maxillam tumor excreuit; adhibitis cataplasmatis, tum gargarismis commodis, tandem maxima copia pituitae ex ore fluxit, ut tandem os aperire potuerit: eoque aperto & inspecto, ranulam quoque sub lingua ex fluxione ortam conspeximus. Quae hoc lauamento etiam tandem curata est: ℞. aquae plantaginis lb ss. balast. 3 i ss. aluminis 3 ss. mellis ros. 3 ss. bulliant: pro lotionis vsui referuetur. Interea cum à ranula curata esset, sub maxilla circa gingiuas potissimum, ut in epulide, animaduertimus abscessum esse. Quare rursus admoto cataplasmate & gargarismis maturantibus, tandem abscessus ruptus est exigua sanie emmanante: & decocto hordei communis, & melle gargarisato pro abstersione. Restit deinde valuit. Eodem mense alia quoque puella ranunculo laborans post purgationes vniuersales adhibitas, etiam exsiccantibus & stypticis curata fuit. At altera mulier rustica longo tempore batrachon sub lingua habuerat, ut non alia spes curandi superesset, nisi ut scalpello vtrinque tumor aperiretur: quod cum chirurgus dextre administrasset, humore effluente quantum potuerat; dein posca, exiguo sale addito, ore paucis diebus colluto; donec nihil amplius humoris in tumore reliquum esset. Nam vidimus aliquando & in alijs si non dextre fieret, neque totus humor efflueret, postea rediisse: ut etiam in hac rustica, licet videretur prius curata.

SCHOLIA.

Quanquam Dodonaeus refert, paucos posterioris aetatis medicos ranunculi curationem attigisse, idque ex Albucasi aut Rhafi sua mutantes: tamen & Paulus & Aetius de huius curatione meminerunt. Refert Nicolus ex Iudaei cuiusdam medici sententia sub lingua apostema esse, quod extenditur, vena lingua sanguine aut alio humore

Ranula.

humore repletis. Vnde alij apostema durum esse volunt, in quo venæ nigrae intumescunt, ad ranæ coloris similitudinem, vnde nomen habet. Alij phlegmaticum abscessum dicunt, glandula similem: adeo eminet, ut alia minor lingua subesse videatur; aliquando vero non sine febre; interdum quoque oritur lethalis. Almanzor etiam glandulam esse voluit ranulam sub lingua enatam: quam definitionem ab Avicenna mutuauit, cum dicat, Ranula est similis glandula dura existens sub lingua, cuius dolor similis est colori composito ex colore superficie linguae & venarum, quæ sunt in ea: & eo quod similis sit colori ranæ, ranulam vocant. Huius autem causam esse volunt humiditatem viscosam, cum materia ipsa sit pituitosa, vel sanguinem crassorem. Nota per se sunt manifestæ. Cum enim subleuatur lingua, videtur quædam carnositas laxa & mollis sub ea: vel, ut Placentinus prodit, ab utraque parte ligamenti quædam prominentia sphaerica, instar cicercis vel fabæ (imo castaneæ magnitudinem superasse vidimus) conspicitur, quæ alias duras continuet. Cumque hic tumor speciem œdematis mollis & laxi referat, eo aperto mucus profilit ovi candido similis. In pueris (ut idem Placentinus quoque consili) curatio celeritatem requirit, ob communionem, quam cum canna pulmonis habet, ne subito suffocentur. Quibus subinde sufficit sola perfusio cum origano, & malorum puniceorum cortice & sale. In adultis Aëtius vitur iisdem, quæ ad aphthas & oris vlceres valent: sed ex his medicamentis quæ fortiora sunt, ut aruginis rafa, chalcitid, gallæ aquales portiones inspergit, aut cum passo, collutione vitur; vel antheram, ut & Paulus, adhibet: ita & erui farinam cum melle subiciunt, & gallam tritam cum melle, aut ros. folior. & oliuæ decocto vlcer colluunt. Verum si dolor adsit, & febris tumorque gulam occupet, nec mors subitanea sequatur, itatim cephalica vena incidenda, quoniam in mora periculum est: ac supra scapulas cucurbitula imponenda scalpello circumcisa. Galenus non libenter ferro secat, ne profluuium sanguinis pereat; sed flore æris & antedictis vlcer curat. Vel eo, quod habet gallæ, myrrhæ, lilij, croci ana p. x. vel eo, quod continet ammoniacum, acetum & æris florem. Rhafes vitur ære viridi, baurach, borace, vinea, myrrhæ, galla, alumine tritis & inspersis. Si his non cedit, ferramento opus est post phlebotomiam & purgationem. Quomodo scalpello sit aperiendum, iam in Obser. diximus: quamuis secundum quosdam alia ratione humor in hoc tumore contentus educi posset: vulnere enim submento facto, mox effluit, sed tutissimum est intra os tumorem aperire. Si quid vero impedit, quo minus in ore commode fieri queat, tunc ut submento fiat, proximum est & extremum remedium: veluti aliquando factum est (ut Dodonæus refert) cui vna cum ranunculo vtriusque tonsillæ inflammatio superuenit. Hic vulnere quo diximus loco facto, adhibitis deinde tonsillarum remediis, ab utroque liber euasit. Præstat tamen (ut nos bis aut ter fieri iussimus in adultis) cum scalpello intus aperire: Guillemus vero Placentinus vncinam ranulam capit, & eius eminentiam firmiter tenet, & rasorio ranulam remouet: eaque remota sanguinem stillare facit ac permittit, deum alumen zuccarinum cum sale imponit, ac ad tempus permanere sinat. Postea vino aceto permixto colluit calide: hæc enim ranulam excruciat. Deinde per diem vino decoctionis myrrhæ abluto, ad perfectam curationem deducit. Hanc

curationem ab Albucasi mutuauit, qui in ipsum ranunculum proicit vncinum, & incidit ipsum cum spatula subtili, & liberat ipsum ab omni parte. Michael Sauonarola (qui etiam curationem sumpsit ex Rhafis) quamuis eam sanationem quæ sit per scarificationem magis commendat: Quæ via est, inquit, expedita; & ad hanc ego quam citius possum peruenio, cum non videam periculum. Intelligit, opinor, ut cum ferro scarificetur & aperiatur.

OBSERVATIO XXX.

De Ancyloglossis & qui vix loqui possunt.

Ancyloglossi quidam sunt ex natiuitate (refert Aëtius) quidam vero ex aliqua affectione. Ex natiuitate sunt, cum membranae inferiores, quibus lingua innititur, duriores & mutile à natura sunt productæ. Ex affectione autem Ancyloglossis & incuruatio linguae contingit, præcedente vlcere & cicatrice dura sub lingua relicta. Qui hoc modo affecti sunt, difficulter loquuntur: quare etiam Mogilia Græcis sunt appellati. Qui vero ex natura Ancyloglossi existunt, principio quidem tarde in sermonem prorumpunt; ubi vero loqui cœperint, citra obstaculum & satis festinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolutione nominum aut verborum, quorum alias difficilis pronuntiatio existit: veluti in quibus R, aut L, aut K, literæ frequenter occurrunt. Hos sane adhibita manu per solam chirurgiam curare oportet. Ad eam itaque perficiendam, ægrum desiderare oportet, eiusque linguam fursum ad palatum attollere: & si quidem membrana ipsa curuitatis causæ existant, incuruatio vncino eas apprehensas & extensas excindere; animaduersione habita, ne simul subiacentes venas dissecemus. Si vero cicatrix curuitatis causæ fuerit, similiter vncino apprehensa extendatur, & quicquid durum adest, & quod cum naturali carne non consentit, excindatur. Ab opere autem parato, aqua frigida aut posca os colluant: postea inspergatur manna thuris, imponanturque linamenta conuulsa: sequentibus vero diebus curatur vlcer collutione aquæ mulsæ, aut illinitione vnguenti Ægyptij, linamentis conuulsis simul impositis, ut per eorum interstitium cicatrix deducatur, coalescat, neque rursus eadem cicatrix relinquatur. At infans cum membranam inferiorem, cui lingua innititur, duriorē & mutilam à natura productam haberet, & lingua contracta esset, ut neque lac fugere posset, ad me cum venisset mater vna cum infante, & ore infantis aperto cum ancylosin esse animaduertentem; nostri tonsores appellant lingua vulgari, die tunc Græci, ut diximus, qui hoc malo laborant ancyloglossos appellant. Quamobrem cum mater consilium peteret, quid agendum esset? illam vna cum infante deduximus ad chirurgum & compatrem meum Petrum Fredericum nomine. Qui membranam illam duriorē lingua fursum eleuata forcipe admodum acuta discedit, sanguine effluente cum sale vlceris perficans. Membrana ita ligata contrahente lingua per incisionem soluta, puer bene deinde lac fugere potuit, & postea ad ætatem maiorem accedens optime loquebatur. Hoc enim modo à nostris chirurgis quotidie curantur.

SCHOLIA

SCHOLIA.

Contrahitur enim lingua (teste Alexandro Veronensi medico doctissimo) à natura, adeo, ut vocem ac verba explanare minime possit: quoniam quod sub ea frenum est continet, nec educi finit: infantibus obstetrices vngue, aut pueris ferro hami modo secant. Sed venas maiores cauere debent: alij acie nodo adstricto paulatim consumunt & secant. Verum quomodo huius operatio fiat, etiam in adultis, ex Aëtio recensimus ex lib. 8. cap. 36. Eadem fere ad verba habet Paulus lib. 6. cap. 29. de ligatione linguae quod ancylium dicitur. Verum contingit aliquando linguam contrahi ex humore lento aut melancholico arefaciente. Ex febre etiam interdum acuta contracta cernitur. Cui oleum violaceum ore contentum emolliendo subuenit. Nymphæum & cucurbitinum idem præstat, aut salignum rosaceumve. Addunt alij psyllij seminis, aut cydoniorum cremorem aut portulacæ, maluæ seminis decoctum. Oleum quoque amygdalinum valet, ac lac ipsum. Occipitio & ceruicis vertebri, quæ refrigerant & emolliunt, imposita valent: qualis est aqua cucurbitina, maluacea, vel per se aqua tepens. Ex humore frigido lento, easdem partes fennagraci, chamæmillæ melilotique decocto fovere studemus: gargarismataque pro morbi natura ex consimilibus auxiliis imperamus.

OBSERVATIO XXXI.

De grauitate linguae, & de quodam ex defectu loquelæ laborante.

Quidam patitur Delfius, ac vir consularis, grauitate linguae, tum difficultate loquelæ subinde afficiebatur: qui & cerebro humidior laborans frequenter destillationibus capiebatur, nam & lingua paulo crassior, & ex copia humoris affluente, sermo nonnihil, vti traulis solet, impediebatur. Tales enim facillime in paralytin linguæ, vel totius lateris aut in apoplexiam decidunt: quod & huic euenit, vti longo tempore prædixeramus; de quo alias egimus. Huic tamen consulimus antequam in eiusmodi mala incidere, cum plethora & cacochymia laboraret, ut singulis ann. venam secaret, & corpus cum caput pilulis cochiis expurgaret, & ut victu attenuante & exciccante vteretur, & ut à piscibus (quibus tamen libenter vescitur) abstinere. Hic tamen postea in leuem apoplexiam incidit: à qua cum curatus esset, aliquot annis magis lingua impedita fuit: licet recte loqueretur, tamen lingua grauitate laborans, non ita diu post rursus in apoplexiam incidit paulo grauiorem priore; nam in prima, manus aliquo modo paralytica euasit: at in secunda apoplexia grauiore, etiam crura paralytica aliqua ex parte subsequuntur. Verum post aliquot annos aliud latus sanum post apoplexiam grauius paralyticum euasit, lingua impedita valde; ex qua post octo pluresve dies cum neque enematâ iniecta, ut prius, neque alia remedia iuuarent, vitam cum morte mutauit.

SCHOLIA.

Grauitas linguae est via quædam, seu introitus ad loquelæ defectum, vel difficultatem eiusdem. At loquelæ difficultas, varias & diuersas causas habet. Quidam enim à natiuitate ea

statim afficiuntur: aliis vero ex tempore aduenit, cum prius perfecte loquerentur. Nonnullis vero difficultas loquendi superuenit; atque ea quidem post morbum aliquem apprehenduntur: quæ equidem difficultas loquelæ euenire potest ob aliquas linguæ aegritudines; vti est linguæ paralytis, spasmus, incrassatio eiusdem, inflammatio, apostema, solutio continui, vel ranula, aphthæ, vlceres: de quibus omnibus egimus, excepta linguæ paralyti. Afficitur enim lingua paralyti, aliquando post apoplexiam, cuius exemplum posuimus lib. 10. Obser. 86. subinde & per se incipit, ut videtur licet eodem lib. Obser. 87. de sartore, qui sola linguæ paralyti fuit correptus. Ita & linguæ stupore. Quandoque tenetur, iis nervis prorsus impeditis, qui à septima cerebri coniugatione prope spinallibus medullæ initium deriuantur. Interdum altera duntaxat eius pars dimidia dextra sinistram resoluatur citra ullam gustus offensionem. Quum tota prehenditur, grauis apoplexiæ metus impendet: quamquam non raro animaduerti in Praxidioturna, linguæ paralytin obortam nulla consequuta apoplexia. Ex consummata paralyti omnes obtumescunt. Ab ortu quoque nonnulli muti permanent; idque naturæ confirmantis vitio. Visus est etiam, cui leuiore ex causa biduum vel triiduum, vel longius loquelæ adimeretur; moxque repente & inopinato redderetur: & qui sapius ex interuallis & circuitibus modo loqueretur, modo mutesceret, integre sano corpore. Sic textor quidam (cuius exemplum posuimus lib. 10. Obser. 88.) subito ex paralyti linguæ per quinque dies mutus fuit; qui nostra tamen industria curatus fuit: & istis diebus monacha apud diuam Agatham, quæ acceptis pilulis cochiis & oxymelite scyllino, & vena sub lingua incisa, quarto die etiam loquelam recepit. Sic læsis musculis & nervis linguam mouentibus loquelæ impeditur, vel etiam aufertur. Similiter & in apostemate partis posterioris cerebri, à qua nervi linguam mouentes oriuntur. Hinc in lethargicis obseruatum, licet loqui non possint, tamen aliqua eorum, quæ dicuntur intelligunt. Vnde & Tharantanus vidit aliquos lethargicos loquelam amittentes; à quibus cum peteret, ubi malum seu impedimentum sentirent, signum faciebant, caput tangentes; nihil tamen loqui potentes. Iam & sermonem, inquit Galenus, dentes anteriores sublatis, aut labiorum fissura, aut nares catarro obstruere, vnaque & cæteris vitia infestantia, impediunt: quibus verba & voces male explicantur. Blasi similiter atque balbi sermonem non articulate explicant, aut linguæ breuitate (ut dicuntur) aut crassitie nimia, aut alio naturali vitio conformationis: nonnunquam & affluente humoris copia: modo ex humidiorē cerebro, modo ex ebrietate: nonnunquam immodica siccitate. Si nervi reuersui læduntur, etiam obtumescunt: sed de obtumescencia diximus, lib. 10. Obseruat. 88. & postea de eadem latius dicturi. Causæ igitur grauitatis loquelæ variæ esse possunt, præter aegritudines iam dictas linguæ obuinentes, præcipue materiales vel ex sanguine, pituita aliisque humoribus, ut de gustu deprauato & diminuto diximus Obser. 27. huius lib. ex quibus etiam signa causarum distinguuntur. Si æger balbutiat à natiuitate vel ob molliem aut breuiatem nervorum, facile id habetur ex defectu virtutis informatiæ: quamuis etiam à mala intemperie cum materia ex defluxione fieri posset. At balbi vel trauli à natiuitate ob defectum nervorum & paralytin iam dictarum incurabiles sunt: quamuis in pueris quibusdam balbutientibus terminus sermonis

Pregressiva.

8
Curatio.

monis prolongatur; postea in adolescentia & iuuentute magis expedite loquuntur, consumpta acutionis, sicuti per accidens balbutientibus febris acuta, superueniens loquelam magis expeditam reddit, humiditate absumpta, quae in cerebro musculus & nervus linguam moventibus, tum in radice eius & partibus circumvicinis harebat. Interea balbuties non consueta, paralyfin futuram denuntiat. Balbuties à pueritia ad iuuentutem progressa, & linguae paralyfis diuturna non recipit curationem. Balbutientes quoque diarrhoea longa capiuntur, aphorism. 32. lib. 6. Curatio quoque illius, quae fit à paralyfi vel spasmo ex humiditate superflua, facile habetur: quae de iisdem proprio capite dicta sunt, nam iisdem purgationibus & gargarismis vel vitis alba, Si ad sit plenitudo, vena cephalica incidenda; si caput quoque repletum est ventose applicandae in nucha sub mento, ut quidam faciunt, & venae sub lingua aperienda. Si pituita vel materia frigida in causa sit, eadem concocta cum pilulis cochis euacuanda, cum hiera: lingua etiam fricanda cum hiera picra, & pilula ex castoreo cum succo saluiae in ore tenenda. Diacastoreum & alia exhibenda; gargarismi pituitam educentes praescribendi. Idem quoque sentiendum, si ex spasio à repletionem fiat: si vero ex inanitione, lingua humectanda, cernix quoque & nucha. Quod si aliae aegritudines linguae, de quibus nunc diximus, ut vlcera, pustulae, ranulae, curentur, ut iam propriis locis praecedentibus dictum est. His addam exemplum adhuc paralyfis linguae, praeter alia, quae libro decimo posuimus.

OBSERVATIO XXXII.

De paralyfi linguae.

Matrona nobilis albi coloris, pituitosa, lingua blasa, in loco humido extra urbem cum habitaret, saepe destillationibus obnoxia copia saluiae os occupante, ultra annos quinquaginta nata, à pituita tenui à cerebro defluente in nervos linguae, eorumque meatus opplente, linguae paralyfi subito oppressa est, transitu facultatis animalis inhibito, ut linguam mouere non posset. Commodum igitur nobis visum fuit pituitam illam euacuare: in cuius euacuatione totius morbi solutio versabatur. Galeno etenim auctore 2. aph. comment. 22. affectus tollitur, si eius causa euacuatur. Primo injecto clystere sequenti: 2℥. decoctionis communis (in qua bullierint folior. betonicae, saluiae, maioranae ana m. j. flor. chamamill. meliloti, rorismarini, stachad. arab. ana p. j.) lb. j. cui addit elect. hierae picrae, diapbrenici ana 3 j. diacubolici, elect. lenitiui ana 3 ℥. olei chamamel. lilior. ana 3 i ℥. mellis ambrosii, vel (si desit) eius loco mellis rosati 3 j. salis communis 3 j. salis gemmae 3 ℥. misce: fiat clyster. Quo cum aluum satis deposuisset, altero die pilulas sequentes dedimus: 2℥. pilul. assiteret, agarici trochisc. pilul. cochiar. ana 3 j. cum aqua saluiae, sicut pilula v. quas sumebat in introitu lecti. Sanguinem post aluum solutam ex clysteri ex cephalica vena detraxissemus: sed quia non erat repletio totius, & caput potius pituita abundaret, ad diuersionem tamen post pilulas altero die scapulis cucurbitulas cum scarificatione apposui. Deinde altero die, cum venae sub lingua aliquo modo tumidae appaerent, venas sub lingua aperiri iussimus. Interea pro materiae coctione utebatur decoctis herbarum pri-

mulae veris, seu herbae paralyfis, saluiae, maioranae, betonicae, origani, flor. stachad. arab. quibus mel. ros. oxymel. simplex, syr. & stachade, & betonica admixta erant. Postea illam purgavi cum pilulis sequentibus: 2℥. pilul. ferid. Mes. pilul. cochiar. de agarico ana 3 i ℥. cum aqua betonica sicut pilula v. quibus egregie aluum deposuit. Altero die capiebat 3 ℥. theriacae cum 3 j. confer. flor. rorismar. Postea vli sumus gargarismis ex decocto hyssopi, rad. capp. pyretbri, origani, saluiae, sicum, & in fine sinapi momentum incientes, ac mel. ros. & oxymel pro sapore, cum iisdem decoctis vel similibus linguam fricari iubebam. Valet & vinum album odoratum, castoreo exiguo addito: idque moderate faciendum, non tamen temere, ne in lingua erosionem aut ulcerationem incideret. Ideo sinapi solo (multo minus succo thymalli. aut pedis cornini vel vitis alba, ut vulgares quidem faciunt) lingua fricanda: his enim plus iusto materia ad linguam attrahitur, inflammatur, vlcatur: quibus aeger vix securus erit à cancro, aut alio vlcere maligno impediende cibi deglutitionem, ut aeger inopia alimenti mori possit, antequam nutriatur, deinde lingua inepta fiet ad retinenda medicamenta sibi applicita. Igitur ad mitioribus incipiendum, ut recte docet praceptor meus Benedictus Faustinus cap. proprio De linguae paralyfi. Interea capitis partem posterioiorem & cernicem, ut oleis sequentibus inungeret praecipimus: olei costini, nardini lilior. ana 3 ℥. misce: partesque post inunctionem tegantur pelle vulpina aut leporina calefacta. Postremo vesicas in cervice excitauimus, admodis cantharidibus (ablatis ante capitibus & alis) cum fermento, vel eius loco, ut libet, axungia. Quibus deinde ruptis aqua citrina effluente folia brassicae superposuimus. Quo praesidio vacuata illa aqua, mox loqui coepit. Interea, ut quotidie mane lumeret ex hoc condito iussi ad nervos roborandos, ut loquela paulatim expeditior fieret: 2℥. confer. flor. rorismar. saluiae, betonicae ana 3 ℥. pul. diamosci dulcis (cum hac vterino malo minime obnoxia esset; alioqui à moscho abstinendum) 3 j. nucis moscatae pulueris 3 j. castorei 3 j. cum mellis ambrosii vel rosati & oxymelliis scillino ana 3 ℥. fiat conditum. Hos quoque orbiculos, ut saepe in ore teneret, consului: 2℥. nucis moscatae 3 j. castorei 3 j. cum succo saluiae, singamur orbiculi lupini similes. Quos saepe in ore tenebat, vel nucis moscatae frustum mandebat. Et praeter omnia iubebam, ut loqui perpetuo niteretur, linguamque non segniter exerceret. Quibus haec conualuit, & alij non pauci.

SCHOLIA.

Quomodo paralyfis linguae curetur, diximus lib. 10. scholia Obs. 87. & 88. & quibus modis ab Aetio curetur. Eadem his remedia conueniunt, quae ad paralyticos longa oratione valere scripsimus: quae non opus est hic rursus repetere. Si autem plura de his desideres, & magis particularia remedia, quae ad linguae paralyfin valent, ad eiusdem causas, signa & curationem perlege ea, quae Benedictus Faustinus praceptor meus capite proprio De Paralyfi linguae in magna sua Praxi scripserit.

OBSER-

OBSERVATIO XXXIII.

De quadam pellione animam quasi agente & loqui non potente: deque rustico obumescente subito: & alia praegnanis sine loquela ad tempus permouente.

Pellio annos circiter quinquaginta natus, ut videbatur, Almariae apud moenia decumbebat, adeo grauiter, ut nulla spes salutis superesset. Forte fortuna cum extra urbem agrum accedentem, vicinis in aegroti aedes modo intrantibus, modo exeuntibus, quid rei esset rogabam. Inquirit pellionem iam duobus diebus sine loquela in lecto decubuisse, & nunc animam agere, & in agone esse. Rogantque, ut ita misere iacentem agrum spectarem; atque me ad illum deducunt. Iacebat autem tanquam moriturus, & animam iam agere videbatur: unde etiam accensis candellis, nihil aliud quam mortem omnes, qui aderant expectabant. Rogavi, quomodo malum inceperat: dicebant illum ex gutture prius doluisse, & non diu post obtuuisse, & semper deinde in deterius euasisse. Arripio manum, tango pulsus, qui mihi satis adhuc constare videbatur. Os vi aperiēbam, inspecta lingua, quae paulo tumidior erat, sed non admodum: lubeo, ut statim chirurgum vocaret, qui venas sub lingua tunderet, quod prima vice, in homine moribundo iniquentes, admittere nolebant. Interea cum dicerem in hoc praesidio nihil periculi esse, cum aliqui mori deberet potius eo utendum esse, quam nullo. Admittunt itaque: & ego illic hinc discens cum extra urbem mihi ad alium agrum discedendum esset, chirurgum vocant: sed re infecta denuo abiit. Cum autem rursus in urbem venissem, reecta per eandem viam iter institui, ut scirem quid de pellione actum esset. Quum ita, ut prius misere vitam trahentem repperi. Rogavi quoque nunquid vena sub lingua secta esset? Responderrunt, chirurgum apud agrorum fuisse. Respondeo secta domum remeasse. Reuoco chirurgum eumque interrogo quid causae fuerit, quod venas non secuerit? Respondit se nullas venas sub lingua repperisse; atque in homine agouisante id minus praestitisse. Ego ad chirurgum conuersus, cum nihil mali inde nobis expectandum sit, scalpello, inquam, linguam leuiter pertunde, etsi venae minus appareant. Quod cum fecisset, vix sex septemve guttis sanguinis è vulnere emanantibus (dictum mirum, & miraculi instar) nobis omnibus praesentibus loqui aeger coepit, tanquam è somno extitius, cum prius uti caudex iacuisset, mortuus, ad vitam reuocatus est, & perfectam sanitatem consequutus. Laudandus Deus, qui sua providentia me per illam viam duxerat, ut miseris agro opem adferrem. Verum rusticus sexagenarius, nomine Theodorus Iacobus, qui in pago Oerlickio dicto prope Almariam urbem habitabat, anno 1547. mense Septembri cum ex nundinis Almariauis (quae singulis septimanis die Sabbathi habentur) scapha domum remearet, inter remigandum fluxu vehemētiore in guttur dilapso, atque intus apostemate ibidem oborto, illico obtuuit, mutumque in domum, qui aderant deducunt. Post quinque dies, ut rustici sunt sui negligentes, me ad eundem vocarunt. Quem reperi quidem mente constare, sed cum loqui non posset, affectum intus in gutture haerere digito indicabat, atque ibi affectum esse demonstrabat, tumore licet exiguo circa guttur apparente, ita, ut de angina latente, vel alio malo metus esset. Cui-

terum cum aeger adhuc satis robustus foret, ac viridi coloris esset, & sanguineus licet sexagenarius cum facie rubicunda, pulsuque satis valido, aluo prius glande irritata, cum clystere nollet, vena cephalica in brachio loco dolenti magis repondente secta fuit, sanguine utrumque extracto. Deinde etiam eodem die cum morbus inducias non daret, venas utrasque sub lingua secari iussimus, sanguine admodum viscoso effluente. Vnde factum est, ut illico loqui coepit, ita tamen ut verba adhuc indistincta proferret. Deinde cum adhuc nihil quicquam medicamenti deuoraret, aut deglutire posset, ut phlegmata ex ore deiceret, quae os valde replebant, globulum in quo pyrethri radices & masticis ana 3 j. inclusa esset, masticandum praebuimus. Pituita ita ex ore manante postea & gargarisari iussi sequenti gargarismo. 2℥. maluae cum toto, flor. chamamill. ana m. j. flor. rosa. rub. p. j. sem. fenugraeci, anisi 3 i ℥. ficum pinguium nu. v. hordei mundati m. j. fiat decoct. in aqua communi ad lb. 3 ℥. adde diamori 3 j. mellis rosae colati 3 ℥. quo gargarismo multa phlegmata deponbat, & tumor resolebatur. Interim totum guttur inunximus oleo liliaceo, amygd. dulc. simul mixtis. Die vero sequenti etiam scapulis cucurbitulas cum scarificatione commode apponi iussimus. Et cum nodulo supradicto, tum gargarismo praecipue usus esset, & phlegmata multa consequta & ab ore copiose reiecta, sexto die loquelam accepit. Et cum deuorare posset solidiora, vnciam vnam diaprunis lenitiui in bolo deuorauit: quo cum aluum mediocriter deposuisset; praeter spem multorum & hic quoque sanus factus est. Eodem fere modo mulier quoque paupercula praegrans, in nono mense à conceptionis tempore (quae & extra murum decumbebat) cum prius dysenteria admodum periculosa laborasset, quem fluxum dysentericum cum intempestiue pharmacopoeus lacte bubulo, semine plantaginis puluerisato immixto restrinxisset, per 10. continuos dies sanguis è naribus fluxit, nullosque consuluit medicos: inde viribus prostratis, cerebrum admodum debile euasit, etiam dolore capitis, haud exiguo superueniente, post tot euacuationes praecedentes, quod mirum alicui esse videbitur: attamen eatarho vehemētiore quoque suborto in gutturi partes internas subito defluxo, haec misera mulier etiam obtuuit. Post tertium vero diem ab obtumescencia me prius vicini vel affantes vocarunt. Reperi eandem viribus admodum prostratis debilem esse, sine tamen febre. Cum loqui non posset, digito monstrabat omne malum in gutture latere. Speculo oris immisso aperto ore obtinuiquam valde inflatam, conspicerem non potui quid in gutture lateret. Erat autem iuencula viginti annos nata, satis bonae constitutionis & sanguinea: nutuque indicabat se & in puppi capitis dolorem perferre: & qui praesentes erant, narrabant ibidem à marito vulnus inflatum fuisse, qui iam è vita discesserat, & vulnus iam dudum cicatricem duxerat, remanente tamen dolore, quem & nunc molestum sentiebat, quem admodum certis signis innuebat. Haec ipsa quoque marito demortuo etiam melancholica euaserat. Ego vero, cum loqui non posset, suspicabar & in gutture nunc abscessum esse; quod nutu quodam negabat, licet minimum quid deglutire posset. Ad hanc autem veni die 2. Iunij anno 1557. cumque haec glande ex nostro praescripto aluum deposuisset, venam cephalicam ut vulnerarius medicus aperiret, non videbatur mihi consultum ob vires plane deiectas. Quare eius loco cum sanguis adhuc è naribus

naribus fluere, ad diuersionem cucurbitulas cum scarificatione scapulis affigi iussi: & etiam altero die venae sub lingua sectae sunt. Mansit tamen muta, dolore sub faucibus in gutture permanente. Ideo exterius quoque inunximus guttur nostro vnguento pectorali, oleo liliaceo, anethino, chamamelino simul immixtis: etiam hoc cataplasmate appposito: ℞. rad. althae mund. ʒ i β. folior. maluae viol. flor. meliloti, chamam. ana m. j. coquantur in aqua ad mollitudinem, pistentur, addendo farinae sem. lini, fenugr. ana ʒ β. farinae hordei ʒ ij. butyri q. s. in cataplasma redigantur. Quarto lunij die & hunc gargarisimum praescripsi: ℞. maluae cum toto, scabiosa, viol. hyssopi, ana m. j. rad. althae ʒ β. flor. meliloti, rosa, rub. ana p. β. ficum pinguium num. iij. vuar. passul. ab arill. mund. ʒ j. sem. fenic. ʒ j. nidi bismidinis cum plumis incisi partem dimidiam (reliqua pars cataplasmati supra scripto addebatur) sit decoctio in aqua communi ad lb i β. colatura addendo mellis ros. colat. ʒ iij. misce: sed eo vii non potuit, cum per nares regurgitaret. Nullus autem tumor exterius apparebat: ideo maxime aborsum metuebam, atque de foetu, cum & obstetrix motum in ventre percipere se negaret. Erat tamen vnum ex signis praesentibus, cum neque venter praegnantis frigeret, neque anhelitus foeteret, neque etiam febris adesset, cum & talia symptomata illico foetum mortuum sequantur. Quod vero mater motum infantis non sentiret, id quidem ex imbecillitate fieri arbitrabar, cum ipsa iam octo diebus nihil edulij aut liquidi deglutire potuerat, & iam per quatuor dies sine loquela permanerat: ita, ut fere aborsum prouocandum duxissem, cum de matre ac infante simul periculum immineret, ne matrem & infantem diu superflites fore, cum nihil per os sumeretur: ita, ut ob ignominiam libenter mihi collegam adiunctum habuissem. At medicus, qui tunc consulatum agebat, praetexit causam sed frivolum, se venire ad agram non posse: quia forte nimis egena, a qua nihil lucri sperabatur. Ceterum die sequenti in multo peiori statu agram inueni. Libenter autem enema nutriendum iniecissem, si admittere voluisset. Quare hoc linimento guttur exterius rursus inuncto, & cataplasmate sequenti appposito, nono die a morbi initio & sexto nostrae vocationis, apostema intus latens ruptum est: ℞. olei chamamill. liliacei ana ʒ β. misce: ℞. rad. lilior. albor. ʒ i β. rad. althae ʒ j. scabiosa m. j. coquantur in aqua ad mollitudinem, pistentur, & cataplasmati superiori addantur, adiecto oleo liliaceo ad mellis cataplasmati consistentiam. Rupto autem apostemate pus exibat in magna quantitate tam per vomitum, quam secessum: & tunc recuperavit loquelam, & ferebatur tunc se foetum optime sentire, & quod sese moueret; ac cibum assumpsit viribus recreatis. Interea pro vlcere abstersione & materiae residuae expulsionem, sequenti gargarisimo utebatur: ℞. hordei non excocti, scabiosa ana m. j. folior. maluae, plantaginis ana m. j. sem. lini, fenugr. coroneor. ana ʒ i β. cicernum rub. ʒ j. coquantur in aqua communi pro lb i β. colatura adde mellis ros. colat. ʒ iij. misce. Deinde pro gula ac ventriculi abstersione, si quid purulenti in iisdem haesisset, hordei communis decocti ʒ iij. mellis ros. colat. ʒ i β. ebibit; & utcumque sana euasit: quamvis post quinque dies iterum collapsa est in fluxum ventris. & in febrem quasi erraticam. Fluxum autem subito constringere nolimus, nam eo constricto magis febricitabat. Ideo postquam ebibisset decoct. hordeacei communis ʒ iij. cum puluere myrrhod. citrinorum rosorum ʒ j. melius habere cepit.

Verum cum pauperula esset, & nemo ei adficeret, cum forte excrementa foras exportaret tempore admodum ventoso, in dolorem hypochondrij dexteri incidit, rata pleuritidem esse. Ad quam rursus accitus, cum neque tunc febricitaret, neque iam a diebus febrem habuisset, ventositatem doloris causam esse iudicabam; neque me fecellit opinio: nam adhibito sequenti fomento dolor cessauit: ℞. flor. meliloti (flores chamamillae hic accipere nolui, quamuis anodynus & resoluens facultatem haberent: verum grauidismine conueniunt, cum & aborsum promoueat, & menstruas purgationes, quae saepe tempore ad eiusdem alimoniam retinentur, aperiant, ut Arnoldus de Villanova sentit, quamquam de iis forte intelligit in potione sumptis; nolimus tamen illis ipsis, ne quidem etiam exterius vti) summi. ratum anethi ana m. i. β. sem. lini, fenugr. carui, ana ʒ β. folior. maluae m. j. sem. cumini ʒ i β. coquantur in aqua communi pro foetu cum spongia calide inuasa & expressa & adnota, vi artis est. Deinde loco affecto inuncto oleo anethino, dolor ille, miraculi instar, statim euauit. Fluxu tamen bilioso peruerante, adhuc semel lotium medicamentum ex hordei decocto nempe ʒ iij. syr. cotoneor. ʒ j. myrrhod. vin. modice vsorum & pulueris aurum ʒ j. sumptis, & frequenter etiam ex hac mixtura: Recipe conf. ros. antiquae, muae cotoneorum, corticum citri conditi ana ʒ β. trochisc. de carabe ʒ β. cum syrupo, mentaceo & cydon. fiat mixtura. Fluxu sanato & optima vi ratione vtiens, non solum fuit praeservata ab aborsu, verum etiam his praediis optimam sanitatem consequuta est.

SCHOLIA.

Trum hic Rosticus, tum muliercula obgentur apostemata intus latentia, etiam fluxionem ad nervos reuerfus, obmutuerint, & lingua simul affecta fuerit, vti etiam in prior aegro, aliquis dubitare posset: cum Galeno auctore nervus reuerfus laevis (vi mox ostendimus) vox adimi possit. Interea alij quidam ex toto muti nascuntur: alij repente obmutescunt: alij imperfecta loquuntur, cerebri, cordis stomachique ac oris dolore, vulvaeque cruciatibus, aut nervi a cerebro orti vitio, aut lingua lacero laeso, aut lingua resoluta, aut contracta fuerit: de quibus paulo ante diximus. Capitis quoque ictu aut ex alto lapsu muti facti sunt: ut puer ille & filiolus Benonis Iacobi, qui ex fenestra partis domus altissimae cum cecidisset, per quatuordecim dies mutus permansit: quamvis a me & collega meo (vi alio diximus) tum tribus chirurgis, non solum vox restituta fuerit, verum probe etiam sanatus sit. Sic etiam Petrus quidam nobilis Iadertinus Lubanatus octogenarius (de quo meminit Alex. Veronensis) qui trabis ictu quindiebus obmutuerat: cui post abstinentiam sanguinisque mictionem diligentia eiusdem Alexandri Veronensis medici clarissimi, restitutus, Deo adiuuante, sermo fuit. Sic Simon Harckonis ex iactu reli in caput ad tempus obmutuit. Hic fuit a me curatus, ut alias retulimus lib. 10. Obs. vti & puella quae apud Hester vicinam nostram ex lapsu muta decumbat, similiter a me curata. Muti quoque ex ebrietate sunt quidam, Hippocrate teste. Ita Petrus Iacobus Delphius ex ebrietate obmutescens conuulsus perit: de quo similiter etiam antea dictum est. Quibusdam cibis male verba dearticulantur: qualis cinarae carduus pineus; aut nectices iuglandes: quod & loquacibus in proverbium obiurganti transit. Ceterum (vi paulo ante quoque

mus Galenus. Refert quoque Amatus de muliere Illyrica, quae ad caput montis habitabat, cum strumam a Gallica scabie originem ducentem, in collo haberet, monachum medici officio fungentem pro sua valetudine accersit. Qui indiscrete, quum pro ea propulsanda multis vsus esset medicamentis, ita sublatum, ut eius rescaret radices, loco indidit. A quo alter nervorum ex pectore reuerentem, qui vocem effingunt, inibi corrosus est. Vnde de ipsa paulatim rauca facta vocem fere in totum amisit. Rosticus alius quidam (ut etiam narrat Beniuencius) cum declinore capitis prope percussus recidisset, & alteram capitis ipsius partem oppositam ad terram, ut par fuit, elideret, surrexit quidem, sed mutus: id autem sine ex repercussione nervorum, qui egrediuntur ex pectore, siue ex destuente materia, quae nervos illos oppleuerit, tam incertum, quam certissimum est, ex hoc communicatum nervis ipsis, qui vocem effingunt. Varias itaque sunt causae obmutescenae & loquela amissionis. Quibus enim cerebrum aliqua ex parte concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri, aph. 59. lib. 7. Si ebrius quispiam repente obmutuerit, conuulsus moritur, nisi febre corripiatur, ut vbi ad horam peruenierit, qua soluntur crapulae, vocem recuperet. aph. 5. lib. 5. Quicumque sani dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit, aph. 15. lib. 6. Quomodo autem curantur illi, qui obmutescunt ex vulnere, ictu, casu, a lethargo, spasmus, seu a convulsione, apoplexia, paralyti aut aliis cerebri affectibus, id quidem declaravimus lib. 10. Observ. Qui autem a phrenitide imperfecte loquuntur vel male, quadam lingua immobilitate, venas sub lingua quidam post cephalicam incidunt, & capiti oleum violaceum vel nymphaeae infundunt. Ex vulnere vel convulsione aliquando non restituitur sermo. Repente obmutescuntibus quidam probant gummi hederæ cum melle liquatum, aut buglossi radices in vino meraco coctas, atque in ore detentatas, succum origani auribus instillatum, pyrethrum aut castoreum lingua subditum. Si quis in deliquio animi obmutescit, folia ocymi in vino meraco infusa ad linguam impeditam valent & obmutescens repente verba restitunt: pulegium aceto infusum panno naribus subiectum: palati & gingivarum confricatio cum theriaca: aut ruta decoctum, & potum. Catarrho destuente si vox amittitur, cucurbitula bregmati acius imposita, humorem fluentem suspendit. Aut si capiti abrotani decoctum infundatur, mire enim sistit. Atini vulvae strangulationibus sternutamenta ex hellebori albi farina repente vocem restitunt mulieribus: etiam pulegium olfactum, eiusque semen. Si linguae vitio loquela impediatur, ab illa quae paulo ante diximus recurrendum. Et ita linguae affectibus absolutis, huic lib. quoque sine imposito, ad faucium & gutturis mala progrediamur.

Finis Libri decimi quarti.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus quintus.

DE FAUCIVM, GVTTVRIS, GVLÆ AFFECTIBVS
& asperæ arteriæ.

OBSERVATIO I.

De inflammatione & inflammatione Gurgulionis columellæ.



Gurgulionis & columellæ inflammationem adeo magnam vidimus, licet longiusculam & satis crassam, non tamen rotundam, ut in vna apparere solet in calceario quodam Alcmariano, Curtio dicto, viro admodum crasso & robusto, 36. annum excedente, ita ut strangulatio eidem pene immineret. Huic & febris aderat, columella quoque inflammata, uti tonsillæ similiter valde inflammatae, idque ex calida fluxione: & ingenti quoque capitis dolore afficiebatur, mense Martio cum sanguis suppullulare solet. Ad hunc lecto decumbentem accitus, magna plethora aderat & totius corporis plenitudo. Quamobrem clysterem statim iniiciendum proponebam, & deinde sanguinem copiose esse detrahendum. At cum clysterem non admitteret, glande acuta ad fauces ab intestinis expellendas cum aluum depouisset, lotio admodum rubro existente, vena cephalica in brachio dextro secta fuit, & ab homine carnoso & sanguineo circiter libra vna sanguinis commodè extracta est. Simul & hoc gargarisma (cum essemus in principio) ad fluxionem reprimendam præscriptum: *℞. aquæ plantaginis, lb. i. aquæ equiseti, lb. i. flor. rosæ rub. an. m. j. folior. myrti, corticum malorum granat. an. z. ij. coquantur in aqua cisternæ pro lb. i. b. adde succi malorum granatorum post colaturam z. j. aceti rosæ. (id enim cito repellit) z. b. dianicum z. iij. misce: fiat gargarisma. Inubam quoque, ut ex dianuco lamberet: venit enim mihi tunc in mentem historia illa Galeni de hortulano vulam inflammata habente, & inflammationem in paristhmis & antiadib. cui suffocatio imminerebat, in quo ægro Galenus dianuco utebatur. Quam confectioem ipse Galenus eius inuentor valde commendat lib. 6. De compos. medic. secundum locos c. 1. Postea in incremento etiā hoc gargarismo vti sumus: *℞. hordei integri p. j. plantaginis, bellidis minoris an. m. j. pass. cum arill. contrarij an. m. j. flor. rosæ rub. p. j. sem. cydon. malne ana z. j. fiat decoctio in aqua cisternæ & in lb. j. dissolue melis rosæ, dianuri, dianicum ana z. j. misce pro garg. Velum cum adhuc fieret magna defluxio, post adhibitas cucurbitulas in scapulis cum scarificatione, aliquid rursus ex succis adstringentibus adiunximus, nempe succum granatorum & cotoneorum. Etiam cum alumine vsto & bolo vuam subleuauimus, & cepit melius habere. Postea tamen in declinatione in partibus circumuicinis pituita multa retenta inhærebat. Quare hoc gargarismo utebamur: *℞. hordei communis p. j. liquiritiæ rase z. b. folior. viol. hyssopi an. m. j. vuar. passul. ab arill. repurg. z. j. sicum pinguium n. vij. fiat decoctio ad lb. j. colatura adde oxymellis simplicis, mellis ros. an. z. i. b. misce. iussique ut mel ros. sæpe lamberet: gutture exterius immisto oleo chamæmili, & amygd. dul. fuit breui restitutus.***

SCHOLIA.

3
Fauces.

Ad faucium mala peruenimus. At summum gulæ Fauces vocari videmus; quibus ea non sunt, iis nec stomachus quidem est, nec collum, nec guttur; sed os ventri iungitur, ut piscibus

Collum est quibus gula, eius extima pars cernitur, pluribus, hoc est, septenis vertebis orbiculatim flexilis ad circumspæctum constituta: cetero spinæ annectitur: Vna in summa parte pendet, extremo palato: Tonsillæ vtriusque vocantur, mentes apparent, *αἰνέδους & ναιέδους* vocantur Græci: his subest Epiglottis, quæ arteriam in epiglottando operit: quæ ad pulmones tendit cartilaginea: nola: Gula ex nervo & carne constat. Arteria ritus tantum capax est, cætera obstrepens respicitur intempestiua. Vini gutta, vel aceti (quod maxime inimicum est) quosdam vidimus misce torquent, quos veluti strangulatos suscepimus, quoniam alienu tramitem acris humor deerrauerat. Gurgulio intus mala occupant, cum vna seu columella tumeat, inflammatur, vlceretur, elongetur seu læxetur; quibus Rondeletius & quartum affecit, addit, nempe atrophiam: Contabescit, inquit, hæc pars, & veluti lorum efficitur; quæ affectio à noma siccitate vel atrophia illius partis fit, & non curatur. Tonsillæ similiter & inflammantur, & vlcerantur. Quibus addunt & Anginam. Gurgulio etiam intumescit, quod aquarum vitio sæpe evenit, Enterocoele à Græcis dicitur. His etiam an nometari poterunt vertebularum colli luxationes, & spondilia luxata: quæ cum ad chirurgiam spectent, de iis dicemus suo loco: nunc autem de columellæ vitiis agimus. Inflammatur autem sæpe numero pars quædam, quæ circa os continetur, carnosa, in summo siquidem ore dependens, tanquam aliquod vocis plectrum existens. Paulo auctore lib. 6. c. 31. Apparebit autem ea, si quis aperit, plurimum ore toto, linguam deprimat: hæc ipsam carunculam veteres Græci (inquit Galenus comp. med. secundum locos) duobus nominibus appellare consueverunt: interin nominantes *παύλα*, interim vero *κρίνα*, quod à Latinis gurgulio & columna dicitur. A posterioribus autem medicis fere omnibus Græcis (ut ipse metasserit) *κρίνα*, id est, columella vocatur. Quod si quidem sunt, qui *εὐρυκρίνα*, id est, vnam ipsam nuncupent, eorum (ut etiam Donatus existimabat) meminisse non præstat: nam non particula ipsa, sed vna aliqua eius affectio *εὐρυκρίνα*, hoc est, vna nominatur, cum scilicet vna acino simile summum gurgulionis appareat, ut inquit Aëtius c. 40. lib. 8. Hanc etiam loram Gurgulionis speciem Hipp. appellat vnam, ut liquet apud Gal. lib. De tænore præter naturam. De his vide Iacchinum doctissimum supra Rinal. & Benedictum Veronensem, & Benedictum Faventinum præceptorem meum, qui hæc rem ad longius tractant. Satis est, quod vtriusque nomen; ut Paulus quoque refert à similitudine factum est, nisi longior tenuique fuerit, columella nuncupatur; si vero crassior, in rotunditatem creuerit, feraturque deorsum, Vna dicitur. Pars affecta aperto ore & inspecto per se nota est, nec aliis signis indiget: & affectus ipse cum sit inflammatio, nempe morbus in compositione primo, & dolore,

& dolore, tumore & rubedine ipsius columellæ cum febre ac diglutiendi difficultate cognoscitur. Si laxetur & oblonga fiat, vitium est in aegritudine, etiam meatus partem obstruens cum linguae radicem attigerit, à quib. partib. suspensa esse debet. Meatus ille Fauces appellatur. Provenit ex capite ad gurgulionem defluxione de sanguine vel pituita, ut alij volunt, vel etiam ex bile & melancholia iuxta quosdam, qui Arabum de creta sequuntur. Atque hæc facile distinguuntur ex coloribus. Iacchinus duas tantum causas ponit, easque facile ex visu & sensu distinguit. Alij vero, ut Arculanus, colorem rubrum in sanguinea inflammatione; ex rubro citrinum in biliosa; ex albo in pituitosa, ex fusco vero in melancholica distinguit: ex sanguine dolor grauis, pullatilis, ex bile pungens, in aliis exiguus aut nullus. Reliqua signa caularam, ut iam sæpe diximus, cum comuta sint, ex ætate, anni tempore, cæli constitutione, temperatura, vitæque instituto habentur. Gurgulio inflammato ac in tumorem aucto, omnibus modis præter chirurgiam, cum curare oportet & extenuare, Hipp. auctore 3. Progn. nam quoad tumorem rubidus magnusque fuerit, gurgulio cum periculo secatur & scarificatur ob sanguinis fluxum & inflammationem quæ subsequuntur, ut constat ex locis citatis Hippoc. & Galeni. Vbi vero summa gurgulionis pars maior liuida, seu orbiculata; superior vero tenuior (quem affectum diximus vuam appellari) aliquando chirurgia vtendum, alio prius subducta, ne ager stranguletur, vbi medicamentis non cedat. Quomodo excidenda, vide Paulum c. 31. lib. 6. & Aëtium cap. 41. lib. 8. dextre faciendum ne vox pereat; uti aliquando evenit, de his vide *εὐρυκρίνα* c. 51. ap. Aëtium Cent. 3. Curt. 65. Sed in primis curatio instituenda per victus rationem, quam in reliquis inflammationibus competere scripsimus, quiete & inedia præcipue adhibitis, ut sexto de compos. med. secundum locos. Archigenis auctoritate Galen. docuit; plenitudine (si quæ adsit) venæ sectione ablata, & purgatione ad ministrata; clysteribus quoque adhibitis, aliisque diuersionibus, frictionibus, vinctulis partium extremarum, cucurbitulisque cum scarificatione iuxta scapulas & nates appositis; etiam, si opus est, venis linguæ sectis. Nam iis præcedentibus ad topica deueniendum in initio, quæ repellant, & in statu admixta, quæ mitigent; in declinatione vero, quæ discutiant: quorum copiam, tum ap. Gal. loco citato, tum Aëtium & Paulum inuenies, & præcipue ap. Rondel. ut etiam exempla infra scripta docebunt; quibus, si libet, adiunge ea, quæ præceptor meus Bened. Faue. ad longum scripserit.

OBSERVATIO II.

De columellæ inflammatione cum febre, postea crescente, & in vuam permutata.

Iuuenis annos 24. natus columellam vna cum febre inflammata habebat, quæ subito ita intumuit in rotunditatem uti vna, ut strangulari videretur. Ad hunc accitus cum aluum per se illo die depouisset, statim venam cephalicam incidere iussi: & cum timerem suffocationem, etiam post meridiem venas vtriusque linguæ aperiri mandavi, & altero die purgationem sequentem exhibui: *℞. syr. ex infus. ros. pallid. cum folijs senæ z. i. b. (in vnaquaque vicia duæ drachmæ senæ infunduntur) electuarij tenuissimi z. iij. seri lactis cum in vere effusus z. iij. misce: quatuor secessus inde habere.* Per. Forest. Tom. 2.

buit: interea etiam statim, cum in principio essemus, hoc gargarismo commodè utebatur: *℞. plantaginis, solani, portulacæ, flor. ros. rub. an. m. j. folior. myrti, corticum malorum granat. an. z. ij. coquantur in aqua cisternæ pro lb. i. b. adde succi malorum granatorum post colaturam z. j. aceti rosæ. (id enim cito repellit) z. b. dianicum z. iij. misce: fiat gargarisma. Inubam quoque, ut ex dianuco lamberet: venit enim mihi tunc in mentem historia illa Galeni de hortulano vulam inflammata habente, & inflammationem in paristhmis & antiadib. cui suffocatio imminerebat, in quo ægro Galenus dianuco utebatur. Quam confectioem ipse Galenus eius inuentor valde commendat lib. 6. De compos. medic. secundum locos c. 1. Postea in incremento etiā hoc gargarismo vti sumus: *℞. hordei integri p. j. plantaginis, bellidis minoris an. m. j. pass. cum arill. contrarij an. m. j. flor. rosæ rub. p. j. sem. cydon. malne ana z. j. fiat decoctio in aqua cisternæ & in lb. j. dissolue melis rosæ, dianuri, dianicum ana z. j. misce pro garg. Velum cum adhuc fieret magna defluxio, post adhibitas cucurbitulas in scapulis cum scarificatione, aliquid rursus ex succis adstringentibus adiunximus, nempe succum granatorum & cotoneorum. Etiam cum alumine vsto & bolo vuam subleuauimus, & cepit melius habere. Postea tamen in declinatione in partibus circumuicinis pituita multa retenta inhærebat. Quare hoc gargarismo utebamur: *℞. hordei communis p. j. liquiritiæ rase z. b. folior. viol. hyssopi an. m. j. vuar. passul. ab arill. repurg. z. j. sicum pinguium n. vij. fiat decoctio ad lb. j. colatura adde oxymellis simplicis, mellis ros. an. z. i. b. misce. iussique ut mel ros. sæpe lamberet: gutture exterius immisto oleo chamæmili, & amygd. dul. fuit breui restitutus.***

SCHOLIA.

Curatio communis est cæteris morbis, qui ex fluxione sunt: ut primo causam tollamus, plenitudinem ipsam, ut diximus, venæ sectione, & humoris purgatione. Deinde ad topica remedia deueniendum pro magnitudine causæ: ut si influxus exiguus, & tardus sit, sat fuerit austera adhibere, quæ moderate adstringant: si magna, acerbæ, quæ valide hæc præstant: in exiguo enim sola polca diluta gargarisata aliquando profuit, vel vino granatorum. Sed ordinem vide ap. Gal. tum de austeris, tum de acerbis 4. De simpl. med. fac. & 6. De compos. med. secundum loc. num decoctum pampinorum vitis rubi, rosa. radic. mori, palmularum, malorum austerorum, pyrorum, sorborum: cyperi & similium. Si vehementior influxus, myrti & baccarum eius decoctum, glandinum mespilorum, rhus culinarij, mali punici floris & putaminis: Galenus & Aëtius arida quandoque inspergunt. At si pars affecta debilis & corpus humoribus multis refertum, cogimur sæpe in principio, vel paulo post admiscere quippiam ex discussoriis: & si dolor adfuerit vehemens, etiam ex mitigatoriis, cum acria inflammata exacerbent: & sic adiciamus flores chamæmilla, fertulam campanam, rad. althææ & similia; & si inflammatio non cesset, discussoriis utimur, adiecto sem. lini, fenugræci, hyssopo, glyc. in gargarismis. Iam quoque in pituitosa discussoria adhibemus, simul & alstringentia: & si malum diu protrahatur, solis valide discutientibus utimur. Etiam eclegmata, tunc ex detergentibus & digerentibus conueniunt ex pul. diaireos, sacch. cand. & aliis, cum syr. perfecte coctis, etiam aliquando zinz. aut pip. adiectis. Hæc enim citissime morbum

Muller &
Rondeletio
chirurgi.

morbum digerunt, & pituitam retentam ob inflammationem expurgant. Probauit aliquando & Rondel. eclegma Scribonij Largi ex pip. myrr. & mel. quo vsus est in muliere, quæ suffocabatur & desperata erat. Infra vnum diem reiecit incredibilem pituitæ quantitatem, & materiæ, quæ circa columellam, glandes & fauces propter inflammationem retenta erat. Sine myrrha poterit sic parari: ℞. pip. ʒss. pul. iridis Venet. ʒij. suc. glycyrr. ʒi ss. r. accb. candi ʒij. mell. ʒj. fiat loch. capiat lambendo. Fiunt etiam in minus delicatis ex decocto rad. gladioli cum multo melle in declinatione in fluxionibus pituitosis: sita enim partium tenuitate materiam incidunt & extenuant; mel autem deterget: ob idque multam pituitam reddunt. Ita quoque si ad suppurationem inflammatio vergat, minoribus collutionibus & gargarismis, eisque concōquentibus vtendum erit: quo casu præstat decoctum ex caricis per se solum, aut aqua multa permixtum, aut sapa vel pitisan. succ. in quo vix passæ sint decoctæ: radicis insuper dulcis decoctum, aut surfurum lotura calida, id quod in reliquis omnibus seruandum erit medicamentis, vt temperate calida sint: Ea vero suppurata, post puris eruptionem extergentibus, & desiccantibus medicamentis curari debet, aqua hord. cum mell. ros. mixta, aut aqua multa & reliquis eiusmodi. At de vlcera columella postea.

OBSERVATIO III.

De columella inflammata & simul laxata sine febre.

Scroterius meus Augustinus Teylingius cum Scereuisiam Gedanam in magna copia bibisset, in columellæ inflammationem incidit sine febre, & in vix laxationem adeo vehementem cum inflammatione tonsillarum, vt subito suffocari videretur: cum nihil deglutire posset, potu quoque per nares regurgitante, lacte cocto gargarisabat, deinde aqua cum aceto. Quæ cum non iuuarent, clystere iniecto, cum per os medicamentum sumere non posset, hoc gargarismo, cum gargarisasset, illico liberatus est: ℞. aquar. plant. equis. ana ʒj. stor. ros. rub. cortic. gran. ana p. ss. sem. cydon. ʒj. bulliam simul & colentur: col. adde dianuc. diamor. ana ʒij. mel. ros. col. ʒss. misce. At tonsillæ adhuc manebant inflatæ: sed hoc appposito cataplasmate detumuerunt, & reliquum, quod influxerat, discussum est: ℞. rad. alib. mund. ʒij. stor. ros. rub. melilot. chamemill. scabios. an. m. j. bulliant ad mollitudinem, piseniur, adde farina farin. lini an. ʒss. olei chamem. butyr. recentis, olei amygd. dulc. an. q. s. ad incorporandum cataplasma.

SCHOLIA.

IN inflammatione columellæ adhiberi possunt etiam cataplasmata resiccantia, quæ in angina præferuntur: sed abstinendum ab oleis & vnguents nimium relaxantibus quod in angina proprium est. Nam in hoc differt curatio columellæ inflammata ab angina, & in repellendo. Nam in angina adduntur aliqua dulcia ad detersionem: in inflammationibus columellæ vt possumus aceto, & aliis adstringentibus citra detersionem in principio: quia hæc affectio nequit tam subito suffocationem adferre: quod in angina potest, & ob tumorem & pituitam ibi repletam ab inflammatione. Et ideo statim præ-

cipio vtimur diamoro vel melle ad illius detersionem. Tonsillæ & antiades plerumque etiam inflammantur ob vicinitatem, si columella inflammatur, vt huic ægro euenit: ita & cataplasma vti sumus, imposito quoque flore ros. ad adstrictionem, & flores chamemillæ: nam possunt tam intus quam extra quædam alstringentia apponi, vt postea de tonsillis dicemus.

OBSERVATIO IV.

De columella inflammata & laxata, & de vna plurimum pendente.

VENIT aliquando, vt paulo antea diximus, vt circa inflammationem nimium humectus gurgulio laxior fiat, & propterea linguæ radici ac faucibus propensus incumbat, quemadmodum in destillationibus continuis contingit, Aëtio autem: quam affectionem Græci παραρροήν, Latini laxatam columellam, barbari casum vix appellant: eodem modo curatur, vt alia inflammatio præcedens, pro ratione confluentis succi, venæ sectione, purgatione, deinde collutionibus, gargarismis iam dictis, & collutionibus, & aridis medicamentis inspersis adstringentibus & exsiccantibus. Sic ego, cum sæpe cararhis obnoxius sim, hoc malo frequenter etiam affligi soleo: vt istis diebus etiam columella non solum laxata existente, sed parum inflammata sine febre, hoc solo gargarismo iuuamen sensi ℞. aquar. plant. ʒj. diamor. dianuc. ana ʒj. misce. plurimis commodè vsus sum: ℞. aquæ plant. ʒj. ʒss. gellas duas omphacitid. contrit. sem. cydon. ʒj. bulliant, colent, adde dianuc. ʒij. pro garg. Nuper cum & pyralismo post morbum longum affligeretur, vix mihi valde elongata fuit: repressi autem puluere gallæ, boli armen. aluminis vti iam partibus aequalibus. Ex leuissima causa hoc me lo affligi soleo: etiam in æstate, si auidius corrasa comederim, in gutturis inflammationem leuem, tum tonsillarum, ad vix elongationem incido. Ideo recte dicebat Mathæus de Gradis, quod cerasa multa comesta à proprietate anginam inducunt: vtrum etiam ob aciditatem tonsillis noceant considerandum. Illud idem malum valde proprium est, & fratri meo Iohanni Foresto iuniori: ideo si aliquam leuem fluxionem in gutture sentiam, statim ad præcautionem lacte bubulo dulci cocto commodè gargarizo: sæpe etiam in principio, cum adhuc leue malum sit, leui adstringente gargar. malum tollitur, alioqui si procedat, cum bolo armeno supprimo, vix lam eleuando, vel adiecto aluminis adusto, vel puluere aristolochiæ radicis, si nimis iussio; vel cum amaritudo offendit, cum pulu. cinnamomi: & egregie confert. Vidimus in ceruicario Adriano Aleuino (de quo egimus lib. i. Observation. 17.) qui columellam adeo elongatam habebat instar lori, vt longiorem & tenuiorem nunquam viderim: is tamen absque incisione per me curatus fuit.

SCHOLIA.

Columella autem dicitur, quando longior facta est, ad instar columnæ. Fit autem longior ob eius extensionem, vel, vt Præficus loquuntur, ob relaxationem. Relaxatur autem, quia multa frigiditate humida defluente à cerebro humectata est. Curatur, si pauca sit materia, & caput non

non admodum plenum recrementis, solo contactu piperis longi, quod quidem calfacit & exsiccatur, & leuiter restringit. Reductum in tenuissimum puluerem, apponitur supra gladium, aut spatulam, aut intra paruum cochlear, vel aliud instrumentum argenteum, quale nos aptum habemus, & tangitur eius extremitas: qua bis aut ter contacta, pituitam exspunt, & cito contrahitur, & breuior redditur. Vel vtere iis, de quibus diximus. Vide arida multa, quibus Apollonius & Gal. utebantur, ex galla omphacitide, aluminis scisso, ac sale ammoniaco, iisque tritis ac simul mistis expleto cochleari, aut staphyle parcto instrumento ligula simili, vix lam contingunt. Quod si plenitudo fuerit in capite, & multa pituita adhuc defluit, optimum est prius pilulis multus viscidus, & crassus humor sit, detergendus, incidendus, & iterum euacuandus est, & pars tangenda prædicto pipere, & gargarismo adstringente sicanda pars est, & adstringenda. Sufficit aliquando aqua cisternæ, dilutum acetum, vel vinum malorum granat. vel aquæ adstringentes. Si autem perseverauerit in ea magnitudine, etiam si sine inflammatione sit, summitas eius abscondenda est, vt breuior fiat. Nam si longior fuerit, quam pro sua natura, partem superiorem cephagi tangit, & nauseam parit. Illis, qui hac laborant affectione, semper videtur adesse bolus aliqui in illa parte superiore cephagi. Illis notis etiam sine inspectione, agnosci potest, an plus iusto elongata fuerit. Quamobrem vbi cunctis iam dictis auxiliis gurgulionis malum non cedat, si oblongior, tenuius præter naturam, quam si in rotunditatem creuerit, eius summo acino vix simili existente, ne continuo irriteretur tussis, vigiliam interim etiam stragulat subsecquatur (vt inquit Paul. lib. 6. c. 31.) is excidendus erit, modo, quo ipse præcipit præcautione loco, ac etiam cap. 41. lib. 8. Aëtius. Neque tamen festinandum erit ad eius excisionem (vt dicitur est prius) Hip. auctoritate lib. 3. Prog. & Gal. 14. meth. meden. iis obseruatis; quæ tum ipse, tum etiam cum eo Galenus in eodem loco præcipiunt.

OBSERVATIO V.

De columella inflammata & male tractata in gangrenam transiente, & purredinem, & de alia ad nigredinem conuersa, & tercia in vlcrationem conmutata.

NOstra ætate Paracelsus quidam, etiam in medicum reipublicæ acceptus, cum quidam inflammatione afficeretur, cum subitanea ad vix lam fluxio fieret, statim venis sub lingua apertis, cum potius prius cephalica aperienda esset, gargarisma, nescio quod calidum & exutens, præscripsit atque adhibuit: eadem nocte factus est gurgulio subalbidus & exanguis, quasi gangrenæ affectus & corruptus, tandem facile decidisset, atque ita vox ægrotantis periisset. Chirurgum cum vocasset, atque is animaduertit subitam factam fluxionem, & columellam valde rotundam, magnam vix lam excedentem, valde albam & translucidam, pus in se quasi continentem, me vocari iussit, vtrum absque incisione curari posset. Cumque ad ægrum venissem, etiam secundo chirurgus accito, vt ibidem fieret incisio, conchisum fuit: interim prius ægrum purgandum Pet. Forest. Tom. 2.

esse, consuluimus; Paracelsico ablegato, qui ægrum nullo modo purgauerat, & omnem materiam ad columnam suo gargarismo attraxerat: quare has pilulas prius dedimus: ℞. pilul. cochlear. aurear. ana ʒss. cum syr. de betonic. fiat pil. viij. quas cum deglutisset, sex sedes habuit, & vix sumus hoc gargarismo: ex Apollonij auctoritate, quæ priuatim, vbi subalbidus & exsanguior est gurgulio gargarisat ex origani triti in aqua & aceto decocto, ac caricarum cremore misto, aut eius loco hyssopo: ℞. origani, hyssopi ana m. iij. caric. ping. mm. vi. scabios. m. j. liq. ras. ʒss. fiat decoct. in aqua comm. pro ʒj. oxymel. simpl. ʒij. misce pro gargarismo, fuit ter quaterne reteratum. Deinde ne tota vix corrupta decideret, tempore vix incidendam esse, duximus, non plane abscondendam; quare chirurgus dextre columellam instrumento meo argenteo incumbentem, scalpello diuisit, cauendo, ne alias partes vicinas laderet; vnde pars illa corrupta diuisa decidebat, mucositate valde exigua exunte putrida. Et chirurgus cum paulatim illam separaret, ægrotans gargarismum supradictum continuabat, & post gargarisationem chirurgus vix lam incisam detergebat melle rosato cum penicillo, linimento induto ac melle immerso: ita vt hic mirabiliter curatus fuerit tempestiue, aliqui columella corrupta decidisset tota, vel magis vlcera ta plectrum vocis abstulisset. Quemadmodum & alteri, quæ ob inflammationem etiam perperam curatam, non solum rotunda euasit, sed etiam subnigra & liuida vix modo, ita vt scarificatione opus fuerit: & cum ex ea scarificatione melius non haberet, abscondenda erat, tum quia maior, tum quia corrupta. Ast in hoc ægro, cum statim chirurgus & me vocasset, facta est scarificatio & incisio, & perfecte fuit curatus. Alius vero cum hoc negligeret, columella suppurata ad vlcrationem deuenit. Vix fumus iis remediis, quæ ad oris vlcera valent, tum aphthas, cum vlcus malignum non esset, neque exedens, facilius curatum fuit.

SCHOLIA.

Diximus, quatuor aegritudines circa columellam fieri, & etiam circa vix lam: vel apostemate affligitur, teste Arculan. (id alij inflammationem vocant:) vel elongatur aut laxatur: vel vlcatur, siue in putredinem aut corrosionem conuertitur. Rondelet. vt paulo antea diximus, addebat & hic quintum affectum vix tabem seu atrophiam, quomodo a. inflammata curetur, etiam laxata propendens, iam diximus. In putredinem conuersa, liuida vel nigra facta, si resiliuit scarificatione non posset nec medicamentis aptis, abscondenda; sed cum cautione, vt Paulus & Aëtius docent, ne vox pereat. Si vlcatur, vt Hollerius quoque docuit, ad curationem vlcum recurrentum, vt purgemus, incarnemus, cicatricem ducamus. Sed in materia, quæ hæc efficiat, esculenta, aut quæ nihil habeant virulentum eligenda; quanquam aliquando vbi ea vlcera serpunt & putrida sunt, calcantho & similibus metallicis vt licet. Sed ne deuorentur prouidendum, atque ea materia ex 2. lib. Hollerij de materia chirurgica repetenda. Fiunt quoque frequentissime vlcera circa illam partem; & potissimum à morbo Gallico, quæ vt aphthæ curanda sunt, hoc est, resse Rondeletio, aquis illis adstringentibus & leuiter ardentibus, ne serpant: vt aqua illa forti bene diluta, de qua dictum est prius, vel aqua, in qua decoctum est sublimatum. Deinde vniuersalem

morbi Gallici curationem adhibere oportet, si post hæc non coalescant. *Quod & exemplum sequens ostendit.*

OBSERVATIO VI.

De vula non solum exulcerata, sed fere corrosa, ex lue Gallica: & de alio, cui columna integra absumpta ex eadem lue erat.

Generosus quidam adolescens, consilij causa ad me descebat, & intus de gutturi dolore conquerebatur. Ore aperto, & speculo immisso vulam exulceratione fatida & serpente aliqua ex parte corrosam & absumptam vidimus; cui & dolor in scapulis maxime noctu aderat, ut referebat, & circa iuncturas: quæ symptomata non leuem suspicionem de morbo Gallico præbebant, illo tamen negante. Interea ut decocto guaiaci vteretur consului. Sed cum huic consilio auscultare nollet, ac temporaneum consilium peteret: pilulas indas & de fumoterra præscripsi, & ut hoc linimento leuiter cum baculo particula panni linei, vel spongiæ alligata vlcera contineretur: *℞. ung. Aegypt. 3 ℔. aluminis vili 3 ℔. melis ros. colat. 3 ℔. misc.* cautione adhibita, ne deglutiret, & ut hoc gargarismo ex decocto balusti. flor. ros. cortic. granat. in aqua solatri, plantag. caprifolij, paucis adiecto mel. ros. gargarizaret. Quibus postea, ut mihi retulit, bene se habuit. At vir ille Delphius, qui pannos obsoles in foro vendebat, ad nos venit, cum de gutturi dolore interno affligebatur, cui neque vox, neque sermo concinnus erat: inspecto autem ore eoque aperto, columellam iam vlcere Gallico absumptam inuenimus. Atque ideo minus admirati sumus de voce ablata, neque de perpetua tussi, qua afficiebatur tabefactus.

SCHOLIA.

Caro illa pendula, quam columellam vocamus, in secundo ægro corrosa ex lue Gallica decidit: quam quidem instituit natura, ut voci confirmandæ adesset, quasi plectrum quoddam (*ut antea dictum est*) seu modulatio: aut quod vox in eam impingens reuerberata sonora magis reddatur. Hinc ea ablata (*teste Galeno*) noxæ in voce fiant, ut obscurior reddatur & minus sonora. Quare & hic vir (*ut ceteri omnes morbo Gallico infecti, eiusmodi vlcibus columellæ, gutturi aut palati laborantes*) per nasum loquebatur: nam talem primum vsum Gal. columellæ tribuit: & alteram, ut æris frigidi impressionem validam tollat, ne scilicet confertim in pulmonem tendat: quod & huic viro euenit, ea ipsa per Gallicam lue prius corrosa, deinde putrefacta & ablata, forte quia temporis sibi ipsi non prospexerat de optimo medico, cum eiusmodi vlcerata ex lue Gallica infinitis tum mulieribus tum viris oborta commode curauerimus. Verum huic, ut reliquis eiusmodi euenire solet, tussis & reliqua vitia iam dicta, quæ ex occurso frigidi vehementi obtinunt, etiam oborta sunt. Qui equidem eo tempore, cum ad me veniret, & antea commoda præsidia, & propriæ morbo Gallico dicata contemneret & postponeret, tabe postea, (*ut mihi relatum est*) consumptus perit. Ceterum præter vitia omnia columellæ dicta, aliud adhuc à Rondel. recenseri diximus, nempe quod hæc pars contabescit, & veluti lorum efficitur aliquando: quæ affectio à nimia siccitate vel atrophia illius par-

tis fit, quam & Rondel. incurabilem dicit. Mini tamen me sæpius vidisse in febribus acutis non solum columellam calore exsiccata & corrugata, verum & fauces ipsas, ut ægros loquentes non intelligeremus, quos humectantibus & refrigerantibus collutionibus hordei, eiusque cremore, aquæ viol. lactuc. & similib. adiecto, viol. curauimus, tum eos, qui gutturi asperitatem inflammationemque perferrent. Verum cum nunc columæ vitia absoluerimus, ad tonsillas progrediamur, paristhnia & antiades, quæ plerumque ob vicinitatem vna cum columna affecta ægros fatigant.

OBSERVATIO VII.

De glandularum iuxta linguam inflammatione.

Omibus hominibus caruncula quædam exiguæ naturæ ex aduerso in oris termino vtrinque iacent, Galeno teste 3. de causis symp. Has Græci *αἰνιδες* (*ut refert Aëtius*) Latini *glandulas*: barbaram sectantes medicinam *amygdalas* appellant: quamuis non partes ipsas, verum cum ipsa de fluxu, præsertim ex capite, tumore aut inflammatione afficiantur, *αἰνιδες* præcitato loco nuncupauit. Paulus autem per *αἰνιδες* tum lib. 6. cap. 30. cum lib. 3. cap. 26. scirrhosum tumorem paristhiorum intelligit. Si vero in contiguas partes fluxio decumbat, seu inflammatio excitetur, *αἰνιδες* tum præcitato loco, tum comm. aph. 26. lib. 3. idem Galen. appellauit, dum asseruit *αἰνιδες* (*que Latini tonsillas vertunt*) inflammationem esse locorum ad isthmum attinentium: intelligit autem per isthmum partem illam, quæ os & gulam interiacet. Nominatur autem ita per metaphoram quandam ab his, qui propriæ dicuntur isthmi, qui angustii quidam terræ transitus sunt, siti inter duo maria. Hæ autem inflammationes nonnunquam solius tunice sunt, ventri, gulæ, faucibus, totique ori communes: nonnunquam vero (*ut idem inquit Galen. præcitato loco*) & subiectorum ipsi musculorum: quamuis has partes & non eorum inflammationem, tum Paulus lib. 3. cap. 26. tum Aëtius lib. 8. cap. 45. *αἰνιδες* vocant, & Latini *tonsillas* vertunt, Celsum forte putantes imitari, qui lib. 6. c. 10. postquam de dentium dolore caput exegisset, de tonsillis ac earum cura pertractat: At nunquid per tonsillas, id quod Græci *αἰνιδες* dicunt, partes quasdam intelligentes, subindire velit, aut quas *αἰνιδες* nuncupant, siue vtrasque, ex eiusdem Celsi verbis haudquaquam percipi poterit, cum dixit: Si vero *tonsilla sine exulceratione per inflammationem intumuerunt* &c. Donatus vero cum Galeno, quicquid alij sentiant, per *αἰνιδες*, glandularum, quæ ex aduerso in oris termino vtrinque iacent, præter naturam tumorem seu inflammationem intelligi vult: per *αἰνιδες* vero, cum contigua his partes tale quippiam perperiantur. Cui sententiæ etiam accedimus, quamquam vtriusque affectus eadem ratio sit & sub vno capite auctores de iisdem tractent, præcipue Donatus, ex mente Galeni, & Aëtij, ac Pauli, sua præsidia sumens. Ita & Rondel. de vtriusque malis agit: quam licet distinguat, ut Galenus, tamen eandem curationem vtriusque conferre scribit. Sic Regnerus custos portæ Alcmariæ, in qua vincti detinebantur, cum leui inflammatione glandularum seu amygdalarum (*ut vocant*) afficeretur, neque febricitaret, vnicui hoc gargarismo ab ea liberatus est:

deueniebant: sæpius ter quaterue in anno à me curatus per resolutionem: aliquando vero per suppurationem. Pueri quoque & infantes teneram habentes misturam etiam hac affectione capiuntur: id quod Hip. præsertim in pueris confirmavit aph. 26. li. 3. Interea glandulæ aliquando sine inflammatione intumescunt, ut postea exemplo docebitur.

OBSERVATIO VIII.

De tonsillis inflammatis & induratis.

Adriani Arnoldi prætoris Alcmariæ filia, 18. agens annum, cui menses nunquam fluxerant, in tonsillas inflammatas induratasque incidit, quod sæpe virginibus accidere scribit Aëtius lib. 8. cap. 46. quibus maxime & tonsillæ aliquando vlcerantur, ut postea alio exemplo docebitur. Verum huic tonsillæ ad suppurationem, neque ad vlcerationem deueniunt. Verum cum huic pene suffocatio impenderet, ac guttur præ nimio tumore præoccluderetur, post octo dies, cum hoc malo derineretur, & vlque in 8. diem vsa fuisset gargarismo valde repellentibus & infundantibus, ex aqua nucum, plantaginis, consilio tonforis, neque sanguinis missione, neque purgationis præcedentibus, adeo malum increuit, ut & tonsillæ inflatæ, & supra modum duræ existentes, tum rubicundæ gulam præoccluderent: cumque suffocatio impenderet, nocte me vocarunt. Ego autem, sanguinem esse mittendum (*cum intellexissem, mensuram huic iuuentulæ nunquam fluxisse*) ex talo, proposui. Interea ut & hoc gargarismo etiam vteretur, quod tonsillas nimium ex præcedentibus gargarismis induratas & partim emolliret, resolveret, & inflammationem minueret. Tale autem erat: *℞. rad. alib. mund. rad. lilior. alb. ana 3 ℔. folior. viol. mal. ana m. j. scabios. bellidis minoris ana m. b. ros. rub. p. j. auricul. sam. buci 3 ij. bordei mundat. p. j. sicum ping. num. ii. j. sem. mal. sanogr. ana 3 j. medietatem vidi birundinis optime incisi: fiat omnium decoctio in aqua communis, & in sine addendo sem. cydon. sem. lini ana 3 ℔. & in sine etiam addendo aqua scabiosa, caprifolij ana 3 j. & tota decoctio fiat pro 1 ℔. colatur. addendo mellis ros. colati (cum enim diu durauerat malum, mel. ros. adiecimus, quamquam illud neque mel in principio conueniat) 3 ij. diamori 3 j. Cum autem per totam noctem gargarisasset, mane cum redirem, durities mollior euaserat, ac melius spirare poterat, licet nondum quid deglutiret, nisi valde liquida cum maxima difficultate. Tunc etiam venam in talo, nempe saphenam incidere iussimus, sanguine ad viciat quatuor aut plures effluente: idque ad diuersionem & euacuationem. Sed cum malum non sedaretur, licet phlegmata melius per gargarisma supradictum, quam prius exirent, licet molliciantibus & resoluentibus opus esset, ne ex iis inflammatio augetur, subinde quoque gargarisabat cum lacte tepido: cum ex acrioribus gargarismis inflammatio exasperetur, & mordacitas deinde accidat: ideo ex Aëtij decreto leuioribus gargarismis colluendi sunt: qualis est succus prisanæ tepidus, aut lac etiam tepidum. Post meridiem vero, cum eodem in statu virginem intenissem, ad euacuandam materiam coniunctam, mandauit quoque, ut venæ sub lingua mitteretur: de quibus nigerimus sanguis & corruptus fluxit: verum tam copiose, ut venæ neque aceto cum aqua in ore retento occludi posset, neque ex panno lineo cōbustio sub venis retentis*

*℞. aqua plantag. 1 ℔. 6. flor. ros. rub. p. j. sem. cydon. 3 j. bulliant vnicui ebull. deinde colent. addendo diamori 3 ij. dianuum 3 ℔. misc. & fiat gargarisma. Ast alteri iuuenti, cui & tonsillæ, seu paristhnia simul valde inflammata erant, cibum subtraximus, modicosque & forbiles ventri commodos obtulimus, & aquam hordei pro potu dedimus, cum febricitaret: & cum periculum suffocationis metueremus, priusquam adstringentia medicamenta adhiberemus, cum plurimo sanguine abundaret, venam mediam secare fecimus, prius clystere emolliente iniectione: & altero die etiam vena externa sanguinem detrahare iussimus, in minori tamen copia, quam in primo die talem sanguinis repetitionem in valde repletis & iuuenibus, Aëtius commendat. Statim etiam à sanguinis detractione gargarismo reprimente vsi sumus, ex decocto ros. nucum cupress. plantag. equis. succo mali puni. adiecto, & dianuum. Sic me ipsum quoque in principio, cum non febricitarem, hoc gargarismo curavi: *℞. plant. m. j. flor. ros. rub. p. j. cortic. 3 ij. galli. omphacitidis partem contusas rum. ii. j. bellidis minoris m. j. nucum cupress. 3 ij. coquantur in aqua communis pro 1 ℔. colat. addendo dianuum 3 ij. misc. pro gargarismo. At iuuenem post venæ sectionem etiam purgauimus hoc modo: *℞. syr. ex insus. ros. palli. 3 j. diacubol. 3 vj. aqua cicchor. betonic. ana 3 ℔. misc.* postea gargarismo supradicto, ne inflammatio ex acrioribus & reprimentibus collutionib. exasperaretur, adiecimus malum, viol. & rad. alib. etiam sicis & glycyrr. & rhus pass. Deinde & lacte tepido subinde gargarisabat. Quibus & hic ab inflammatione sine suppuratione conualuit.**

SCHOLIA.

Apartibus autem ipsis affectis, & *αἰνιδες* id fuisseperunt, teste Aëtio, cum & glandularum tumores maiores aliquando apparent, citra quidem inflammationem, ut postea etiam alio exemplo ostendimus. Et nunc substantia earundem colore feruant: ubi vero inflammata fuerint, rubicundæ apparent, ac dolorem inferunt. Si vero partes eis proximæ inflammantur, accidit ita affectus difficultas transglutendi, dolor aliquando etiam, & febris, ut iuueni supradicto eueniebat. Id quoque testatur Aëtius: velut etiam glandulis ipsis inflammationis, nedum transglutitionis, verum etiam & spirationis difficultas aderit: ex quibusmet capi poterit. Quæ quisnam morbus sit, non semel dixit in præcedentibus diximus, nec opus erit, eiusdem inflammationis causas iterum repetere, cum similes esse possint, cum his, quæ gurgulionis inflammationem efficiunt. Priuatim autem (*ut refert Aëtius*) *αἰνιδες* in infantibus & adhuc lactantibus, ex haustu lactis: pueris propterea, quod multum cibo se expleant: reliquis autem hominibus plerumque eueniunt à nimia meri porione, & à multa, ac audiore deuoratione ciborum maxime acrim & asperorum. Frequentissime (*codem Aëtio teste*) *αἰνιδες*, quæ tonsillas vocant, cum partes sint calidæ & humide, inflammationem incurrunt, quæ etiam affectione magis arripitur hi, qui plurimo sanguine abundant. Sic iuuenis 27. annor. nomine Matthæus Iohannes, qui in insigni Corui habitabat Delphis, aliquando ter in anno, iuuenis plurimi sanguinis hoc malo detinebatur: cui aliquando tonsillæ vel etiam amygdalæ non solum inflammatione corripiebantur, imo aliquando ad suppurationem

quo praesidio sapē sanguinem affluentem inhibuimus: tandem panno lineo triplicato & aceto ros. inculcato sub lingua detento sanguis commode restrictus est. Et harum venarum incisione haud exiguum iuuamen consequuta est: tonsillis etiam subsidentibus, inflammatione maxima ex parte quoque sedata: quamvis sub noctem tonsillae (ut plerumque fieri solet, quod eo tempore ex fluxione magis infestentur) rursus nonnihil intumuerunt, alio etiam tunc per glandem irritata. Mane autem sequenti bis in die ex apozemat. subsequente fumebat, cum iam melius potionem sumere posset, quae simul ad vteri purgationem faceret, & materiam tam per aluum, quam vrinam simul diuerteret & expurgaret: ℞. cortic. rad. fenic. petros. glycyrrh. rase ana ℥ ss. meliss. artemis. scabios. scopulend. malu. ana m. j. betonic. hyssop. fumaria ana m. ss. flor. cord. p. i. sem. anisi ℥ ij. mellea ℥ i ss. vuar. pass. ab arill. repurg. p. i. ficum ping. num. iij. folior. fenae & stipitib. repurg. ℥ j. fiat omnium decoctio in sero lactis ad ℥ j. Zaccb. pro sepe condatur. Deinde calore iam diminuto, gargarismo magis emolliente & resolvente vsi sumus: ℞. rad. malu. ℥ j. lilior. albor. num. v. folior. malu. scabios. pariet. ana m. j. ficum ping. nu. v. vuar. pass. ab arill. mund. p. j. coquantur in aqua communi pro ℥ i ss. colatur & adde mell. ros. col. ℥ ij. diamori ℥ j. misce: guttur exterius inunximus oleo amygd. dulc. lilior. simul mixtis. Quibus optime habuit, ut illam amplius non inuiferem. Post 5. tamen dies optime valens, in animi deliquium incidit, credo ex vteri suffocatione: ideo frictionibus vinculisque iniectionis cruribus & coxis, ad se rediit. Deinde pedibus quoque lotis cum decoct. flor. chamomill. meliloti, artemisiae, majoranae, verbenae, maricariae, bene deinde se habuit, ita ut tabellis denotatis ex zedori, agni casti sem. cinnamon. & speciebus aromat. ros. sine mosco, & di. rad. abb. sana enaserit, & Hagham Comitibus accesserit. Verum diutius ibi manens, reuersa rursus in gutture conuulsa est, ore aperto & inspecto, cum levis inflammatio ex catarrho falso in tonsillis apparet, modo lacte tepido, modo hoc gargarismo vtens, & alio leniente medicamento inanita, & cucurbitulis scapulis cum scarificatione affixis, intra tres dies denuo sanitati restituta est. Talis erat gargarismus: ℞. plant. vtriusque, portulac. flor. ros. rub. bellid. min. viol. ana m. j. hord. co mm. p. j. gall. an vnam contrit. sem. cotom. ℥ j. bulliant in aqua comm. ad ℥ i ss. dianuc. ℥ iij. fiat gargarismus.

SCHOLIA.

6 **A** Etius ex auctoritate Archigenis, Multae, inquit, virgines circa vigoris aetatem menses purgationem appetentes, hac affectione apprehenduntur, (nempe, quod tonsillae frequenter infestentur, & in malignas tonsillarum ulcerationes dilabuntur:) quae praecipue venae sectione opus habent. Incidenda autem sunt in eis tali venae, & vnicuique sanguinis detractioe facta euacuanda, non autem vsque ad animi defectionem: quanquam haec in vlcerebus tonsillarum, quae virginibus eueniunt, commendantur. Eadem quoque venae sectione commoda est in virginibus, si inflammationes ac tumores tonsillis obueniant, & eandem causam habeant, ex qua tonsillae vlcercuntur: quemadmodum domicellae nobili iuenculae in Campo regio euenit, cui menses quoque nunquam fluxerant: etiam & haec inflammatione tonsillarum correpta fuit: verum cum neque haec huic malo tempore consuleret, & nunc quasi

suffocatio immineret, atque tonsillas inspersas valde tumidas & subrubei coloris esse animaduerti, quod ad suppurationem tenderent. Si inflammatio ab initio reprimentibus, deinde & reprimentibus & discutientibus, postea in declinatione magis discutientibus & resoluentibus non curetur, permanente ac immorante inflammatione, diutius & tonsillae ipsae subrubei coloris fuerint, ut in hac domicella virgine religiosa spectabantur, permutationem in pus expectare oportet: cito enim tonsillae abscedunt, non solum in talibus, verum in aliis quam plurimis, ut quotidiana experientia in praxi observauimus: quod & Aer. quoque testatur. Idque facile cognoscimus ex quibusdam signis, quae & Aëtius ex Philumeno medico antiquissimo sumpsit: quae etiam in inflammationis signa augescunt, & exacerbationes ad asperam fiunt fortiores, cum horrore & inaequalitate, aliquando etiam cum febre: quare hoc tempore coadiuuare oportet, ut quam citissime suppuration fiat. Ideo in hac domicella ex gargarisato decocti ficum pinguium, vuar. pass. enucle. viol. & malu. & cataplasmate matorante exterius adhibito, abscessus ruptus est: eoque obsterio cum hydromelite, deinde adiecto decocto ex ros. rubeis & plant. vlcus consolidatum est, & breui admodum conuuluit. Ad citissimam suppurationem Aëtius calidiores gargarismos, velut ex aqua multa calida, adhibet, & decoctum caricarum ac hyssop. cum radice dulci. Extrinsecus vero cataplasma imponatur, ex eiusdem Aëtij sententia, ex hord. farina. & fenugr. cum decocto caricarum, & althaeae, ac melle, aut vapor aquae calidae intrinsecus: sed aliquando diutius admoventur, donec ea suppurentur, & perse aperiantur, ut Celso visum est. Confecto autem pure dolore immittuntur, & inflammationis tumor mollior redditus, digito cedit. Quare tunc (ut Aëtius quoque praecipit) aciores collutiones exhibenda sunt, ut abscessus rumpantur: cuius generis sunt, pulegium, hyssop. thymum, calaminth. thymbra in sapa, aut aqua multa decocta & gargarizata. Si vero pure substante non rumpuntur, hi tumores ex Celso decreto incidendi sunt. (Nos aliquando per chirurgum commode scalpello aperiri fecimus, ubi tumor suffocationis imminet) deinde ex multo calido ad gargarisandum per se: postea etiam admixto leuicula vel rosarum decocto: atque id faciendum, donec in totum soluantur, ac penitus ad cicatricem perducantur, ex Aëtij & Pauli mente. Modico autem tumore existente, ac exulceratione, furfurum cremori ad gargarisandum paulum mellis adiciendum est, & ubi plurima vlcera sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarisandum est, Celso decreto. Modus autem sectionis, si non per se aperiantur, ac situationis aegri, tum ante, tum post diffusionem, ac parato opere, quae conducant auxilia: ab Aëtio (quae & a Leonida medico antiquissimo accepit) cap. 45. & cap. 48. lib. 8. & a Paulo cap. 30. lib. 6. describuntur: quem locum vnusquisque legere poterit. Refert Dodonaeus cap. 26. de inflammatione vtriusque tonsillae in filiola quaedam dnerum amorum: in qua idonea remedia propter aetatem non admittentur, natura viam sibi ad salutem quaerens, motum ad exteriora conuertit. Nati sunt itaque vtriusque in collo infra aures singuli tumores: quibus scalpello apertis, pus effluxit: itaque ab abscessu tonsillarum liberata, sanitati restituta est. Facit huc aph. 37. sect. 6. Ab angina habito, si tumor fiat in collo, bonum. Tonsillarum si quidem

liquidem inflammatio anginae quaedam etiam est species, quamuis non vera angina.

OBSERVATIO IX.

De vtriusque glandulis, quas Graeci *coindades* vocant, longo tempore induratis.

Vidimus filium Francisci Duiistij viri consularis, cum annum 13. ageret, quod per innotu induratas adeoque tumidas haberet, ut loquelam impediret, & per nasum loqueretur, erantque vix inflammatae: imo citra inflammationem valde durae & inflatae. Ad hunc accitus: cum tatarico quoque ex fluxione pituitae etiam laborare videretur, hoc leniens medicamentum & nonnihil purgans praescripsi: ℞. syr. ex infus. ros. pallidarum cum solis sen. (in vnaquaque vicia ℥ i. senae infundebantur, dum infusio parabatur ℥ i ss. diaphorici ℥ i ss. aquae betonicae salvia ana ℥ j. misce, ac ea portio aluum quinquies deposuit: mox & hoc gargarismo vtatur: ℞. foliorum viol. scabiosae, hord. mund. ana m. j. flor. ros. rub. p. j. sem. rylor. ℥ i ss. r. ad. althaeae ℥ ij. fiat decoct. in aqua communi pro ℥ i ss. colatur & adde mell. ros. colat. diamori ana ℥ j. syr. gran. ℥ ss. misce pro gargarismo. Inflammatio, quae levis erat, facile sedabatur: sed duritie atque tumore aequae permanente, ut magis emolliret, postea garr. adieci mus ficus nu. v. & exterius inunximus ole. amygd. dul. chamemill. lilior. lana succida admota. Cum glandulae aequae durae permanent, exterius apposimus emplastrum de mucicil. Et ne fieret maior fluxio, apozema sequens praescripsimus: ℞. corticum rad. cicchor. demis leonis, fenicul. ana ℥ ss. rad. althaeae mund. ℥ iij. flor. cord. p. j. capill. Ven. polytr. scabios. betonica ana m. j. sem. anisi ℥ iij. sem. malu. ℥ j. foliorum fenae ℥ j. polyd. querc. ℥ vj. sem. caribani contrit. ℥ ss. vuar. pass. enucleat. ℥ j. ficum ping. num. iij. iunibar. sebesten. recent. ana num. v. prun. damasc. num. xij. fiat decoctio in aqua communi pro ℥ i ss. colat. adde syr. ex infus. ros. pallid. ℥ iij. misce pro iij. dosibus matutinis. Sperabam autem, quod mollescerent, & ad maturationem tenderent: sed postea parum subsidebant, tanquam resoluerentur, licet aequae durae permanent. Gargar. vltimo praescriptum reiteratum est: & hoc cataplasma appositum: ℞. rad. althaeae mund. ℥ ij. rad. liliorum alborum num. v. ficum ping. num. vij. meliloti p. j. coquantur in aqua communi ad mollitudinem, pistentur, adde farinam sem. lini ℥ j. olei amygd. dulc. butyri recentis ana q. s. fiat cataplasma molle. Non peruenit ad suppurationem: videbatur potius minui atque resolui. Quamquam duriores manebant: ideo cataplasmate adhuc appposito, minorabantur quidem & minus durae erant, ut nouo melius deglutire posset: tamen ad perfectam molliem & subsidentiam non peruenierunt: quare ab vltiore curatione etiam mater tunc abstinuit, puerumque rursus ad scholam dimisit.

SCHOLIA.

Antiades licet sint inflammationes glandularum, quae sunt post linguam in eius radice: tamen citra inflammationem aliquando inflantur: ut huic puero euenit, & defluxione pituitae intumescunt, ita ut cibi transglutinationem impediunt. Rustici in Gallia (ut refert Rondeletius) vocant *siuoux*: quia curant longa frictione facta in carpo, existimantes tumores quosdam facios,

& apertos frictione illa dura in carpo praedictum affectum tollere: prodest autem, inquit ille, re vera ob diuersionem. Nos curamus, ut idem refert, vacuando pituitam, & humiditates capitis. Sunt enim posita non longe à foraminibus, quibus pituita mota palatum expurgatur. Post euacuationem illam vniuersalem faciam pilulis pituitam educentibus, deriuatio per vtriusque multum confert. Si non sit copiosa materia, etiam lenia masticatoria putat conferre ex *zinzib. cubebis cum sicibus*. Interea conferunt gargari. leuiter adstringentia & aliquantulum detergentia, ut de angina dicitur. Inunctiones in principio in parte externa ex resiccantibus: in declinatione, cum consistit defluxio, digerentia cum aliquibus emollientibus, cum glandulae istae facile indurentur & in scirrhum degenerent, quod in puero isto metuebam, qui morbus nunquam aut raro curatur in his. Sunt autem illa medicamenta apponenda in lateribus arteriae, sub maxilla inferiore. Et quia hoc videtur pugnare cum consuetudine, Rondeletius rationem subiungit ex Diosc. loco, qui ait nucibus cupressi strumas curari posse. Haec videntur pugnare cum praedictis, qui omnes vtuntur astringentibus in parte interna, & relaxantibus in externa. Sed quia partes laxae sunt cum defluit materia, non sunt laxandae: sed cum consistit defluxio, ut materia ad extra trahatur. Quare in omnibus illis affectibus esset vtilissimum in principio, si medicus vocaretur, aut illas futuras defluxiones praecognosceret, medicamenta vtrumque resiccantia, cum leni quadam astringentia intus & extra ponere. Quod in me ipso (inquit Rondeletius) experiri sum, & anginam & defluxiones ad faucibus prohibui, & multos à scrophulis incipientibus vindicavi, nucibus illis cupressi supra partem apposis. Potest fieri tale cataplasma: ℞. nidi hirund. ℥ iij. pulu. nucum cupressi ℥ j. olei ros. ℥ i ss. excipiantur oxymelite, fiat ad formam cataplasmatum: & applicetur in lateribus colli. Hoc medicamentum leuiter astringit partes laxas, pituitamque illam tenuem iam defluxam exsiccat. Si induratae fuerint glandulae illae internae, curandae sunt ut scrophulae: nam scrophulae adhaerent sunt induratae.

OBSERVATIO X.

De vlcerebus malignis tonsillarum.

Petri Gualtheri cereuissatij Delfensis vxor, Sophia nomine, mulier Dordracena, anno 1558. cum per multos annos vlcera tonsillarum serpentia habuisset ex acris & salsa fluxione, & cum nullis remediis curari posset; tandem cum frequenter vlcera linimento attingerentur quod ex cinere centaurii minoris constaret & stercore canino puluerisato & melle ad crassamentum ut melius adhereret, magno cum nostro honore per me curata fuit ab vlcerebus serpentibus.

SCHOLIA.

EO tempore in mentem mihi venit historia Galeni de stercore canino, quae ita habet. Lib. 10. *Disseram* (inquit) *nunc de stercore canino, quo vti assidue consuevit praecipuum nostrorum quidam, sola ossa de stercore canini edenda exhibens duobus continuo diebus: ex quibus caninum candidum ac minime foetens stercore proveniebat.* Hoc igitur acceptum desiccabat, ut cum postea vsus postulare, facile ad laeuorem posset redigi. Vtebatur eo ad anginam, dysenteriam, & summe inueterata vlcera: ad anginam quidem iis admiscens,

miscens, quæ alioqui huic affecto congruebant: ad dyscæria lacti illi immiscens, cui decocto calculus vocatos *καλκίνας* ignitos iniici ante posuimus; aut, ut ego postea ob parabilitatem, ad ferum confugi, id candens lacti probe iniiciens. Cæterum medicus ille stercus caninum lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam iniiciebat: & id solum generosissimos quosque discipulos docebat. In his ergo duobus multum expertus sum stercus caninum seu medicamentum mirabile, sicut & in vlcibus extreme malignis. De stercore autem humano valente ad gutturis phlegmonem, in qua timetur gutturis suffocatio, vide eundem loco præcitato. Sic nobilem quandam & generosum virum habuimus, qui cum diuturna inflammatione gutturis laborasset, neque vllis remediis à medicis etiam doctissimis curari posset, celsigma confecimus ex stercore canino (*pharmacopœi nostri Album Græcum appellant*) saccharo penidio & syrupo viol. & diamoro, pulvere ieros ad 3 β. iniecto, ad stercoreis odorem refrigendum: quo quidem remedio cum vltus esset, conualuit. Cæterum post abscissum tonsillarum aliquando sequitur vltus fordidum modo malignum, quo & graueolens fit expiratio in tonsillis: modo oritur citra phlegmonem ex humore salso & acri, qui molles, humidus, calidusque tonsillas prorsus exedit: nonnunquam ex contagionis labe incipienti sui veneræ familiare est: ut nos quam sapissime obseruauimus, & innumeros sæpe curauimus, ut de morbo Gallico dicemus. Iam quoque in prædictis partibus crustosa, pestilentia ac serpentia vlcera oboriuntur, siue ex præcedente influxu, siue ex quauis alia causa, nulla fluxione præcedente, modo à consuetis inflammationibus suppuratis & maxime efferatis perficiuntur. Frequentissime quoque in pueris; aphthis præcedentibus etiam in ætate iam perfectis & his qui vltis humoribus abundant: qualia quoque illa sunt vlcera quæ vere contingere solent pestilentibus constitutionibus. Succedit ægris difficultas transglutendi, & suffocatio coaceruatim incidit; maxime cum rubor subeat mentum; aut ubi hæc acrimonia præterierit, nome quæ depascitur, locos excipit, succeditque vna putrefactio. Virginibus quoque (*ut diximus*) circa vigoris ætatem mensium purgationem appetentibus euenit. Curantur totius corporis curatione præmissa ac reliquis diuersionibus. Paulus adhibet diamorū rosas inspersis, vel thus siccum vel decoctum vel siccum mali punici cum cortice tusum & expressum. Reliqua vide apud Aetium. Summatim tonsillarum & columellæ vlcera eodem modo curantur, quo & aphtæ: in quibus & hoc obseruandum, quod cum omnia vlcera interna oris serpentia sint, idque ob partis mollietatem & laxitatem (*quod non accidit partibus externis*) vehementibus exsiccantibus & adstringentibus gaudent, quam externa vlcera; tum ne amplius serpent, tum quia semper à salina (*ut dictum est*) sunt humidiora, vnde & medicamentorum vis restringitur. Interea conandum in vniuersum ne digitum quidem locis admoveamus, aut leui saltem tactu manum admoſiamur, sic magis irritantur si & crusta amoueatur; sed pinnula illinenda stomaticis dictis; quorum copiam apud Aetium, Paulum, Galenum inuenies. Crustas egregie tollit (*Aetio teste*) caninum recrementum melle illinitum, & vltarum hirundinum cinis, & centaureæ minoris vltis cinis: quibus nostram mulierem à serpentibus & crustosis vlcibus curauimus: fel crocodili tri-

tum inspersum vel cum melle illinitum; etiam lac gargarisatum, ne longius serpat. Crustis solutis anthera remedia seu florida adhibenda. De his vide Aetium & Benedictum Veronensem, qui & refert excrementorum hominis cinerem mederi tonsillis; Pantherarum exemplo, quæ cum aconito deuorato strangulantur, excrementis humanis liberari traduntur. Hirundinū cinis cum melle egregie valet, & emplastrum ex nidis hirundinum, quo nos sapissime felicissimeque vti sumus.

OBSERVATIO XI.

De puella núbili sæpe inflammatione tonsillarum, columellæ ac earundem vlcatione correpta, quæ & anginam periculosissimam incurrebat.

Puella núbilis annos viginti tres nata, cui mentis euauctiones nunquam apparuerant, frequentissime inflammatione tonsillarum & columellæ ac earundem vlcationem incurrebat. Tandem vero & anginam passa adeo vehementem, ut suffocari videretur. Ad quam vocati anno 1561, mense Augusto, columellam non solum quoque inflammata, verum etiam vlcera ratam inuenimus, ut de eadem præcedenda cum chirurgo consilium iniretur. Tonsillæ adeo cum vlcatione excreuerant, ut de subitanea suffocatione metus esset. Puella (*ut fieri solet*) consilium medicaliæ sequuta, gargarismo ex saluæ decocto cum lacte ad quatuor dies adhibito. Cum eandem suffocationi vicinam inueniremus, spiritui acri trahentem, de vena malleoli incidentem delibauimus, ut mensēs simul euocarentur: sed quia iam quartus dies esset, & ex angina suffocatio immineret, à loco magis proximo, nempe cephalicam venam in brachio incidere iussimus, cum aluum ex acuta glande prius deposuisset, sanguine ad vncias quinque extracto, idque sub multam noctem. Mane in diluculo redeuntes, cum paulo melius spirare posset, vtrasque tamen venas sub lingua aperire iussimus: adhibitis quoque gargarismis moderate repellentibus & quibus vis quoque discutiendi inerat, cum in principio vocati non essemus, ex ros. malua, sem. cydonior, ficus postea adiacientes. sed quia ex fibubus columella laxior fieret, à fibubus abstinuimus, vna relaxata bolo arm. eleuata. Sed quia columella postea videbatur vlcera, lacte cui ros. & folia plantag. incocta erant, gargarisato; chirurgus rhodomelite cum stercore canino tonsillas vlcernas penicillo attingebat panno lino circumuoluto. Extrinsecus cataplasma appositum fuit ex hordei farina, & scenugræci polline, foliisque malua & chamæmillæ prius coctis & adiunctis. Cæterum cum his remediis adhuc parum proficeremus, febrisque incretceret, aluo tamē per se satis fluxa, & ipsa ægra intra septem dies parum edulij fumente, cum tamen vires adhuc satis valerent, saphenam incidere iussimus, vique ad vncias fere sex. qua sectione non solum à febre liberata est, sed & vlcera tonsillarum solo gargarismo & lacte cum melle adiuncto, rectè curata sunt.

SCHOLI A.

Tantum hic profuit sanguinis missio ex tali, ut reliquis medicamentis non satis iuuantibus, à strangulatione imminente & tonsillis vlceratis curata fuerit, quibus virgines ex Aetio

Aetio diximus obnoxias esse ante tempus mensium, vel eo tempore cum erumpere debeant. In fine nos conimode lacte & melle pro gargarismo vti sumus, cum & Aetius cohibito iam vlcere pascente, lacte samia terra permixto gargarizare iubet. Oportet autem in vlcibus repurgandis explanandisque valde sollicitum esse, non tantum in adultis, sed etiam in infantibus, quialiquando sunt passi conuulsionem in vlcum repurgatione: aliqui via transglutendi excicati, sunt strangulati. Aetius puellam nouit post quadragesimum diem consumptam esse, quum iam à morbo recolligeret. Aliqui vltic ad septimum diem plurimi periclitantur. At nostro tempore ex lue Gallica hæc vlcera multo maligniora euadunt, de quibus suo loco.

OBSERVATIO XII.

De ingenti gutturis apostemate interno.

Vir qui sportas conficiebat Alcmariæ, annos 36. complens, hyeme cum fluxionem ad guttur experiretur, noua magni faciens, intus apostema ad magnitudinem oui auctum circa fauces & epiglottida obortum, ut ne minimum quid transglutire posset; & ceruicam si biberet, rursus elatum in palatum per nares fundebat. Octauo autem die à mali initio cum glande acuta aluum exonerasset, cephalica vena secta in cubito: deinde post quatuor horas etiam ex venis linguæ, cataplasma sequens exterius appositum est: etiam gargarismo sequenti vtens; die subsequenti mane ruptum est apostema, ingenti copia saniei effluent: *℞. flor. meliloti, folior. malua, viol. mar. j. flor. chamæmill. p. j. rad. alibæ mund. 3 β. nidum vniuersi hirund. cum plumis incisum. in aqua omnia coquantur, ad mollitudinem pistentur, adde farina hordei, sanguis ani 3 β. olei amygd. dulc. hyrri recentis, olei liliorum, chamæmelini ana q. s. fiat cataplasma.* loco affecto exterius apponatur. Gargarisma vero tale erat: *℞. rad. alibæ 3 j. folior. viol. malua, plantag. ana m. j. flor. meliloti m. β. flor. ros. rubr. p. j. seminis lini, scenugræci. alibæ, malua ana 3 j. β. seminis cydon. 3 j. nidum hirundinis cum plumis incisum, sicum pinguium numer. iij. vna. passul. ab arill. mund. p. j. hordei mundati m. j. fiat decoct. in aqua communis pro libr. ij. β. exprimantur & colo ex-cipiantur, addendo mellis ros. colati 3 iij. diamori 3 j. β. misce prog. g.* interea continuo capiebat follicula cassiæ recentis, supra linguam ponendo ac sugendo, donec medulla liquefces paulatim sine deglutitione in gulam descenderet: hoc enim modo habebam & maturationem & lenitionem, neque bibere aut deglutire æger aliud posset: his apostemate rupto, & sanie copiose effluxa, pro vlcibus abstersione aqua mellis gargarisata; deinde pro mitigatione, lacte tepido; vltimo vero ad conglutinationem cum decocto plantaginis maioris & arnogiostæ, consolidæ minoris, intra tres dies cum nostro honore, nutu Dei, probe conualuit.

SCHOLI A.

Illud apostema procul dubio ad anginam pertinebat. Nam à dictis iam partibus alterum morbi genus, si quod aliud, quoque vitium acutissimum existit; ut Trallianus refert lib. 4. cap. 1. pestiferum atque acutum, ut Celsus inquit, ut

pote ab Hippoc. *κυνδύνη* appellatur, ut 3. *Progn. liquet*: quanquam idem affectus 4. De ratione vitus siue Hippo, sit siue alterius auctoris, *κυνδύνη* nominetur *κυνδύνη* *ή κυνδύνη*, hoc est, à suffocando dicta: à Latini Angina. Vulgus vero perperam squinantiam vocant, Anginam vero à Latinis quidam vocari volunt, ut Leonellus, quod angat fauces. At Iacchius taxat fere omnes scriptores de Angina scribentes, cum nusquam alias de aliquo morbi genere tanta confusione loquuti sint, tum in assignandis speciebus, tum in monstranda sede affecta: dum alii quatuor, alii tres species faciunt: è quibus ut iuniores, extrinsecos musculos gulæ citant, & alias partes, quas profecto nunquam sunt conspicati. Hic etiam de nominibus digladiantur, vnicuique sua nomina imponentes, quæ vana quidem esse vult, & nihil ad naturam rei noscendam aut ad curationem facere. Is ex Hippoc. 3. *Progn.* Anginam proprie dictam esse vult, nempe partes intra fauces existentes quæ inflammari possent, & anginam parere: ac primum sunt muscoli gutturis interni, & externi (quibus cartilagine mouentur dilatata & astricta) à diffectoribus numerosi positi, & qui ad linguæ radicem ad os *ουθεν* mouendum perueniunt: quibus & videtur annumerare & glandium genera & paristhonia, & quæ in capite arteriæ ad laryngem sunt, & ad fauces pertinent, quæ sub inferiore maxilla vsque ad aurem perueniunt, & spacia ea replent. Quauis itaque ex his partibus inflammata anginam facit: quamvis in sania & periculo multa sit differentia, prout magis aut minus spiritum occludit: quod sane accidit prout larynga, per quam primum spiritus fertur, magis aut minus affligit: porro ratio dictat, maxime affligere eam, ubi interni musculi sunt inflammati: propterea quod primum tumore per se viam spiritus occludunt; de hinc ad interna cartilagine conualluntur, vnde aperire nequeunt, sed claudunt: post hanc ubi externi musculi, & glandulæ circa laryngem ortæ inflammantur; nam hæc quoque spiritus angustiam facere possunt: ideo aspera arteria inflammata, strangulatio sequitur, inquit Galenus, ob tunicæ tenuitatem. At circa guttur tum tunica, tum musculi sunt, qui vna inflammantur. Tertio loco ubi circa separatas à larynga partes sit phlegmone, ut in glandulis aliis, & musculis ad linguæ radicem positis. Hanc distinctionem optime vidit Hippoc. Itaque tertio Prognost. primo ponit eam, in qua nihil tumoris, vel ruboris in faucibus, aut circa iugulum apparet; & est Iacchino quoque prima. Secunda huic proxima (*hoc autem facit per notas non propria morbi definitione*) cum rubor apparet in faucibus & tumor. Hic vero secundam describit, in qua externi musculi & glandes inflammantur: mox tertiam, in qua etiam tumor ad externa tendit, ubi antiades, aut aliæ glandes, quæ sub auribus & mento communicant, inflammantur. Aliter vero Donatus ab Alto mari distinguit, cum quatuor anginae species à Paulo constitui scribit, quibus & quintam recentiores addiderunt. Sed his præhabitis nunc exemplum anginae aliud adferamus.

OBSERVATIO XIII.

De Angina admodum periculosa.

Angina admodum grauissima laborabat Adrianus Cornelius, filii Cornelii Laurentii Thessalienis apud Alcmarianos, iuuenis viginti

ginti duos annos natus, adeo ut nec cibum nec potum deglutire posset. Hic spiritum difficillime trahebat, fauces internae tumorem habebant, calorem, ac ruborem doloremque, qui & ceruicem occupabant: sumpta vero pocula per nares resiliabant, dolore quoque acutissimo accedente. Huic autem cum per os medicamenta exhiberi non possent, neque glande acuta alius irritari, ad eum accitus, illico enema sequens iniicere iubeo: ℞. folior. viol. malua cum toto, mercurialis, branca vrsina vna cum rad. ana m. j. florum chamemill. p. j. rad. albae z j. semin. anisi, sem. lini, sem. 4. frig. maior. ana z j. prun. damasc. num. xv. vuar. passul. ab arill. mund. p. j. decoquantur in iure pulli vel vernicis, cum aluum durior esset, ad magis emolliendum faeces, q. s. & huius col. accipe lib. j. addendo castae mundae pro chysteribus z j. diacaboli, benedictae laxat. ana z iij. olei amygd. dulc. viol. lini ana z j. salis communis z j. b. misce: bis inde alius soluta est, atque illico facibus eductis vena cephalica secta fuit in brachio loco affecto magis respondente. Post duas horas etiam vena sub lingua incisae. Hic enim festinandum est: nam & veteres in angina periculosa & sanguinem mittebant & medicamenta vno die exhibebant. Ego sane (inquit Trallianus) non, me, cum visus valde vigeret, venam manu aperuisse: dicitur linguae subiectas secuisse: & vespere ex cremore priusanae lachrymae scammoneae exhibuisse: atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix posui dissolvere. Iam alium quendam non me, postquam duorum brachiorum in cubito venas secissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Haec habes apud Trallianum lib. 4. cap. 1. Eadem quoque peracta sunt in angina illa populari anni 1517. de qua mentionem fecimus lib. 6. observat. De febr. scholio Observ. 2. A misfione sanguinis hoc gargar. utebatur. ℞. aquar. solatri, plantag. viol. end. ana lib. 8. aqua equiseti z j. diamori z ij. mellis ros. colati z j. misce. Exterius hoc cataplasmate admoto: ℞. farinae fanneg. z b. farinae bordei, farinae seminis lini ana z ij. mucag. seminis albae extraeta cum aqua malua, & mucaginis, seminis lini. ana z b. olei amygd. dulc. chamemill. ana z j. olei ros. z b. butyr. recentis z b. croci pul. grana v. probe mixta cum lana succida loco affecto applicentur. Deinde etiam adiectis resolventibus tale gargarisma praescriptum: ℞. scabiosa, plantagin. acerosae, consolida minoris, florum chamem. meliloti ana m. j. foliorum viol. malua ana m. b. sem. lini, fennugraci ana z i b. sem. malua z j. sem. anisi z b. ficum ping. num. iij. vuar. passul. ab arillis repurg. p. j. bordei mundati m. j. coquantur in aqua communi pro lib. iij. adde mellis ros. colati, diamori ana z ij. misce. Hoc finito sequens praescriptum est. ℞. fol. viol. malua cum toto, florum chamemill. meliloti ana m. j. b. ficum ping. num. v. rad. albae z b. vuar. passul. ab arill. mund. bordei mund. ana p. j. glycyrrhiz. rasa z vj. kysopi viridis m. j. coquantur in aqua communi pro lib. iij. b. colatam addendo mellis ros. colati z iij. Postremo & hoc utebatur: ℞. florum chamemill. meliloti ana m. j. viol. scabiosa, malua cum toto ana m. b. rad. albae z b. glycyrrh. rasa z iij. seminis fennug. z i b. sem. anisi z j. ficum ping. num. iij. vuar. passul. enucleat. bordei mund. ana p. j. coquantur in aqua communi pro lib. ij. b. colat. addendo mellis ros. colati z iij. misce pro gargarismo. quibus praesidiis malum resolutione finit, copiosa pituita per gargarismos ex ore emanante: quarto autem die cum deglutire posset, hanc purgationem sumpsit: ℞. diacaboli. z b. castae mund. z iij. b. agarici rochis. z j. cum z iij. aqua melissa, fiat potio: quinto die cum sumpsisset, & quinquies aluum deiecit, sanus factus est. Quomodo & alia puella in iis

dem adibus ex eodem malo decumbens annos sexdecim nata, cum pene suffocaretur, & extrema iniunctione iniuncta, ut eam statim moritiram existimarent, quae magis erat pituitosa, & materia similiter magis pituitosa, quae & ingentem tumorem ad maxillam exterius vergentem habebat, os praecudentem, ut nihil sumere posset, iisdem fere remediis curata fuit, quamvis loco venae sectionis, cum ita debilis esset, cucurbitula cum sacificatione scapulis imposita fuerint; sed fere obrepente syncope, statim amota sunt. glande alio irritata, iisdem fere gargarismis, utens magis emollientibus & resolventibus & simili cataplasmate imposito superius dicto, cum multa pituita ex ore fluxisset, facta est resolutione, neque abscessus subsequutus; cum postea aliquid per os sumere posset, potionem dedimus sequentem: ℞. castae recens ex canis tractae z b. diacaboli. z iij. (cum decoctum nec commune nec pectorale paratum haberet pharmacopoeus) in z iij. ceruicis communis dissolvimus: & cum bene aluum deposuisset, haec pro deplorata habita etiam curata est.

SCHOLIA.

Omnibus communis est inflammatio, aliando cum tumore, deglutendi difficultas, impedita respiratio, dolor circa laryngem. Hippocrates & veteres (ut & Donatus censebat) olim inflammationem quae in gutture & faucibus fiebat, anginam vnicum nomine appellabant, & ex veteribus medicis omnem inflammationem circa gulam siue intus siue foris immineret, Syntanchem nominarunt. Posteriores vero ut Aetius cuius & Alexander Trallianus meminit, differantiam inter syntanchem & cynamchem, & parasyntanchem & paracynamchem fecerunt; prout quatuor diuersae partes in eo affectu affici possunt: nam internis gutturis musculis seu laryngis inflammationem patientibus. κατὰ γλῶττιν, externis vero κατὰ φάρυγγα ab eisdem appellatur. Quibus & Neoterici adhuc quantam addunt speciem ex luxatione vertebrae ad anteriora, in qua locus cauus apparet cum dolore, si extra attingitur: quod contingit, teste Aetio, ob distracta intro verticula, & consistentem circa internos gutturis musculos inflammationem. Haec autem species iuxta Aetium etiam proprie cynamche à veteribus est appellata. Lingua enim ad luxato verticulo iuxta radicem suam impolla, ex propriis locis excedit & difficultas magis circa respirationem infestat, unde coguntur aperto ore semper hiare atque aërem attrahere. Celsus tantum tres differentias facit, quas etiam suis notis distinguit: Arabes in veram & notham distinguunt, & notham esse volunt sine febre, pituitosa desillatione in fauces ceruicisque musculos fortasse cum tumore, sed sine rubore, ardore & febre, quae inter acutos morbos non habetur: & ita penes affectum & humorem distinguunt: de quibus vide Gradum & Arculam, sic enim fieri volunt ex sanguinis, bilis, pituitae aut melancholiae fluxione. Verum quoniam, ut Cal. inquit 4. De rat. vietus in morbis acutis, ad curationem nominibus opus nobis non est, (nam tam prius nomina quare incipient) cumque had. aff. etiones in curationibus suis in paucis varient, teste Aetio: interim praestat vnamquamque

suis propriis notis distinguere, ut aliquod certius de vnaquaque specie prognosticum faciamus, & curatio vniuscuiusque melius innotescat. Quamquam omnes praedictae affectiones, eodem Aetio teste, communem habeant difficultatem transglutendi, tamen ut in alia plus, in alia minus hoc malum augeat. Accidit etiam eis potum adsumptum ad nares reflecti: nam & spiritus, ut Celsus inquit, eis includitur. Iuxta Galeni vero sententiam, in cunctis spiratio quoquo modo deterior redditur, nullo existente vel in thorace, vel in pulmone vitio; qui in hoc veluti in reliquis, Hippocratem sectatur. Verum vna pars cum afficitur, ab altera tunc potius poterit, velut magis & minus transglutendi difficultas, sine spirationis noxa fuerit, ac fuerit affecti, nihil coloris, caloris, & molis conspiciuntur, nec in ceruice, nec in faucibus, ut 3. Progn. testatur Hippoc. adeoque spirationis difficultas augetur, ut non nisi recta ceruice trahatur aër: tunc quoque angustiae, ac dolor plurimus in gutture erit, & febris non levis; vox insuper simul cum spiratione laeditur, ut patet 4. De loc. affect. Externis vero dumtaxat ipsius gutturis musculis inflammationem patientibus praedicta omnia adeo, remissa tamen: nam neque angustiae sensus, neque dolor, licet circa guttur adsint, adeo vehementer erunt pariter nec spirandi difficultas. At si dolor fere praedictis similis adsit, calorque, rubor ac moles fauces offendant (quae omnia aperiendo oris, & linguam deorsum comprimendo oculis cerni possunt) nec admodum difficulter spirent, fauces ipsas affectas esse iudicabis: interim etiam lingua ipsa similiter cum faucibus coarctatur, quemadmodum ubi non solum fauces, sed ceruicem quoque rubor occupaverit, & forte pectus comprehenderit, nec vehementer agri dolore affligantur, nec fere difficulter spirent, & extrinsecus partes circa fauces inflammatae cuilibet apparebunt; exteriores earum partes affectas esse nemo verebitur. At quae ipse morbus erit in compositione primo, & protom ex iam dictis, tum etiam ex dicendis indicibus, facile percipere valebis: namque aeger nec eis spirat, potissimum ubi gutturis partes afficiantur; interim ore conuiet, quoadque eo aperto aërem trahit, febrisque saepius aderit: accidit etiam eis nares reflecti: dolore quoque afficiuntur, & excedente interdum inflammatione, & lingua & fauces in tumorem attolluntur. Verum haec omnia exemplis multo clariora euadent.

OBSERVATIO XIV.

De cynamche vera musculis internis laryngis occupante.

Gerardi Iacobi ex familia Heermans vxor, Anno 1546. mense Septembri, constitutione humida praecedente, inflammatione musculorum laryngis correpta est, ac angina admodum febrilissima, cum neque tumor exterius, sed tactu dolor in parte dextra magis sentiebatur: febre quoque continua & acutissima detinebatur. Cum iam metus suffocationis impenderet, ex nostro consilio vena cephalica statim in cubito dextro secta est, glande prius alio irritata: & gargarisma praescriptum ex aquis plantagin. solatri, equiseti ana z iij. diamori z iij. Sed quia intus latebat in-

flammatiō, gargarisma ad locum affectum minus veniebat; ideo ut lamberet syrup. iuiubinum, viol. & diamorum, iussimus: sed egre deglutiebat: interea eodem die venas sub lingua secari fecimus; unde paulo melius habuit, ut ipsamet fatebatur; cum antea vix loqui posset. Exterius guttur inunximus oleo amygd. dulc. viol. chamemill. & aneth. Secundo die iterum glande aluum sollicitauimus, cum enema admittere nollet: & syrupis dictis, ad statum accedente, syrupum de glycyrrhiza adieciimus. Et cum tertio die pituita ex ore fluere coepisset, hoc gargarismo deinceps vsi sumus: ℞. ficum pinguium numer. v. florum chamemill. meliloti florum ros. rubra, ana p. j. bordei mund. m. j. sem. fennug. z ij. liquoris rase z vj. fiat decoctio in aqua communi pro lib. i b. adde diamorum mellis ros. colati ana z ij. misce. Exterius hoc quoque emplastrum admotum est: ℞. farinae bordei p. ij. mucag. albae; fennugraci extraeta cum aqua malua ana z i b. olei chamemill. lilior. ana z j. mixta calide apponantur: quo & dolor sedatus est, & potuit deglutire. Quarto die mensibus per se apertis, ad modum crisis à febre tum angina liberata est. Verum post aliquot dies ita largiter continuo fluxere, ac viribus prostratis aliquo modo cohibere coacti sumus, dorso & ventre inferiore inuncto oleo myrt. & ros. & semine plantag. & acetosae ana z b. puluerisatis & cum ceruicia sumptis; paulatim fluxus quoque restrictus est: & his rotulis ad z ij. quotidie deuoratis: ℞. seminis plantag. acetosae ana z b. rerva sigillata vera, spodiij. corall. rub. ana z b. specier. triflor. z ij. amygd. virag. canth. ana z j. dissoluis in aqua plantag. adiecto rache q. s. fiat confectio in rotulis z ij. ponderantibus.

SCHOLIA.

Angina modo contingit à calidis humoribus, modo à sanguine calidiore, modo pituitosiore. Et quamvis fluxio haec maxime ex capite deferatur (quemadmodum Galen. testatur. 4. De rat. vietus in morbis acutis) tamen magna ex parte biliosior existit, eodem auctore 3. Progn. ita ut praecipue erysipelas spectetur, & inflammatio eryspelati similis: & licet ab acerbis fluxionibus fiat, etiam à frigida & pituitosa maxime in fauces irruente; tenuibus vero & acerbis in guttur ipsum. Vel hoc modo causas distinguere poterimus, in externas seu procatarticas ut est anni constitutio pluuiosa, aër ambiens calidus seu frigidus: calidus per modum colliuationis fluxiones à capite irritat & in fauces ac guttur dimittit; per modum compressionis. Sic venti austrini, aquilonij, balnea capiti adhibita vel calida vel frigida: capitisque nimia tectura, vel omnino nulla. Ad has causas etiam pertinet fortis ictus capitis aut locorum in quibus angina fieri potest, aut contusio, aut rei dura obuiatio, vel casus: & praecipue cum ex multo aestu subita facta sit refrigeratio, tum & frigidissimi potus; aut si piscium spinae incautis fauces occupauerit, ut scribit Aretaeus: vel ut alij tradunt, ab ictu inflammari potest locus, aut aconito assumpto, vel venenatis quibusdam fungis, ac vna taminea, vel iis similibus venenatis, veluti trifolij semine, quod guttur laedit & spiritum occupat: sic & cibi & medicamenta; ut fungi: ita & cerata magna ingluvie comesta à proprietate anginam inferunt. At causae praecedentes generales esse possunt, repletio totius corporis & potissimum capitis: altera minus generalis praecedens humores, ut bilis vel pituita: ex bile, cum aestate vel

M autumno

Corpora.

Signa.

Signa propria.

Signa magnitudinis.

Signa essentia.

Signa differentiarum & parvis affectibus.

Signa causarum & quo pacto fluens redundans succus percipi valeat, si musculus gutturis inflammatus ex sanguine copioso oriatur, spirandi ac deglutendi difficultas maxima erit, & gravitas simul conjuncta, febris non exigua, corpusque totum ac caput plenum sanguine videbitur.

S.

Si ex bili f.

autumno calida fluxiones e capite fluxerint: ex pituita hyeme magis: ex sanguine, si bili permiscetur vel falsa pituita, acres sunt fluxiones; si pituita, magis crassiores in fauces. Alij his addunt succum melancholicum, sed rarissime, quem & a sanguine magis fieri volunt. Et ita causas corporeas volunt esse ipsos humores, aut sanguinem cum aliis humoribus permixtum: antecedentes vel præcedentes repletionem totius vel capitis, aut partium circa guttur, & debilitatem illorum membrorum facile fluxionem recipientium. Alij conjunctas causas humores esse dicunt. Præter signa vero, de quibus antea diximus, alij eadem statuunt in spirandi difficultate: alij in deuorando, ut Rhases. Igitur quousque in spiritu difficultatem non facit, angina non erit: quod amygdalis inflammatis euenit, ubi magna inflammatio non fuerit, ceteris enim omnibus adest utrumque symptoma, in respirando scilicet & deuorando seu potum seu cibum. Nam ubi partes intra fauces sunt inflammatae, siue ad arteriam siue ad gulam, in consensum trahunt arteriam, quoniam alligatae sunt: Si vero externae partes faucium inflammantur, cum omnes cooperentur ad deglutitionem suo motu, fit ut hæc actio fiat difficilis. Locus affectus parum diuersus est: sed sat est, si vel per se, vel per consensum quandam via spiritus afficiatur ad anginam significandam. Hæc ergo sunt propria maxime signa; ut & dolor in illis partibus, qui necessario comitatur, & calor: nam cætera signa, ut potum per nares trudere, potius magnitudinis eius signa sunt, & ad prognosticum faciunt: ut & non nisi recta ceruicē spirare. Primum enim fit, quoniam cum ad faucium partes peruenit, nec in gulam deduci potest præ angustia; per meatus naribus communes, circa gurgulionem positos recurrit in nares. Aliud fit, quoniam facilius sic spirat, quam iacentes: quoniam iacentibus posterior pars arteriæ molli cum sit, comprimitur à gula (ut recte dicebat Iacchimus) & spina. Rubor vero ceruicis assidens est signum, ut rubere fauces & attolli, vel non: non enim affectus sunt essentialia signa: sed sedis affectus: male ergo faciunt, qui hæc signa confundunt. Signa vero differentiarum & parvis affectibus, scholio præcedente diximus: nam in epiglottide maior difficultas spirandi; & si musculus laryngis intus tument, ocylime interimunt, & nunquam sanabiles, si nulla tumoris nota intus vel extra appareat. Sed hæc signa etiam ad prognosticum faciunt: quæ in faucibus hæret, magis conspicua est; uti & in musculis exterioribus. De quibus vide ad longum Praxim magnam Benedicti Fauentini præceptoris mei, cap. proprio. De signis angina demonstrauimus. At si signa causarum & quo pacto fluens redundans succus percipi valeat, si musculus gutturis inflammatus ex sanguine copioso oriatur, spirandi ac deglutendi difficultas maxima erit, & gravitas simul conjuncta, febris non exigua, corpusque totum ac caput plenum sanguine videbitur. Temperamentum, habitus, ætas, anni tempus, regio, ac aëris constitutio, præcedensque victus ratio sanguinis redundantiæ attestabuntur. Biliofa vero in prædictis musculis defluxione decumbente, quæ magna ex parte est præter spirationis & deglutitionis difficultatem, quæ non adeo vehemens, ut in prædicta aderit, velut nec angustia, citra ferre grauiter plurimum dolorem ac intolerabile quoddam incendium circa guttur sentient ægri, morsum ac acrimoniā, sicut ac oris amaritudinem: simulque

(ut & Donatus annotauit) acuta febris aderit magis: nec minus temperamentum, ætas, & habitus, præcedensque victus ratio ac reliqua redundantiem bilem demonstrabunt. At si circa fauces prædictorum humorum fluxio fiat, ex maiorimole, calore, diuersoque colore, præter iam dicta, vna ab altera secerni poterit: minor enim moles, maiorque calor ac rubor ad flauum inclinans in biliola fluxione aderunt: velut maior moles, minorque calor, rubensque color ad opacum inclinans, decumbentem sanguinem indicabunt. Quod si mixta fluxio fuerit ex utrisque, & permixtis quoque iam dicta indicia erunt: & prout magis & minus alter reliquum superat, vincent quoque vnius vel alterius indicia. At si frigidus crassusque sanguis ad prædictas partes, præsertim fauces (quas potissimum, ut diximus Galeni auctoritate, infestare solet) confluat, paucius aderit dolor, tumor fere citra ruborem, aut cum exiguo & obscuro, laxior quodammodo apparebit; licet interdum crassiore existente humore durus consistat, febris nulla aderit; aut forte exigua & leuiter corpus totum, ac præsertim caput, pituitoso sanguine refertum erit; ac proinde temperamentum, ætas, habitus, tempus anni, præcedens victus ratio, ac reliqua id promptius indicabunt, cum omnia frigidi sanguinis ac pituitosi redundantiam attestentur. At illa quæ sit ex luxatis ceruicis vertebis ad partes anteriores, ut ex Atreio diximus scholiis Obseru. 13. huius libri, de qua Hippoc. 2. De morbis vulg. & Galen. 4. De loc. aff. meminit, quos & Paulus sectatur, eius signa iam diximus. Si enim fiat per viam coarctationis, ut sit in vertebis luxatis, ad sensum manifestantur. His & alij adiungunt tempus & periodorum anginae signa & etiam terminationis: nam in principio conferuntur repellentia, in augmento adiacentur discutientia, in statu magis discutientia, & resolutoria, in declinatione pura resolutoria, quæ non iudicantur tantum ex fluxione humorum, sed magis ex suis accidentibus. Terminantur autem anginae iuxta Arculanum suo tempore insignem præticum sextupliciter: vel quia inflammatio ipsa vel apostema anginae resolutur, vel suppuratur, aut induratur, aut putreficitur, vel ad cutim exterius, vel ad pulmōnem, vel ad cor rapitur, vel in stomachum irruit, vel rursum ad cerebrum fertur, aut putreficitur, interficit maxime. Sed quibus modis hæc signa innotescant, id exemplis postea luculentius euadet, cum etiam hæc partim ad signa prognostica pertineant, de quibus proximo scholio dicendum.

OBSERVATIO XV.

De Cynanche lethali.

Inter anginas grauissima est, ac celerrime interimit, quæcumque nec in ceruice nec in faucibus conspicuum aliquid efficit: hæc enim & eodem die, & 2. & 3. & 4. strangulat, ut inquit Hippocrates 3. Prognosticorum: nam cum in neutro prædictorum appareat aliquid præter naturam, excitandum est intra gutturis corpora lacessere inflammationem, ex qua strangulantur, ut Galenus testatur in prædicti textus Hippocratis expositione. De qua iterum aphorism. 34. 4. lib. sic scriptum reliquit: Si febrem habens suffocatus repente supervenerit, nullo tumore in faucibus existente lethale. Tali angina suffocabantur in finiti ante nō 1517. intra 16. vel 20. horas, ut lib. 1. cap. 1. Obseru.

Obseruat. nostrarum de febribus diximus. Sic etiam (ut refert interpres Hollerij) in musculis dextræ parvis laryngis cum orta esset inflammatio, neque appareret, sed tactu dumtaxat externo dolorem præ se ferret, mors subitibus horis à missione sanguinis consequuta est. Et quamquam iuuenibus, teste Aetio, non minus grauis est, & sæpe lethalis in senibus: vti euenit Sasboto viro doctissimo & Præsidi Brabantia in Haga-Comitis agentis, qui & latente angina in qua nullus tumor neque in collo neque intus in gutture appareret, cum spiritu difficillime traheret, ita ut recta ceruice deidere cogere vel ambulare, cum nihil edulij aut potus per gulam descenderet, neque medicamenta eo peruenirent, & nulla præsidia iuuare possent, quarto die & ambulando & loquendo strangulatus est.

SCHOLIA.

EX spirandi difficultate tum deuorandi, de qua paulo ante dictum est, prognosticum facile patet, & quod consistat in scintilla symptomatum & curæ difficultate: Vbi itaque nihil ruboris apparet, difficillimam curam significat: quoniam medicamenta (ut diximus) eo non perueniunt. Igitur deterrimæ anginae Hippocrates meminit 3. Epid. 2. in muliere quadam hæc notat scribens: Obscure, inquit, vox (quæ & hinc Sasboto aderat: hæc enim est actio propria gutturis, ut prius instrumenti vocem formantis, quæ necessario vitatur: spiritus quoque sublimis, id est, suspensus & erecto thoroce & gurgule, idem monstrant: similiter & potus & per nares. Hæc enim sunt prorsus obstructio spiritus meatu, ut nihil deglutire possint, communicata phlegmone etiam gula: vel quia non sit deglutio sine motu & auxilio gutturis. At quæcumque dolorem similem prædictæ anginae infert, attollitur, ac ruborem in faucibus efficit, admodum quoque exiosa est, sed paulo longior quam prædicta. Quibus vero fauces rubent, & ceruix hæc diuturnior est, eodem Hippoc. auctore, maxime vero ex ea seruatur, si ceruix ac pectus ruborem traxerit, neque ad interna remaneat erysipelas, gutture siquidem nequaquam patiente, sed aut in ceruicem, aut in hæc viraque decumbente. Securissima vero inflammatio erit, si rubor quam maxime foras vertatur, id quod aphor. 37. lib. 6. comprobauit cum dixit: Ab angina habito si tumor fiat in collo, homini: & aphor. 49. lib. 7. asserens: Ab angina habito, tumor & rubor in pectore superueniens bonum; extra enim vertitur morbus. Si ad pulmōnem conueniatur, pessimum; de qua postea exemplum dabimus. At quæ ad cutem transmutatur, aut à principio ita defertur fluxio, multo salubrior, ut constat omnibus 4. De rat. viñ. Galeno teste. Paulus vero inquit raro talem affectum oboriri nisi cum ceruicis vertebrae affectæ loco excidunt: id quod Hippoc. inquit. aphor. 26. lib. 3. Verum illis (eodem Paulo teste) ceu curationem non recipientibus ac deplozatis manum admoliri non oportet. Anginae plurimæ, teste Hippocrate 23. aphorism. libro 5. Hyemalis angina fere semper est pituitosa: fauces dolentes tenues cum quadam difficultate strangulantes, velociter exitum adferunt, Hippoc. lib. 1. progn. Post febrem repente inuadens, & non apparent, lethalis. Si tumor exteriora ac interiora penetrauerit, rubore iam discusso, & strangulari ob id ægrum videmus, lethale. Hoc modo Iordanus Forestus vir nobilis, pater mihi carissimus, piam memoriae, cum per totam hyemem valde senex circiter annos sexaginta quinque febricitasset, Pet. Forest. Tom. 2.

& in tumorem gutturis postea incidisset, eo delitescente, non diu post vitam finit ac in Domino requieuit. Sic nuper æger supinus iacens brachia iactando, protinus se suffocari ostendebat, & veluti furiosus suspirando in lecto sedebat reclusus ac mœstus: & inter spirandi angustias hinc inde se iactabat, siticulosusque non bibebat, neque poterat, quoniam per nares potum effundebat, circumstantesque necessarios odio prosequabatur: hic sine voce tandem inquietus succumbebat, & misere moriebatur. Ita & quidam mente incommoti, pulsu diuerso, tremulo, & anhelitu tremebundo ac interfecto & pulsu formicante, miserabiliter suffocantur. Si quoque vrina ex crassiori substantia in tenuem conuersa, delirio accedente; & lingua crassa exerta, nigra ac dura, cum febre ardente & virium defectu, ore spurante, ab Hippocrate certum exitum portenditur, spuma etenim in angina ad os delata, multo deterior est quam in epilepsia, ut de epilepsia diximus: nam strangulati & dissoluti nondum mortui, non referuntur quibus spuma ad os fertur; at angina vexati absque dolore & difficili spiratione gutture haudquaquam patiente, faucibus tantum vel ceruice affectis, ea quidem diuturnior est, & plurimi ab ea euadunt. Quamobrem bona signa habentur, si deglutitio non impediatur, & senior spiratio tumorque extra ad collum & gulam verratur, & ægri vigilantiores appareant atque hilares, & dolor sedetur, & membra ad naturalem dispositionem redeant, maximam spem sanitatis denuntiant; si & apostema post aures contingat, anginae symptomatis remissis. Si contraria eueniant, humoribus intro pulsus, nulla, aut exigua, spes salutis supererit. Si plura de signis prognosticis requiras, præceptorem meum Benedictum Fauentium de iisdem in sua Praxi magna perlegas.

OBSERVATIO XVI.

De Angina ex sanguinis repletionem cum men strangulationis.

Simon Bartholomæus (ita enim illi nomen erat) Genet pharmacopœi nostri Iohannis de Meer anno 1554. 15. Maij die, vir optimæ constitutionis, & temperaturæ sanguineæ, & si quis alius liberalissimus, potu utcumque & genio indulgens, & valde facetus, in anginam valde deploratam ex sanguinis copia incidit. Hic autem spiritum non nisi recta ceruice trahere, ore aperto hiabat, facies rubra erat, collum quoque tumidum & rubrum, febrisque continua: quibus signis certo cognoui anginam ex sanguine copioso & calido originem habuisse. Ad hunc prius accitus medicus eiusdem ægri gener, hic vero empirico modo sanguinem è manu dextra prope pollicem mittit (nos autem si in principio aduissimus, in brachio ex vena cephalica fecissemus, ut à propinquo loco magis materiam & euacuasset & deriuasset,) & gargarisma nescio quale præscribit, forte non satis repellens, sed solum laxans cum in principio repellentia ad intra conueniant, non autem discutientia aut laxantia. Ideo recte dixit Trallianus. Sape in vniuersum oportet, neque reprimere solam medendi rationem, hisce affectibus conferre, neque discutientem requiri, & temporum ratione habita, initio cum adhuc materia fluit, repellentibus utendum: postea etiam discutientia admiscenda.

M ij

in statu adhuc magis detergenibus & discutientibus
vendum & resolucentibus; magisque in declinatione,
post erian, si fuerit opus maturantibus. Qui enim
sola laxatoria ratione vsi sunt, siue intus, siue foris; hi
insipientium malorum auctores extiterunt, ut multi ex ip-
sis vix euerint; alij periculum moris incuterunt.
Hæc Trallianus. Licet tamen in principio com-
petant repellentia ad intra (ut Rondeletius dice-
bat) numquam autem ad extra: nam materia
semper ad exteriora trahenda est, ob pericu-
lum suffocationis. Verum ob gargarisma forte
nimis laxans in principio, sub noctem ita inua-
luit malum, ut astantes subito suffocationem me-
tuerent, tum æger ipse: ita ut Eucharistia à sa-
cerdotibus munitis nunc animam quasi exhalaret:
& medicum reuocarent: sed is valetudina-
rius venire non potuit: quare me è lecto voca-
runt. Cumque iam ex signis præhabitis animad-
uerterem anginam esse ex copioso sanguine, &
sanguinem fuisse extractum circa pollicem, aluo
prius clystere non soluta, libenter clysterem in-
jecissem: sed cum neque æger, neque astantes
admitterent, glandem acutam injicio, cum per
superiora nihil sumere posset. Deinde hoc gar-
garisma præscripsi: ℞. plantaginis m. j. florum ros.
rubr. p. j. gallam omphacitidem crasso modo contusam,
semin. cydon. 3 j. bulliant in lb j. aquæ plantaginis, ad-
dendo aquæ solari, equiseti ana 3 ij. colaturæ immis-
cendo diamori, dianicum ana 3 i b. fiat gargarisma.
quo cum gargarisasset, loqui potuit, quod antea
minime poterat. Iussit ut si per noctem deficeret,
idem statim paratum haberent, ob utilitatem
quam ex gargarismo percipiebat. Sed in ipsa
nocte hora tertia circa diluculum defecit: qua-
re alterius medici gargarismo, qui adhuc re-
stabat cum gargarisasset, strangulationem in-
currebat; ita ut denuo me ex lecto reuocauerit:
sed hoc sequenti cum vteretur, suffocatio de-
fuit: ℞. folior. plantagin. bellid. minoris ana m. j.
florum ros. rubr. p. j. balast. 3 j. bordei communis p.
j. coquantur in lb ij. aquæ communis ad lb j. cui &
aquæ plantag. lb j. addatur, & aquæ scabiosæ 3 ij.
semin. fenugr. malvæ, lini (cum iam in augmen-
to essemus) ana 3 j. gallam vnam crasso modo contu-
sam, nidum hirundinis cum plumis incisam, (ad re-
solutionem aliqualem faciens: ebulliant hæc semel:
deinde fiat lenis colatura, addendo diamori, dianicum
ana 3 i b. mellis ros. colati 3 b. misce, eo plurimum
delectabatur, cum se leuamen inde sentire fa-
teretur. Rursus in deluculo 16. Maij. die re-
deuntes, qui erat secundus dies à morbi initio
(tales enim oportet crebro inuifere cum ex
morbis peracutis sit) glande iterum aluo exone-
rata, venas sub lingua incidere iubeo, crassissi-
mo sanguine & nigerimo ac limoso effluente:
& melius cepit habere, & spiritum liberius du-
cebat: eodem tamen die guttur innoximus lini-
mento sequenti, simul etiam cataplasmate im-
posito: ℞. olei amygd. dulc. 3 j. pingued. gallinæ
buxi recentis loti in aqua viol. & chamamill. ana 3
b. mucag. semin. lini, fenugr. malvæ, althææ extract.
cum aqua chamamill. ana 3 ij. cere citrina modicam;
fiat linimentum, lana succida superposita: ℞. rad. al-
thææ mund. 3 i b. folior. malvæ, viol. ana m. j. flor.
chamamill. meliloti ana p. j. coquantur in aqua ad
mollitudinem: pissentur, adde sœvina feminis lini, sœ-
vina bordei ana p. b. nidum hirundinis in pulverem
redactum; olei amygdal. dulc. viol. buxi recentis
ana 3 ij. olei chamamill. 3 j. fiat cataplasma, &
amora lana calide apponatur. Post meridiem eo die
gargarismo deficiente, sequens in vsum venit:
℞. rad. althææ 3 b. folior. plantag. malvæ, scabiosæ

(quæ à proprietate resoluit interna & externa
apostemata) flor. ros. rubr. ana m. j. sicum pi-
guum num. iij. bordei mundati p. j. coquantur in lbij.
aqua ad medietatem: cuius colaturæ deinde adde aquæ
plantag. lb b. aquæ scabiosæ 3 ij. aquæ equiseti (ali-
hippurin vocant) 3 ij. semin. coton. 3 j. nidum
hirundinis, vel, si magnus, medietatem: bulliant
iterum forti ebullitione: deinde rursus colaturæ
adde dianici, diamori, mellis ros. colati ana 3 j. misce
pro gargarismo: & cepit materia cliuari, saluta-
re, gargarismo ex rad. althææ præscripto, prius
hoc gargarismo vsus est: ℞. aquæ plantag. equi-
seti, aquæ nucum ana 3 iij. aquæ scabiosæ 3 ij. aquæ
caprif. 3 i b. sem. coton. 3 iij. facta vnicæ ebull.
lentur: adde mellis ros. colati 3 ij. diamori 3 j. colo-
mella retracta fuit alumine viso & holo ameno pos-
Sed cum non posset ob anginam adhuc deglutire,
re, gargarismo ex rad. althææ præscripto, prius
de ros. ablatis & duplo pondere mellis rosati ad-
iecto, & dianuco relicto, commode vsus est: at-
que hæc tertio die præscripta sunt, aluo iterum
glande irritata. Post meridiem potuit deglutire
re: & concessimus ceruisiam tenuem, zaccaro
candi iniectione, febre iam continua minus vi-
uente, ut pissetaret cum nondum libere bibere
posset. Quarto vero die (post quem si non resolu-
uitur, plerumque aut suppuratur, aut occidit
angina cum à copioso sanguine sit) à principio
morbi, qui erat 18. Maij. cibum sumere poterat,
sed molliorem, ut iuscula: etiam hoc apozema
ad aluum quoque soluendam & febrem præse-
psimus, licet illa ipsa nunc multo mitior esset:
℞. cor. rad. cicbor. 3 j. rad. dentis leonis, glycyrrh.
rassa ana 3 b. end. cicbor. dentis leonis, viol. bign.
ana m. b. scabiosæ, beronica, capill. Ven. mellis
flor. corol. ana p. j. semin. anis 3 i b. semin. 4. f.
maior. ana 3 b. prun. damasc. numer. ix. vinar. pol-
sul. enucleat. vinar. corimb. ana 3 vj. bordei mund.
p. j. foliorum sena 3 j. hab. seletti 3 j. epithymi, pa-
typod. querc. ana 3 i b. schœnanthi 3 j. coquantur
in sero lactis pro lb j. col. adde syrup. viol. ex in-
fus. ros. de liq. ana 3 j. misce pro apozemate. Quo-
bis in die viens quaterque quotidie aluum de-
ponebat; & secuta est anginae resolutio. Verum
cum postea leui tussi adhuc afficeretur, & guttu-
ris asperitas & inflammatio eum aliqua ex parte
adhuc vexarent, ex linctæ sampsit; tum etiam
cum gargarismo sequenti quinto die vteretur,
curationi colophonem imposuimus: ℞. flor. viol.
3 j. syrup. pap. 3 b. mucag. cotoniorum extract.
cum aqua farsara 3 ij. pul. specier. diatr. frig. in
tabul. 3 j. zaccb. penid. 3 iij. fiat locb. sumebat quo-
que diatr. frigidum & trionfant. in tabulis, modo
vnum, modo alterum. Gargarisma autem tale erat:
℞. bordei communis, folior. plantag. malvæ, viol. ana
m. j. coquantur in aqua communi pro 3 ix. adde aquæ
plantag. 3 iij. & cum 3 i b. sem. coton. fiat lenis ebulli-
tio, & colat. adde mellis ros. colati, diamori ana vnc. j.
b. misce pro gargarismo. Et istis prædiis, morbi
addictus luci fuit restitutus.

SCHOLIÆ.

Angina, si quod aliud quoque vitium, ac-
tissimus morbus existit: Nam agros, (inquit
Alexander Trallianus) laquei finisque modo fran-
gulare solet; vnde etiam Græcis merito Cynan-
ghe appellata est. Quoniam igitur acutissimus
est affectus, & statim mortem inducit,

necesse est etiam protinus ad curationem festina-
re. Omnes itaque auctores in omni angina ve-
nam secandam esse suadent: magis vero si reple-
tio totius vel capitis addit, vel in sanguinea: ve-
næ ex qua vena, non omnes inter se conveniunt.
Aëtius ex auctoritate Archigenis, cum in prin-
cipio compendiarium & præceptum auxilium om-
nis angina requirat, quandoquidem ut in totum
ferre iuuenibus accidit, è vestigio cubiti venam
incidit; sed venam non explicat. Idem Paulus
sanguinem è cubito demendum esse simpliciter
asserit. Ita & Trallianus, angina infestatis venæ
sectionem ante omnia adhibere necesse est. Sic
etiam Hippoc. 4. De viis. in morbis acutis, ac text.
30. Sanguinem igitur ex brachiis detrahens, mox
venas sub lingua. Rhafes primo ex cephalica
mittit. Trallianus vero in detentis mensibus
tali venam aperit. Neoterici quoque, ut Arcu-
lanus & Gradus, idem iubent, si & hamorrhoidi-
bus confuetis & iam afflictis afficiantur: alio-
qui prædominante sanguine si hepar fuerit in
causa, ex basilica mittunt; deinde ex cephalica
eiusdem lateris, vel si in neutrum declinaue-
rit latus, ex dextra; aut dextra & sinistra simul.
Idem Arculanus si repletio solum fuerit à forcula,
inquit, satis est cephalicam incidisse prius ex
latere opposito; deinde eiusdem. Rondeletius
vero scribens de curatione, inquit: Si inflam-
matio musculorum gutturis vel colli vel vna fiat ita
ut sit synanche, primum detur clyster, mittatur san-
guis de basilica dextra, afficiantur cucurbitula
cum scarificatione in spatulis. Statim rursus sub-
iungit: Debet autem sanguis mitti de cephalica
dextra, quacumque hora veneris, ut materiam nimiam
& diueras, ne augeatur morbus. Donatus autem si
totum corpus plethoricum est, incidit cubiti ve-
nam mediam, aut humeralem, si non sit: vel pri-
mo mediam, deinde humeralem. Habemus ma-
gnam discursum de venæ sectione apud Gradum.
Et qui Auicennam sequuntur, in phlegmatica
& biliosa præmittunt ventris solutionem: quod
& Mesue etiam iubet. Rhafes tamen 2. Conti-
nentis redarguit Iudæum prohibentem in bilio-
sa & pituitosa phlebotomiam fieri. Ita varij
sunt: cum quidam in omni materia à sangui-
nis dimissione initium sumant: quoniam &
raro medicamenta hauriri possunt. Quidam
etiam in angina sanguinea venam non secuit,
quoniam macer esset, languidisque venarum re-
ceptaculis; in cubiculo enim frigidissimo collo-
carent, ne sitiret esuriretque, neque vires resolu-
uerent; tum enim synanchicus inedia plu-
rium dierum sanatus est, quoniam sanguis ali-
mentum corpori subministravit: sed talis cu-
ratio in morbo acuto vix aut numquam imi-
tanda. Verum inter omnes doctissimus ille Iac-
chinus egregie distinguit quando angina sectio-
nem, & quando utrumque requirat reme-
dium: Si (inquit) à sanguine sit, & is in totius
venis abundet, sanguis est mittendus; siue etiam sanguis
vnam alio humore abundet, idque primum statim in-
ter initia. Mox si quis alius humor abundet, etiam
adhibenda est purgatio, quæ est illi humori propria,
ut bile & pituita. Si vero profusus pituitosa sit, quam
etiam sine dolore esse dixit Galenus, præterquam
cum denotare aliquid enititur; tunc purgationis po-
tius intentio est. Ita nos in puella illa, de qua an-
tea diximus, scarificationem loco phlebotomiæ
adhibuimus. Ratissime tamen talis contingit
angina sine dolore, etiam ex pituita; ita ut pau-
ca sanguinis extractio sæpe profuerit, neque ita
laserit, etiam ad diuersionem facta. Interea, (ut
Pet. Forest. Tom. 2.

apud ipsum ad longum videre poteris, de saphena sectio-
ne in mulieribus non purgatis, ubi repletio totius est) 12
præstat statim in cubito mittere. Rursus quod
scribit Alexander, Paulus & Aëtius, quod sanguis
non vniuersum, sed pluribus vicibus sit euacuandus, ne
animi defectio accedat, & ex ea subito sequatur suffoca-
tio, tota materia in afflicta partem collectam vnum-
pente, vel à faucibus aut gutture in pulmonem delata,
inevitabile periculum subeat æger, neque tamen angu-
stior facere venæ incisionem conuenit, Aëtio asse-
rente, ne sanguis velut percoleatur, & crassior eius pars
intus remaneat, potissimum ubi crassior sanguis huius
affectionis causa existit. Vult Iacchinus ut quantita-
tem ad vires metiamur, & corporis naturam, & pleni-
tudinem; tum quantitatem tum qualitatem; & demum
magnitudinem affectionis: ideo arguit in his Aui-
cennam qui varius est, ut multum torqueat se-
ctatores suos: modo enim Auicenn. dicit ex Pau-
lo, ut non confertim multa fiat, sed iterata vsque
in diem tertium; imo ait, si virtus fortis è ducatur,
ut sincopis appareat: & statim dicit cum Paulo, me-
lius esse, ut syncopæ excludatur, ne virtus flaccescat.
Nec enim diuinare possis, quid in illis verbis
Auicenna voluerit, qui vsque ad maturatio-
nem dimittere vult phlebotomiam, quamvis
laborent multum sectatores. Quod si super ver-
ba falsa comminiscuntur veram aliquam sen-
tentiam, habeamus gratiam, quod nobiscum sen-
tiant & veritatem sua assertione confirmant.
Interim tamen eiusmodi negotia maioribus in-
tenti illis dimittemus, ut & illud de vena eligen-
da. Hæc Iacchinus. Holerius mediocri vulnere
venam secat, ne si amplius sit, nimium viribus
detrahatur; si angustius; effluat tenuis sanguis,
crassus relinquatur. Hyeme, ubi angina fere
phlegmatica, parcius detractio, sed foramen
maius esse debet: Vere & reliquis temporibus
copiosior, vulnusque angustius imprimatur. In
principio itaque vena cubiti secanda; post
principium in ipsa lingua: contra nostros ton-
sores qui indifferenter etiam in principio id
perperam faciunt. Post venæ sectionem, potis-
simum ubi alij humores redundarint, secundum
erit (Celfo auctore) ducere aluum: sic & Galen.
lib. 4. De viis. rat. morborum acutorum. Corpus
igitur totum vena secta, vacuare oportet & pur-
gatione & clysteribus. Primum namque ve-
nam secare iussit, tanquam maxime necessa-
rium: & deinde etiam purgatione & clyste-
ribus vtendum: idem Hippocrat. sentit lib.
De locis in homine. Rhaf. purgat eadem die, si opus
sit: in crassa pituita dat cochias pilulas; si te-
nuis, per agaricum vel catapotia fieri potest; si
mista, cum pilulis Galeni, sed hæc in principio
non possunt deuorari: ideo aliqui clymate acio-
ri vtuntur: his materiam non concoquunt: sed
præstat post sectionem venæ, si deglutire pos-
sunt, purgans medicamentum tribuere, quod
leniendo vacuat; ut est cassia, mamma, syrup ex insus-
ros. viol. In crassis succis diacatolicum cum agarico
dissolutum cum aliquo decocto conuenienti. talis pur-
gatio resse Galen. 6. De compos. med. secundum lo-
cos, conuenit, gratia euacuandi vniuersum cor-
pus, & transferendi infra humorum momen-
tum, qui ad affectas partes feruntur. Conuenit
& clysteribus uti primo lenioribus; interdum
etiam acioribus, potissimum ubi aliquid venæ
sectionem, & purgationem prohibeat, aut eis
exhibitis, si adhuc malum non cedat. Nec mi-
nus reuulsiois gratia conferunt extremarum
partium frictiones, aut vincula, similiter si
pedes aqua calida foueantur, ut inquit Paulus.
M iij Cucur-

Cucurbitula item scapulis hac ratione affigenda, citra scarificationem: & ubi malum longius prorogetur, post prædictas euacuationes, cum eius materia influere desierit, cucurbitam cum scarificatione apponere oportet, sub mento, si tumor circa fauces, & maxillas persistet: si vero nullus extrinsecus tumor appareat (veluti in ea angina, quæ occulta appellatur, in qua gutturis partes, præsertim internæ afficiuntur) circa ceruicem cucurbitula affigenda erit, iuxta primam aut secundam vertebra; vel hirudinis applicanda. Rhases quoque phlegmone vitur in initio ceruicis proprie circa secundam vertebra cum melle Anacardino. Nos vna cum Ericio medico collega meo & Nicuonio, cum Heiuricus Meesterius dictus Aduocatus deplorata angina laboraret, & omnia præsidia iam dicta tum gargarismi non iuuarent, in collo versus aurem in ea parte ubi angina erat, communi consilio vesicatorium apposuimus; & præter spem fuit à præfocatione curatus. Verum talia non sunt adhibenda nisi in totum materia fluxerit, & in timore suffocationis, præcedentibus aliis omnibus euacuationibus & diuersionibus. Et ita malè faciunt, qui statim emplastra resoldentia loco affecto applicant, vel alia cataplasmata ante venæ sectionem; quibus ægrum ad interitum ducunt, materiam magis ad locum trahentes. Sed de particulari curatione tum gargarismi ac topicis postea; tum repellentibus, discutientibus & maturantibus: quæ exemplis supradictis, tum adhuc dicendis per se satis clara & lucida euadent.

OBSERVATIO XVII.

De Angina biliosa.

Angina biliosa seu ex sanguine bilioso, sæuissima laborabat Ioannes Zygerus apud Alcmarianos sacerdos, annos 45. excedens, vir gracilis & procerus, raræ texturæ & coloris citrini, temperatura admodum biliosa, cui & febris continua aderat: sed nullus tamen rubor aut tumor intus in gula aut faucibus, vel extra apparebat. Erat autem verum cum hoc malo corripere: ad quem illico correptum accitus fui. Verum cum aluum non deposuisset illo die, nec præcedente, libenter clysterem emollientem & nonnihil refrigerantem iniicissem; sed cum nollet admittere, glande acuta cum aluum deposuisset, paulo post ex vena cephalica cubiti dextri sanguis non ita copiosus extractus est: gutture vero exterius inuncto cum oleo viol. & amygdal. dulc. Interea & hunc gargarismum præscripsimus: ℞. aquæ plantag. lb. j. aquæ solari lb. ss. diamori, syrapi viol. ana ℥ j. dianicum ℥ ss. misce. At hic gargarizare non nouerat, ita ut subito in guttur dilaberetur, & suffocari videretur: neque linctum sumere poterat, potu quoque regurgitante per nares: quem hortabamur ut gargarizaret, alioqui illum suffocatum iri. Et sic in pedes stans, & duo viri illum sustinentes capite paululum in colli partem posteriorem inclinato, malo quoque id suadente & vrgente, tandem gargarisationem edoctus. Secundo die gargarismo adiecit aliquid melli rosacei, & oleis aliquid olei chamæmelini, lana succida post inunctionem gutturi imposita. Tercio die venæ sub lingua secata sunt, & alius glande iterum irritata, & gargarisma tale præscriptum: ℞. aquæ plantag. viol. fenbiosa ana ℥ iij. syrapi ex ros. siccis, mellis ros. colati

ana ℥ i ss. misce. sub noctem facta est inunctio, & cataplasma sequens exterius impositum: ℞. olei amygd. dulc. lilior. ana ℥ ss. olei chamæmelini ℥ iij. misce. ℞. rad. altheæ ℥ j. rad. lilior. alborum num. iij. flor. malua m. ij. flor. meliloti p. j. flor. chamæmelini p. ss. decoctis & contusis adde farine hordei ℥ ss. farine semini lini, fenugr. ana ℥ iij. butyr. recentis, olei amygdal. dulc. chamæmelini ana q. s. fiat cataplasma. Quarto die nihil adhuc deglutire potuit: iterum glande aluo irritata, rursus venæ sub lingua apertæ sunt, cum prima vice parum sanguinis ab eis fluxerat, nunc vero parum plus & melius habere tunc videbatur, interea & hoc gargarismo utebatur: ℞. folior. malua, plantag. viol. ana m. j. folior. scabiosæ, flor. meliloti ana m. ss. flor. ros. rubr. p. j. rad. altheæ ℥ ss. sem. coton. lini ana ℥ i ss. bord. mundati p. j. ficum ping. numer. iij. coquantur in aqua communi pro bibi. adde mell. ros. colati ℥ iij. diamori ℥ i ss. misce. Cum neque quinto die adhuc deglutire posset, mane cucurbitula scapulis cum scarificatione appositæ, sequenti gargarismate utebatur, etiam emplastro imposito: ℞. foliorum malua, viol. ana m. ij. flor. meliloti m. j. rad. altheæ ℥ i ss. nidum hirundinis. rad. liquir. ℥ ss. rad. lilior. ℥ iij. sem. cydon. ℥ j. hordei comminis vuar. passul. ab arill. mund. ana p. j. hyssopi m. ss. ficum ping. numer. iij. fiat decoct. in aqua communi pro bibi. addendo aqua plantag. scabiosæ ana ℥ iij. colatura nō valde expressa adde mellis ros. colati ℥ iij. misce. Hoc cepit multa salua exire, & appositio emplastro exterius hunc in modum parato: ℞. rad. altheæ ℥ ii ss. folior. viol. m. ij. rad. lilior. albi ℥ i ss. folior. viol. m. j. flor. meliloti p. i. coltis ad m. litudinem & contusis adde nidum hirundinis, farine seminis lini, fenugr. ana ℥ j. olei lilior. amygd. dul. ana ℥ i ss. butyr. recentis ℥ iij. olei arbutini ℥ j. fiat emplastrum, tunc potuit primum deglutire exiguum ceruicæ cum zacch. cando. & facta resolutione gargarismo ultimo continuando præter spem amicorum cum admiratione stantium sanitate adeptus est.

SCHOLIA.

Vniuersalibus remediis præmissis, ad localia venimus, quæ & intus adhibentur: ut sunt gargarismi, vel linctus, si deglutitio non impeditur; vel extra, ut sunt linctiones, vnguentæ, cataplasmata, emplastra, & fomenta. Sic ubi initium est cum multa inflammatione, ea quæ leuiter adstringunt, offerenda sunt primum, & deinde resse: velut est rosarum, lentium, myxarum parumque decoctum: vel quod ex moris constat: iuxta Paulum cum Rhus decocto: aut ex succo nucum viridum; de quo vide Galenum & eisdem historiam de botulano libro 6. De compos. medic. secundum locos, cuius antea mentio facta est. Linctus quoque ex diamoro, syrapi. granat. confert: vel hoc modo, ex syrapi. pap. myrtill. cum diatr. frig. & diapap. si deglutire posset. Hæc & similia in calida sanguinea conferunt: in biliosa magis frigida, ut in principio, cum aqua plantag. solari; syrapi. viol. nenupharis, lac emulsum cum aqua ros. Arculanus etiam succum solari laudat in gargarismis. Loeb etiam conuenit ex syr. iunibar dianco & diemoro. In augmento additur supradictis aliquid mellis ros. & si adsit dolor, lac muliebre vel aliud cum exigua castia, & constringentibus gargarismis ex ros. rub. myrti vel lentisci decocto vel plantag. & aliorum adde aliquid glycyrrh. & passul. mundat. postea etiam sicis, magis accedente statu. Et sic vigente, crescente & consistente morbo magis iis utendum, quibus discutiendi facultas inest, ut

caricis fuscis. liqui. in aqua mulla decoctis, adiecto hyssopo, melle ros. tum aliis: de quibus vide Actium & Gal. & alios ut Rondeletium, Hollerium, & Donatum: conuenit & tunc syrupo violaceo adiacere de liquiritia, vel de iunibus syrapi. Et si sit materia frigida vel fluxio frigida, tunc oportet adiacere thymum, pulgemin, calamintum, origanum, & namque succi acrioribus indigent medicamentis, quæ scilicet secare & in tenuia diuidere, & tum glutinosa, tum crassa constringere possint, autore Galen. 4. De rat. vict. in morbis acutis, ut proximo exemplo ostenditur. In declinatione supradictis gargarismis adde possumus magis discutientia, ut nidum hirundinis, & decoctum hyssopi, origani, in hy-dromelle, & linctum ex oxymelle simplicis & scillito. Sed cum morbus est in statu vel declinatione, si prorsus non resoluatur, ad suppurationem venit: quæ postea intus & extra adiuvanda est, ut postea exemplis docebimus. Quod ad topica externa attinet, nullo modo oportet hic repercutere, sed potius lenire & resoluere, & iniicere (teste Tralliano) ceruicæ spongiam oleo madidam, aut ceratam tenera ex cera, butyro & adipe asserino confecta, cataplasmata quæ inflammata discutunt & coneuolunt, ex farina hordeacea, sem. lini, mica panis, si vetusta, etiam sicca addere & adipe, si dura, & fomenta ex altheæ decocto chamæmeli. Celsus vitur, calidoolo cum spongia admo. Valet & chamæmelinum, amygd. dulc. aliquando & anethinum, lilaceum si materia frigidior & cataplasmata ex semine altheæ, malua & lini cinere, & fenugr. ac hordei farina; ut iam præcedentibus exemplis docuimus, & subsequenter etiam illustrata erunt.

OBSERVATIO XVIII.

De Synanche à causa frigida & pituitosa sanguine.

Vir quidam satis obesus & pituitosus, tempore hyemali, fluxione subitanea oborta, in interioribus faucium musculis ac pharyngis inflammationem (quam Synanchem vocant) incurabat, ex materia frigida & sanguine pituitosa, non sine suffocationis periculo, cum nihil quoque alimenti demitteret: sed quicquid abumeret statim reiectans vix spiritum trahebat, & vox adeo faucibus hærebat, ut ne nutrire quidem posset: iugulari prorsus hominem putasset, nos tamen & vrgentis morbi & ægri virum ratione habita, vtile & præsentaneum remedium duximus, sanguinem mittere. Verum cum iam duobus aut tribus diebus aluum non reddidisset, & nihil quicquam per os sumere posset, clysterem prius iniiciendum esse valde commodum duximus in hunc modum paratum: ℞. rad. altheæ, brancæ visine ana ℥ ss. malua, p.rietaria, mercurialis, bera ana m. j. centaurij minoris, sampsoni ana m. ss. flosur, flor. meliloti, chamæmelini ana p. j. fiat decoct. in aqua communi pro lib. j. col. adde castia pro clysteribus ℥ j. biera picra compos. benedicta laxat. ana ℥ iij. olei chamæmelini ℥ iij. salis communis trii ℥ i ss. misce. Cum aluum probe reddidisset, cephalica vena in brachio dextro (in qua parte etiam maxis afflictebatur) secta fuit, sanguine tamen medio cricere effluente, non valde copiose ob pituitum, cum non euacuationis gratia, sed reuulsionis magis fieret. Post sanguinis detract. garg. hoc utebatur. ℞. plantag. flor. ros. ana m. j. nucum cur. pressi m. ss. balauj. ℥ j. fiat decoctio in aqua mulla q. s. pro lib. i. col. adde mellis ros. colati dianicum ana ℥ iij. misce: collum exterius inungebat vng. dialtheæ olei amygdal. dulc. lilior. chamæmel. ana simul mixtis.

Interea & venas sub lingua secari iussimus: deinde etiam cucurbitulis naribus affixis humorem deducere conati sumus; frictionibus simul atque aliis præfidiis, quæ & hominem intus & extrinsecus iuuare poterunt. diebus etiam sequentibus hoc gargarismo, vel simili vti sumus: ℞. hyssopi m. j. hordei mundati p. j. vuar. pass. deractis vinaceis ℥ j. caricas pingues v. seminis lini, fenugr. ana ℥ iij. f. decoct. pro lib. j. in qua dissolue pyrethri, sinapi ana ℥ ss. myrrha, croci ana ℥ j. pulu. hirundinis ℥ j. fiat garg. Exterius parti colli anteriori & circa latus magis dolens, vnguenti dialtheæ ℥ iij. nidi hirundinis ℥ iij. cerati instar admoimus; & facta est resolutio: alioqui si ad suppurationem apostema seu inflammatio conuerfa fuisset, adhibuissimus maturantia, & suppurantia: & cum iam copiosa pituita fluere, ex ore per gargarismum in quarto die, ut per os aliquid sumere posset, hanc positionem dedimus: ℞. Carbolicæ ℥ ss. electuarij Indis maioris, diaphenici ana ℥ iij. aqua beconica ℥ iij. mellis ros. colati ℥ ss. misce. fiat posio: detur in diluculo, optime aluum deiecit, & sanus factus est.

SCHOLIA.

Hic etiam sanguis mittitur, sed in minori copia; & venæ etiam sublingua, si opus est, aperiuntur: & enemata etiam in processu paulo acriora conueniunt, ut magis diuertant: quidam & hieram colocynthidem infundunt: purgant, si possunt, cum pilulis cochiis, alioqui cum potione qua nos vti sumus, quidam in principio hoc vel simili gargarismo vtuntur, si materia sit crassa & pituitosa: ℞. nucum cypressi, balauj. ana m. j. masticis ℥ iij. (alij ℥ j. ponunt) coquantur in aqua mulla pro lib. i. in qua dissolue dianicum ℥ j. mellis ros. ℥ iij. aluminis aliquid. ℥ j. myrrha, croci ana ℥ j. vel ℥ i ss. fiat gargarisma. & in viscoso phlegmate conueniunt syr. acetos. oxymel. simplex cum decocto myrti & diamoro. In augmento, diacaryon, addito pyrethro vel myrrha & croco: postea decoctum hyssopi cum oxymelle, vel gargarismo, quo nos vti sumus. Exterius vero primo oleum liliorum & chamæmelinum. in augmento, adiecta farina hordei & lini pinguedine porci: & in statu ex nido hirundinis cum farina fenugræci, lini & floribus chamæmillæ. De his vide Leonellum & præceptorem meum Benedictum Faucinum, Arculanum & Rondeletium. Si sit à sanguine melancholico, cuius curationem Græci non ponunt, sed Arculanus de ea angina meminit, etiam mittatur sanguis, purgetur cum pilulis Indis, si possit, vel epithymo & senæ: gargarismis vtantur ex decoct. liquir. diamoro aut la-ctæ. in augmento calidiora, & in processu magis resoluentia adhibeantur in statu emollientia, si ex melancholia fiat scirrhus: ius brassicæ collutum & gargarisatum valet. Reliqua vide apud Arculanum.

OBSERVATIO XIX.

De Parasymanche.

Iacoba Iuonis, monacha Alemariana, in monasterio, quod inter Franciscanos, & aliud canonicum monachatum situm erat, anno millesimo quingentesimo quadagesimo octauo, mense Februuario, ex Parasymanche decumbebat, nempe musculis exterioribus laryngis inflammatis, parum tumentibus, cum febre continua, quæ cum strangulari videretur, multis tentatis remediis,

cum aqua aceti zaccharo immixto ex muliercularum consilio gargarisasset, ita ut secundo die ab habito malo sub noctem periculum suffocationis metueret, de medico accersendo tunc primum cogitavit, cum & astantes illam pro deplorata haberent. Cum ore aperto gulam & fauces inspicere nullum tumorem reperi, nisi leuem in parte sinistra, licet se intus laqueo strangulari diceret. Aluo statim per glandem acutam irritata, mox venam cephalicam tundere iussi & directo loci dolentis, sanguine utcumque extracto, cum bene ferret. Deinde gargarismo via ex decoct. plantag. diamoro & melle rosaceo nonnihil immixto (mel quidem rosaceum addebam, cum principium iam praterisset, & malum in augmento esset:) sex deinde horis a sectione venae cephalicae, alia quoque venae sub lingua sectae sunt, sanguine admodum viscoso effluente; ita ut visa sit melius habere. Interea & gutturi cataplasma quod sequitur admouit: *℞. farina hordei pug. j. mucag. sem. lin. fœnugr. alibae extract. cum aqua maluae & chamemill. an. 3 ss. olei liliorum, chamemill. an. q. s. fiat cataplasma.* Rursus glande aluum solui-mus, cum clysterem admittere nollet. Deinde inclinante malo, & cum materia resoluere, ac dolor sedaretur, & phlegmata ab ore copiose educerentur, ad illud magis iuuandum etiam hoc gargarisma præscriptum est: *℞. hordei mundati man. i ss. florum chamemill. meliloti ana pug. j. cary-carum pinguium num. vij. passul. enucleat. p. j. seminis maluae 3 ij. seminis lini, fœnugr. coroneorum an. 3 j. glycyrr. rase 3 ss. coquantur in aqua communi pro lib. ij. colat. adde diamori 3 ij ss. mellis ros. colati 3 j. misce pro gargarismo.* Guttur inuncto exterius cum oleo hiliaceo & emplastro seu cataplasmate imposito egregie sanitati intra quatuor dies restituta est.

SCHOLIA.

Postquam hæc quid deuorare poterat, optima victus ratione instituta, qualis in reliquis inflammationibus confert, pariori tamen cibo, tum potu, in illa vti sumus: namque copiosiore periclitantur, ut *Alexander testis est*, sintque humidi, molles ac liquidi: & sic tribus diebus idem ac Paulus mulsam aquosam exhibent: tertio vero die cremorem hordei seu ptisanæ cum quadam potione dulci, inquit Paulus, quippe cum abster-gat, incidat, nutriat & inflammationem refrigerare possit. At inflammatione iam extenuata, & moderatiore facta, necesse est etiam iuxta Trallianum lutea ouorum mollissima, non autem multa exhibere. Vel ubi vires exigunt, ptisana cum iure pulli utimur, vel gallinæ decocto, aut eius iure, vel pullorum contusorum iure. Abstinentum ab iis omnibus, quæ fluxiones incitant: quale vinum, vaporosa, calida omnia. Statim initio collocamus agros loco satis amplo nec frigido: & ita sinimus residere in lecto, ut caput altius attollatur. Alij vsque ad septimum, (ut Itali, quemadmodum & Leonellus) panatellam exhibent in aqua coctam cum vino granatorum. Nos in hac regione frigida etiam post quartum, quando quid sumere possunt, panatam cum iure pulli exhibemus; vel panatam nostram cereui-liariam, sine vino tamen, solummodo zaccharo iniecto cum exiguo butyro, quo magis leniat.

OBSERVATIO XX.

De Synanche cum erysipelate phlegmonoso in facie.

Pistor quidam Almaria anno millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, in hyeme mense Februario, subito inflammatione faucium interna (quam Synanchem vocamus) correptus, strangulationem fere incurrerat; simul cum erysipelate phlegmonoso totam faciem occupante. Hic autem in via butyracea cum decum-beret & pene suffocationi vicinus esset, neque in principio medicum admisisset, cum strangulationem præsentiret, me vocat: Statim secta vena cephalica, & eodem die etiam venis sub lingua: & cum iam initium præterisset, & status morbi immineret, gargarisma magis resoluens quam repellens præscripsi; & gutturi cataplasma admouimus ex farina hordei, mucag. alibae, lini & oleo liliorum & amygd. dul. concinnatum folisque viol. & malua. Topica erysipelati phlegmonoso in facie existenti non apposuius neque quicquam quod intro repellere posset; imo naturæ id reli-quimus, cum rectè dixerit Hippocr. ab angina habito rubore in pectore, bonum: ita & in facie non minus bonum fuit. Quarto die potuit deglutire, exhibitum est serum lactis cum castoreo 3 vj. & catholici 3 ij. aluo satis soluta. Sed quia facies adhuc phlegmonosa permanebat, quinto die cucur-bitula cum sacificatione affixæ sunt: & sexto diacatholici 3 j. diag. gr. j. cum sero lactis ebibita: & septimo die gutta rosaceæ, sedari cepit ac minui; & sanitati restitutus fuit.

SCHOLIA.

Optimum erat hic signum, quod erysipelas phlegmonosum foras in angina prodebat, cum extra iuxta 50. aph. lib. 7. Hippocr. morbus vertebatur: nam illa angina, quæ cum aliquo tumore est, & ceruix ruborem traxerit aut pectus erysipelas non intro recurrerit, etsi prolixior fuerit, prorsus tamen salubris est, Hippocrate auctore. Significatur enim robur nobilium membrorum pellentium & detinentium malas, & prauas anginae materias, quo temporis progressu discuti & resolui possit. Contra si angina ex tumore faucium aut ceruicis & rubore, cum rubore aut erysipelas intro recurrerit malum, iuxta eundem aph. 25. lib. 6. qui ita habet: Erysipelas ab exterioribus veris ad interiora non est bonum; ab interioribus veris ad exteriora bonum. Non solum (inquit Galen. in Commento eiusdem aph.) erysipelata, sed aliud quodcumque, quod ex profundis & principalioribus partibus transfertur ad cutem, bonum esse signum ac causam debemus existimare: contra vero, si ad interiora & profunda transeat, malum.

OBSERVATIO XXI.

De Parasyynanche.

Colonus in pago Pœldiickio dicto, annum quinquagesimum agens, parasyynanche, id est, faucium inflammatione externa laborabat. Ad quem cum secundo die prius accitus essem, non sine febre erat, doloremque ingentem patiebatur cum colli tumore externo versus maxillam procedente cum ingenti faciei rubore: adeo ut nec cibum nec potum deglutire posset. Hic enim cum eodem die aluum deposuisset neque os ob-

tumorem

tumorem bene aperire posset, vena cephalica illi secta fuit, in brachio dextro, cum in dextra parte tumor eundem affligebat. Loquela quoque erat impedita. Hoc gargarismo etiam vltus est: *℞. aqua plantag. lib. i. syr. gran. diamori ana 3 j. mel-lis ros. 3 ss. misce:* altero die, cum non bene loqueretur, quamquam os nunc aperire poterat: ita ut venæ sub lingua sectæ fuerint. Deinde gargarismo superscripto addito hyssopo & glycyrr. & melle ros. solo, & exterius cataplasmate imposito ex rad. althææ, flor. meliloti & foliorum malua cum farina lini & butyro, per modum resolutionis, & hic curatus est.

SCHOLIA.

Arrabum sectatores & qui supra Rhafem commentati sunt, anginam quamcumque, quæ per resolutionem terminatur, quinque intentionibus curant: optima victus ratione, tum vitæ instituto: Deinde diuertunt humorem fluentem ad locum apostematis vel inflammatum. Tertio leuiter repercutiunt. Quarto digerunt si possunt. Quinto eradiciue euacuant. Quibus nonnulli & sextam addunt, nempe resolutionem. Alii ad duo tantum fundamenta hæc referunt, ut augmentum & fluxum inhibeant, & quod fluxum est remoueant: Quod si angina terminetur per viam collectionis, ad saniem scilicet vel suppurationem, quatuor alias intentiones adiciunt: maturationem, ruptionem, abster-sionem, consolidationem: ut postea exemplis docebitur. Rursus quidam communem curationem (ut antea ostendimus) ad tres partes redu-cunt: nempe victus rationem, materiæ euacuationem diuersionemque, & fluxus inhibitionem: particularem vero, ut diximus, ad topica remedia tam intra quam extra adhibita. Rursus non desunt, qui ad triplicem scopum hæc referunt: in euacuationem, fluxus inhibitionem & diuersionem. Secundus debetur causæ coniunctivæ, & hæc particularis curatio dicta fuit atque hæc de-nuotres intentiones in se complectitur: primo repercutientia, & discutientia, secundo & tertio resolutionem, si per resolutionem terminetur: alioqui succedit maturatio, quæ & quatuor intentiones in se complectebatur, ut paulo ante meminimus. Tertius autem scopus utique & cau-sæ accedenti & coniunctæ communis est: atque hæc iterum duas intentiones habet, ut acciden-tium correctionem & regimen vitæ. De his vide Galenarium, Gradum & Arculanum: quamuis & hæc ipsa ex iis, quæ dudum diximus, per se nota sint.

OBSERVATIO XXII.

De angina admodum periculosa in pregnantibus, in qua mul-senti gutturis interiores & exteriores simul inflammati erant.

Scribit Hippocrat. mulierem vtero gerentem Scapi ab aliquo morbo acuto, lethale esse libr. 5. aph. 30. præcipue vero, teste Galen. in Commento, si cum febre sit morbus, necesse est, ut & ipsa sit continua. Idem Hipp. refert lib. eod. aph. 31. Mu-lierem vtero gerentem sanguine misso ex vena, abortiri & negat, si factus sit maior. Experientia tamen quoti-diana experti sumus, utrumque non semper ve-ritatem habere, quod neque talis morbus acutus in pregnantibus semper sit lethalis, & quod non semper abortiat grauida sanguine misso: ut

exemplis etiam, cum de febribus ageremus, ostendimus. Ita & nunc nouimus mulierem, quæ an-num trigessimum sextum agebat, in sexto mense prægnantem: ad quam anno millesimo quingentesimo sexagesimo secundo in pago, cui Sylua nomen erat prope Delphos, decumbentem ex gra-uisima angina, in qua muscoli gutturis interiores & exteriores inflammati erant, adeo ut pene suffo-caretur, acciti fuimus, cum iam secundus dies ageretur, quo fauces præoccluderentur ob infi-gnem tumorem, qui in parte colli dextra durus hærebat, superius etiam fauces occupans, & intus tum guttur, tum fauces simul comprehendens, cum febre continua & capitis insigni dolore vix spiritum trahens, gulamque præoccludens, ut neque potum neque cibum quantumuis molli-simum deglutire posset. Cum nocte præcedente aluum per se deiecisset, & vena secta esset, qua-tuor vncis sanguinis emissis, ne animi deliquium sequeretur in prægnante: deinde gargarismis aptis, prout tempus morbi suadebat, adhibitis; & inunctionibus in collo peractis, tum empla-stris commode impositis, & cataplasmate con-uenienti collo admoto, & venis etiam sub lingua sectis, tertio die tumor, qui intus latebat parum detumuit, ut deglutire potum potuerit. Rursus cataplasmate discutiente & parum emolliente, etiam adiuncto nido hirundinis, post meridiem spectauimus tumorem magis ad exteriora verge-re, & cum iterum admoto emplastro conuenien-te, (cum melius transglutire posset) mamma 3 i. ss. cum aqua scabios. 3 ij. in nocte sumpsisset, ter aluum deposuit; & quarto die post alui subdu-ctionem melius alimenta liquidiora sumere po-terat. Et cum aliquo modo tulisset syr. violarum & liquiritiæ, adiecto zaccharo penid, lambebat; rata fuit in septimo; febre quoque eam relin-quente, cum ab astantibus pro deplorata habita fuisset.

SCHOLIA.

Quod in angina in prægnantibus & grauidis commode venæ sectio fieri possit, hoc exemplum iam dictum satis demonstrat. Et quamquam angina non solum in prægnantibus, sed in aliis quoque medicum etiam doctum de-terreat, & illi metum incutiat; non oportet ani-mum delicere, cum multi etiam quandoque cu-lato ex ab-cessu gulae, medicis præstantissimis: vix euenit Beruënio in quo-dam Alexandro Serratio: cui neque rubor, neque tumor villus intus in gula aut extra ostendebatur, sed aridum corpus & squallidum: omnia assumpta reieciens, spiritum vix trahens, & vox faucibus hærens, ut ne muire qui-dem posset. Cuius Beniuënius commoda adhibuisset præsi-dia, & sanguinem duxisset, & cucurbitulas nabis af-fixisset, & frictions adhibuisset, aliaque præsidia, quæ extrinsecus hominem iuuare poterant tantisper. Verum ubi malum his omnibus auxiliis non modo cedere aut lenari, sed in horas vehementius ac contumacius fieri aduertit, omni abiecta spe ægrum tanquam proxi-ma nocte moriturum, Deo & naturæ reliquit. Hunc au-tem cum assistentes, velut iam iam spiritum exhalaturum, signo crucis ex more in auroram vsque singulis momentis consignarent ac manerent, ecce statim à summis ægri fau-cibus tam ingens ex adaperto intus abscessu purulenta materia vis effertur, ut homine pene ingulato, catinulum, in quo recepta est, ad summum repleui labrum. Quæ ex-pulsa statim resumpsi est spiritus, & ægri, qui iam pro mortuo lugebatur, veluti ab inferis remeans paulatim cor-nalescere cepit, donec integram consequutus est sanitatem. Memin.

*Historia cu-
iusdam qui
ut absces-
sum peruen-
sit.*

Memini ego similiter, cum in Italia studii causa agerem, viros doctissimos in consultatione vocatos, qui de nobili iuveni angina laborante, penitus desperarent, cum abscessus intus in gutture lateret (qui nequaquam scalpello attingi poterat) prius aeger succumberet, quam intus meatus rumpi posset; quod si vero per se rumpetur, spem curandi superesse: quod aeger quidem clam audierat; iisque discedentibus, famulum ad se vocat; & laqueum in lecto sedens iniici iubet, atque manu per funem sese leuans; altera vero manu, digito in guttur immisso, exultans abscessum vi- perripit, & reuocatis medicis, qui adhuc in vicinia erant, dicebat ruptum esse abscessum; si quid consilij superesset ad curationem eandem statim adhiberent: quare adhibitis detergentibus & deinde consolidantibus, ex insperato ad cupitam sanitatem hoc modo peruenit. Non solum gutturis, scularyngis & faucium, atque laryngis inflammationes: sed & tonsillarum quandoque adeo magnae sunt, ut gutture ocluso (vtraque videlicet tonsilla affecta vel gutture faucibus) nec cibum nec potus transmitti queat; vel non absque summa difficultate, ut & Dodonaeus supra illud exemplum observationis Beniuenii annotauit. Tum res vero & quandoque ita augentur, praesertim ad suppurationem vergentibus inflammationibus, ut ore hiare nequeunte, dentes cohaereant, ac strangulationis periculum imminet. Abscessu vero rupto; copiosiusque erumpente pure (ut & sequens exemplum ostendit) solutio fit, & ore patulo, gutturis quoque meatus patet.

OBSERVATIO XXIII.

De angina periculosa per suppurationem finiente.

Dictum est prius, quod angina sit periculosa, si post febrem fiat, ut aliquando euenit mulieri cuidam Delphensi quinquagenariae, quae in domo insigne crateris habente decumbebatur. Ad quam cum ingressi essemus, atque inflammationem ingentem intus in gutture haberet; quae & tonsillas ac vulam occuparet, facta vena sectione ex cephalica in brachio & lingua, & electuario lenitio cum decocto communi sumpto, gargarisina apta nihil iuuerunt, cum ad suppurationem malum tenderet: nam post quartum diem dolor, qui plurimum agram affligerat, sedebatur. Cum enim ex toto maturatur, feruor mitigatur ac dolor mollitur: cum enim remissiora sunt symptomata & perstant ultra quartum diem, tunc maturatio plerumque est expectanda (hoc in maiori admittenda saepe euenit, praecipue si in externis communicet:) nam & hac tumorem quoque exteriorum experiebatur etiam intus ad abscessum tendentem. Et tunc amplius cum dissoluentibus contendere non oportet, sed concoquentibus & mitigantibus: quae tamen ab astringente aliquo prolixius non absoluantur, & sic gargarisinate vsi sumus ex decocto ficuum, cum spica, croco & melle, & fenugraeci & althaeae, rosisque in exigua quantitate admixtis. Similiter emplastrum sequens maturatiuum nonnihil & rumpens extrinsecus admoimus: *℞. althaeae mundatae ℥ ij. rad. liliorum ℥ j. ficuum pinguium m. v. foliorum maluae m. ij. storium meliloti, chamemill. ana p. j. coltis & conuulsis addendum hircudinis, farinae bordei m. ℥. olei chamemill. amygd. dulc. butyri recentis ana q. s. sit ad modum emplastri.* Eo vix ad horam collo impolito & maxillae usque ad aurem, intus ruptum est apostema: deinde solo absterforio gargarismo vtens conualuit.

SCHOIIA

SI angina ad suppurationem tendat, tunc quatuor intentiones curandi (ut paulo antea diximus) resultant, nempe maturatio, ruptio, absterforio, & consolidatio. In calida angina, concoquitur, & in pus vertit gargarisma, ex decocto seminis maluae, passularum, myx. viol. radic. dulc. bordei mund. addita sepe. Emplastrum ex radic. althaeae, li- liorum alborum aqua coctum, addita axungia & buty- ro: etiam succus ater siliqua Aegyptiae illinitur. In frigida decoct. hyssopi, ficuum, muccag. sem. maluae, can- linum, ficuum, & butyri recentis cum decocto glycyrrh. ad formam lambitini vel gargarismi. Alii extrinsecus applicant emplastrum ex coepa alba vel porro, cum sepe vel butyro, ex rad. ieros. althaeae, caricis pin- guibus, cum farina frumenti, lini, fenugraeci & axun- gia porcina oleo liliorum, & similib. Aliud maturans & aperiens: ficus aridas, cum aqua discoquito, & con- terito; addendo farinam fenugraeci & fermentum mole- le: vel capram sub cinere rosm. & vitam cum melle ad- misceo: emollit, maturat, ac dissoluit. Dolorem sedant, maturant & aperiunt decoctum fenugraeci cum palmulis & fenugraeco vel cum melle. Facta ma- turatione, secunda succedit intentio, nempe apo- stematis ruptio: quae modo cum medicamentis, modo manu chirurgica perficitur. Maturantibus itaque addimus aliqua acra, ut hircudinis excre- menta, vel cinerem, aut lupinum stercus, vel caninum. Radix lilii, galbanum, pix liquida, abscessus rumpunt & facile maturant: fermentum quoque foris rum- pit cum sale & oleo. Iam quoque plurimum ad- ruptionem facit, vociferatio & fortis motus gut- turis in transglutendo, dura masticando, ac ea ipsa violenter transglutire, ut crustam panis: haec enim saepe contulisse compertum est. Quae- dam, ut empirici, si neque haec iuuerint, candela cerea impingunt & rumpunt: oportet autem eam in guttur demittere & abscessum dirumpere, ut facit Amatus in Graeco quodam angina laborante tentandi causa: qui cum ceram candellam immisisset per os, repente pus effluere cepit per os, & aeger à tam seuo morbo liberatus est, cum medicis eundem pro deplorato & strangulato reliquerint. Alii hiantem ore linguam de- primunt, cultrum ligneum acutum ingerunt (si abscessum attingere possunt) in guttur, & tumorem dirumpunt, vel scalpello aperiunt: deinde pro- no capite saniem expurgant. Non desunt, qui ubi tumorem in faucibus conspiciunt, cum vellicant vnguibus, aut ferro aperiunt, quidam etiam, si in tonsillis sunt, vnguibus propriis dilacerant tuniculam; & pus effluit. Alii spongiae partem ad magnitudinem auellanae suspendunt è filo, & ita ab aegro deuorari iubent: intumesceat spongia, atque dum vi retrahitur, tumorem rumpit. Hoc alij bolo carnis salae semicoctae ita suspensio & deuorato, dum vi retracto molliuntur. Haec ta- men omnia cum cautione facienda: Memini enim quendam tonsorem, sed temerarium, cui specillum (remam vocant) immisum in guttur mu- lieris è manu sua elapsum per gulam in stomac- chum decidit; quae postea multis annis tabida sa- ta obijt: de qua aliquando dicemus, cum de- dicus lib. i. suo Theiser cap. 13. & 14. ferro quo- modo incidantur, se in capra experimentum fe- cisse commemorat, sed hoc opus in desperatis anginis ex Antyllo docet Paulus cap. 33. Et Alexan- der Veronensis inquit: Quidam in conclamata stran- gulatione, arduo remedio vsus est: nam tracheae inter en- tulum & annulum sub epiglottide dissectis membra-

am & respirandi modum inuenit egrotante: donec seda- ta synanche, confuso vulnere, arteria persanaretur. Ta- lis arteria incilio postremum in desperatis reme- dium est, quod etiam veterum inuentum fuit: etate nostra, quod sciam, factum non est: iacchi- nus tamen periculum fieri ait: alij vero temera- riam eam curationem praedicant. Aperto vulnere caput agram inclinandum est, ne sanguis in pul- mones demissus coaguletur. Ora vulneris aceto & aqua colluenda, ac exinde chalcantio proflu- uio sanguinis occurrimus: demum vlcus percur- randum est, sicut reliqua oris vlcera, mulla & cadmia, ut Galeno placet: quoniam ad cicatricem perducit, sicut & lapis Phrygius vltus & lotus, & trius imponitur cum melle. Sic Nicolaus Ro- ta à Beniuenio cum ad mortem tenderet, ex angina curatus fuit: Cum, inquit, intellexissent medicos quaecumque opportuna fuerant praesidia adhibuisse, capi- isse necum cogitare, satis ne esset agram ipsum Deo & naturae, ut ceteri medici, incuratum dimittere, an- aliud licet insolitum, vtile tamen, auxilium experiri. Verum adhortantibus his, qui aegro assistebant, consilium capio & locum altius sub ipsi maxillis, ac etiam supra collum incido: ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus leuatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul & cibum cupientibus, facilis deus ad bonam valetudinem aegro ipsi daretur regressio. Si autem per se rumpatur apostema vel abscessus, commodius scalpello aperiatur: aeger capite prono etiam situandus est, tum ad os & capite deorsum inclinato pus commode, tum sanies egredi possit: imo sub- inde aeger ipse aut medicus digito vel instrumen- to obusto comprimant locum abscessus, ut sanies effluat per os, ne in gulam aut pectus dilabatur. Deinde succedit intentio, repurgandi & vlcus detergendi cum aqua mellis vel zacchari: vete- res mulla tergebant: alij hordei decocto cum melle. Quae & subsequitur vltima intentio con- solidandi cum linctu ex holo armeno & syrupo ros. vel melle, vel hoc gargarismo. *℞. aqua decoct. rosarum rubearum, gallar. myrrill. lb. j. rhuis, sangui- nis draconis, sarcocollae ana ℥ ss. syr. ros. ex ros. siccis ℥ j. miser, fiat lenis gargarismo: puluerem nonnulli addunt pilorum leporis combustorum & pulue- rifactorum ℥ j. misce.*

OBSERVATIO XXIV.

De angina in pus mutata & ad pulmonem & pectus con- uersa, agram pene suffocante.

Iohannes Themistocles Alcmarianus, cum an- num quadragesimum fere compleuisset, capi- tisque morbis tum praecipue catharro obnoxius esset, in grauem & desperatam anginam sub fi- nem mensis Maij anno millesimo quingentesimo quadragesimo sexto lapsus est, adeo, ut pocula sumpta per nates resiliunt: aderat autem huic & dolor capitis & febris continua; per tres iam dies opera tonsoris & muliercularum remediis vlus fuit, donec suffocatio immineret: me tunc prius ex Gallia (in qua tunc praesens exercebam) in patriam reuersum, vocauit. Guttur autem, uti conspeximus, tam intus quam extra graui tumo- re afficiebatur: oculi vertebantur eidem, & valde rubebant prominentes; non aliter quam iis fieri solet, qui laqueo strangulantur, voce impedita, locum quod eo tempore referuatum erat, rubro colore tingebatur, pulsusque tenuis rarusque apparebat. Tonsor, qui illi in cura assisterat, ni- hil aliud quam collo stercus ouillum aceto fri- ctum iniecerat, vena sectione tum diuersioni-

bus praetermissis. Clysterem statim iniiciendum propono: verum aegro non admittente, glande alius irritata est, & vena cephalica secta in bra- chio: & cum nec linctu, nec gargarismo uti pos- set, emplastrum quod leniret doloremque seda- ret & resolveret, impositum est. Post meridiem atque sub noctem redij, cum amici suffocationem metuerent, agram sacerdotibus commendantes, qui eundem sacra iniunctione tanquam hiuc emigraturum Deo commendarunt. Hora nona noctis denuo reuersus (tales enim frequenter aduen- di & inuendi, ex Hippocratis diuissimi decreto, ut tempore accidentibus, si quae occurrant, subuenire li- ceat, ut in libello. De honestate constat) sub lingua, cum eandem extendere non posset, libenter san- guinem detraxissemus: quod cum fieri non pos- set, eius loco tentauimus adhibere cucurbitu- las scapulis cum scarificatione. Verum sedendo cum ex leui motione, oculi conuerterentur, faciesque in liuorem & viriditatem mutaretur, tanquam laqueo iniecto suffocationem denuo subiret, ab hoc genere remediorum abstinere coacti fuimus. Iterum emplastrum emolliens & resoluens nido hirundinis cincto, tumori im- posuimus. Quarto die inuenimus tumorem aliquo modo laxiore, & dolorem imminutum; quam- quam nec deglutire, nec gargarizare posset. Cum enim ad suppurationem malum tendere videba- tur, eo die, tum etiam quinto emplastrum magis, magis maturans imposui. Sexto liquida quaedam deglutit cum difficultate; & ex cassia & diaca- tholico cum decocto pectorali exhibita, bis alium deposuit, multaque liquida & viscosa de- ieit. Interea neque gargarizare, neque caput mouere poterat: quamquam postea ius pulli & serum lactis pitillando deglutiebat. Septimo au- tem die prius gargarismo uti potuit leniente & maturante: & cum à meridie tumor fieret laxior, febrisque minueretur, iam maturato apostema- te, externo tumore imminuto, rupturam inter- nam metuius in noctem subsequente. Quare ne ex multitudine materiae in pectus forte illa- bentis suffocaretur, admonuimus ut capite decli- uiori decumberet, neque supine inter dormien- dum subito in pectus irrueret, necemque subita- neam inferret; idque assistantibus in mandatis cum dedissem, ne etiam dormirent, vel agram neglectim haberent, in multam noctem ad eum reuersus, postea discessi. Post mediam noctem, cum aeger somno graui detentus supine cubaret & neglectim haberetur, eidem per se abscessus ruptus est, qui antea nullo modo attingi poterat: materia per asperam arteriam vnico momento in pectus defluxa, pulmonem & cor suffocabat, aegro subito à somno excitato, ob dolorem à duo- bus fortibus viris in lecto idem contineri non potuit, motuque vehementi inordinato clamans, se nunc suffocatum iri: non sine ratione, ex Hip- pocratis sententia, angina ad pulmonem versa, ut latius in scholio explicabimus, cito interficit. Cum itaque materia subito in pectus collapsa es- set, potissimum inclinans in latus dextrum, cum tanta torsione, angustia & dolore, ut se iamiani suffocari continuo clamaret, Astantes me ex le- cto reuocarunt: enema (quod antea admittere volue- rat, nunc vero dolore & metu mortis compulsum admitte- bat) statim iniicere iubeo: quo & alium mox de- posuit, ad subitanam materiae retractionem, multaque foetida & valde corrupta excrementa vna cum ventositatibus expulsis, deiecit: ita ut leuamen sentiret multoque liberius anhelitum ducere posset. Tunc quoque de vena basilica ciuf- dem

dem lateris in brachio aperientia mentionem feci: sed cum ob debilitatem non annueret, lotium medicamentum etiam adhibeo, ad materiam purulentam absterfionem (si qua in gula aut stomachi v. l. inhaerere) ex decocto hordei communis & melle rosato, paratum. Deinde indefinenter absque ulla intermissione ad materiam in pectus delapsam dispositionem resolutionemque (nam hoc praesidium pro sacra anchora mihi solum relictum esse putabam) ut sequenti fomento vteretur, mandabam: ℞. florum chamemille, meliloi, summitatum anethi ana m. j. foliorum maluae m. ℥. seminis feniculi: anisi fenugreci ana ℥. ss. fiat decoctio in aqua communi pro fetu: panno laneo calido intincto & expresso, locus dolens continuo fometetur: quando astantes ab illa fomentatione abstinere, aeger quodammodo ex copia materiae suffocabatur, ac dolore intolerabili augebatur. Rursus adhibito fotu tam in pectore quam in latere dolente, melius spirabat, & alleviationem sentiebat. Locum quoque inunximus tam ante fotum quam post ex oleo chamemelle, anethino, liliaceo & axungia vituli ac felis simul commixtis, alio prius irritata per clysterem, ut diximus, & absterfuo medicamento exhibito: hunc bolum quoque deuorandum dedimus. ℞. cassia recens extracta ℥. j. pul. diaireos simplicis ℥. ss. cum zaccib. fiat bolus, quo quatuor sedes habuit putridas, purulentas, mucosas multum tumque foetentes pituitosasque & nonnihil biliosas; fotum & inunctionem nondum relinquentes. Decimo die melius habere cepit, vrina crassiore euadente, & materia in pectore prolapsa ad hepar per venas emulgentes in renes, & deinde per vrinam transmissa: eamque expulsionem adiuvando, hoc sequenti diuretico paulatim melius habere cepit: ℞. radic. feniculi, petros. apij, glycyrrhizae vase ana ℥. ss. hordei communis p. j. cicerum rub. ℥. iij. coquantur in aqua communi pro ℥. j. colatura addendo mellis rosati ℥. iij. misce. Pro cibo tunc ceruisiaria panata, exiguo butyro adiecto, zaccaro, & paucio vino immixto, commode utebatur: & vndecimo die adhuc melius habuit. 12. die rursus ne materia in pectore remaneret, cum ℥. j. diacaboli in ℥. iij. decoct. pectoral. soluti, addita ℥. j. mellis ros. colati. Tandem 13. die melius dormiens, ac sudore effluente ac pectore per syrupos pectorales repurgato pertusum 14. die fuit liberatus, & septimo die egregie curatus post apostematis eruptionem; neque empyemate in pectore subsequente: quod aliquando subsequi solet, ut in scholijs latius dicemus.

SCHOLIA.

Quam perniciosa sit permutatio anginae ad alium locum, facile ex hoc exemplo praehabito cognoscitur. Si enim, ut recte dicebat Mesue, declinat in occultum corporis, sicuti est raptus eius proprie ad pulmonem & cor, interficit quidem: sed ad cor confestim praefocatur, ad pulmonem non subito, sed in septem diebus; quos si effugiant, per suppurationem euadere possunt. Id quidem & diuissimus Hippocrates testatus est, aphor. 10. lib. 5. sic dicens: Quicumque ab angina liberatur is ad pulmonem vertitur, & in septem diebus angine ad pericardium; si vero has effugerint, suppuratur. Galenus in Commento dicit hoc fieri aegro strangulato: & talis sermo est de transmutatione anginae ad pulmonem: quod si septimam diem transeat, fluxione in pus conuersa sit suppuratio. Et tertio prognosticorum: si in pulmonem conuersio fiat, demen-

tiam parit: sumque ex ea magna ex parte purulenti. Si igitur angina tumor discutitur sine sectione vel pure per os non exeunte, iam suppurata, & detumescit locus non facta manifesta euacuatio: ne; signum est materiam raptam esse in alium locum: si vero ad pulmones, specialius ostendit pulsus magnus, vndosus cum tussiculatum equidem peripneumoniam parat vel empyema, aliquando pleuritis & pleuritidem; si ad pleuram rapitur, tunc pulsus durior erit; sed plerumque, ut auctores scribunt, in peripneumoniam mutatur: & procul dubio, quia aderat postea tussis, nisi hoc modo pus subtilius per fotum euasisset, materia in concavum pectus illapsa, aeger in empyema transisset. Verum cum antea dixerimus ad diuersa loca posse permutari, non solum ad loca iam dicta, verum etiam ad cerebrum rapitur materia: tum statim dolores capitis mentisque alienationes subsequuntur & phrenitis. Si vero pulsus diuissimus fuerit, ad nervos factam esse conversionem demonstrat, quod & spasmus nervorum denunciat. Stomachi vero dolores nauseaeque insolitae ad ventrem materiam esse deriuatam, certum indicium est. At si denique pulsus misere subducitur cum cordis palpitatione, naturalis calor dissolvitur, cum defectu animi; ad praecordia materiam pestilentem peruenisse, nota est: Cum enim cor attingit, syncope subsequitur, tremor & calus virtutis, deinde mors cita. Si ad cutem, dolor in cute excrefcit, durities minor, & rubor ad exteriora tendunt, si materia sit calida, potissimum cum remissione noxae, quae ab angina fiebat. Si itaque permutetur (quod cognoscitur, ut diximus, ex tumore delitescente & dolore euascescente) circumspicendum diligenter ad quod membrum vertatur. Si enim in partem ignobilioris vergat, quemadmodum ad cutem, adiuvanda erit permutatio, apponendo exterius emplastrum attractivum: in quibus ut ponatur fermentum, ac emplastrum de sinapi solo, aut mollioribus immixtis: cum enim tumor in extimis partibus se monstraverit, ad eas partes trahendum est malum medicamentis attrahentibus, & cucurbitulis, etiam scarificatione adiuncta si res urgeat: & hoc opus vere dicitur translatio. Et collum, inquit Rhafes, epithemetur ex melle anacardino, & est remedium attractivum: eius loco & nunc quidam sinapismo vtuntur vel vesicatorio, quod fermentum & cantharides recipiat, quo & nos aliquando commode vti sumus. Si autem ad membrum nobile conuertatur, illud roboretur ne recipiat, sicut cerebrum aut caput, oxymelino fronti ac temporibus admoto, vena cephalica secta, & eodem modo, ut phrenitis curatur. Si per gulam ad stomachum repat, materia repurganda, ne villis stomachi inhaereat, si ad spiritalia, ex basilica vena euacuatio perficienda, & venter leniendus, prout materia exigit: si ad cor rapitur, cor roborandum pectusque cordalibus iuvandum: quamvis tales fere semper occumbant: si ad pulmonem sit conuersio, curatur ut pneumonia. Ita nos cum subito pus in concavitate pectoris sese recepisset, post diversiones, fotum commode vti sumus: & ne quid pectori inhaeret, etiam pectoralibus vtens, quae tussiendo materiam expectorarent, commode iam dictis ingenijscutatus fuit. Interea (quod iam pene omiseram) ad deterfionem ulceris in gutture, gargarismo detergente & abluciente vsum, mox & consolidante. Deo auxilium nobis praebente, tandem curatus fuit. Ita, ut ex hac eccellente curatione non exiguum honorem & amicorum copiam

piam & vulgi fauorem adeptus fuerim in primo aggressu praeceos meae in patria: adeo, ut infinitis ex ciuibus nostris innotuerim: utpote cum multis constaret de eiusdem vitae discrimine; cum & senex medicus Aemilius cum audisset subito materiam ad spiritalia membra collapsam, mortem praedixerat; ita, ut huius felicitis curationis apud multos percrebuerit fama, quod omnem fere hominum opinionem: licet naturae forti, iuxta Hippocratem, nihil sit impossibile, cum & sanicem per ossa expellat: quae tamen licet fortis sit & mirabiliter operetur, eadem tamen saepe medici adminiculo indiget: quemadmodum & in hoc aegro tamquam deplorato: ut enim melius fieret transpiratio per poros, opus erat fotu & inunctione & ut materia per alium & vrinam auerteretur, similiter indigebat medicamentis hanc expulsionem iuvantibus; alioqui sine dubio aeger cum natura forti succubisset, vel saltem ad empyema devenisset: Ars enim, teste Hippocrate, cui & Galenus consentit, recte naturam operantem imitatur: hanc igitur adiuvare oportuit. Quibus intentionibus, facta suppuratione & ruptione, vlcus si remaneat in gutture, quomodo repurgetur & consolidetur, iam dictum est. Verum si Angina terminetur per indurationem, tunc partibus subtilibus resolutis & crassius remanentibus sit alienatio, & decrefcit febris, ac reliqua symptomata minuuntur, & remanet tantum gravitas & dolor, ac impedimentum deglutitionis, aut anhelitus, longo tempore & fortasse per annum, & quia materia in lapidem mutatur. Sic Galenus lib. de partibus interioribus refert, quendam diu tussi vexatum, viscosa quadam exserendo; qui postea calculum grandis similem extusivit cum conatu violento, ut pene suffocari videretur. Haec rarissime contingunt: sicut & alij quidam quasi frusta carnea strangulantia (ut nos aliquando vidimus) expectorauerunt cum violenta tussi & stertutamentis forti adiuta. Ita sorcula à me curata (ut alias dixi) lapillum sub lingua concretum expellebat. Si itaque apostema (quod tamen rarissimum est) induretur, curabitur emollientibus exterius admotis: ut diachilo cum gummis, emplastro de mucilaginibus; fomentisque emollientibus, gargarismis quoque vim emolliendi habentibus, linctu quoque simul molliente: & summatim curabitur ut reliqua apostemata dura & scirrhusa. Si autem putrefiat, increfcit febris, & caetera accidentia augentur, & partes putridae, quae sensui subiacent vel visui, liuent, foetent ac nigrescunt, id plerumque fit ob multitudinem, aut materiam malignitatem, si & locus viridis appareat. Haec similiter rarissime fit. Si vero fiat, vniuersalibus remedijs insistendum; venis etiam sub lingua sectis, si consultum videatur: & locus scarificandus, qui iam putrescere incipit, modo illum attingere possimus, ut materia putrefacta & corrupta egrediatur vel absumatur. Deinde aeger gargarisari debet cum aceto calido salito aut oxymelite, cui plus aceti immixtum sit, deinde retuliquum curationis absoluendum, ut de aphthis exedentibus dictum est. Si vero interficit absque alijs supradictis terminationibus, quod neque resoluitur neque supporetur, induretur aut putrefcat, tunc hominem occidit, vel qui corpus non nutritur, hoc ipsum deglutitione impediens, vel praefocatur anhelitu intercepto. Quamquam in quibusdam in angina, praecipue latentem

te, post mortem (ut in lanione, ut refert Dodonaus cap. 18. in suis Observat. qui circa laryngem & fauces dolebat, & in deglutiendo cibo ac potu difficultatem habebat) aperto corpore reperta est pulmonis substantia in pus conuersa, & ad vnum eius latus abscessus pure quoque impletus. Nulla tussis huic antea fuerat molesta; neque sanguinis vlla sputatio praecesserat; sano validoque corpore eousque visus, eoque non gracili sed obscuro. Idem in aetate anni 1565. diligenter annotavit multos angina & molesta ex capite destillatione correptos; praesertim ex his qui praecedente hyeme vel tussi vel rauedine laborassent, aut peripneumonia euasissent; plurimis horum posteaquam circa laryngem dolor remissior tandem desisset, peripneumoniam successisse, cum lateris dolore, non tamen pungente, & respirandi difficultate & pulsu molli. Horum non paucos intra non multos dies mortuos animaduertit; seniores euasisse & frigidiores. Horum autem pulmones vel purulenti fuere vel abscessum habuere; iuxta vero laryngem, aut eius musculos, nihil occurrit, quod vel adesse vel adfuisse inflammationem ostenderet, satis quidem apparuit, pulmones male affectos, superueniente ac accedente & capite destillatione, reliqua symptomata successisse; laryngem vero non primario, sed per sympathiam, siue consensum, laborasse. Verisimile vero & est, inquit idem, destillante humore asperam arteriam, eiusque ramos impleri atque distendi: deinde eodem ad alia vasa transmissa, à dolore liberari quidem asperam arteriam, ac eius supremum finem ipsam laryngem; pulmonis autem male affectas partes à dolore occupari: atque hoc modo ex angina in peripneumoniam per mutationem fieri. Subuenit huic morbo mox, si vires ferant, venae sectio: ita enim citissime impetus defluentis humoris & aueritur & compescitur: deinde quae lenire asperam arteriam & pulmonem queunt, ac sputi facilem exitum procurare: quibus & nos etiam postea vti sumus, cum angina in pectus decumberet, quamquam statim expurgaretur, materia collapsa, ut neque empyema, ut plerumque fieri solet, tunc etiam dulcia, ut glycyrrhiza, eiusque decoctum conueniunt, ut vix passae, vinum passum, aqua multa, vinum multum dilutum, si febris abest: & alia eius generis, quae à Caelio Aureliano commendantur. Astringentium ac repurcutientium in hoc morbo vsum inutilem: aceti vero etiam perniciosum. Et ita omnem anginae curationem absoluiamus: quamquam alij addunt & correctionem symptomatum & accidentium, quae eam subsequuntur, ut vehementiam doloris, difficultem deglutitionem & anhelitus attractionem; quibus & tertio adiungunt synocem suffocariuam. Dolor quidem corrigitur anodynis, humidis quoque & mollientibus ac dolorem sedentibus exterius correctio, admotis: in calida cum solis malua, oleo viol. gallinae pinguedine: in frigida dialthea cum oleo amygd. dulc. cum butyro & croco, muccag. sem. alb. fenugr. cum oleo liliaceo, chamamel. de meliloto; interius cum lacte tepido gargarisato cum syr. viol. & bord. decoct. viol. & similibus, in calida, in frigida cum decoct. vuar. ficuum, flor. chamemill. &c. praecedente tamen venae sectione, cum alijs iam dictis. Difficultas deglutitionis & anhelitus attractionis, si materia crassa viscida, cum decoct. aliqua ex dictis in materia frigida, addito oxymelite simplici: si subtilis sit humor, cum decocto in materia calida conue-

niente, adiectis inersantibus, syr, viol, iuiubino & quæ magis expectorant. Syncopi occurrunt, inexta *Asicennam*, nempe suffocatiua, clysteres acuti, sectio venæ sub lingua, & aliæ diuerſiones. Reliqua vide apud *Arculanum*. Nunc itaque ad alia genera præfocationis veniamus, quæ gutturi ac gulæ obſtrungunt, quæque è laqueis iniectis vel aqua immerſis, vel fumo ſuffocatis, quæque gulæ inhærentibus deuoratiſque obueniunt.

OBSERVATIO XXV.

De quodam qui laqueo iniecto collo ſe ipſum interfecerat: & de alio qui ſeipſum ſuſpenderit.

Sartorem noui Alemarianum (qui adhuc uiuit ſedum hæc ſcriberemus) qui quotidie ceruiſia ſe implebat ebriofus; cumque ob eam cauſam ab vxore obiurgaretur, neſcio qua furia exagitatus ſartor, miſer laqueo collo iniecto ſeipſum ſuſpenderit. Quod cum videret vxor conuocauit vicinos, qui præſecto fune, vix ſpirantem ſartorem à laqueo liberarunt: cumque illi extinctum cum putarent, ſartor adhuc ebrius rauca voce inquit, *Non ſum mortuus*: & ſic vitam ſpirans, præſentibus omnibus riſum concitauit. At alterum noui, ſed (pro dolor) melancholicum ex deſperatione, qui cubiculum in altiori loco poſitum ſolus cum aſcendiſſet, cupam ceruiſiarum conſcendit, & funem trahi alligabat, colloque ſuo iniiciebat: deinde pedibus dimouens cupam, vitam ſuſpendio finire decreuerat. Verum mater, quæ tunc in inferiori loco domus erat, cupam cadentem cum audiret, ſubito cubiculum aſcendit, ſpectauitque miſera filium pendulum, mox conuocatis vicinis; qui & præſecto fune filium exceperunt ſatis annoſum: & is inter remedia (dum nunc muſcatam, cinamomum, contrita, in os ſuffocati inſpirant) reuixit.

SCHOLIA.

Si quis laqueo ſuſpenſus fuerit, ita quod ex ore ſpuma exierit, ut inquit Hippoc. ſalutis locus relictus non eſt, & res in ancipiti habetur. *Ætate noſtra* (inquit Benediſtus Veronenſis) cuidam militi inter hoſtiles incuſſiones id contigit, qui ligatus poſt terga manibus à duce Venetorum Franciſco Sfortia, ramo arboris & collo deligato fune (à tergo enim dux ipſe militem ad arborem ſuſpendio delectam duxerat) concitato equo, ſuſpenſus pependit. Diſcedente duce, milites præſecto fune, vix ſpirantem militem exceperunt: qui inter remedia reuixit, & oborto collo militiam ſemper exercuit. Iſis gargarifandum violaceum cum aqua tepente ſæpiſſime dari tradunt, ac ex ſimilagine liquidas potiones, aut ptiſana: & à multis abſtinere verbis ſuadent: Vel reuocantur, iuxta *Ætium*, aliquando ſuffocati, aceto ori inſuſo cum pipere & ſemine vrticæ: verum diſſiculter tractari poſſunt ut admittant: cogere itaque oportet, ac ori inſundere, vomitionemque irritare. Rubore autem circa collum diſſoluto, ſtatim reſpiciunt ac relaxantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato collum aſidue circumcirca eſt amplectendum.

OBSERVATIO XXVI.

De quibuſdam aqua ſere ſuffocatis, & iſſdem ad vitam reuocatis.

Inſantula ſupra duos annos nata, nondum tertium annum attingens, apud ceruiſiarum Delphis habitans, pro cuius cupis clauſes pro inſignierant, anno 1564. Martio menſe in vaſculum aqua ſaponis plenum, in quo linteamina lata erant, cecidit: illaque aqua tota intus repleta, animam agere videbatur, alit dormiebat, ſtertebat, anhelitum vix trahens ſuffocabatur, mutum quodam obrepente oremoni (ut vocant) ſimili, quale in morientibus apparere ſolet: adeo ut aſpera arteria oppleta vix aërem admitteret, forſaque expelleret. Adhuc caſum accitus, iubeo ut decoctum hordei non excorticati, glycyrrhizæ & ſiſcui, adiecto exiguo butyro & ſaccharo, continuo obruderetur; idque tepide: & ita vomitu leui irritato, puella totam aquam ſaponicam cum etumuliſet, illam paucis horis à ſuſſione liberaui. Mater autem, niſi inhibuiſſem, vinum Rhenanum propinaſſet: quod equidem, naturæ amicum, non ſolum materiam venenofam, quæ ſaponi inieſt, ad cor facilius perduxifſet; verum etiam facile inflammationem & febrem induxiſſet. Pons ligneus qui è regione domus ciuicæ conſtructus, cario quaſi conſumptus, anno 1577. cum miles quidam in aquam inciderat, multitudine hominum tam puerorum quam puellarum, ſupra pontem ituentium aduolante, ut ſpectarent quid ageretur, ſubito in aquam collapſi, inſiniti aqua obruti de vita periclitabantur, ad quos cum vocatus eſſem, ſalutem aduehant, ſumpto decocto ex noſtro conſilio, ſorum chamæmillæ in ceruiſia decoctum; quo ſudorem in lecto poſitis prouocauimus: inter quos erat filia Hugonis Iacobi pharmacopœi noſtri annos 20. nata, quæ etiam infans è dum in aqua iaceret, in vlnis habebat, diu extra mentem ſine loquela perſiſtens: quam veſtibulis abſciſſis, cum ob humiditatem exui non poſſent, in lectum collocauimus calidum, & iuſſimus ut puella nuda eam amplecteretur: etiam decocto ſorum chamæmillæ cum ad ſe rediſſet, ſumpto, hoc modo ſudorem euocauimus; quod & aliis commodè fecimus, ut omnes ſanitatem recuperarent.

SCHOLIA.

Naſtragos Aëcius uti ſuffocatos laqueo, ſimili modo reuocat, modo reſpiratio adhuc in eis ſeruetur. Prius autem, inquit, capiti eorum ſonum emittere conuenit (ut nos quoque ſecimus antequam decoctum ſorum chamæmillæ præberemus) ac cogere, quo abſorptam aquam euomant, ſine pinularum ſeu digitorum irritatione: forinſecus vero manuum impoſitione iuuare oportet ventris firmitatem. Si quis item aquæ immerſus extinſus, ronenſis, cruribus protinus ſuſpendi debet: illud tamen ſubinde ſuſpectum eſt; quale etiam illud vulgare conſilium rotationis ſupra eupam, ut ſic aquam euomant: verum talem motum ſic exanimatus ferre poſſunt: ſed quod deinde reſert eſt magis tutum, animam ſcilicet ſuſcitari hyeme, calido conclauis, ſuſſitionibus bene olentibus; quaſi muſcus eſt (modo non ſint puellæ malis veteris obnoxie) ac lignum aloes, quod in deliciis nunc cremari ſolet, pretium eius in libras aureis binis, torno poliane

poliant lignum in baccas, quas ad ſacras orationes ſuperſtitioſe conſuunt: quale apud priſcos eſſet, non liquide comperimus: probatur gummoſum, ac graue bene olens ac nigreſcens, carioſis lignis ſimile, ad medicinas expetitur. Interea quæ cordi profunt ſorbtiones, exinde ex ciceris farina cum lacte offerri ſolent. At ſalubrior eſt carnis eraticula, aut veru aſſæ ſuccus cum oui luteo. Quidam, poſtquam vires recollerit æger, ſanguinem demitti iubent ex iecoraria vena, ac clyſteres ſingulis diebus inſundunt. Sic ego aliquando præ manibus habui aliam puellam ſupra nouemdecim annos natam, quæ cum ex curru cecidiſſet in aquam putrem & corioſam, & eam non ſatis euomiſſet, neque medicum adhibuiſſet, poſt duas ſeptimanas dolore inſigni in lumbis & renibus, & febre continua quamuis lenta ſine ordine augeſcente correpta fuit; ſanguine ex vena baſilica detracto & purgatione commoda adhibita, & ventriculo corroborato etiam conualuit. Memini ſuffocatos quoque in nauis duos vel tres, in qua ceruiſia conſoſa erat, cum exitum non haberet. Et ita iſtis diebus nauæ puerum habui ex fumo pene præfocatum, qui ſubito extractus quaſi mortuus, in domum ceruiſiarum deportabatur: quem & nos bonis odoribus recreauimus & reſtituimus. Ex fumo aliquando ſuffocatio obrepit, in iſſedibus, qui carbone pro igne vtuntur admodum male olente, vel in loco conſoſo, ut aër libere trahi non poſſit: quemadmodum narrat Matthæus de Gradi ſuo tempore Medioli contigiſſe in duobus fanulis cuiuſdam pharmacopœi, qui hoc modo ſubito extincti fuere. Huius moris cauſam Eraſtriſtratus assignabat, quod non poſſent ſpiritus continere præ nimia ſubtilitate: contra Galenus, quod ſienti cibi quidam, ut panis, olerum & ſimilium nobis familiares ſunt; quorundam vero, ut cantharidum, leporis marini, qualitas nobis extranea eſt: ita & exiſtimat aëris quandam nobis eſſe familiarem ac ſpiritus amicam qualitatem; aliam vero extraneam & corruptentem ſpiritus. Cæterum ut res ſe habet, poterit fortasse & ex alio fumo non corruptente fieri præfocatio. Et ideo Haly Practicæ ſuæ lib. 6. c. 4. inquit: Qui autem ex fumo fuerit ſuffocatus & diſſolutus, ſi ab eius ore ſpuma exierit, nulla via eſt adeo ſalutem: cui autem non ſic, violatim gargarif oleum, & aquam tepidam, ſorbtionem ex ſuſure: atque à clamore arceatur, & verbis multis, quod ex laqueis antea ſuffocatis vtile eſſe diximus. Curabitur quoque calidum & impinguantium correptione, id eſt, multum nutritiuorum, ut quidam interpretantur. Pinguia quidem, ut mihi videtur, ob ſumi acredinem præſcribunt. Sufficiens quoque ex aromate cordiali frigidiſque admixtis conuenit: ut eſt nymphaea, papauer ob qualitatem manifeſtam fumo reſiſtentem, quæ calida & ſicca eſt. Quidam & hic poſt duos dies ſectionem venæ imperant. Tales autem & qui in aëre ſectido conſuſi ſunt, ſtatim ad aërem apertum deducere oportet, & odoribus bonis reſtituere & reſicere.

OBSERVATIO XXVII.

De muliere cui in conſillis ſpina piſcium inhærebat, pene ſuffocationem inferente: & de altera quæ acum deuorauerat.

Mulier Delphenſis vetula cum ſpinam piſcis deuoraffet, conſillis inhærebat, ut pene ſuffocaretur: quæ neque villo modo dimoueri poſuit, neque potu largiore, neque cibis mollioribus, aut offis aut magno panis bolo, cui aliquando inhære ſolet. Quamobrem ecligmata emollientia ex muccagine ficuum, rad, althææ, ſeminis malmauiſci, vuar, paſſul, ſebſten & iuiubarum cum ſyr. violaceo conſecta ut continuo lamberet, imperaui. Deinde cataplaſmata toto gutturi circumducto, ſpinam ſectione tandem euulſam reddidit. At mulier illa quæ acum deuorauerat inſcia, gulæ inſixa cum diu inhærebat, nullis remediis medicorum illuſtrium, neque noſtro conſilio poſtea vtens curari potuit; ut tandem miſera tabe obierit.

SCHOLIA.

Memini quendam Alemarianum, qui longo tempore cum valetudinarius eſſet, nec eum alij curare poſſent, & aciculam deuoraffet, cum aliqua remedia adhibuiſſemus, quæ vias lubricas facerent, ut deſcenderet, aciculam poſtea deuorata emiſſiſſe quod minus admirati ſumus, cum & Langius id in iuuenula etiam eueniſſe ſcribat lib. 2. epiſt. 40. Sed & Alex. Veronenſis, reſert lib. 2. *Actus per Anatomiæ ſuæ, c. 9. mulierem Venetam, acum crinalem, qua cirri capillorum intorquentur quatuor digitorum longitudine, quam obdormiſcens in ore detentam deglutierat, decimo tandem menſe emiſſiſſe. Beniuſius quoque De abdiſtis morborum cauſis cap. 20. mulierem æneam acum & deuoraffe, & poſt decem annos perforato ſtomacho extruſiſſe ſcribit: quam & ipſe vidit & curauit. Cæterum, ſi in aſperæ arteriæ extremum, atque ipſam adeo aſperam arteriam, aliquid eorum quæ deglutiuntur delapſum, tumorem induxerit, tuſſis prouocanda eſt, per acetofam aliam quam qualitatem, & ſternutatorium quoque naribus admouendum ex vehementi enim agitatione & inſtantia, ſpiritu ſimul expulſionem adiuvante, eiufmodi conſueuerunt excerni. Si vero iuxta conſillas (inquit Aëcius) aut iuxta principium ſtomachi ſeu gulæ, ſpinæ aut offa fuerint inſixa, ita ut oculis ſubiaceant, atque plurima ſui parte extra conſillas promiſceant, velleſſa apprehenſum extrahere oportet. Quum vero in inferioribus gulæ locis adhæſerit, hoc modo educatur: Spongiam paruaſſimam terebinthina madefactam, aut carunculam crudam recentem excuſpam, vna cum ſilo valido ipſiſſimo alligato, deglutire coge, & mox comprehenſam per alligatum ſilum riuſus extrahere. Hoc enim modum ſæpe etiam id quod inſixum fuit, ſimul extrahi conſuevit: conuenit etiam panis recentis interioris bucellas deglutiendas exhibere citra com manducationem; non tamen penitus diſſoluram. Quum a. ad fundum vſque ipſorum corporum penetrarit, neque extrahi potuerit, aqua muſſa gargarifanda exhibeatur, & cibi ſorbiles, velut ptiſana cum melle, aut halica ſimiliter: aut micæ aqua muſſa calida macerata offerantur: forinſecus vero ceruici atque vniuerſo collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet ſimiliterque cataplaſmate calido laxante & deprimente collum contegere conuenit: velut eſt id quod ex ſemine lini cum aqua muſſa apparatur. Hoc enim ductu tum locus ipſe ſuppuratur, tum ſpina commota ſimul cum his quæ deglutiuntur, deducitur.*

OBSERVATIO XXVIII.

De quibusdā rebus solidis deuoratis & gulæ inherētibz.

Concupina cuiusdam nobilis, cum in ultimo mense partus grauida foret, poma cruda im-
matura, quæ à diuo Ioanne nomen habent, cum
avidius sine masticatione deglutisset, gulæ ita in-
farsita sunt, ut nocte pene suffocata, voce quoque in-
totum suppressa, anhelitu impedito, animā agere
videretur. Ad quam noctu euocatus, speculo in os
immissio nihil quicquam in gutture inspicere po-
tuit. Permanerat in tali angustia, & sine voce per
duas horas: sed cum forte fortuna prope lectum
animaduertissem poma illa cruda adesse, interro-
gauī, numquid ex iis quædam deuorasset? annuit
autem, cum eloqui non posset, digitoque monstra-
bat in gutture hæere: cum neque per os ceren-
tiam sumere posset, ea ipsa ad nares regurgitante,
oxymel continuo lambendum dedi: quo rictibus
emissis, tandem per continuum usum oxymelitis
pituita crassa per os excurrente, poma incisa per
acetum, in stomachum delapsa sunt; & anhelitum
ac vocem recuperavit & præter omnium opinio-
nem à præfocatione hoc præsidio liberata fuit.
Quæmadmodum & altera rustica mulier, quæ vl-
tra Sceldam fluvium commorabatur, annos supra
quingenta nata, quæ & avidius frustum carnis
fumo indurata deuorauerat: quod cum non pro-
be masticasset, & subito inglutisset, æsophagum
transire non potuit, gulæque infarctum & forti-
ter hærens, suffocationem pene inferebat: adeo
ut neque tussiendo, neque verberando dorsum
(quod & vulgares recte in tali casu facere consue-
verunt) neque exire vel resiliere aut descendere
potuerit via æsophagi etiam præclusa per tres in-
tegras dies, nihil edulij aut potus sumens, ex fa-
me, sana existens, mortem expectabat. Verum
hæc ipsa omnis consilij experta me tandem acces-
sit, & quæ contigerant apud eam narrat, cum
recte loqui posset, cum in partibus meri (ut vo-
cant) paulo inferius frustum impactum esset.
Cum neque specillo immisso, neque candela cerea
attingi posset, iussi ut follicula cassiæ lamberet, &
lingua attereret, ut paulatim à folliculis cassia so-
luta leuiter in gulam dilaberetur: cumque à glan-
de alius soluta esset, & cataplasmate collo inter-
iecto ex folior. malvæ m. iij. flor. chamæmell. meliloti
ana m. j. radicis althææ ʒ. iij. decoctis in aqua ad molli-
tudinem confusis, adiectis farinæ semina. lini, sennæ
ana ʒ. ij. & medietate nidi birundinis, & olei chamæ-
mell. amygd. dulc. & butyr. quarto die cum tentaret
pituitando serum lactis, impetu quodam carneum
frustum in stomachum dilapsum est: & supradic-
tis præfidiis à dicto symptomate liberata bene
deinde habuit. Cum hæc agrotanti cuidam po-
stea narrabam, is retulit cum persicum malum
avidius deuoraret, nucleum seu lapillum gulæ in-
herentem eundem obstruxisset; sed cum mox co-
piofiori potu vnicō haustu vteretur, vi quadam
demissum esse in ventriculum. At postmodum in
longanone circa anum hærens, cum ingenti ven-
tris dolore, adeo vtribus diebus aluum minime
deponere posset, tandem impetu quodam bom-
bardæ instar, dum globuli emittuntur, per anum
erupit simul cum excrementis: quamquam ab eo
tempore pluitib. annis pus excernens in perpetuas
hamorrhoides vel potius condilomata inciderit,
ano ita per lapilli transitum læso. Cui tamen nunc

pleuritis laboranti etiam à me curato, apta pro
hoc symptomate pollicebat me adhibiturum re-
media: verum nunc à pleuritis liberatus, ea ne-
glexit, cum postea amplius me non accesserit, ne-
que à me visus sit. Memini vero & aliam puellam
annos 28. natam, 18. Septembr. anno 1582. parti-
culam carnis duræ & nervosam subito inglutisse,
eamque iisdem præfidiis à præfocatione fuisse cu-
ratam, cum die sequenti in stomachum delapsa es-
set. Ita quoque eodem an. 23. Decembr. filiam 23.
annorum Regneri ministri Delphensis cognoui,
quæ cum intestina bouilla dura & tenacia auide
comedisset, gulam obstruxerit, ut per tres dies ni-
hil deglutire potuerit: sed glande aluo irritata, &
collo prius inuncto oleo lilior. amygd. dulc. deinde
cataplasmate iniecto, ab eodem malo, ut præ-
cedentes, cum mortem omnes altantes timerent,
liberata fuit nostra industria, Deo adiuuante.

S C H O L I A.

In hoc affectu gulæ vel æsophagus læditur sed
obstructione, cum nullo modo deglutitio fieri
possit, sed nequaquam resolutione; de qua dictum
est prius cum de paraly si loqueremur, scilicet la-
ryngis & æsophagi: sed hic affectus morbum
quirit, nempe obstructionem in via. Plurima au-
tem gula persistentia multis modis hominem læde-
re possunt; imo & aliquando mortem inferre. Vt
mulieri euenit, cui cum chirurgus probam (ut vo-
cant) vel tentam cum in gutture laboraret, immi-
ssisset, ut paulo ante diximus, suo infortunio è ma-
nu dilapsa in gulam, postea in stomachum des-
cendit longitudine octo vel plurium digitorum
sed aliquot annis ibidem permanens (ut nos vidimus
cum nostro collega Cornelio Heydio, cum illam pro-
bam habere) tandem misere rabe obiit.
Narratum est nobis aliquando, lignum ad digitum
longioris crassitudinem & longitudinem deuora-
tum fuisse, & per annum in corpore retentum,
deinde ab eodem viro qui illud deglutierat in
templo sedente, torminibus ventris correpto, &
in domum eunte, aluumque tunc excernente per
sedem eiectum esse. Refert quoque Arculanus se
vidisse os acutum gutturi infixum tandem in sinu
duorum mensium per cutem exiisse. Illud etiam
memoria dignum videtur (teste Beniuenio) Mulli
præfocata cum ab omnibus pro mortua haberetur, & de
eius potius super quam vita cogitarent assistentes, pau-
latim quasi grauiore somno excitata, in molestam inci-
dit tussim; quæ cum diu agitata esset, diuiores tandem
carnis frustulum eiecit, & sanata est. Ita & Iulianus
medicus apud eundem vomitu frustum carnis ad
paræ pilæ magnitudinem, in quo vermis non
secus ac bruchus in siliqua recludebatur, reiecit
& ad pristinam statim reuersus est valetudinem:
hic tamen circa ventriculum cruciabatur prius
Frequentissimum quoque est (teste Benedicto Veronense)
voracissimos quosdam, ossa & spinas, lapil-
los, denarium, aut panis frustum & similia deu-
orasse: quod pueris sæpe contingit, unde dolor
ac spiritus agitatio percipitur, & alterutra cana-
licula oppilata hominem exanimat suffocando,
quoniam ij meatus vicinitate conueniunt: & quic-
quid per gulam transit immodicæ magnitudinis
arteriam quoque strangulat. Sic ego quoque me-
mini fratrem meum Theodorum Forestem tunc
puerum existentem plumbum rotundum sed de-
pressum, inter ludendum cum in ore teneret deu-
glutisse, tertio deinde die absque molestia deuor-
atum facibus per aluum reddidisse. Quod alium
mirum

mirum forte non videbitur, cum aliqui à prædo-
nibus vel militibus obfessi aureos nummos com-
primentes deuorent, quos postea rursus per al-
uum deiciunt. Illud tamen magis admirandum,
modo verum sit, quod narratur, quendam acumen
cultri prærupti deuorasse, acidem per posteriora
reddidisse: quamuis existimarem ferrum rubigi-
nem posse contrahere, quæ & intestina obludere
posset, licet rursus per fæces quæ continuo per
intestina exeunt, rubigo auferri posset. Interea
qualiacunque fuerint, quæ naturæ inutilia sunt
stomachum & gulam in transeundo facile lædere
possunt. Sic ego memini iuuenem quendam Har-
lemensē squillas viuas deglutisse (vulgares garna-
rem appellant) easque non solum in stomacho hæ-
sisse, & dolorem intulisse, sed tandem tabem &
mortem. Licet aliquos nouerim, acanthios fluui-
atiles (vulgo poschen dicuntur) duos deglutisse vi-
uos: tandem & tertium: sed sibi ipsi & præfoca-
tionem & mortem intulisse: quamquam & sacer-
dotem Alcmarianum quoque; nouerim, qui coctos,
pinnis ablatis, sine noxa deglutierit. Verum tales
helliones sunt, ut Bassus qui apud imperatorem
Carolum halecem interaneis ablatis, aliquando
cum ceruicia deglutisse fertur. Verum videntur
mihī tales temerarij: ut nuper quidam Alcmariæ,
quem noui, tres Daleros cum ceruicia vnicō hau-
stu per gulam demisit, & tertio die iterum per
aluum reddidit: quidam magna temeritate & in-
solentes & testes contractas, & vitrum contritum
deuorant, ita ut eiusmodi gulosi se aliquid
egregij præstitisse existiment. Quamquam vidi-
mus vel vini guttam vel acetii ob acridinem ita as-
peram arteriam torrisse: quos veluti strangulatos
excepimus, cum in alienum tramitem acris hu-
mor deerrauerat. Nonne stulti & temerarij iuue-
nes, qui in conuiujs pro delicijs, imo gulæ infer-
uientes, nudes auellanas integras cum vino ingur-
gant? immemores quod Anacreon poeta, ut fer-
tur, acino vix passæ deuorato strangulatus sit:
& Fabius senator Romanus in lacte pilo hausto.
Sic etiam matrona quadam (ut testis est Benedictus
Veronensis) Braxiensis inuito filio pilulam assumere ne-
gantis, digito imprudens in arteriam compulsa, qui protin-
us exanimatus in sinum iacuit. Nonne & piscis spi-
na sola transversa, fauces occupans, spiritus agi-
tationem facit? Iam & venena deuorata, ut postea
dicemus, strangulationem faciunt. Verum quibus
excitantur ex gutture, iam dictum est: ut sca-
pulis pugno percussis, tussi. De quibus vide Be-
nedictum Veronensem, & Rhafem, & Arcula-
num: qui etiam plumbum quoddam instrumentum
describit multis foraminibus peruium retis
instar, quo in gulam demisso, quicquid gutturi
inheret, attrahitur.

OBSERVATIO XXIX.

De crinibus vomitu eiectis & suffocatione inferentibus.

Filius cuiusdam fabri laterarij, qui in cygno ru-
bro Delphis habitabat, anno 1562. cum diu
tossillarum inflammatione & gutturi ac faucium
inflammatione laborasset, multisque remedijs
usus esset, & meam operam quoque frustra ex-
pertus esset, incidit in manus cuiusdam empirici:
& epoto medicamento nescio quo enormi seces-
su, vomitu tum violento subsequente, crines con-
glomeratos magna vi euomuit, in tantam angu-
stiam prius coniectos, ut se distumpi & in partes
lacerari clamaret. Erant autem crines rubri tam-
Pet. Forest. Tom. 2.

quam à barba rafa prius expullulante incisi val-
de curti, producti, mox in vnum conglomerati
eiecti, & à vomitu amplius dolorem in gutture
non sentiebat: adeo ut nunc sine dolore, quod
prius facere non potuit, quæuis deuorare & de-
glutire potuerit, quamuis & rascatione per ali-
quod tempus (ut vidimus) per sputum eiusmodi
minutos pilos per tres scilicet continuos dies ex-
pulerit, & nunc præter spem miraculose curatus:
quamquam vulgares adolescentem 22. annorum
veneficio seu incantatione affectum iudicarent.
Quicquid sit, eiectis crinibus præfocationem gut-
turi amplius non est perpeffus, & postea uxorem
ducens recte habuit. At aliam iuenculam noui,
quæ singulis fere mensibus crines conglobatos
vomitu admodum molesto deliceret.

S C H O L I A.

Non sine strangulationis periculo (inquit Bene-
dictus Veronensis medicus Valsignæ) euomuntur,
quæ fidem excedunt. Vidimus mulieres duas so-
cias & in ciuitate familiares, vna die malis, ut ar-
bitrati sunt medicamentis potionatas, quæ mon-
strificis exagitata vomitionibus miraculum præ-
bueret: altera acum crinalem ingentem, in mo-
dum hami implicatam cum capillo muliebri
plusculo, cum resequinibus vnguim inuoluto,
reiecit magnis conatibus, dum ea euomeret omni
nixa, nihilo pene minus strangulata iacuit, quæ
sequenti nocte obiit. Altera item capillamentum
muliebri, vitri frusta, cum canis caudæ pilosæ
tribus frustis arefactis, ita ut pene integræ caudæ
quantitatem, si vna composita fuissent, facile
adimplerent: Ter aut quater in eos conatus iacuit
anxio hiatu pene suffocata & moribunda. Vnde,
quæso Deum immortalem, eos efficaces effectus
inuenit mortalitas? Mox idem ait magorum
esse commenta, de his eundem perlegito, tum
Wierum ac alios qui de præstigijs demonum
scripserunt. Strangulati tamen, quocumque modo
fiant, non sunt relinquendi sine præfidiis, cū Ari-
stoteles tradat quosdam strangulatos in sepulchris
reuixisse. His addere poteris ea, quæ idem Bene-
dictus Veronensis scribit lib. 7. cap. 25. de reme-
dijs veneficiorum & inhærentis ossis vel spinæ.

OBSERVATIO XXX.

De puero aquam fortem bibente, qui præ ardore in gut-
ture suffocabatur.

Apod Gandauum puer (ut nobis relatum est)
Acum aquam fortem incisi bibisset, & gula
præ ardore occluderetur, adeo ut suffocationis
periculum immineret: medicus exhibuit mucca-
ginem cotoneorum in potu: & puer præter mul-
torum opinionem euasit. Refert Amatus quoque
de muliere quadam, cui sublimatum ad interne-
cionem datum esset illico id persensit, suffocatio-
nem incurrens & excoriationem: & euocato vo-
mitu sana euasit.

S C H O L I A.

Oesophagus tum gula iisdem fere morbis ali-
quando, ut ventriculus afficitur: quamuis De æsopha-
geidæ hi affectus magis peculiare sint, difficultas gi, gula &
degutendi, excoriatio, inflammatio, apostema, nri affe-
vlcus. Cæterum impeditur aliquando deglutitio
N iij ab

dictum est: si vero frigidum fuerit, febris nulla vel vix adest, dolor emissior magisque grauior; & quæ transglutuntur plus in loco affecto manent. Interea considerandum num in tota substantia Meri sit nocumentum; tunc enim cibi non descendunt nisi cum angustia, dolore, & per interualla. Si in parte inferiori, descendit quidem, sed quando peruenit ad partem affectam, non potest transire, ita ut infirmo videatur cibum ibidem permanere inuiscatus. Quod si tunc non fuerit apostema nec angina refertur ad intemperiem, quam sequitur tarditas deglutendi & tarda penetratio, quæ in omnibus partibus meri est æqualis, & sine dolore, teste Galeno: quem & Valerius, Gordonius & Constantinus sequuntur. Vel enim sit vitio partium circumiacentium in membris vicinis, ob dislocationem spondylium, anginam, spasmus; aut malitiam rei quæ euomitur & expellitur à stomacho; aut ob illud quod transglutitur, ut iam ostendimus prius exemplis. Et ideo si fiat ex proprio vitio Meri seu oesophagi; propter tria iam dicta cuenit: cur propter intemperiem nudam, aut apostematam, aut vlcera. Quamuis & alij quoque fieri velint à virtutis debilitate, in morbis vehementibus, vel in iis qui passi sunt morbos diuturnos, & in conualescentibus vel senibus. Si ex vlcere, iam diximus; si enim phlegmone ad suppurationem veniat, hinc tempore pus vel scretu, vel vomitione exit. Vlcus tandem his accedit, à quo dolor in aff. & parte acerbiore euadit, qui mirum in modum exacuitur, vel acre vel salum vel acidum vel acerbum quippiam vortetur. Omnis porro oesophagi dolor in spinam dorsum incumbit, in quam gula quoque reclinat, & adhærescit. Si ex dislocatione, sentitur dolor in collo, spondyliis, & patulis, & non potest iacere supra dorsum; dolor enim occupat locum affectum. Si ex spasmis, os clauditur, dolorque occupat mamillam, thoracem ipsum ac peccoris partes. Si ex angina, propria eius signa aderunt. Ita quoque à vermibus (ut quidam volunt) ex nocumento euomendi vermes, & de alia re deglutina: ita quoque de veneno tum aliis exemplis superius enarratis reliqua internoscuntur. Et licet raro oesophagus inflammationem, apostema aut vlcus incurrat, si tamen tale quippiam patiat, non potest fieri quin cor aut cerebrum aut vtrumque patiat; cor quidem ob vicinitatem, cerebrum per colligantiam. Iam quoque ulcerationes tam in oesophago quam ore ventriculi valde perniciose sunt, in iuuenibus & senibus lethales ut plurimum teste Gal. 5. De loco affect. c. 4. Ita & impedimentum deglutitionis ex mala intemperie frigida vel sp. (mo non recipit curationem, vel admodum difficulter, aegritudine existente confirmata. Si rigor aut tremor ægrum apostemate Meri laborantem occupet, ruptionem apostematis denuntiat & sanguis exiguus cum vomitu exiens, venarum rupturam notat ipsius Meri vel stomachi vel ex communicatione vlcum eorundem. Vlcus in Meri à vulnere magna ex parte lethale: ut ex Auic. constat, cap. proprio. Quod ad curationem attinet, quidam hic ante curationem passionum meri quædam generalia obseruanda volunt: ut cum meri & oesophagus & os ventriculi sint membra valde sensibilia, ideo neque fortia medicamenta aut mordicantia vel acra, aut acuta propinanda: ita & in eiusdem vlcibus acra, pontica, acerbata, acuta interducenda, cum vlcus irritent; emplastra quoque si quæ apponenda, id

quidem dorso fieri iubent. In apostemate calido quæ repletionem, nequaquam venæ sectio aut pharmaca omittenda, cibulque detrahendus; ut in angina dictum est, medicamenta quoque in ore detinenda, ut paulatim deglutita in gulam & oesophagum descendant ac ferantur. Vlcera præterea si curemus, medicinis consolidantibus & incarnantibus quædam viscosa & crassa adiungemus, ut efficiamus sit & leuis effectus consequatur. Si morbus fuerit quoque ex sola intemperie, sola alterantia sufficient. Si vero cum materia (quæ canon generalis existit) illam ipsam concoctam expurgabimus. Si itaque intemperies calida in causa fuerit, frigidis alteretur: syr. viol. nymphaea vel tur lacte acetoso bordeato, ptisana, lactuca, portulaca, & similib. & collum inungatur oleo cucum. bino, viol. mucag. psyllij, cotoneorum, & oleo viol. & similib. si sicca, victu humectante resumptio vtendum, oleo viol. exterius unguento, & amygd. dulc. sumatur fiat frig. syr. viol. vitatur lacte & balneo, eadem & his conferunt, qui ex debilitate hoc malo afficiuntur. Si à frigida intemperie, detur diatrixis, diacalamenthum, rosata nonella cum melle ros. syr. de betonica, & inungantur oleo laurino, costino, aliisque similibus. In temperie humida valet decoctum hyssopi cum melle, & ad maiorem exsiccationem, si opus est, detur hiera picta, vel confectiones magis exsiccantis. Si addit similiter materia calida & sicca, digeratur cum syr. viol. ex infus. ros. & detur casta fistula diaphan. simplex. Et si sanguis fiat venæ sectio, dentur syr. refrigerant. viol. de succo cucurb. cum herbis frig. lactuca portulaca. Si vna addit bilis, post syr. decocta humectantia purgetur, cum syr. ros. laxat. ex infus. viol. manna & aliis, epithymetur collum, emplastretr emplastris, & quævis oleis, infundantibus, viol. nympha. cucum. De quibus vide Constantinum & alios. Si sit apostema sanguineum, curationem obseruatione præcedente diximus; si sit biliosum, curetur, ut iam paulo ante admonuimus, & sicuti diximus de angina biliosa: si frigidum sit apostema, post decoctum hyssopi cum melle & syr. prassino, purgetur, cum diaphanico vel syr. ex infusione rosarum pallid. cum agarico. Deinde calida topica admittantur, ut de angina pituitosa dictum est. Si vero apostemata tendant ad maturacionem & suppurationem adiuuentur cum decoct. fenug. butyr. & similibus & emplastris maturatiuis iam sape dictis. Et ubi ruptum fuerit apostema, expurgetur melicrat. to, ptisana, cum melle ros. aut syr. ex infus. ros. communium: & conglutinetur cum lacte & bolo, in quo calculi candentes exstincti fuerint. Si in vlcus transierit, curetur ut iam de ulceratione diximus; quamquam vlcera plerumque incurabilia sint, præcipue in senibus, ut dictum est: tamen pium erit vitæ prolongare, iuxta Auic. etiam cum iis quæ de vlcere ventriculi dicemus. Si ab angina, spasmus, vel paralyti fiant, recurre ad capita propria, de quibus antea dictum est: Et si à dislocatione ortum habuerit malum, ea ipsa quantum fieri poterit restituenda; ventosa applicanda & frigidones adhibenda, tum ea quæ in dislocationibus fieri consueverunt. Ita quoque si ob vermes difficultas deglutendi originem habeat, dulcibus vermes alliciendi erunt atque amaris necandi, & ea conferent, quæ ad vermes valere si ribemus cap. proprio. Si à scirrhus, uti scirrhus curetur: & si ab obstructione (ut iam docuimus) ea ipsæ erunt tollendæ, siue solida fuerint, ut exemplis prius demonstratum fuit, etiam de iis quæ gulæ inhaerent aut

aut in ipsa singuntur. De veneno, tum iis, quæ gulam quoque excoeriant, satis superque dictum est. Et ita omnes passionis Meri tum oesophagi absoluitur.

OBSERVATIO XXXII.

De Branchio vocisque raucedine diuturna.

Cum dictum sit prius de catarrho, si in fauces aut in larynga ex capite excrementa decidunt, præterea à Græcis, Raucitas à Latinis nominatur affectio: de qua licet dixerimus lib. 10. Obs. 134. tamen vnum atque alterum exemplum curationis his adiciemus. Nam principio vocem raucam efficit; procedente tempore paruum: si vero longius etiam procedat malum, totam adimit: uti euenit Mariz Duxitæ Delphicæ mulieri, quæ cum ultra annos duosset, & ipsamet quasi medicaster, variis vta esset remediis, curari postea non potuit. Hoc est quod Gordonius dixit, vocis raucedo si per annum duret, curationem non recipit, quæ autem sit à rheumate seu catarrho, nec ita curari potest nisi rheuma prius curetur. Et ita cum alia mulier post tres menses rauca ad nos accederet, hunc syrupum longum commode eidem præscripsimus: 2℥. rad. iros. glycyrr. ana 3℥. caulium rub. m. iij. vngulae caballina. hyssopi, betonica, scabiosa, capill. ven. an. m. j. ros. psyll. enucleat. 3 j. iunbarum, sebesten. ana num. viij. dactylor. pinguium num. iij. carycarum siccat. num. v. coquantur in aqua vngulae caball. pro lib. j. coletur, addde sacch. candidi albisimi 3 j. sacch. penid. mellis opt. despumati an. 3 j. iterum bulliant ad consistentiam syrupi longi bis in die capiebat iij. vel quatuor cochlearia. Deinde hoc modo fuit purgata: 2℥. pilul. auer. cochlear. de agarico an. 3℥. cum succo caulium fiant pilule. v. ter aluum deposuit, cum sacchari solutione esset. Capiti ad roborationem & cathari suspensionem cucufa hæc imposita est: 2℥. flor. ros. rub. exsiccat. maffici, sem. myrtill. nigella ana 3℥. betonica sicca p. j. crasso modo confusa & bombaci inspersa, & syndone cooperata & interfecta fiat cucufa rotunda sutura coronali applicetur. Deinde rursus sumpto syrupo cum pilulis supradictis, iterum purgetur: & hoc linctu quotidie vtatur continuo: 2℥. succi caulium rub. depurati lib. j. mellis optimi 3 j. pul. glycyrr. in pollinem redacti: iij. sacch. albisimi 3 j. coquantur ad spissitudinem syrupi vel mellis, & facta clarificatione puluis liqui. addatur: quibus hæc optime se habuit. Altera quædam iisdem præfidiis vtens, modo ab iisdem abstinens, cum per annum raucedine laborasset, à mulierculis persuasa & aliis omnia remedia relinquens, ad Thermas quasdam Ochreæ nuper inventas (ut audio) cum accessisset; nescio quibus præparationibus vta & sanguine in valde debili extracto, ex consilio medici, sed empirici, balneum aquæ adit, quamquam inter balneandum animo defecerit: & cum aquam balnei per os sumpsisset, pectus coarctabatur, pulmoque exurebatur, ac facta est inflammatio vehemens, & tandem hectica febre accedente, vix anhelitum spirans, domum misera reuersa, tabe obiit.

SCHOLIA.

Dictum est prius cum de catarrho ageremus, Branchion tertiam speciem esse catarrhi; quamquam & in hac specie sit symptoma excrementorum cerebri: præter faucium partes etiam

aspera arteria tandem læditur, tum alia partes quæ vocem constituunt. Non defunt qui ad intemperiem hunc morbum pertinere velint, eadem causas & differentias cum coryza habentem, ut modo à bile, modo à pituita fiat; iuxta quem humorem etiam remedia variantur, præter illam vniuersalem curationem, quam communiter catarrho conuenire diximus. Sic alia præfidia in frigida, nempe si pituita abundet, præter totius & capitis providentiam detergentibus & siccantibus curatur, & aliquando astringentibus maxime in principio; & modo sunt liquida, vel quæ lambuntur, modo solida: ut ex sicibus, passis, & melle potata vel gargarizata; ex sapa. succo brasseie cum melle, ex croco, myrrha, ebure & scylla aut capsa cocta. In calida vero, glycyrr. virid. sebesten. iunib. sacch. solidus, quo ex sacch. candido & oleo amygd. dulc. conficitur & garg. ex lacte. In calida etiam sistit & crassiores reddit materiam diacodion. Iam quoque si raucedo fiat ob defluxum alicuius materię in tracheam arteriam, is humor coquendus & euacuandus: in calida, si & materia sit calida, syr. viol. de iunib. si frigida, viscida & crassa, melle ros. anthos. vel scyllin. purganda cum decocto petiorali, ut de catarrho dictum est: prout materia sit calida vel frigida, illa erunt adicienda, quæ non opus est repetere, quæ de catarrho tam calido quam frigido diximus, & de Coryza. Et si ad asperam arteriam confluit materia, eadem valent quæ ad tussim describuntur; præsertim arteriaca dicta: quod & Aëtius his verbis confirmat: Aspera arteria (inquit) extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis propriis musculis, pellicula quedam fortiter complectitur, & ambit. Quando igitur adfectio aliqua, siue iuxta eam ipsam pelliculam, aut circa extremi ipsius arterię musculos contingit, remedia, quæ vim medendi eam obtinent, arteriaca communiter appellantur. Afficitur autem pellicula hæc, aut ob nimiam humectationem, aut asperitatem, aut ulcerationem. Vocis enim nocumenta, videlicet eius interceptio, hoc est, non posse loqui, & raucitas in loquendo, ad plures causas consequuntur: aliquando quidem propter diuturnos ex capite defluxus; aliquando vero propter suppurationem thoracis & tabem. Sic Laurentio cuidam Alcmario non tantum vox fuit rauca & quandoque intercepta, sed etiam antequam moreretur, cartilagines asperæ arterię corruptas extuliebant. Ex vociferatione etiam magna & plurima, raucedo vocis oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationem, & ob plurimam ac insuetam portionem meraciorum. Verum hæc affectiones magnitudine inuicem distant: etenim vehementius humidis vocis instrumentis, vocis interceptio contingit: mediocrius autem rigatis, vox rauca perficitur. Itaque qui ex vehementi clamore, amplius voce vexantur, consimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis particulis fatigatis & ex labore afflictis afficiuntur. Nam & pellicula quæ arterię extremum atque ipsam asperam arteriam ambit, per magnas vociferationes extra prolato spiritu percussa inflammatur. Et iuxta arterię extremum, ultra hanc plagam, musculorum ipsum mouentium actio offensa, maiorem adfectionem operatur: musculi enim illi vocem operantes, ob magnas vociferationes non solum ab erumpente spiritu percussi læduntur; verum etiam superextensi vehementer, maximum sustinent dolorem. Curatione autem horum

Lib. 8. c. 57. De arteriarum phar-macia.

Arterica remedia.

Vocis læsa causa.

7

Vox intercepta. Vox rauca.

8

Phonast.

horum coincidunt cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas, balneum enim dulciū & bene temperatarum aquarum magnopere iuuat omnes phonascos à Græcis appellatos, qui vocis exercitio magno vtuntur: citharædos, inquam, & præcones & tragædos, quum contendendo oblaferint vocem. His valent & arteriaca ad vocis asperitates in principio exhibita lenissima: gummi Arab. 3 ij. tragac. 3 j. sapa chemicum j. vide plura apud Aëtium. Quale & hoc est ex brasiæ succo cum melle decoctum, quod delingendum præbe; & confestim auxiliabatur. Habes & alia quam plurima apud Aëtium ex Orisatio, tum aliis ad asperitates & suppressam vocem. Laurentius Zafius verbi diuini concionator egregius, & præceptor meus, cum quotannis passionem dominicam pro populo concionaretur, sequens arteriacum, quod pro eo conscripsi, ad vocem instaurandam. egregie, vt falsus est, huic rei conferebat: Recipe specier. diatrag. frig. in tab. sacchari penid. sacch. candi albiss. an. 3 lb. nucum pinear. recentium macerat. in aqua vulgæ caballina 3 ij. amygd. dulc. depilat. num. ix. contusarum succi glycyrr. recent. 3 lb. syr. viol. 3 ii lb. loch. sani & experti. 3 lb. misce fiat linctus seu loch. Plura quoque inuenies apud Benedictum Veronensem: Vocis enim, inquit, instrumenta, vocalia dicuntur; sermonis vero, sermocinabilia appellantur, veluti labia, dentes, lingua, vna, nares, illius vero guttur, epiglottis, ac vocales nerui ac laerti, qui pariter affectu exilem vocem efficiunt: ex quibus nobiliores existimantur, qui aut referant guttura aut claudunt. Vocales nerui incaute præcisi (vt dictum est) aut detecti vocem auferunt, iidem

Lib. 8. c. 52. Ad inuenerat asperitates arteriæ.

IO Vocis sermonis instrumenta.

Finis Libri decimi quinti.

OBSERVATIONVM ET CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus sextus.

DE PECTORIS PVLMONISQVE Vitiis ac Morbis,

PETRO FORESTO ALCMARIANO, REIPVB.
Delphensis Medico, Auctore.

OBSERVATIO I.

De tussi ex frigida & nuda intemperie.



VM aquilonia constitutio esset, vir quidam hyme vrgente dum iter faceret, tussi eaque molesta correptus est, licet non valde violenta. Hic vero, cum auxilium à me pereret, in mentem mihi venit ex 2. de causis sympt. licet Gal. tussim, quandoque fieri scribat ex refrigeratione instrumentorum respirationis: ab eodem quoque ab intemperantiis eorundem instrumentorum fieri posse non negari: namque cum non de malignis tussibus (quas Hipp. aridas ac parum seu leuiter irritantes, tum eodem sexto de morbis vulgaribus, tum aphor. 54. 4. lib. appellat)

sermonem faceret, eas aut ob faucium, arteriarum asperitatem, aut instrumentorum spirabilium intemperiem oriri asserit: quam intemperiem interrim frigidam esse testatur, utpote in aquilonia constitutionibus in quibus Hippoc. aph. 5. lib. 3. tussis ac fauces excitari asserbat: non propter aliud (vt Galen. fatetur Commen. eiusdem aph.) quam propter instrumentorum respirationi obseruientium intemperiem, & propter faucium asperitatem: ac namque admodum frigidus inspiratus interdum faucium asperæque arteriarum exasperat atque refrigerat: nonnunquam & toto pulmone pectorique intemperiem affert: sæpius vero & ambo hæc contingunt: quapropter ex his arida modicaque tussicula (vt huic viro euenit) vexantur, quod quidem cognoui ex signo ab eodem Galen. sic descripto: Cum eger spiritum attraheret, ad tussim provocabatur, postquam

cum multus subito aer, ipsi loquenti ac oscitanti, ac ore spiritum ducenti intraret, sed cum per nares aerem extrinsecum attraheret in edibus calefactis, tunc omnino parum aut nequaquam iussiebat. Ideo nos consulimus, vt in domicilio calido versaretur, & vini dulcis calido potu vteretur, partesque pectorales lineis calidis munitet: nam & animæ retentio, pedum calor & capitis, sufficienti remedio aliquando esse possunt. Si vero ex inæquali duntaxat intemperie ortum ducat: frigida ea existente, per calefacientia emendamus, vt inquit Aet. Hæc inquam tussis (modo non valde magna fuerit) ex spiritus cohibitione, iuxta Gal. sententiam 2. de causis sympt. curari poterit. Quamobrem huic ægro inhibemus frigidam inspirationem, frigidum quoque cibum ac potum: & vt in calidis locis versetur, imperauimus, & vt calidis cibis, tum potibus vteretur: & summam, vt thoracis partes à frigidis defenderentur, ac calida seruarietur, prius vnguento infra scripto inunctæ: Olei chamæmill. anethini, amygd. dul. lilior. an. 3 ij. pinguedinis anseris, gallinæ, butyri recentis, ana 3 iij. misce. saccharo etiam enulato utebatur: & breui conualuit.

SCHOLIA.

CVm in hoc libro rectè proposuerimus agere de pulmonis & cæteris thoracis vitiis, æquū est, vt omnium primo de tussi agamus. Hæc enim cum omnibus vitiis ac affectibus pulmonis & thoracis fere semper copulatur. Vt in sternutatione cerebrum, in vomitu ventriculus, quod noxium est, concitato quodam naturæ impetu expellere conantur: ita in tussi, partes thoracis simul insurgunt, conatiunturque musculi, vt vel quæ carni suæ molestæ sunt, in pulmonum arterias expellant, vel quæ in aspera arteria præter naturam continentur, foras eiciant (non per contractionem, sed confertim emissio per eius interiora ductus, plurimo spiritu, haud secus ac si quis, quæ in fistula cauitate hærent, efflatione vehementer expurgare velit) siue humor aliquis impactus fuerit, vel corpusculum, vel intemperies liberum spiritum prohibeat: vel compressio diaphragmatis à tumore, aliaque causa id præstent: de quibus postea latius. Et sic tussis est motus instrumentorum anhelitus, à virtute animali motrice, qua natura intendit expellere, quod in trachea arteria lædit, vel in propinquis membris. Opesce sublimis, inquit Galenus, duplicem motum in animali constituit, vt contraria expellat, alterum sternutationis, alterum tussendi. Quædam animalia tussunt, quædam numquam tussi vexantur, veluti boues: quoniam, vt tradit Aristoteles, humoris materia iis extra saluari fluxu effertur. Tussis itaque, quam Græci tæxa appellant, pertinet ad genus deprauatorum motuum, non à natura, sed à morbo, iuxta Galenum 2. de causis symptom. quorum vna est vehemensissima efflatio, qua plurimus spiritus celerissime foras erumpit, ad quam pertinet vehemens & magna tussis: quales tusses sunt ex destillatione à capite in asperam arteriam atque pulmonem, teste Actio cap. 5. 4. lib. 8. quas tusses malignas & contumaces appellabat, Paulus cap. 28. lib. 3. Aliud genus est, de quo iam exemplum posuimus, non adeo violenta, neque coacta, sed exigua, vt Galen. 2. lib. de causis symptom. etiam testatur. Priorem autem sequi volunt morbum in via, nempe obstructionem viarum spiritus, quæ

quidem valida est, vehemens, ac violenta, nec supprimi, seu prohiberi potest omnino ne cueniat, vide de his 4. de loc. affect. Alteram vero, exiguam scilicet, sequi volunt intemperiem frigidam aut calidam: Trallianus addit, siccam & humidam: alij, vt Donatus, humidam cum Galeno non admittunt, eundem ad longum videas. Alij vero symptomatis causas, id est, morbos, multi generis esse volunt, vt Iacchinus: Primum, repletionem arteriarum pulmonis, quod est frequentissimum, estque ea obstructio ex puluere & aliis corpusculis, quæ mordicant. Secundum genus apud eundem est intemperies inæqualis, quamquam & humidam prorsus molestia carere vult, quibus additur & viscosus humor. Tertium genus ad asperitatem reuocat, quæ ex siccitate ortum habere potest: & est vitium in tunica: aliquando in summo gutture solum, vel in tota arteria ex causis branchi, fit & ex asperis corpusculis irruentibus cum aëre. Galenus hoc genus reducit ad obstructionem: sed Iacchinus potius ad noxam partis ad superficiem: quam natura lenem fecit, propterea quod in asperam impingit spiritus, non in lenem. De hac Galenus 1. de differ. morb. cum dicat tusses excitari ex faucium asperitate. Exasperant & acres humores, & medicamenta extergentia, 2. de causis morb. Cuncta vero, quæ exasperant, dolorem faciunt, & continuum solunt. Quartum genus mordicatio est, & omnino dolor partium: & videntur omnia ad vnitatis solutionem reduci. Siue enim ex asperitate, siue ex intemperie dolor excitetur, seu ob morsum humoris influentis sponte, vt in destillatione, vel extrinsecus, vt pipere, euphorbio, olco præsertim acri. Hæc enim omnia eadem ratione tussim videntur efficere. Sæpe igitur vnus ex his morbus est, qui tussim facit, sæpe & varij iunguntur simul, quia & ab vno eodemque principio & causa, varios gigni affectus apparet. Partes autem, quæ in tussi afficiuntur, secundum aliquos, sunt respirationis organa, præsertim thoracis musculi. Verum (vt dicitur Iacchinus) in hac re multum laborant Sophistæ, parum vero proficiunt: quoniam nec definiunt, nec distinguunt omnia confundunt. Si de symptomate solo queritur, parum utilis est questio, quoniam ipsi primo non debetur curatio, nisi ratio, cum causæ & morbi rationem obtinent. Ideo musculorum pectoris motrix est, quæ symptomate afficitur. At tussis apud medicos aliud quoque significat, quod nomine accidentis significatur, & cui remedia adhibentur: & sunt quatuor morborum genera iam dicta, quibus curatio debetur, quorum sedes requirimus. Hic ergo non vnâ partem lædi videas, neque vno modo: Aliquando enim membra respirationi deferentia, per se læduntur, vt musculi, septum, pulmone. Aliquando solum consensu quodam, cum in ipsis læsio propria non sit: vt cum iecinoris gibba phlegmone laborant: aut cum gula læsa est: nam coniuncta tracheæ, in consensum eam trahit, & tussim facit, similiter & cum fauces mordentur extrinsecus vel intrinsecus aliquo irritameto. Cum vero proprie afficiuntur, quæret quis, num semper pulmo afficiatur. Videtur autem Galenus dicere, aliquando musculis pectoris moveri, ad noxam propriam intemperiei pellendam, 2. de sympt. causis. Experientia tamen monstrat, quod nisi affectus pulmone aliquo modo communicent, tussim non faciant: consolli enim latus tussunt: propterea quod aut sanies decidit, & pulmonem tangit aut

aut medicamenta, quæ iniiciuntur. Sed cur tussis sicca in pleuritide accedit, cum pulmo adhuc non repletur? Similiter & tumores, qui in externis partibus thoracis eueniunt, tussim non faciunt. Contra vero statim, ubi aërem frigidum multum inspiramus, aut parte aliqua pulmoni attinente lædimur, fit tussis: ideo motus ille pectoris, ut seruit in respiratione, ita in expurgatione à noxis pulmoni seruire videtur. Igitur obstructio asperarum arteriarum pulmonis tussim facit: & vulnera & morsus circa eas partes, & intemperies visceris. Aër enim in simplici illa carne (quam *Assumptionem* dixere) non sentitur. Quod si extrinsecus aër pectus refrigeret, certum est qualitatem illam frigidam ad pulmonem quoque velocissime peruenire. Quamuis vero per motum hunc intendat natura expultrix noxas pellere, frustratur tamen sæpe sine suo. Cuius ratio est varia: prima, quoniam nihil aderat obstruens corpus, quod expelli posset: sed intemperies, vel vlcus, vel affixum tuberculum: & dicitur tussis sicca. Secunda causa est, quoniam materia est rebellis & contumax, non cedens impellenti, ut cum viscida nimium est, & hæret, aut crassa, quæ non facile per minores arterias præterlabi possit. Tertia, quoniam à spiritu dissipatur, dum impellitur ob tenuitatem, quod accidit in aquosa & tenui destillatione: Hæc ex primo epid. 4. de tussi arida Iacchius quoque sumpsit. Sed nunc aliud exemplum proferamus.

OBSERVATIO II.

De tussi ex intemperie calida.

Sicuti autem ex aëre circumfuso frigido tussis generari possit, ita quoque ob vehementem æstum, immodicamque ariditatem à circumfuso aëre tussis oriri potest, quod iuueni euenit post deambulationem in sole: qui cum etiam cibus calidis pipere conditis usus esset, asperitatem tracheæ arteriæ incurtebat, & arida & exigua tussis afficiebatur, qualis & in febribus aliquando euenire solet. Contrariam igitur huic victus rationem superiori præscripsimus, tum medicamenta aliaque omnia ad frigidum & humidum vergentia, cum huic siccitas quædam permixta esset. Deditur autem pitana cremorem, leniētesque cibos, tum potiones, propter asperitatem, *syr. pap. de iuuibus cum mucag. gummi tragac. Arabic. extrah. cum aqua vngula caballina, sem. cotoneorū.* Et gargarisma ex lacte & elect. diatr. frig. oleoque viol. & amygd. pectus inunxi, quibus & hic breui restitutus est.

SCHOLIA.

Frequenter tussit homo pluribus de causis, ut in scholio præcedente dicere cepimus: à sola intemperie, aliàs frigida, aliàs calida, siccitate tracheæ. vnde exasperatur, vel si quid in eam fortuito incidit aridum aut humidum, quoniam nihil aliud præterquam spiritus ingreditur. Offendunt extrinsecus nix pota, aut aqua gelida, vinum item, aër quoque, & quæ frigida pectori imponuntur, ferrea vel plumbea quibus vocis studio si vtuntur, aut nimium calefacientia exsiccantiaque qualis fumus & calx: vel iis qui aurum & argentum ex metallicis facere arbitrantur continuis venenatis vaporibus pectora replentur: cuiusmodi & puluerum genera hinc lapidicida facili tussi afficiuntur, tum alij prædicti, & plurimi horum sus-

focati sunt. Causæ vero horum affictuum sunt expositæ fere. Nam obstruentes dictæ sunt destillatione, tuberculum, & quæ extrinsecus in arteriam incidunt: quæque intemperiem faciunt, externæ sunt: quæ exasperant, siccantia multum & extergentia, ut pulueres inter respirandum attracti, siccis nimia in febribus, ita & in acuta, aut pestifera febre, vel frequenter in pueris, cum boa vel papulis laborant, non sine contagiosa febre, tum enim antequam pustulas emittant, asperime tussiant. Tussiant & hepatici, hecticique quam importune, quoniam tussis somnum aufert. Addit Hippoc. 6. Epidem. lib. 2. in eo aphorismo. Sicce tussis ex cibis & potibus exasperantibus, cuiusmodi sunt austera nimis & acerba, quæ etiam mordent, aut acris sunt intrinsecus incidentia, ut acetum, oleum vetus rancidum, piper, euphorbium. Sapor enim acutus aut acetosus tussim excitat. Ex destillationibus nihil magis & frequentius, pituita acuta liquida, aut crasso phlegmate, cum in pulmonis tramitem destillauerit. Fit quoque in his, quibus exesa est columella, vel diuisa: à compressione septitransuersi, ut in tumoribus hepatis arida tussis: à liene quoque, vel à tuberculo innato in aliqua parte tracheæ arteriæ vel pulmonum. Actio quoque fieri vult ex lumbricis stomachum infestantibus, & aeri humore ipsum perturbante: similiter & in his, qui stomachi morsum sentiunt, sed potius circa gulam irritationes à quacunque causa fiant: quibus Iacchius adnumerat vermes in pueris: quam causam cum quidam scripsissent Galen. nec negat, nec probat, dicit solum, eos non scripsisse, num ita fieri experientia an ratione compererint. Sed ipsi (inquit Iacchius) loquebantur de ore ventris, quod non communicat arteriæ nos dicimus de gula, quæ illi iuncta est, & experientia id monstrat fieri aliquando. A materia igitur fit, cum aliquid in arteriam dilapsum est, siue sit humor, siue corpus aliquod, ut mica panis, potus, aut aliud quoddam humidum, ut sanguis, pituita, à capite, ut in catarrho, aut acris destillatione: à materia, quæ in pulmonem, vel in thoracem, vel tracheam arteriam, ut à serosa humiditate, quæ in spatium resudauit, sicut in hydrope: vel à tenui materia, quæ ab inflammata membrana resudat, ut in pulmonis inflammatione, quando materia in asperam arteriam resudat. Plura de causis videas apud Benedictum Faentinum præceptorem meum in sua magna Praxi. Tussis præterea alia sicca est, alia humorem continet, alia recens, alia verusta. Celsus in duas tantum differentias redigit, in humidam & siccam. Verum hæc omnia exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO III.

De tussi ex destillatione acris orta.

Quoniam igitur tussis non vnâ, teste Tralliano, sed multiplicem causam sortita est, conuenit etiam nos omni studio eniti, ut causam eius effectricem inter noscamus, discernamusque. Nam apud omnes hoc in confesso notumque est, citra internotationem non posse recte curari. Exemplum autem paulo ante attulimus de nuda intemperie calida: qui autem eam sentiunt, aërem frigidum respirare desiderant, iuuanturque magis acris inspiratu, quam aquæ potione: & facies rubicunda magis & caput apparet. Quod si igitur sola adeonuda qualitas (ut in præcedente) fuerit, nihil pene aut nequaquam expuunt, sin autem

expuunt, spiritum salum habet qualitatem, aut fumolam colorem, aut leuiter biliosam, idque modicum admodum & tenue apparet. Nihil vero minus etiam ex his, quæ præcesserunt, hoc fieri potest, nempe insolatu magna parte, balneis calidis, victuque calefaciente. Tales ubi materia acris ex illis causis præcedentibus coaceruatur, in destillationes acres incidunt. Sic domina illustris de Abbenbroeck filia Domini de Bergen, cum fluxione calis acris laboraret, & ex destillatione rimas & pustulas quoque in lingua haberet, & laetè tepido gargarisaret, iussu, & ut præsumpta causa 3j. cum decoct. hor dei mundati, viol. glycyrr. 3j. & mandani, ut syr. viol. papau. cum decoct. hor dei mundati, sem. 4. frig. maior. malue sumeret, & diatr. Deinde etiam & illa, quæ ad tabem conferunt, ut puluerem Haly contra phthisin. Hæc enim tussis, etiam si initio levis est, facile in tabem transire potest, valet & his diacodion iuxta Galenum, ut fluxio in principio inhibeat. Postea etiam dedi-
leeb de pino cum syr. viol. papau. & rubino, & similibus. Pro cibo vtebatur luteis ouorum, gallinarum alis, testiculis gallorum, piscibus dura carne præditis, tum alijs à Tralliano descriptis, pro iis, qui ex tenui & acris fluxione tussunt. Quib. remedijs hæc & curata fuit: quemadmodum & vxor mea Eua Teylingia, mihi carissima: quæ sub noctem, cum pauca materia adesset: ex acris fluxione tussiebat. Cui deglutendum exhibui vitellum oui crudum, cum rache, cand. quod cum in introitu lecti ter quater ne deglutisset, illico in principio tussis cessauit, neque alijs remedijs opus fuit. Prætor Reni burchius, cum de tussi mentio fieret, dicebat se omnem tussim curare pomio excauato, & melle rosato impleto, supra prunas viuas affato & sub noctem deuorato, quod seipsum semper, tum alios plurimos à tussi curasse iactabat.

SCHOLIA.

Tussis licet ab omnibus & visu & auditu, teste Aristotele, percipiatur: attamen à quibus causis oriatur, id non omnibus, sed medicis peritis per signa quædam innoscitur. Ideo diligenter percutiendus, quibus de causis tussire inceperit, vnde & signa specialius distinguimus. Si ex nimia caliditate, tum in parte pectoris aut capitis, feruor quidem facile percipitur, cum siti & faciei rubore, tum aëre frigido gaudet, pulsus magis excitatur. Si enim ab intemperie calida fuerit, necesse fuit præcessisse causas externas, ut in duabus obser. præcedentibus ostensum est: aut saltem præcedentes in corpore, ut febrem ardentem, calfacientem. Si adit simul materia calida vel destillatio acris, ea quoque facile dignoscetur ex iis, quæ de destillationibus acris, & de rædine diximus. Ex frigida vero causa signa iis contraria apparent, pallor faciei, frigiditas capitis sine siti, cum & calida prodesse sentiuntur, salua aut aquosa est aut acetosa, & victus ratio his subscribere creditur: Acidum enim, inquit Trallianus, magis quam amarorem sentiunt, neque salum expuunt. Præcedit hos potius frigiditas, quam ardor solis: item intemperiorum balneorum, potuum, & ciborum frigidorum usus. Si autem materiam admixta, & quis sit humor à capite destillans in fauces, asperam arteriam, in pectus, vel pulmonem, & ex iis, quæ de destillatione & catarrho diximus, numquid lentus, viscidus, pituitosus, bronchiis infusus, vel acris, mordens, salus, vel tenuis, ut aqua, etiam ex spūto cognoscimus: Si à bile, erit citrinum, subrubescens, aderit amaritudo oris, sitis, tussis, molestia, magisque

sonora. Si ex sanguine vel plenitudine, facies rubet, venæ tenduntur, pulsus grauis est & mollis, sputum rubrum cum dulcedine oris. Sic si à pituita sit, facies albescit, sapor insipidus, aut salus, sputum album, viscidum, aquosum. Sic tussis à sola intemperantia sicca est. Si ex materia quæ à capite fluit, uti coryza siue grauedo indicat. Si in pulmonis vias defluerit, spirandi difficultatem facit, febrem inducit. Hinc si ab obstructione sit, erit vehementior & magis impetuosa, & si signa alia destillationis adfuerint circa fauces, nares, oculos, vel etiam totum caput, aut sonitus aliquis sentiatur in pectore, certo id significatur. Si ab asperitate, causæ exasperantes aderunt vel præcesserunt. Si à morsu, iam dolor ipse manifestat, & eo magis si de mordete aliqua causa certi sumus. Si non sit affectus obstructionis, moderatiore tussis sunt. Porro tussis, quæ ex influxa materia superueniunt, ea re innoscunt, quod copiosa expuantur, sed ex quib. particulis materiæ transmittantur, distinguendum, num à capite. Tunc n. irritatio-
nem quandam in vna vel aspera arteria concitari capitis, necesse est. Si ex inflammatione pulmonis, ex spirandi difficultate, febre acuta, lingua scabra, genis rubris & sensu grauitatis, ut latius de pulmonia dicetur. Si biliosum expuatur sine grauitate & angustia, ab erysipellate pulmonis. Si strepitus elidatur cum grauitate pectoris, ex pectore. Et si à pleuritide, signa huius præcesserunt. Si ab vlcere vel tabe, huius signa quoque aderunt. Ita si tuberculum sit in pulmone, accedet angustia maior & spirandi difficultas, modo subito, modo paulatim: nihil expuet. Strepitum aliquem aut stridorem sustinebit: quæ euenire nequeant dum pituita incocta sit & nondum rejiciatur. Si autem æger angustiam subito citra molestiam febris suumque multam percipit, stridorem autem quandam cum tussi experitur, interdum etiam humoris educationem; crassum viscosumque in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula, eo confluisse liquet. Caput vero materiæ thoracis influentis causam existere, inde manifeste cognoscitur, quod irritatio quædam & gargarismus circa vnam præcessit. Si ex ulceratione, ruptura, erosionem, propria habebunt sua signa. Si à vitio stomachi, tussiant in crapula magis quam in fame. Ex abscessu iecoris, lienis, ex proprijs quoque signis. Vir quoque ex Tralliani historia (vi
antea quoque mentionem fecimus, cum de lingua loqueremur) calculum exquisitè figuratum expuit.
Meminit & Galenus aliquem non calculum, sed grandinibus similia expuisse. Causæ itaque primitiue, uti & externæ, ex relatu ægri & assistentium facile habentur, ex iis quoque, quæ præcesserunt siue à pulvere, fumo, cibo, potuque aut alijs rebus ortæ. Internæ ex intemperie & materia abundante, tum ex iis, quæ diximus, cognoscuntur. Quæ per essentiam sunt membrorum spiritualium & maxime pulmonis, habentur ex continua & laboriosa tussi. Quæ vero per consensum à toto post febrem consequuta, cuius augmento augetur, & diminutione diminuitur. Si à capite per catarrhum dignoscitur, ex signis catarrhi, defluentis modo per tracheam arteriam ad pulmonem, qui cum per nasum exire deberet, nunc in pectus defluit. Si ob splenem, hepar, ventriculum, aut ab alijs membris, id læsiones & dolores eorundem indicabunt, tum signa ex proprijs locis petenda. Signa præterea præsentia tussim, sunt corpora pectoris minus lata, collumque longum ac humeros eleuatos instar alarum habentia, debilia: & quæ

cerebrum debile fortituntur, malique regimjnis, senilia, tempore hyemali parata sunt ad tussim. Vbi aestas aquilonia, sicca, autumnus pluuiosus, austrinus, tunc in hyeme, teste Hippocrate, tussis expectanda: & tempore boreali: quemadmodum & austrinum liquefacit borea subsequente, tunc tussis sequitur austro dilatante, borea constringente, infrigidante, comprimente. Prognostica ex aetate: Tussis infantum deterrima, quod respirationem & somnum impediunt & profocent, sepe & ex multa agitatione febres acutas & comitiales excitent: plurimi ergo pereunt. Senes vero ob aetatem non maturantur, & affectus eos ad mortem comitatur. Secundo ex causis: quae ex destillatione acri, periculosissima de tabe, praesertim in iuvene: Quaecumque igitur tussis ex destillante humore à capite oriuntur, siue ex alicuius spirabilium viscerum vlere, aut ex aliquo in iisdem orto abscessu, siue ob ea, quae vocantur empyemata, quae ab Hippocrate, *serina* appellantur, lib. 9. de morbis vulgaribus, omnes malignae sunt, ut Galenus eodem loco testatur, maleficae & contumaces, ut inquit Paulus: Quae autem à fixa causa obstruente, difficillimam habet affectus sanationem, & periculum tandem minantur. Et ideo valida & vehementissima tussis nequaquam praetereunda: nam ubi diu protelentur, propter vehementem thoracis motum sputum sanguinis superuenire consuevit. At cum nihil excreatur, materia intus putrescit, & febrem mouet, & putridae materiae aut hecticae, & ideo tussis diu perdurans & sicca, reiectiones facit sanguinis, aut sanienem aut phthisin quae omnium teterrima est. Celsus quoque tussim propter faucium exulcerationem fere molestam esse asseruit: solent tamen (ut ipse inquit) interdum per se quoque male habere, & vix cum vetus facta est, eliditur. Quae in hydropneumate superuenit tussis, dira est. Ceterae causae faciles sunt curatu, vlere excepto: nam reliquae tussis, quae malignae non sunt (ab his siquidem diuersa, ac exigua dicta) periculum (quantum in ipsis est) non minantur: suntque curatu faciles. Tussis ex qua materia facile excreatur, qua pulmo lenior fit, salutaris habetur. Exemplum tradit Galenus cuiusdam, qui subita tussis purulentum excutiebat tenue, deinde aliud crassius: exinde sanguinem, unde corpus eius macie eliquata substantia conficiebatur, & mortuus est. Et se vidisse tradit quendam, qui pulmonis partem putris excreauit: & alium diutine tussientem, qui frustum pariter pulmonis exspuerat, & subinde quasdam veluti glandulas quotidiano excreatu. Tertio itaque prognosticum habetur, si febris multum eam exasperet. Si grauida mulier, de abortu periclitatur. Et libet tota aetate molestae sint tussis, senioribus tamen molestiores & periculosiores, ut constat. *Aphorism. 5. comment. 69. & 3. comment. 24. ex Galeno & 3. 21.* Quicumque in febribus ardentibus sicca tussis molestantur, ij parum siciunt 4. *Aphorism. 54.* consule de his Galenam. Hepate quoque tumido facto, malum: ex 6. *Aphor. comment. 16.* & tussis ex aqua intercute mala, Et qui gibbi facti sunt ex tussi, ante pubertatem moriuntur, id quod nos in praxi sepe obseruauimus. Quicumque tussi premuntur à frigido aeris ambientis, cauere frigida oportet, dicente Galeno 5. *Aphorism. comment. 24.* Frigida, qualis nix & glacies, pectori inimica, tussis mouent. Quod vero tussis in aquilonia constitutione ac hyeme generari magis aptae sunt, decretum reliquit Hippocrate. *Aphorism. 5. & 25. lib. 3.* Nunc ad alia exempla curationis procedamus.

OBSERVATIO IV.

De tussi ex materia viscida pituitosa, tam pectori quam asperae arteriae infusae.

Andreas Petrus Sellius, vir consularis apud Almarianos, cum ad 64. annum pervenisset, Anno 1547. mense Octobri, tussis valida correptus fuit (alioquin anhelosus) ex materia pituitosa viscida, partim in pectore, partim in bronchiis asperae arteriae infusae. Per ea igitur, quae extenuant succos frigidos, & crassos, & discindunt iuxta mentem Aetij, curationem instituit: vtentes eodem victu, quem diximus catarrho ex causa frigida conuenire. Et hunc syrupum praescripsimus. *℞. Syrup. de hyssopo, de praeapio, de liquiritia. ana 3 i b. aquar. hyssopi, feniculi, helenij. ana 3 iij. misce, & à ieiunio per triduum bibantur.* Deinde in diluculo solutium sequens ebibit. *℞. diacatholici 3 b. diaphanici 3 iij b. dissolue cum 3 iij b. decoct. pectoral. addendo syrupi de hyssopo 3 b. misce, & quinque alium deposuit.* Rursus sumptis decoctum radic. ireos, inula, hyssopi, glycyrr. adiant. thi, carycarum pinguium, etiam marrubij, syrupis vna cum melle rosar. superius scriptis adiecit. Fiant quoque rotulae in tabul. ex speciebus diuersis simplicibus 3 ij. vel iij. cum decocto sumantur, & sepe de ore deineant, & quod superest deglutiant. Postea iterum pilulis infra scriptis illum purgavi, *℞. pilul. de agarico, cochlear. de assaievet, ana 3 j. cum aqua hyssopi, fiant pilulae vij.* quae circa noctis dimidia sumantur. Interea & hoc lectu utebatur, vel eius amulo, cum baculo glycyrr. *℞. loch sano & experto 3 i b. diapenid. 3 b. specier. diar. calid. diapenid. ana 3 j. pinearum recentium maceratarum in aqua vngulae caball. confusarum 3 ij. pilul. sub lingua 3 iij. Syrup. de hyssopo, de liquiritia ana 3 j. fiat elegma.* Pectus inungebat vnguento pectorali, adiecta dialthara, & quia ex parte asthmaticus, utebatur inula coacta. Modo per se utebatur loch sano & experto, modo elegmate de pino: modo diatraga cantho calido per se. Et sic tandem à tussi liberatus restitit valuit.

SCHOLIA.

Quoniam vero neque vnum duntaxat habet tussis ipsae generationis modum, nec causam vnam, propterea pro causarum diuersitate eorum quoque curationem variari contingit. Cum enim constet symptoma esse & morbos sequi, illius nulla est curatio, cum curatio ad morbum referatur. Sed illius ablatio erit, auferendo causam, scilicet morbum curando, qui illius tussis causa est. Nam ut morbus non tollitur, nisi causa prius auferatur: sic neque symptoma. Nam ut Philosophi dicunt, non tollitur effectus, nisi auferatur causa; & ablata causa tollitur effectus, si morbus adhuc sit in generatione & in fieri, & à causa dependeat fiente vel conseruante. Interea, qui curaturus est hunc morbum, primum consideret oportet aliquando affectum esse respiciendum, aliquando symptoma. Etenim tussis est ex his, quae ad se aliquando vertunt curationem, etiam neglecta causa, non secus ac dolores: ideo quod rationem causa obtineat gignat, quando & alia grauissima symptomata gignat & morbos. Ex tussi enim febres exasperantur, tum motione, tum & vigiliis, quarum ratione etiam vires debilitantur, ut & motione ipsa. Nam tussis vehemens caput replet: videmus enim

enim & venas capitis intumescere & faciem rubere, non secus ac vomitione. Verum tussis, ut dolor & alia symptomata, si tantum sua vehementia molestant aegrum, tunc neglecta causa ad mitigationem venimus, tanquam ad id, quod magis vtiget. Mitigatur autem dolorem, id est, dispositionem minuendo, vel sensum partis auferendo vel stupefaciendo ne tussis: aut qualia sunt pilulae de anaglossa, & cynoglossa, & diaspermaton: sed iis non vtendum nisi cogamur: & cum cautione, ubi metus est, ne ex tussi rumpatur vena, ne vehementia praefocetur aeger, ne acris catarrhus pulmonem erodat: Ideo non vtimur iis nisi in molestissima tussi & perpetua vigilia, vt syrup. papau. cum decocto palmularum, quod tutius est, vel pilula vna de cynoglossa pondere scrupuli semissis: & horum vltus tutior est repurgato iam corpore, & thorace non ita pleno. Aliqui vehementer commendant syrup. myrtillorum sedandae & reprimendae tussis: calidae quidem cum iuleb. rosato: frigidae vero cum decocto passul. aromatizato tum modica spica. Sed haec est cura coacta: alia vero propria, quae morbi causam tollit. Morbi itaque curatio pro causarum varietate varia quoque est. Quapropter si ex peripneumonia, pleuritide, empyemate, tabe aut simili aliquo affectu in spiritalibus instrumentis orto, (veluti etiam distillatione seu asthma) tussis fiat, ex eorum affectuum curatione (vt in sequentibus etiam exemplis patet) curabitur & ipsa. Si vero à morbo instrumentario incipiat, id est, obstruente, si ea à re externa fit, sponte sua soluitur affectus: nam tussis causa ejicitur, nisi vehementer inhaerit: quando & praefocari metus est, & aliqui vili sunt (vt hisloris est prodium) non adeo, quod via clausa esset spiritus tam exiguo corpore: sed tanta & tam vehemens exspiratio sine intermissione ad praefocationem adducere potest: quod ad cor aer inspiratus non perueniat (vt recte dicebat Iacchimus) praecupatus à pulmone extra feratur. Nonnumquam in his, qui aqua praefocantur, plenus est aqua pulmo, & ex syncope, amisso sensu, non proritatur ad pulsionem. Si ex calida vel frigida sola intemperie nascatur, curationem eam duobus exemplis ostendimus. In frigida, calidis vtendum extra admotis, sicut, vnguentis tum victu ex his, quae actu & potestate sunt calida: contra vero in calida: & hic quoque vtendum erit his, quae hebetant sensum. Nihil enim obsunt materiae, quae non adest, & ex tussi periculum est in refrigeratis, ubi duriora vasa sunt affecta ne rumpantur: ideo ad monebat hoc Hippocrates, cum frigidum distemprium appellet 6. *Epid.* In calida aërem calidum fumofum declinabimus, somno & quieti indulgebimus, ac balneo aquae dulcis, modo abest febris: iam & aqua hordei, syr. viol. pap. mucag. psyllij vtetur. In frigida imperabimus, vt vigilia somnum superet; aërem calidum naturalem vel arte paratum eligemus, somnumque moderatum, ventumque frigidum & borealem vitabimus, iisque praescriptis vtetur, quae temperiei frigidae conferre exemplis docuimus. Si ab asperitate, succum tragacanthae dabimus cibosque lententes, & potiones molles, vt diximus. Si ab acritudine, siquidem intrinsecus inuat, facile sedatur obundantibus frigidis & humidis, abluentib. aqua, mulla, lacte. In tussi, inquam, omni, quae fit ex causis primitiuis, omnibus modis illa amouenda sunt: & quae ex sola intemperie, alteranda est. Et sic etiam causa asperitatis statim tollenda, seu ex pulvere, seu ex fumo oriatur: interea & in exasperata arteria valent viscosa sine

mordicatione: quale est tragac. gummi Arab. Oui luteum forbile, butyr. sem. cydon. lac per se, mel passulorum, succus iuiubarum, ficum, dactylorum veterum non recentium, nam recentes exasperant: hordeatum, lac amygd. penidia, zacchi. violatum. Si vero tussis fiat ex destillatione multis modis communicat cum cura branchi. Primum enim, vt ibi, totum vacuare, & à capite reuellere oportet: siquidem copia humorum adsit in toto. Vacuatio autem molienda iuxta qualitatem copiae: nam ubi sanguine aeger abundat, praecipue circa capitis venas, & praesertim calida quoque fluxio appareat: expedit venam secare: mox purgatione vt pro qualitate humoris, vt iam saepe dictum est. Mox capiti prospicere oportet, aliis praeterea auertendi ingenis: cuiusmodi sunt frictions, quae ab inferis incipiunt, & semper ex supetnis deorsum fiunt: & cucurbitulis itidem. Mox, & si opus sit, vtenuit auersione ad posteriora pectus sinapismum facta, prius abradis occipitij capillis iuxta eminentiores partes. De hinc deriuatione vt oportet & tralatione. Deriuatio quidem ad nares fiat: tralatio autem ad cutem sinuipitis pectus, quae siccant. Hic tamen iam diuersificantur remedia, pro natura materiae & intemperiei. In frigida enim haec acria sunt: in calida vero siccantia citra calorem. Post haec ad partem affectam descendendum: primum vero prohibere oportet, ne in fauces materia descendat: mox pectus expurgare iis, quae defluerunt. Primo igitur scopo satisfacimus si calida materia sit. Frigidis siccantibus, cuiusmodi sunt trochisci diaspermatum, de quid. 5. *method.* Sunt enim in his semina siccantia & frigida: quatenus siccant, cogunt & desicant: quatenus frigida sunt, caliditate mobilem humorem immobilem reddunt: huius generis est diacodion. Fit vero cum sapa & cum zaccharo: & confectio ex succo nucum, pinulae de cynoglossa. Cum enim sistere oporteat, si prohibere volumus, id faciunt siccando & refrigerando: cum vero & astringere partem quae recipit, id astringentia faciunt: ideo & diacodion admiscere solemus, bolum Armenum & zaccharum rosatum, quousque materia sensibilibus influere à capite cernitur. In tussi igitur, quae ab acri fluxione ac tenui sit, proba victus ratio instituta, qualem in catarrho calido descripsimus, conuenit: & in omni tussi speciatim utilis est, Celsi auctoritate peregrinatio, navigatio longa, loca maritima & nationes. Sed in acri, iuxta Aetium, medicamenta conferunt, quae vim refrigerandi, spissandi acrimoniamque obtundendi habeant, quorum copiam & apud Aetium & Paulum, & praecipue Trallianum, (cuius quintus liber nihil aliud, quam de tussi agit) inuenies. Materia itaque incrassata cum syr. de papau. viol. & aliis, purgatio quoque adhibenda cum cassia, manna, zacchar. viol. vel syr. ex pluribus infus. viol. deinde antidota in ore detinenda ex pap. diatr. diapenid. pilulisque bechicis refrigerantibus, tum aliis supradictis, quorum formulas à practico mutuabimini, & thorax oleo violaceo inungetur: quibus adiunges ea, quibus nos Obseru. 3. huius lib. in tussi ex destillatione acri, vili sumus. Habes & pulcherrima remedia ad acres fluxiones, apud Trallianum libro iam citato. Verum, quantum ad fluxionem sistendam in frigida fluxione, quamuis non multus sit fluxionis plerumque impetus: aliquando tamen propter tenuitatem & aquositatem vehementer fertur. Ideo iis ingenis quoque vt oportuit: sed erunt vi maiore siccandi praedita pharmaca, cuiusmodi sunt pastilli, quibus vtitur Iacchimus, &

ex thure, mastiche, croco confectis, addito glycyrr. succo & tragacanthæ. Similiter & theriaca noua vesperi exhibita id facit, vel sola, vel rosato zacch. admixta. Sequitur post, vt omni ingenio pectus expurgari iuuenus: impediri vero scimus expurgationem visciditate, crassitie, tenuitate humoris: his omnibus contrariis infistemus, si visciditas sit, in qua incidant, si crassities, quæ extenuent: semper vero detergendi vi est opus, ne inhæcant. Sed quæ incidunt, inquit Hipp. nimis sicca ne sunt, ne magis glutinosum faciant: ideo aquosum oxymel est optimum, & ad crassos aliquando mulla iuuat humectando. Hic syrapi omnes ad calidum, vel frigidum, vel crassum, vel tenuem materiam, conferunt: sed parum valent, vbi non diu in ore detinentur. Modus vero applicandi communis erit omnibus faucium morbis, id est, vt diu in ore teneantur, & sensim dilabantur: ideo & consistentia glutinosa esse, opus erit, eclegmata vocant: aut aquæ sensim dimittantur: semper enim aliquid in arteriam percolatur. 4. melib. lam ergo hic multæ compositiones occurrunt, vt est compositio lacchini de terebinthina & succo prasilij & succo brassicæ. Quæ vero in officinis confectæ sunt, est loch sanum, de pino, de scilla in viscida materia: confectio ex iridis radice, & alia, quæ fortiora sunt, in capite de asthma propo- nentur. Ex potionibus vero sunt, quæ ex hyssopo & marrubio & melle fiunt cum scibus, & passis uis. Pectus vero inuagendum butyro & croco. Quod si materia aquosa sit, si frigida, siccantibus & calfacientibus utemur: sic enim crassescens à natura per tussim expurgabitur. Pectus ergo iuuat concalfacere & cibis & porione actu calida uti, & pastilli illi iuuabunt, & demum quæ calore innatum fouent: contra vero in calida, quæ siccant & acritudinem tollunt, quæ dicta sunt. Optimum vero est, quod glutinosum reddit, quod est fluidum, vt confectio ex tragacanth. & succus extragacanth. solus: & loch de zaccharo candi, & quod vulgo Sauoneam dicunt, delicatæ sane confectioes. Confectio vero ex radice tussilaginis prodest in omni humore. Sic igitur vbi crassus & viscidus fuerit affligens humor, per ea quæ extenuant & discindunt, medebimur, ex Actij sententia, eodem victu viuentes, vt de catarrho ex causa frigida diximus, & decocto glycyrrh. caryocarum ping. hyssopi & adianthi: & in crassiore pituita adiecta radic. irid. inulæ, & herba scabiosa, & marrubio, & melle: vel syrup. de glycyrrh. adiantho, hyssopo, marrubio, melle ros. scyllino, & similibus. & humore repurgato cum pilulis de agarico vel similibus, vt in Obseru. præcedente diximus. Cornelius Celsus laudat ouum sorbibile cum pauco sulphure adiecto: alij vtuntur diaphysopo. Plurima attenuatoria tam simplicia quam composita habes apud Trallianum & Aetium, tum alios: qualia & præceptor meus Benedictus Farentinus in sua magna Praxi scripsit. Tussi valida Cornelius Canning sacerdos Alcmarianus afficiebat, vna cum pectoris angustia & ingenti dolore sub dextro hypochondrio, annos viginti quinque natus. Hic cum bolum sumpisset, & syrupum sequentem, ab omni dolore lenatus simul & tussi liberatus est. 2. cassia mundata 3vj. diacatholici 3vj. castia recens trita 3ij. dissol. cum 3ij. decoct. pector. addendo syr. de blugloss. viol. ana 3b. misc. sexies aluum excreuit, cum facilis solutionis esset: & febris hectica, quæ videbatur sublatitare, desit, & tussis eclegmate sepius repetito etiam cessauit: 2. loch de pino 3i b. diaphenid. sine speciebus 3ij. syrup. viol. capil. vener. de liquir. ana 3b. misc. pectus inunximus mane & sero cum butyro recenti, & his sanus euasit præter mentem multorum, & bene se habuit: quanquam idem post tres annos anno ætatis suæ 71. pleuritide correptus est, cumque eo tempore non satis tempestiue sibi consulere, ea ipsa pleuritide in suppurationem conuersa est: qua etiam, viribus paulatim destitutus, senex obiit.

Curatio
tussis mate-
ria existen-
te frigida
& aquosa.

Si ex crassie
& frigida
succus del
fluens
tussis sit,
curatio.

13

Curatio
tussis mate-
ria existen-
te frigida
& aquosa.

ad ignem parum tostas, vt rorida tantum essent, sub noctem dum cubitum ierent, deuorare iussimus: & hoc vnico remedio multi à tussis liberati sunt. Conficiuntur quoque tabulæ ex botryde ad tussim.

OBSERVATIO V.

De inueterata tussi, quæ per annum durauerat.

Gerardus ædituus Alcmarianus supra sexaginta octo annos natus, per integrum annum tussi validissima laborabat, homo admodum macilentus, vt vix per cubiculum emicere posset: subinde ventriculus etiam ructus emittebat: decoctum sequens cum sumpisset, & purgationem, & eclegma, tussis ita sedata fuit, vt ructus in publicum exiret: 2. rad. glycyrrh. rase, feniculi, pector. ana 3j. hyssopi, capill. Vener. viol. bugloss. ana m. j. tussilaginis cum rad. flor. cord. ana p. j. radic. althææ, inulæ ana 3b. sicum ping. num. 5. prim. Damasc. num. x. inulæ. sebesten ana num. vij. vnay. pass. de rad. vinaceis, hordei mundati ana m. j. sem. anisi, carui ana 3ij. sem. 4. frig. maior. & minor. ana 3iij. fiat decoctio in lb. iij. ceruicia communis ad consumptionem medietatis: maneat per noctem infusa: fortiter exprimatur, addatur q. j. zacch. cand. & rursus bulliant ad syrapi longioris consistentiam. Capiat bis in die mane & post meridiem hora quarta pomeridiana 3v. Deinde 2. diacatholici 3vj. cassia recens trita 3ij. dissol. cum 3ij. decoct. pector. addendo syr. de blugloss. viol. ana 3b. misc. sexies aluum excreuit, cum facilis solutionis esset: & febris hectica, quæ videbatur sublatitare, desit, & tussis eclegmate sepius repetito etiam cessauit: 2. loch de pino 3i b. diaphenid. sine speciebus 3ij. syrup. viol. capil. vener. de liquir. ana 3b. misc. pectus inunximus mane & sero cum butyro recenti, & his sanus euasit præter mentem multorum, & bene se habuit: quanquam idem post tres annos anno ætatis suæ 71. pleuritide correptus est, cumque eo tempore non satis tempestiue sibi consulere, ea ipsa pleuritide in suppurationem conuersa est: qua etiam, viribus paulatim destitutus, senex obiit.

SCHOLIA.

Tussis sicca vehementissime hominem urget, quam emolliit syrup. viol. cum ptisana. Veteres medici (teste Alexandro, Benedicto, Veronensi medicis) laferis optimi paulum deuorandum dabant: plebi fabam sine cortice coctam ex amygd. oleo. Prodest ex horto portum, malua, vrtica in cibo sumpta, aut allium ex lacte coctum: sed addendum, modo non addit febris. Apud eundem plura habes: tum apud Aetium, ad veterem tussim. Plinius Secund. lib. 1. capit. 58. ficus aridas coquit cum hyssopo, iisdem fere, tum aliis, utitur Aetius lib. 8. capit. 54. vbi & syluam medicamentorum ad veterem tussim & diuturnam inueniens. Quidam inueterata tussi, ob humorum influxum rebel- lionem, etiam suffumigiis vtuntur ex folijs chij. Inter Veteres Trallianus, ex resina terebinthinae, auripigmenti, stercoris leporis pares modos in collyrium, inquit, redigito, & carbonibus abiegnis & terebinthinis fumum excitato ad triduum, si vires permiserint, & affectus ex omnibus notis apparuerit frigidissimus, atque id, quod influit, tale ad amissum existat. Nam in quibus calidus est affectus, talibus uti periculosum est. Aliud ab eodem sape expertum: thuris sanctæ, medullæ ceruinæ paria pondera in pa-

in pastillos leuigata. Cautione tamen opus est, vt materia in pectore vel natura, vel arte sit immutata reiteratis euacuationibus communibus & propriis: deinde quod absit febris: tertio viribus constantibus: quarto stomacho ieiuno: quinto, vt in minima quantitate prius attentetur: sexto, si sequatur constrictio anhelitus, aut febris, corrigantur cum humectantibus, pectusque dilatantibus & infrigidantibus, aut in actiuis temperatis, vt aqua hordei, glycyrr. passul. & similia cum iuleb. aut zaccharo violaceo. Alij aut statim à fumigiis iubent agros fumere aliquid quod egregie humectet, vt est aqua hordei cum butyro ouino. Fit autem fumigium per embolum aut canulam ore aperto ter quaterue in die, prout æger tolerare potest. Hæc autem volunt esse medicamenta extrema, quæ conferre dicunt phthisi, asthma, empyemati, & proprie quando materia est subtilis & saniosa. Refert Marthaus de Gradi cap. proprio. se feliciter usum fuisse fumigio Rhafis in muliere 60. annorum, matre scilicet, illostris Poëta Maphæi de Vegijs Laudensis, quæ materiam catarrhalem quasi saniosam longo tempore in pectore contentam habuerat, cum aliis remedijs curari non posset, hoc fumigio intra quinque dies sanitati præter opinionem restituta est. Descriptionem huius fumigij habes apud Rhaf. 9. ad Almanforem c. de tussi. Ad omnem tussim profuit pulmo ceruinus cum gula sua arefactus in fumo, deinde tusus ex melle, quotidiano eclegmate: cocta oua & trita cum melle. Ego ad tussim siccam & veterem ad tabidos pleuriticos, asthmaticos, & eos, qui valida tussi laborant, vt hoc eclegmate: 2. succi tussilaginis sen feriare lb. 6. mucag. se. althææ extractæ cum aqua hordei 3ij. cum zaccharo penid. q. s. fiat loch.

OBSERVATIO VI.

De tussi puerorum.

Infans vnius anni, filiola Theori Verhochij cereuisarij Delphensis, cum valida tussi afficeretur, quæ & nullis præsidijs mitigari potuit, tandem necio cuius mulierculæ consilio mures coctos uirgines masticabat, & pro cibo infanti dabat, quo remedio à tussi liberata est. At altera puella annos quinque nata, ex Persinorum familia, cum validissima tussi longo tempore (quam vulgus idiomate vulgari die kincheft appellat) detineretur, nec ullis medicamentis curari posset, alterius mulierculæ consilio vtens, guttam vnâ atque alteram sumpfit aquæ destillantis à limace, exiguo sale consperso (hoc enim modo limaces in liquorem resoluuntur) quam cum cyatho ceruicis communis ebit, & ex incontinenti curata fuit. Insulanus medicus quidem hoc eclegmate ad tussim puerorum commodè utebatur magno experimento: 2. rad. althææ bene mundatæ 3ij. coquantur in lb. j. lactis vaccini, vel melius in flore lactis ad optimam dissolutionem: tundantur, & cybo cremor excipiantur, addendo zacch. candi, zacchari penidiarum ana 3ij. misc. tempore tussis vehementis detur cochlear vnum, deinde bis in die. Hoc magna cum utilitate usus sum, & raro me fessellit: quanquam subinde (cum facile sum contrahat, ob lactis pinguedinem, neque diu eclegma durare possit) iubeo radices althææ in aqua farfara decoqui, deinde per setaceum, vt prius, extractis reliqua addo. Vtor quoque commodè & vtiliter ad tussim non solum succo glycyrrhizæ vel radice ipsa recenti, verum etiam radice althææ zaccharo incrustata, quam

Pet. Forest. Tom. 2.

pharmacopœi nostri in usu paratam, vt habeant, iubeo.

SCHOLIA.

Mlti (inquit Amatus) qui tussi veteri laborant, experti varia medicamenta, hoc vno liberi facti sunt. 2. sulphuris vini vel communis crass. 2. optime triti 3b. beniuini 3j. in ouo sorbibile excipito, & ieiuno stomacho in auro sorbenda dato, vel post cenam cum doriturum: Hoc n. remedio repetito, sani omnes facti sunt, vt sape experti sumus. Caterum pueri qui absque manifesta, aut procacitica causa, tussi ingenti cruciabantur, hoc alio sanati sunt: 2. succi petros. vulgari 3b. lactis mulieb. 3j. pul. cumini 3j. misce, & propina tepidum: & illico pectus pueri hoc inunge linimento: 2. sem. lini. fenug. rad. maluanisci an. parum. in aqua incoque, & postea mucaginem illam excolatam butyro excipe, & calida pectus pueri inunge, & fasciâ, breuiter recte habebit. His adde quæ Sebastianus Austrius ex Paulo, Rhase & Auicenna contra tussim, branchum & & coryzam libello suo, de morbo 34. puerorum scripsit.

OBSERVATIO VII.

De Asthmate, per modum Consultationis, pro M. Adriæno Gœsio senatus populiq. Hollandici Aduocato.

Alum, quo tua dominatio laborat, vir doctissime, crebram efficit respirationem intra febrem, qualis est iis, qui citatiore fatigati sunt cursu, ob tenacium & crassorum humorum copiam pulmonis branchiis, cartilaginibusue infartam: conquestus enim mihi es de anhelitus difficultate, potissimum infestante, si per gradus vel scalas, altiora loca vel montes ascendere debeas. Hoc quidem vitium ad asthma pertinet: quod quidem senibus non tantum graue & molestum, imo vix curatur: verum nunc nondum eo processit malum, vt anhelosis euenit, qui vix procedere possunt, & interdum etiam corporis partes, quæ supra thoracem sunt, rectas habere coguntur, suffocari metuentes, nisi recta ceruice spirent. Et licet à catarrho, originem sumpsisse videatur, cum destillationem prius senseris, & ob hoc difficulter etiam in senectute. Verum cum tantum in primo senio hæreas, rectè facis, quod consilium tempori adhibeas: iacula enim præuista (teste Dino Gregorio) minus feriunt. Propterea neque ipsa curatio adeo leuis habenda est, neque omnino omittenda atque negligenda, tanquam omnia præsidia inutilia existerent: sed omnibus modis elaborandum, vt huic malo quantum possimus resistamus, ne incrementum recipiat, quod commodè in primis fiet optima victus ratione, & vitæ regimine probe prius obseruatis. Deinde iis medicamentis adhibitis, quæ asthmatis succurrere solent, & id curare valent. Aer igitur vitetur frigidus & humidus, niuosus, pluuiosus, ventosus. Vitæ sit prorsus calidus & liccus: non tamen ita siccus, neque pharmaca ita sicca, quin eadem talia sint, vt viscositatem & crassitudinem humorum dissecare possint, quum talia & humiditatem quandam habere oporteat, Gal. auctor. 7. de compos. med. secundum locos. Cibi igitur sint leues, Cello teste, & sorbitiones. Vtendum igitur carnibus perdicum, auicularum montanarum, gallinarum, pullorum, phasianorum, sternarum, caponum, potius assis, quam elixis: interea & elixis cum pauco hyssopo, oreoselino

O ij thymo,

thymo, calaminta, aut sceniculo, aut reliquis eiusmodi extenuantibus. Pilces vitandi omnes, quantum fieri potest, nisi saxatiles potius ad saporem concedantur. Vitabis in genere fructus, ac omnia, quæ crassos & lentos humores procreare possunt. Vini potus, iuxta Galenum, tibi conuenit substantia tenuis: nec exiguus eius potus tribuendus erit, imo multus, ut ipse inquit: nam humectatione multa opus habet, quo faciliè efferatur per tussim, id quod in bronchiis continetur. A ceruicia crassa abstinerebis, sed pro potu si multa uti cupias aliquando, vel melicrato cum cinamomo clareti instar, concedo. Somno autem moderato, præcipue nocturno utere, cupitque in lecto subline habeas: id & Celsus iubet: & diuturnum fugias. Præstat autem anhelosos altioribus stramentis, thorace atque capite subleuato, loco lucido atque calido decumbere. Clysterisque alius ducenda, vel glande irritanda. Præsertim ubi natura eadem humecta non sit. Prodest & ambulatione lenta, penè usque ad lassitudinem: frictio quoque multa, præcipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, & per se ipsum, & per alios usque ad sudorem. Exercitio uti quoque debes ante cibum, & nequaquam subito, quod complures hac ratione exstincti sint. Animi perturbationes fugiendæ, maxime vero mœror, & ira. Præter cibos superius dictos, quidam commendant aliquas carnes à proprietate anhelosis conferre, ut bubonis, ericij, vulpis, ut habetur apud Gradum: sed non fratribus non sunt in usu. Quod ad medicamenta, breuiter me his quoque expedit: alia rationem habent materiæ contentæ in pectore, alia vero eius, quæ fluit, & adhuc fluxibilis est, & nondum fluxa. Et sic non minus capitis ratio tum catarrhi habenda, quam pectoris aut pulmonis, & membrorum spiritualium, quippe cum curatio asthmatis quid commune obtineat cum aliis morbis: nempe ut redundancia humoris hæc vitia procreantis absumatur & cibo aboleatur. Secundo, cum proprium quiddam obtineat, ut si ab humoribus crassis ac tenacibus, oriatur, malum per extenuantia & extergentia medicamenta curetur. Omnium primo igitur vniuersalem euacuationem instituemus. Sed quia crassa difficulter solutuntur, prius materia coaptanda ad expulsionem cum decoctis conuenientibus glicyr. marubij, hyssopi, herbarum capill. scabiosæ, betonicæ, passul. caryc. & similibus, adiectis syr. de hyssopo, prassij, de glicyr. rhiz. a. oximelite, vel syrupi per se dandi. Deinde vna vniuersalis euacuatio administranda. Sed quia solutium hyemale transit, & in hyeme fumus, & in sene, potius pharmaco vtendum, quam venæ sectione: à purgatione leui incipiendo, ut hoc modo. *℞. agaric. optimi 3j. rhabar. selecti (quia dominatio tua hepar calidum habet) 3℔. zinz. alb. 3j. schenamb. 3℔. infunde per noctem, farta prius leni ebullitione in 3 v. decoct. pector. mane fortiss. express. adde syr. de liquiritia 3j. electuarij lenissimi, diapbœnici ma 5 ij. misce: detur in diluculo. Vel si manus pilulas, 2℔. pilul. de agarico 3j. rhab. optimi 3j. cum aqua sceniculi, fiant pilule vij.* Præterea cum etiam adest catarrhus, unde & asthma, duo præcipue membra in curatione respicienda, nempe cerebrum tanquam mandans, primo vero & pectus tanquam recipiens. Primo membro, nempe cerebro, debetur exsiccatio ac roboratio, nec humor catarrhalis generetur: mox & humoris incrassatio, vel potius suspensio, ne amplius fluat, postea ut humor diuertatur, & per aliam viam fluat. Si itaque catarrhum fluere sentias, fiat sacculus ex sale tosto cum fursure, & capiti imponatur, ad capi-

tis exsiccationem & roborationem. Ut a. incrassetur, si opus est, detur pil. vna ex olibano in introitu lecti, alij ex olibano fumum recipiant per os: illud tamen asthmaticis suspectum. Quæ autem auertunt humorem fluentem: sunt hæc: succus maioranæ vel betæ per nares attractus, vel radix gentianæ naribus imposita, cucurbitula quoque scapulis admotæ. At suscipiens membrum trachea arteria, pulmo, pectus, præter communem purgationem etiam pectoris cum agarico, proprio quoque remedio indiget, quod extenuet, tergat, & partim per sputum expectorationem educat, qualia sunt decocta rad. bellenij, iridis, hyssopi, prassij, vngulæ caballinæ, scabiosæ, ficuum & vuarum passularum. Eclegmata de pino, de botryde, loch sanum, loch de caulibus, loch de pulmone vulpis, etiam scyllinum. Interea & pectus inunges cum oleis calfacientibus, liliaceo, irino, vng. dialthæa, pectorali. Quibus cum usus fueris, cum in Hagam Comitis accessero, si malum non cesserit, reliqua medicamenta addam: cum ad alios euocamur, te quoque inuisam. Hæc pauca pro tuo affectu annotasse sufficit. Ex nostro Musæo Delphis 23. Decem anno 1559.

Petrus Forestus Alcinavianus, Delphensis Reipubl. Medicus.

S C H O L I A.

Asthma est affectus, qui respirandi difficultatem cum magno conamine præ se fert. Latini crebrum anhelitum, vel anhelationem dicunt. Nomen est à symptomate sumptum, etenim species est vitij in respiratione: & est actio deprauata, non secus ac tussis, & sternutamentum. Mouet enim natura, sed irritata à causa præter naturam, & morbosum affectum sequitur. Qualis enim sit vitiosa respiratio, describunt, quoniam creber est, instar eorum, qui vehementer sunt moti. Crebet autem dicitur, ubi exigua quies interest inter utrumque motum, dilatationis & depressionis pectoris. Galen. aph. 6. comment. 46. Multæ, inquit, sunt spirandi difficultates, sed solam illam Hippoc. consuevit Asthma nominare, in qua contingit satis crebrum anhelitum tum fieri: estque difficultas respirationis, qualis iis, qui diu cucurrerunt, ex quo aduoluerunt, anhelare, id quod in cursibus & vehementioribus exercitiis fit. Vide de his plura apud Galen. 7. de compos. medic. secund. loc. cor. cap. 6. Dicuntur autem tales, qui citra febrem dense respirant, dicuntur tales anhelosi seu suffocati, Aëtio & Paulo testibus, & Galeno auctore. re 3. de difficultate respirationis. Intera spirationis difficultas, si modica est, dicitur Græce dici-tur. vide Gal. lib. 4. de loc. affect. ubi amonæ, quæ si non spirationem dixeris, dumtaxat à quauis alia respirationis oblatione seiunxit. Sic & Galenus lib. De difficultate respirationis, tum etiam 6. de morb. vulgar. cum Hippocrates dicitur spiritum densum crebrumque licet, non valde difficilem respirationem, intelligit, à reliquis seiunctam, asthma videlicet & orthopnoea. At cum vehementior sit, & spirare æger sine anhelitu & sono non potest, tunc dicitur vocatur: si vero accidat in spirando, ut non nisi recta ceruice spiritus trahatur, tunc dicitur nominatur, estque hæc maxima, ut ægri iacentes suffocentur. Hæc inquam tres differentie communicant, quod videlicet febre careant, ut patet 3. de morb. vulg. & 6. de his. De his noster sermo est, & non de iis, quæ cum febre sunt, ad alias videlicet seu inflammato-

tiones spiritualium, seu reliquarum partium subsequentes, sic enim difficultas respirationis fit & angusta quoque peripneumonici, suppuratis, & pleuriticis, sed cum febre, à quibus facile distinguuntur prædictæ anhelationes difficiles, quæ sine febre sunt, & ideo facile distinguuntur. In quibus etiam non facultas ipsa respirationem efficiens, neque usus per se afficiuntur, sed instrumenta ipsa, & inter ea aspera ipsa arteria, quæ in collo & thorace continetur, seu eius propagationes, quæ in pulmones distribuuntur: id quod scipius accidit, sunt enim strictiores, propterea promptius obstruuntur, ac constriunguntur, seu angustiores redduntur, quæ admodum liquet 4. de loc. affect. de compos. medic. secund. locos. & comment. aphor. 26. lib. 3. quamuis non semper huius symptomatis causa, siue morbus ipse in fistulis aut cavitatibus pulmonis consistit, ut experientia constat. Anno enim, inquit interpres Hollerij, 1549. mense Septembri, monachus quidam in collegio vulgo de Arras, breui asthma interijt, corpore dissecto abcessus repertus est, in vena arteriosa & sine pari, integris omnino pulmonibus. In quodam (nomine Brui) asthma mortuo plumo tanquam spongia, imbutus multo humore pituitoso, inuentus est. Similem fere casum cum superiore refert Dodonæus de difficultate respirandi cum suffocationis periculo, cap. 19. in suis Obs. in medicinalib. de quodam nobili defuncto, in cuius pulmonis inferiore sede ac basi, quæ septo transuerso incumbit, reperti sunt abcessus duo, vnus in dextra, alter in sinistra parte, per meatus pulmonis purulentus ferebatur humor, qui incisio pulmone ex ipsis profluebat. At Benueuius, de abditis morborum causis, cap. 61. corpus etiam incidit in orthopnoico, in quo inuenit non parum atræ bilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisles: vnde etiam per venas diffusum, non est mirum si corruptum eo spiritum ipsum, hominem ad festinam mortem deduxerit: quod etiam auctore Galeno alias contigisse nouimus. Interea quod quis difficulter spiret, tres causas ponit Galen. 4. de loc. affect. vel ex vitium imbecillitate, dum spiritus ex folis naribus emittatur, & narium pinnae manifeste per inspirationem contrahi videntur: vel aucto in corde & pulmone calore, calido frequenti spiritu exsufflante. Vel ob spiritualium instrumentorum angustiam, toto thorace magna ex parte celeriter & frequenter dilatato, sed nec spiritum efflant, nec calidum emittunt, ut illi faciunt, qui ob cordis vel pulmonis calorem, musculis thoracis maxime agentibus, difficulter spirant. Hic vero agimus de ijs, qui ex spiritualium instrumentorum angustia difficilem spirationem habent: ita ut cunctæ istæ affectiones, de quibus paulo ante diximus, ad symptomata referantur functionis voluntariæ, respirationis inquam, non quidem ablatæ, sed oblatæ, in utraque quidem debilitate seu imbecillitate, aut interim quoque deprauate, & in orthopnoea, licet raro. Separatur autem vna ab alia quibusdam proprijs indicijs. Namque in ea, quam dyspnœam nominis generis appellauimus, spiritus dumtaxat densus, isque modice citra sonum & anhelationem apparet. In asthma vero seu anhelatione, præter spiritus densitatem maiorem, æger sine sono & anhelatione, inquit Celsus, spirare non potest. At in orthopnoea, nedum spiritus crebritas maior percipitur, sed ita affecti, non nisi recta ceruice spiritum trahere valent, & cum decumbunt, seu iacent, suffocari seu strangulari videntur.

tur. Symptomata autem hæc ad morbum in via succedunt, quamuis interdum via ipsa obstruantur, per quas aer inspiratur: interim constriunguntur ac coarctantur pro causarum diuersitate: de quib. postea agemus: atque hæc omnia exemplis illustriora enadent.

OBSERVATIO VIII.

De viro pituitoso dyspnœa paulatim correpto.

Vir annos quadraginta natus, obesus, & pituitosus, cum in hyeme, tempore nivoso, iter faceret, paulatim anhelitus difficultatem incurrebat. Erat a. huic spiritus quidam densus citra tamen sonum & magnam anhelationem, ita ut potius dyspnœa laborare videretur, quam asthma: nam calido tempore hic inuamen sentiebat, veluti thermarum vapore, vel si in cubiculo paulo calidiore sederet, melius se habere fatebatur. Verum cum hic pituitosus esset, & non sine catarrho, ne in asthma aut grauius malum incideret, huic imperauimus, ut in aere calido & sicco versaretur, & exercitium leue, nempe ambulationem lentam ante cibum, ad lassitudinem fere concessimus, & somnum moderatum, & ut diuturnum vitare præcepimus, vinoque tenui vel aqua multa aut cinamomi, in qua aliquid prassij, vel hyssopi incoctum esset, loco potus vteretur, mandauimus, & ad materiam frigidioris concoquendam, ut oxymelle simplicis comp. & syr. prassij & hyssopi aquis hyssopi, betonicæ, prassij, vel decocto similiter vteretur, iussi. atque mox illum purgauimus cum diapbœnico. A venæ sectione, quia in hyeme eramus, nec sanguine abundare, abstinuimus. Postea vtens zacch. enulato, etiam theriacæ veteri 3j. cum vino, & victu calfaciente & exsiccante, etiam assumptis iij. aut quatuor guttis destillationis anisi cum vino, ab hoc symptomate probe curatus fuit.

S C H O L I A.

Asthma causa, nempe ab aere frigido, hæc dyspnœa ortum habebat, postea etiam accedente catarrho cum paucio humore, pituitoso in pectus collapsio: sed facile cessauit malum, sicuti enim dyspnœa, ita & asthma & orthopnoea ab iisdem causis oriuntur: quanquam asthma à grauioribus, & orthopnoea, à leuioribus vero dyspnœa. Asthma itaque, tum reliquæ dictæ affectiones, multas causas habere possunt, licet à Paulo vna tantum assignetur, quæ quidem potissima existit. Potest namque angustia hæc citra febrem excitari, aut à tuberculo copiam iuxta asperam arteriam orto, eamque coarctante, aut à lœtis crassifve, seu multis succis in bronchijs ipsis existentibus, aut eisdem ab alijs partibus ad eadem delatis, ipsam asperam arteriam obstruentibus: alij volunt causam esse tuberculum aliquod crudum in pulmonibus genitum. Nam & Gal. aphor. 46. lib. 6. fieri significat aliquando à tuberculo nato in spina, ut in gibbis: quod si magnum est & durum siue crudum, asthma facit, si non ita durum & aliquid defudat in arteriam, tussim. Aliquando etiam suppuratur, & intecimit. Si fuerit in collo, asperam arteriam coarctat, in dorso, pulmonem & vicina corpora, sub septo, & renes & lumbos, vrinæ quoque intercipit. Malum quoque hoc quandoque generat fumus argenti viui, aer cauernarum, à quibus metalla effodiuntur: ab ijs enim vaporib. contigit

pulmonem nimium exsiccari: ut & ex metallo-
rum cuniculis, ex navis carina, ubi multa cor-
rumpuntur: dirum n. odorem emittit triticum,
quo superuenientes multi suffocati sunt: etiam
in navibus occlusis cereuisia omittis aut in furni-
bulis, quib. cinnabaris factitius, aut similia con-
fici solent, aut arsenicum, argentum vivum, vel
reliqua metallica sublimantur. Si sit à resiccatio-
ne, ut in aurificibus, chymistis, fabris ferrarijs,
& similibus, quibus addi possunt, inunctiones
& remedia à morbo Gallico. *Rhas. libr. 4.* Conti-
nentis adiecit pectus strictum & paruum pul-
monem: Qui natura talem constitutionem habet,
iugiter (inquit) sit asthmaticus, vel si quid in-
caute in spiritalem fistulam, veluti in alienum
tramitem, exciderit, ut refert Benedict. Veron-
nen. de quadam Lucretia Veneta, quæ nucem
Ponticam in pulmonis fistulam imprudenter ad-
misit. Victus quoque intemperantia, nec non
corporis crassities, otio aut natura contracta, an-
helosos subinde facit. Omnium autem frequen-
tissime sit à pituita crassa & viscida, quæ in as-
peræ arteriæ ductib. inuisitata hæret, siue aliunde
defluat (quo tempore saepe subito spirandi difficultas
oritur) siue ibi generati sint: saepe enim spirandi
instrumenta (ut nunc diximus) sui mali principium
habent, cum scilicet multæ superfuitates in ipsis
generantur, quæ aliquando tempore, vi caloris,
in pituitam vitream aut gypseam permittantur,
hinc quoque tempore in grandinem atque calcu-
los degenerant: tales enim aliquando calculos
ex pectore tum pulmone expulsos esse diximus
lib. 14. scholio Obs. 26. cum & in asthmatico fru-
stum carneum eiectionem vidimus, de quo eodem
loco mentionem fecimus: quem & nos probe cu-
rauimus, qui & post carnem illam eiectionem me-
lius multo spirare potuit. Neoterici vero cau-
sam huius procatasticam esse volunt, calidita-
tem vel frigiditatem aëris, casum, percussione-
m, nimium corporis motum, fumigium argenti vi-
ui, & quæcumque odorem pectus contringentem.
Antecedentem vero dicunt esse malam in-
temperiem, frigidam, coarctantem vel obstruen-
tem, vel materiam pituitosam in pulmone vel
eius bronchijs infarctam: & causam coniunctam
volunt esse humores infarctos in arterijs & venis
pulmonis. Signa per se tum vniuscuiusque gene-
ris per se satis patent, tum ex iis quæ scholio præ-
cedente diximus. At signa causarum probe sunt
distinguenda, ob curationem. Si sit ex tubercu-
lo, inter respirandum stertere videtur: nihil
expuit, malum semper augetur, circa arterias
pulmonis grauitas sentitur, veluti Antipatro
medico contigit: demum temporis diuturnitate
asperas pulmonis arterias coarctans spirandi
difficultatem facit. Iam quoque sine manifesta à
capite fluxione, sine sputo aut humida tussi illud
patiuntur. Si vero stertendo strepitum fecerit
respiratio, lentorum crassorumque humorum
perrinaciter impactorum, multitudinem pul-
monis bronchia infestare, indicium est. Sed nec
generatim verum est, quod ex humore crasso
aut viscido semper fiat, sæpe n. vidimus (inquit
Iacchius quoque) à tenui destillatione fieri, & ra-
tio dicitur: quoniam omnia corpora, quæ replent,
spiritum impedire possunt: sic his fieri diximus,
qui metallica tractant, qui etiam aliquando præ-
focantur, ut Galenus in Cypro accidere dicit circa
chalcanti venas: sic & carbonum fumus præ-
focat. Videntur igitur hæc fieri potius qualita-
te attracti aëris, quam quantitate: ut autem
externus aër hoc efficit, ita & vapor venenosus

Signa cau-
sarum.

internus. Sed adhuc quæritur, quæ ratione fiat
hic creber anhelitus? An quia multum refugit
eius respirationem, ideo crebro ad inspirandum
reueritur ob necessitatem? tandem vero præfo-
cat, cum nihil inspiratur, vel cum cor refrigera-
re nequit, quia non admittitur? Hoc euenit etiam
in aëre cauernis incluso, & ita putrescente. Hæc
facile habentur ex causis prægressis & sermonib.
ægri aut astantium. Iam quoque vehementissimo
asthmateprehenduntur laborantes ex vtero. De
ea quæ mulieribus accidit causa, nihil forte in-
conuenit dicere: quod afficitur pectus per consen-
sum vteri: etenim genitalia pectori multum con-
sentire Gal. ait, *1. epid. 13.* & causam ibi exponit:
ideo ab vna parte ad alteram abscessus fieri ait
facile. Cognoscitur a. ex proprijs signis: si ex de-
stillatione, quam primum ab angustia sensu quis
difficiliter spirauerit, id vel à cerebro, vel à vici-
nis sedibus in pulmonem irruentem fieri, porten-
dit, idque sæpius ex manifesta causa accidit, pro-
prijs destillationis signis existentibus: pingui
etenim (ut inquit Theodorus Priscianus, *lib. 2. ad
Timoth. c. 12.*) & frigidophlegmate pulmonibus
adherente, cauernæ vel meatus, quibus natura-
liter spiritus redditur, & accipitur, concludun-
tur: & ex hoc impedimento suspirium, vel an-
helitus molestissimus nascitur, ut sedendo magis,
quam iacendo respirent. Verum si prædictæ as-
fectiones ex alijs quibusdam præter iam dictas cau-
sas, interdum oriuntur, ut ab hepate, splene, sto-
macho, vel diaphragmate inflammatis, vel pul-
monem distendentibus, vel à ventositate, vel
quouis modo per consensum, vel à vertebra dis-
locatis, vel gibbosis, vel à vaporib. sanie, cruo-
re, sanguine trumbofo, vel ab angina, peripneu-
monia, pleuritide, empyemate, aut ex tumore
aliquo abscessui simili in pulmone genito, seu
alijs eiusmodi, licet de his nunc non sit sermo, ex
proprijs tamen prædictorum affectuum notis in-
tersinguentur sunt, potissimum quod non citra
febrem erunt, cum & de his postea acturi simus
in proprijs quoque suis locis, ut de sanguinis spur-
to, pulmonia, pleuritide, & empyemate, &c.
Nos nunc ægre spirantes intelligimus sine febre,
cuius rursus exemplum adferamus.

OBSERVATIO IX.

De Asthmate difficili, hereditario, antiquo & periodico
habente ex succis crassis & viscidis.

Asthma plurimas differentias in se continet,
cum aliud nouum sit ac recens, aliud rursus
sine periodis, aliud vero periodos habens, diutur-
num quoque & antiquum: quale Iusta Teylingia,
uxoris meæ soror, matrona mehercule proba, pa-
tiebatur, per certas periodos, tempore potissi-
mum pluuioso, niuoso magis & nebuloso, cum
difficili anhelatione, adeo sonora, tanquam per
fistulam aër cum magno conamine exsufflaretur,
ut etiam extra cubiculum subinde sonitus exau-
diretur. Insuper & hoc malum erat heredita-
rium: pater enim eius Augustinus Teylingius hoc
eodem malo afficiebatur, uti & duo fratres Bar-
tholomæus Teylingius Prætor Alcmarianus, &
Augustinus. Teylingius iunior frater. Filia quoque
eiusdem Iustæ, virgo. Ideo peius malum erat, &
hereditarium, & diuturnum: & quia iam ætate
satis prouectiore, difficulter in talibus asthma
curatur. Etenim de signis prognosticis difficul-
tatis illud commune est, quod in ætate decrepi-
ta non sanantur, neque diuturna iam, propter ma-

magnam infirmitatem, quam viscus contraxit,
sicut pectus diuturni dolores articularum, nec aliud
malum vllum eiusmodi quod ad multam infirmi-
tatem partem trahat: propterea in iis, qui male
formato sunt pectore, ut angusto thorace, vel in
iis qui natura ad hunc morbum inclinant (ut hic
quidem, & morbo hereditario, viscus imbecillum siebat,
& à leni causa ladebatur ob angustiam malo sæpius re-
pente & diuturno, ex frigidis humoribus orto) ita in
valde senibus si excitetur, iuxta aphor. 40. lib. 2.
ex commento Galen. eos fere comitari solet ad mor-
tem. Hyeme magis corripiebatur: nam, Cælio
Aureliano teste *lib. 3. cap. 2.* magis grauat atque
premit hæc passio mulieribus viros, & iuuenibus
senes atque pueros, & durioribus corporibus na-
tura teneriora hyberno tempore atque nocte
magis, quam die vel æstate. Omnes autem isti,
de quibus diximus, asthmate laborabant ex pi-
tuita viscida & crassa, arteriam tracheam, tum
pulmonem cavitatemque pectoris implente, si-
mul & tussi quandoque grauiore pituitosum
quid exspuentes, modo difficili anhelatione tan-
tum sine tussi. Fratribus vero, qui iuniores erant,
vena tempore veris commode fuit secta, idque ex
Pauli & Celsi, tum Galeni decreto, cum vires ve-
næ sectionem admitterent, quæ à Cælio & Prif-
tiano quoque laudatur. Reliquam curationem,
quæ plurima cum tussi communia habet (ut in can-
sis & affectibus nature communia) post totius corpo-
ris prouidentiam absoluius cum iis, quæ ma-
teriam viscidam & concoquent, & deinde eua-
cuarent. Interea prius distinguendo aliam esse
curandi rationem in iis, qui iam in accessione
sunt, aliam in tempore medio, cum hoc malum
periodos haberet. Ideo tempore medio & ante
accessionem diligenter viscus rationem institui-
mus, ut cibos concoctu faciles sumeret, & qui
tenues succos gignerent, & ut omnem crudita-
tem vitaret: in ea enim caput pituita repletur,
vinumque modice sumptum, tenue, aquolum, &
pallidum, quod minime caput tentaret, concess-
imus, & ut aërem clarum eligeret, mandauimus,
à paludibus semotum, sicum, apricum, in-
solatum, & exercitium ante cibum. Per inter-
ualla pilulas ex hiera simp. vel compos. de agari-
co & assaieret (quæ neque diacridium neque myrobol.
reciperent) exhibuimus. Aliqui & hic singulis
mensibus vomitum laudant, præsertim si facile
vomant, alioqui præstat per aluum purgatione
viri. Deinde etiam decoctis extenuantibus & ex-
pectorantibus (capite prius quoque expurgato & ro-
borato ob causam arduam) utebatur: & syrups pecto-
ralibus, prius quoque auersione & diuersione fa-
cta cerebro: & post pilulas dictas etiam theria-
ca, cuius usus (ut & diacalamimbes & oxymelitis
scillini) eximius est præ omnibus, ut prorsus à pe-
riodo liberare queat. Dum extra paroxysmum ef-
fet, ad nares quoque materiam deriuare conten-
debamus. Utebantur omnes oxymelite scillino,
inula campana condita, & similibus. In accessio-
ne (causam antecedentem inspicientes) si copia
sanguinis adsit in corpore & magnitudo affectus
suadeat, venam secamus communem, sed in duo-
bus fratrib. fecimus, mox purgamus, ut prius
leni purgatione, quæ à capite attrahit, & à supe-
rioribus reuellit, ut est hiera cum agarico: quæ
purgatio vti sumus in his duobus, tum mulie-
re. Vniuerso corpore repurgato, caput etiam re-
secuimus: deinde & pectus repurgauimus, ideo
& oxymel aquosum dedimus, hyssopo incocto.
Non desunt qui commode cerebintina 3 ss. ex-
hibebant ex oleo amygd. dul. pectus & aluum si-

mul purgant. loch etiam de scilla dedimus, &
confectiones quæ ex helenij radice conficiuntur,
tum loch de pulmone vulpis. Sed & huic matro-
næ egregie contulit. quod urgente spiritus dif-
ficultate, ptisando sumpsit aliquot guttas vini
ardentis è vino Rhenensi per destillationem de-
purati (vulgo aquam vitæ vocat) vel cum sub no-
ctem sumeret bucellam paruum panis macerati
in tali vino. Post materiam paratam & incisam
ac concoctam fratribus quoque egregie profuit
apozema ex folijs senæ, & agarico, cum herbis
pectoralibus aperitiuis: sumebant subinde &
rad. althææ conditas, & enulæ, uti & vinum
enulatum egregie quoque contulit, (post sectio-
nem venæ & purgationem) M. Adriano Wentzio
consiliario, cognato nostro, qui pectoris & in-
terscapulij dolore afficiebatur, & asthmate ex
compressione diaphragmatis, oris ventriculi re-
pletione, ut aliquando in via sistere deberet nec
progredi posset, ob anhelitus difficultatem: qui
nostro consilio vtens, tum Martini aditui Am-
stelrodamensis, istis & similibus remedijs bene se
habuit. Hic tamen post aliquot annos in platea
concidit ex asthmate, & subito mortuus est. So-
lebat enim bis in anno sese purgare, nostro con-
silio, quod cum iam intermisisset, quanquam ad-
monitus, subito exstinctus est.

S C H O L I A.

Prima differentia, scilicet, dyspnœa (Celsoreste)
diutius trahitur, duæ vero insequentes, asth-
ma & orthopnœa videlicet, acutæ esse consueue-
runt: ob vehementissimas etenim accessiones in-
terdum ægros strangulare solent, id quod
dyspnœa proprie dicta, nequaquam efficere va-
let, cum modica in ea consistat spirandi difficul-
tas, si asthmaticis quoque deliquium animi fre-
quenter superuenit lethale augurium facit. Et
quibus gibbi ex asthmate (teste Hippoc. Aphorism.
47. lib. 6.) aut tussi sunt ante pubertatem mo-
riuntur: vti euenit filia Iodoci Francisci cereui-
sarij Delphenensis, quam longo tempore ante me
Henricus Vergerius medicus Haghanus in cu-
ratione habebat: atque cum ego deinde etiam
accitus essem, curationem impossibilem esse di-
ximus: quando enim magis confirmatur, tanto
eius cura, secundum Auicennam, difficilior est.
Ego enim plurimos tales vidi, ut etiam Gradus
fateretur, nunquam curatos: licet etiam cum ma-
gna diligentia tractarentur. Ideo quædam in ea-
dem puella, ut matri & huic complaceremus, tē-
tauimus, sine spe tamen curationis: cum illi, qui
non ex tuberculo, sed ex ictu aut casu gibbi sunt,
melius restituantur, vel si restitui non possint,
diutius uiuant. Sic ego memini in Iusta Neobur-
chia cognata uxoris meæ Alcmariana: quæ cum
decimum septimum annum ageret, ex casu facta
est gibbosa, idque paulatim, cum propter pu-
dorem parentibus se cecidisse non indicauerit:
cumque chirurgum non aduocasset, gybbus tan-
dem inualuit, ut parentes tunc prius animadu-
uerterent, cum tota incuruaretur filia, alioqui
pulcherrima. Cōuocatis tunc medicis atque chi-
rurgis, restitui non potuit, ut ob gibbum, quam-
uis nobiles annos habens, vitam celibem deinde
transegerit, factaque paulatim asthmatica diu
vixit cum magna miseria, vsque ad annum 38.
ætatis suæ: tunc ex asthmate in pulmoniam lapsa,
mortua est. Maximum enim periculum imminet,
cum asthma in febre acuta euenit, vel vna cum
asthmate iungitur. Etenim à calore febris, modo
si suapte

Signa præ-
gnostica.

si suapte natura sit difficilis scatur, multo red-
ditur difficilior siccatione plurima. Præterea
cum ea egeat multa inspiratione frigidi aëris,
hæc autem ob angustiam fieri nequeat, breui pe-
riclitari vini vitalem esse necessarium. Adde
quod febris irritatur maxime: minimum vero fe-
bri adiuncta læduntur, qui ex aquosa pituita id
patiuntur: nam crassescit & excreatur: tunc ve-
ro maxime periclitantur, cum viribus sunt inua-
lidis: cito enim in syncopen aguntur & mortem.
Proximos igitur morti iudicabimus, cum inæ-
quales admodum sunt pulsus, præsertim si inter-
mittant, idque in iuvene. Hæc ex adiunctis af-
fectibus. Ex pituita frigida ortum malum, super-
ueniens febris sanat, & varices quoque enata id
curant. Imbecilles asthmatici non diu viuunt. Id
malum quoque si vertebrarum vitio contingat,
si introrsum id fiat, nunquam sanatur: atque is
morbus, ut iam diximus, in peripneumoniam
transitum facit: & si diuturnus est, ægrum ad he-
patis læsionem deducit & hydropem: & qua pe-
riodos habet, præter opinionem subito sæpe in-
terficit. Quamvis in pueris permutatione ætatis
sæpe curetur, ob victum calidiorem & materiæ
frigida consumptionem: quæ huius mali causæ
existerant, cum & crescentibus anhelitus orga-
na melius dilatentur. At periculum maximum
imminet, cum omnes musculi intercostales, su-
periores scapulæ & omoplata trahuntur, virium
imbecillitas, vehemens calor, angustia partium
spiritualium conspicitur. Vbi omnes aut plures
concurrunt, æger morti proximus est: ubi duæ,
non facile seruari potest.

OBSERVATIO X.

De Orthopnea.

O Orthopnea adeo graui subinde laborabat
M. Hieronymus presbyter Alcmarianus,
& vxoris meæ auunculus, ut in ipsa accessione
adeo difficilis fieret respiratio, ut etiam in
platea, si exacerbatio contingeret, staret toto
tempore accessionis parietem innitens, ut ita anhe-
litum traheret. Posteaquam accessio conquies-
set, melius respirare potuit, & quocumque libuit
abire. Attamen cogebatur leuiter incedere, alio-
qui facile periodus reuertebatur. Hoc autem ma-
lo multis annis detinebatur: quem alius Medicus
ante noscebat. Malum aliquando adeo inua-
lescebat, subinde reuertentibus paroxysmis, ut
cum parietem alicuius domus, primum obuiam fa-
cta inclinans, erectus stare cogebatur, à pariete
se se mouere non posset, etiam si domus fuisset co-
busta, donec accessio quiesceret. Multa huic re-
media frustra adhibita fuere, cum tempore iu-
uentutis apud amicos crapula vtrumque indul-
gisset, cum etiam Veneri, concubinam domi alens:
quam cum relinquere nollet, malum frequentius
recurrerebat, anno 1548. sub finem Decemb. atro-
cissimo obrepente paroxysmo, ita ut per duos in-
tegras dies & noctes corpore erecto in pedes sta-
re cogebatur, imo sustentari à duobus robustissi-
mis viris: alioqui lassus si sederet, suffocationem
incurrerebat. Hic cum me antea cum medico alio
in consilio adhibuisset, primo die cum hoc malo
tam sauo corriperebatur, eundem alium medicum ad
se vocauerat: cumque eo tempore ego apud do-
minum de Schagen ex hydropis periculose de-
cumbentem agerem, ab eo reuersus ægrotum in-
uifens ita misere paroxysmo diuturno detentum
animaduerti, spirationemque tremulam adesse,

pulsusque inæqualem ac valde inordinatum,
sapiusque intermittentem ac deficientem, tan-
dem & languidum magisque tardum, ita ut sub-
inde syncopen incurreret. Iam quoque spiritus
paruus, tardus & frigidus ex ore prodibat: cer-
tum indicium, ægrum non diu superuicturum,
pulsu quoque ex tardo in nimis crebrum, & val-
de languidum permutato: ita ut amicis astanti-
bus mortem præ foribus adesse prædixim, me-
dico tamen altero spem salutis ægro pollicentes,
quod is breui sanaretur. Cæterum cum paroxys-
mus adeo violentus & atrox continuus quatuor
fere dies permaneret, atque ipse fatigatus, am-
plius ita erectus à viris sustentari non posset,
mortem breui adfuturam pronuntiaui, ex præla-
gio doctissimi illius Leonelli prædicti, cuius verba
ita habent: Anhelitus per os & nares exiens
frigidus, mortale: & in asthma seu orthopnea
anhelitus tardus & paruus, vel frigidus, vel syn-
copis, vel si cogitur super pedes stare, quia an-
helitum habere non potest, mortale. Hæc cum ad-
esse viderem, ut si quæ agenda essent ægro hic emi-
graturo, id consultum iudicabam, cum presbyte-
ris curatio desperata esset: quare extrema inua-
sione peracta, lecto nunc incumbens cum am-
plius stare non posset, mox expirauit: ex cuius
augurio non minorem honorem habui, quam si
ægrum curassem. Ita quoque Franciscus Guilielmus
de Bodegem, cognomento Heerius, vir circiter
octoginta annos natus, singulis fere noctibus
hoc eodem malo pressus, recta ceruice spiritum
trahebat difficillime. Ab hac quidem molestia
subinde per me & Cornelium Ericium anno 1559.
subleuatus, quamquam per totam noctem prius
sella insidere cogebatur, sæpe apozemate inci-
dente sumpto & pilulis agarico ad 3 ss. tres pilu-
las conficiendo aliquot dies, miraculi instar or-
thopnea cessabat. Attamen in senectute cum tempore
paroxysmi vel pituitosum quid vel viscidum, mo-
do etiam cruentum quid exspueret, citius accessio
terminabatur: alioqui, si nihil exspueret, pro-
trahebatur. Extra paroxysmum nunquam tale
quid cruentum vel viscidum exspuebat. Hic tamē post
aliquot menses paroxysmus reuertentibus. cogebatur
rursus sella insidere: & si se ad lectum compo-
neret, mox redibat accessio. Quid multis: post
annum vnum, post sonitum campanæ nocte indi-
cantis, incendium in vrbe esse (scilicet noctis, 10.
die April. anno 1560.) experiretur & terribus, in
paroxysmum vehementiorem incidit: adeo ut
antequam ex lecto euocatus illum adirem, eun-
dem (quod antea sæpius de morte inopinata in senectute
dixeram) suffocatum ac mortuum repererim.
Libenter autem mortuum corpus secuissemus,
cum causam mortis vel tuberculum, vel abscessum
in pulmone arbitraremur: sed amicii ad-
mittere nolabant.

SCHOLIA.

Quid sit orthopnea, iam antea diximus, cum
non nisi recta ceruice in ea spiritus ducatur.
Causas easdem habet cum asthma, licet ef-
ficaciores: estque symptoma multo periculosius
asthma. Fernellius adeo lentum humorem habere
quandoque putat, ut in grandinem concreseat,
atque hæc rursus in calculos veros, quibus inter-
dum dissectos pulmones confertos deprehendit,
alios præduros, alios solidos in casei substantiam
concretos, incipientes, alios gypsea duritie, om-
nes quidem propria cysti obduetos. Ita vir qui-
dam Fernellio occurrebat, qui quoties exercita-
tione

tione incallescerebat, concitata tussi calculosè pul-
monibus, edebat præduros, eosque excreabat hor-
dei modo, modo pisi magnitudine. Bona tamen
is valitudine fruebatur, præterquam quod paulo
difficilius respirabat, & in medio thorace graui-
tatis cuiusdam pondus percipiebat. Apud Brie-
lenes quidam per quatuor annos ex pulmone ta-
be laborans, quatuor vel quinque lapillos ad pi-
si magnitudinem fere albos induratos calcis in-
star exspuebat, ut nos vidimus. At vir ille apud
Dodonæum, 36. plus minus ætatis annum agens,
orthopnea laborabat, cuius accessio subinde sin-
gulis mensibus, quandoque rarius, & bis aut ter in
anno, inuadebat, & per humidam frequentius,
quam per siccam aëris constitutionem: cui & dif-
ficilis in accessionibus, erat respiratio, stabat toto
tempore mensæ aut tabulæ alicui manibus inni-
tens: efferebatur, ac profluebat ex ore humor len-
tus viscidusque: cibum vix, potum ægre admit-
tere potuit: sæpe toto accessionis tempore stans,
absque cibo & potu copiosius horas transigebat,
accessione finita libere spirabat, & quocumque
libuit abibat: quatuor aut quinque milliaria
quandoque vno die pedes perfecit, sed decum-
bere non valuit: quocumque enim iacere co-
nabatur, mox omnia circa respirationem mole-
sta. Noctu sedendum illi erat in sedili aliquo,
nec aliter somnium capere aut conuiescere illi
integrum erat. Agarico purgatus, visus est me-
lius habere, sed ad exiguum tempus. Profuit
etiam subinde diacymion & diaspolicicon. Vbi
autem consensisset, sponte & absque vllis re-
mediis à molestia orthopneæ liberatus hic est:
cessantibus, multo tempore exacerbationibus, tan-
dem periculum iacendi fecit: quod cum citra in-
commodum succederet, relicto sedili, in lecto
per noctem decubuit. Tenax erat humor, asperæ
arteriæ ramulos obstruens, ac meatus interclu-
dens: quo superabundante, mox accessio conti-
git, quæ tantisper durauit, donec portio eius
per os expurgata esset. Sed cur intermissionis
tempore iacere, aut in lecto decumbere non fuit
integrum: An quia non omnis humor excretus &
decumbendo minus liberi sunt pulmonis mea-
tus, atque coarctari sic contingit, & idcirco
quoque à lento humore facilius obstrui? Decum-
bentibus enim pulmo (ut Gal. 4. de loc. affect.)
in se concidit: erecto vero thorace non amplius
seipsum grauatur, tunc enim omnes asperæ arteriæ
propagines dilatari contingit, & interiorum pe-
ctoris regionem augeri: ut in commentarijs
Prorrhæticon idem scribit. Idem Dodonæus nar-
rat de mercatore quodam etiam iuvene, correpto
simili orthopneâ, in quo nullum remedijs genus
intentatum relictum est, sanguis sæpe detractus,
& frequenter purgatus: bibebat & aquam fontis
Leodienfis, sed nullo succedente fructu, tandem
calculo in renibus, doloribus ac podagra corre-
ptus, ab orthopneâ liber factus, decumbere po-
tuit, cum antea aliquot non paucis annis, in sedili
somnia capere debuerat. Cæterum curatur
orthopnea, ut asthma: venæ sectio adhibetur uti
in asthma, si vires admittant: materia deinde
digeritur, prout tenax est. Verum licet ea sint
adhibenda, quæ humorum crassitudinem ac vis-
cositatem attenuent, incendant: & detergant, ea
tamen rursus tussim mouent, ut ex 7. de comp.
med. secundum locos & 5. de simpl. med. facul.
constat. Bechicis etiam opus erit, sed non iis, quæ
materiam incrassant, verum opus habent multa
humectatione, ut melius expectorent: quale dixi-
mus esse melicratum, oxymeli, & ptisanam, &

ideo etiam Aëtius à multum calidis, tum Gale-
nus, abstinebant, ne calore viscosiores & glutin-
osi humores difficulter auellerentur, vitando &
refrigerantia & astringentia. Ideo & scillam as-
sam cum melle laudabant, nos syr. de hyssop.
glycy. de prassio, med. ros. antea laudauimus.
Deinde purgationem ex cassia, agarico trochis-
& diaphanico. Postea & clysteres validiores ad
aluum eluendam: quales & Donatus commen-
dat, mox & diapenid. diaphysop. diaireon. Ex-
trinsecus cataplasmata, iuxta Paulum, Aëtium,
ex sicibus, hordeacea farina & lollacea cum res-
sina & melle imponenda: vel vnguentis & vapo-
rib. calidioribus vtendum: quorum copiam inue-
nies apud Guainerium cap. proprio: is iubet ab-
stinere à fumigijs, quæ arsenicum continent.
Non desunt; qui & vitiones & cauteria laudant:
quale & ab Aëtio describitur lib. 8. c. 57. de Asth-
mate. Si ex tuberculo, eadem fere conueniunt, quæ
in cruda, viscida, pituitosa, ut Galenus Antipa-
tro (4. de loc. affect.) præscripsit, qui grandines
expellebat, quamvis tandem mortuus. Si per
consensum, ut à materia venenosa vel vaporibus
venenosis curatio eiusdem est causæ abscessio: ut
si ab vtero, eidem succuratur. Si à causis exter-
nis, vel ab aëre corrupto amoueatur, excitentur
vinum sorbeant vel aquam cinamomi: si ab in-
ternis abscessibus, illi quoque curentur: si à ven-
tositate, resoluantur: si ex gibbo recurratur ad chi-
rurgiam. Reliquum curationis apud alios aucto-
res longo sermone inuenies.

OBSERVATIO XI.

De cruento sputione sæpius recurrente.

Monachus quidam ex Diui Francisci ordi-
ne, iuuenis annum trigimum agens, spu-
to cruento quotannis fere, tum destillatione, Alcmariæ
affliciebatur. Huic statim, cum eum adiuu-
sem, venam internam basilicam tundere iussi:
Deinde aluo soluta cum cassia, cui pulueris rha-
barbari exiguum adiectum esset boli modo.
Etiam per os decoctum herbæ acetosæ, plantag.
polygoni, portulacæ cum syr. ex portulaca com-
mode propinavi. Insuper elegmata sæpius gustaba-
bat ex syrupo myrteo, portulacæ, bolo armeno
vero & terra sigillata, ac zaccharo penidiarum
inspersis captiti quoque ob destillationem, qua
frequenter laborabat, quæque tussim incitabat,
cucula imposita ex maltiche, ros. siccis, sandra-
ca. Quibus remedijs hic probe curatus fuit: quæ
admodum & alter Alcmarianus, qui in vere po-
tissimum solitus erat sputo cruento laborare, id-
que ex plenitudine quadam. Huic vere incipien-
te statim sanguinem detraximus, mox & alijs
commodis remedijs exhibitis, optime conualuit,
cui & anno sequenti antequam sputum appare-
ret, vere quoque incipiente, cum sanguis detra-
ctus esset, in posterum ab hoc malo præseruatus
fuit. At valde cuidam tussienti, cum sputum
sanguinis redderet, post venam sectam ad vncias
quatuor, imperauimus, ut paulatim lambendo,
hunc linctum deglutiret, quod egregie profuit:
2℥. conferuæ rosæ, antiquæ, electuarij diatrags. frig. an.
3j ss. boli arm. veri, loti cum aqua rosæ. 3 iij. amyli 3
ij. excipiantur cum syr. iunibino & myrteo, & fiat electu-
ma. Multis quibus sputum valde copiose redde-
batur, neque medicamina iuuabant, drachma
vna philonij Persici, cum aqua plantag. & portu-
lacæ ante cibum propinata profuit: uti & ius fri-
gidum decoctorum ziziphorum, in quo candens
ferrum

ferum exstinctum fuerit: omniaque actu frigide fumenda.

SCHOLIA.

³ Sanguinis excretio quæ à Græcis *αἱμορροΐς*, & *αἱματὶς τῆς σπύης*, nuncupantur, à Latinis sanguinis exspuitio, seu reiectio, seu cruenta spuitio dicitur. Dicitur n. *αἱμορροΐς*, *αἱματὶς* Græcis, quasi *αἱματὶς*, sursum ferentes, qui ex inferioribus partibus per os sanguinem reiciunt. Et sic cum ad tussis genera quædam facile sanguinis sputum accidit, insuper & ad disrupta tubercula, ideo de hoc affectu quidam post tussim agunt: quidem affectus inevitabilem saepe mortem inducit, non quidem subitam, sed diu misere contabescere corpore. Et quod ad hunc affectum attinet, cum multiplex sit, ut de sanguine profluente naribus diximus, & cum symptoma sit potissimum in excrementis, cum exeat id, quod non debet, & ea parte, qua non debet, ideo & hæc cruenta spuitio, non modo inter alias sanguinis expulsionem, verum etiam inter alios præter naturam affectus difficilior existit: nam pessimorum longorumque morborum magna ex parte causa redditur, Alexandro teste cap. 1. lib. 7. Nam qualibet sanguinis eruptio toto genere præter naturam esse censetur, ex excepto sanguinis flore, qui mulieribus ab utero defluit, cum videlicet, modum in quantitate non excesserit: ut 3. de caus. sympt. Gal. testatur. Nulla enim excretio sanguinis à natura est instituta, excepta ea, quæ per menses fit. Quod si 5. Aphor. 33. solum profluuium à naribus laudatur, intelligit Galen. comparatione aliorum, quæ ex ore fiunt: quoniam ex eo, aut nulla, aut facile evitabilis noxa adest: neque quantum in se est (ut etiam doctissimus Iacchimus medicus amonuit) noxam facit, sed fere multitudo excretionis. Sed de sanguinis profluuii narium prius dictum est. At hic affectus (de quo nunc loquimur) ex ore qualibet sanguinis excretio est. Sed rursus sanguis ex ore profluens, de multis partibus euenire potest, unde & Prognosticon quam maximè euariat & curatio: hinc primum oportet distinguere, quæ sit pars quæ afficitur, & qua sanguis profluit. Pars igitur hæc sunt, iuxta Galen. 4. de loc. affect. (quem & alij Græci cum Arabes ac Latini sectati sunt) nam aut è gula, ventriculo, aut spiritalibus partibus, thorace videlicet, pulmone, seu aspera arteria, aut ex faucibus & gurgulione, vel ex ipso proprio ore, seu ex gingivis expellitur: per narium etenim communes palati meatus in os descendere potest: secundo à faucium venis: tertio à lingua & gingivis, ut lib. 14. Observ. ostendimus: quarto ex pectore, vel pulmone, venis, arterijs: vel ab arteria ipsa: quinto è stomacho, qui etiam distinguitur, quoniam vel à liene est, vel à iecore, vel à mesenterio. Vidimus nos & ab utero mensibus repressis sanguinem per os regurgitasse, ut suo loco sumus dicturi. Illud tamen animaduertendum, ut inquit Cælius Aurelianus cap. 9. libro secundo, quod differt fluor sanguinis à sputo, quod neque fluor sanguinis sputus dici potest: partem enim materiam significationem sputus refert, fluor plurimè neque sputus sanguinis fluor, supradicta ratione: partem enim materiam sanguinis ex gingivis, aut vena, aut faucibus emissam, sputum magis quam fluorem rectè nuncupamus. Differt ergo fluor sanguinis sputo ratione plurimè aut exigua quantitatis sanguinis ac partium diuersarum, ex quibus profluit. Hæc

omnia exemplis infra dicendis clariora evadent: etiam methodo distinguendi affectum patrem illustrior fiet.

OBSERVATIO XII.

De cruenta sanguinis floridi spuitione ex vena rupta pulmonis per tussim validam.

Theodoricus de Loey, Regius consiliarius, annum 32. agens, cum apud Haghanos sanguinem floridum valida tussi expueret. (Nienius medicus in curatione assistebat) me atque Cornelium Ericum collegam meum ad consulendum de huius sputi origine vocavit. Ex signis tunc presentibus unanimiter conclusum est, hanc sanguinis spuitionem cum valida tussi originem suam habuisse à vena pulmonis disrupta. Ideo ter sanguis per vices exigua quantitate ex cubiti vena interna detractus est, iuxta Galeni decretum 3. methodi medendi. Verum cum non perpetuo, sed subinde talem reiectionem sanguinis pateretur, imperavimus, ut astum, soles, ignem, puluerem, thermarum affusionem, sulphuratas aquas, frigora, nives, septentrionum flatus vel Euri calidiores vnice vitaret: merorem præcipue, cum gener eiusdem Adrianus Leydius Pensionarius Delphensis tabe laboraret, in cuius adibus hanc spuitionem contraxerat. Insuper consulimus, ut declinaret iras, iurgia, contentiones, clamores ac vigilias, minimeque purpuram & coccum, ex Galeni sententia, intueretur. Acris quoque omnia & salsa & amara & supra modum acida in cibis damnavimus: licet & concesserimus moderate vnam acerbam, citrea & mala punicæ medini saporis, pruna & actia cerasa, similiter & thus Syriacum in condimentis, panem quoque simlaginicum, oryzam far, punicum, milium, lentem, fabam & amyllum: carnem agnina, vitulina, vervecina, hædinam, omniumque intestina, iecora, pulmones, cerebella, perdices, coturnices, phasianos, attagones, turtures, turdos, merulas, pavones, pullos, alaudas, & his similia, sed in parva quantitate: nam abstinencia hos iuvat in principio, ne abscissus imminet: præterea & cotonea mala, quemadmodum & pyra & sorbas, & mora admissimus: cum & alij mespila & palmulas, & myrti baccas extollant, & ex hortis portulacum, cucurbitam, endiviam, leetucum, ciclorium sine aceto. Lac item decoctum exempto butyro, quod & macie confectis prodest: quidam & in eo commode candente ferro vituntur. Dedimus & caesum recentem (nam sine sale valde efficax habetur) & ova sorbilia postea, triticeamque pulcem ex eodem lacte: alij ex vino austero dant, vetulam tamen minime prodest: quibus addunt & vinum rubrum in parva quantitate, modo febris abest, postea admixta aqua ferrata & celesti. Valde damnavimus & Venetrem & crapulam & famem: somnum autem longiorem concessimus, & ut erecta ceruice dormiret, aut in latus incolumem, insimus. Et ita proba victus ratione huic symptomati congrua præscripta, & adhibitis remedijs increpantibus, sanguinem & refrigerantibus, ut syr. de portulaca, myrtino, ex pap. cum aqua plantag. & vngula caballina, & decoctis & eclegmate, ex syr. de portulaca, diarrag. frig. & bolo ameno vero, prius repurgato ex 3 j. cassia & 3 j. rhubarb. pul. in bolo bene habere cepit, rotulis quoque paulatim in ore detentis & deglutitis, in hunc modum præscriptis: 2℥. amygd. dulc. vitarum prius repurgatarum: amygd.

an. 3 i℥. gumm. tragac. 3℥. gumm. Arabici, boli armeni veri, an. 3 ℥. sem. plantag. portul. pap. albi an. 3 j. pulcriscentur, solvantur cum aqua vngula caballina, equiseti plant. adiecto zaccab. q. s. fiat confectio solida in rotulis 3 ij. ponderantibus. Interim à melle & zaccabari vlu nimio abstinere iussimus: nam huius vsum frequentem nocere auctores inuenere. Deinde in maiori copia conf. ros. Quibus cum vsum aliquantisper fuisset, quæ sanguinem inerasant, in frigidant ac moderate restringunt, & glutinationem quandam habent, optime habuit. At post aliquot dies id victus genus pertaxus, dum & sorbitionem ex hordeato amygdalato relinqueret, & liberaliore victu præter nostrum institutum vteretur, & minus conuenienti, rediit sputum cruentum, ita ut omnino relictis nostris remedijs alium medicum, aliqui doctissimum, ad se vocaverit, qui cum Nieuenio (ut nobis postea relatum est) disputationem coram ægro inuit, & non venam sed arteriam pulmonis ruptam esse proposuit. Quod si ita res habet, inquit Nieuenius, æger proculdubio moriturus est. Cæterum de venis aut arterijs ruptis, licet copiosior sanguis erumpit atque spumofus, calidior ac reliquo sanguini similior, is clarus ac tenuis reicitur. At nos aliam differentiam in ipsis deprehendimus: ex arterijs dilucidior subito & leui causa effertur spumofus, antecedente quodam caliginoso vapore: qui licet in parte externa saliendo videatur exire. Id minus in pulmone cernitur: sed ex pulmonis materia vniuersus sanguis spumofus ex omni parte videtur subrubicundus. Sed cum nostra deinde & Nieuenij remedia relinqueret: sola alterius medicis opera vsum est. Verum cum & ille postea parum proficeret, sputo sanguinis sæpe redeunte, eodem quoque reliquit, & tandem spretis omnium optimorum medicorum prædijs, suo morte vixit, ita ut tandem in tabem incidere: tunc demum Amstelrodami profectus, adiit quendam Empiricum valde famosum apud vulgares in hac Gallicia curanda. Nobilibus quibusdam ex curatione cuiusdam Grandij, quem à morbo Gallico restituerat, innotuerat: hunc consiliarium tam tabe confectum hic curandum receperat, qui sibi (proh dolor) male consulens, breui admodum tempore in huius Empirici manibus occubuit.

SCHOLIA.

Quoniam à diuersis partibus sanguis rejicitur, diligenter methodo pars affecta erit distinguenda, ut egregie nos admonuit Galen. Ideo operationes læsas primo considerabimus, si quæ sint, quæ sensibilibus lædantur, ut motus præuicinus sint, exempli gratia, respiratio: num cominina sit, & secundum naturam, an contra se habeat, si enim vitiosa sit, aliquod ex instrumentis illis seruiantibus laborare est necessarium, arteriam scilicet vel pulmonem, vel thoracem, vel septum. Postea excrementa spectabimus, atque in primis excernendi modum: num cum tussi, an sine ea fiat. Qui enim cum tussi sit, ex membris spiritui deservientibus educi videtur: & ratio est, quoniam vias spiritus ingreditur, & eas occupat, unde irritatur natura ad propellendum, & hoc signum satis facit quibusdam, ut Rhafis & Auicenna, sed signum est inefficax. Etenim (ut Gal. 4. de loc. affect. habet) is, qui a faucibus sit, omnino à capite descendit, tussim facit: id etiam nos in praxi sæpe obseruauimus: unde plurimi tum vulgares, tum medici frustra sunt perterriti. Idem præce-

ptor meus Benedictus Fauentinus cap. proprio nos admonerat ex decreto Galeni, cum sanguis aliquando ex cerebro & gurgulionis partibus interinis affatim descendat, & subito gutturi irruens (quod caput est aspera arteria) tussim moueat, & deinceps tussiendo per os educatur: quo fit ut sanguis is à spiritali instrumenti cum tussi exeat, nullo disrupto in eo vase, ita ut instrumenta spirationis primogenia affectione non lædantur, sed solo defluxu materiam à cerebro ad spirationis vias: ideo diligenter nos adhortatur præceptor meus: ut illud diligenter notemus, cum viderit præstantissimos medicos, hanc eruptionem periculosissimam fore pronuntiantes, ut exesa vena in organo spirationis vel pulmone, prædicat inde phthisin ac mortem, cum tamen altero aduentante die æger sanus euadat: medici iudicio errante, ipsoque in vulgi fabulam confidente. In contrarium & illi labuntur, qui sanguine à pulmone prodeunte, & cum aliquid sanguinis ad nares regurgitatur sanitate promittunt, non diu post phthisi subsequente ac morte. Atque is error peior est priori. Quare hoc vnicui præcedente signo ià dicto non erimus contenti, considerabimusque affectionem, num per consensum pars aliqua sit affecta, ut caput, & num ex aliquo loco oris, aut gingivarum (ut antea ostendimus) simplici exspuitione exspuatur. Quod si quid per nares feratur, clariora res erit: caput vero vel calefactum, vel omnino dolens hoc mittere solet, & quamvis subito ex gurgulione in pectus irruere possit, ut nunc diximus, verum ex dicendis patebit, qua via id interfingui valeat, quamvis nonnunquam etiam accadat, ut pluribus ex ordine diebus (quemadmodum & antea meminimus) quispiam sanguinem excreat & emungat, idque citra capitis vel dolorem vel gravitatem præsentem, siue præteritam, neque aliquo præcedente ictu, propter deformatam hirundinem, in ea oris parte adhaerentem, qua ad nares foramen tendit. Quare hanc partem, & totum per nares meatum accurate, & sæpius considerare oportet, præterita quoque semper interrogando: namque ex his rei ipsius veritatem facile conicies: eadem ratione ex ventriculo quoque epota hirudine, cruor euomitur: verum is siue ex ventriculo, siue ex naribus, siue ex ore feratur, tenuis erit, sanieque speciem refert, eodem Galeno teste. Cæterum si per consensum in pectus sanguis prolatur, sicuti intuenti ad solem hirudo affixa faucibus, inspicitur, ut & sanguinolentæ fauces & gurgulio, si inde excidat: sed & tussis leuissima erit: solum enim levis quædam gutturis proratio est: motus vero excernens secretus: cognoscimus autem, non posse ex tussi adeo leui quippiam ex pectore educi. Quod si sine tussi, ut secretum, vel vomitu, statim certo scimus, ex pulmone aut pectore non esse, & ita arguere negatiue est validus. Distinguere igitur, num ex faucibus an ex pectore eueniat, coniectura certa non est: ideo sæpe medicos inter se certare videas, ut Iacchimus referebat. Verum idem mox addit. Sed ex multis præcedentibus conicitur, præter operum læsionem, quam diximus, puta ex affectibus capitis, partium oris & pulmonis vel pectoris, neque enim subito ex his fertur sine aperta causa. Cæterum ex faucibus & gurgulione (ut libro præcedente ostendimus) secretum effertur: vel ipsis primario affectis, aut per consensum à cerebro sanguine ad ipsas partes contingit. Verum si à capite (ut & Donatus ex Galeno annotauit) descendant, præter id, quod secretum, seu tussim interim inicitur, aderit ipsius palati titillatio, ac frequens excretio, irritantur ægri ad tussim,

tussim, licet non valde tussiant: præsertim ubi quippiam subito gutturi irruat: aderitque capitis grauitas, aut calor, aut frigiditas, aut dolor. Ex dolore vero sedes affecta dignoscitur, vt circa fauces & guttur: dolor, pruritus, titillatio, si ex partibus capitis aderit & aurium sonitus, faciei rubor, venæ frontis emicant, vertiginesque accedunt, præcessitque nimius capitis ictus, frigiditas vel calor, seu ebrietas, interim consueta per nares sanguinis excretio cohibita. At si absque his cum

17

Ex ore & gingiuis.

Ex stomacho.

18
Ex ventriculo.

Spiritalia membra affecta quomodo distinguenda.

19

20

screatu sanguis educatur, faucesque seu gurgulionem sanguinolenta inspexeris, atque veluti exulcerata, eas partes per se affectas esse non dubitabis: de quibus & antea diximus, de gingiuis sanguifluus, veluti si simplici expuitione sanguis expellatur, ex ore seu gingiuis profluit, vt recensuimus, nec minus sensus diiudicat. Interim vero accedit, vt à capite per gulam, seu stomachum sanguis in ventrem defluat, vomituque rejiciatur. Verum præter id, quod euncta iam dicta capitis symptomata præcedunt, sanguis hic levis, æqualis, atque immixtus erit, nec adeo crassus, & colore nigro, & cum excreatione statim se in linguam infert, rotundus, facileque rejicitur per sputum. Sed de aliis partibus ad ventriculum facilis, & certa est agnitio. Nihil enim sine vomitu ex eo ferri potest. Si enim è stomachoeductio fiat, præterquam quod vomitione excernitur, non magna erit sanguinis eruptio, graciles etenim sūt stomachi venæ, vt inquit Aëtius, & cum nausea quoque sanguis effertur, ac in deglutendo mordacitas percipitur, maxime si adstringentia aut acrida deglutiantur. Si vero ex ventriculo educatur, nausea plurimæ commitantur & vomitus: & si à cibo sumptoeductio contingat, sanguis cibis permixtus, aliquando etiam pituita & bile effertur, ac si hepate vel splene sanguis in ventrem deferatur, & ex eo demum vomitione expellatur: in alterutro viscere aderit tumor, ac dolor, ipseque sanguis grumofus, ac niger erit, & magis si à splene, ac si ex pectore, ibi dolor aliquis erit. His ita spiritalia instrumenta (vt paulo ante diximus) distinguimus, sed adhuc certi non sumus (vt recte dicebat Iacchimus) quæ pars labore ex his. Quod igitur ad actiones attinet, exigua nota & obscura haberi potest, clarior vero ex excrementis: primum ex modo. Nam tussis minor multo ex aspera arteria: vehemens & diutina ex pectore, medio modo quæ ex pulmone; semper enim è longinquo spatio motus quoque diuturnior est, si eadem facultas moueat, maior etiam vis, quoniam per angustiores vias pertransire debet, extremas scilicet bronchiorū scissuras. Deinde ex qualitate eorum. Nam spumofus sanguis efficax coniectura est, quod per pulmone proveniat, & est signum Hipp. 5. Aph. 13. ubi vero Galenus ait, non esse signum pulmonis absolutè: Nam sæpe, inquit, eductus est è pulmone, ob externas causas irruptentes, bene coloratus & plurimus sanguis: vnde cum à vase rupto educi est verisimile: sed significat, inquit, esse ulceratam veram pulmonis carnem. Et quidem in animalibus, dissectis apparere, incidenti eius substantiam, eiusmodi sanguis emanare spumæ similis, id est, bullis exiguis plenus, & albicans ex rubro. At. 4. de loc. affect. dicit Galen. efficax esse signum. Caterum esse efficax signum est (vt sentit Iacchimus) si ex spuma de pulmone arguamus, sed non negatiuè: quoniam à valis pulmonis spumeus non educitur. Aliud vero ex colore sumitur, qui tamen obseruari debet, cum in præsentia educitur astante medico. Etenim, qui ex pulmonis valis, bene coloratus est, inquit, Galenus 5. aph. quo verbo & spumeum

excludit & pectoris: spumeus enim bene coloratus non est, quoniam albicat: qui vero pectoris, bene coloratus non est, quoniam nigricat: At qui in pulmone, egregie sanguinis naturam refert, quoniam est maxime elaboratus, & florentem illam purpuram repræsentat: tali enim sanguine nutritur, vt 5. de usu par. habetur. Præterea sanguinem à pectore latum, necesse est liuidum expui, & admodum alteratum, quod à longinquis aduenit: etenim & extra vasa fertur, & in bronchiis diu manet, vnde & trumbosus fit, & color mutatur. Ille vero tenuis, & floridus, quod cito educitur, & tali secundum naturam colore est. Attamen iuxta Iacchimum, dubitatur primo, num ex spumeo sanguine efficacissime significemus pulmonis videri, quoniam Auicenna dicit, etiam ex pectore talem educit, & ex arteria: vnde multum laborant expositores: sed reuera nisi iungatur aliquando pituitosum sputum, non repræsentat spumam, neque vndique quasi spuma quædam visitur: magis tamen ex calore & colore distinguitur, vt Galenus quinto meth. & ratio dicitur. Propterea quod è vtriusque valis egreditur. Dubitant & de thrombis, & cinis valis egreditur. Dubitant & de thrombis, & fabulantur multa. Etenim non coagulatur, nisi in bronchiis, vt querendum non sit, quomodo coagulatus subeat poros pulmonis. Ad exercendum etiam modum attinet considerare, num facile vel difficile, sic enim conijcimus ex pectore, vel pulmone: vt si confertim fluat, ex pulmone potius: contra ex pectore, mox ex doloribus, exitus in pulmone est, aliquando nullus, ubi caro eius interna afficitur. In pectore dolor adeo ob membranosam & musculosam substantiam. Sed huc vsque concludimus, excludentes pectus: sed num ex arteria, vel pulmone? Signum primum erit ex modo excernendi; nam exiguus est, qui ab arteria & leui tussis educitur. Secundo ex doloris situ. Ex spiritalibus itaque partibus, licet tussis ejiciatur, sanguis, inuestigandum tamen erit, num ex thorace, pulmone aut aspera arteriaeductio fiat: nam si thorax affectus erit, neque multus, neque ruber sanguis erit, sed nigricans ac grumofus, ac minus calens, seu è longinquo veniens. Dolores, insuper circa eum: intensiores sunt, cum ad ipsum multi adueniant nervi, quibus facile dolores percipi possunt: musculus præterea ossibusque thoracis abundat, vt inquit Gal. Interim sanguis, qui ex thorace effertur, scetidum odorem de se præbet, & aliquando pure admixtus est. Si vero spumans & subalbidus, floridus, feruens, confertim, multusque circa dolorem (vt Cypriano medico collegæ nostrum, qui postea ad talem deuenit & mortem) aut eo multo remissiore existente, cum tussis sanguis rejiciatur, pulmone affectum esse notum est, ex eiusdem Galeni sententia, tum 4. de loc. affect. tum 5. meth. medendi. Est namque pulmo laxus & ab asperæ arteriæ sectione tutus, à 6. duntaxat nervorum cerebri coniugatione duos perquam tenues nervos per eius membranam dispersos excipiens, qui haudquaquam per visceris profunditatem extenduntur. At si paucus sit, quid cum tussis sanguis affertur, ægrique doloris sensum iuxta aliquam arteriæ partem percipiant, sitque sanguis sic quodammodo pure permixtus, aderitque etiam paucitas sputi, ac tussis non valida, aspera arteria affecta erit. Hæc prius consideranda, antequam curationem instituamus. Quæ, inquam, omnia clariora euadent exemplis infra dicendis.

OBSER-

OBSERVATIO XIII.

De sputo sanguinis ex compressione & vena rupta in thorace.

SCHOLIA.

Tribus modis, vt iam alias diximus, è valis sanguis profluit, aut eorum osculo aperto, aut ipsis ruptis, aut erolis. Quod si ex vasorum ruptura fiat, ex multi sanguinis fluxione ac confertim facta deprehendimus: idque ab externis vel internis causis: vt si quis ex alto, vel in ludo, vel certamine ceciderit: aut cum alter sub alterum cadit, vel ex inanimatis corporibus, aliquid graue, vel lapis vel lignum hominem offenderit: item cum ira cum exclamacione præcessit: citharedis quoque ac tragedis certantibus, acuta vehemēti- que voce vasa interdum rumpuntur, ubi vehemēter clamare conantur, non præmissa pulmonis leu- nitione per præcedentes exclamaciones, vt testatur Galenus. Et quod ad causas externas attinet, quarum nunc vnum exemplum adferemus, facile ex iis, quæ præcesserunt, & sermonibus ægri percipiuntur. Sic anno 1566. mense Maio cum currū regeret Leonhardus Nicolaus Delphagus rusticus, equis concitatis, ex currū excussus est, atque intra murum circa thoracem compressus, vt duæ costæ quasi contractæ ac compressæ fuerint, sputo sanguinis subsequente, eoque nigricante satisque grumoso & minus calente, vt quilibet facile conijcere posset in thorace venam aliquam ruptam esse, tussis valida superueniente. Chirurgus hanc dolor ingens thoracem occuparet, & tussis satis valida esset, minusque sanguinem cum sputo redderet, neque venæ sectio facta esset, neque vllum medicamentum exhibitum, & iam tertius dies esset, quod alium non deposuisset, libenter clysterē iniecissem, & in eo statim venam secuissem, cum nunc prius ad illum accitus essem: quamvis id ab initio prius factum oportuerit. Clysterem noluit admittente. Ideo vt dimidium huius potionis statim à meridie (cum eo tempore vocatus essem) fumeret, mādauit. ʒ℥. caulium rubr. fanicula artemisia, ʒ℥. i. melle, ʒ℥. i. caryophyllata, an. ʒ℥. i. capill. Ven. polytrichi, herdei mund. an. m. ʒ℥. i. sem. 4. frig. maior. seminis nigelle, m. ʒ℥. i. folior. senæ ʒ℥. i. rhubarb. seletti ʒ℥. i. schœn. m. ʒ℥. i. vuar. passul. emul. ʒ℥. i. liquoris rase ʒ℥. i. bulliant in aqua communis pro ʒ℥. viij. huius fortiss. express. dimidium capias, in quo dissolue elect lenit. diacathol. an. ʒ℥. i. mumiæ ʒ℥. i. syrup. insusuf. oxymellis simplicis (ne sanguinis in pectore grumofus fieret) an. ʒ℥. i. misc. Fuit autem exhibitum statim à meridie: multaque excrementa putida & male olentia, insular sanguinis cōcreti, deiecit: dolore thoracis nihil sedato. Mane tamen (ne febris subsequeretur, & propter sputum cruentum) secta fuit vena ex vena basilica in brachio, è regione costarum dolentium. Si in principio aduocatus fuisset, statim post venæ sectionem, id quod sequitur dedissem. ʒ℥. mumiæ ʒ℥. i. rhubarb. ʒ℥. i. resacti, boli armen. ʒ℥. i. terrea sigill. an. ʒ℥. i. syr. cydon. ʒ℥. i. aquæ plantag. ʒ℥. i. misc. hanc potionem cōmendat vnice Guainerius cap. proprio in sputo sanguinis ex casu, offensione vel percussione. Caterum die subsequenti cum dolor adhuc in pectore hareret, reliquum potus sumpsit, ʒ℥. i. senæ adiecti, & expressi syrup. capill. ven. ad ʒ℥. i. immixto, & ter plurima excreuit, & dolor sedatus est, sputo sanguinis cessante. Post inunctionem prius olei ros. & myrtei, postea & olei hypericonis, chamæmillæ, costis in fine adhibuit chirurgus oxycroceum: & bene habuit.

Pet. Forest. Tem. 2.

Haud noui (inquit Alexander Trallianus) an alius æque difficilis sit affectus, ac sanguinis excreationio. Non enim ipsa per se, dum immoderatam vacuationem inducit, vitam adimere consuevit, sed pessimorum longorumque morborum magna ex parte causa redditur. Quare incumbendum est, vt vitium hoc prius internoscamus, vnde causam traxerit, & quo in loco incidat: atque ita curationem tentemus, neque eam differamus. Quippe mora & dilatio cum in omnibus morbis nocua sit, tum vero magis in sanguinis educatione plurimum nocet. Scire hic ante omnia conuenit, sanguinis reiectionem tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura (aliqui ʿπρωτοχαιμὴν Græcè appellant) cuius nunc exemplum posuimus, aut erosione (Græci διαβρωσιν vocant) vel cum ore referantur (Græci nominant ἀναστροφὴν) vel cum sanguis raritate sua transcolatur sudoris instar (Græci διαγνιδιον dicunt) vt etiam antea de sanguinis narium profluvio annotatum est. Ruptura itaque vasorum vel in pectore, vel in pulmone facile cognoscitur, vt nunc exemplo ostendimus, ex aliqua causa primaria seu externa præcedente, casu, ictu vehemēti, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit: aut etiam à causa interna, quam nunc hic addemus, ab ingenti frigore, in quo æger versatus fuerit, aut ex plenitudine sanguinis; aut ex flatibus descendentibus. Potest enim (teste Galeno 4. de loc. affect.) nulla ex prænaratis manifesta extrinsecus adueniente causa, vas aliquod, tum in cæteris corporis particulis, tum in pulmone dirumpi, ob sanguinis abundantiam, vel per se, vel vna cum crudo vel frigido & flatuoso spiritu venas extendente, cum videlicet vas ipsum extensioni resistit, aut ob frigus à vicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem, quemadmodum & ipsa aqua frigida, Hippoc. auctoritate venas frangit 4. Aph. lib. 5. verum non per se (vt docte etiam annotauit Altomarus) ruptiones facit, sed quia venarum tunicas frigiditate sua duras, & extendi contumaces reddit, & vt rumpatur paratior efficit. Erit igitur ruptionis causa, aut interna, vt quiuis vehemens motus, aut humorum abundantia, seu sanguinis copia, vt diximus: vtrisque vero commune existit sanguinis effusio repente. At quæ sanguinis reiectiones ex eo vase eueniunt, diabrosin Græci vocant: Primum sane (inquit idem Trall.) inde cognoscas, quod excreationes paucæ fiant: deinde cum vasa magis extenduntur, multæ simul vacuentur: postea vero & quod præcesserit, aut destillatio aut salforum, & valde acrium efus, aut tristitia immoderata aut inedia. Idem Paulus ait, quod præcedat acrium prauorumque ciborum usus, vel inedia. Quod si etiam (inquit Trall.) cum sanguine carnosa quædam particula siue membranosa permixta appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ respirationi inserviunt, ex eis fieri existimandum est. Ex eo itaque vase sputa cruenta non cōfertim, sed paulatim per interualla rejiciuntur. Solet enim, teste Galeno, præcedere sanguinis expuitionem exigua sputa atque acres in pulmone à capite fluxiones, si ab eo sanguis profluat: temporis vero diuturnitate, multi sanguinis intertusciendum eruptio fit, vt 5. meth. & 4. de loc. affect. & potissimum si nulla præcesserit ex prænaratis externa causa: quocirca diligenter considerare oportet, num quippiam spumofum simul educatur:

P ij id

id enim efficaciffimum erit indicium, quod proprium pulmonis parenchyma fuerit exulceratum, haud ſecus ac ſi bronchi pars quædam aut arteria, aut venæ tunica ejiciatur, eadem ipſius pulmonis partes exefæ ſunt, quemadmodum *aph. 12. lib. 5. & prædicto 4. lib. de loc. aff.* ſcripſit Gal. Sin autem ore vaſis ad aperto ſanguinis exſpuitio venerit, primum ſane inde notatur (inquit Trall. & Galen. ante illum quoque meminit, vt etiam Paulus poſtea) quod nihil eorum, de quibus prius dictum eſt, præceſſerit, ſed potius calidioris, humidiorisque viſtus, & frequentium balneorum abuſus: item ex eo quod æger in calidioribus ædificijs præter conſuetudinem, aut loco calidioris immoratus fuerit. Nam ſi horum prædictorum aliquod adfuerit, ſputumque ſanguinis modicum & paulatim fiat, ſanguinis curſum patefacto vaſorum ore accidiſſe cognoſcitur. Hac igitur ratione cauſam, vnde ſanguinis eduſtio initium traxerit, internoscere poteris: locum verò vnde proſiuit, iam ſatis ſcholio præcedente enarrauiſmus. Quod ſi plura de cauſis & ſignis deſideres, perlege caput proprium præceptoris mei Benediſti Faurentini in magna ſua Praxi. Nunc aliud exemplum interponamus, vt ita melius quid certi de hoc malo minime contemnendo prædicere poſſimus, antequam curationem vniuſcuſque abſoluamus.

OBSERVATIO XIV.

De ſpuitione cruenta ex acri catarrho, pulmonis vaſa, deinde & ſubſtantiam erodente, cui in fine etiam bronchia aſpera arteria in pelum ejiciebantur.

IVuenis Alcmarianus ſupra annos triginta natus, cum ex deſtillatione acri erodente vaſa pulmonis, longa ſpuitione cruenta laboraſſet, & variis vſus eſſet medicis, in fine etiam me vocauit, cum bronchia aſpera arteria vna cum ſputo cruento in pelum rejiceret; aliquando particulas ſubſtantia pulmonis corruptas. Cui mortem prædixi: nam cum ad eum veniſſem, vix per octo dies ſuperuixit.

SCHOLIA.

RECTE dixit Galen. *lib. 4. de loc. aff. et ca. 6.* ob auctam eroſionem ſæpe plurimum ſanguinem inter tuſſiendum fuiſſe reiectum: atque non pauci ſic affecti pulmonis quaſdam particulas ſimul cum ſanguine reiecerunt. Quocirca diligenter conſiderari oportet, an ſpumofum quippiam educatur: Id enim efficaciffimum fuerit indicium, quod ex pulmone facta ſit excretio. Haud ſecus ſi bronchi pars quædam, aut arteria, aut venæ tunica, aut etiam pulmonis ipſius caruncula ejicitur. Quæ cum viderem, mortem prædixi, præter id, quod reiectioni ſanguinis vlcera pulmonis ſuperuenire ſolent ac conſueuerunt, vt idem eodem loco dicebat Galenus, quæ etiam plerumque & per ſe lethalia ſunt. Scribit Dodonaus pictori cuidam, cum valida tuſſi non ex vaſe aliquo rupto aut ex pulmonis vlcere: ſed ab ipſa pulmonis ſubſtantia ac parenchymate ſanguinem nigrum adeo ſpumofum eſſe reiectum, vt concretus & vnde quaque poroſus ſpongiam aut pumicem referre videretur: in quo reperta fuit pulmonis pars nigricans & ſphacelo corrupta, in qua magnus & profundus ſinus. Et ichthyopolam quoque, tum ceruiſia coctorem, eundem ſanguinem exſpuiſſe

narrat, atque pulmonem eodem affectu corruptum fuiſſe: pictoremque plus quam menſem ſuperuiſſe: ceruiſia coctorem bis euaiſſe ſed in domo peruiſſe: veluti & ichthyopola, qui & in ſanguinis ſputo deſecit. De huiusmodi ſanguinis ſputo ſenſiſſe videtur Hippocrates *Aphor. 13. lib. 5.* Quicumque autem ſpumofum ſanguine exſpuunt, iis e pulmonem eduſtio fit. Nam qui ex vaſe diſrupto, aut vlcere profunditur, haud quaquam ſpumofus apparet. Fateſtur Galen. in commentariis ſe ſæpius vidiffe ſanguinem plurimum bene coloratum exſpui, quem ratio, ait, dictat ex aliquo pulmonis vaſe prodire. Sed hunc ſpumofum, fuiſſe non addit. Spumofus ſanguis, vel, vt Hippocrates *apud de; aſia*, naturam ac figuram eius retinet, vnde abſceſſit. Pulmonis ſubſtantia laxa, rara, & poroſa eſt: talis & ſanguis, quem cum tuſſi proſuſum ſcripſimus: cui parenchymatis partem coniunctam & commixtam fuiſſe apparet. Hæc Dodonaus. At iuuenis noſter etiam vlcus in pulmone habebat, etiam bronchos exulceratos, quas cum tuſſi, & pure, & ſubinde ſanguine admixto reddebant, & non diu poſt ſuperuiuebat. Conſiderare igitur oportet, ex qua cauſa ſanguinis fiat reiectionis, & qualiſcumque fuerit affectus, vt eiſdem curationem ſtatim aggrediamur, propter imminens (vt Paulus admodum) ex immodica euacuatione, periculum: ſiquidem copioſe euacuatus ſanguis, quemadmodum in his, qui iugulantur, mortem inter præſentaneam: ſi affectus remanet, in tabem tranſire minatur. Cæterum prognôſtica ſigna, primum ſecundum Galen. & alios recte ex natura affectus diſtinguemus: eroſio n. grauius malum eſt quoniam minus glutinationem ſuſcipit: eſt enim neceſſarium cauum vlcus eſſe ac ſordidum, quod eroſum eſt; aliqua enim tunc carnoſa portio, tum membrôſa perit. Namque ſanguinis euacuatione (Paulo teſte) quæ fit exefis vaſorum tunicis, nunquam commode cadit, ſed facitque valetudini, etiam ſi ex pulmone non fiat; etenim grauiſſime nocet, vt Celfus dicebat. Simpliciter vero affectus reſolutionis minus eſt periculofus: nam aſtrigentibus facile ſiſtitur Gal. auctore 5. method. Et huic in ſalubritate proximus eſt affectus apertionis: nam vacuato multo humore ſiſtitur: quamvis ſæpe multitudine lædere poſſit, & etiam, quod non conuenienti regione vacuatur à natura. Aggregari enim & vacuari per eas partes commodum non eſt: tū ob tuſſim, quæ neceſſario ſequitur tum ob partem, quæ facile afficitur ſi mala qualitate aliqua ſanguis ſit præditus. At diuiſio continui ex aliis cauſis mediam naturam obtinet: nec enim periculofa eſt, vt eroſio, nec ſecura adeo, vt apertio, & exſudatio: Simpliciter tamen periculofus admodum eſt morbus; quoniam Galeno teſte, non facile glutinatur vulnus in his partibus, ob perpetuum motum. Quod ſi vulnus iam inflammacionem ſenſerit: vnde & pus contraxerit, tunc multis modis periculum augetur: nam expurgari pus oportet, idque tuſſi, vnde & continue vulnus dilaceratur motu illo violento: ideo, inquit, exitus ſpes ſalutis eſt. At in cruento vulnere ſpes eſt aliqua ſanitati: ex ſede quoque affecta ſecundo magnitudinem periculi conijciemus. Ex pectore enim minus periculofum profluuium, vt Galenus *Aſſeruit*: primum quod venarum vulnus, quod parua ſint, facile coaleſcit: neque enim impedit ſanguinis copia: quod ſi non ſanatur primum, vt dicebat Iacchius, ſed vlcus faciat: at hoc periculum non adfert, vt vlcus pulmonis. Nā & magna quoque pectoris vlcera ſanantur, & reſtituitur caro,

caro, vt nos multis exemplis vidimus: Vlcers vero arteria ob ſiccitatem facile ſanantur: plurimum enim ex eroſione ſunt. At eroſio ſanatur, vbi putredo facile ſiſtitur. Siſtitur vero facile, vbi licet præualeat, ideo 5. meth. eiſmodi partis vlcera ſanari ait. Hic autem cum bronchia tuſſi redderet æger, tabe obiit; vbi vero iam phlegmonem contraxit vulnus, coniectura eſt ex tempore, primum, ex quo laborauit, mox ex febre, quæ neceſſario ad phlegmonem ſequitur, ob viſceris calorem & cordis vicinitatem, præſertim ſi pulmo ſit. Denique & quod ſanguis paucus, non florens, ſanieb. admixtus eſſuit, vtpote qui iam putrefcere incipiat. Hinc Hippoc. dicebat *Aph. 15. lib. 7.* à ſanguinis ſputo, puris ſputum malum eſſe: nam purulentum ſputum (vt Galen. in comment. reſert) non omne ſputum ſanguinis ſequitur, ſed quod malignum exiſtit: tale autem omnino eſt ex pulmone, ex quo proueniente ſanguinis reiectione, quæ inter tres dies non curatur, phlegmone deinde adueniente, omnino incurabilis affectio erit, potiſſimum ſi ex eroſione ortum ducat, eodem Gal. teſte 5. meth. Ideo difficilis eſt iudicanda curatio eorum, quibus à pulmone ſanguis profluat, ex Sorano, non impoſſibilis omnino: hoc intelligendum eſſe puto, quod ſtatim curetur non ſubſequenter phlegmone. Veluti rurſus cuilibet patere poterit, ſanguinem ex ore gingiuis proluentem e cæteris minimum periculofum eſſe, quemadmodum ſi ex faucibus, interioribusque partibus proceſſerit, & metus maior eſt, & cura maior adhibenda, Celſo etiam auctore: at ſi ex thorace ſanguis profluat (vt iam dictum eſt) minoris eſt periculi, quam ex pulmone. vt edoſti ſumus 5. meth. & 4. de loc. aff. et ca. Gal. Quod ſi (vt etiam Celfus reſtatuſ) quod modo minus, modo plus periculi habet ſanguinis exſpuitio: etenim ex capite veniens ſuor generaliter eſt curatu faciliffimus: ex ſtomacho vel ventre aut faucibus, curabiles fluores approbat vlceratione factos curatione diffiſiles: ita & grauior atque difficilior, qui ex pulmone fluat; ob iuge ſpirationis officium; vt videre quoque licet apud *Cæſium Aurelium. lib. 2. cap. 12.* Cur vero à 18. anno vſque in 35. vaſa pectoris & pulmonis rumpantur & ſanguinem fundant, vide ad longum Benediſti Faurentini præceptoris meum de ſignis prog. hæmoptoicæ paſſionis: qui hanc cauſam tum alios aphoriſmos ad ſputi ſanguinis reiectionem pertinentes, longo ſermone explicat.

OBSERVATIO XV.

De quibusdam ex caſu, ſſuo cruento Libanibus & curatiſ.

Simon monachus, portæ Egmondanæ Abbatiaſcuſtos, qui à vulgaribus Grifeus abbas vocabatur, eo quod Abbatem quaſi regere dicebatur, ex curru equis concitatis prolapsus, rota per totum pectus circumducta, animam quaſi agere videbatur, ſanguinem ex pectore extuſſiens. Medicus, qui primo accitus erat, venæ ſectionem prætermiſit interpoſitis aliquot diebus, cum & ego accitus eſſem, venam libenter aperuiſſem, ſed quia valde debilis erat, neque venæ ſectionem admittere volebat, mumia & ſpermatidis ceti, an. 3. lib. cum cereuiſia butyrea propinaui, pectore inuncto oleo roſ. & myrteo, puluere myrtilorum aſperſo, vi & Amatus fecit in D. Alphonſo Alecaſtrenſi, ſupremo apud Iulium Pontificem Maximum oratore grauiſſimo, qui intra domum, quam trans

Tiberim habitabat, ex equo calcitrone ceciderat, ex caſu in colliſ verſus ſpinam dolebat: quem locum, etſi nullus in eo appareret tumor, aut liuiditas nigricieſce; ex oleo myrtilino, adieſtis pulueribus myrt. & roſ. inungi fecit, ac ſaſcia optime ſaſciari: ſequenti vero die ſimile modo, quum circa eundem locum doleret, internam eiſdem lateris, vbi erat dolor, aperire fecit venam, & ex ea ſanguinis vncias quinque fluere permiſit: à qua ſanguinis miſſione paulatim conualeſcere cepit, donec integram conſecutus eſt ſanitatem. Sic inueni Leonhardi Cornelij cereuiſiarij filio euenit, qui cum ebrius curru regeret, pede à temone glifcente, à curru prolapsus eſt, vtraque rota per ventrem ac pectus circumuoluta: ita vt in domum ſemimortuus deportaretur. Ad eundem cum nocte accitus eſſem, in ventre inferiore potiſſimum dolebat, & in hypochondrio dextro: ſanguinem extuſſiebat, qui proculdubio ex pectore prodibat. Illico poſt caſum biliola vomuit: & ab aſſumpta piſana, quam præbueram, & cibum crudum, vt ebrius, & potum quoque euomit. Locum dolentem inunxiſmus oleo roſaceo, cum neque liuor exterius, aut quid luxatum appareret. Mumiam & ſperma ceti cum ebibiſſet, non retinuit. At mane crapula edormita, & experrectus ad ſe rediit. Venam brachij dextri internam ſecari fecimus ad vncias quinque ſanguine extracto, & egregie profuit. Venit mihi tunc in mentem ægrotus ille apud Galenum, qui in palæſtra graui plaga accepta, fere duas corylas ſanguinis exſpuit, qui ſtatim ſecta vena & adhibitis iſtis remediis conualuit, & in poſterum ſuperuixit. Verum cum noſter hic iuuenis etiam in ventre doleret, commode poſt venæ ſectionem enema injicere mandauimus: aliſque remediis aptis, etiam per oſumptis, hic, vt etiam monachus præcedens, curatus fuit. Quemadmodum & alius ruſſicus diues, Ysbrandus Paingius dictus, annos ſupra 56. natus vir robuſtus: qui cū in Pago Limenſi dicto, non procul ab Alcmaria ſcenum in horreum ſeu granaria, ſpicas cum aſtilis conderet, è ſcala prærupta cecidit ſupra pectus, & colliſus ſyncopen incurrebat, quem omnes morituum putabant. Ingenti dolore cum circa pectus afficeretur, & ſanguinem exſpueret, ad eum accitus illico hec quod ſequitur exhibui: *℞. mumia, ſpermatidis ceti an. 3. lib. de colli. pectoral. 3. i. mellis roſ. oxym. ſimplicis, an. 3. lib. pauco adieſto, butyro.* quam potionem cum retineret, vena quoque ſtatim ſecta fuit in brachio: pectus ſi inunctum oleo roſ. & myrteo, & alia commoda remedia adhibita, & hic priſtinæ ſanitati fuit reſtitutus: vt & Vincentius monachus apud regulares Alcmarianos portæ cuſtos, qui ſimiliter ex ſcala in pectus ceciderat, & ſpuitione cruenta afficeretur, poſt ſectam venam, puluere quoque adhibito ex mumia & rhabbaro, quo Guainerius utebatur. Elidæus præceptor meus Bononiæ ſequentem puluerem dabat cum decoctione pullæ nigra in ſanguine coagulato à caſu aut percuffione, vt vidimus: *℞. mumia, yhab. ſeleſti, an. 3. lib. rub. tinſtor. 3. j. miſc.* ſæpe enim obſeruatione coſpeximus periculofa ſigna in ſanguine conglobato in pectore aut pulmone hærente, cum extrema frigore corriperebantur, & venarum pulſus interciperetur, anhelitusque creber fieret, anima exitiſaliter deſiciente. Nec mirum hoc alicui videri debet, quod humor naturæ familiariffimus, tam ſubito aſſuſus ſpecie veneni gerat. Ideo in ſputo ſanguinis, ſiue ex caſu, concuſſione, collapſione aut vulnere, aut etiam alio modo oriatur, quatuor ſemper timenda ſunt: primum, nec nimis ſuperfluat, ſecundum, nec ſui

multitudine subito suffocet: tertium, ne in aliqua parte coaguletur: quod maxime obseruandum est, si ex percussione fiat. Quartum, ne sequatur vlcus propter ipsius sanguinis constrictionem & putrefactionem, aut quia vlcus non consolidatum, fiat vlcus. Sed quia hæc etiam ad chirurgiam pertinent, de iis latius suo loco dicemus: quamquam hæc exempla hic potius ponere libuit, cum omnes isti prædicti etiam sputo sanguinis laborarent, & recte curati fuerint.

SCHOLIA.

Cum vero ad profluuium sanguinis factum & ad cruentam exspuitionem accesserimus, & iam certi simus de affectu, quem varium esse diximus, atque diuersam causam habere, non vnam & eandem curationem postulat, neque vnâ victus rationem, sed quodammodo diuersam: Nam aliter curatur sputum cruentum ex disrptione, cuius nunc exempla posuimus, aliter vero ex apertione vel refectione vasorum: aliam quoque curationem exit erosio, de qua ultimo dicemus; cum priores duo affectus communem, quasi victus rationem desiderant, de qua pauca quædam adferemus. Aër itaque frigidus, & ad siccum parum vrgens confert, calidus & humidus declinandus: qua ratione & austrini status vitandi. Aestate ad frigidum inclinet, hyeme vel finire vel temperatum eligere oportet: calidum enim qualecunque fuerit, sanguinem fluere facit, *Aphor. 7. lib. 5.* Potius in obscuro loco degant ægri, & res atras inspiciant & fusco colore: lædit enim purpure aspectus, præsertim splendide. Somnus moderatus hic locum habet, præsertim nocturnus, diurnus vero fugiendus: caputque cubantis in sublime tendat, præsertim, si ex spiritalibus sanguis profluat, neque conclauis calidum & includum existat, aut mobile. Motus vero omnis interdicitur: non loquantur, respirationem cohibeant quantum possunt, quanto magis tussim? nisi ubi pectus expurgare opus sit. Hic enim magnopere conuenit quies, securitas, ac silentium, *Celsi teste Idem & Gal. 5. methodi medendi vult, ut motum ac exercitium, præsertim ubi ex spiritalibus sanguis profluxerit, declinent, atque ut magnam ac frequentem respirationem vitent, imo sensim respirent, semperque silentium agant, ac reliquam omnem quietem eligant. Animi affectus immodicos omnino fugiant, iram præsertim, pariter & Venerem. Nam omnes animæ vehementes motus nocent, quum & sanguinem & spiritum moueant, quæ conuenit esse immota. Quare (ut paulo ante diximus) somnus iuuat, ideo aliquando est prouocandus: non tamen ita, ut alie diu dormiant, ob sanguinis coagulationem in bronchiis, vnde postea non nisi multa tussi educatur. Alui quoque excrementa quotidie natura aut arte, clysterib. præsertim lenibus, excernantur. Quod ad cibum potionemque attinet, eligendi sunt, qui emplasticam vim habeant & refrigeret, eodem Galeno auctore. Atque si valentior sit æger, omne fere nutrimentum circumcidendum erit, sin aliter, sorditionis, quod satis est exhibendum, potissimum ubi pulmonis vas fuerit diruptum. Sit autem (inquit Alexand. Trallian.) omnis cibus, qui & leuiter astringat, & mediocrem vim obturandi habeat. Cremor igitur alicæ aut prisanæ hic est idoneus. Longe autem melior, valentiorque erit sorbitio, si amyli frumentacei, & mali cotonei paulum cremoribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, & leuiter astringere*

poterit: quod etiam maxime in iis requireremus, qui ob rupturam vasorum exspuunt. Inopia vero prisanæ, etiam co vtantur, qui apud Romanos vocatur farris cremor, vel eo, qui ex simillagine ipsa violenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbutæ, & ouorum lutea, si quid aliud, his sunt accommodata. At neque sorbitiones, neque aliorum ciborum quippiam calidum offerre conuenit, sed omnia potius sint temperata, & ad frigidius declinantia; etiam actum, licet non vehementer (ut & Aëtius admonet) neque nimiam humectationem inferre debeant: pyro quoque vel alio pomo austero incoctis, vel mali punici granis immixtis. Item placenta fuminalis, iuxta Trallianum, non alienus his cibis est; sed & ipsa opitrali potest, si absque sale & multo oleo confecta fuerit. Ex olerib. assumant ægri malum, ante citra salem prope elotam; item lactucam decoctam, in poscam aquosam ipsam intingentes, similiter intybum & portulacam & arnoglossam, etiam Paulo hoc ipsum cum Tralliano iubente. Horum inopia post septimum diem etiâ gallinas non admodum pingues tiora: quin & perdicum, attagenarumque pectora comedant, nec non gallorum testiculos. Etenim præterquam quod valenter breui tempore nutrant, augentque vires, adhuc etiam lauigandi obturandique facultatem obtinent: Quod, si venter copiosiora excerneret, alii quoque citra salem sumantur: sic namque comestis ventrem non perturbant, cum id, quod serosum in eis est, inter assandum abiecerint, & præterea etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeo veterum alæ offerantur, nec non ventriculi ouæque ipsorum, abiectis albuminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obturandi facultatem habent: sed non ægre concoquantur, ut quidam calumniantur. Vbi sanguis etiam exspuit desierit, etiam pedes suum, & pisces saxatiles, aceto inter coquendum adiecto offerantur: leguminibus autem halica, & chidron admodum decocta, eaque ipsa ex longiore intervallo, & quum non vehementer ægri febricitant. Nam ubi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dedis, nihil nocebis: præsertim iis, qui etiam per sanitatem assumere consueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modice astringant, ut mala præcipue cotonea decocta, pyra, sorba, melpila, etsi admodum siticulosi fuerint ægri, etiâ pepones, & cucumeri medulla, vnaque pensilis exhiberi debet. A sicub. bellariis, pistaceis, maxime amygdalis & malo punice abstineant: raro autem nuces pini & vuas passas simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem. Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum exhibeatur, eaque non calida, sed temperata. Quod si diu tepida potioni insistere nequeant, imbecilles se ventriculos habere dicentes, concedendum ipsis etiâ paulum omphacomelitis, aut hydrorofati, aut hydromeli ex cotoneis, semel aut bis assumere debent: in aliis horis rursus tepidam, aut poscam aquosam. Hæc Trallianus de cibo ac potu. Eadem ferè & Paulus habet, quamuis is pro potu, si febre careant, concedit vinum aquosum modicum alioqui, si febris adest, dat hydromeli Sybariticum. Verum Iacchius doctissimus. Quod ad victum attinet, non expedit, inquit, hic catalogum ciborum numerare: quod quidam faciunt: cum, dum symptoma vrget, & quousque cesset, sæpius intergram inediā seruare expediat. Multa ergo frustra inter se disputant de acris, de aceto, de carnibus, quæ omnia præter propositum sunt. Vel enim nihil dandū est, si vires ferunt, vel sola sorbi-

tionem, & ea exigua contenti esse debent. Nec enim augere sanguinem, sed minuire expedit: & morbus maxime vrgat ab initio. Extreme ergo tenui victu est vtendum, & sic Galen. facit, quando halicam vel prisanam propinat. Potu vtetur medicam vim habente. Illa vero diligens ciborum disquisitione iuuabit forte in præseruando, sive etiam in alijs profluuijs. At in hoc est inutilis, præsertim, si ex ruptione fiat. Nam post priuam de erosionem dicemus. Hæc Iacchius. Interea si malum non statim curetur, victum conuenientem, ut nunc diximus, adhibebimus. Et quod ad alia remedia attinet, cum sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti iuxta Trallianum omnimodo secari debet, non quidem vna vice, verum daab. aliquando tribusve horis interpositis tentari: præsertim si primaria causa sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi & statulenti collectio, vel vas aliquod fuerit ruptum ex casu vel offensione. Sic & Galen. cubiti venam internam statim secare præcipiebat *lib. 5. meth. & post ipsum Paulus & Aëtius*, bis terve gratia diuertendi. Si vena in conspectum non veniat, Alexander etiam ex talo commode mittit, cum ad longiores partes diuerso fiat. Hollerius vero viribus integris, internam brachij angusto vulnere mittit modica quantitate, sed bis aut ter vna die, aut duabus detrahi iubet: si plenitudo in causa est, largius, si suppressis mensibus, vena curis aperienda: Vnde Rondeletius distinguit à qua causa fiat. Si ob rupturam venæ, maiorem quantitatem sanguinis vel vnica vice vel iteratis vicibus: Postea danda ea, quæ vim astringendi habent. Causa quoque diuertendi, artus omnes fricandi viciendique imo vincula brachij & coxis ad articulos, & in eisdem frictio adhibenda. Etiam aliqui cucurbitas hypochondrij affigunt, ilibus atque inguinibus: & sanguisugas pectori affigunt. Sanguine detracto iuxta Trallianum ægrum conuiescere cogemus, compellimusque ne magnam respirationem edat: Vbi vero respirauerit, aquosam poscam ipsi superforbere præcipimus, quo, si quis in viscere trombus, id est, eror concretus latet, resolutus exspuat: atque hoc nihil vetat bis ternis horis facere, ut idem Gal. asserit. Poterimus autem eiusdem poscæ 3 iij. vel iij. aut salem ij. qualibet vice exhibere. Quod autem in bronchijs sanguis coagatur aliquando, manifestum est experientia. Quod etiam coactum apprimere lædat, imo accidentia praua efficiat, omnes norunt: & ponitur inter venæ: igitur studendum est, vt educatur. Quoniam vero non facile educeretur, si trombus foret ob crassitatem, ideo medicamentum propinamus ex his, quæ trombos dissoluunt. Etenim cum non nisi tussi educi possit, studendum est, ut quam minimus motus fiat. Poscam igitur dilutam & tepidam exhibet: dilutam ne acetum proriter; tepidam vt melius operetur. Patet autem, vt Iacchius quoque annotauit, quod & sensim dimittenda est, ut in viscus aliquid eius penetret. Auicenna dicit & quandoque Galenus ponit, quasi semper eodem vtendum sit. Hic vero in vsu acetum contendunt auctores. Sed errant, inquit Iacchius, ex Auicennæ & Auerrhoe, qui poscam legunt acetum cum aqua: ignari esse eam missionem, quæ potui iucunda sit: vnde experientia monstrat, quod tussim non facit. Est autem necessarius vsus ab accidentia dicta. Mirum vero videbitur, si Auerrhoe non viderit, necesse est medico, vt contrarijs simul indicationibus satisfaciât, præterligendo eam, quæ magis vrget, & al-

teram non negligendo, quod & hic facimus. Cautere enim oportet grumos, & si sunt, dissoluere, neque expectare, donec eorum evidentes notæ adsint, & symptomata graua inferant: quando etiam valentioribus vti oporteret, vt coagulo leporis, vel hædi, quibus vis inest maxime dissoluenti, vt omnes testantur, & acerrimum est viribus. At posca mitissima est, quod maxime sane experimur, dum bibimus. Et scimus eam in internis vulneribus ad glutinationem maxime facere: ita etiam bibita faciet, vnde tantum abest, vt eius vim pertimescat Galen. quin potius etiam ad medicamenta glutinantis propter eius deductionem vtatur. Est ergo tunc ea vtendum, cum iam magna parte fluere cessauit, quod cognoscitur, quia rarius fluit, & iam colore non adeo floridus est. Hæc de pulmone. Nam si malum in arteria sit, vel in pectore, nihil obstat, quin tanto vtaris. Non ergo, vt Auicenna ait, quandoque vtendum est; quo pectus expurgetur, vt Gal. voluit. Hæc Iacchius. Nos vero ad sanguinem congelatum commoda dedimus mumiam & sperma ceti. Donatus etiam post poscæ assumptionem commendat pul. sequentem, *2. rhabar. 3 j. vel 3 iij. mumia gr. v. vel vij. rub. tinctor. iij. vel iij. dabat cum astringenti vino rub. aut aqua plantaginis, exiguo aceto iniecto.* Hoc medicamento non solum concretus sanguis resolutur, sed foras propellitur atque expurgatur, ruptumque vas seu resectum sanatur. Quamquam mumiam & sperma ceti Langius *lib. 2. epist. 31.* his verbis vituperare videtur. Si (inquit) præcipiti ex abrupto, vel equo, casu vel violenta corporis succussione, aut venæ in pectore, vel sub cranio ruptura, aut iugi sanguinis in ventriculum vel pulmonem destillatione, putridi cruoris, grumos in corpore coaceruari conieceris; ne viroso cruoris habitu cor cerebrumque infestetur, opera pretium erit, hoc pharmaco deicere grumos, ac per lotium aut aluum expurgare: non, vt vulgus chirurgorum imperitum assilet, carbonibus tilia, aut Arabum mumia vel ignoto veteribus spermate ceti, sed subscripto puluisculo. *2. rad. angelica 3 ij. coaguli leporis 3 b. succini 3 b. farinæ orob. rub. 3 ij. exarte confusacribro excernatur, ac de illius pulueris sarragine 3 j. dissoluitur in stillatio cheyresolij, aut gingidij liquoris 3 iij. b. & oxymellic. 3 j. fiat haustus.* Oxymel quippe, vt Galen. compertus est per se absque adiuncto haustum, sanguinem concretum dissecat, expectorat, vel per lotium prolicit: quem postquam oxymelite incidis, tum commode ex aloë & rhabar. catapotij per aluum expurgabis. Quod Paulus quoque Aegineta his verbis suadet. Sanguine inquit, circa ventriculum concrecente, coagulum leporis porandum dabis: aut ex cinere ficus lixiuium, addita aqua charesolij aut thymum, vel thymibram cum aceto, quos lacte aut aloë quoque euacuabis. Qui autem hoc puluere vti velit, potest; licet eos optimo successu in præcedentibus ægris spermate ceti & mumia vsi sumus; quibus & præceptores mei in Italia vsi sunt. Post hæc procuranda est omni ingenio glutinatio cum emplastris & astringentibus: quorum prima illa sicant solum sine astringitione, vt multa terra genera & lapidum, vt Lemnia terra, & bolas armenus, & alia eiusmodi. Astringentia & nota sunt, tum simplicia, vt symphyti rad. decocta ex Tralliano, portulacæ succus vel herba ipsa vel rubi fructus, tunica glandis putamini subiecta, polygonij succus, & alia infinita, tum quædam composita, vt troch. de terra sigillata, de spodio, & similia

similia : nam astringentibus etiam emplastica adiungimus , cum sine morfu siccant. Trallianus quoque tum Paulus ac Aëtius , externis quoque remediis vtuntur ; etiam superfusionibus thoraci extrinsecus accommodatis per lanas ex rosaceo , aut melino aut myrteo cum aceto modico , aliisque vt apud eosdem videre licet.

OBSERVATIO XVI.

De vena rupta & tussi in pectore.

Maxime verendus videtur casus , cum ex tussi vena rumpitur in pectore , magis vero & in pulmone : quod maxime euenit , vbi refrigerata sunt partes pectoris , & inde tussis : nam hic contraria oriuntur indicationes , sistendi sanguinem , & tussis sedandæ. Quod equidem cum contigisset cuidam mercatori Delphensi , Philippo Vergoesio dicto , fratri Prætoris Delphensis , in foro frumentario habitanti , 5. Septem. die , anno 1571. cum nocte præcedente ex frigore contracto tussiret , vena in pectore rupta est , & semiscutellam sanguinis extulsiit. Vnde terrore percussus , Cornelium Heydium , collegam meum ad se vocauit : sed is cum in Hagham Comitatus ad alium agrum accitus esset , me vocarunt ; & statim basilicam venam in brachio dextro aperire iussi , sanguine moderate extracto. Deinde , vt sequenti condito vteretur , mandaui , cum & ego eodem tempore Hagham Comitatus accedere cogerer. *℞. conserv. ros. 3j. diatrag. frig. 3ij. boli arm. veri 3j. cum syrup. ex ros. siccis , fiat conditum :* quo cum vsus esset , & post venæ sectionem , cum ex Hagha statim prædio rediissem , melius habuit , sanguinis sputo non amplius apparente. At sub noctem hora decima cum vehementius rursus tussiret , sputum sanguinis rediit ; ita vt tunc Heydium ex lecto , tunc me quoque vocarit. Cum etiam catarrho tunc laborare quoque videretur , & vrinam vtcumque tinctam haberet , cum renum calore , & aliquantulum biliosus esset , etiam melancholicus , & calorem quandam sentiret , licet non febricitaret , iuleb. sequens ad sanguinem reprimendum & restringendum præscripsi. *℞. aquæ vinfæ pastoris , plantag. portulacæ , an. 3ij. aquæ vngulæ caballinæ 3ij. lapid. hematit. subtilissime pul. 3j. boli armeni veri pul. 3j. syrupi myrrill. (qui etiam ad tussim facit) 3ij. misce , fiat iuleb. capiebat frigide sepe cochlear vnum aque alteram in nocte , quo remedio minus sanguinem expuebat. Pectus vero inunximus linimento sublequenti. *℞. olei myrrill. 3j. olei viol. ros. an. 3j. olei amygdal. dulc. 3ij. ceræ albæ modicum , fiat linimentum ; 8. Septembr. diatrag. frig. in tabulis fuso cum aqua ros. sepe utebatur pro tussi. Et quia sputum sanguinis tum vix apparebat , capiebat subinde myrobalanum vnum empeliticum conditum. Et glande sequenti , cum aluum non deponeret , eam inuitauimus. *℞. Pul. Specier. biera piceæ 3j. trochisc. albandal. 3j. salis & mellis q. s. fiat glans. Resque ac lumbos inunximus vng. ros. cum autem ex glande stercora dura deiecisset , decimo die Septembris hanc potionem ebibit. *℞. folior. fenæ , myrob. indor. (quia valde melancholicus erat , & ante à longo tempore lienosus fuerat) an. 3ij. myrob. ciuinor. rhab. selecti , an. 3j. sem. anisi 3j. scabianthi 3j. infunde in 3 ix. aquæ fumariæ per noctem , facta prius ebullitione , deinde fortissime expressione addendo syr. myrrill. de epibymo , an. 3j. clarificetur , & fiat potio pro 1j. dosibus. vna adhibita , probe ventrem deiecit 13. die Septembr.****

Propter catarrhum , ne sputum sanguinis quoque rediret , sapissime utebatur conser. ros. ad libitum. 14. Septemb. tam ad somnum conciliandum , quam ad tussim ac catarrhi incrassationem , hordeato utebatur. Verum eodem die rursus in maiori quantitate rediit sanguinis sputum. Quo valde denuo perterritus ager ac multum melancholicus , sibi metuebat de phthisi. Quamobrem imperauimus , vt ex decocto sequenti sape fumeret. *℞. rad. consolide maioris 3j. bulsa pastoris , portulacæ , sanicula , pyrolæ , polygoni , an. m. j. sem. end. acetos. portulacæ , vrticæ , an. 3j. fiat decoctio , vt artis est in aqua comm. pro 1j. colatura addendo 3ij. syr. myrrill. clarificetur , & fiat iuleb. Loco sem. vrticæ ego libenter vsus fuissim succo vrticæ , qui pro arcano habetur contra sanguinis sputum , vt collegæ meo referebam ex Amati historia Cent. 6. curat. 4. Nam omnes , qui sanguinem ex pectore reiecerant , & à Medicis tanquam deplorati habiti sunt , solo vrticæ succo ebibito conualuerunt : post multa enim machinata remedia , nullum remedium ita contulit , vt sanguis hic cohiberetur , ac succus vrticæ , quem ad quinque vel sex dies ebiberunt. Singulis namque diebus , singulas quatuor vncias ieiuno stomacho bibebant , imo & ipsam vrticam incotam iure pulli aut veruecis sape comedebant : ex iis alter prædicti Bucignolæ nepos erat ; alter vero Ragulæus , Patrius quoque. Vrticam hoc minus conficere posse , difficile creditum est. Dioscorides tamen de ea ita inquit : Vrticæ folia profluuiarum cum succo siliunt (quod & nos experti sumus) trita imposita ; & vltimo vrinæ succus , gargarizatus vnam reprimat. Maluit tamen Ericius semine vti ; quamuis idem fatebatur se succo vrticæ fluxum in vulnere restinxisse. Seniori tamen hac in re nolui ita resistere , quamuis libentius succo vsus fuissim. Verum , cum ex præscriptis remediis sputum sanguinis nondum ex integro cessaret , & catarrhus ad pectus etiam deflueret cum tussi : vnde vena licet contracta & consolidata de nouo aperiebatur , & sanguinem fundebat ; ideo & hanc cuculam vna præscripsi. *℞. flor. ros. rub. flor. nenuphar. an. p. j. sem. corind. præpar. 3j. b. sandaracæ , masticis , an. 3j. samal. vrb. ciuin. an. 3j. puluerisemur omnia crassiuscule , & bombaci inspergantur , & sindone rubra cooperiantur , & fiat cucula roborata intersua , succo coronati applicanda. Decimo sexto Septembris cum sputum sanguinis nondum cessaret , sequens eclegma præscriptum est. *℞. conserv. ros. veris 3j. b. gummi tragacant. albiss. solut. in aqua portulacæ 3j. boli armeni veri 3ij. trochisc. de spodio , de carab. de terra seigil. an. 3j. sem. portul. confusa 3ij. b. com syrup. myrrill. fiat eclegma. capiebat cum baculo liquir. ad libitum : subinde & cochlear vnum syr. de portulacæ , non qui sit ex succo end. & sem. portulacæ , qui valde mucilaginosus est , neque illitum aliis multis placet , sed qui ex solo succo portulacæ & saccharo clarificato paratus esset. Vicissim hoc syrupo vtens , tum conser. ros. & portulacæ , in cibis etiam viridem masticando ac deglutendo , tandem sputum sanguinis desinit , & optime habere capit. Hic tamen postea melancholicus , & rursus catarrho acri destillante in pectus , tabem incurrebat , ac phthisi obiit sexto Martij , Anno 1572.***

SCHOLIA.

Sanguinis autem reiectio , quæ ex aperture osculi alicuius vasis contingit per ea , quæ dilatatum

latatum os obturant , curari debet , Galeno auctore 7. de compos. medic. secundum locos. Obturant autem osculum (vt etiam Scholio præcedente diximus) dilatatum medicamenta , quæ vim habent adstringendi : eius vero (vt etiam exemplis antea ostendimus) quæ ex vasis ruptura fit , curatio per eiusdem conglutinationem perficitur : at qui conglutinator ruptum per eadem medicamenta astringentia , & quæcumque ipsis in compositione miscentur citra mordacitatem resciantia , & glutinosum quiddam habentia , vt & antea dictum est ; quæ idcirco , quod ex lentia , crassaque substantia consistunt , meatus obstruunt , & Græci *ϕυμασµα* vocant , vt 5. method. med. & 4. & 5. de simpl. medic. facult. liquet. Id vero in vtriusque prius animaduertendum (vt Donatus quoque numquid causa ruptionem aut aperture nem efficiens deserit , vel adhuc maneat : namque si deserit , primum sistere sanguinem expedit ; post vero (vt inquit Galenus eodem 5. method. med.) per ruptum vas aut resectum , sanare eo conglutinatio vel obstructio. Si autem permaneat efficiens causa , vt pote abundantia , ea quidem primo vacuanda erit : etenim manente ea , vas etiam plus rumpitur , aut resecatur : hinc sanguis reprimendus , moxque vlcus ipsum vasis , vel eius aperture curanda. Desinente igitur effricice causa , primum sistere sanguinem expedit , Galeni decreto , post vlcus sanare : obturato quidem , quod per ruptum est ; auerso autem atque aliorum translatum , quod per id ferebatur : quando si id eo , quod inter initia , impetu confluat , osculumque vasis pari modo pateat , citius plane moriatur animans , quod profluuium laborat , quam sanguis cesset effluere. Siftitur porro , quæ vasis profluit sanguis , aut propterea quod amplius non confluit , aut quod oclusa diuisio sit , seu conuiueat id , quod resecatum est , vel propter vtrumque vt inquit Galenus eodem lib. 5. method. medendi , id quod ipse dicit tutissimum. Hæ qui dem sunt communes curandi indicationes cuiusvis cruentæ expuitionis , ex diuisione seu aperture vasis cuiuslibet partis : est insuper & aliud commune omnium internarum partium affectarum , vt idem Galenus lib. 4. method. medendi. asserit , vt ea eligantur , quæ animalis naturæ maxime sunt familiaria , siue ea cibi sint , siue medicamenta , fugiantur respuanturque huic contraria. Interea partes affectæ aliquo modo priuatim curationem variant. Si ex refrigeratis spiritus instrumentis sanguinem reiecerint , his è vestigio sanguinem vena secta extrahere conuenit , vt Scholio præcedente diximus , bis eodem die , vt Galenus l. 5. method. docuit ; alioqui , modo atas vel vires non prohibeant , paulatim euacuatio facienda , vt etiam Aëtius admonet : deinde & ligationes , & frictiones peragendæ. Diximus autem hunc casum , si ex tussi vena rumpatur , partibus pectoris refrigeratis , ob contrarias indicationes curatu difficilem esse. Nam quæ tussim ad frigore sedant , necesse est calida sint , vt inspiratio & ea , quæ extrinsecus calida applicantur ad intemperiem tollendam. Quanquam in hoc nostro ægro etiam catarrhus aderat , neque intemperies ita frigida. Calida itaque sanguinem fluere faciunt , vt supra diximus. Galenus igitur historiam ponit iuuenis , qui tussiens ex refrigeratione pectoris sanguinem exscreauit. Curâ verò fuit hæc : primum enim procurauit , vt sanguis sisteretur , quod magis vrgebat , secta vena , & vinctis & frictionibus : mox medicamento soporante , diaphoreticum est vsus : secunda itidem detrahit. Sed pe-

ctori mox emplastrum ex tapfia apposuit , ad tollendam intemperiem pectoris , sed diu morari non sinebat , ne multum calfaceret. Noui ego medicum quendam alioqui doctum , qui cum ægro suo ceratum calidum pectori applicuisset , & peregre profectus diutius cum reliquisset , pectus adeo exulceratum fuit , vt ad interiora vlcus pertransierit , & æger non diu post obierit , quo factum est , vt deinceps ille Medicus omnem auctoritatem amiserit. Alio similiter die Galenus apposuit , licet etiam tunc non diu morari sinebat : itaque per interualla , & vacabat symptomati tussis , & spatium naturæ præbebat , vt glutinaret ; nec adeo calfaciebat , vt venam aperiret : & semper medicamentum diaspermum dedit vsque in quartum diem. Sed dices , qua de causa ? Respondet Iacchinus , vt tussis symptomati occurreret , sensum hebetando , & ita proritationem ; & vt sanguinis fluorem sisteret. Deinde ad Tabias misit pro siccanda magis cicatrice , vt firmior esset. Si ex aliis causis eadem vasa rumpantur aut referentur , etiam tunc vena incidenda est : ex mente Galeni , Pauli & Aëtij ac Tralliani , vt Scholio præcedenti diximus : artusque fricandi & vinciendi , atque posca tepida exhibenda , mox medicamenta emplastica & astringentia. Illud tamen perpetuo seruari debet ex Galeni decreto , l. 4. method. medendi. & 7. de compos. med. secundum locos , quod congruenti mensura prædictis medicamentis , in his qui ex pulmone , aut thorace , aut aspera arteria sanguinem reieciunt , miscantur tum calida , tum tenuium partium existentia ; quamuis vasorum rupturæ ac resecationi sint infestissima , gratia scilicet distributionis ipsorum medicamentorum : etenim astringentia & viscosa , ac tenacia sibi ipsis vias præcludunt : quare opus habent facultate ipsis viam strante , ac præparante. Quapropter omnibus medicamentis , quæ thoracis & pulmonum vlcibus sunt destinata , mel admiscendum erit : est namque ipsum veluti instrumentum quoddam digestionis eorum in corpus , ac celeris transitus : veluti vehiculum , vt patet eodem 4. lib. method. medendi. Quod si ex acri destillatione , vel ex catarrho vena aperiat vel referatur , aliter curandum erit , & catarrhus prius tollendus erit , vt exemplum sequens docebit.

OBSERVATIO XVII.

De sputo sanguinis ex catarrho oborto , potius insipido quam acro.

Tussis aliquando ex catarrho descendente à capite in pectus vel pulmonem , sputum sanguinis inducit : quod equidem bifariam contingere potest ; vel enim ex tussi sit continui solutio ob partium distensionem , vel quoniam catarrhus erodens sit , ideo vlcus facit. Si enim insipidus sit catarrhus , sola tussis causa esse videtur : vt illis diebus iuueni euenit , vt ex tussi cum catarrho tamen insipido , sanguinis sputo laboraret ; & quia plenitudine hic iuuenis aliquo modo laborabat , & satis robustus erat , venam incidere iussi ; moderate tamen sanguine extracto in cubito. Ad diuersionem quoque à capite , postquam leuiter purgatus esset cum pil. ex aloë & rhab. etiam cucurbitulas scapulis admodum iussimus cum scarificatione , etiam vinctis membris extremis iniectis , & adhibitis frictionibus. & capite mastiche & olibano inspersit. Pæctor meus etiam cauterium adhibebat capiti , eoque sic

sic roborato theriaca \mathfrak{D} ij. *dabat cum succo arnoglossi vel portulacae.* Nos autem ad constrictionem dedimus lapidis haematit. curiose laeuigati, & in puluerem tenuissimum redacti \mathfrak{D} ij. cum aqua sola tepida, & egregie contuli: hoc enim modo Trallianus dabat in iis, in quibus sanguis copiose (ut hic) non euacuabatur, alioqui in his, qui largius sanguinem reiciebant, cum succo mali punici & granis, vel cum succo polygoni dabat. Hoc enim modo sine theriaca aliisque pretiosis antidotis multos curauit, lenibus utens medicamentis, & praesertim lapide haematite. Dat autem ex eo ita laeuigato, ut sit aëreus & vento persimilis, \mathfrak{D} iij. & paulo amplius minusve. Exhibuit etiā iis, qui pus expuere inceperant: ac mirum est, quomodo vlcus excisicari sanaueritque ut non amplius pus generaretur, neque aeger à tussi infestaretur. Ideo etiam in catarrho acri corrodente utebatur. Spectauit autem & alium quendam ex his, quibus vas exesum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem: ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit: nam & hic curatus est, illo ipso non admodum etiam sperante. Exhibuit autem aegro potui medicamentum frequentius, ut commodius distribuerebatur. Quare, cum crebro ipsum bibisset, tandem sumere ipsum fastidiuit. Excogitauit autem huiusmodi rationem: redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo impoluit, & diligenter ipsa vndeque constrictionem, colligatumque in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisit, idque per totam noctem iam inde ab ipso vespere: extraxit autem tenuem aëreamque eius partem, ut aeger solam vini qualitatem perciperet: ex hoc bibere, quantum mane bibere solebat, ei praecepit. Atque hoc sane agendo, bibendoque continue, sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem praeseruationis causa facere pergebat, bibebatque donec etiam corpore probe permutato, consueta agendo viribus se constare sentiret. Hæc de lapide haematite, haecenus à Tralliano visu & usu comprobata, hic recensere nobis vtile visum fuit: cum & nos hunc lapidem cōtritum in tenuissimum pollinem cum aqua plantaginis vel bursæ pastoris saepe transfusum, & deinde colatum, ut aqua rubedinem acquireret, accepimus, immixto syrup. de portulaca vel myrtillo: ac ita ad sanguinis sputum commode exhibuimus.

SCHOLIA.

4 **S**i itaque insipidus catarrhus sola tussis causa fuerit, facile cognoscitur, & etiam facilius curari poterit. Si vero salsus vel amarus, & flauum quid expuitur, de erosione suspicio est. Galen. autem posuit vtriusque affectus curationem, ac primum eius qui ex sola tussi fiebat, ut in illa nobili Romana. Nec enim illa erosione pulmonis reiecerat. Nam hi, ut mos habet, insanabiles sunt, & curam nullam admittunt, nisi ut vita prolongetur. Et errarunt multi in hoc (viti etiam Iacchinus doctissimus annotauit) quia crediderunt historiam illam & curam conuenire erosioni ex catarrho: vnde frustra de multis dubitant circa eam curam, quomodo apposuerit capiti calido, toties calidum emplastrum. Et ego alias (inquit idem Leonardus Iacchinus) de hoc dubitabam: & respondi, laborare Galenum contra symptoma. Sed reuera optima est curatio, quæ tollit causam, nec lædit: quoniam siccatur

calefacit: in capite laborante destillatione, est vtile: ubi si esset arrodens catarrhus, profecto malum esset. Mirum non considerasse hunc locum Veteres, qui historiam referunt, quasi catarrhi erodentis. Mesue & Rhafes nullam historiam æque admirantur, & colunt: cui tamen morbo medeantur profus ignorant. Vnde iuuenis ille, qui tuniculam gutturis expuit, ex catarrho erodente id passus est: neque in hoc hanc curam posuit, sed longo tempore curatum: nempe ratione, quam postposuit: quoniam succi vitium corrigere oportuit purgatione, & alimentis, idque non potest, nisi longo tempore fieri. Quod historia mulieris sit catarrhi frigidi & humidi, patet: primo: quia cito sanata est: ergo non erosione. Præterea erosionem dicit esse insanabilem. Præterea etiam post agglutinatum vulnus, ad caput taphia vitur, ut pateat non aduersus symptoma pugnasse, sed aduersus causam. Quod si dicas, cum præcauet catarrhum acrem, & erodentem, adhibet capiti taphiam: Respondetur, potest esse sine calida capitis intemperie: sed potius cum humida, cum reliquum corpus plenum esse vitiosis humoribus, qui caput petunt. Sed si esset ex capitis intemperie, hoc non fieret. Verum ad catarrhum prius accedamus: atque curationem ex Galeno ita instituamus. Primum itaque, ut in eiusmodi aliis affectibus, sanguinem mittere decreuerat, quod id morbus exigeret, tum ad minuendam materiam catarrhi, tum ad reuulsionem, & deriuationem à parte. Sed alia dissuadebant, nempe quatruidi inedia: forte vero & gracilis erat, & æstiuo tempore, & alia aderant contra indicantia: sat nobis est affectum id exigere. Post modum qui eam dimiserat aliis reuulsoriis ingeniis vitur, clystere acris, scilicet & vinculis, & fricat calfaciente pharmaco, ut puta sinapi ex aceto. Hæc enim auersio maxima est. Huc vique auersio: mox ad causam tussis proximam accedens, rasocapite emplastrum ex columbino stercore imposuit, ex recenti, inquam, in turribus collecto, cui maxima vis in est calfaciendi & siccandi, & attrahendi catarrhum ad extimam cutem. Hoc usus per horas tres est, ne scilicet exurere nimium. Sed caput pro tempore idoneo operimento contegit, hoc est, quatenus externo aëre non læderetur, mox in balneum duxit. Hic vero dignum consideratione est, quomodo in balneum ducat eos, quibus sanguis profluit, cum vniuersum calidum promoueat profluuium \mathfrak{S} . *aphor. & priuatim balneum ea augeat. 1. ad Glasc. c. de accid. & in historia Metonis 3. 1. Epidem. ad sanguinis profluuium augendum caput lauat Hip. Præterea in fine curæ, dicit in balnei abstinentia cum continuisse, ut scilicet siccaret. Respondetur: Primum, quod reiecerat exiguum erat: itaque ruptum vas erat exiguum: sed potius timor erat futuri, quam presentis affectus. Præterea inedia præuacuata ea non videbatur timor fluxionis, & ideo resistebat. Vel dicitur, non esse eandem rationem laborantis pectoris, & capitis. Calidum enim balneum caput replet, ideo sanguinem è naribus fluentem proritat. At à pectore reuellere videtur: nõ secus atque alui profluuium ab intestinis. Hic nota solum lauat, cum capiti emplastrum apponit. Et Auicenna dicit, propter medicamen, id est, ad tollendam acrimoniam eius, non vngit caput, sed lauat: quoniam vnguenta plus morantur & humectant; & quia quod attractum est, exhalare non sinit, 6. de semir. iuend. Ut ergo frictione vitur, cur non & balneo? Caterum hæc responsiones ad logicam quidem disputationem viles forent,*

OBSERVATIO XVIII.

De destillatione acri à capite in pectus cum tussi, ex qua vena pulmonis corrosa fuit cum sanguinis cruenta spuitione.

Vir quidam annos circiter quadraginta excedens, cum longa destillatione acri laborasset, neque satis tempestiue de remediis cogitaret, & tussi valida afficeretur, tandem sanguinem subito exscreauit spumofum, rubrum, humiditatem euidam admixtum: quamquam ultimo paucus, viuus, nulli rei admixtus exierit, quem ex vena pulmonis vel prope pulmonem existente, effluxisse existimabam: assidua enim humoris destillatione à capite in pectus vena quoquo modo corrosa intelligenti illa tussi aperta fuit, vnde sanguis ille effluxit: tunc enim prius me vocauit, cum iam macilentus & extenuatus ex longo morbo præcedente: sanguinem hic mittere ausi non fuimus, cum ad hecticam tendere videretur. Et quamquam destillante acri humore, praesertim ad pulmonem aut pectus, toti corpori consulendum sit, quo sistatur erosio Galeni auctoritate \mathfrak{S} . *meth. med.* Interea Paulus & Alexander præcipiunt cauere debere sanguinis missionem; praesertim ubi admodum acris fuerit destillatio. Nam magna ex parte corpus eorum, qui ex erosione sanguinem reddunt, gracile ac persiccum est, quale hic erat, cum & diutius male habuisset, ideo sanguinem non detraximus. Si autem ab initio iam prius sanguinem exspuisset, Galeni auctoritate fretus (*cod. 5. lib. method. med.*) ubi validus fuisset aeger multique sanguinis, statim à principio sanguinem detraxissem: id quod nec Alexander, nec Paulus negarunt. Et si parum sanguinis habere viderentur, ij ad quandam succum probiorem victus ratione reduci debent, deinde sanguis detrahendus, si res ita suaserit. Verum hic cum sub noctem acciti essemus, ut scilicet quens sumeret mandauit: *symp. pap. myrtini, ana 3 ss. boli armeni orientalis 3 ss. misc.* mane cum spiritum salum sentiret, atque hic vitiosus succus corrigendus esset, atque primo alterandus & cōtemperandus, licet omnino longo tempore opus sit, ut Galenus dicebat, quo succi huiusmodi temperentur, & corrigatur vitium. Cum & tales acri sanguine decocto ab initio (quod nunc prætermisum erat, cum diutius laborasset) tum reficiendi sint, tum purgandi ac rursus post purgationem reficiendi. Quæ omnia tempus habent: Post exhibitum hunc syrupum, \mathfrak{Z} . *symp. violarum. papauer. myrtini. ana 3 ss. aquæ decoct. bordei 3 iij. deindus 3 j. cassia recens extracta cum sero lactis.* Deinde ad sanguinis sputum, boli armeni veri \mathfrak{D} ij. cum lacte. Postea etiam lac caprillum dedimus, cum de phthisi metueremus: nam tales maxime lac requirunt, qui maxime insanabiles sunt; præcipue, ubi à capite aliquid defluerit. De quo Alexander in hoc Gal. imitatus. Omnes autem, inquit, lacte vtuntur, molli recentiq; caseo, praesertim caprillo aut bubulo. Est valde accommodum à balneo aquæ dulcis sumptum. *Gal. 7. meth. med. vult,* ut calens à mammillis ab ægris sugatur: & ut mellis tepidi pauxillum immisceatur, ne in ventriculo cogatur aut concreseat. Verum, licet multis & aptis remediis vsi simus post semiannum tandem mortuus est ex tabe.

SCHOLIA.

4 **S**I ex acri destillatione cum tussi, exuenta spuitio contingat, medicamentorum copiam, & cap. de destillatione tum de tussi, requiremus. Illud tamen perpetuo in eorum exhibitione seruandum, vt quæ magis familia ac leuia sint, eligamus, vitæque acriora, calidiora, ac sicciora: quæ insuper non semel tantum propinabimus, quin imo bis & sæpius, vbi oportet: nam longo tempore (vt diximus ex Gal. auctoritate) omnino opus est, vt succi contemperentur, & corrigatur vitium; potissimum si ex eo in pulmone erosio facta fuerit. Quapropter Galenus eos, qui plane deplorati non sunt, omnes seruari fatetur, per hæc tria, per sanguinis videlicet missionem & purgationem, & ea, quæ caput roborant: non enim in huiusmodi affectibus à paruis auxiliis incipiendum est, veluti Erasistrato visum fuit: nam in morbis, in quibus periculum non imminet, à paruis auxiliis incipiendum est: quod si nihil profecerint, aggredienda maiora sunt. At vbi periculum maximum impendit, à maximis quoque auxiliis exordium est: Nam ad vltimos morbos vltima prorsus remedia maxime valere Hippocr. decretum reliquit. Ea de re non immerito statim circa initia venæ sectione (si nihil prohibeat, at hic in nostro ægro prohibebant diuturnitas mali, macies, & vires deiectionis) ac purgatione vtendum, nec minus & capiti confestim prospiciendum, ne ex eo in pulmonem aut pectus aliquid destuat: in quem vsum conducit si 3 lb. infra scripti pulueris, ex Donati sententia sumatur: 2 lb. sem. hyoscyam. & pap. alb. an. 3 lb. sem. coriand. preparati 3 j. cort. thuris g. ij. massicis g. 4. pul. hirundinis preparati 3 lb. zacch. 3 iij. Tēpus autem sumendi est post duas vel tres horas ante somnum à cœna, vel pilulas duas deuorent ex pilulis decynoglossa Nicolai, loco medicaminis, quod diaspermaton à Galeno prius appellatum diximus, quo is utebatur. Is quoque thapsiam (vt scholio præcedente retulimus) capiti imponebat: alij sinapismo aut ignis cauterio vtuntur. Sed aduersus Galenum Trallianum defendit, & Galenum redarguit: quoniam Donatus eundem contra Alexandrum Trallianum defendit, non vt temperiem capitis calidam curaret, sed vt humiditatem acrem, quæ à capite defluebat partim exsiccaret, partim etiam ex interioribus foras traheret, & per cutim euacuaret, idque etiam in principio, ne materia deflua ad pulmonem, & tussim excitet, ex quo maius periculum, quam propter reuulsionem & exsiccationem. Quam rem etiam doctè prius Iacchinus scholio præcedente, & ad amissum interpretatus est. Vbi vero hæc pericula non impendent, in calida fluxione post redundantium humorum vacuationem, ea quæ infrigidant, pro eius alteratione capiti adiuuere hæsitaret nemo, & nō calida; cum, si caput ex calida intemperie male habet, talia medicamenta noceant; Vt igitur temperamentum melius reddamus, præstat ipsum rosaceo perungere: atque æstatis tempore præstantius erit, eo quod ex crudo oleo, quod omphacinū vocat, componitur, vti: quemadmodum idemmet Gal. præcipit 6. de sanit. tuenda, damna medicamentum, quod ex thapsia & sinapi componitur, cum ex calida capitis intemperie fluxio fiat; eosque balneari iubet, frequenti balneo potabilis aquæ, quo & calidos vapores, qui in capite sunt, euocemus, & totum capitis temperamentum melius

Quando à paruis, & quando à magnis auxiliis incipiendum est.

Calenus defenditur contra Alexandrum.

6

reddamus: nec minus balneum ipsum prædictis lib. 5. ineb. med. commendauit. Prædicti quoque sunt (eodem Gal. teste) qui maxime lac requirunt, neglectoque eo omnium sunt insanabiles, præcipue vbi ex capite aliquid in pulmonem destuat. Alexander quoque de lacte imitatur Galenum, vt obser. præcedente sub finem diximus. Horum auctoritatem loca ipsa perlegere poteritis, cum Galenus & Alexander de sputo sanguinis curando nihil intactum reliquerint. Si autem lactis quantitas ab 3 iij. ad vj. pro diuersa corporum natura, ætate & consuetudine, ac reliquis: melius autem vel rosacei mellis, quo & ego vti soleo, quarta pars, aut medietas vnciæ vnius. Hoc modo & Donatus vitur.

OBSERVATIO XIX.

De quibusdam ex vasorum exeseione sputo cruento laborantibus.

GODEFRIDUS Petrus Beaumontius cerevisarius, annos (plus minus) 59. natus, cum aliquando diu asthmate laborasset, tandem tussi valida correptus, etiam febre continua satis, vt de phthisi metus esset, tandem & sputo sanguinis correptus est: quod cum in notabili quantitate cum febre prodiret, multum sibi metuebat etiam de tabe, quamquam prius sputum non purulentum, sed pituitosum vna cum sanguine extulsiesset, postea vero subinde nigriusculum, ita vt ex erosione venæ pectoris prodiret, cum pure quasi tandem permixtum. Tale autem sputum cum febre solet esse semper suspectum: nam febris putredinem & corruptionem maiorem arguit: & quamuis maius periculum inducit sputum sanguinis arterialis quam venalis, etiam si sine febre fluxerit, suspectum habeatur: tamen omne sputum sanguinis, si cum tussi ex pectore aut pulmone erumpat, cum febre & sine febre, malum semper est: deterius tamen ex pulmone, vt mox alio exemplo docebimus; & magis ex substantia ipsius, cum ducat ad phthisin: quod ex pectore est, sanatur: quidem velociter: si minus, habet malitiam vlcis pulmonis, cum fiat fistulosum frequenter rediens cum sanguinis sputo. Ad hunc in principio accitus cum febricitaret & valde tussiret, & nondum sanguinem exspueret, sed materiam putidam pituitosam, & aliquandiu etiam lenta febre correptus esset, vt longo tempore foras prodiret: vbi enim magis cepit febricitare, me vocauit mense Maio, propter febrem; & quia quorundam consuetus erat sanguinem mittere, quamuis paulo macilentior, tamen multi sanguinis. Post acceptum bolum ex cassia, aluo satis soluta, die subsequente vena basilica in brachio secta fuit, & pro tussi ac febre continuo lambebat ex syrupo viol. nam maciem contraxerat, & de tabe metuebamur. Deinde ex hoc decocto tam ob febre, quam ad vitiosos humores contemperandos his in die ciathum sumebat. 2 lb. corticem rad. cichorii, demis leonis, glycyrrh. rosa, an. 3 lb. flor. cord. p. j. vngula cab. seu beechij, solior. viol. acies, cichor. capill. ven. polytrichi, ana m. j. bordei mundati, p. j. sem. quat. frigid. maior. an. 3 j. prin. damasc. nu. 9. vna. passul. enucl. 3 j. vna. corimb. 3 lb. iusabarian sebesten. recent. an. 5. fiat decoct. in aqua communi pro 1 lb. coletur, & adiecto vniuerso saccharo candido dicto, ad meliorem saporem, seruo ebulliant ad modum iuleb. Interea quoque pro tussi & calore febrili subinde capiebat ex tabulis diatrag. frig. Sub noctem sumebat hordeatum in hunc modum concinnatum.

2 lb. bordei

2 lb. bordei mundati p. j. amygd. dulc. depilat. 3 lb. sem. pap. alb. 3 j. sem. 4. frig. maior. mund. an. 3 lb. fiat hordeatum pro 1 lb. j. sacchar. parum dulcoretur, vt artis est. Hoc multis diebus sub noctem sumebat: interea leuiter cum purgauimus cum syr. rosa. pallid. & sero lactis. Et rursus apozema, vt superius, adiectionis scabiosa, pulmonaria & hyssopo, vt sputa melius exirent: & cum dormire non posset, tempora inunximus vng. populeo, & oleo pap. & mandragoræ simul mixtis, & utebatur suo diatragac. Et cum ad mensem Iun. peruenissemus, & in lumbis doleret, eos inungi iussimus vnguento rosato. Postea sanguinem extulsiesset: primo quidem rubrum, postea pituita immixtum, deinde etiam purulentum, vt de corrosione venæ suspicio esset, sputo aliquot diebus perdurante: quamuis histabulis frequenter vtens tam pro tussi, quam pro sputo cruento, etiam subinde consueta ros. accepta cum exiguo bolo immixto & syrupo myrteo, tandem sputum sanguinis desit. Tabulæ tales erant: 2 lb. specier. diatrag. frig. 2 lb. boli armeni veri prius puluerisati 2 j. sem. port. 2 lb. dissolutis in aqua vngula caball. q. s. sacchar. albiss. 3 j. admixtis, fiat confectio in tabul. Interea si aluum non deponeret, glande tantum irritauimus, absque alia purgatione. Et vbi sputa minus prodirent, hoc syrupo longo sæpe utebatur, alioqui tabulis suis vel consueta iam dicta, si magis cruentum esset, glycyrr. rosa 3 iij. vngula caball. pulmonaria, solior. viol. bordei mundati, an. m. j. sem. quatuor frigid. maior. an. 3 lb. vna. passul. ab arillis repurg. 3 j. vna. corimb. 3 lb. dactyl. pinguium nu. 3. iusabarian sebesten. recentium, an. 5. fiat omnium decoctio in aqua communi pro 1 lb. j. col. dulcoretur saccharo candido, & fiat ad modum syrupo. longi, rursus ebulliendo. Continuabat & suum hordeatum sub noctem. Quibus tandem cum multorum admiratione, cum in fine pro tabido quasi haberetur, fuit curatus. Eodem modo fere Machthilda Alphonsa mulier Delphensis, non tamen fabricitatis, tertio quoque anno incidebat, licet vetula, in sanguinis sputum ex corrosione venæ pectoris cum catarrho falso: quæ & iisdem fere remediis fuit curata, magis tamen astringentibus, cum ex erosione hæmorrhagia profusior contineret: tunc enim iis vtendum medicamentis vehementissimis, quo ad vehemens eius impetus frangatur: reliquo vero tempore iis utebamur, quæ celeriter erosionem lenire poterant, & modice siccarent, & vlcera ad cicatricem ducunt: quare & pulvere lapidis hematitidis (de quo prius dictum est) utebamur, radice symphiti condita, & bolo armeno & terra Lemnia vera, quam & egregie iuuabant rotulæ sequentes. 2 lb. boli armeni veri 2 j. specier. diatrag. frig. 2 lb. cum aqua vngula caballina & portulacæ, adiectis 3 j. sacchari, fiat rotula ponderantes 3 j. & quotidie tres pluresue rotulæ capiebat, & fuit curata. Quamuis hæc ipsa cum annos septuaginta attingeret, rursus ex catarrho falso incidit in venæ pulmonis rosionem; ita vt sanguinem rubrum ac purum & spumofum exspueret, postea vero vna cum sanguine etiam purulentam materiam, idq; longo tempore, vt tamen etiam tabe consumpta, ex eodem malo sæpius recurrente, vitam valde vetula finiebat. Eodem modo David Georgius longo tempore asthmaticus, diu in sella sedens, sputum cruentum extulsiesset valde nigrum: multis tamen adhibitis remediis, & hic quoque senex tandem obiit. Cyprianus vero medicus, & collega meus, qui post obitum Cornelij Ericij in eius locum

P. 1. Foresti. Tom. 2.

succesit, in sputum sanguinis ex erosione venæ pulmonis incidit, & longo tempore laborabat, & aliquando floridum sanguinem & copiosum ac spumofum profundens, cum vltus esset multis ac variis remediis, aliquando vena videbatur consolidata, & cicatricem contraxisse: postea rursus ex tussi vehementiore particulam seu crustam cicatricis, cum in peluim expectoraret, de nouo sputum sanguinis violentius subsequetur, & deuorato subinde diacodio, & aliis medicamentis aptis paulo constitit sanguinis sputum: verum cum sæpius malum rediret & exasperaretur, materiam quoque purulentam longo tempore expellens, hic tandem tabe etiam consumptus, nullis remediis ad tabem valentibus illi conferentibus, extremum diem clausit.

SCHOLIA.

QVI vero ex erosione laborant, si quidem iam sanguinem reicere cœperint erosa vena prorsus insanabiles esse videntur. Et quanquam prior noster æger curatus fuit, hoc Dei quoque beneficio factum existimamus, cum ab omnibus fere, qui illum inuisebant, pro deplorato haberetur: & quamquam mulier illa vetula bis per me curata fuerit, etiam ter, tamen in extrema senectute, cum malum ad pulmonem serperet, illa quoque, licet in extrema senectute, obiit. Et alij duo reliqui ex vena erosa mortem quoque incurrerunt. Quod autem tales sint insanabiles, ratio dicat: cum sanguis erodens & vitiosus sit, ex prauis saniebus admixtis. Eiusmodi autem corpora breui & facile attemperari nequeunt, quoniam temperatio non fit, nisi vacuatione & nutritione. 9. method. Hæc autem longius tempus exigunt. Quare cum causa erodens cito tolli non possit, opus omne medici frustrabitur: plus enim proficiet ea exulcerando & erodendo, quam tu attemperando. Præterea cum catarrhus à bronchiis ad venas peruenire debeat, siquidem exulceret, & interim inter mediam pulmonis carnem, qua venæ circumdantur, exulcerasse verisimile est: sed nec ipsum venæ corpus subito quasi ictu quodam fecit, sed sensum erodit, itaque vlcus esse purulentum necesse est, & inflammatum. Quare, vt impossibile fere erat talia sanare, ita & vlcera ex erosione non poterunt. Præterea refarcire carnem oportet, est enim cauum vlcus: id autem breui fieri non potest. Si qui vero seniores sunt, & sicco corpore, hi in longius tempus perdurant, vt euenit huic vetulæ, & Danieli Georgio Melissæo. Et, vt apud Arabes legitur, vitam multo tempore protrahere possunt: & quidem multos vidimus, præter hanc vetulam, qui vsque in extremam senectutem vixerint. Ita soror M. Iacobi Musei Dordraceni, cum sputum sanguinis ex vena pulmonis pateretur, ac quasi pro mortua haberetur, nec vllis remediis restringi posset, ita vt frequenter syncopen incurreret, vt ex profusione sanguinis pro deplorata quasi haberetur, cum frustra medicorum quorundam opem experta esset, me tandem vocauit, ac Dordracum accessi 4. Iulij die, ann. 1576. quam reperi vires plane habere exhaustas: ideo ad restringendum sanguinem hæc præscripsi; Recipe rad. symphyti conditi 3 j. sanguinis draconis, lapidis hematitidis. an. 2 j. boli armeni. veri 2 lb. terra Lemnia vera 2 j. pul. specier. Haly contra phthisin 2 lb. diatrag. frig.

frig. in tabul. 3 iij. confer. ros. 3 i b. pulverisanda pul-
ueriscentur, ut alcohol. seu in tenuissimum pollinem, &
radices pistantur, ac omnia probe simul misceantur cum
syr. de portulaca, & syr. myrtil. q. s. in eclegma coquant,
sumat cum sp. liquoris. ad libitum, modo sumat parti-
culam unam rad. symphyti. Atq; hic pulvis paratur:
2. boli arm. veri 3 i b. lapidis hæmatitis 3 j. terre
Lemnia vera. 3 b. cor. all. rub. gr. vij. sit pul. subtilissi-
mus ad modum alcohol. & dividatur in tres partes, &
una pars exhibita fuit cum vino rubro vel ceruisia. qui-
bus eo tempore vena fuit consolidata, ita, ut ad
tempus quasi videretur curata, ac deinde domum
reversus sum. Verum post mensem unum atq; al-
terum redibat sputum sanguinis: sed iis remediis
rursus deficiebat sputum, ut postea per semian-
num deinde redierit, & tandem tabida & maci-
lenta euasit: consulimus tunc ut subinde 3 j. pul.
Halycontra tabem cum lacte sumeret: modo cum syr.
viol. vel iunbino: & præcepimus, ut amygd. dul-
ces recentes conditas, sæpe comederet, & ut pro
tussi subinde radices althææ saccharo incrustatas
fumeret: atque ita cum multis deinde & commo-
dis remediis uteremur, ad vitam solū conservan-
dam, adhuc tabida per tres annos superuixit, &
macie ac marcore tunc consumpta obiit. Et ita
plurimos vidimus ad extremam fere senectutem
peruenisse, quamquam aliquos etiam iam consi-
stentes ætate perisse conspexerimus. Quibus un-
que tandem partibus ex vase exeso reiectio san-
guinis fiat, per renutritionem erosorum curabi-
mus, Gal. auctore 7. de compos. med. secundum locos.
Renutritur autem corrola (ut ipse inquit) per
cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia
(sarcotica à Græcis appellata) ea de re (ut testat-
ur Alexander) non amplius medicamentis, aut
cibis admodum astringentibus, aut acidis, sed po-
tius eis, qui temperare & alterare humoris,
quietationem excitant, acrimoniam possunt, uti
oportet, nisi profusior hæmorrhagia fuerit: nam
tunc iis, quæ vehementissime astringunt, uten-
dum medicamentis est, quoad vehementius eius im-
petus frangatur, ut auctor est Galenus quinto meth.
med. Quapropter ptisana ægros alere conuenit,
aut alica, seu reliquis cibis, quibus nihil adsit, aut
salsum, aut acidum, imo nulla alia qualitas, sed è
contra, quæ magis implentem obturantemque
ipsam reddere queant, ex mente Alexandri: ve-
lut est amyllum frumentaceum. Ex oleis com-
petunt intybum, cichorium, buglossum, lactuca:
procedere vero tempore, ubi vires infirmas ha-
beant, citra salem offerre expedit carnes gallina-
rum, pullorum, caponum, perdicum, phasianor-
um, sturnorum, turdorum, ac reliquarum mon-
tanarum avium: interdum hædorum, seu castra-
torum, ut ita dixerim, aut suillorum pedes cum
ptisana decoctos assumant, ut summam dicam,
cibis utantur boni succi, ut antea etiam diximus,
qui etiam humoris influentis acrimoniam obtun-
dere, & crassiores reddere possint: potissimum
ubi ex acri destillatione pulmonis seu thoracis
erosio fiat, ab acidis, salis, potissimum veteri ca-
seo præsertim captillo aut bubulo (ut Alexander
inquit) commode uti possint, tanquam vtili exi-
stente. Pro potu aqua utantur decocta cum semi-
ne coriandrorum præparatorum, paucis cinna-
momo, aut glycyrrhizæ radice: vino quoq; (ubi
assueti fuerint) uti aquoso, aut parum rubeo sub-
stringenti conuenit. Reliqua peragenda (quod
ad destillationem acrem atinet corrosivam)
ut dictum est scholio præcedente.

OBSERVATIO XX.

De sanguinis sputo vehementiore & violento, cum
copioso pure.

A Perus de Diick capitaneus, cum militiam diu
sequeutus esset, & intemperanter vixisset (ut
militis solent) & præter id quod multum vini
sæpe ingurgitasset, sæpe scanno, nequaquam lecto
incumbens, longo tempore sic pernoctasset, ut in
lecto postea vix dormire posset. Homo procerus
& aliqui robustus, circa 42. annos natus, cum
sefe otio dedisset, militiæ pertæsus, nunc æcono-
mi quasi officio functus (Galli concierge vocant)
incidit ex tussi vehementiore (cum aliquandiu
prius circa thoracem dolorem persensisset) in
enormem expectorationem cruentam, adeo copio-
sam, ut totam peluim sanguine impleuerit, cum
pure admodum male olente, ut vix aliquis in cubi-
culo apud ipsum permanere posset, ut abscessus
in pectore esse conicerem, ad eum in nocte acci-
tus; ita, ut quotidie fere peluim plenam cum san-
guine, & pure expectoraret. Cui statim lotium
medicamentum ex decocto hordei communis
cum syr. ex infus. ros. communi exhibui ad deter-
sionem puris: & iussi ut hanc ptisanam propo-
tuberet: Recipe hordei mundati p. j. glycyrrh. rasæ 3 j.
rubar. passul. enucleat. 3 j. fiat decoctio in aqua communi
pro 3 lb. & parum saccharo candi dulcoretur, semel ebul-
liendo: quo utebatur pro siti: plurimum enim si-
tiebat, & non sine febre erat. Et quia valde tussi
afficiebatur, sæpe capiebat frustum unum ex
diatrag. frig. in rhombis seu rotulis concionato,
& ex eclegmate sequenti, ut sputum non solum
cruentum & purulentum, sed & pituitosum
subinde melius expectoraret: 2. syr. de liquir.
3 i b. syr. capill. ven. 3 j. loch sani 3 ij. syr. viol. 3 b.
fiat eclegma, & sumat cum bacillo liquoris. ad libitum.
Cum autem alium non probe deponeret, & hoc
lenitium exhibi: 2. electuarij lenitissimi 3 ij. diaca-
tholici 3 ij. dissolue cum 3 iij. aquæ vngula caballina
syrupi ex infus. ros. capill. ven. an. 3 b. misc. & acce-
pit in diluculo. Postea magis febricitavit sub no-
ctem, eratque febris satis continua: & quia ro-
bustus erat, tam ob sanguinis sputum, quam ob
febrem, venam secui in brachio dextro ex
basilica vena, sanguine utcumque extracto, &
videbatur paulo melius habere. Decocto sequen-
ti utebatur: Recipe hordei mundati m. j. vngula ca-
ballina m. ij. glycyrrh. rasæ 3 ij. rubar. passul. enucleat.
3 ij. rubar. corinth. 3 b. ficum nu. 5. fiat decoctio in
aqua communi pro 3 lb. col. adde syr. iunbini. pap. viol.
an. 3 j. ad temperandam acrimoniam, misce. Et sem-
per bibebat ex sua ptisana loco potus. Et pro tussi
utebatur diatrag. frigido in tabulis, & post
aliquot dies etiam hoc eclegmate: Recipe syr. iun-
bini. 3 ij. syr. de liquir. 3 ij. syr. capill. ven. 3 b. sacch.
penid. 3 iij. diatrag. frig. 3 ij. misce, fiat linctus, su-
mar cum baculo liquoris. ad libitum: & quia
dolebat in pectore, totum thoracem inunxit
cum oleo amygdal. dulc. & longo tempore sub
noctem (ne ex acrimonia materia & ex pure
fieret vlcus canum, & ad pulmonem procederet)
utebatur amygdalato in hunc modum parato:
2. amygd. dulc. depilat. 3 ij. sem. quat. frig. maior.
an. 3 b. cum aqua soss. fiat amygdalatum pro 3 lb. j.
dulcoretur parum cum sacch. perlato. Quibus reme-
diis cum videretur euasisse, & melius habere,
post mensem subito rursus incidit in sanguinis
sputum

sputum copiosum floridum, ita ut suspicio esset
ex vena pulmonis corrosa euenisse, cum maximo
impetu, ut totam peluim impleveret. Quare coacti
fuimus astringentibus uti, & dedimus bolum ar-
menum verum bis aut ter ad 3 j. cum vino Galli-
co rubro adstringente, & utebatur continuo de-
cocto astringente in hunc modum: 2. rad. symphi-
ti 3 j. bellidis minoris, pulmonaria, vngula caballina,
portulacæ, plant. g. an. m. j. sem. acetosa, portulacæ an.
3 j. fiat decoctio in aqua communi, pro 3 lb. j. colature
adde syrupi de portulaca, myrtill. an. 3 i b. misce. con-
tinuo etiam fumebat syr. de portulaca: & portulaca
continuo in cibo suo utebatur, etiam conditis ex
conser. ros. veteri, rad. symphiti conditi, adiun-
cto bolo cum syr. de portulaca: & tandem spu-
tum sanguinis cessauit: hac etiam confectione in
tabulis frequenter utebatur: 2. specier. diatrag. frig.
3 ij. boli armeni veri 3 j. dissolutus in aqua vngula ca-
ballina, adiecto sacch. albiss. 3 i b. fiat confectio in tabu-
lis. Postea cum minus sputum cruentum exiret,
& tamen adhuc valde tussiret, subinde tenuo ca-
piebat solum ex diatrag. frig. in tabulis, etiam ex
hoc syr. longo bis ter reuerteretur: 2. vngula ca-
ball. m. ij. casium rub. pulmonaria, veronica an. m. j.
rubar. passul. enucleat. 3 j. rubar. corinth. 3 b. fiat decoctio
in aqua vngula cab. pro 3 lb. j. dulcoretur saccharo albiss.
& iterum bulliat ad consistentiam syrupi longi. Postea
rursus parum sanguinis cruenti reddebat, & ne
rediret, semper sub nocte utebatur hoc hordeato:
2. hordei mundati p. j. amygd. dulc. depilat. 3 i b. sem.
quat. frigid. maior. mundat. an. 3 b. fiat hordeatum pro
3 x. dulcoretur parum cum saccharo perlato: 2. conser-
ua borag. ros. an. 3 iij. manus Christi cum perlis 3 ij. b.
syr. iunbini, myrtilli, ana 3 ij. misce. sumat ad libi-
tum, etiam post assumptam confectionem in ta-
bulis ex diatrag. frig. cum bolo (& quia adhuc
sanguinem expectorabat) cochlear unum atque
alterum subinde fumebat ex decocto sequenti:
2. rad. consolida maioris 3 j. pyrolæ, bugulæ, vngula ca-
ball. polygoni. an. m. j. liquiritia rasæ 3 b. fiat decoctio
in ceruis. communi pro 3 ix. Interea fuit idem deco-
ctum reiteratum, & utebatur omni die ter aut
quater 3 b. conser. ros. veteris: & pectus inungebat
ac locum dolentem oleo amygd. dulc. & myrteo:
& sæpissime fumebat particulam unam rad. con-
solida maioris conditæ. Quibus intra duos mē-
ses (morti destinatus & ab omnibus pro deplo-
rato habitus) curatus fuit. Quamquam postea
post aliquot dies cum foras exisset & bene se ha-
buisset, Dordracum profectus est ad celebrandas
sili nuptias, & cum rediret, ex curru Yselmon-
dam petuenisset, fluuine traiecto, pedestri itine-
re Delphos venit, defatigatus, & iterum in san-
guinis sputum cum magno impetu hæmorrhagiæ
incidit: qui tamen, cum de eius vita alij ac ipse
desperaret, iisdem remediis supradictis conua-
luit. Et quia postea adhuc tussi afficiebatur, post
eclegmata conuenientia, ut subinde lacte ca-
pilli vteretur (ne in phthisim incideret) con-
cessi. Atque his probe curatus, etiam nunc sa-
ne viuit, dum hæc rursus recolligeremus anno
1590.

SCHOLIA.

Edandæ tussi, cui sputum sanguinis est admix-
tum, medici egregie commendant syr. myrtil.
quo & nos in hoc agro frequenter uti sumus. Va-
let etiam syrupus de portulaca in sanguinis sputo,
ita & loch de portulaca, quo frequenter præce-
pet. Forest. Tom. 2.

ptor meus Elideus Bononiæ utebatur, cum phi-
lonio persico: nam (ut memini) idem Bononiæ
ad puerum quendam vndecim annorum voca-
tus erat, qui sputo cruento laborabat: cui (me
& aliis studiosis præsentibus) ex vena hepatis
cum sanguisugis extraxit uncias tres sanguinis:
& postea eidem præscripsit, ut sæpius hoc ele-
ctuario vteretur: 2. philonii persici 3 j. loch de por-
tulaca 3 b. dedit etiam diatrag. frigidum cum bolo.
quibus remediis idem sanatus fuit. Mathæus Gradius
dat 3 iij. philonii persici una vice, Hispanus medi-
cus insignis Bononiæ dabat coralli rub. pul. 3 j.
cum aqua amoglossi. Gisbertus Horstius Præceptor
meus Romæ in nosocomio Maria Consolationis dabat
3 j. vel 3 i b. lapid. hæmatidis subtiliss. pul. cum
succo granat. vel vngula pastoris. Benedictus Fauenti-
nus Præceptor meus dabat stercoris muris pul. 3 ij. cum
aqua plantag. Hæc mirabilem effectum habent
consolidandi venam ruptam, vel quando cum
impetu sanguis erumpit. Vbi autem simul vlcus
vel abscessus adsunt, ut in hoc nostro agro præ-
cedente prius erat, opus quoque abstersione, &
ut materia ex pectore educeretur: quod etiam
exemplum sequens docebit, cum etiam ex sputo
cruento materia viscida adesse possit, vel etiam
pus, quæ & expurgari & detergeri debent, at-
que postea rursus cum impetu fluens astringi
debebat.

OBSERVATIO XXI.

De muliere sanguinem putridum, nigrum, & viscidum
ab erosione venæ thoracis exsistente.

Margareta Anna Suskenia dicta, mulier
annos triginta quatuor vix excedens, quæ
Alcmariæ in platea Homilia vocata habitabat,
Anno 1546. in fine Veris in pectoris quandam
angustiam ac dolorem collapsa est: & tandem
longo tempore sanguinem putridum, nigrum ali-
quando & pituita admixtum expectorabat,
quæ proculdubio symptomata originem habue-
re ex vena in pectore corrosa, prius etiam catar-
rho utcumque falso & corrodeute prægresso, ut
ab ipsa postmodum intellexit: verum cum ita
misere vitam traxisset sine medico, tandem cum
phthisin metueret, me accersiri iubet. Ad hanc
cum intrassem, & eandem reperissem ex hoc diu-
turno malo progresso, valde debilem esse, venam
non secui, sed leuiter omnium primo eam purga-
ui, cum cassia extracta in bolo, & loco venæ se-
ctionis altero die ad materiæ catarrhalis diuer-
sionem cucurbitulis scapulis cum scarificatione
applicari iussi, sanguine mediocriter extracto.
Præterea cum copiosa materia in pectus illapia
esset & valde tussiret, sputum sanguinis inhibere
noluimus, neque eius impetum impedire, & su-
bito restringere: sed potius nobis visum fuit uti-
le, iis uti, quæ ad expectorationem facerent, &
cum sanguis, quæ exspectabatur in pelui referua-
tus, crassus esset & niger, viscidus quoque nonni-
hil cum pituita mixtus, non tantum opus erat
mundificatione, verum etiam leui incisione obpi-
uitam: insuper & quadam leui lenitione, tum
abstersione, ut sputum commodius exiret, & simul
materia detergeretur, ne vlcus tantum ex ea oriri
posset. Quare & hunc syrupum post ventris deie-
ctionem ex cassia propinaui: 2. syr. viol. iunbini, an.
3 j. syr. de liquiritia, de hyssopo, ana 3 b. aquæ senniculi,
Q ij. hyssopi,

hyssopi, scabiosa, ana ʒij. misc. pro ij. dosibus: & quia satis ex holo alium deposuerat, & aliud postea non ita dura resisteret, purgationem aliam non exhibui: sed ut melius sputa exirent & detergerentur, rursus de hunc syrupum ebibat: syr. de liquir. ʒij. mellis ros. colati pro maiori absterfione, syr. de hyssop. ob pituitam tenaciorum, ana ʒb. aqua feniculi, borag. hyssopi, ana ʒij. misc. pro duabus vicibus. Vtebatur quoque inunctione vnguenti pectoralis, nostrae descriptionis. Erat autem in quotidiano usu apud Adrianum Dodonaeum pharmacopoeum nostrum, quod ita conficitur: Recipe olei amygd. dul. ʒiiij. butyri sine sale. ʒiiij. axungiae gallinae, olei chamemill. viol. ana ʒij. axungiae anatis, medullae crurium vituli, vel bouis ʒj. cera alba. ʒi b. hic cera alba magis conueniebat ob aliquam roborationem & astringentem quam citrina, ut paulo post dicemus) mucilag. seminis psyllij, lini seuungiaci, albicae, ana ʒi b. gummi tragacanthi; arab. ana ʒi b. conficere sic: gummi tragac. & arab. ponantur in f. q. aquae viol. postea colentur per cribrum, & addantur vnguento post concussionem & permutationem mucilaginum & usui referentur. Valerius Cordus simili quodam vitur, cuius haec est descriptio: ʒl. mucilag. sem. psyllij, tragac. gummi arab. sem. lini. seuungiaci, ana ʒj. adipsi gallinae, medullae vituli, butyri recentis loti cum aqua viol. ana ʒi b. olei viol. olei amygd. dul. ana ʒj. cera alba q. s. fiat vnguentum: mitigat dolores pectoris & tussim, digerit, maturat, faciliat sputum & resoluat pleuritidem. Loco autem vnguenti pectoralis, cum Delphis in usu non sit, vitur commodum vnguento resumptio, quod apud eos ita conficitur: ʒl. axungiae porcinae recentis ʒij. axungiae gallinae, anseris, enatis, ana ʒj. cypsi humid. ʒij. olei viol. chamemill. anethini, ana ʒj. cera alba ʒiiij. gummi trag. sem. cydon. mucil. sem. lini, albicae, ana ʒij. sem. seuungiaci, ʒij. gummi arab. ʒij. fiat vng. secundum artem. Alij duo pharmacopoei seniores relinquebant gummi arab. & mucilag. cydon. quo & nos communiter utebamur. In istis vnguentis relaxantibus, Rondeletius ponit ceram citrinam, unde plura apud eundem in sua Officina. Sed in hac muliere potius alba addi debuit. Caeterum inuncto pectore postquam & subinde holo cum diatrag. frig. vta fuisset, sanguinem minus excreabat: sed ob materiam mucosam quasi purulentam, ideo & hoc eclegma continuo lambendum dedimus: ʒl. diatrag. frig. in tabul. sacchari candi ana ʒb. loch de pino ʒvj. loch sani. ʒij. syr. de liquir. q. s. fiat eclegma; deinde continuo utebatur tam pro absterfione quam consolidatione confectu. ros. duorum annorum: valet enim egregie, uti & saccharum ros. quo solo mulierem tabidam Auicenna curauit. Quibus quidem remediis & haec mulier, cum omnes eam tabe affectam & consumptam iudicarent, etiam victus ratione prebe obseruata, quam descripsimus scholio precedente, cum multorum admiratione curata fuit.

SCHOLIA.

Quod si adhuc non est factum vlcus tunc cum catarrhus descendit, potest hic prouidentia adhiberi, sistendo catarrhum acrem, ut paulo antea diximus, vel eo modo, ut cap. de catarrho scriptum est. Quod si illa in principio fuisset peracta in hac muliere, non ita diu laborasset, & malum eo progressum non fuisset: quamvis nunc

cum maiori periculo euaserit. Nam & in catarrho & in erola vena corpus purgabimus educantibus excrementa acra, siue biliola sint, siue exusta: vel serum putrefactum, & temperabimus sanguinem, & in hoc purgatio ex sero lactis iuuat: & potus postmodum lactis, & balnea & caetera, de quibus dictum est, quae temperant acritudinem. Aliquando tamen nec in pectore, nec in pulmone est malum, sed in aspera arteria sit vlcus ex catarrho, quod sane insanabile non est. Cur autem potius hac parte sanetur, causa est, ut similiter annotauit Iacchius, primum quod medicamenta facile applicantur, tum extrinsecus vlcus siccantia, tum intrinsecus, sensim delapsa: & sunt ea, quae addimus ad cruenta sananda, tum emplastica, tum linctus, ut consolidare maioris radix, & portulaca, & terra lemnia: si sordidum, extergente & siccante est opus. Secundo, quoniam pars natura sicca est, ideo leuiter putredinem suscipit. Situs quoque facit lubricus, ut non facile ibi figantur acres humores. Hinc Galenus recitat multos sanatos libr. 5. method. med. sed praecipue eos, qui ex febre pessilenti in hoc inciderant mali, quod erant sicca vlcera & scabiei similia, unde exigua ope sanabantur. Haec autem est vlcus curatio. Quod vero talia essent vlcera, ex sputo monstrabatur, quo crustulae educantur. Maxime vero ad horum sanationem facit, quod sane euenit iis, qui sunt corpore adhuc acris & erodentis, cum siccantibus & temperantibus sanguinem. Sed hos securitatis gratia, ad Tabias & lactis usum demittebat Galenus, ut loco citato ad longum videre poteris. Videtur autem collem talem describere, qualis ille est apud Iacchium in sua patria, S. Iuliani dictus, aprius, non procul a mari, & herbis siccissimis confusus, unde lac idoneum. Dicit autem Galenus Tabias in imo maxime sinu esse, qui inter Surrentem & Neapolim conspicitur: magis tamen in latere, quod ad Surrentem pertinet. Reliqua vnde apud Galenum loco citato. Sic enim Galenus omnes, qui primo die se illi curandos permiserunt, sanauit: qui vero post duos aut tres, non omnes curauit: sed aliquibus eorum insanabile vlcus fuit. Quotquot autem phlegmone sic occupauit, ut iam febricitarent, horum nullus est in totum persanatus. Sed qui postea sic per omnia praesidia rite transierunt, vi sicaretur vlcus, ij tantum saltem lucri fecerunt, ut illud nec ultra progrediretur, nec maius fieret, sed siccatum, ac callo duratum, longiore vita frui hominem sineret. Sed illi, qui vlcus in pulmone habebant, insanabiles eidem videbantur.

OBSERVATIO XXII.

De sanguinis sputo per periodos recurrente.

Vt quidam annos quadraginta, vel paulo minus habens, bona constitutione, minime febricitans, conquirebatur, se iam ter sanguinis sputo vero instante laborasse, absque tamen pectoris dolore, cum tussi exigua. Quam rogauit nunquid sanguis de naribus fluere soleret, vel nunquid aliquando haemorrhoidum fluxione laborasset. Quod cum didicissem & ab eo intellexissem, cum nunc sputo laboraret, quando me accedebat, illico sanguinem extrahere iussi ex brachij vena interna, & bene habuit. Venit mihi tunc in mentem

mentem similis casus apud Amatum cent. 2. curat. 13. descriptus de Angelo de Prato singularis doctrinae viro: qui haemorrhoides solitus erat habere, & copiosum sanguinem emittere: qui sanguis per remedia adhibita ex toto cohibitus fuit. Vnde veris statuto tempore sanguinis reiectio illi superueniebat, cui post venam internam brachij sectam, cum bene haberet, deinde imperavi, ut singulis sequentibus annis antequam morbus ipsum inuaderet, venis haemorrhoidibus diuersis hirudines admoueret, sanguinemque traherent quoad deciderent: qua sane diuersa euacuatione, homo absque sanguinis ex pectore reiectione, sanus & incolumis perseverabat. Idem quoque consului, ut noster aeger faceret.

SCHOLIA.

Erat haec anastomosis, quam euenire diximus, ubi solum sanguis, & ita rucens in venas, & replens tandem minores, ora aperit, vel natura proritata, sicut profluvia mensium euenire solent: quibus in mulieribus cessantibus, ut ait Hippocrates, mala euenire solent: ita & haemorrhoidibus constrictis his euenit, & ita haec anastomosis simili ratione contingit, quod nos pluries vidimus. Curatio eadem est, qua vitur in sanguinis profluiis aliis. Primum igitur reuulsio valida uti licet, non adeo leui, ut in rupta. Sed si a multitudine fusio facta sit, vitur ad remota valde. Fit autem reuulsio non modo, ne multus nimium vacuetur sanguis, sed & quia per regionem conuenientem non fertur: ideo tametsi vacuatione est opus, at ea tamen non facienda est via, sed alia vitur. Vitur etiam aliis reuulsio, quae dicta sunt. De hinc & apertioni medebimur, hoc autem fiet adstringentibus tum ebibitis, tum foris apposis, & sunt ea omnia, de quibus supra mentio facta est. Hic & diapedesis curatur: poterit & aeger simili modo purgari, ut de erosione dictum est, interea sanguis magis retinendus & glutinantibus & obstruentibus, quam obtundentibus acrimoniam. Solet enim hoc fieri vel ob venae raritatem, ut diximus, vel ob sanguinis tenuitatem, & ob id laudantur alimentia, quae emplasticam vim habent, & obstruentem, ut polenta cum lacte, & omnia, quae ex lacte & farina parantur.

OBSERVATIO XXIII.

De sanguinis sputo ex ore & gingivis profluente.

Sanguinem ex ore & gingivis simpliciter spuitione diximus posse expelli, quod & sensus diiudicat, cuius exemplum posuimus obs. 17. lib. 14. Ita etiam mulier maniaca, quae Delphis in agere nouo habitabat, anno 1565. cum epulidas nigras tumidasque ac plumbeas haberet, ex ore, gingivis & palato sanguis continuo emanabat. Chirurgus carcinomate affici, & noli me tangere, affirmabat. At nos hac infra scripta cum adhibuissimus remedia, mulier maniaca & melancholica curata fuit: Recipe, stor. borag. summitatum lupul. cochlear. bekabungae, nasturij aquatici summaria, an. m. j. sem. anisi ʒi b. rad. ferni. petros. ci. borag. an. ʒi. ghyrr. rasae ʒb. folior. senae ʒj. epibymis ʒb. polypod. querc. ʒvj. rhaz. passul. enucleat. ʒb. coquantur in aqua communi pro ʒb. j. sicut infusa per nectem, & colat. adde syr. de epibymis ʒij. syr. de Pet. Forest. Tom. 2.

sumotera. ʒj. misc. pro ij. dosibus matutinis, quibus quotidie ad minus sexies valde melancholica & copiosa excrementa deiecit: Recipe, plantaginis, equiseti, bistortae, bekabungae, ana m. j. stor. ros. rub. cochlearia, ana m. b. coquantur in aqua servata pro ʒb. i b. aluminis, ʒiii b. semel ebulliant & iterum colentur, addendo mellis ros. colati ʒii b. syr. sceleribici nostri ʒj. misc. quo gingivae fortiter abluantur, ut sanguis corruptus egregie defluat. Demum hoc linimento gingivis sanguifluis inunctis non amplius sanguis effluxit: Recipe, Succu bekabungae (alij capraem vocant) ʒij. succu cochleariae (alij telephium esse putant) ʒj. succu sumariae ʒb. balanst. ros. rub. exsiccatum & pulverisatum, an. ʒb. pul. salinae siccae ʒj. aluminis ʒssij. mellis q. s. fiat linimentum.

SCHOLIA.

Vanquam haec ad Scutbutum malum pertinet, de quo suo loco dicemus, si idem Curatio malum fiat absque scutbutto, exiguum est: nam cruenti sputo ex gingivis sanguis exit vel spuitio cruenta sequatur, portulacam manducasse (Celsus auctore) satis est, vel os ad gingivas colluemus cum stipticis acerbis & gingivas roborantibus, ut decocto plantag. ros. gallar. portul. balauft. ex gargariis, vel ex iis linimenta parata adhibebimus. Si ex ore sanguis fluat, proderit continuo co merum vinum, si id parum proficit, acetum, quo & lingua secta, si sanguinem nimium profundat, iuuat, adiecta aqua. Celsus, si impetuoze ab ore profluat, cucurbitulam occipitio admovent: si id mulieri euenit, incisus inguibus admouenda. Conueniunt & collutiones ex astringentibus cum vino rubro. Alij sanguinem etiam mittunt hoc vena humerali, alioqui in talo in mulieribus si menstrua non ferantur. Si vero ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur aut per palatum, gargarizare iisdem oportet, & astringentia fronti & capiti admo-
nere, & ea quae ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur, Paulo teste. Et si sanguis ex gutture fluat, saepe ad rem fecit sola portulaca manducata, profluit & gargarismata constringentia, de quibus satis dictum est, cum de malis gutturis loqueremur, cum & de sanguifuga gutturi inhaerente diximus. Si a capite sanguis feratur, multusque sit, qui defertur, euacuatione opus erit, ex Aetij sententia, vel per nares vel vena secta, deriuando ad propinqua, aut ad longinquas partes diuertendo: frontem quoque accipitio, ex Caelij Aureliani sententia, apponemus. Et licet nihil periculi adferat, si tamen vires deiecit, cephalica incidenda, & gargarismis astringentibus vtendum, & cibus stipticis & vino rubro. Si autem defluat a capite ad pulmonem, curabimus, ut prius dictum est de spuitione cruenta ob destillationem.

OBSERVATIO XXIV.

De vomitu sanguinis.

Sanguinem à iecinore aut liene quandoque sper ventriculum vomitione reieci, testatur Galenus lib. 5. cap. 5. A quocunque autem viscere, siue à quacunque parte in ventriculum influat, semper cum molestia, violentia, magna virium

prostratione, ac *remissio* euacuatur: frequenter enim in ipsa vomitione, ægri deficiunt, veluti Guilhelmo Iohanni Prætori Alcmariano, aunculo vxoris meæ, contigit, qui cum vina calidissima in secundis nuptiis filij sui largius bibisset Anno 1574. ipso D. Augustini Festo subito sublatu est, cum ingenti impetu sanguinis, nescio quot heminas infra & supra deiecerit. Nos autem cum Oudtgero Medico seniore Amstelrodamenfi ad eum ingressi, venam cauam ex multitudine vini acris ruptam esse existimauimus, cum tantum sanguinis profudisset, vt & integram situlam repleuisset. Facile quoque deficiant ægri, præsertim si ex iecinore efferatur: veluti etiam accidit cuidam M. Guilhelmo Brasserio Theologiae Licentiato Delphenfi, cui sanguis ab hepate ad ventriculum deferbatur, & ex eo demum vomitu expellebatur. Huic enim dextrum hypochondrium dolebat, & tumor aderat, sanguinemque modogrumosum, modo purum euomebat. Hic bis à me curatus fuit, cum plus quam tres heminas sanguinis tam supra quam infra deiecerit. Hic autem vino admodum calido & potenti delectabatur, cui valde indulgebat, quamuis per me admonitus, vt ab eiusmodi vinis abstineret. Cæterum his admonitionibus postpositis, apud amicos cum largius iis vteretur, tandem in idem malum cum tertia vice prolapsus esset, & per superna ac inferna sanguinem adeo copiose profudisset (non aliter quam bos iugulatus sanguinem effundit) & cum magno impetu indefinenter euomisset, mox è vita sublatu est.

Ioannes Bekellus Delphenfis vino repletus cum ex mensa saltasset, incidit in vomitum sanguinis enormem, vt plusquam sex vel plures heminas sanguinis euomeret, adeo vt pro mortuo haberetur: fuit hic tamen per me curatus, quamquam postea ex nimio illo sanguinis vomitu, cumque sanguinem copiose simul per anum excreuisset cum magno impetu, hepar debilitatum fuit, neque bonam victus rationem obseruans post vnum atque alterum mensum cepit venter intumescere, neque tunc mea opera, nec aptis remedijs vtens, tandem ad hydropem deuenit, & Medicum quandam Paracelsicum ad se vocauit, qui ei sanitatem pollicebatur, varijs & multis præfidijs vtens, iisque vehementissimis, in dies in peius vergebat, & venter quotidie in maximam molem increuit, vt iam ascite confirmata laboraret, viribus paulatim absumptis, tandem post sex menses alium Medicum adhibuit: cum nec ille aliquid proficeret, me tunc in consilium vocarunt: etiam alio Chirurgo præfente, qui vna cum Medico altero paracentesin proponebant, qua & salutem ægro promittebant, quam ego tamen admittere nolui, certis rationibus adductus, cum vires iam prostratae essent, & cum sanguis prius copiose & sine mensura effusus esset, vnde postea ascites, & nunc vires deiecit, vt æger ex lecto se mouere non posset, quin animo deficeret, validis medicamentis prægressus: & ideo nequaquam paracentesin fieri debere, nec tantam tyrannidem sufferre posse dixi; & si fieret in homine in partibus superioribus iam macie consumpto, facie nigra, temporibus collapsis, quod intra 24. horas mortem subiret. Itaque cum paracentesin, nequaquam admittere vellem, me reliquerunt. Interca tamen abstinent ad tempus à paracentesi: quam postea apud ægrum vrgentes perfecerunt; sed cum vtriusque ignominia, adeo, vt cum aqua profusa altero

die æger exspirauerit, ita, vt prædictionem meam veram fuisse, pro dolor: parentes ferius experti fuerunt. Qui vero à vomitione sanguinis in ascitem prolabantur, ex eadem pereunt. Ab hac autem neminem, etiam si sanguis ex liene fundatur, Dodonæus quoque seruatum nouit: cum idem referat mulierem quandam post frequentes vomitiones in ascitem incidisse, quæ licet sanitati restituta videbatur, & ab aquoso humore liberata; pauld tamen post, denuo sanguinis vomitione superueniente, extincta est. Ita & alius quidam vir ex frequenti vomitu sanguinis asciticus factus fuerat: per prominentem umbilicum laneo filo siue licio transmissio; aquosus humor sensim affluerat, sed nihilominus non multo post mortuus est. Quibus verò ex liene sanguis funditur, raro in prima vomitione deficiunt, sed vel recurrente subinde sæpius vomitione, pereunt, veluti cuidam accidit, cum tertia vice, vomitione sanguinis ex liene vt cumque copiosa, laborasset, & hic quoque obiit. Qui cum vino Hispanico libenter vteretur, admonui illum, vt ab eo abstineret, alioqui cum, cum bis atque ter à vomitione curatus esset, ea redeunte, moriturum: quemadmodum eidem, non obtemperanti nostris monitis, contigit. Verum Andreas Monachus in Abbacia Egmondensi, Anno 1550. mense Augusto, iuuenis annos viginti tres natus, in vomitum enormem sanguinis cum incidisset, plus quam tres integras matulas sanguine purissimo repletas vomuit. Quod eundem multi mecum & famulus Pharmacopœi Alemarianus viderunt. Cum aluum non redderet, ad diuersionem glâe indita aluum deposuit: & quum debilis esset, sanguinis vomitione violenta exstente, ita vt nulla sanguinis detrahendi (quod nonnulli præcipiunt) occasio reliqua esset, diuersiones, veluti brachiorum ac crurum frictiones, adhibuimus, & vnice laborauimus, vt vires conseruarentur & lapsæ repararentur: nam tales (vt iam diximus) creberrime in ipsa vomitione, & citissime deficiunt. Et hunc syrupum exhibuit. *℞. syr. ex ros. siccis: de end. an. 3 j. syr. de cicor. cum rhubar. (ne in grumum sanguis conuerteretur) syr. de portulaca, an. 3 ss. aquar. end. portul. plantag. an. 3 ij. misc. pro ij. dosib.* Cum autem plurimum sciret, capiebat ex syr. de ribes, & rob. de ribes, & syr. viol. Postea verò, cum & sanguinem concretum euomeret, & plurimum augetetur nolimus subito sanguinem astringere: ideo aquam decoctæ hordei communis dedimus cum syr. ex insul. ros. communi pro absterfio medicamento. Sed paucis horis interiectis, cum iterum copiose sanguinem euomeret, hanc potionem ebibit: *℞. syr. ex ros. siccis, syr. cydon. an. 3 j. melle ros. colati 3 ss. aquar. plantag. scabiosæ, vngula caball. an. 3 ij. misc. pro ij. dosibus.* & pro paulatina restrictione ex hoc condito utebatur: *℞. conseru. ros. antiqua 3 j. conser. bugloss. capill. vner. an. 3 ss. pul. specier. trionf. 3 ss. trochisc. de carabe 3 j. cum syr. myrtis, ex ros. siccis. q. s. pro condito.* Quibus cum sanguis nondum restringeretur, & rursus integram matulam euomeret, & animo fere deficeret, quasi iam moriturus, vltima inunctione munitus, vt hinc emigraturus, attamen hanc potionem infra scriptam dedit: *℞. mumia 3 j. succi equiseti 3 j. aquæ plantag. equiseti, an. 3 ss. totum frigide cum ebibisset, sanguis restrictus est, neque amplius vomuit: ventriculo quoque exterius inuncto cum oleo myrteo & cydon. alio deinde ad quatuor dies adstricta remanente. Et cum debilis esset, neque ex-*

lecto moueri posset, medicamentum aluum mouens aut leniens per os dare minime ausi fui, ne vomitus sanguinolentus denuo rediret, quare in lecto clystere, ter quaterque aluum deposuit, in hunc modum parato: *℞. iuris galli decrepiti, lb j. cassia mundata 3 j. olei amygdal. dulc. viol. an. 3 ss. salis 3 j. misc. pro clystere:* quo ter quaterque excrementa prius dura, mox mollia deposuit, cum maxima alleviatione, virtute roborata, vomitu non amplius subsequente. Cæterum cum parum tussiret, & minus dormiret, ne iterum in vomitum incidere, eclegma sequens ad libitum sumpsit: *℞. Symp. myrtis 3 ss. (sedat tussim & vomitum compefcit) syr. pap. syr. iunubini, an. 3 ss. melleag. cydon. extractæ cum aqua vngula caball. 3 ij. syr. viol. de liquir. ana 3 ij. diatrag. frigid. in tabul. sacch. pend. an. 3 ss. probe mixtis: fiat loch.* Interea in ore subinde tenebat modo sacch. candum, modo diatrag. frig. in tabulis, eaque paulatim deglutiebat. Pro somno inducendo tempora illinebat oleo pap. mandrag. granis tribus opij adiectis: & eclegma sequens sub noctem sumpsit: *℞. Succ. syr. peniph. albi depurati, syr. pap. an. 3 ss. misc.* Quibus remedijs tussis cessauit: neque vomitus rediit, fuitque miraculi instar curatus. Quamuis post duos annos paneraticæ viuens, vt mihi postea relatum est, ex catarrho acri ad tabem tandem deuenit, & cum frustra à Gallo Medico (nam ad eum illo tempore non accitus fui) sanaretur, phthisi obiit.

At vxor Iacobi Schot mercatoris Delphenfis, cum febre satis continua laboraret, & dolorem in hypochondrio dextro sentiret, sanguinem tandem euomit, modo concretum, modo magis purum, & per inferiora sanguinem quoque deieciebat, mulier valde obesa. Ad hanc vna cum Bosennio doctissimo collega meo mense Decemb. Anno 1584. accitus, cum satis robusta esset, illico venam in brachio dextro ad diuersionem, & etiam ad febrem secari vna iussimus, medicocriter sanguine extracto, & satis contulit. Hypochondrio dextro ceratum admonimus ex vnguento santalino, cui pauillum olei chamæmil. ros. & anethini: ob dolorem, admixtum esset; pauca cera alba, & exigua resina adiecta, vt melius adhæreret. Et cum postea ex sanguinis reiectione valde debilis esset, sumebat ex his tabulis bis in die 3 ss. vel ter. *℞. specier. diatrag. abb. 3 ss. spec. trionf. 3 j. spec. diatrag. frig. 3 ss. dissol. in aqua boragin. & portul. adiecta sacch. albiss. 3 ss. fiat confectio in tabulis.* Postea & hypochondrio dextro solum ceratum santalinum apponebatur: & hoc condito (redeunte subinde vomitu, & cum per inferiora sanguinem excreneret) utebatur: *℞. Conseru. ros. antiqua 3 j. diatrag. sine specieb. 3 ij. specierum trionfant. 3 j. spodi 3 j. marg. subtilissime tritatum 3 ss. syr. cydon. q. s. fiat conditum:* utebatur pullo cocto portulaca adiecta, & nodulo ex rhu obsoniorum iniecto: iis potissimum sumebat, vel eiusdem colaticum. Cum circa stomachum etiam doleret, hanc mixturam capiebat, quæ & hepati conueniebat: *℞. conserua absinthij Romani 3 j. conser. solior. acetosæ 3 ss. specier. diatrag. abb. specier. trionf. an. 3 j. fiat mixtura.* Similiter & hac postea capiebat: *℞. conser. sol. acetosæ, conf. absinthij Rem. an. 3 ss. conser. bor. ros. an. 3 ij. spec. diatrag. abb. arom. ros. sine musco. specier. trionf. an. 3 ss. fiat mixtura.* Et febris eam relinquebat: & vomitus desijt, tamen subinde tunc sumebat ex syrupo methægo, & quia hæc valde obesa esset, ne in hy-

dropem incederet, ad hepatis roborationem & eiusdem deobstructionem fori quoque vsi sumus, in hunc modum parato: *℞. mentha, flor. ros. rub. an. m. j. absinthij Romani p. j. sem. myrtill. 3 j. coquantur in aqua communis & vino rub. pro lb j. post colaturam addendo acetos. 3 ij. misc.* sumebat & ad roborationem ventriculi syr. menthaceum & byzantinum, duo cochlearia bis in die. Et cum postea adhuc dolore ventriculi afficeretur, & toto ventre, cum lubrica aluum haberet, ad roborationem ventriculi: *℞. vnguenti stomach. 3 ss. olei cydon. ros. an. 3 ij. postea & huic linimento guttas 3. olei Caryoph. & olei cort. limonis, ad meliorem odorem odorem adieciimus.* Cum circiter mensem decubisset, cum multorum admiratione sanitati fuit restituta Ob debilem stomachum ceratum vltimo ex sola maltice vtriusque nostrum consilio ventriculo impositum fuit.

S C H O L I A.

12

Vomitus sanguinis ab hepate.

BRasserio ac Ioanni Bokello, ac mulieri vomitus sanguinis, & per inferiora eiusdem deiectionis, procul dubio ab ipso hepate originem habere: nam in dextra parte (vbi hepar situm est) aderat dolor & tumor, cum & sanguis ipse grumulosus subinde existeret, atque in ventrem, seu ventriculum deferretur, cum etiã copiose & cum impetu expelleretur: sanguis n. li. è stomacho educatur, præterquam quod vomitione expernitur, non magna est sanguinis eruptio: graciles etenim sunt stomachi venæ, vt inquit Aëtius: & cum nausea quoque sanguis effertur, ac in deglutendo mordacitas percipitur, maxime si astringentia aut acria deglutiantur, vt antea dictum est, & sanguis quoque aliquando cum cibo, modò etiã cum pituita aut bile permixtus, effertur. Hoc modo Theod. Forestus frater meus (cuius mentionem quoque fecimus in lib. Obs. de febr.) sanguinem cum cibo & pituita, sed in exigua quantitate euomebat, hic & melancholia hypochondriaca multis annis laborans, à me curatus fuit. Alius sanguinem ex liene, in ventriculum delatum euomebat, grumulosum & magis nigrum, qualis à splene in ventrem fertur. Scribit Dodonæus, se multos cognouisse sanguinem vomitione ex liene reiicientes: qui pallentes fuere, & in quibus sæpenuero sinistro hypochondrio tumidus splen manifeste (vt in illo qui sanguinem copiose ex liene euomebat) sentiebatur, sed ante vomitionem: nam ex vomitione, exonerato iam splene, subsederat tumor, nec deprehendi poterat. Plerique horum tertia aut quarta vomitione, vel etiam frequentiore (multis inter singulas mensibus, vt plurimum intermedijs) petierunt: sic & æger ille, de quo in obs. præcedente dictum est, post tertiam vomitionem, alij post crebras vomitiones in ascitem lapsi, tandem & mortui sunt. Refert a. idem Dodonæus vnum aut alterum suo consilio post vnicam vomitionem seruatum, & quidem frequenti absinthij quoquo modo vsu, vt in suis Stirpium historiis cap. de absinthio scripsit. Verum Bokellus noster ex copioso vomitu sanguinis asciticus factus, neque paracentesis vilo modo profuit, cum statim post eandem peractam obierit: ita neque in viro illo, de quo meminuit Dodonæus, qui à frequenti vomitu sanguinis ascitem incurerat, per prominentem umbilicum laneo filo transmissio, licet aquosus humor sensim efflaxisset, quicquam profuit, cum &

13 Ex liene.

14

Quij postea

postea mortuus fuerit: illius enim lien sanguini concreto similis, substantiæ soliditatem haud retinens, facile in partes soluebatur: quandoque siquidem, cum venter amplius distendi nequit, umbilicus foras irumpit, & in tumorem attollitur, aquoso distentus ac repletus humore, quod *δρόμη* Graeci *δρόμη* appellant: & tunc quidem per hunc lanco filo transmissio, vel etiam eodem scapello aperto, humor effluit, nullo subsequente fructu alio, quam quod æger à distentione ventris pauco tempore liberetur. Prius enim quam umbilicus erumpat, iam interna viscera corrupta ac putrida sunt; proinde sanitas nec expectari, nec sperari potest, multo minus in nostro Bozalio paracentesis auxilio esse potuit, non solum hepate corrupto, sed viribus ad extremum collapsis: quare etiam statim ab effusione aquæ intra 24. horas: ut prædixeramus, obiit. Nam ut Hipp. prorrh. lib. 2. Eum, qui ab hydropse, siue aqua inter cutem coarctatus est, & superfluit esse valet, vobis visceribus præditum esse oportet. Præterea vt omnes Medici sentiunt, in talibus (multo minus in iis qui vires prostratas habent) utilis esse potest paracentesis: imo adeo periculosa est, vt mox mortem inferat, vt huic nostro ægro contigit, vt prius prædixeramus; ex quo prognostico nos honorem habuimus, alij vero infamiam. Qui a sanguinem ex iccinore reiciunt, raro euadunt, & ij multo minus, qui vino largiore, eo-que potenti vtuntur; vt iam exemplis constat; à splene quoque raro liberantur. Ita & Hadrianus Schoonhouerus Delphensis hypodidascalus: cum sanguinem grumotum & nigrum per intervalla euomisset, postea in tabem incidit, à qua euadere non potuit: quem & collega meus Cornelius Heydius curabat. Quicumque sanguinem copiose vomunt, etiam tussiendo, & largiore vini potu, raro curantur. Sic miles quidam, iuuenis annos natus 29. cum integras noctes diesque more militum vino calidior se impleuisset, & frequenti coitu supra modum se fatigasset, vena in pectore ei rupta est, adeo vt tussis integram conchiam seu peluim tonsoriam sanguine quem vomebat, repleuerit: & simul in febrem continuam inciderit ac delirium: ita vt nulla remedia quantumvis apta adhibita iuuare potuerint: vnde non diu post mors subsequuta est, delirio eodem ad finem adherente. Cæterum, quod ad curationem attinet, venæ sectionem ad diuersionem in exigua quantitate, vel etiam repetitam valere diximus; his quidem vena incidenda est (modo vires ferant, vt in muliere fecimus) in cubito statim basilica dicta, si ex hepate in ventrem deferratur. Si à splene, incidenda erit vena, quæ inter paruum & annularem digitum in sinistra manu est: sic namque probe & proprie auxiliaberis. Ite pati vero quidam etiam ventosam succam imponunt ad sanguinis retractionem: sed in corpore plethorico non facile adhibenda; & præstat vincula partibus extremis iniicere. Primo ad inferiora, postea ad superiora, deinde ad styptica & adstringentia veniendum, de quibus satis dictum est, & prout vas magnum ruptum est, eo magis adstringentis vtendum: etiam topica adstringentia membris ipsis adhibenda, tamen cum cautione, non ante diuersionem. Si ex stomacho sanguis feratur: venæ sectio quoque ad diuersionem iuuare potest, tum alia iam sæpius dicta. Interea considerandum, numquid sanguis in grunum concreuerat, & pessima accidentia inferat. Etenim

non solum in ventriculo, sed etiam in pectoris cavo vel pulmone si conglobetur, statim periculosa symptomata apparent; extrema frigore corripuntur, venarum pulsus interceptiuntur, antelitus creber fit, anima exitaliter deficit, mirumque quod humorum naturæ familiarissimus tam subito effusus speciem veneni gerat, tunc illico dissolvens erit sanguis in grunum congelatus, iisdem remediis, quæ scholio obs. 15. huius libri recensuimus.

OBSERVATIO XXV.

De mensura purgatione vomitu prædicta.

Monacha iuuenula 25. annum agens apud M.D. Virulam Delphis, certis mensium temporibus, vomitu menstruum sanguinem per superiora reiciebat. Adeam cum accitus essem, virib. deiectis erat, circa lumbos valde dolebat, ac pectus intumuit, adeo vt vrina in totum fuerit suppressa: aderat & dolor intentissimus in reno sinistro, ita vt astantes de futuro abscessu metuerent. Cum a. per plures dies aluum non deieceret, & sanguinem euomisset, ad diuersionem & etiam deriuationem ex rene, clysterem iniicere iubeo. Recipe iuris pulis decocti, cui pruna, rubea passæ. & seminis anisi exiguum incocta erant, ita i. castia mundata pro clysteribus 3 j. olei olinarum, amygdul. chamamill. an. 3 j. salis communis 3 j. salis gemma 3 b. vitellum vniui oui, misce pro clysteri. Quo aluus non solum soluta est, sed facta diuersione vomitus pro eo tempore cessauit, & menses ex vtero more solito fluxere: atque hoc vnico remedio præter spem conualuit. Interea; cum antea singulis mensibus vomitio hæc sanguinolenta reddere solet, ne fieret recidua, consului: vt non uilunio instante, antequam vomitio contingeret, venam in talo, seu sapenam dictam incidere iuberet, sanguine utrumque extracto. Verum nescio quia ignauia illud ipsum sit prætermisum: ita vt post menscm idem vitium recurreret, adeo vt non solum sanguinem menstruum euomere, & rum etiam cibum nullum continere posset, & quod prius fuit, vrina in totum fuit rursus suppressa, ac aluus adeo restricta, vt per octo dies nihil exereuerit. Eo autem tempore eram vocatus ad ægrum leydis decumbentem, atque hæc ipsa aliarum monacharum persuasione, vt opinor, medicum Empiricum & tonsorem ad se vocauit: is diaphenicon per os exhibet, sed cum aluus eo medicamento non solueretur, sororcola pharmacopœum accedunt, qui & clysterem prius à me descriptum iniicit, sed eundem per superiora & os reiecit. Transactis deinde duobus diebus me reuersum accersiti iubent: cumque ad illam ingressus essem, & intellexissem vndecimum diē prægressū, quo aluū non deposuerat, statim balano indito eam frustra irritabam; quare de secundo enema iniicendo admonui. Hic mater Monacharum ab empirico edocta clysterem admittente noluit, nam si eo vtretur, eam morituram prædixerat. Cui respondi: nisi illud fiat, vere morietur, cum iam 12. dies essent quod aluum non deposuisset, neque vlla medicamenta per os, neque cibum retinere posset. Quare firmebam me discessurum, cum apta remedia adhibere non possem. Quibus dictis, mater cœnobij admisit, & enema sequens iniectum est. Recipe decocti, supra scripta, in qua bullierint parietariae,

folior. malua, florum chamamill. meliloti. an. m. 3. lb. j. Castia mundata pro clysteribus 3 j. B. zacchar. an. 3. lb. j. olei chamamill. amygdul. an. 3 j. olei anethi olinarum an. 3 j. salis gemma 3 j. salis communis 3 j. vitellum vniui oui, misce pro enemate. Quo probe aluum deposuit, primo stercore duro reiecto, mox excrementis mollioribus subsequenter: & rursus cessauit vomitus, ac aperti sunt menses, & egregie cum nostro honore conualuit: & ex nostro consilio, periodo mensium instante, vena talo cum secta fuisset, postea nunquam hoc sedulo laborauit. Et nunc cum libertas religionis accessisset, viro nupta multas proles peperit, & adhuc superstes est, & bene valet, dum hæc recolligerem, anno 1591.

SCHOLIA.

Cum hanc Monacham curarem, in mentem mihi venit historia illa Beniueni de muliere menses vomitione rejiciente, quam lib. De abditis morborum causis cap. 41. in hunc modum recenset: Vrgebatur mulier acerbissimo capitis dolore, propterea quod menses non prouenerent; verum his demum vomitione propulsis, illico sublatus est dolor. Sed cum id iterum iterumque accessisset, abhorrens tandem mulier ab huiusmodi vitio, auxilium nostrum exposcit, qui sola sanguinis missione ex vena, quæ sub talo est, & menstrua ipsa ex naturali loco rite profluere coëgit, & quod sequens est, mulierem ipsam pristina sanitati restitui. Memorat & Dodonæus de quadam virgine in hunc modum. Ab vtero autem suppressis mensibus raro item sanguinis vomitio superuenit. Virgini vero cuidam mihi obseruatum, quæ in ipsa vomitione grauiter laborauit: postea vero idoneis adhibitis remediis, & sanguine ex interiore vena prope talum detracto, cum menstrua purgatio successisset, bene habuit, quod apho. 34. test. Hipp. docet. Mulieri sanguinem euomenti, menstruis erumpentibus solutio. Idem affirmat Ioan. Langius epist. 40. lib. 1. Interea mulieres & virgines, quibus suppressi menses, minus à sanguinis vomitione periclitantur, quam viri, quibus à icore aut liene effertur; neque enim viscera harum corrupta sunt, vt exemplis superioribus demonstrauimus, & superueniens menstrua purgatio, ab omni periculo eas vindicat. Attamen ubicunque viderimus mulierem sputo sanguinis laborare, non tamen statim inferemus (vt nuper quidam Empiricus faciebat) ab vtero efferri, quemadmodum contigit Alemaria mulieri cuidam, quæ puerpera existens, post tres septimanas à partu dolore ingenti in pectore afflicta, bat circa latus sinistrum, & sputum cruentum per tres quatuorve septimanas valida tussi eiciebat. Medicus qui eam prius tractabat, ex vtero venire dicebat; quamvis ille, cum ea à partu bene purgata esset, originem morbi non intellexerit. Vnde cum semper in peius vergeret, vt eo tempore agerem in Schaga oppido apud Dominum de Schagen ex hydropse decumbentem, me reuocatum vocarunt, aderat huic & febris lenta: & cum mulier antea valde crassa & obesa, nunc ob dolorem gracilis euasisset, & in partu bene purgata, cum sanguis nigrior esset, conieci ex pectoris vena rupta euenisse, cum & secreto mihi relatum erat, tandem cecidisse, & percussione à viro passam, quod ob honorem subticuerat. Cum autem dolor lateris ingens esset: & valde debilis esset puerpera, & sanguinis detractionem abhor-

reret, & iam tempus mali etiam progressum esset à venæ sectione abstinuimus: sed foris sequente vi sumus. Recipe florum meliloti, florum chamamill. an. p. j. sem. malua, lini ana 3 j. B. sem. anethi, fenugr. an. 3 b. coquantur in aqua communi, & fiat foris: & deinde inungebatur locus dolens infra scripto linimento Recipe vnguenti nostri pectoralis 3 j. olei amygdul. chamamill. ana 3. lb. misce. quo dolor sedatus est. Et deinde optime dormiuit, quod ante plures dies noctesque minime poterat, & cruentum sputum minui cepit, & melius expectorabat, & respiratio facta est liberior, dedimus etiam statim 3 j. castia in bolo, etiam exhibuimus mumia spermatis ceti, an. 3 j. rubia rinf. 3 b. cum ceruicia, & post duos dies cessauit sputum cruentum, quamvis cum post vnum atque alterum diem rursus rediret, cum sputo pituoso admixto, decoxit flores chamamill., & nepitam in ceruicia communi, in qua nodulus rubia tinctorum, & mumia ana 3 b. pendebat, quam bibebat bis in die: quibus egregie curata fuit: paucis postea sumptis expectorantibus, ob pituitam paulo viscidam, quam in fine expectorabat. Et ita cum tribus fere septimanis ab alio medico perperam curaretur, intra paucissimos dies à me sanata est. Tota itaque curatione cruentæ spuitionis absoluta, nunc ad huius finitimos affectus accedamus, quietiam per modum resudationis sanguinis sputi, & cruentam spuitionem terminantur: vt est pleuritis, & peripneumonia, de quibus deinceps agemus.

OBSERVATIO XXVI.

De pleuritide.

Cornelius nanium confector, vt fortis & robustus, annos natus fere 36. mali regiminis, qui & subinde potabat, mense Aprili, cum paulo intentius naues reparasset anno 1546. in pleuritidem lapsus est; ad quem 4. die prius accitus fui: costas superiores multum dolebat, dolore quidem pungente & acuto, cum quo multum tussiebat, & sputum sanguineum emittebat, continuo vero febricitabat, & vt paucis referam, omnia patiebatur, quæ in graui comperiuntur pleuritide. Quæ cum animaduertissem, cum eodem die aluum ex se deposuisset, illico venam basilicam eiusdem lateris, vbi dolor erat, secare feci, sanguinisque vncias octo extrahere, in homine sanguineo, qui procul dubio putridus, & omni corruptione affectus erat, ac ex phlegmone defluxerat, à qua sanguinis missione dolor non nihil euauit, qui tamen sub noctem ex parte redibat: sed foris sequenti plurimum mitigatus est, loco affecto simul inuncto 2 l. florum chamamill. meliloti, malua, an. m. j. sem. fenugr. 3. lb. fiat decoct. in aqua communi, pro 3 b. j. pro foris, cum spongiis expressis, vt artis est. Recipe olei amygdul. dulc. chamamill. ping. gallinae, butyri recentis. an. 3. lb. cera cirina modicum fiat vng. Vnde & dolor ita sedatus est, vt si tussiret, minime, vt antea, dolorem perferiret. Interea vtebamur lambitivo in hunc modum parato. Recipe iunibini. viol. an. 3 j. syr. deliquir. 3. lb. diatrach. frig. in tab. 3 iij. misce. fiat eclegma. Die sequenti eum purgauimus cum 3 j. diacatbolici, feri lactis 3 iij. quo quinquies aluum deposuit: & cepit melius habere, & facilius expuere, lambitivo ex syr. iunib. & glyrr. adiecto zacch. penid. vtens. & ita paucis dieb. hic sanus euasit. Pro potu ptisanam confectam ex hord. mund. passolis & glycyrrh. capiebat.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Nullus est morbus adeo decantatus, ut pleuritis. Etenim Hippocrates lib. de acutorum victu, fere huic vni dicant priores, quando eo vititur pro exemplo in instituendo libro primo; & rursus libro secundo priuatim curationem exponit ordine. Quod factum etiam Iacchinus putat, eo quod frequentissime euenit, multamque inuehit difficultatem symptomatum. Argentarius medicorum consultationem describens, pro exemplo pleuritidem ponit: in quo totam consultandi rationem comprehendit: nobis satis erit pauca hic adferre, cum & Galenus in libro de constitutione artis, inter omnes morbos pleuritidem pro exemplo sumit: in quo demonstrat, quoniam pacto morbi & pars affecta cognosci & curari possint: quod ideo factum existimo, tum quod frequentissimus sit & insignis hic affectus, tum quod multas differentias, causas & symptomata obtinet; præbendique rationem difficilem ostendit; & denique plurima postulat præsidia. Nomen vero quamuis à costis deductum: quasi costalem morbum dicamus, Latini tamen à situ partis dolentis, lateralem morbum vocant. Ut fere si nomen, quod per se nullum priuatim affectum significat, sed communem, institutione post modum fit, ut particularem quendam morbum significet, quemadmodum phrenitis à phrenib. & nephritis à renibus, ita & pleuritidis nomen à lateresumptum, quoniam est in membrana succingente costas, & quia passio est in ea parte, propterea pleuritis à loco appellatur, & ut rem breuiter explicemus, nihil aliud est quam inflammatio eiusdem succingentis costas membranae, ut apud Galen. 5. de loc. affect. & 4. de causis pul. videlicet, idem & 2. de crisi. & sexcentis aliis in locis testatur Galenus: quem etiam sectati sunt Paulus & Aëtius in propriis capitulis, ad quem lectorem relegamus. Constat igitur in exquisita pleuritide membranam, quæ costis subtenetur, affectam esse. Insuper cum notas habeat cum phlegmone, erit morbus magnitudine, intemperie, ac soluta continuitate: ea ratione ex necessitate symptomata habebit, tumorem præter naturam, ruborem ac dolorem: quorum duo, tumor, videlicet & rubor, nunc sub sermonem non cadunt: relinquitur ergo dolor solus, qui ad costas firmatur pungensque sit. Cuius notas etiam nullo narrante, methodo ex natura affectus, & partis affectæ accepta, facile accipere est. Primum enim membrana necessitate quadam dolorem puncturum sentit, & hic dolor membranarum à materia in vno loco collecta, distenditur ad partes vicinas ob membranas, modo ad iugulum pertingens, modo ad infernas costas, quæ hypochondria attingunt. Et ita primum signum sumitur à doloris specie: nam dolor affectum significat, species sedem. Rursus aliud signum ab accidentibus sumitur, spiratione scilicet: nam ea membrana quod annexa sit spiritalibus organis, ea quoque organa necessario vna afficit. Fit autem spiratio parua, quod æger cohibet pro dolore multum pectus eleuare, atque ideo fit frequens; nam frequentia minimum percipit dolorem, multum vero: siue multum eleuet pectus, seu velociter eleuet. Superuenit & necessario febris ob affectus naturam: nam phlegmone (ut recte etiam annotauit Iacchinus) consistens in vicina cordis parte: præsertim ad aliquam magnitudinem aucta febre faciet acutam & vehementem, pulsus quo-

que ac febrem sunt velociores, frequentiores & maiores, & ob partis naturam quæ nervosa est, duriores, & species pulsus est, quæ veluti serratactum. Tensio enim arteriis communicatur, unde species ea deritici fit, quæ tensiva dicitur, non quod vasa ipsa induruerint. De pulsu tamen 5. de loc. affect. cap. 3. ait Gal. pulsus paruos facere, & ratio dicitur. Hæc ergo est contradictio. Apertum de constit. art. dicit pulsantur & de 2. lib. de caus. pul. ob tensionem: inquit, minor est, quam febre conueniat. Igitur sic solues. Sed maior est, quam sibi sano conueniret, non sic respiratio, quoniam voluntaria est, & ab animante prohibetur. Tussis quoque se iungi ab affectu non potest, quod aliquid necessario per membranam affluat ab initio: & ita pulmonem afficiat, unde ad tussim proritetur: sed non semper exserant: ideo quia dura membrana est, unde parum affluit, vel quia materia praua est, & contumax solutu: unde fit, ut protrahere quidem possit, sed nihil sensibile educere: & tussis hæc hæc dicitur. Hæc itaque sunt propria & inseparabilia signa, quoniam ex natura rei consequentia sunt. Ceterum quamuis tussis ab affectu ipso separari non possit: creatio tamen post tussim inseparabilis quidem minime est, sed magna ex parte fit. Verum si exseret, colorabitur sputum necessario, licet non semper eodem colore inficiatur, sed pro diuersa natura excrementi in inflammata parte contenti, diuersos excretionis adfit color, ut in causarum dignotione dicemus. Nam cum in inflammata parte multa simul ac tenuis fuerit humiditas, & ipsa pars rara: plurimum ex ea foras effluit; cum vero contra fluxus pauca crassiusque, & spissum corpus fuerit, minime ad tussim irritat, & nihil sputum veluti & cum prouenit copiosissimum, tussim plurimum: nec pauca exspuunt, ut patet eodem lib. de constit. art. At cur modo dolor ad clauiculam perueniat, & interdum ad hypochondria, inter assidentia morbi lateralis signa referuntur: fieri enim poterit admodum parua inflammatio ad mediam costarum, ut neutram ad partem offeratur: quandoque vero magna, in qua ad utramque peruenit, tum propter læsæ particulæ naturam, tum inflammationem, quæ dolorem efficit extensum, ut prius dictum est: necessario tamen vnum quodpiam ex prædictis consequetur, ut vel sursum ad clauiculam, vel inferne ad hypochondrium dolor erumpat. Ad idem quoque genus assidentium pertinet, quod æger facilius in latus patiens, quam in alterum decumbat: nam euenit interdum quod minus dolore afficiatur, si in non affectum latus decumbat: interdum vero, si in vtrumque decumbat, similiter dolor excitatur: licet vnum ipsorum necessario pleuriticos comitetur, ut eodem lib. de constit. art. med. Galenus fatetur. Nam cum duplex sit succingens membrana, ut etiam à Donato citatur: si pars eius exterior circa ossa valentius phlegmone infestetur, facilius in oppositum declinant ægri: opprimuntur enim si super affecta cubant parte. Quod si pars altera, quæ intus est (id quod magna ex parte fieri consuevit) affecta est, in oppositum magis decumbentes dolent; suspensa enim est ipsa pars phlegmone vitata, si in latus affectum minus, non enim ad ossa comprimitur, nec pendet, sed ab horum vtroque libera euasit, ac super in offensa parte altera firmata est. At affectis ambabus succingentis costas membranae partibus super latere vtroque similiter decumbunt. Non ab re igitur inter assidentia signa hæc à Galeno connumerationatur, quorum natura est, non esse à morbo inseparabilia

inseparabilia, sed aliquando simul inuadunt, aliquando superueniunt, nonnunquam autem neque omnino veniunt, ut patet Comment. aphor. lib. 12. & lib. 1. de constit. art. med. quoniam ex his sunt, quæ sæpe morbis accidunt, ut idem Gal. inquit 3. de morb. vulg. Ex his iisdem omnibus (ut Alcinarus refert ex Galeni mente) magnitudo prædicti morbi lateralis desumitur, magnitudo videlicet, seu paruitas in specie sua potissimum: nam si ingens fuerit dolor, isque punctorius, valde, maxima anhelitus difficultas, valida febris, ac ingens quoque tussis, ascenderitque simul dolor ad iugulum, ac ad hypochondrium pertineat, decumbantque laborantes super vtroque latere diffusculter, nihilque cum tussi exspuant; maximam fore inflammationem indicant: sic, si exigua prædicta fuerint, dolor videlicet febris, anhelitus difficultas, ac tussis, cum qua aliquid exspuant coloratum: ac promptestatem, ad neutramque partem dolor offeratur, ac non ægre sub vtroque latere decumbant, exiguum fore pleuritidem, manifestabunt: nam species quidem morbi ex propriis accidentibus dignoscitur, magnitudo vero ex eorumdem quantitate, Galeno teste 3. de crisi. Hæc omnia exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO XXVII.

De pleuritide satis exquisita.

Vir ille qui cupas conficiebat, annos 32. natus potui deditus, pleuritide satis exquisita detinebatur; difficulter n. spirabat, tussis aderat, & febris continua, dolor vehemens, in latere dextro vehementer pungens, ad clauiculam ascendens, pulsus durus, & serræ modo asper. Ad quem tertio prius die accitus: cum alium non deponeret, libenter hunc clysterem iniecissem. ʒ. maluæ viol. mercurial. parietaria. an. m. j. bordei mundati. p. f. prim. damas. m. ix. fiat decoctio, & huius accipe lb. j. adde cassia, zaccari m. an. ʒ. j. olei viol. ʒ. iiii. salis parum. fiat clyster. Verum cum eum admittere nollet, balneo alium irritauimus: & statim eodem die ex vena iecoraria in brachio eiusdem lateris dolentis sanguinem extrahere fecimus ad vncias septem, & quia incipiebat exspuere sputum rubrum & cruentum (quod quidem indicium erat sanguinem exuberare) & quia dolor post sanguinis detractionem adhuc vrgeret, licet parum mitigatus, hunc solum præscripsi. ʒ. folior. maluar. cum radic. bismalua, stor. chamæmill. meliloti, viol. an. m. j. sem. lini ʒ. ʒ. fiat decoctio in aqua communi pro lb. j. & decoctum calens in vesicam impositum lateri dolenti admoveatur semel atque iterum, deinde inungatur vnguento infra scripto. ʒ. olei amygd. dulc. viol. chamæmill. an. ʒ. ʒ. pingued. gallinae, caponis, an. ʒ. iij. cere medicum, fiat vnguentum: atque hoc modo dolor sedari cepit. Interea ad sputi facilem excreationem hunc syrupum bibebat, & eclegmate sequenti utebatur. ʒ. syr. viol. iuiubini, de liquiritia, an. ʒ. j. aquar. scabiosæ, bug. an. ʒ. iij. misce. pro iij. dosib. ʒ. zaccari penid. diarrag. frig. in tabul. an. ʒ. ʒ. syr. viol. iuiubini, de liquiritia, an. ʒ. j. misce pro eclegmate. Ad materię coctionem utebatur apozemate ex decoct. bord. mund. nuar. passul. glycyrrh. ad ʒ. ix. adiectis syr. viol. capill. ven. iuiubini, an. ʒ. j. ʒ. misce. Quinto die purgationem exhibuimus: nam solutium pharmacum hoc in affectu minime conuenit, nisi ubi materia fluxit, quod die quarto plerumque factum est,

quoniam solutium pharmacum humores mouet: ideo damus in principio lenientia, & etiam in quarto vel quinto: nos vero sequens dedimus, alij in septimo idem faciunt. ʒ. diacatholici ʒ. vj. cassia recens ex camis tracta ʒ. ʒ. dissolue in iij. decocti. pett. syr. capill. ven. ʒ. j. misce. qua quinquies plurima excreuit, & deinde melius habere cepit. Interea ad maiorem sputi quoque & facilem excreationem, plus de syrupo liquir. admiscuimus, & fuit curatus per expectorationem, sputo paulatim magis albedo & concocto euadente.

SCHOLIA.

Exquisita pleuritidis causæ Gal. teste de constit. artis med. 2. de crisi. ac 2. de loc. affect. & 2. de diff. feb. ac plerisque aliis in locis. affluens sanguis est, aut optimus, mediocremque crassitudinem habens, aut biliosus, aut pituitosus, aut melancholicus, quamuis sæpenumero magis biliosus sit. Quum enim phlegmone esse dicemus, necessario (ut etiam Iacchinus annotauit) nisi vox transmutatur, causam esse sanguinem dicemus, id est, materiam in qua sanguis dominatur, quamuis modo sincerior sit, modo admixtus magis alteri humori, necessario tamen calido & bilioso, ut Galenus scribit: differentia eius à pulmone, quoniam causæ humores nequeunt membranam efficere. Quod si dicas, Gal. 5. de loc. affect. 2. de constit. art. meminit pleuritidis pituitosæ, & melancholicæ: ergo non est verum, quod semper à sanguine puro, vel bilioso fiat. Respondetur, ut ipse ait in lib. de constit. artis medicæ. Cum materia illa, nempe vel pituitosa, vel melancholica, in musculos & venas vicinas infarcta est, tum ex putredine quam ibi acquirit, tum ex dolore, quam excitat, accersit fluxionem sanguinis, unde afficitur membrana: non quod ab initio inflammatio ex eo humore dominante foret. Et hoc innuitur etiam 6. aph. 33. ubi ait Gal. Non valde pleuritide capiuntur pituitosi acidum eructantes, quoniam non est nata extendi his membrana. Sed possumus dicere, musculos & venas vicinas illum humorem continere, unde erit phlegmone illa diuersa in suis partibus, ut biliosior in membrana, in alia parte poterit pituita, vel atra consistere. Galenus tamen videtur hic fateri posse à quatuor humoribus fieri, id est, ex eorum mixtione dum naturam seruent phlegmone, id est, sanguis superabundet. Neoterici vero in tres causas distinguunt: & sic pleuritidis primitiua causæ esse possunt, casus, percussio pectoris, atque denudare post laborem in aere frigido, venti Septentrionales, aquæ frigida, potus & similia. Causæ antecedentes, ut humorum influxus, vel eorum superabundantia, vel retentio superfluitatum consuetarum exire. Causæ vero coniunctæ sæpius erunt sanguis & bilis, inflammationem actu producentes, raro pituita, rarissime melancholia, quia quod densius, raro ad hæc membrana penetrat. Gignitur vero hic morbus, ut omnes aliæ fluxiones corporis, vel ex interna causa, cum natura refertas habet venas, & de parte in partem tranfluunt. Fluxionibus vero gignendis occasio est, tum externus calor fundens, tum frigidus exprimens; unde & vere sunt maxime à calore, Autumno vero excurrente à frigore: vtroque vero tempore scatur corpus. Vere quidem multitudine bonorum acervata per hyemem, Autumno vero prauis acervata per æstatem. Sic 4. de visu, meminit in angina facta. Plura si de causis pleuritidis cognoscere

gnosceret velis, lege Benedictum Faentinum præceptorem meum capite proprio.

OBSERVATIO XXVIII.

De iuvene post exercitum ex aqua frigida potu in pleuritidem incidente.

- 1 Iuvenis annos circiter viginti natus, apud Pithueros in Gallia, cum ibidem praxim exercere, in sphaisterio reticulo ludendo cum impense sese exercitasset, & supra modum concalescit, in gravem pleuritidem incidit. Hic cum biliosus esset, & macilentus, & sputum postea vergeret ad flavedinem, cum in principio ad eum acciti essemus, secunda vena media, quæ magis apparebat in brachio eiusdem lateris, sanguine utrumque extracto, qui & putridus & postea biliosus erat, clystere emolliente prius injecto; deinde vena incisa dolor plurimum mitigatus est. Locum affectum interea inungi iussimus, cum vng. resum. & oleo amygd. dul. & ad materiam præparationem exhibuimus decoctum viol. bordei mundati, vngule caballine, capill. Ven. vng. passul. ab avillis repurgatam & glycyrr. additis syr. iudub. viol. & capit. Ven. Et quia sputum subflavum erat, ad eiusdem excretionem primum exhibuimus hoc lambitium. 2. diatr. frig. in tab. zacch. penid. an. 3. b. syr. iudubini, viol. an. 3. i. b. postea addendo syr. cap. Ven. materia parata post sextum diem hanc purgationem exhibuimus. 2. castia recens extracta 3. vj. elect. de succo ros. 3. ij. syr. viol. infus. ros. an. 3. b. cum 3. iij. de coct. supra scripta fiat potio: qua quinquies alium deposuit. Et quum quotidie magis magisque expectoraret, postea etiam concocta & alba; & quia hic cito sputum apparebat, hac pleuritidis concocta materia, quæ paulatim per sputum educabatur, intra decimum quartum diem sinit. Voluit u. pleuritidem quatuor vel quinque modis terminari; vel enim resoluitur humor, vel per sputum educitur; alioqui suppuratur aut induratur, aut in alias partes transfertur, ut postea exemplis quoque docebimus. Alij quintum modum addunt, quod vel putrefiat vel corrumpatur.

SCHOLIA.

- 2 Cui iam paulo ante brevius demonstratum sit, quomodo pleuritidis dignoscatur, scilicet legitima, de mendosa & spuria postea dicemus. Nunc vero & illud addendum, quomodo eius cause distinguantur: huius distinctio præcipua est ex colore, cum expuunt, eodem Gal. auctore, cum: color naturam humoris significet. Sed & antea conicere ex victu est, & ambientis statum, & modo doloris, & febris vehementia. Ita hanc biliosam esse pleuritidem cognovimus ex dolore admodum pungente, sed non perinde distendente, pulsu duro, crebro, & febre vehementiore, tertianam imitante, ex creberrima respiratione, ex sputo & vrina ad flavedinem tendente, cum & tales facile delirent quoque subinde, ut in aliis multis observavimus. Ad hæc habitus corporis, ætas, victus præcedens biliosus, iuantes ludentesque causæ & similitudines idem ostendunt. Ita quoque si à sanguine fiat, dolor erit vehemens, distendens, febris simplicior, vehemens tamen, & quæ nullas accessiones habeat, sputum vero rubrum, & vrina rubra, citaque maturatio & expurgatio, tuber in corpore color, & venæ tumida, habitus corporis bene constitutus, carnosus, sanguineus, victusque præcedens delicatus, valde

corpus augens, quique sanguinem plurimum procreandi vim habuit, tempus vernum, regio humidior accalidior, ætas iunior, atque homo succi plenus, cui consuetæ evacuationes retentæ, ut sunt sanguinis narium fluxus, hæmorrhoides aut mentes suppressi. Nec non iuantes, ludentesque, causæ & similitudines idem docebunt. Si ex pituitoso sanguine, sputum spumans & candidum erit: rarius tamen contingit, si contingat, pituitosam pleuritidem sequitur remissior & humidior febris, quæ quotidie exacuitur, color non admodum pungens, sed potius cum quadam gravitate hominem vrgens, pulsus molliores tardioresque sputum spumans, ut diximus, candidum ac viscidum, & quod non admodum tarde procedit, & nonnunquam sopor & reliqua huiusmodi symptomata, quæ indicia sunt pituitæ redundantis. At hæc causæ, quæ pituitam gignunt, iuuant, aut lædunt, & similitudines præbeant sua indicia. At melancholica omnium rarissime evenit: melancholicam vero testantur, febris remissa, sed maligna, & accidentia prava & magna, vigilia ac animi corporisque malæ actiones. Expuunt & hi parum & difficile, illudque vel nigrum vel livescens, dabant & in hac pleuritide suas notas, causæ & similitudines, ut in aliis. Sed hoc postea aliis exemplis clariora evadent. Quoniam vero quidam sunt affectus phrenitidis admodum similes, ut qui multis signis illi communicant, hinc fit ut notis quibusdam distingui oporteat. Sunt enim dolores pectoris multis modis, 6. Aph. De dol. pectoris quantum differant, perdiscendum: hoc enim tum ad curationem, tum ad præcognitionem facit. Primum ergo accidit, ut musculos exteriores dolor occupet, ipsi inflammatis, unde & spiratio similiter frequens fit & parva, & febris adest, sed distinguuntur tussis, & febris magnitudine (hic enim levior est) & pulsu, qui hic durus non sentitur. Sæpe vero dolor ad extrima & tangenti, & præmenti dolet, & demum suppuratione ad extrema præparatur, & inciditur, vel resolvitur. Est & alius affectus, ubi catarrhus cum febre multus est, & flatus sive dolores circa latera fiunt, & tussis adest. Hi igitur pleuritides, non sunt, & concocto catarrho cessant. Distinguuntur sputi natura, quæ prorsus pituitosa est: distinguuntur & febris magnitudine: nam non est acuta, ut pleuritidis: quamvis hi periclitentur, ne in veram incidant pleuritidem. Modum vero Galen. posuit in lib. de consil. artis medend. quod ex dolore sæpe ad affectas partes materia trahitur, & processu fit phlegmone. Hic tamen lectionem admonere oportet: quod si non aderit inflammatio, sed status inclusus in membrana, vel musculis intrinsecis, videbitur, quod sit pleuritidis sicut contigit D. Marco Antonio Genæ, qui laboravit circa latus dextrum dolore quodam: quem, cum tractaret Montanus doctissimus medicus, cumque considerasset ex signis, an vera pleuritidis esset, animadvertens, quod neque pulsus, neque febris, neque difficultas anhelitus, neque tussis ita adest, qualia solent apparere in vera pleuritide, sed valde remissa & quod febris per intervalla rediret, dolore augescere, illis quidem signis agnovit, non esse veram pleuritidem. Propterea eidem perpetuo vinum exhibuit, quia solus erat in curatione, & rexit eum, sicut reguntur illi, qui flatu affliguntur; & febris potius erat ephemera ratione doloris: quia illa remittebatur, & evanescebat ad remissionem & evanescentiam doloris. Ideo diligenter signa sunt investiganda, neq. statim pleuritidem adesse iudicabimus, ut vulgus facit, ubi modo latus dolere videat: neque etiam dolorem omnem ad ventositatem referemus, uti vulgus iudicat, nobisque proponemus aliam quoque historiam Gradi de medico pleuritico, qui suo & aliorum iudicio putabat dolorem ventosum esse, cum vera esset pleuritis, utensque calidioribus confectio-nibus, Mediolani exiens, brevi vitam finiit. Similis etiam est iecinoris phlegmone, habet enim signa omnia pleuritidis communia: nam & dolor circa spurias costas sentitur, quibus alligatur: & febris acuta adest & tussis, & spiratio vitiatur ab distentione diaphragmatis: tussis vero succedit, quoniam exsudat intra diaphragma nonnihil humoris, quæ parte contigit, distinctio est statim, ubi tussis humida adest. Nam à iecinore humida non fit, quia exiguum est, quod traditur. Præterea & malus color corporis committatur, & dolor infra hypochondria descendit, Gal. 2. de loc. affect. & Paulo testib. Neque in iecinoris inflammatione punctorius aderit dolor, neque pulsus adeo durus, qui & serræ modo tæcum secet, velut in morbo laterali: & si affectus, qui proprie iecorarius nominatur, cum iecinoris inflammatione adest, erunt alii sedimenta similia aquæ, in qua nuper macerata caro fuerit abluta; id quod haudquaquam in pleuritide evenit: ab exigua quoque tussis irritantur, qui hepatis inflammatione laborant, eaque perpetuo sicca erit. At thorace affecto tussis increvit, & eo tempore omnino apparent, quæ tussiendo expuuntur, Gal. teste 2. de loc. affect. nec non lingua, facies & universi corporis color alteratur, iecore affecto: ac pallidi fiunt, decoremque amittunt, Paulo & Tralliano testibus: aderitque dolor ad notas costas in dextro laborantis latere, gravatius magis, ut interim ægri ingulum ad infernas partes detrahi sentiant. Sic itaque loco, pulsu, dolore, colore, & tussi differunt: Loco, quia infra costas in dextera tantum parte sentitur durities, tumor: pulsu, quia in inflammatione hepatis vndosus est: dolore, quia non acutus, sed gravis: colore, quia facies male colorata: tussi, quia adest sine screatu spirationeque maiori, contra vero in pleuritide: hisce notis inflammationem iecinoris à pleuritide intertingere poteris, quemadmodum Gal. à Glaucione philosopho ductus ad Si-culum medicum iecinoris inflammatione laborantem, cognovit, quem prius, tamquam pleuriticum, curaverunt medici, velut 5. de loc. affect. scriptum reliquit. Quidam tamen hic, ut Auicenna inflammationem diaphragmatis ad saevissimam pleuritidem referunt: & tales quandoque sentiunt dolorem in extremitatibus costarum, & in extremitate ossium pectoris, scilicet ubi finit spiritalia: & accidentia illa quinque superscripta, quæ pleuritide semper adeste solent (de quib. antea dictum est) dicunt fore valde sæva & intensa, ut ægrum ad insaniam ac mentis alienationem deducant. Membrana (inquit Hollerius) thoracem quoque distinguunt, si inflammantur, par negotium vitæ faciunt, atque verus lateris dolor. Sæpe etiam in inferioribus costis inflammationis, diaphragma atque hinc stomachus graviter laborat, magno periculo. Morbus hic proximo vere (anno 1551. ante pascha) plurimos, & eos maxime, qui vel temere vel negligenter curati erant, sustulit. Si vero in septo aut mediastino inflammatione contingat, (tres enim membranae continentur intrinsecus in pectore, ut testatur, id est, subcingentes Latine, inde diaphragma: tertio quæ recta per medium thoracis ad ingulum se-

runtur, 8. de costis, id est, interspicentes, barbari mediastinum vocant) dolor communicatur antea usque ad ossa pectoris, & usque ad collum transit, plerumque per medium pectoris in longitudine: aut dolor sentietur posterius communicans spondilibus pectoris, & accidentia quinque superscripta valde intensa sunt, & ægrum magna ex parte ad delirium trahunt, & mentis alienationem. Anno 1567. sub finem anni, tali septi inflammatione laborare videbatur Ioannes Godscalcus dictus, qui insigni viri ferrei, nempe in foro Delphis habitabat: nam per medium pectoris dolebat, aderat febris continua, subinde delirabat, & omnia signa, quæ in saevissima pleuritide apparere solent, illi aderant: insuper & sputum cruentum expectorabat, pulsus erat ferrinus & minime vndosus, & dolor sentiebatur per medium thoracis. Quinto die, cum nihil esset actum, amici me ad illum deduxerunt, sanguinem in cubito copiose detraxere iussimus ex vena basilica: deinde adhibitis iis, quæ pleuritidi conveniunt, præter spem multorum 14. die curatus fuit. Non erat hæc peripneumonia, quæ à pleuritide distat: nam in peripneumonia, pulsus est vndosus, & genarum malæ rubent, ac si fuso delinearentur: neque dolor punctorius adest, sed grauius tantum ob sensum exiguum, quem pulmo sortitus est tantum in membrana: pulsus quidem vndosus est, pulmone humido existente: difficultas spirandi quoque maior, & anhelitus constrictio, & aer qui expiratur calidior, qui non euentatur, vel vaporibus calidis resolutis ex pulmonis apostemate. Habet & pleuritidis signa quædam communia cum phrenitide, in permixtione intellectus potissimum, iuxta Auicennam & eius sequaces, pleuritidis diaphragmatis, vel, si maius, eiusdem inflammationis, & in alienatione mentis & anhelitus frequentia, in sitis vehementia, ac multitudine rixæ, & alteratione coloris faciei ad diversos colores transmutati & febris vehementia: ideo hæc dispositiones inter se distinguendæ. Primum signum: id distinguens ex se manifestum evadit: nam mentis alienatio aut intellectus permixtio in phrenitide statim ab initio adest, deinde succedunt reliqua signa iam dicta, & in processu vehementiora, ut anhelitus frequentia, sitis vehementia, & febris, & alia iam dicta. Contrario modo fit in pleuritide: nam prius incipit difficultas anhelitus cum dolore punctorio & tussi, & tandem succedunt deliria: & hoc ipsum quoque raro est, nisi in ea, quæ est in diaphragmate: imo, ut dicebat Auicenna, hoc ipsum non evenit, nisi morte instante. In phrenitide anhelitus quoque non æque difficilis. Propria quoque signa rubedo & ad phrenitidem consequuntur, ut oculorum superiora eorumdem attractio. In phrenitide pulsus rarus est, & eodem modo ob falsas eorumdem imaginationes. In pleuritide ferrinus: & deliria, quæ in pleuritide contingunt, potius paraphrenitides sunt, quam phrenitides veræ. Hæc de signis distinguendis pleuritidem ab aliis affectibus. Propria eius signa & inseparabilia iam dicta sunt, & quæ assistentia signa existunt. Si autem copiosam tractationem de omnibus signis ad pleuritidem spectantibus desideres, perlegas Montanum, quæ de pleuritide commentatus est supra Rhafem, & Argenterij libellum de ratione consulendi.

OBSERVATIO XXIX.

*De muliere pleuritica, in qua signa lethalia
aderant.*

Sub finem Iunij anno 1545. nempe in iuuentute mea atque primo anno cum praxim cepissem exercere, accitus sum ad mulierem quandam quinquagesimum annum agentem, in ciuitate Bonna, duobus milliaribus ab vrbe Pituetensi in Gallia; (in qua tunc agebam, & praxim exercebam) diffusam, & pleuritide grauissima correptam, vt abstantibus ex signis ab iisdem relatis intelligere potueram. Erat iam decimus dies, quo graue hoc malum mulier incurrerat: nihil, vt prius, exspuens, imo sputum in gutture plenum feruere visum est, atque multum intus strepitum in pectore edens, viribus collapsis, vt illud exspuere non posset. Cumque vitæ periculum adesse animaduertirem, incepti omnia signa diligentius inquirere: nam cum carpum contingerem, reperi pulsum non iam ferrinum, sed vermiculantem adesse, difficultatem anhelitus extremam, & ab ore anhelitum frigidum exeuntem, nares quoque tum auriculas exangues præ frigiditate, insuper & sudorem frigidum madidumque emanantem, frontem intensam, & vrinam vltro profluentem. At hæc longe post morbi principia, infirmis iam viribus aluum fusam, ex qua non corporis inquietudo, nõ ipse spiritus alleuabatur: ita vt & nunc sterora ipsa sponte prodirent. Febris vehemens erat, vires deiectæ, ad interrogata vix respondebat, mente minime constabat: nam materia translata ad cerebrum in hoc morbo sola insania ipsa occidit: magisque cum sputa in pectore cum murmure detinerentur. Hæc cum animaduertissem, mortem illico adfuturam prædixi, & quod nocte subsequente cum plenilunio, vndecimo die existente à morbi initio, moreretur. Quod cum amici astantes audissent, iisque prius obiurgatis, quod omnia sanguinis detractione aliis remediis neglectis in principio, cum ex me rogarent, vt pernoctarem, & aliquid præsidij adhiberem, respondi nullam spem esse repositam in arte medica, morte instante, cum tales prognosticis signis sint relinquendi, iuxta Hippoc. 1. præfag. vt calumniam euitemus. Atque sic equum ascendo, & vna cum famulo domum redeo, sacerdoti, & præcipue Deo, cura relicta: cum eadem hora vndecima noctis è vita decessit. Ex cuius præfatio cum eodem tempore iuuenis praxim prius exercere inceperam, laudem haud exiguum consecutus sum, & vulgo magis innotui.

SCHOLIA.

Quam vtilitatem signa prognostica præstent, alias in Obser. de febribus declarauimus: Et ideo non satis est essentiam morbi dignoscere: sed & mores ipsius. Qui enim vult profligare inimicum, oportet prius vt ingenium eius ac mores cognoscat, & quomodo is molitur illi insidias: ita & nos qui contendimus cum morbo, idem facere debemus, vt exemplo quodam docuit Montanus medicus ille doctissimus, de pleuritide, cuius mores varij sunt, ac penes tria consistunt, scil. locum affectum, materiam, cruditatem, & coctionem. Et post mores idem considerat motum morbi, & terminum considerat numquid resoluatur, vel suppuretur, vel in alium morbum mutetur, vel

interficiat: quæ omnia ad signa prognostica faciunt, vt apud eundem in lectione de pleuritide supra Rhaf. videre licet. Quæ vero motum morbi significant, plurimum quoque faciunt ad temporum cognitionem, & quæ & viam prognosticis signis aperiunt, cum eadem mere signa prognostica sint. Hinc sputum in pleuritide longitudinem & breuitatem morbi significat, iuxta Galen. de crisibus, & iuxta Hippoc. 1. lib. 12. Aph. 12. Si sputum statim appareat in pleuritide, morbum breuiat: si postea, producit. Si circa initia appareat, intelligit per principium non instantaneum, & circa latitudinem, nec prout est vnum de quatuor morbi temporibus, sed prout extenditur versus ad tertium diem: triplici namque modo iam dicto principium ipsum intelligi potest, ex Galeni comment. prædicti, aph. 12. lib. 1. imm. 1. de crisibus. Quapropter crudissimum esse lateralem morbum idem ait Galenus, in quo nihil exspuitur, quem & incoctam pleuritidem nominant, ita vt celeriter hominem rapiat, vel longo temporis spatio finiatur, vt 5. de loc. affectis etiam liquet. Secundum ordinem (vt etiam Aleimarus ex Galeno annotauit) obtinet ille morbus lateralis, in quo sanies tenuis exspuitur: tertium in quo crassior: & quartum in quo perfectam habet coctionem. Quod si apparuerit circa tertium vel quartum diem, non contingit morbum transcurrere septimum: in aliis vero similiter necesse est, vt pro concoctionis modo mensura temporis consequatur: quamuis magna ex parte terminum suæ iudicationis habet, quartum decimum iuxta Aphor. 8. lib. 5. Quicumque morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur. Et iis quidem terminis per exspuiones pleuritidis est, non numerando ab eo die, quo æger cepit exspuere, vt Fuchsius putabat: tunc enim falsum esset, quod Anaxanoris historia 3. Epid. demonstrat, non enim 14. die iudicatus fuisse, sed ferre 24. quia 11. cepit prius exspuere. Vnde & Aleimarus dicit magna ex parte 14. diem pleuritidis terminum esse: & si non hunc, saltem omnino 20. vt eodem comment. Aphor. 12. lib. 1. patet: idque verificauit etiam in Anaxione, de quo Hippoc. 3. de morb. vulg. scriptum reliquit, quamuis ad 34. diem extensus fuerit morbus, quoniam ab initio non exspuebat, sed & octauo die tussis sicca subsequēbatur, vt Hippocrates inquit eodem loco. Longitudo præterea & breuitas ex materia quoque habetur: si ex pituita, longiorem, vt & à melancholia: si à bile vel sanguine, breuiorem: sic etiam ex velocitate motus vel eius tarditate. Si velociter moueat, vt ceteri acuti morbi, cito terminum attingit. Sin tardius, serius: motus velocitatem deprehenditur ex eius veloce augmento in symptomatis, quodque cito appareant coctionis notæ, vt iam diximus ex Hippoc. de sputo cito vel tarde apparente: iam & coctio materiam, vt & paulo ante meminimus, sequitur: & sicuti tempora ex materia seu sputo cognoscuntur, ita quoque & ab accidentibus innotescunt: cum enim fluxio & dolor fieri incipiat, principium est, & cum nihil exspuitur, vbi symptomata augentur, cum sputum melius procedit, augmentum est, dolore ad vigorem progressio, status, vbi remittuntur accidentia, declinatio: si etiam sputum simul totaliter remoueatur, accidentibus cessantibus. Et ideo sputum maximè in pleuritide considerandum est, cum ex eo cognoscamus principium, augmentum, statum & declinationem,

tionem, coctionem, cruditatem, malitiam & malignitatem pleuritidis, & bonitatem ipsius, longitudinem atque breuitatem. Ideo cum morbus materialis sit, & circa thoracem versetur, excrementa illa, quæ ex pectore educuntur, maxime consideranda sunt. In quibus diligenter animaduertemus, ea quæ Hippoc. 2. prognost. enumerat: primum, vt prompte, cito creetur: prompte inquam, id est, facili, & leuiori tussi & breuiore. Ita enim benignitas humoris significatur, vt qui neque lentore inhæreat, nec crassitie, quibus aliquando ægros præfocari contingit: cito vero, id est, non longe à morbi initio, vt aphor. 12. lib. 1. dictum est. Et ita si sputum statim appareat, & reliquæ conditiones bonæ non desint, non solum salus speranda est, sed & breui fore. Si cito eueniat, è conditionibus & hæc optima est: secunda equidem conditio sumitur ex calore: nam rubra admodum salutaris est 4. Epid. & 47. text. si crassa omnia mala, excepto sanguine: tum quia humor benignus est, & simpliciora symptomata inuoluit: tum quia cito coctionem admittit. Sed si biliosus humor multus addit, siquidem sincerus sit, & non permixtus, & temperatus aliis, malum significat, vt si liuet, vel nigricat: prauis enim natura sunt hi humores, & cum sinceri exsereantur, magnum eorum dominium significatur. Contra vero si sint aliis temperati, præsertim vero niger, qui modis omnibus infalubris est, quia multo fluoior. Scretio itaque sine dolore prompteque facta, mitissimum quidem est pleuritidis signum, potissimum vbi permixta appareat cum scretione admodum fluua bilis, Hipp. auctore 2. præf. At si quod exspuitur concoctum fuerit, adhuc magis mitissima erit, Galeno teste de consil. art. med. Nihil vero exspuere (vt etiam paulo ante meminimus) exitiale est, partim quod fluxum declarat à phlegmone deunctum, partim quod totus (propterea quoniam intus maneat) corrumpatur. Ex diuerso item exscretionis colore, prout diuersam indicat inflammationis causam, possumus indicia prognostica asumere: nam perniciosissimus est melancholicus humor præpollens, id quod indicabit sputum nigrum aut liuidum: tum quod & prædictus sit ipse morbus pessimis, & maxime etodat, concoquaturque ægre, nec facile expurgetur, vt constat apud Gal. eodem libro: tum quod plurimæ sit caliditatis index, à quo affatus, genitus est. At æquissimus (iuxta eundem, & citatur ab Aleimaro) omnium est sanguis per cruentum sputum, ac rubrum indicatus, vt pote, qui dulcissimus existat, & concoctus facilissimus. Reliqui vero duo humores inter hos medij sunt, quod ad simplicitatem malignitatemque attinet. Tertio etiam prognostica signa habentur ex modo substantiarum crassa enim & glutinosa omnia mala. Contra vero, quæ mediocritatem habent in crassitie & tenuitate, bona sunt. Sed quibus notis coctionis signa distinguantur, vel in nullas vel latentes, vel obscuras, vel manifestas & perfectas, iam quasi diximus: reliqua vide apud Iacchinum: quamuis cruditas signum sit neutrum, eo quod merito si neque salutem neque mortem significat. Coctiones vero, vt Hippoc. ait, certam citamque sanitatem annuntiant. Sed de his vide alios auctores. & Galenum 1. de crisib. Caterum quod ad pulsum attinet, si in pleuritide pulsus fuerit malignopere durus, parvus etiam atque creberrimus, indicium erit lethale, ita vt pleuriticus cum tali pulsu nemo fuerit seruatus, ex Galeni decreto, 4. de præfag. expulsi. Maximum quoque si

gnum prognosticum ipsius pleuritidis, præbet pulsus terrinitas. Nam si ea remissa sit, mollem & prope maturandam inflammationem indicat, si vero magna, difficilem & admodum crudam: quæ si cum imbecilli facultate coniuncta fuerit, periculum: si cum firma, aut tarde conquoquetur, aut ad suppurationem desceat, aut tabidus eam excipiet marcor, ex Galeni sententia lib. de puls. ad tyrones, & 4. de causis pulsuum. At hic quæritur numquid vrina aliquid faciat ad temporis cognitionem, an sit mala, vel cocta vel incocta. Si fuerit bona cum suis conditionibus & in substantia bene cocta, in residencia, colore ac liquore, quod ad pleuritidem refert, nihil prorsus facit, quum in pessima pleuritide & in inflammatione rebelli, vrina bona existere possit, licet æger moriatur. Equidem fieri potest, vt totum corpus bene habeat, & inflammatio pessima sit natura. Interea, si vrina malas in se condiciones complectatur, pessimum signum est. Si enim tenuis & subtilis fuerit, nec habens aliam malitiam, indicat materiam raptam esse ad locum inflammatum, quemadmodum in pleuritide, cum vrina talis apparere contingat, etiam mortem notat. Si vero fuerit crassa, indicat aliquid dominium humoris maligni. Mala est, quia indicat cacochymiam esse in corpore, quæ sub ratione causæ antecedentis nocebit, fluat ad locum inflammatum: ideo semper malum dum vrina est mala: tum etiam si sit bona, quoad inflammationem, bona non existit, si ea ipsa inflammatio pessima sit naturæ, vt iam dictum est. Ad prognostica etiam pertinet Aph. 23. lib. 3. Hyeme vero morbi lateralis, &c. Et aphor. 33. lib. 6. Qui acidum eructant, non valde morbo laterali corripiuntur. Item morbo laterali, si pulmonis inflammatio superuenerit, malum est, ex Aphor. lib. 7. Causam reddit Galenus in commento: quo etiam loco asserit: quod non admodum consequi solet morbus lateralis ad inflammationem pulmonis. Qui autem pulmo costis affigitur vel adnascitur, atque illud quidem rarissimum est, & semel tantum vidi in corpore dissecto, pulmone plumbeis maculis infecto ac corrupto, vtrinque costis affixis: alij tamen id quoque ante me viderunt. Talis plerumque vel ex asthma, vel ex tabe tandem commoriuntur: pulmo enim (spirandi organum existens, vt in præfatione diximus) tunc quidem afficitur, vt nec aërem inspirare, nec libere expirare possit, corde etiam tam per distensionis motum, quam contractionis, minus officium suum obeunte. Hi quoque si in pleuritidem eueniant, præter illud quod difficulter eueniunt, facile in peripneumoniam eamque lethalem dilabuntur, cum pulmo membranas costas succingenti ex parte adnatus vel affixus, facilius in se virus recipit, & minus à se propellere potest, citiusque inflammatur. Sed & aph. 16. lib. 6. dicit Hippocr. A morbo laterali vel pulmonia habito, alui profluuium adueniens, malum: quod quidem intelligendum est de fluxu non regulato (vt ita dicam) à natura. Nam qui à virtute regulante sit etiam in principio, bonus esse potest, nisi aliud accedens accesserit virtutem prosteruens. Sic & Auicennam fluxum in principio bonum esse existimauit. Quicumque vero ex morbo laterali suppurantur, si in 14. dieb. purgantur, à die, qua sit eruptio, liberantur, si minus ad tabem transeunt. Refert Auicenn. pleuritidem propinquam cordi deteriore esse, & parti sinistra, sed maturationi convenientiorem, at remotiorem à parte sinistra, salubriorem quidem, sed ex

R ij parte

parte resolutionis & maturationis magis inobedientem. Pleuritidis quoque sanguinis fluxus narium eueniens pro optimo signo habetur: non tantum à naribus, sed ab hæmorrhoidibus quoque & matrice, vt sæpe experientia vidimus in in communi praxi, quod quidem & à Galeno 10. method. capit. 5. laudatur.

OBSERVATIO XXX.

De pleuritide in prægnantibus.

SI pleuritis prægnantibus contingit, valde perniciosa est, vt Auicenna pronunciauit, quem admodum & decrepitis: Solet enim hominem interimere, vel ex præfocatione, vel ex symptomatum vehementia; ob quam causam prægnantes præcipue moriuntur: decrepiti vero, ob debilitatem virum in spuendo. Senes vero cum frigida sint natura, morbos concoquere, etsi diuturnos, non valent: cumque sanguinis & prægnantes pleuritica & decrepiti missione egeant, & tenuissimo victu; hæc neque prægnantes, neque decrepiti ferre possunt: vnde sæpe in vtriusque ad mortem comitatur pleuritis. Nos tamen aliquas prægnantes magna cum industria curauimus. Ex quibus mihi occurrit quædam nomine Remula, mulier si quæ altera, pulcherrima, viginti quatuor annorum, Alemariæ decumbens, anno 1549. ad quam 18. die Octobris accitus fui. Quæ cum sanguinea & boni habitus esset ac robusta, & in nono mense grauida, & partum quasi nunc expectaret, sæuissima pleuritide correpta, sanguinem expuebat, & circa mammam laeuam in latere, insigni dolore afficiebatur, qui ad clauiculam adscendeat cum tussi valida & continua febre. Ad quam cum intrassem, plurimum hæsitabam de venæ sectione, ob *aph. 31. lib. 5. Hippoc.* sic dicentis. Mulier vtero gerens sanguine misso ex vena, abortit. Ab altera parte venæ sectionem vrgebant febris continua vehemens, & inflammatio vrgens, dolor insignis, virtus fortis, mulier bene habita & sanguinis missione consueta, quam & ipsa petebat: itaque alio prius per balneum expurgata, venam secari iussimus ad vncias quatuor, ex eodem, in cubito nempe basilicam: Adeo autem profuit, vt dolor magna ex parte sese remisit; adhibitisque denno decoctis pectoralibus, & aliis remediis aptis post septimum diem pleuritide curata est, cum optime expueret per eclegmata præscripta. Septimo die oborta est exterius inflammatio mamillæ sinistræ cum intensa rubedine: cumque per externam inflammationem terminaretur pleuritis, nolui mammæ inflammatae repercutientia adhibere: sed inuncto loco affecto cum oleo viol. & exiguo populeo, inflammatio cessauit, & perfecte conualuit. Deinde post duas septimanas, cum optime valeret, peperit feliciter filium optime sanum & robustum. Ad alteram eodem tempore accitus etiam in ultimo mense imprægnatam accessi, debilem, pituitosam; ob quam causam sanguinem extrahere non audebam: septimo die abortum patiebatur, & 14. die obiit. Quamquam Pithueriensis mulier cum propensionem mensem grauida foret valde debilis, venæ sectione non admittens, adhibitis optimis remediis, etiam foris ad dolorem sedandum, circa quartum diem melius habere visa est, cum in principio nihil expueret, nunc quædam concocta expuens, dolore lateris nonnihil consopito. At sexto die febris aucta est, & in septimo omnia vehementiora, ita vt vi infantem peperere-

xit, cum in nono mense esset, sed non superuixit infans ad tres dies. A partu vero dolor lateris omnino sese remisit; quamuis sub noctem intensissimus dolor pectus occupauerit cum ingenti angustia & anhelitus difficultate vehementiori, vt suffocatio immineret, ac pro deplorata haberetur. Octauo die delirauit & tandem obtulit, sacra inunctione, vt sacrifici solent, munita Nono die delirium increuit. Postea melius habere visa est, ac concocta expuere, & sub noctem, post symptomata maligna sedata, incidit in somnum profundum, & per noctem ac diem integre dormiuit. Vndecimo die compos mentis facta est, bene & concocta expuebat, & melius spirabat. Vnde magna salutis spes emergebat: nam si somnus delirium sedat, teste Hippocrate, bonum est. Post vndecimum diem, qui erat quartus dies à partu, purgationes per se magis subleuebantur; plurimæque crassa & rubra, postea & pituitosa biliosaque per vterum excreuit, vsque in 14. diem ab initio pleuritidis: atque tunc crassam vrinam mingens & pituitosam, conglobatam, inuiscatam, & in partu bene repurgata, spurto albo & concocto apparente, hæc quoque sanitatem cum admiratione multorum consequuta est. Verum in alia muliere, quæ Delphi commorabatur duos supra viginti annos nata, cum prægnans in octauo mense esset, in asperissima hyeme (cum multa alia, tum viri pleuritide corripiebantur, anno 1565.) commode quoque in pleuritide sæuissima (quemadmodum & aliis multis prægnantibus) vena secta fuit in brachio, è directo loci dolentis: aliisque deinde aptis remediis adhibitis ad pleuritidem conferentibus, tum decoctis, eclegmatis, inunctionibus & fortibus convenientibus præscriptis, etiam & hæc sanitati restituta est.

SCHOLIA.

QUod in prægnantibus venam secare possumus, id quidem multis exemplis alias docuimus, vt *lib. 2. obseru. 28.* de continua tertiana in prægnante, in cuius scholiis ad longum ex diuersis auctoribus, numquid prægnantibus euacuatio & venæ sectio conueniant, illustrium medicorum sententia, tum rationibus eorumdem adiectis docuimus. De qua re etiam *obser. 29.* eiusdem libri, in scholio pertractauimus: etiam *obser. 2. lib. 15.* quomodo etiam in angina mulieribus grauidis sanguis demitti possit. Ad loca citata lectorem relegamus, ne opus sit hæc eadem hic repetere. Quamobrem cum de causis & signis pleuritidis satis egerimus, nunc ad actionem ipsam seu curationem deueniendum est; quæ recte institui nequeat, nisi certis scopis propositis, in quos omnia referantur, & nisi certa adhibeamus instrumenta, quorum beneficio singulos scopos assequi liceat. De scopis ipsis alias diximus, qui ab auctoribus variis modis sumuntur, vt in *lib. 3.* de incerto vrinarum iudicio ostendimus, à quib. denno indicationes sumantur. De quibus quidem loco exempli de pleuritide egregie pertractat Argenterius in libello suo de consultatione: vt etiam facit Montanus de pleuritide in lectionibus suis supra Rhafem. Quibus si lector ipse, tum iuniores sese exercere velint, habebunt latissimum campum, quomodo pleuritidem curabunt. Nos autem breuiter (cum alij hanc curationem longo sermone tractarint) duo in primis victum commodum instituemus: Duo autem apud veteres, iuxta Hippoc. erant cibi

tibi genera, pituitosa integra, & cremor. Si sine periculo videatur, inter initia pituitosa vtemur, alias, si adsit periculum, & morbus magnus est, cremore vtemur: cibis enim maxime tenuis & levis, præcipueque sorbitio, Celsus placuit: potissimum sorbitio ex pituita nihil vero detur (vt inquit ille) quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet: quæ ratione acris, acida, salia, & astringentia vitanda sunt. Ita & Alexander pituitam cremorem largiter decoctum, donec id, quod statuosum est, deposuerit, pro cibo commendat. Nos etiam si humor ægre ducatur, amygdalata purgata leuigataque pituita incoquimus, quo humor magis educioni pareatur: ac commode vtimur subinde & hordeato: & sic mane, iuxta Alexandr. pituitam cremorem, vesperi amygdalarum succum offeremus. Si fit ex pituitoso sanguine, paululum mellis adijcit idem Alexander. Quoties vero dandum sit, & quantum in ea, consuetudo seruanda, tam ad ægros & sanos, vt habet *aphor. 18. lib. 1.* inter initia tamen exiguum & tenuem non tanti alimenti seruare oportet. At nostræ regiones tam exactam in ediam, vt Itali & Hispani, non ferunt. Et sic in nostris agris aliquando amygdalata extirpata & contusa & mulla cum aqua exhibemus, vel panatam (vt parant Itali) & si vires imbecilliores fuerint, in gallinarum iusculo panis micæ decoctas pro cibo commode damus. Interea olera vitamus, nisi lingua scabra, sticculosaque & febris ingens appareant; tum etiam Alexander ante malum aut intybi decoctum exhibet. Possunt & pleuritidis mala dulcia cocta exhiberi, apia dicta. Initio igitur aqua hordei & hordei pulicula; principis liquidior, post etiam crassior: deinceps mixtis amygdalis, tum amygdaloga: post etiam eadem ex pullorum iusculis dissoluta: tenella pullorum carnes in sine, ubi vires deficiunt, intrita madida, quæ & infriatas carnes & synterimata appelles licet, vulgo collyria & collaticia iuscula dicta, expressiones quoque, quibus defecis viribus vtimur, alioqui integra satis virtute tenuius nutrimus. De quibus ad longum quoque videas Benedictum Fauentinum præceptorem meum cap. proprio de curatione pleuritidis. Pro potu vtimur aqua hordei, vel radicem glycyrrhizæ seu paucum cinnamomum in ea decoquimus. Quidam (teste Alexandro) aquam tepidam propinat; alij aquam mullam in pleuritide ex pituitoso sanguine. Vbi paululum morbus sese remisit, alimenta pleniora exhibent. A vino tamen abstinendum cenfeo, nisi viribus admodum imbecillibus: etiam vini aliquid Celsus dat. Præceptor meus Benedictus Fauentin. non dabat, nisi extrema iudicatione pleuritidis transacta, quæ 14. die fit, idque aqua permixtum: quod si pleuriticus non fuerit iudicatus 14. die vinum non exhibet; rationem loco citato explicat. Huc etiam pertinet acir, qui temperatus eligendus est, parum tamen ad calidum inclinans: nam frigidum nervosis partibus, eisque affectis est inimicum, teste Hippocrate *Aph. 18. lib. 5.* dolorem quoque insupperabilem facit. Somno quoque potius longiori vtantur quam vigilia. A motu omnino abstineant, iniungendaque quies erit: ideo à coitu abstinendum, cuius habemus exemplum apud Amatum de pleuritico, qui post venæ sectionem & sputi reiectionem sanum se dicebat; quamuis sequenti nocte cum vxore cum rem habuisset, facta recidua & dolore reuerso intra biduum in sine sexti diei, obiit: quicumque enim recidiam patiuntur, etiam ex victu inordinato, tales quoque iuxta Auicenn. commoriuntur.

Pet. Forest. Tom. 2.

Hinc quoque summopere cauendum à stypticis, cum & Rhafes 4. Continentis narret historiam de quodam medico imperito, qui cum pleuritide cum præ manibus haberet, & videret pleuritidem iam perfecte in declinatione esse, ac ægrum iam quasi sanatum, crassiore diætâ utebatur: atque agro suo exhibuit, lenticulas cum aceto confectas, vnde illico cessauit sputum, ob impedimentum illius nutrimenti, ita vt errore medici miser ille nocte subsequente à vita discederet. Sic ego quondam cum haberem pleuriticum præ manibus, & iam quasi curatus esset, me incito salsamentum piscium ebibi: vnde denuo suborta tussi, dolor lateralis reuersus est, vt astantes illum morituum existimarent; & nisi ego statim adhibuissem eclegmata dulcia, tum alia remedia expectorantia, æger succubuisset. Veteres, vt paulo ante diximus, pro potu dabant mullam aquosam, vel aquosum oxymel, vt sputum facile educeretur. Nos commode vtimur aqua hordei mundati, in qua radices glycyrrhizæ, & vix passulæ ab arillis repurgatæ, incoctæ fuerint. Sed à frigida aqua abstinendum, quæ sputum incrudescere facit; & subito (vt vidimus) suffocati sunt quidam ex hominibus plebeis, qui cum sitirent, frigidam bibissent. Hæc obiter de vitæ instituto. De medicamentis (alio interiecto exemplo) postea dicemus.

OBSERVATIO XXXI.

De pleuritide legitima.

VXOR Magistri Henrici cognomento Rabbi, annorum 43. mense Iulio, anno 1549. Alemariæ pleuritide vera corripit: aderat enim dolor punctorius in latere sinistro ad clauiculam ascendens, supra modum tussiebat, sputum erat rubrum pituita mixtum, difficilem anhelitum trahebat, continuo febricitabat cum capitis dolore, pulsus durus atque ferrinus erat. Quarto die ad eam primo ingressus, iubeo vt in loco lucido mediocriter elato collocaretur, & vt molli culcitra capite ac thorace subleuato decumberet, cumque in pedes decideret, lignum aliquod, aliudve corpus pedibus obijcerem, vt in ea figura perlisteret. Deinde cum nostri in ediam ita non ferant, & iam quartum diem attigisset, quod ad victus rationem attinet, poma assata dulciora concessi, & hordeatum, & amygdalatum, & panatam cereuisariam vulgariam more paratam, absque vino, quod quoque interdixi, eo quod nostri rustici statim in omnibus pectoralibus morbis ac tussi vino dulci vtuntur, apud nos Romano dicto, existimantes à frigore tales affectus semper oriri: vt istis diebus mihi euenit, cum extra urbem in pago Diui Eligij dicto, colonum pleuriticum præ manibus curandum haberem, atque eidem omnia vina interdixissem: cumque is nostris præsidii melius haberet, post nostrum discessum stupidi homines etiam præter vinum, aquam vitæ agrotos propinarunt, vnde febre denno accrescente, & sputo ob calorem retento, intra quatuor pluresve horas miserrime extinctus est. Ita & tartor quidam Delfensis prope nosocomium decumbens ex grauissima pleuritide, cum aquam vitæ ebibisset, etiam grauissimis symptomatis obortis, & ventris proluvie, nono die sua incuria obiit. At in hac nostra ægra, cum in quarto die acciti essemus, & sponte per se aluum deposuisset, ex vena basilica in brachio sinistro sanguine copiose extracto, dolor

R. iij mirum

munt. Et inter Græcos Archigenes ipse inquit. Si latus inflammatur circa mammam, & ad clauem dolor peruenerit, in opposito cubito venam secabis, & sanguinem detrahes citra animæ defectū; tum peripneumoniam, inquit, non extimesces; pulmo enim, qui rarus & calidus est, laterique vicinus, facile virus contrahit: at expedit per intervalla extrahere. Eundem & Aëtius sequitur. Alij Græci, ut Hippoc. & Galen. & post eos Orbasius, ab eodem latere miserunt: & Cornelius Celsus inter Latinos præcipuus lib. 2. c. 9. taxat medicos, qui in dolore pleuritico faciunt diuersionem à longinquis: & Constantinus ille Casianensis medicus, ex mente Isaac lib. 3. Viatici c. 12. in pleuritide venam, quæ ex directo loci affecti est, secandam docuit: quamquam & is Arabs non deuiavit, ab opinione Græcorum: quamuis alij quoque non desunt, qui nituntur Arabes cum Græcis concordare, ut Nicolaus Monardus Hispanensis medicus. At nos etiam insequendo præcepta præceptorum nostrorum, commode semper in principio quoque ex latere eodem sanguinem misimus, non solum in hoc fabro, sed in alijs fere omnibus. Idem Amatus in multis exemplis peregit; ut in Angelo Ferreto nobili Anconitano, præmissa clystere basilicam eiusdem lateris dolentis secare fecit, ad vncias octo sanguinem extrahens, idque primo die, ut videre poteris, cent. 1. curat. 59. & in mercatore Ariminensi ad vncias decem in eodem latere, cent. 3. curat. 68. Et in puella annos 17. nata iniecto clystere, eodem die bis axillarem venam secuit ad vncias viginti sanguinis, centuria eadem, curat. 69. idem iussit fieri in alio, centur. 4. curat. 88. Et in textore ad duas libras, ubi & in scholio se cum Brisorto Gallo, Matthæo Curtio & Fuchio convenire testatur, rationemque ibidem addit longo sermone, curid faciat. Interea neque illi audienti sunt, qui docent semper faciendam esse in parte dextra, quod vena azygos, magis ad partem illam vergat, quam ad aliam. At Donatus & Argenterius magis quoque inclinant ad illos, qui ex latere eodem sanguinem demendum esse tradunt, quamuis uterque illud tamen non vult perpetuum esse præceptum, quod nunquam in latere opposito fieri deberet: de qua re vide prædictos auctores, & præcipue Donatum. Sic istis diebus etiam memini me secuisse saphenam in iuencula octodecim annorum, cui cum menses fluere, & subito adstricti essent, & in pleuritidem colapsa esset, mox alijs remedijs hac ipsa sanitati restituta fuit: nam ubi facta fuit saphena, aperti sunt menses, & melius pleuritide euasit: & quamquam in hoc casu iuuabat, si tamen menses non subito fuerint restricti, sed forte longiore tempore, vix video in tam vehementi malo, quomodo tam longinqua diuersione prodesse possit: licet Holerius eam laudet, sic scribens: Suppressa aliqua per partes inferiores vacuatione, ubi malum inde ortum est, in insigni plenitudine, in materia virulenta, cumque statim in initio materia in cepit rapitur, ac mentem commouet, è venis cruoris eiusdem lateris, sanguis demendus est; alioqui è basilica eiusdem lateris: & ideo debet fieri (ne hic multa verba profundamus) secundum rectitudinem, quod Hippocrates, & deinde Galen. appellat *καὶ ἴση*: & ita eligit Hippoc. venam internam eiusdem lateris, quod hæc, ut Galenus ait, reuellit, & celerrime, & vacuat à partibus peioris superioribus. Cum ergo in acutis morbis celerrima auxilia exigamus, hinc eam præeligemus, & ea non apparente mediam. Nam quæ ex

opposita vena sit, aut exiguum præstat auxilium, aut non cito sentitur, sed serius. At nos velociter iuuari ægrum volumus in morbis acutis. Sed antequam reliqua explicemus de venæ sectione, aliud exemplum proferamus.

OBSERVATIO XXXIII.

De pleuritide valde periculosa in sene, & de muliere pleuritica, in qua non ante octauam diem fuit secta vena.

Alon Langius Hyperanus, vir insigniter doctus, Scholæ Delfensis Rector, familiaris noster amicus, annum agens 64. anno 1589. mense Octobri in pleuritidem sæuissimam incidit: ad quem priustertio die accitus fui, nempe 23. die Octobris, cum sputum crudum, viscosum, cruentum, subinde & biliosum exspueret, cum ingenti lateris sinistra dolore, ut morti vicinus videretur, glande vix aluo soluta cum tribus diebus nihil excreuerat, neque vena secta fuerat, & iam tertius dies esset, venam in brachio sinistro, nempe basilicam, secari præcepi, sanguine ad vncias septem, vel paulo plus in sene extracto: interea hoc decocto utebatur. *℞. rad. liquiritiæ rasæ ʒ. ss. bordei mundat. p. j. viol. bechy, scabiosæ, capill. Ven. polytrich. an. m. ss. sem. anisi ʒ. j. ss. vuar. pass. enucleat. ʒ. j. iuinbar. recent. numer. vi. fiat decoctio in aqua communi pro ʒ. ix. colaturæ addendo syr. capill. Ven. ʒ. j. ss. miscet: locus inungebatur linimento sequenti. *℞. olei amygd. dulc. ʒ. ss. olei chamamel. butyri recentis, axungie gallinæ, an. ʒ. ij. miscet. Pro expectoratione hoc elegmate utebatur. Recipe syr. capill. Ven. ʒ. j. ss. syr. de liq. viol. an. ʒ. ss. ʒ. acch. penid. ʒ. ij. fiat loch. 14. Octob. cum aluum non deponeret, glans acuta iniiciebatur: sed nihil effecit: & rursus assumptis hoc lene medicamentum laxans. Recipe syr. ex infus. ros. pallid. cum folijs sene ʒ. j. ss. elect. lenitui ʒ. j. ss. aqua vesicula caball. sen bechy ʒ. ij. ss. miscet: sed nihil effectum dignum eduxit: ideo hoc apozemate utebatur. Recipe bordei mundat. p. j. folior. malua, viol. vesicula caball. capill. Ven. polytrich. an. m. j. flor. cordalium p. j. prim. danascen. numer. xij. vuar. passul ab acrimis repurgat. ʒ. j. iuinbar. recent. numer. vii. folior. sene Alexand. à stipitibus repurgat. ʒ. j. ss. sem. anisi ʒ. j. ss. polypod. quer. ʒ. ss. fiat decoctio in aqua communi pro ʒ. ix. fortiss. express. adde syr. vesicula. syr. ex infus. ros. comm. & pallid. an. ʒ. j. miscet, fiat apozema pro tribus dosibus matutinis: cum vnam lumpsisset, ter aluum deiecit: dedimus 26. Octob. altero die rursus dosim cepit. At dolor non mitigabatur. Quare & hoc solum utebatur. Recipe rad. alibæ mundat. ʒ. ij. folior. malua, viol. flor. chamamel. meliloti, an. m. j. seminis malua ʒ. ij. semin. lini ʒ. ij. coquantur in aqua communi pro ʒ. j. ss. fiat solum cum spongia, ut artis est: & rursus cum vng. suprascripto cepit dolor mitigari: & nono die sputum melius exibat: sumens quoque ex lincto syrui capill. Ven. & liq. antea quoque ex syrui iulubino de liquiritia, adiectis tabulis diatrag. frig. eo quod sputum biliosum erat. Sed 27. Octob. syr. capill. Ven. de liquir. Decimo quarto, sputo bene exeunte iam melius habebat, vtens hordeato: & post 14. diem sputo magis exeunte in sene, circa 20. diem, perfecte curatus est à pleuritide sæuissima, cum omnium admiratione, cum pro deplorato habitus fuerat. Interea in dubium vertitur à quibusdam, numquid post quartum diem sanguis demendus sit in pleuritide: quam quæstionem mouet Valescus lib. 3. c. 8. de pleuritide: & auctoritate Rhafis & aliorum,**

ac Auicennæ concludit, cum tunc adsit augmentum & materia incipiat digerere & expelli sputo apparente & melius exeunte, quam prius, venam minime esse secandam, ne impediatur apostematis maturatio. Neque propterea id fieri iubet, nisi aliorum medicorum præsentium consensu; idque admonens ut opinor, ut calumnia declinetur, modo vires admittant. Hipp. tamen in Anaxione octauo die venam secuit, ut etiam ex commento Aphor. 12. lib. 1. apud Galenum constat. Et huius historiam ad longum habemus 3. de morb. vulgaribus, licet etiam tunc medici (referente Galeno in eodem commento. 3. Epid.) quæ certa lege ultra quartum diem venam non secabant. Sed quod octauo die prius venam secuerit, aliqua referuntur rationes à Galeno, vel quod Hippoc. citius non esset vocatus, vel quod materia esset cruda: quæ tamen rationes Montano non satisfaciunt, ut ad longum explicat in commento supra Rhaf. de pleuritide: sed & hanc rationem meliorem esse putat: non misit in quinto, quia erat dies maioris afflictionis, neque in septimo potuit; quia hi dies erant maioris afflictionis, cum pleuritides plerumque habeant affectiones de tertio in tertium: in sexto quoque non misit, quia tunc delirabat, & habuit sæuam accidentiam ideo necessarium fuit in octauo mittere. Reliqua vide apud Montanum. Quod Hippoc. hoc prius in octauo die fecerit, oportet, ut aliquam ex his dictis causam habeat: Cum enim magnitudine morbi & viribus indicatio mittendi sanguinis sumatur (ut 9. methodi habetur) optimum igitur factum est, id quod nos semper (inquit Galen.) facere vidisti, statim non numero dierum, sed vni virium robori in febribus eius generis (Synochos præcipue intelligit, sic & acutas, ut est pleuritis) attentum esse: quippe quod si seruatum est, non solum sexto septimone, sed etiam sequentibus diebus sanguis est mittendus: & ita si tardius vocati fuimus ad pleuriticos, etiam post quartum diem, & omnia fuerit venæ sectio, sanguinem demittimus, modo vires adsint, ac dolor ac febris urgeat, & sputum nondum maturuerit: & sic ego aliquando in muliere pleuritica & vidua annos quadraginta nata (quæ in aggre in festo Delphis decumberat) octauo prius die venam secari feci, cui facies pustulis repleta erat, pulsus utcumque fortis, idque ex eodem latere; quæ postea alijs quoque adhibitis remedijs, & elegmatibus ad sputum facilitandum vtens, per modum resolutionis sputum commode expectorans sana euasit, cum alijs nonnullis, cum anno 1565. mense Ianuario vsque ad Martium, cum aspera hyems esset, quam plurimi ex pleuritide decumberent. Venit & mihi tunc in mentem Oliverius pleuriticus apud Amatum, cui in principio tantum vnciæ quatuor sanguinis detractæ fuerant: & postea Amatus ad eundem accitus 10. die, vncias octo detraxit: deinde rursus 13. die vncias sex: qui tandem euasit 27. die, ut apud eundem videre licet cent. 1. curat. 21. Hoc tamen exemplar non semper imitari oportet, cum & vires consideranda sint, quæ non semper toties reperitam venæ sectionem ferunt: sed potius in principio, cum vires adhuc fortes sunt, & exitus sputi non impediatur.

SCHOLIA.

Quantum ad sanguinis detractionem, postquam Hippoc. quando sanguis sit detractus, & ex qua vena docuisset, mox de quanti-

tate agit, dicens: tantum sanguinis auferendum, ut color permutari ceperit ipsius effluentis. Est autem permutatio hæc, ut si prius albidior colore sit, ut in pituitosiore habitu contingit, rubidior euadat, id est, pleniore purpureo colore: si vero calido sanguine æger sit & purpureo, loco eius liuidus exeat. Iam n. hoc signum est, detractionem eo peruenerisse, ut euacuaret sanguinem circa partem impactum in exilibus venis, qui etiam eo modo alteratus est à calore phlegmones. Nam calor ita colorem alterat exurendo; quod aperte in febricitantibus videmus, & ætate exercitatis euenire: sed contra quam hic; in illis enim sæpius mutatio coloris fit ad melius, propterea quod sanguis in extimis venis manens exurit, qui vero in visceribus, benignior est (ita procurante natura in febribus, ut excrementitius ad cutem tendat, contra viscera potius fruatur) præterea quod exiguus est, & in exiguis venis facile exurit. Ignari vero medici cum eam mutationem vident, Hippocratis exemplo sistere volunt. At non eadem ratio est, ut etiam doctissimi Iacchinus annotauit. Hic enim plurimum educetur, priusquam educio ad locum peruenerit: itaque bonum erit ibi sistere. At hic vacuare plenitudinem volumus, & non solum, qui in extimis est, sed qui in visceribus: itaque non statim sistere oportet. Horum autem dictorum Hippoc. Galenus reddit rationem in 2. de rat. victus & in lib. de curandi ratione per venæ sectionem. Non tamen, secundum eundem Galenum, sanguis semper mittendus in pleuritide ad caloris mutationem, ob infirmas vires, quæ tantam copiam vacuare prohibent, aut ob phlegmones prauitatem. Quibus & Galen. isdem locis, & 1. de art. curat. ad Glauconem, adiungit laborantis temperiem calidam & humidam: nam suapte natura talia corpora diffantur, uti & pueris. Et licet Græci in pueris vsque ad 14. annum à venæ sectione abstinerint, Arabes (ut alias diximus lib. 1. scholio, obseruat. 21.) etiam in pueris eam aliquando non reliquerunt. Sic nos in pueris 9. annorum pleuritide laborantibus venam secimus, etiam in quodam 13. annum agente. Quidam medicus Bruxellensis felici successu quarto anno venâ secuit: Galenus ubique prohibet, vsque ad 14. annum, Amatus venam secuit in puero obefulo, sanguineo, quatuor annorum. In pueris tamen pinguisculis (ubi venæ angustiores sunt) quidam sanguisugis vtuntur, decurtata harum cauda, ut vacuationis modus certo finiatur. Ideo & mensura obseruanda: in pueris parcius, in adultis copiosior adhibenda: & tantum, ut alias diximus, detrahendum sanguinis, quantum postulat vehementia affectus & copia humoris redundantis; sed non ad syncopen, ne sputum retineatur, aut humor postea regeatur in affectam partem; præstatque sanguinem, (ut alias diximus) in peluiculis demissis spectare, & eius colorem & consistentiam considerare. Atque hæc sectio fienda præsentem medico, ut & colorem spectet, & vires ex pulsu metiatur. De tempore iam paulo ante diximus, & latius lib. 1. Schol. Obseruat. 12. Sed hic aliquis dubitare posset, quod aliquando non tantum ob imbecillitatem virium sanguinis missio fieri non debeat, sed etiam ob aliam causam, ut si natura euacuet satis per hæmorrhoides vel sanguinis fluxum è naribus aut menstrua purgatione. Sic ego quondam in nobilissima domicilla Terlongia, iuencula quindecim annorum, quæ ex pleuritide in Campo regio decumberat, eo scilicet tempore, cum publica pleuritides grassarentur,

Num uten-
dum sit pur-
gatione in
pleuritide.

5

rentur, ad quam quarto die prius accitus eram, quo tempore mentes aperti erant, & largiter fluebant, à sanguinis missione abstiniui: quæ postea (mensibus apertis sanguine satis copiose profluente, sputi expectorationem non prohibente) adhibita leui ventris lenitione, & eclegmatibus ad sputum facilitandum & linimentis, absque venæ sectione conualuit. Quod si tamen non satis profluant (vt alias fecimus in quadam famula iuxta Aëtium, cum non satis videretur purgari per menses) commode venam in brachio e regione dolentis secamus. Sed hæc de venæ sectione dicta sufficiunt: cum integri libri de eadem re, de pleuritide curanda, conscripti sint. Sed nunc de purgatione etiam quid adiciamus: & primo à medicis doctissimis quaeritur, num ea vtendum sit. Hippocr. solum ea vtitur, vbi dolor inferna affligit. Galenus huic non repugnat, & fatetur vsui esse, sed non esse tutum propter febrem, propterea quod non nouimus semper ægri naturam, vt se habeat, ad purgationes, & alia incommoda, quæ ibi enarrat: ideo præligit & hic venæ sectionem, quem sequitur Rhales. Hinc quoque Rondeletius potius clysteriis contentus est, cum viderit aliquos perire ob medicamenta laxantia; cum & Hippocr. alibi dixerit, inflammationes internas laxantibus medicamentis non esse curandas, quia nihil à parte inflammata euacuent, & sanas colliquefaciant, & ideo in solo morbo pituitoso, qui per catarrhum siue defluxionem fit, laxans medicamentum alibi exhibet Rondeletius. Nos tamen dicimus cum Iacchino ex communi methodo 4. meth. & 13. in cura phlegmones patere, quod si æger vitioso succo abundet, esse etiam adhibendam purgationem, sed quæ minime agat: cuiusmodi sunt leues purgationes, quarum multa sunt exempla: & multi iis vtuntur, præsertim, si morbus non prorsus constitit, sed adhuc semper augeatur. Aliquando igitur ea vtetur, aliquando fat erit clysmate vti. Galen. autem præligit phlebotomiam respectu purgationis acrioris, quæ fit à peplio & helleboro. Hippocrat. vero, et si sub septo transuerso partes doleant, per inferiora ventrem purgare præcepit 2. de rat. vit. & 4. quam sententiam etiam post Hippocr. sectati sunt Paulus, Aëtius, Alexander, quod quidem seruari duobus duntaxat prius consideratis perpetuo potest, modo non sint correpti validissimis febribus: nam iis medicamenta purgatoria dari non debent, donec febres remiserit. Vnde & (eodem teste Aphor. 24. lib. 1.) in acutis morbis raro, & in principiis tantum medicamentis purgantibus vtendum. Iam quoque ex Gal. 2. de rat. vit. ipsius laborantis naturæ cognita esse debet, vt paulo ante dictum est: si eius naturam cognouerimus, & dolor inferiores partes thoracis infestet; & febris non fuerit vehemens, medicamentum purgans iuxta Hippocr. & Galen. dari poterit. Sed quia sapissime febris vehemens, pleuritidem comitatur, etiam dolore partes inferiores infestante & natura incognita plerumque sit, Galenus ea ratione tutius semper venam secari iubet: quam opinionem ad longum etiam Donatus explicat. Hinc & quidam raro vtendum purgantibus voluere, iisque leuibus in principio, morbo pituitoso per defluxionem; & si materia fluat ab hepate; sed tutius adhuc clysteribus agitur. Sed quia nostra medicamenta multo tutiora sunt quam veterum, lenientium purgatio etiam ab initio non erit metueda, quæ leniendo purgant, & tussi non aduersantur, qualia nostro æuo sunt cassia, manna syrup. ex

insuf. ros. aut viol. soluius, & diaphanum simplex, ali- quando, adiecto diacabulico vel electuario leniente, vt exempla curatorum ostendunt. Sic ventrem lenimus & materiam minoramus, digerimus cum syr- rupis & decoctis & purgamus cum leuibus iam dictis. Sed à vehementioribus solutiuis abstinemus, & non vtimur pilulis, vt quidam ineptus medicus (vt Guainerius refert cap. 12. de pleuritide) qui nobili pulcherrimæ iuuenulæ pleuritide affe- ctæ dedit 3 j. pilularum foetidarum cum gr. iij. diagr. quibus in syncopen sapius prolapsam Guainerius restituere non potuit: ita vt in bra- chiis eiusdem expirauerit misera. Sic & quidam alius pleuriticus cum pilulas accepisset, postea curari non potuit. Vomitus hic quoque nullo modo confert, nimis etiam pectus exagitat, & sua commotione malum augeat. Ideo & vulgares pessime faciunt, qui in pleuritide semen catapu- tiæ exhibent. At clysteres emollientes viles sunt, & statim iniiciendus emolliens, si tempus patia- tur; deinde fiat sectio venæ, vel post. Formulæ habes apud Rondeletium & alios. Hæc de euacuatione. De aliis remediis, quæ sputum promo- ueant, & intus & exterius adhibentur, mox dice- mus: quæ inquam dicta, & iam dicenda exem- plis multo illustriora erunt.

OBSERVATIO XXXIV.

De pleuritide miti benigna qua facillime fuit resoluta.

A Leida, Petri Opmeri filia, puella 14. anno- rum plus minus, gracilis & biliosa, ac raræ constitutionis anno 1565. 16. Ianuar. die, cum ingens gelu esset, & venti boreales flarent, Del- phis apud patrem habitans, vera pleuritide cor- repta est. Ad quam secundo die accitus, cum par- rum coloratum expueret, atque omnia signa pleuritidis veræ adessent, sed benignioris, atque dolor latus dextrum contorqueret, cum balneo aluum deposuisset, ac bis stercorea licet dura ex- creuisset, post duas deinde horas, cum dolor cla- uiculam ascendere, venam basilicam in cubito eiusdem lateris tundere feci, sanguine ad uncias quinque vel paulo plus extracto. Plus vero ex- trahere ausi non fuimus in puella 14. annorum, tempore valde frigido existente, & in gracili corpore. A sanguinis detractione mox dolor mi- tigatus est: & post inunctionem loci dolentis cum vnguento resumptiuo, & à sanguinis detractione sudauit, & plurimum febris mitigata est: & tunc sub noctem hordeato pro cibo vsa est. Die vero subsequenti anhelitus liberior & dolor ex toto fere sedatus. Sed quod omiseram, à venæ sectio- ne eodem die hoc iuleb. ebibit. 2℥. decoct. pector. 3 iij. syr. viol. iuuibini. 3 ℥. misce. Tertio die ab ini- tio morbi melius spirabat, vt dictum est, & spu- tum optime procedebat, licet paucum & sine do- lore, cum & materia admodum exigua videretur, & minime rebellis. Sed cum ventrem non bene deliceret, dimidium huius potionis sumpsit. 2℥. folior. senæ 3 vj. bulliam in 3 ix. decoct. pectoralis, & fiat fortis expressio, addendo syr. viol. capill. ven. iuuibini, an 3 ℥. misce. Cum dimidium huius ebibi- set, bis excreuit liquidiora. Interea ad sputum facilitandum hoc lambitiuo continuo utebatur. Recipe diarrag. frig. in tabul. syr. viol. iuuibini, an. 3 ℥. zacch. penid. 3 iij. postea & syr. capill. ven. adiectus est. pauca expuebat, sed mediocriter sudabat, & cum inunctione insensibiliter materia resolve- batur. Quinto die reliquum decoctionis lenæ sumpsit, & bis denuo excreuit: sexto die nisi cum glande.

OBSERVATIO XXXV.

De pleuritide sanguinea per spatium, deinde & per menses critica expurgatione finita.

SCHOLIA.

Quamuis autem hæc pleuritis mitis esset, hoc tamen tempore à mense Ianuario vs- que ad Martium, continuo pleuritides grassaban- tur, etiam sæuissimæ; nonnullæ quoque perip- neumoniæ, quæ in senioribus magis lethales erant, & multæ pleuritides in peripneumoniæ lethalem conuertebantur. Atque hæc omnia vide- bantur enenire ob aquiloniam constitutionem, cum & per totam hyemem & ultra decem septi- manas continuo gelu erat & glacies, & ante nati- uitatem Domini gelu atrocissimum vsque ad se- cundum diem Martij perdurans, quale tempus hybernium neque ipse vix in vita viderim. Quod tunc erant pleuritides & peripneumoniæ, nihil miratu digoum, cum antea ex Hippoc. dixerim- us ex Aphor. 23. lib. 3. Hyeme morbos laterales & pulmonis inflammationes fieri: eoque magis, cum venti frigidissimi spirarent: nam & versus orientem & aquilonem flabant, hinc dolores la- teris & pectoris increcebant, iuxta Aph. 17. lib. 3. cum aquiloniæ constitutiones pectoris dolo- rem augeant, quod & Aphorism. 5. lib. 3. ostendit. Plurimi tum temporis suamet negligentia perie- re, cum non satis tempestiue medicum vocarent, alij veronimis nasuti sibi ipsi medentes medica- mentis calidioribus (cum tamen febre acutissima afficerentur) necem quoque intulerunt. Cæterum (quod ad curationem attinet) de euacuatione iam dictum est, & de maiorib. remediis, nempe purgatione & phlebotomia; interea alia præsi- dia non erunt negligenda, quæ ad facile excrea- tionem, & ad thoracis expurgationem valent, quæ etiam diuersa esse debent, prout humor quo- que varius sit, qui pleuritidem intulerit: sic in bi- liosa confert syr. viol. iuuibini & adianthi, etiam in sanguinea ita & syr. de glycyrrhiza, de hyslopo, de passio si ex crassioribus succis origi- nem traxerit. Huc pertinent & decocta pectora- lia, & eclegmata, & epiglottida dicta de tussi & catarrho: quorum medicamentorum copiam ha- bes apud Rondeletium, Hollerium & alios præ- cticos: vti etiam de vnguentis, linimentis, foti- bus, & aliis, præsertim apud eos, qui Arabum decreta quoque sequuntur. Et sic in verâ pleuri- tide curanda, quæ per sputum vel resolutionem terminatur, curationem tertis quibusdam inten- tionibus absoluit, vñtum commodum descri- bentes, materiam diuerntes, & digerentes, mox euacuantes & sputum facilitantes & materiam ultimo resoluentes vt apud Gatenariam, tum alios videre licet. Et sic omnibus modis augmen- tum apostematis inhihent, & secundo quod flu- xum est resoluit. In his tota curatio consistit. Si vero per collectionem terminetur, supradictis quatuor intentiones addunt, maturationem, ru- ptionem, absterisionem, & consolidationem. De quibus videas Valescum & Arculanum; & quam- uis in numero discordare videantur, in re ipsa sa- tis concordantes sunt. Per exempla hæc ipsa mani- fèstiora euadent.

SCHOLIA.

Sanguineam pleuritidem minus biliosam le- thalem esse prius diximus: quamuis conside- randum veniat, quod aliquando vna cum pleuri- tide purus sanguis expuitur, venam ruptam si- gnificans in pectore, cuius curatio, teste Ronde- letio, insanabilis quasi habetur, cum & iuxta In euacuatione pleuritidis sanguineæ. Auicennam in phthisin mutetur. Sed & Bertru- tius de huius curatione meminit, dum præscri- bit ea, quæ partim leniter sputum educant & si- mul conglutinent: de quibus dictum est de spu- to cruento. Verum in sanguinea pleuritide, in qua

qua etiam albedo quædam vna cum sputo apparet, liberalius sanguinem mittimus, alio respondente, alioqui clystere emolliente præmissio. Deinde cum sanguis non digeratur, sed sua ebullitione facile in bilem transeat, incrassantibus syrupis utimur, uti & in biliosa pleuritide, sed minus tamen incrassantibus in sanguinea quam biliosa. Ventrem cum cassia lenimus, adiecta pulpa thamarindorum, & in principio utimur decoctis detergentibus & lenientibus aluum, ex passulis, prun. dulcibus, iunib. & sem. 4. frig. maior. malua & glycyrr. vngulæ caball. viol. adiecto syr. viol. postea addimus syr. capill. veneris, purgamus cum syr. ex infus. ros. pallid. & decoct. pectorali immixto, ita & in materia calida utimur elect. diatr. frig. diapenid. sine speciebus, ex quibus etiam eclegmata paramus, adiectis syr. viol. & iunibino, & si maiorem incrassationem desideramus, etiam adiciamus syr. pap. adiecto syr. adianthino, ne nimis incrasset: de quibus videas Rondeletium & alios. Potus, vnguenta & alia hic ita calida esse non oportet uti in pituitosa, & fetus magis humidi conferunt, ut dictum est prius: atque tale vel simile vnguentum. Recipe olei viol. amygd. dulc. an. 3 j. b. butyri recentis 3 j. misce. alia tamen magis conveniunt in principio, alia in statu & declinatione: de quibus omnibus vide iam dictos auctores.

OBSERVATIO XXXVI.

De pleuritide biliosa.

Vir quidam pontem auenarium Delphi pleuritide biliosa correptus erat, post vini ingurgitationem febre validissima affligebatur, cum ingenti lateris dextri dolore ad superiores costas descendente, sputum sublaum vix sanguine tinctum huic aderat, plurimum angebatur, inquietus erat, & subinde paraphrenitidem incurrebat, capite dolebat, vigilabat, manus tremulas habebat, ideo & venæ sectionem volebat admittere, quamvis alia vice per venæ sectionem simili pleuritide laborans per me curatus fuisset. Secundo die cum ad eum accitus sum, venter illi satis copiose ex sero lactis soluebatur, decocta pectoralia præscripsi, adiectis syr. viol. & iunibino, locum dolentem inunximus vnguento resumptivo, & ad sputum promouendum zacch. viol. exhibuimus, & diatr. frig. At in quarto, cum venæ sectionem nollet admittere, & dolor non sedaretur, eundem cum vellem relinquere, tandem sectionem admisit: & venæ secta ex brachio è directo loci dolentis, & sanguine copiose effluente, ad vncias fere octo satis nigro, melius habuit: quinto die peius. Sexto deliravit. Sed eidem postea copiose venter fluxit: plurimum & tunc angebatur, ut astantes ægrum moriturum existimarent. Septimo tamen die facta est crisis per ictum, & totus croceus evasit: at post sudores & copiosas deiectiones urinæ, cum sputa satis commode exirent, decimo quarto die sanus factus est.

SCHOLIA.

Quod septimo die icticus & postea totus croceus evasit, bonum fuit signum: Nam & Hippocr. (ut etiam à Celso citatur libro tertio, capite 23.) pronunciauit, post septimum diem febricitanti ægro Regium morbum supervenire, tutum esse, mollibus tantummodo præcordiis subsistentibus. Diocles ex toto, si post fe-

bre moritur, confirmavit etiam prodesse: si post hunc febris, occidere: Hac autem pleuritis, cum materia esset biliosa, citius terminabatur, cum eius terminus iuste sit 14. dies, ut alias dictum est, quamquam in Anaxione ad 34. prius soluta. Quod ad curationem attinet pleuritidis biliosæ, si facies sint indurata, molli clystere utimur, ex decoct. malua, betæ, viol. bordei ad lb. j. cui adiungimus cassiæ, zacch. rubr. an. 3 j. olei viol. 3 iij. salis 3 j. misce. alioqui si enema abhorreat, 3 j. cassiæ propinamus, cum decoct. viol. borag. hordei mund. pass. & iunib. & sebesten, venam secamus, sed non copiose, ob bilem: hic autem, cum sanguis nigrior efflueret, ad 3 viij. In pleuritide à bile post cachexiam, si ob imbecillitatem vel ætatem sanguis mitti non possit. Rondeletius leniter purgat cum decocto aliquo vel iam dicto, adiecto syr. ros. solutivo. Damas & syr. viol. cum aqua hordei, melonis aut cucurbitæ. Syrupus ex succo viol. magis lenit: & de cucurbita biliosi sanguinis feruorem exstinguit, Eclegmata quoque inspissantia in principio conveniunt supradicta, vel in hunc modum parata. ʒ. syr. iunibino viol. an. 3 iij. diatr. frig. 3 iij. zacchari penid. 3 j. misce. Topcis quoque remediis commode utimur, ut fote ex decocto clystere, vng. resumpt. vel pectorali ex adipibus, adiectis oleis viol. & amygd. dulc. In statu vero quæ magis resoluunt, & in declinatione quoque ut ad longum videre licet apud Arculanum & alios auctores. Nunc ad exemplum pituitæ pleuritidis accedamus.

OBSERVATIO XXXVII.

De pleuritide pituitosa.

Mulier utcumque pituitosa, hyeme quoque asperissima, pituitosam pleuritidem experita est, cui dolor lateris sinistri paulo remissior aderat, non ita pungens, ut in præcedente, febris quoque mitior, quamvis continua & quotidie affligens: pulsus aderat paulo tardior ac mollior, sputum spumofum, viscidum atque album. Ad quam vocatus primo die, cum aluum non deponeret, clysterem iniiciendum præscribo, in hunc vel similem modum. Recipe folior. malua, betæ, parietar. mercurial. summitatum caulium an. m. j. flor. meliloti. p. j. fiat decoct. pro lb. j. in qua dissolvat cassiæ 3 j. zacchari rub. 3 b. biveræ picæ 3 iij. olei communis 3 iij. salis 3 j. b. fiat clyster. mox facibus eductis, eodem die per chirurgum venam secari iussit ad vncias sex ex vena media, cum basilica minus appareret in brachio sinistro. Postea & hunc syr. propinavi: ʒ. syr. capill. ven. de liq. an. 3 j. syr. viol. oxym. simpl. an. 3 b. cum 3 ix. decoct. pectorali fiat inlebe. pro iij. dosibus: purgavi bolo sequenti. ʒ. elect. lenitimi. 3 vj. diacatholici 3 iij. arabici trechis. 3 b. fiat bolus asperso zacch. Ad expectorationem hoc eclegmate prius utebatur. Recipe syr. capill. ven. 3 iij. syr. de liq. 3 j. zacch. penid. 3 b. misce. postea etiam utebar, locb. de pino, & locb. samo, addito syr. de liquir. Postea etiam ob materiam viscosam, syr. de hyssopo ad maiorem incisionem. Fotu quoque usus sum ad dolorem sedandum (qui potius gravior erat quam pungens) ex decoct. althææ, malua, flor. chamæm. meliloti & fenugr. commode utebar postea & hoc linimento. Recipe olei amygd. dulc. chamæm. meliloti, lilacei. an. 3 b. oxym. gallicæ, anatis, butyri recentis, an. 3 b. cere q. s. fiat vng. quibus remediis hæc probe convalevit.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

In pleuritide curanda, ut iam ostensum est, aliter procedimus, si ex sanguine bilioso vel aquoso fiat, aliter si à crassiore & viscosiore sanguine vel pituitoso. Ab his duobus humoribus pleuritis frequentior sit, rarissime vero à melancholico humore: à quo si fiat (ut etiam dictum est prius) raro aut nunquam curatur, & fere semper in tabem transmutatur, ut euidam Petro Guilhelmo cuparum fabro Roterdamensi evenit, ex cuius adibus, cum foris cupas igne torreret (ut moris est) sub tempore ventoso, ingens incendium ortum est anno 1563. 10. Iulij die, ut tertia fere pars urbis Roterdamensis conflagrata fuerit, unde coactus Desfos accedere: cui, anno 1566. mense Maio ad aqueam fossam decumbenti ex pleuritide à melancholia contracta, debili existenti, sanguinem ex vena basilica è directo loci dolentis extrahere feci, sed minus copiose ob debilitatem. Die vero sequenti cum 3 j. elect. lenitimi in bolo exhibuissim, aluum mediocriter deposuit: & locum dolentem inunximus vng. resumpt. & eclegmata ex conf. viol. borag. syr. viol. & borag. & capill. veneris fumebat, quibus sputa, sed nigra, expectorabat, & statim bene habere cepit, ita, ut amplius mea opera sese minime indigere diceret. Quamvis nonno die rursus oborto insigni dolore me reuocauerit: qui cum nullo modo neque fomentis, neque aliis remediis sedari posset, iterum sanguis tractus est, sed niger & valde corruptus, idque in mediocri quantitate: à qua venæ sectione iterum melius habuit, & febris multo mitior facta est, & dolor fere totus convenit post venæ sectionem sedatus: adhibitis etiam eclegmatibus, ad sputi facilitationem. Sed cum per decimum quartum diem non ex toto per sputum solueretur pleuritis, nullis deinde remediis inquantibus & cum melancholicus in dies debiliior fieret, suppurationem metuebam, & tandem tabem. Et ita circa 20. diem purulenta exspuebat, & paulatim in tabem mutata est pleuritis, & tandem ad hecticam devenit febrem, & mortem multo antea prædiximus, sub finem suborto vomitu bilioso ex atra bile fluxu ventris subsequente: & postquam sex septimanis decubisset, viribus consumptis, vitam finit. Sed inter curandum præcipua quoque ratio habenda est symptomatum: quia plerumque in pleuritide solent esse: vehementis dolor, sitis molesta, fluxus ventris, vigiliarum instantia, subeth, seu caros, anhelitus difficultas, mentis alienatio, alvus ficta, syncopis, calor ingens, fluxus sanguinis narium, alcola. In principio dolor lateris aliquando fere tollitur, qui si non iuvat, sæpe venæ sectione prodest. Sic ego memini textoris cuiusdam Alcmariani, cui agnomen Spanckius erat, viri, si quis alius, voracissimi: qui circa annum ætatis suæ trigessimæ sextum, in pleuritidem gravissimam incidit, cum febris acuta putrida, ita ut etiam vermes deiceret. Cum dolor ingens esset, quarto die prius accitus sum, & sponte aluum deieciat, & tonsor, cum plenilunium esset, & luna in Geminis deuolueretur, venam minime secare audebat, nos tamen sanguinem extrahere iussimus in magna copia à qua sectione venæ dolor sedatus est: & aliis prædictis utens commodis, 1. die curatus est: quanquam ad tempus à sectione venæ brachium rigidum permaneret, quod tonsor putabat factum ob lunam brachium

respicientem. In morbo vigente, Astrologia locum non habet. Verum postea rigiditas illa fere cessavit. Quidam etiam hic utuntur cucurbitula, sed post septimum diem, si eodem modo dolor persistat: Et sic Aëtius cucurbitulam lateri affligit: manifestissima enim in pleuritis (ut ipse refert) utilitas ex cucurbitulæ appositione apparet. Celsus vero ubi lenior siue vetustior fuerit lateris dolor, ad cucurbitulas confugiendum esse (ante summa cute incisa,) præcipit. Verum, ne in errorem incidamus, in cucurbitularum adhibitione, servanda erit Alexandri sententia: qui dixit commodius & tutius esse hac uti curatione, in quibus parva copia est vacuanda, nam per eam, quod in affecta parte continetur, ex alto extrahitur: atque hoc facto mirari licet, quomodo inde etiam dolor, qualiscunque fuerit, licet vehementissimus, conquiescit, ut neque fomento, neque alio præsidio indigerit. Sic ego in alio quodam textore, octavo die prius accitus, non in loco affecto, sed in naribus cucurbitulis, cum scarificatione usus sum: cui in principio vena secta fuerat per alium medicum in brachio opposito, & nunc in debili viro existente cucurbitulas admoui, qui & in 11. concocta exspuebat, & in 14. sanguis è naribus fluxit, & cudo restrinatus fuit. Is quidem sanguinis fluxus criticus genus, cum esset, nullo modo erat restringendus, nisi quando non, admodum excessisset: idem, etsi non sit criticus, sed propter exuberantiam sanguinis confert: imo si non satis excerneretur, venæ sectio utilis esse posset. Propterea si in die critico fiat, post signa coctionis, ut hic, bonum præfagit, nec inhibendus, nisi vires ad extremum deiceret, tunc restringi potest: & quando fit ex vehementi ebullitione, cum exstringentibus & ebullitionem sedantibus inhiberi poterit, ita tamen ut non compingatur materia, & sputum exhibeatur. Si in principio contingat, ex multitudine materiæ à natura regulatæ, & anhelitus inde minoretur, & febris vehementia cesset, utilis quoque esse potest, ut non sit inhibendus: si contrarium eveniat, & symptomata non allevientur, contingit plerumque ægrum mori in quarto. Verum quod ad dolorem lateris attinet, si is, tum tussis, & difficultas anhelitus, cum expurgatur materia, vel cum iam ad maturationem degenerit, & ad sanem reducta fuerit, perseverent, vel augeantur, pessimum signum est. Nam in principio minus timorem incutiunt hæc: neque in generatione puris aut saniei, quando dolores & febres magis accidunt, ut Aphorism. Hippoc. habet. Sed in aliis temporibus declarant materiam esse corrosivam, & valde pravam ac malignam: & tunc festinandum est ad mitigationem horum symptomatum in causa calida, cum syr. viol. & aliis, quæ ad tussim valent, & embrochis, & fotibus dictis, cum oleo amygd. dulc. viol. & ping. gallicæ & similibus in frig. addemus aliquid olei lilior. prout causa exigit, cum anodynis quæ dolorem mitigant. Sitis exstinguitur cum aqua hordei, citrulli, melonis, cucurbitæ, peponis, ut de siti & paraphrenitiâ dictum est: Vigiliæ cum syr. viol. pap. nenuph. & inunctionibus sæpe dictis: cauendo tamen siptica etiam in paraphrenitide: & sic potius utemur iis, quæ materiam auertunt: ut sunt frictions extremorum, & lotiones: de quibus vide Mesuem. Caro seu subeth occurrat odorando acetum, vel tempora & frontem aceto liniendo, clysteres quoque & frictions fortes, & vincula

Pet. Forest. Tom. 2.

Aluus a-
stricta.
Aluus ni-
mii fluens.

inicta, & ventosæ scapulis appositæ profunt. Si aluus stringatur, lenientibus clysteribus mollienda: aluus si nimium fluuat, considerandum nunquid in principio morbi sit: quod duobus modis euenire potest, aut ex multitudine materiæ natura fluxum regulante (vt ita dicam) neque tunc vt de fluxu sanguinis narium dictum est, restringi debet: nam ex tali fluxu sequitur anhelus facilitatio & febris delitescencia, & ideo non est malus. Aut est propter multitudinem materiæ, præter hoc quod regulatur à natura: imo est (dicente Arculano) sicut regurgitans, & malus est, præsertim cum non sedatur per ipsam difficultas anhelus, & febris inflammatio: tunc enim forte superuenit mors in quarto vel ante: neque hic est restringendus, nisi modum excedat, sed potius obuiandum erit malæ qualitati humoris, siue occulte siue manifeste impediens naturam, vt regulare non possit: & natura seu virtus ipsa fouenda vt non cadat. Si vero acciderit fluxus in fine morbi, aut morbo procedente, talis quoque secundum alterum dictorum modorum, aut criticus expellens id quod noceat, vel separans id quod bonum est post debitam coctionem: & subsequetur ægri salus ac incolumitas, neque est restringendus, nisi mensuram excederit. Vel accidit ex debilitate membrorum naturalium, videlicet contentiua & digestiua virtutis deiectione atque prostratione, quem & mors subsequitur. Cui subueniendum roborando vtramque virtutem per interius assumpta & exterius admotæ: ita tamen vt hæc ipsa non inhiabant sputum, & ita conuenit syrupus myrtinus, & topica adstrictoria super ventrem. Si in principio contingat, & magnus sit, præscribemus poriones, quæ neque ventrem irritant, neque expectorationem impediunt, ex decoct. hordei, ex sem. 4. frig. maior. anisi, cum syr. capill. ven. & myrtini. Et ita quoque in principio, si vires debiles sint, neque sanguis demissus est, abstinemus à potionibus, & topicis remediisq; ventrem roborabimus. Quod ad syncopen attinet, diligenter considerandum, quæ ratione contingat: nam potest euenire, quod rupto apostemate vel abscessu nondum maturo, acuitate materiæ, vel eius multitudine rumpatur, ubi sit collectio, & ad cor materia subito ruat: ac tremorem & syncopen inferat, & æger illico intra diem moriatur, vt aliquando scetauimus, quemadmodum etiam narrat Guainerius, duabus nobilissimis matronis euenisse, sed hæc ad transmutationem pertinent, de quibus suo loco. Vel contingit ex virtutis debilitate: cui subueniendum exhibendo modicum vini dulcis lymphati, cum aqua hordei vel cum iure restaurante. Si vero fiat raptu humorum aut vaporum ad cor, auersiones imperandæ, frictions, vincula, tum alia superius dicta: & cor roborandum, ac spiritalia membra odoribus bonis reficienda, quæ & propriis capitibus de syncopa desumenda. Si materia ad caput repat seu nervos, adhibendæ frictions in latere contrario, clysteres iniiciendi ad auersionem. Si nervi dolere incipiant, vel contrahantur, inungendi sunt oleo chamæm. lior. vermium terrestrium, & lana succida inuoluendi. Si aleola ex vapore febrili & humore putrido, vel ex pectore membrisque spiritalibus sursum sublati vaporibus, vel ex pulmone contingat, iisdem vtere, quæ caput. De aphthis dicta sunt: valde sriptica interim cauendo, ne iis sputum impediatur, quod multo aphthis deterius

II
Syncope
quomodo
succurren-
dum.

Si materia
in caput vol-
uerit ir-
ruat, quid
faciendum.
Quibus ale-
olis prospi-
ciendum.

esset. Lac in ore detentum, vel gargarisatum, quo nos vtimur, conuenit, & gargarismi ex decoct. iuinbar. diamor. & similibus, quæ & aphthis profunt, neque sputum retinent. Hæc satis dicta sunt de accidentibus corrigendis in pleuritide. Nunc ad alia eiusdem morbi exempla progrediamur.

OBSERVATIO XXXVIII.

De pleuritide in prægnante curata.

Dictum est prius, morbos acutos in prægnantibus esse periculosos: attamen præter prægnantes paulo superius dictas, Maria Theodori, vxor illius Isbrandi Chirurghi loripedis Alcmariani, mihi familiarissimi ac coactanæ, in quarto mense prægnans, pleuritide sæua correpta, per me in hunc modum curata fuit. Hæc cum sub finem mensis Septemb. an. 1555. pleuritidem ventram incurrisset, antea per duos dies, cum puerum à terra subleuasset, in dorso dolorem patiebatur maritus dislocationem in lumbis esse suspicabatur, quamquam dolor paulo post euasit, licet ab eo tempore vrinam tinctam meieret sine febre, neque decumberet. At peractis duobus diebus, febre acutissima cum dolore lateris dextri admodum pungente corripit. Atque omnia illa aderant, quæ in vera & sæua pleuritide adesse solent: difficultas anhelus, dolor punctorius, tussis valida, & pulsus ferrinus. Ad eam ingressus, oleo amygd. dulc. chamæm. & anethino locum affectum inunximus, & sacculum ex floribus chamæmillæ & sale tosto apposimus, cum & ipsa tum maritus ventositatem esse existimarent. Verum cum iis dolor non sedaretur, sed etiam venæ basilicæ eiusdem lateris in cubito, scilicet dextro, ad vncias fere sex, cum niger efflueret, & inter fluendum dolorem mitigari diceret, dolor plurimum sedatus est: ita vt deinde post tres horas in suauem somnum incidere. Secundo die, cum reuerfus essem, dolor lateris ex parte sedatus: parum expuere cepit: vnde ego morbi breuitatem expectabam, ex Aphor. 12. lib. 1. Si sputum facili apparet, morbum breuiat. Quare & ad sputi facilitationem & febrim, decoctum sequens præscripsi, cum satis per se aluum deponeret. *℞. rad. bugloss. liquir. an. 3 j. pessul. ab arill. repurg. p. j. coquantur in aqua communi pro lb j. zaccharo dulc. syr. iuinib. (erat mulier imbecillis, propria natura biliosa, & raræ texturæ) 3 j. syr. de liquoribus zacchari penid. an. 3 ss. misce. & in ore tenebat, sa-
pius deglutendo, ad tussim, Zacchar. candi dictum. At cum post meridiem reuerterer, rursus dolor lateris auctus est, ac febris innaluit: nec aluum deposuit, nisi glande irritata. Forum pro loco affecto præscripsimus cum spongia. *℞. rad. althææ mundat. 3 i ss. folior. viol. malæ cum toto. flor. chamæm. meliloti, an. m. j. coquantur in aqua, & fiat fortis: quo dolor iterum egregie sedatus est, & melius expuebat. Nutriui eam panno asato dulci, zaccharo aspero, sub noctem ne factus deesset. Optime habuit ad mediam noctem; sed deinde inquieta, parum dormiuit. Tercio die sputum quod in paropside reueratur erat, altum & quod coctum apparebat, & bene exibat. Sed mox agitatio quædam circa præcordia pectusque & angustiam sentiebat, cum anhelitus difficultate & calore**

calore intenso. At vrinam copiosam sed croceam instar ictericorum emisit, pannum lineum valde tingentem, ex hepatis calore & bilis ebullitione (de qua re latius in scholio) ideo tabulæ præscriptæ sunt. *℞. specier. diatræg. frig. absque campbo-
ra 3 j ss. Specierum triosan. 3 i ss. dissoluta in aqua
cichor. & vngulæ caball. (tam pro hepatis calore, quam sputi facilitatione) & aqua viol. adiecto
zaccharo albiss. q. s. fiat confectio in tabulis. Quarto die melius expuebat. Mane iterum sputum vrebatur; post meridiem eo abstinens, cum calor febrilis vehementior esset. At nocte præcedente quartum diem decretorium (licet dolor lateris cessaret, sed dolore magis crescente circa pectus) & circiter horam decimam noctis cum angustia & sputi incrassatione, symptomata adeo increvere, vt astantes illam morituram putarent, atque me inscio sacra inunctione eam more solito munirent, licet antea prædixeram, noctem illam, diem decretorium præcedentem, grauiorem fore. Cæterum post mediam noctem sudor irruit per pectus primo, deinde per totum corpus, quasi vniuersalis; à quo alieniabantur, ita vt mane optime dormierit, & melius habuerit. Quinto die plus tussiebat, sputo nonnihil recento ob sæuora accidentia prægressa: sed dolore inuncto vnguento pectorali, & sæpius exhibitio syr. de liquir. melius expuere cepit & concocta. Verum cum aluus non responderet, balano fæces emisit, & decoctum sequens sumpsit. *℞. glycyrrh. rasæ 3 ss. folior. viol. malæ cum toto, borag. bugloss. hyssopi, an. m. j. sem. anisi 3 i ss. prun. damasc. dulc. num. ix. ruar. passul. ab arill. repurg. p. j. fiat decoct. in sero lactis, & colatura zaccharo candi dulcoratur, quo sumpto bis excreuit liquida. Sed cum ob serum lactis, vt illa existimabat, nauscam haberet ac ventris tormina, metuebat abortum: ideo amplius non exhibuimus. Post secessus dictos melius habere cepit. At à meridie, me inscio, comedit tria vel plura cochlearia lactis cum oryza, pectus inde constringebatur: sed eius vltim inhiabentes, sorbituunculas & poma assata concessimus; & denuo sputa melius exhibant. Sexto die copiose minxit vrinam croceam, febre magis inclinante. Dietam auximus ob sctum, & syr. liq. lambabat, pectore inuncto cum vngu. pectorali; & vrina postea minus tincta videbatur. Septimo melius adhuc habuit, & vix febrim sentiebat & cessauit difficultas anhelus, mox & lateris ac pectoris dolor. Tunc ad ius veruecis, cum pulliis abhorrebat, deuenimus, optima hypostasi in vrina apparente, etiam minus tincta. Octauo die febris quasi nulla fuit, vrina minus tincta, valde crassa & subsidens: bene expuebat, & sponte aluum deponebat, & excrementa naturalia spectabantur. Nono die sanitati perfecte restituta est.**

SCHOLIA.

Pleuritis in prægnante, vt ante dictum est, non sine periculo est, quamuis hæc euaserit: cum & Hippocrat. prædixerit mulierem vtero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, lethale esse. Causam huius declarat Galenus in Commento. Sed sanguine emissio (qui camen, Hippocrate teste, Aphorism. 31. lib. 5. facile abortum facit) melius habuit, cum & secundum eundem, & in quarto mense purgatio, imo magis sine periculo (vt alias ostensum est) missio sanguinis conferat.

Pet. Forest. Tom. 2.

Et quamquam hic vrina crocea in tertio icteritiam notabat, non tamen illam, quæ totum corpus inficit colore croceo, sed tantum vrinam ex calore hepatis, non tamen ex inflammatione aut apostemate hepatis, nam nullus tumor durus aderat, & ideo hæc icteritia non fuit ita indicatoria, cum totum corpus non tingeret, sed potius ex calore hepatis: neque fuit ex tumore aut obstructione, quia subito venerat, cum nec tumor exterius sentiretur, neque grauitas aliqua circa hepatis regionem. Dolor enim lateris, qui aderat, ad mammillam dextram tendebat, deinde ad partes superiores. Vnde quoque non fuit tanta inflammatio in hepate, aut apostemia, sed potius ebullitio caloris, quæ vrinam tingebat, vel si velimus vrinam illam fuisse criticam, id quidem potest esse: nam nos alias diximus in obs. nostris de febre, etiam ictericos ante septimum in febr. euasisse: idem testatur & Amatus centur. 3. cur. 49. Ideo neque ille Aphorism. 62. lib. 4. superficie tenus intelligendus est, quod ante septimum icteritia accidens mala sit. De his vide loca citata. Sed hic aliquis dicet: quomodo vrina flaua, & sputum album? potest pleuritidis commixta esse cum calore hepatis & ebullitione bilis in ipso fonte: vnde vrina solum tincta. Sed sputum in pectore non flauum erat, cum ibi bilis non multa esset, vt sputum suo colore inficeret. At mulier cum videret lotium ita citrinum, metuebat sibi mortem, cum pater ictero obiisset, & mater pleuritide, & duo fratres ex phthisi. Sed sputo bene exeunte, illam optime sperare iussimus, & ita nono die absque abortu quoque, de quo etiam metus erat, fuit curata.

OBSERVATIO XXXIX.

De pleuritide in peripneumoniam conuersa: & quomodo ea fuerit curata.

Pvella famulam agens, annos 23. nata, admodum robusta, nigriuscula & bene carnosâ, febre cum horrore correpta fuit, quæ quidem acuta & continua erat: in latere sinistro cum doleret cum tussi, & vix pauca expueret & pulsus durusculus esset, & primo die dolor neque vehementis esset, sed secundo die magis & punctorius, accitus secundo die cum per se excrementa deposuisset, in cubito sinistro basilicam tundere feci, sanguine ad vncias octo extracto: quo & dolor, cum vera pleuritide affecta esset, nonnihil sedatus est, & anhelitus paulo liberior factus. Interea & vnguento resumptiuo locus affectus inungebatur, & commoda lambitiua sumebat. Tercio die accidentia dicta magna ex parte fuere sedata, quamvis capitis dolore afficeretur, & minus dormiret. Tempora inuncta fere vnguento populeo, & oleo nymphae commixto: & hordeatum ad nutritionem exhibitum. Quarto die dolor lateris iterum vehementior, febrisque validior cum maximo aestu totius pectoris. Sed rursus latere inuncto, dolor nonnihil mitigatus est, qui & pectus magis inuasit. Tunc & liquida per se excreuabat. Quinto, dolore lateris punctorio cessante, & cum parum expueret, pituitosum quid ac subflauum in principio vix cruentum: febris postea aucta est, & anhelitus difficultas increbuit, malæ ac oculi rubere incipiebant, & dolor grauians totum pectus occupauit, & sexto die in pectore grauiora omnia sentit; pulsus vndoso, vt pleuritidem

S ij in

in peripneumoniam conuertendam conicerem, cum & cogeretur in dorso iacere, minusque in latere materia ad pulmonem reperet, cum & sputum cum murmure quodam ex pectore prodiret. Quinto die lenitium medicamentum cum decocto pectorali exhibitum: quo satis aluum depoluit. Septimo die, uti praediximus, pleuritis in peripneumoniam commutata est: & cum aluum non redderet, balano imposito excreuit. Octauo die pessime habuit, grauissimis accidentibus oppressa: vigilabat, noctem inquietam egit, nonnihil delirabat: pectus inunctum oleo amygd. dulc. & liliaceo, eclegmata sumpta & decocta pectoralia ebibita. Nono die quamquam sputum utcumque expelleretur, post meridiem pessime habuit, facram synaxin sumpsit, & pro deplorata habita est. Sub noctem tamen, cum redirem, pulsum altum reperi & valde inaequale: horrorem quoque sentiebat in lumbis & circa inguina & inum ventrem: delirabat, plurimum angustia afficiebatur. Ego vero sperabam crisin futuram (vrina concocta apparente prius, nunc perturbata & nigriuscula, qualis plerumque meitur cum menses expectantur, sputo quoque concocto exeunte, quamuis cum maiori molestia) per menstruas purgationes, quod equidem euenit: nam nocte subsequenti aperti sunt menses, & largiter fluxerunt, & paulatim anhelitus difficultate cessante, ac tussis delitescente, & febre euanescente, 14. die, magno cum nostro honore, sanitati restituta est, non solum a pleuritide maligna, sed etiam a pulmonia, mensibus largiter profusis, neque minus miratu dignum erat, cum etiam sanguine per nares effluente, praeter mentem medicorum, quaedam lethales peripneumoniarum (teste Aetio) sanatae fuerint.

SCHOLIA.

4. Quomodo pleuritis tranfit in peripneumoniam & eius nota.

Peripneumonia ex pleuritide succedens nota.

Pleuritis quandoque in peripneumoniam tranfit, modo subito, ut in hac puella contigit, quum scilicet humor facilis est ad motum, & pulmo ad sceptionem aptissimus, modo paulatim id fit, quando scilicet contraria adfunt, ubi vero tranfit pleuritis in peripneumoniam, ex Galen. quarto de causis pulsuum, dolor cessat lateris. Et licet pulmo sit insensibilis, sentit gravitatem quandam aeger circa pectus & durities & ferrinitas pulsus cessat, & fit mollis, & inaequalitas maior euadit, quia materia colligitur in membro magis cordi propinquo: & ideo magis opprimitur virtus, constrictio anhelitus augetur, febris incrementum, & accidentia peripneumoniarum succedunt, de quibus etiam latius capit. proprio. De pulmonia dicemus. Et quamquam haec nostra puella euaserit, plurimos aegros vidimus succumbere, vnde etiam recte dixit Hippocrates. Aphorism. 11. lib. 7. a morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. His enim dictis, inquit Galen. in commento. Hippocrates innuere voluit, peripneumoniam vehementiorem & maligniorem morbum esse pleuritide: nam morbo lateris recedente inflammatio pulmonis malum: fit enim transmutatio ad maiorem & periculosiorem morbum, quia pulmo propinquior cordi locum obtinet quam pleura, & maiorem colligentiam habet pulmo cum corde, cum magis spirationi deseruiat, & ob hanc causam pulmo inflammatus magis laedit cor, quam pleura, dicente Galen. 4. de presig. ex puls. cap. 2. Celerrimam

cordi & omnium maximam noxam dat pulmo, & maiorem difficultatem spirandi efficit, & maiorem angustiam inducit, teste Galen. 4. Aphor. comment. 34. & ita siue pulmonis inflammatio laterali morbo superuenerit, siue laterali morbo abeunte, ipse in pulmonis inflammationem tranfmuetur, semper malum est: quamuis peripneumonia in pleuritidem minus mala est. Difficultas tamen Galenus admittit peripneumoniam in pleuritidem conuerti, quod priusquam materia a pulmone in costas transeat, aeger strangulatione pereat, attamen fieri posse, quamuis difficultas, idem admittit 7. Aphorism. 11. de qua re ad longum videas Benedict. Faurentin. praepceptorem meum. Ceterum quomodo peripneumonia curatur, postea dicturi sumus, cum de pulmonia & inflammatione ac peripneumonia agemus: vnde autem quidam eodem modo curari ut pleuritidis, nisi quod magis sputum subilantia sint exhibenda in pulmonia, & maior sollicitudo in mundificando sputum: & medicamenta, iuxta Auicennam, quae exterius admoventur, magis in profundum transeant: de qua re, vide Arculanum & alios auctores, & sic si ad pulmonem pleuritidis transeat, peripneumoniarum curationi intendendum. Interea quod ad venae sectionem attinet, si peripneumonia ex pleuritide accidat, si in principio pleuritidis sanguis sit detrahitus, & timeatur magna debilitas, tunc venae sectio non erit iteranda, vel si ab alio chronico morbo, vel ab angina aut pleuritide fiat iuxta Rhaf. 4. Continentis, & Paulum & Gradum supra Rhafem, & commendant: tunc potius clysteres & cucurbitulas cum scarificatione supra pectus, de quibus videas Arculanum. Valeseum & alios auctores, quamuis, ut alij sentiunt, si in principio non sit demissus sanguis, & vires adhuc consent, vel in principio non satis extractus sit, in sanguinea extrahi poterit. In hac famula abstinuimus a secunda sectione, debili existente & in affectu frigidiore, & hyberno tempore. Quod ad reliquam curationem peripneumoniarum attinet, postea dicturi sumus. Nunc & pleuritidis exemplum adferamus, quae ad suppurationem peruenit, & quomodo illa ipsa curata sit.

OBSERVATIO XL.

De pleuritide conuersa in suppurationem.

Scritbit Fernelius doctissimus, ex destillatione squenquam in veram pleuritidem posse incideri: quod equidem filia Iodoci Berendrecht annu 14. agentis euenit, admodum gracili, extra murum habitanti Delphis, cum septimus dies esset, quo laterali morbo correpta esset, antequam ad eam accitus essem, & sputa vix exierent ob debilitatem; sanguinem in puella prius valetudinaria & longa tussis laborante, mittere non ausi fuimus: & cum dolor neque fotu, neque linimentis & aliis commodis remediis non recederet, neque resolveretur, & in loco fixo maneret, mihi suspicionem praebuit futurae suppurationis, cum febris ac dolor auerterentur, & etiam in aphthas incideret. Quare ad promouendam suppurationem, emplastrum praepceptoris mei Benedicti Faurentini ad maturationem faciens, in eius Empirica descriptum, ut loco affecto apponerent, consului quod ex foliis maluae cu radice viol.

& radice althaeae ac lilior. alb. & enulae ac flor. chamem. & meliloti constabat, bullitis ac colatis, & adiectis farina scenugraeci, frumenti, & in fine exiguo fermenti, pingued. porci, butyro, & oleo communi ad impinguandum emplastrum & decocto sicum, vuar. pass. liq. rad. maluae, althaeae, intus vtens, zaccharo adiecto: tum aliis commodis remediis post quatuordecim dies: dein aliquot diebus interiectis, dolor cepit sedari, & erosa membrana ac perrupta sanies non admodum multa in pectus collecta est: tandem cum aptis remediis saniem expurgantibus ante quadragesimum diem curata est, pure paulatim per bechica medicamenta & eclegmata excreto, ut in tabem non tranferret, consului statim ab eruptione, ut ter quaterue in die naturali aquam hederæ terreftris (post decocta hordei, mellis ros. syr. viol. & insus. ros. communium, & alia eclegmata pectus repurgantia) ad 3 iij. pro vice sumeret, id enim, iuxta praepceptorem meum loco citato, disruptum apostema plenitudo a sanie repurgat, ne ex empyemate in tabem aget incidat.

SCHOLIA.

Dictum est prius, si pleuritis in 14. diebus non resoluatur insensibiliter, vel sese mundificando per sputum, tunc tranfit in suppurationem, iuxta Aphor. 8. lib. 5. Quicumque morbo laterali laborantes in 14. diebus non repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur: materia enim artis beneficio vel naturae si non absoluitur, in pus vertitur, atque erumpens pelliculam intrinsecus costas tegentem in thoracis cavitatem intrat, & aliud genus morbi gignit, ut Galenus tertio, De caus. pulsuum, capit. 7. & 5. De locis affect. cap. 2. & constit. artis medicae, & 1. Aphorism. 12. plenius enarrat: licet rarius materia forte ante collectionem vel melius post collectionis ruptionem; defluens per vesicam vel ventrem exoneretur: quemadmodum etiam enarrat Amatus centur. 3. curat. 64. de quodam mercatore Arimensi, qui pleuritide affectus per lotium saniem quinto die emisit, & in septimo a pleuritide euaserit: Idem Beniuenius narrat de abditis rerum causis. cap. 43. de quodam Antonio; in quo cum pleuritidis ad maturationem peruenisset, euacuato per vrinam pure, penitus sanatus esset. Sed hac in suppuratione raro contingunt, cum potius per sputum expurgentur. Ideo pleuritici post collectionem membrana disrupta, nisi in 40. diebus (iuxta Hippocrat. lib. 5. Aphorism. 8. & Galen. locis iam citatis) per sputum repurgentur, in tabem transeunt. Ideo diligenter signa notanda, quae suppurationem futuram indicant: si enim dolor fixus in loco manet, (ut in hac nostra puella contingeat) vel etiam incendatur vna cum febre, haud exiguum indicium est futurae suppurationis: sputum praeterea non ita procedit in pleuritide, quae suppurari debet, aut pauca omnino est, quod excernitur, illudque maxime sanguineum, nequaquam vero malignum: & ita magis pleuritides & proprie sanguineae magis suppurantur, & pituitosae minus. Non desunt tamen alij, ut Gradus, qui etiam volunt in frigida saepe suppurari. Vnde, haec pleuritis a destillatione orta, licet magis ab humore pituitoso: credo id euenisse ob salsedinem in pituita admixtam, & acrimoniam habente. Vnde corrode-

Pet. Forest. Tom. 2.

bat membranam, & licet materia pauca, citius rupturam fecit: nam circa septimum diem a collectione, ex signis praedictis, suppurationem metuimus: & huius coniecturam fecimus ex Hippocrat. 2. prognost. tex. 52. sic dicente: Si dolor perdurat, & nullis auxiliis sedatur, sed etiam naturae ope per sputum, expectanda est suppuratio. Intellige, si nihil exitiale appareat, puta, nec vires inuadant, nec alia signa praua: sic enim mors esset expectanda. Ratio est, quoniam collecta est plurima materia in parte, quae etiam, cum non posset a natura educi per conuenientes vias, abscessum per faciliores partes molitur, distumpitque membranam, nisi dicas disrupti multitudinem & acritudinem humoris distendentis, & eam erodentis. Nam in ea, quae rite solui debet, pleuritide, semper excernitur, & excretio multo amplior fit in dies, adeo ut multo plus excernatur quam influat. At in hac, seu nihil excernitur, siue exiguum pra multitudine, necesse est multum colligi, & tandem disrupti. In hac nostra puella 7. die a collectione, facta est: neque mirum, cum & Iacchinos meminerit se vidisse aliquando in tertia factam praefluxum multitudinem, & cum in praecedente morbo vis esset inuadida, praefatus cito periit. At nostra haec puella licet prius destillatione affecta facilius in tabem transisset ex suppuratione, tamen ante 40. diem repurgata, aptis praesidiis curata fuit, neque in tabem tranfit. Ideo non reseruatur tota materia, quae ad collectionem deducitur, ad vnam criticam expulsionem, ut quidam putant: verum aliquando pars materiae per tempus sensibiliber resoluatur per sputum, postea alia pars collectionem facit: & ubi iam rumpitur abscessus, paulatim etiam per sputum excernitur, & repurgatur intra 40. dies, & si non perfecte repurgatur, tunc fit tabes. Quum vero iam fit suppuratio, certa adfunt indicia ex rigore, qui necessario omnes internarum partium suppurationes comitatur. Pulsus praeterea suppuratorum in his apparere incipiunt, qui prorsus conspicui sunt, dum facta suppuratio est: quam monstrant & dolor qui minuitur, & febris & respiratio, & virtus. Principium autem collectionis habetur ex vehementia doloris & difficultate anhelitus, & constrictione eiusdem ac febris vehementia, & vigiliis, mentis permixtione, & prauitate, quae in loco sentitur, & adest tunc tussis sine sputo, ob materiae inobedientiam, & velaminis spissitudinem, & virtutis debilitatem. Eadem fere habent & Hippocrates & Gale. 2. Prognost. & Alexander Trallianus cap. De purulentis. Nam dum pus conficitur, dolores, ac febres accidunt, magis quam iam confecto, ex eiusdem Hippoc. sententia, Aphor. 47. lib. 2. Adest & tunc grauitas pectoris, tussis valida & sicca cum dolore, ut in hac puella erat, aliquando etiam cum humiditate, ob quam releuati quoque videntur, ut Paulus refert. Verum licet confecto pure & febres mitiores & dolor fierent, tamen instante tremore disruptionis ipsius vehementius cum horrore iterum febricitant, ac in sermonis proprietate conturbantur, offendunturque spiritus (quod huic puellae 11. die circa noctem fieri astantes narrauerant) adeo ut difficilius quam antea spirent, ex eiusdem Pauli testimonio. Sic & Auicenna inquit: Cum rumpitur apostema, accidit tremor diuersus, & dilatur pulsus cum diuersitate sui, scilicet fit tremor diuersus ab eo, qui communiter in principio

S iij paroxys-

6. Quasi signa adsum cu fit suppuratio.

Principium collectionis.

Signa disruptionis abscessus.

paroxysmorum sit: nam qui in principio paroxysmorum euenit, totius corporis communis est: qui vero sequitur rupturam, sit solum circa membram vicinam abscessui, ad quam materia saniosa affunditur: aut sit propter punctiorem & acuitatem materiam, & eo tempore cadit virtus, & debilitatur anhelitus, & multoties accidit febris vehemens, & hoc propter dolorem aut materiam mordacitatem. Et hæc ruptio sit ut plurimum in pectoris concavitate: unde sæpe fit empyema, de quo postea: nunc autem aliud exemplum pleuritidis in suppurationem conuersæ adferamus.

OBSERVATIO XLI.

De pleuritide in suppurationem lethalem conuersa, cum variis symptomatibus.

Pleuritis quæ in suppurationem tendit, quam periculosa sit, iam diximus, & quibus notis deprehenditur, si 14. die non resoluatur, etiam enarrauimus, & signa quoque eruptionis in pus conuersæ enucleauimus, & quod ad tempus eruptionis attinet, illius suppurationis, quæ sit à natura & non arte, plerumque sit septimo die, scilicet, à principio collectionis, ut in puella præcedente euenit. Sed est ex iis, teste Auicenna, & qui eum sequuntur, quæ raro euenit: & addit, quod plurimum usque ad 20. & 40. & 60. tardetur: quod & neoterici sequuntur. Idem voluit Hippocrates 2. Prognosticorum textu 57. cum ita dicat: Aliæ suppurationes fere rumpuntur 20. die & 30. & 40. & ad 60. diem deueniunt. Sed de his latius in scholio. Sic istis diebus, anno 1587. 23. Iulij ad mulierem prægnantem in septimo mense accitus sum, sæuissima pleuritide correptam, annos circiter 30. natam in foro Delphis habitantem, cui cum chirurgus purgationem fortem adhibuisset, adeo aluum deposuit enormiter cum torminibus & vomitu, ut abortus metueretur: ad quam post octauum diem, cum pleuritide sæua correpta esset, accitus, adeo debilem eam inueni, ut illico illam morituram astantes putarent, & abortum subsequiturum. Sectio venæ in hac prætermissa erat, neque nunc ob fluxum & debilitatem ea uti nobis tutum videbatur. Dedimus autem amygdalatum, ad fætus nutritionem & virium refocillationem, & syrupum myrtinum, qui pectori conuenit & sputum non impedit, viribusque paulatim refocillatis, sputum utcumque excreabat. Sed dolor lateris neque linimentis, neque aliis anodynis sedari potuit, & cum fluor alui aliquo modo cessasset per amygdalata, semper tamen peius habuit, febre magis crescente, & dolore aucto: ita, ut cum post 14. diem pleuritis non resolucretur, de suppuratione metus fuerit, cum vehementius semper febricitaret & siti afficeretur, noctesque insomnes ageret, postea similiter & deliraret, ac in aphthas incideret, & sputum minus exiret, collectionem faciens. Varia remedia, prout accidentia postulabant, præscripta sunt. Pro siti enim & febre bibebat pitisanam vulgarem ex hordeo mund. glycyrrhiza confectam: & pro somno utebatur hordeato cum semin. 4. frig. maioribus mundatis concinnato, zacccharo perlato addito ad saporem delectabiliorem: & pro febre iulebos accepit ex decoct. hordei mundati, adiecto syrup. de limonibus & iuiubino, & viol. & pro inflammatione guttaris, cum aphthæ

metuerentur, lingebat syr. granat. & diamorani cum baculo glycyrrhizæ: & gargarismata apta, ex decoct. viol. bellid. minoris, & hordei communis ad maiorem absterisionem, & vuis pass. & semin. coton. præscripta sunt: quibus & syrup. granat. adieciatur, & latus inungebatur vng. resumpt. & oleo viol. primo: postea, cum ad collectionem tenderet, adieciimus magis maturantia. Pro sputo, quia valde febricitabat, syrup. iuiubinum, & viol. lingebat frequenter, & cum aluum non redderet, hæc leni purgatione, vel potius lenitione, vsi sumus, ne sabiequeretur abortus. 2. diaphran. lenitiui, seu simplicis, 3. vj. pulpa the. marind. recentis extrahæ cum aqua malua 3. ij. syrup. ex infus. ros. 3. ss. aqua cicchorij 3. ij. ss. misce. quo probe aluum deponebat. Et quia valde dolebat in lumbis, ne fieret abortus, inonximus vnguento ros. Si aluus paulo durior esset, & nihil excerneret, glande ex hiera, melle & sale irritabatur. Pro dolore lateris, præscripsimus fortè ex rad. althææ mund. foliis malua, viol. flor. chamæmill. meliloti, semine malua, & similibus: sed antequam apponeretur, horrore affecta & valde delirans & febricitans, facta est eruptio collectionis in nocte, circa 20. diem à collectione, cum tanto metu, ut omnes illam morituram putarent: nam & in syncopen incidit paulo post, cum materiam plurimam purulentam post eruptionem subito tussiendo expueret: solet enim materia plurima aliquando, quæ subito à vomica euomitur, facta eruptione subito effandi circa præcordia, & cum virtus tunc debilis est, sæpe inducit mortem per viam suffocationis: & sic aliquando pleuritis ad syncopen permutatur, quod etiam cognoscitur à tremore cordis, seu palpitatione vehementi, à pulsu & à syncope subito adueniente & suffocante. Verum hæc per frictions à syncope releuata (quod mirum est) non passa est abortum: sed quia valde debilis erat, conditum sequens præscripsimus, 2. conserua boraginis, buglossæ, viol. an. 3. iij. corticum citri conditi, 3. ij. ss. manus Christi cum per. 3. ij. syrup. de succo boraginis 3. ss. misce. Intererea dolor lateris remissus est, rupto abscessu, & effuso pure inter thoracem ac pulmonem: & quamquam tunc febris quiescere solent, & magna ex parte dolor quoque, licet indefinenter febricitent habituali quadam febre, uti & hinc nostræ mulieri euenit, atque indies debilior fieret (licet nunc operam daremus, ut paulatim reliquum puris expurgaretur, ne in tabem incideret) semper debilior facta est, & tandem etiam in octauo mense existens, valida tussi subinde etiam correpta, cum quotidie plurimum puris pessime olentis expueret, partus conamina accessere, & peperit infantem quidem viuum, sed diem non superuixit. Et sic etiam pure in concavitate pectoris collecto, grauitatis autem sensus remanebat intus in profundo thoracis: simulque aliquando aliquid transfluere apparebat, iuxta multiplici res reclinacionis permutaciones, & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt, tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter in reclinacionibus ipsorum auditur, prout legitur apud Galenum libro quarto, De locis affect. & Aërium libro octauo, capit. 65. Sed hoc notatu dignum, cum suppuratio sit puris in thoracis capacitatem collectio, in cuius illucie pulmo totus immergitur. Eo autem influxit, vel ex angina, vel ex peripneumonia, vel (quod frequentius contingit)

contingit) ex pleuritide, de qua nunc loquimur; his enim tussi non expurgatis, abscessus exoritur: & quo tandem rupto, pus sæpe vniuersum in thoracis capacitatem influit; eoque etiam diu postea è sordido vlcere stillat, dum tandem ingens ac pene suffocans copia cumuletur, interdum ex abscessu pus sursum in os irrumpit, expulsiurque, ac tum suppurationis periculo liberat, ut sæpe in quotidiana praxi obseruauimus. Cæterum febre magis incrudescente, & non desinente, & siti accedente, tum sputo nigro & liuido apparente, talia signa (ut postea de suppuratione & empyemate dicemus) lethalia sunt, si febris de nouo recalescat. Quæ omnia nostra mulier experiebatur: nam aliquando & pus per tres dies, vel plures retinebatur: mox rursus peluim plenam extuffiebat cum tanto fetore, ut perdurare nemo apud illam posset: unde rursus ex putredine febre crescente, & aphthis deinde oborientibus, & purulenta fætida ad tempus cum expulsiur, viribus consumptis, & ad extremam maciem redacta misera, postquam duabus mensibus decubuiisset, & quotidie purulenta fætida male olentia expectorasset, etiam ab initio facto prognostico, tandem obiit.

SCHOLIA.

Mltis quidem ingeniis suppuratio rumpi potest tardius vel citius. Sed de ea ruptione hic non loquimur, sed postea: verum de ea, quæ à natura sit vel septimo, vel 20. vel 30. & 40. vel 60. ex Hippocratis mente. Sed harum differentiarum omnium communes habentur ex commento Galeni libri 2. prognost. text. 57. ob quas spatium temporis euariant inter se ex affecta sede, & idem nocuo humore: sedes enim calidior ac mollior, citius suppuratur, frigidior vero, durior: ac glutinosior, tardius: item ex humoribus, calidior citius, frigidior tardius. Hæc igitur rei ipsius differentie sunt. Porro accedunt extrinsecus ea quæ ab ætate ducentur, natura temporis, terræ conditione, ac viribus ægri. In omnibus his calidus humor citius, frigidus tardius suppuratur. Hæc igitur vniuersim scire (inquit Galenus) de omnibus suppurationibus bene est, sed mihi (idem ait) videtur operæ pretium nunc quoque scire de iis, quæ in thorace ac pulmone fatigant. Eadem fere Auicenna ex loco Galeni desumpsit, quæ & gradus longo sermone explicat. Sed aliquis verum & præfixum tempus eruptionis definire non potest, quamquam in pleuritide post 14. diem, si non resoluatur, postea sequitur collectio puris, deinde eruptio, temporibus iam dictis, prout materia sit multa, calida, acris, et odens. vel frigida & contumax. Et ideo hæc non sunt quasi absolute intelligenda, sed quod plerumque istis temporibus fiat eruptio, facta computatione à die collectionis, quæ tamen tardius vel citius aduenire poterit, secundum occursum causarum eruptionem facientium: & ideo illud principium considerandum, quo tempore collectio fiat, quod facile dignoscetur cum infirmus diuerso modo se habere cœperit, modo magis frigere videatur: modo plus calere, & quod dolores punctiõesque intenduntur, & quod antea fiebat excreatio, nunc veroretentio, tum alia iam ante dicta. Ideo Auctores cum videant pleuritidem non terminari 14. die, amplius resolutionem non sperantes, sed collectionem & suppurationem, ex signis iam dictis, statim maturationi intendunt, & ubi abscessus maturus est

ad ruptionem deueniunt, & abscessu perrupto ad abstersionem & repurgationem, & ultimo consolidationem, & quartæ intentioni animum adhibent. Maturationem complent res temperate calefcentes, & communiter humectantes cum viscositate quadam, inhibente tamen fortem resolutionem: & ita puris confectio seu concoctio iuuanda, iuxta Paulum. Nam concoctio vnum quid ex naturalibus operibus existit, estque ea, (iuxta Galenum 5. de simplic. facult. med. & primo de different. febrium. in pus conuersio. Hæc vel intus sumuntur, vel exterius applicantur. Intus iuuant decoct. rad. bismal. liquir. scabios. hordei mund. passula, dactyl. ficus & cremor pitisanæ, & coeque ex mucag. ficum ping. luyr. recent. & oleo amygd. dulc. zaccchar. candi, & penid. adiecto: qualia habes apud præceptorem meum Benedictum Faentinum & Rondeletium, ac alios descripta. Cibi quoque adhibendi tempore maturationis molliores, ut iura ex malua, beta, spinachia, ex oleo amygdal. & butyro confecta, ius caulium, aqua hordei crassior: ficus sicca, passula, dactyli, poma dulcia. Exterius valent fortius ex decoct. malua, althææ, fenugr. semin. lini, emplastra ex viol. mal. farina bor. fenugr. butyro, axungia porci, & cataplasmata ex radic. liliorum, scibus, farina lini. fenugr. & similibus. Inunctio dialthææ, olei lilior, ex dyachylo, & alia infinita apud auctores iam dictos, cum alios practicos descripta. Sed hic queritur numquid venæ sectio conueniat tempore maturationis, quam quæstionem longo sermone Gradus explicat, cum dicat non esse iterandam phlebotomiam, cum sit intentio ad suppurationem, ne congeletur materia, quod equidem intelligi volunt, virtute iam debilitata, vel propter euacuationes præcedentes & sectionem venæ vel victum tenuiorem, & accidentia prægressa quæ virtutem deiecerunt. Sed constante virtute, & in corpore robusto, ex quo in principio collectionis accidentia augeantur, dolor scilicet ac febris, reiterari poterit modica detractio sanguinis ad diuersionem & in frigidationem: hoc enim modo magis, quam alio vilo ingenio mitigabatur dolor, tum & Auicenna dicat phlebotomiam plus conferre doloribus vincentibus: attamen cum cautione hoc faciendum, prout vires ferunt, & venæ sectio copiosa præcesserit. Sed ubi vires fortes sunt, aliquando iuuisset experti sumus statim in principio collectionis, ut in famulo quodam annorum quadraginta, robusto, stante dolore vehementissimo, & febre valida, ut anhelitum vix ducere posset, exiguo detracto sanguine dolor imminutus est; & melius ad suppurationem deuenit, aliis aptis remediis: idem intelligendum de ventris solutione cum lenitiuis, etiam si antea præcesserit. Ceterum ubi iam maturatum cognouerimus apostema ex remissione doloris & febris, & grauedine existente in loco collectionis, tum omnibus modo rupturam promouebimus, vociferatione, clamore, & forti locutione, motuque inordinato. Deinde & medicamentis id efficientibus, nempe calidis lenientibus, subtilitantibus, tam intus sumptis, quam extra ad motus, utemur, sed non nisi præcedente maturatione & signis eiusdem, ut est syrup. de hyssopo, de passio: in causa magis frigida, in calida oxymel propinant. Auicenna succo scabiosæ utitur, vel eiusdem aqua, & theriaca, modo non fuerit febris nec debilitas aut extenuatio. Exterius emplastra, apponunt ex supradictis, adiecto fimo columbino, vel ex butyro, adipe antiqua, melle & fermento, fimo columbino, vel rad. althææ, ieros, axungia

ſem. lini, ſemugrac. olei lilior. & pauco adiecto fermento & ſimo columbino, formulas vide apud auctores iam dictos hoc tempore, quod ad cibum attinet, dentur ſorbitiones cum melle, panis fermentatus, paſſula, ficus, daſtyli, aqua muſſa, & oua ſorbilia, vomitus valet & ſternutamentum. Volunt quidam, ſi circa 20. diem à collectione hoc modo non rumpatur, agrum deſperatum eſſe: alioqui ſi per ſyncritica medicamenta non rumpatur, volunt phlebotomo vel cauterio aperiri, priuſquam corpus contabeſcat: de quibus videas Rondeletium, & Arculanum. Sed quia difficile eſt inuenire locum ſanici, id nequaquam faciendum, niſi aliquis tumor aut qualitas mutata manifeſte exterius appareat, cuius poſtea exemplum dabimus. Quod ad tertiam intentionem attinet, facta eruptione oportet abſtergere, lauare, mundificare, & repurgare. Sed conſiderandum, num ſanies expellatur per pulmonem cum tuſſi, vel magnam venam ingredietur, & reſudet ad hepar, & expellatur per renes: vel ad locum concauum hepatis tranſiens ad inteſtina, pus efluat, cum hac omnia poſſe euenire antea dixerimus. Quod ſi in concauitate peſtoris coarceſcitur, poſt eruptionem tandem tabem inferet, vt dictum eſt, ſi in 40. diebus non repurgetur. Ideo quæ detergant conferunt: vt aqua zacchari, aqua hordei & mellis, ſyrup. de liqu. decocta in aſthmate & tuſſi deſcripta, & lambitua ex penidiis, melle roſae, ſucco enulæ, & pulmone Vulpis, tum alia apud præceptorem meum in ſua Empirica deſcripta, & apozemata, & ſyrup. apud Rondeletium, tum alios relata, & exterius adhibita fomenta quæ reſoluant, tum alia topica. Si pus ad vias vrinae decumbat, decocta radic. apij aſparagi, ſeneculi, alkekengi, & cicero iura proſunt, vel caſſia diſſoluta in eodem decocto. Si ad inteſtina pus deſluerit, valet ius galli antiqui, decocta hyſſopi, caulium, & radic. ireos, & clyſteres leniter lauantes & abſtergentes: & in ſine ſyrupi aliqui aſtringentes, quibus inteſtina exulcerati prohibeantur, vt decocti plantag. 3. iij. ſyr. ex roſ. ficis 3. j. Si diutius pus per ſputum expurgetur, aliqui theriacam dant, alij 3. b. diaphulphuris, ex quo ſi ſequatur exſiccatio, corriguntur cum humidis, vt Meſue docuit. Quod ad cibum attinet, eo tempore dandi cibi abſtergentes pus, vt ius cicero, piſorum, caulium, galli antiqui, cibaria zaccharo & melle condiantur. Si ad vias vrinae tranſluat, aſparagi, ciceres, pineæ cruſtæ zaccharo, aqua mellis, hordei, vel paſſul. Poſt repurgationem ſequitur conſolidatio, cum laſte aſinae, caprae. Sed cautio adhibenda, quod ſubinde incarnantibus vtendum, mox rurſum detergentibus, prout affectus poſtulet, vel ſimul mixtis. Lac igitur plurimum caſei continens plus conſolidat, & contra plus feri habens, magis detergit & mundificat; cibi tunc conferunt, pedes vituli, partesque viſcoſæ, porcellorum, & caſeus recens non ſalitus, farina hordei: orizæ. Prodeſt & ſyrupus myrtinus. At ſi in putredinem pleuritis conuertatur, vel pus ad corruptionem tendat: tunc augentur lethalia ſigna, abeunt vero quæ ſalutem aliquam promittebant, appareque ſubinde latus liuidum aut nigricans, aut viſcens: nam cum ad mortem tendit, & in corruptionem mutatur, quia perneſcat, calorem innatum ſuffocat, gangranam eſſicit, & ſphacelum, ſyncopam, & deſectum. Si in cancerum tranſit, (addit Arculanus) augebitur febris, aut ſaltem non minuetur, & ſequitur dolor quidam fulmineus, id eſt exurens cum grauedine, & ſi idem

Abſterſio & repurgatio

Si pus ad vias vrinae decumbat.

Conſolidatio.

Signa putredinis ad putredinem conuertentem, cancerum & mortem.

ulceretur, emitteretur per ſputum virus valde ſcortens; & vbi terminetur ad putrefactionem, ſputum apparebit liuidum, & tandem viride ac nigrum, valde ſcortens, cum reliquis malis ſignis, & magno anhelitus ſcortore, vt in hac noſtra muliere poſtea euenit, vt ipſamet ſcortorem, dum ſputum egrederetur, ferre non poſſet. Sed tales ſemper fere ſuccumbunt, quamquam nonnulli ſcribant in hoc caſu prodeſſe oxymel, ſua acritudine corruptionem inhibens. In cancro opus eſt tantum cura blanditoria, cum tandem moriantur. De pleuritide quæ induratur, pauci mentionem faciunt, excepto Arculano, cum raro contingat, neque ego vidi: ſi contingat, caliditas & febris paulatim declinant, ita & anhelitus difficultas, donec in totum auferantur: nam ſputum diu retinetur & aboletur remanente grauitate in loco affecto. Tunc procedendum emollientibus inſus aſſumptis & extra admotis, qualia ad ſcirrhum ſcribuntur conferre. His alij etiam addunt conuerſionem ad phrenitidem, quæ habetur ex vigilia præter conſuetudinem capitis caliditate, vigiliis: dolore & delirio, ſputo deſiciente: vrina tenui, ſubtili, & anhelitus paruitate & frequentia, pulſu raro & intermittente, & alui exſiccatione: ea adhibenda quæ phrenitidi, delirio & vigiliis conferunt, abſtinendo tamen ab iis, quæ ſputum retinere poſſent. Si ad nervos apparebit aliquis nervorum affectus, ſtupor: tremor, ſpasmus, paralyſis, dolor peſtoris & lateris deſinit, & manifeſta euacuatio. Curatio petenda ex propriis locis. Ita quoque ſi permutetur ad membræ exteriora, collum, axillas, inguina, quæ per ſe patent, materia iuvanda eſt, cum attrahentibus, tum reliqua abſoluenda, quæ auctores de curatione apoſtematum exteriorum ponunt: ſi ad pulmonem, curationem iam ex parte diximus, & latius dicemus, cum peripneumoniam aliis exemplis declarabimus: & ſi ad tabem, eius curationem inſtituimus de phthiſi. Et ita abſoluimus omnem curationem de vera & legitima pleuritide: nunc etiam vnum atque alterum exemplum addemus de pleuritide mendosa.

OBSERVATIO XLII.

De pleuritide mendosa ex ſtatu.

Quibus modis pleuritis vera diſcernatur, non ſolum ab aliis affectibus, verum etiam ab illegitima & mendosa, ſatis ſuperque diximus ſcholio obſeru. 28. cum & ſæpe fiat dolor lateralis à deſtillatione, qui & prægreſſam habet cauſam & manifeſtam: dum in ceruice vel ſcapula, primum aſſixit: deinde in latus delapſa eſt deſtillatio, in quo preſſu contractuque exacerbatur: tales ſæpe in praxi habuimus, qui dolor non tollitur fomentis, ſed potius iis remediis quæ ad deſtillationem faciunt: atque horum dolorum nulla febris comes eſt, niſi aliunde fortasſe accerſita; quamquam ex diuturna deſtillatione aliquando vera pleuritis ſubſequuta ſit, vt prius oſtenſum eſt obſer. 40. huius libri. Fit etiam pleuritis mendosa in muſculis externis: vt ſcholio citato enarrauimus, ipſis inflammatis; cuius etiam exemplum poſtea adferemus; iam quoque à ſtatu dolor lateralis & pleuritis mendosa oriari poteſt: vt Montani exemplo recensuimus in Marco Antonio Genneſi. Si iſtis diebus cum vix quidam ichthyopola intenſo dolore lateris laboraret: ceruiſia epota, in qua flores chamamilli incocti erant; prius colata: ex noſtro conſilio ebibita,

OBSERVATIO XLIII.

De pleuritide ſpuria, ab externa membrana coſtas ſuccingente, tum muſculis intercoſtalibus exterioribus inflammatis.

Vir quidam apud Clariffas ſorores pleuritide non exquisita, ſed mendosa & ſpuria dicta corripiebatur: inflammatio coſtas ſuccingentem externam membranam & intercoſtales muſculos exteriores inſeſtabat. Exterior pars thoracis dolebat dolore extenſiuo & pulſatorio, adeoque tuſſis exigua, vel nulla, nec reſpiratio admodum difficilis, quamquam in expiratione æger maius percipiebat nocumentum, quam in inspiratione: pulſus non admodum durus erat, & ſupra idem latus affectum decubitus difficilis erat, obſtinuo febricitabat. Venam ſtatim huic ſecui ad vncias fere ſex, cum bona habitudo eſſet, ſotuque adhibito ex viol. malu. flor. chamamilli. flor. roſ. rub. & meliloti, oleoque roſaceo, amygd. dulc. chamamilli. & anethi, dolor ſedatus eſt, facta reſolutione, vt aliis remediis opus non fuerit.

SCHOLIA.

Si dolor lateralis in illegitima pleuritide ſit ex frigore, aut ab aliis cauſis ſtulentis atque euidentibus, tunc vtendum eſt carminantibus ventofitate. In quibus & hic vel ſimilis ſacculus proderit. 2. ſorum chamamilli. meliloti. ſambuci. ana. p. j. ſummitatem anethi. vna cum ſem. 3. b. ſem. ſeneculi. malæ. ana. 3. j. (in materia frigida vel ventroſa, addi poteſt ſemen rutæ; cumini 3. j. & erit efficacius) fiat ſacculus interſutus, & calefactus ſuper patellam ardente vino irrotatam, & parti affectæ applicetur. Valent & alia linimenta, & vnguenta & cataplaſmata caleſcientia & reſoluentia, quorum formulæ ab aliis auctoribus petendæ. Sed hic etiam notatu dignum exiſtimamus, quandoque dolorem lateris phthiſicis ſuperuenire, qui tamen non eſt vera pleuritis, cuius etiam meminit Dodonaus cap. 22. in ſuis obſervationibus: Phthiſicos inquit, diuturnitate mali etiam extenuatos, lateris dolore quandoque corripit accidit: qui ſubinde valde moleſtus, & reſpirandi libertatem impedit, febrilem tamen non multum intendit calorem. His pulmo membranae coſtas ſuccingenti ita firmiter adglutinat, adhæret, vt ſæpe numero nõ abſque violentia auelli queat. Concepto aliquo ſpiritu frigido, dolor ſuperuenit: tollitur calorificis, vt fomento ex floribus chamamilli & cumino, quod multis beſecit: ſacculo hæc inſuere oportet, qui deinde candido rigatus, calens dolenti loco imponitur. Venam ſecare, qui temere audent, quantum ſanguinis demunt, tantum vitæ detrahunt. Non modo autem iſtis ſanguis perperam detrahitur, verum & aliis, ex craſſis, viſcidis humores, latere dolentibus. Ingerunt enim quandoque ſefe craſſi viſcidisquæ pituitosi humores in thoracis ſpatium, tum & in ipſos pulmones, qui multitudine ſua ſuccingentem membranam diſtendentes dolorem aſſerunt, & vias ſpiruum interceptantes, ſpirandi difficultatem inducunt. Nam & his ſanguinem, præſertim copioſum, detrahere, eſt motus cauſam agris præbere, vt Aëtius ſcribit Tetrab. 2. lib. 4. cap. vltimo.

SCHOLIA.

Similem quoque curationem fere ponit Amatus ſcentur. 3. curat. 67. in qua axillarem venam dolentem locum reſpicientem ſecare fecit, vncias ſanguinis octo extrahens: deinde ſecundo die vltro admonuit fomentum ex roſ. malæ, parietariæ, chamamilli. anethi. ſem. lini, ſemugrac. decocto, in ſine adieciſis 3. iij. olei roſ. mox loco affecto inuncto hoc vnguento. 2. axumie gallinae, butyri recentis, ana. 3. j. pul. chamamilli. 3. b. olei roſ. amygdal. dulc. ana. 3. b. cere q. ſ. ad ignem miſce. & fiat vnguentum molle, & cucurbitulis loco affecto affixis ex toto intra octo dies inflammatio reſoluta fuit. Solet hæc inflammatio ad cutem aliquando deuenire, adeo vt neceſſum ſit tumorem aperire, vt 5. de loc. affectis cap. 3. Galenus reſert, id ſe ſemel obſeruaſſe in quodam Luſitano, idem Amatus ait, quem tumorem ſcapello incidi fecit; idem & Zoar glorioſus ſe feciſſe narrat in muliere quadam, vt lib. 1. ſui Theſiſ, cap. 4. tractat. 16. videre licet. Rondeletius omnia fieri in mendosa pleuritide vult, vt in vera iſſi dolor vehemens vrgeat omnibus conſentientibus venam ſecare iubet, niſi atas & cruditas materiæ obſtiterit, vel aliud impediatur, apponit ventofas ſuper nates ſine ſcarificatione, ſi materia omnino frigida ſit, vel cum ſcarificatione, quando eſt permixtio ſanguinis: additque curari pleuritidem iſdem fere remediis, vt vera, niſi quod in parte externa fortiora remedia ſunt adhibenda, vt emplaſtra, ſacculi, vnguenta, quorum formulas apud eundem deſcriptas videre poteritis. In hac pleuritide idem laudat cucurbitulas ſupra affectam partem poſitas, prius vero natibus admotas, ante lenito ventre & miſſo ſanguine. Si vero ad partem externam trahatur, & vertatur in ſaniem (quod patet ex inundatione, & partis inflammatae pulſatione) aperiatur locus, vt in aliis abſceſſibus, vel vtendum emplaſtro de meliloto, vel alio digere, vt materia potius per inſenſilem tranſpirationem, quam per manifeſtam euacuationem educatur. Si muſculi peſtoris externi circa latera dolent, & adſit inflammatio, curetur vt alia inflammationes, & ſi in abſceſſum terminentur, curetur.

De pleuritide non vera eiusque variatione.

curetur, vt alij abscessus in locis externis, visu, & tactu apparentibus. Solent aliquando lateris dolores in peripneumonia apparere, quamuis non sit vera pleuritis. Sic nostra aetate peripneumonia populariter grassata aliquando vidimus: vt in libro nostro 6. obser. de febr. epidemicis & peste recensimus. Memorat Dodonaeus, sua aetate bis quoque sauisse, & in memoria multorum adhuc esse, semel anno 1557. Octobri; deinde iterum anno 1565. Ianuario mense. Ab initio Iulij mensis, anni 1557. sicca praecesserat constitutio, & mediocriter pro temporis ratione calida, praesertim Iulio ac Augusto. Sub finem Septembris tertio ac quarto Kalendas Octobris, superuenit validissimus à Septentrione ventus, admodum frigidus, mox desillationes plurimae sunt natae: vnde cito valida vehementesque tussis, & lateris cum febris: & respirandi difficultate dolores praecesserunt. Lateris dolores non vehementes, non punctorij erant; sed elementes admodum: tertio die, vel prius sputum prodiit cruentum: quinto, aut sexto, aut septimo, ad summum octavo mortui omnes sunt latere dolentes, quibus sectio venae praetermissa, aut tempestive non facta. At quibus sanguis vel primo, vel altero die detractus, euaserunt, quarto aut quinto die sanitati restituti. Quarto vero aut quinto sanguinem detraxisse nihil profuit, morbo iam confirmato. Humores desillantes tenues admodum, & non-nihil acres fuerunt. Eclegmata idcirco vtilissima quae inspissandi vim habent, acrimoniam retundunt, & aspera leniunt; quale est ziziphis (iubas vulgo vocant) serapium quod tenues desillationes inspissat, acrimoniam obtundit, aspera obliniendo lenit. Altera peripneumonia dissimilem occasionem habuit. Decembri mense Anno 1564. gelu admodum acre extitit, quod non modo omnia reliqua flumina vbique, sed ipse Scaldis in portu Antverpiae (quod admodum raro contingit) adstrictus fuit. Decidit per id temporis nix admodum crebra. Post Kalendas Ianuarij Anno 1565. frigoris remissio sex aut septem dierum successit, sex exigua admodum, sic vt neque nix, neque glacies dissoluerentur. Per hos dies vapores multi eleuabantur, qui cum interdiu dissolui ad discuti non potuerunt, nec altius ascendere, nocturnis frigoribus densati, inferiorem, & quem haurimus aërem inficientes, crassum, humidumque eum admodum reddiderunt. Ab huius autem tam crassi aëris, & vaporibus infecti inspiratione, morbi circa pulmones atque in ipsis etiam pulmonibus exitiales nati sunt: quibus infinita hominum multitudo mox correpta fuit. Nulla autem citius aut grauius affecti, quam qui hora vna aut altera post solis occasum aëri sese exposuerunt. Nam interdiu, praesertim ipso meridie, aut paulo post, aër minus crassus extitit, nec ita cito aliquem offendit. Multis locis profuit focus elegans ex quernis lignis, qui hos in sanitate continuit, aëre in cubilibus ac cenaculis reficcato ac puriore reddito. Morbi per hos dies erant tussis, rauedines, respirandi difficultates, & plurimi vna laterum clementes, non punctorij cum febris dolores, hoc est peripneumonia. Fuit autem haec peripneumonia non minus quam superior exitialis: necessum quoque erat in hac mox primo aut altero die sanguinem detrachere, quando cessatum est, nulla saluti ac vitae spes reliqua erat. Sputum in hac processit crassum, sanguini permixtum nonnullis biliosum, quorum nemo seruatus. Eclegmata desiderabantur, quae pulmonis meatus expurga-

retur, & ab infarctu liberarent, non tamen valde calida, vt serapium ex capill. ven. & quod ex dulci radice paratur: ex hyssopo quoque quandoque profuit. Vtroque autem tempore morbum hunc non pleuritidem, sed peripneumoniam fuisse, mortuorum quorundam corporum dissectiones ostenderunt. Istis exemplis sit manifestum (vt idem asserit) non semper pulmonis inflammationem citra lateris dolorem accedere. Nam licet parenchyma eius sensu sit destitutum, vt satis in phthisi apparet, non tamen membrana, quae ipsum ambit, sensus & doloris, si distendatur, est expertus: quando enim inflammatio ad vnam aliquam exteriorum pulmonis partem consistit, dolor in latere distenta membrana sentitur: vbi vero interius acceditur, grauitatis sensus quidam circa sternum & dorsi spicula tantummodo percipitur, nisi simul & pelliculam suae membranae quae dorso sternoque adheret, inflammari contingat; tunc enim dolor circa sternum etiam adest. Aëtio teste. Haecenus Dodonaeus. Ceterum pleuritide nunc absoluta, ad peripneumoniam maiorem enucleationem accedamus, ab ea incipientes, in qua plurimum pituitae dominabatur: tum aliis exemplis, quae non à pleuritide, sed per se ipsa ortum habeant.

OBSERVATIO XLIV.

De peripneumonia, in qua pituita plurimum praedominabat.

Mulier Hornana, quae fratrem visendi causa Alcamariam accesserat, annos triginta octo vix accedens, asthmate subinde tanquam morbo familiari laborans, satis pituitosa, fluxioni ac catarrho obnoxia, anno 1550. Ianuario mense, in peripneumoniam incidit. Quam magna spiritus difficultas vrgebat, ac oculos tumidos habebat, aderaque praecordiorum pectorisque angustia, simul & grauitas summa, sternum dorsumque contrahens: & febris acuta, sed non admodum vrens: tussis valida, sputum crudum, pituitosum, vix aut parum cruentum: ita vt à sanguine pituitoso, pituita plurimum praedominante, hoc malum originem traxisse existimaremus, in muliere Asthmatica, pituitosa tempore quoque hiberno. Ad quam vocatus, cum alium non deponeret, balneo sequenti faeces communes deposui. 2℥. pul. specier. hiey. picra 3 j. mellis 3 j. diac. gra. iij. silis exiguum. Fiat suppositorium. Eodem die post alium solutum, statim è vena basilica in brachio dextro sanguinem extrahere iubeo ad vncias sex: qua detractio angustia pectoris nonnihil sedata, multo melius spirare potuit. Interea hoc decocto bis in die utebatur. 2℥. radic. feniculi, mal. uia, glycyrrhizae, ana 3 j. capill. ven. scabiosae, hord. mandati, hyssopi, vngulae cabal. ana. m. j. flor. cord. p. seminis anisi 3 j. vuar. passul. detractis vinaceis p. j. in iubar. sebesten. recent. ana. numer. viij. prunor. aliquo modo dulc. numer. xij. coquantur in aqua communi pro 1℔. j. 3. colatura zacccharo dulcoretur, & hunc syrup. lambebat. 2℥. syrup. viol. capill. ven. ana 3 j. in syrup. de liquir. de hyssopo, ana 3 1/2. misce. pectus inungebat vnguento pectorali, oleo chamemill. & amygd. dulc. adiectis. Post duos dies, ad expectorationem & maiorem incisionem, utebatur sequenti eclegmate. Recipe loch. de pino 3 j. 3. loch. sam. & ex-perii 3 j. misce. Quarto die materiam magis coctam hoc modo expurgauimus per vices. Recipe bordei mundat. vngulae caball. hyssopi, scabiosae, capill. vener. ana m. j. flor. cord. p. j. cor. rad. feniculi, liquir.

vasa, ana 3 i. sem. anisi 3 j. solior. senae Alexand. 3 j. prun. damasc. dulc. num. viij. vuar. passul. mundat. ab arillis p. j. in iubar. sebesten. an. num. v. coquantur in aqua communi pro 1℔. j. zacccharo dulcoretur. Modo bis modo semel ex hoc decocto capiebat, & quotidie modo bis, modo ter excreuit cum maxima pectoris alleviatione, febre non incremente: sed cum aliquo modo cor doleret, cochlear vnum syr. brag. propinauimus. Lingebat quoque ex electuario ex pulpis prun. damasc. parato cum succo liquiritiae, & speciebus diatrag. confecto, pro febre & siti. Post tres dies à decocto purgante difficilis spiratio cessare cepit, sed oborto in nuhiere satis crassa lateris dolore, quem ex ventositate contractum coniecimus, & fotu decoctionis flor. chamemill. meliloti, & semin. lini, scenu-graci, anisi cessauit, & liberius extulsiabat, expectorabat vndecimo die: & quia per sputum peripneumonia tendebat ad resolutionem & declinationem, syrup. sequentem lambebat. Recipe loch. sam. & ex-perii 3 j. syrup. capill. ven. de liquir. de hyssopo, ana 3 1/2. irat. tandem 14. die à peripneumonia satis periculosa euaserit. A febris totum actus liberrata, solum relicta appetitus deiectione, quam ob dulcia medicamenta stomacho refragante euenisse existimabat: sed hoc condito sumpto subinde ad magnitudinem faebae maiusculae, appetitus quoque rediit. Recipe confer. borag. 3 j. diarod. abbat. 3 j. 3. specier. aromatic. rosa sine musco 3 j. corticum citri conditi 3 iij. confer. capill. ven. 3 1/2. syrup. menthae ceteri parum, ne tussis rediret, fiat conditum. Interea cum sanitatem consequuta esset, ac iam discederet & domum reuertetur, consului, vt subinde vteretur inula campana condita & zacccharo incrustata, ad asthma morbum sibi familiaritatem.

SCHOLIA.

Cum pleuritis aliquando in peripneumoniam mutetur, vt prius dictum est, deinde quod parum à curatione pleuritidis distet, solent medicati statim post pleuritidem de peripneumonia agere, quae quidem variis nominibus decoratur. Nam alij exanthematis, seu mib. vuar. vel vt Celso visum est cap. 7. lib. 4. exanthematis Graeci vocant, Latini vero peripneumoniam appellant. Et haec inter eos morbos connumeratur à Galeno 2. method. medend. quibus à laesa particula nomen fuit indicum: estque ea, teste Celso, vehemens & acutus pulmonis morbus, quam & Paulus lib. 3. cap. 30. inflammationem pulmonis esse ait, cum febris acuta, vt etiam Galenus confirmat. 2. & 4. de loc. eis affect. & lib. de puls. ad tyrones, & 4. de causis pulmon. Aëris lib. 4. cap. 66. Non desunt, qui in vnam & legitimam notam distinguunt: vnde & Fernelius raram admodum veram peripneumoniam esse asseruit, cum & tenuis & acris, multaque desillatio cerebro confertim in pulmones illapsa, interdum ardore praeter naturam incenditur, astum ac febrem inferens, ac plerique eam affectionem peripneumoniam nomine designant, in qua & tussis & spirandi difficultate, & lenta febre sensim conficitur ager, sine vlcere, sine expectoratione cruenta. Haec si peripneumonia dicitur, ab exquisita profecto plurimum, tum causa, tum symptomatum magnitudine diffidebit. At nos non loquimur de peripneumonia: Potest enim haec inflammatio, vt in sequentibus de causis latius dicitur, nedum ex sanguine optimo ac laudabili, mediocremque crassitudinem habente

initium sumere; verum etiam ex eodem pituitoso aut bilioso, aut melancholico existente (quamquam quidam hoc vltimum de melancholico vix admittunt, & nonnulli negant) vt patet apud eundem Galenum 2. de loc. affect. & comment. aph. 36. lib. 6. vt etiam à Donato Altimaro citatur: dicebat pulmonem aptum natura esse, cum rara ac laxa substantia particeps sit, ad omnes humores percipiendos: non obstant 4. de caus. puls. vbi Galenus potius à pituitosiore & crassiore sanguine inflammari vult, cum subtilis biliosusque fluat fere, nec cum viscere vlla ratione coalescere possit. Quibus respondetur, intellexisse quidem proprius hoc fieri ex pituitoso sanguine, non tamen negauit utraque partes ab utrisque inflammari posse, licet in laterali morbo saepenumero magis biliosum, in peripneumonia vero magis pituitosum sequi consuevit. Pars affecta hic facile cognoscitur pulmonem esse & compertum affectum praeter naturam vitium hoc esse inflammationem, & ideo morbum in quantitate, subsequente immodica spirandi difficultate atque angustia: adeo vt suffocari laborantes videantur, vt saepe recte sedere cogantur; hoc enim modo sentiunt thoracem magis dilatari: quippe decumbentibus in sese concidit: idque magis si inflammatio particeps fuerit erysipelatis. Quocirca, vbi plurimum efflant, iuuari videntur: ac multum aërem frigidum attrahere concupiscunt. Thoraci quoque granitatis sensus adest & dolor spinam contingens, ob membranas ambientes: vehementi enim dolore pulmo numquam cruciatur, nisi ob dictas membranas, & earum extensionem, adest & acuta febris incendium vero magis in erysipelate: sed tunc angustia & grauitatis sensus minor. Si igitur erysipelas, aut phlegmone erysipelatos desit, aut difficulter deprehenditur: si vero inter tussendum sputum expuunt, id (vt in pleuritide dictum est) modo hoc, alias alio colore infectum videbitur, pro ratione diuersi humoris inflammationem causantis. Proprium item in peripneumonicis signum est, eodem Galen. teste 1. de propriis loc. affect. quod maxilla rubrae apparent, pulsus signum pe-que magnus, languidus, mollisque, atque inaequalis & vndosus est, interim quoque dicrotus: & cum acute omnes febricitent peripneumonicis: nonnihilque comatis habeant, vtrum horum excellat, maxime ratione crebritatis pulsus inuenitur: nam vbi ardentior febris fuerit, pulsus abunde creber erit, si comatosior minus creber: & huius causas requiras apud Galn. 4. de causis pulsuum. Sed & alia symptomata peripneumoniam comitantur, vt anxietas, impotentia, iactatio, lingua flaua, licet temporis progressu nigrescat, lib. 3. de morb. vulg. & delirium atque oculi intumescences, teste Paulo, & natus in summa sumus, & venae temporum eleuatae, iuxta Aëtium, & prostratus appetitus. Simili autem via, ex quo humorum ortu duxerit, indagabimus, quam de pleuritide docuimus, licet saepenumero expituitosiori sanguine gignatur, & aliis quoque humoribus fieri poterit, vt prius dictum est, idque potissimum percipiemus ex eiusdem sputi colore diuerso: ex rubeo sanguine, ex flauo & rufo, seu pallido biliosum sanguinem, ex spumoso albo atque candido pituitosum: ex liuido & nigro melancholicum sanguinem, vt 2. de loc. affect. & 2. prognosi. à Galeno scriptum reperitur. At si nihil expuant, ex aliis id coniectabimus: ex maiori vel minori calore, seu incendio in thorace percepto ex maiori minoriue angustia, respirationis difficultate

cultate, ac gratitatis sensu, temperamento, ætate, habituque diuerso, regione, aëris constitutione; anni tempore: ac præcedente victus ratione. At de causis & signis plura videas apud præceptorem meum Benedictum Faentinum in præxi: capite proprio; & Gradum: tum alios, qui longiore sermone hæc prosequuntur: quæ exemplis subsequenter adhuc clariora euadent.

OBSERVATIO XLV.

De peripneumonia ex sanguine magis prædominante, cum mediocri pituita portione.

Matrona honesta ac iuencula, annos plus minus octodecim nata, & nuper nupta, veris principio subito peripneumonia sanguinea correpta fuit: genæ enim plurimum rubebant; sputum sanguinolentum erat, mixtum cum exigua pituita, febris acuta erat cum inflammatione, & venarum omnium extumescencia, cum pulsu vndoso, pectorisque gravitate; habitu mediocriter carnoso, victu satis lauto præcedente, ac ætate iuuenili, & tempore verno respondentibus, cum vrina rubra, modo clara, venis apparentibus, ac per totum corpus satis repletis, cum tanta anhelitus difficultate, vt suffocari videretur; ita vt facile, cum ad eam subito vocatus essem, intellexerim pneumoniam esse ex sanguine magis prædominante, & cum dolor grauis pectus occuparet, ad mammillam sinistram, tum humerum sinistram tendens: cum alium intra duos dies non deposuisset, libenter ante venæ sectionem enema molliens iniicissem. Sed cum non admitteret: balneo, id tentauimus: quo nihil vel vix effectum dignum excreuit. Angustia pectoris magis incrementum, precibus amicorum educta est, vt clysterem emollientem admitteret, hoc modo descriptum. *℞. radic. alibæ mundatæ ʒj. B. malua, cum toto viol. parietaria, mercurialis, ana m. j. flor. viol. meliloti, chamemilla, ana. p. j. seminis lini, fenugraci, ana ʒij. sem. anisi ʒj. sem. 4. frig. maior, ana ʒj. prun. damasc. numero 15. coquantur in aqua communi, & m. lb. j. huius decocti, dissolue cassiæ mundatæ ʒj. diacaboli ʒij. olei viol. amygdal. dulc. ana ʒj. olei anethini ʒj. salis ʒij. misce pro clystere. Quo bis alium deposuit, dolore & difficultate anhelitus parum diminuta. Sed cum post meridiem rediremus, & malo incrementum, cum versus mammillam magis sinistram doleret, vena lienari in manu secta, cum in brachio minus appareret, ad vncias sex, optime tulit, & anhelitus liberior processit; sputo melius quoque exeunte, pectore inuncto oleo amygdal. dulc. & amar. viol. & anethino, & lambitino sepius deglutito, ex syrup. viol. ʒj. B. syrup. capill. vener. de liquir. ana ʒj. B. Et hoc iulebo ebibito ad materiæ præparationem. *℞. syrup. de liquir. inuib. capill. ven. ana ʒj. aqua vnguent. cabal. scabiosa, ana ʒij. misce pro dosibus. Quinto vero die ita eam purgauimus. ℞. cassiæ mundatæ ʒj. diacaboli ʒj. agarici trochiscati (quia leuissimè aderat portio pituitæ) ʒj. B. zaccaro candi asperso, & granis tribus pulueris cinnamomi & hyssopi adieclis. Fiebat bolus: quo ter alium excreuit. Vbi enim morbus venæ sectione, & clysteribus non cedat, solent medici ipsi, præsertim in primis quatuor aut quinque diebus, purgante medicamento alium subducere, & hoc pau-**

lo amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiiores vt Hippocrates iussit lib. 3. de morb. Ad hoc opus eliguntur ea: quæ lenientior purgant, cuius generis sunt nostris temporibus, manna cassia fistula, diacatholicon, diaprimum non laxatiuum: & medicamentum lenitiuum dictum: in bolo, vel cum decoctis pectoralibus. Oportet autem infusum alium ex eiusdem Hippocratis mente, neque valde suppressam esse, ne febres sint acutæ, neque valde egerere, quo salua atque sputum sursum educi possit, & æger viribus valeat. Interea & ad diuersionem vsu sumus frictionibus eiusmodi diutissimæ non parum conferunt, si bis quotidie fiant in scapulis: proxime ab his in brachiis & pedibus & cruribus, leniter contra pulmonem, vt testatur Celsus. Interim neque syrupis, neque eclegmatibus abstinuimus, vt prompte accelerare pulmo expurgaretur: quare & sequenti ad expectorationem vsu sumus. *℞. syrup. violar. ob calorem, ʒj. syrup. de liquir. capill. vener. ana ʒj. zaccaro candi pul. ʒj. B. misce. Sexto rursus die, cum durioris alui permaneret, vt hoc decocto vteretur, mandauimus. *℞. folior. viol. boragin. ana m. ij. radic. liquir. ʒj. B. folior. 4. frigid. maior. semin. anisi, ana ʒj. B. folior. senæ ʒj. prun. damasc. ad dulcedinem tendentium numero xv. hordei mundati, p. j. capill. vener. hyssopi ac magis incidendum, ana m. B. inuib. sebesten. recent. ana m. v. fiat decoct. in sero lactis ad lb. j. zaccaro parum dulcoretur. Ex eo decocto, cum semel ʒij. cepisset, quatuor secessus in die habuit cum alleviatione. Quare amplius non sumptis quotidie melius expectorabat. Interea topicis digerentibus & reoluentibus minime relictis, facta pectoris inunctione ex vnguento nostro pectorali, sepius melius habere cepit, & cum minori molestia extussibat sputa magis alba & concocta. Eclegmata continuabat syrupo postea à violaceo relicto, addito eius loco syrupo de hyssopo. Octauo die iterum alium, non nisi balneo deposuit. Nono die suborto dolore cum quadam inflatione circa inguinæ, & quadam gravitate circa vterum, pectinem, & lumbos, morbum per menstruas purgationes finitum expectauimus: cum neque grauida esset. Et cum per superiora calidis, quæ febrem augerent, vti & menses euocantibus non ausi essemus: ideo cum vteri dolor multum vrgeret, per obstetricem mandauimus, vt digito oleo sequenti intincto collum matricis intus confricaret, atque hoc modo ora venarum matricis aperta sunt, & menstrua copiose fluxerunt. Oleum verum tale erat. *℞. olei lilior. ʒj. croci orientalis pul. ʒj. misce. Menstruis itaque fluentibus, morbus, eo modo signis coctionis antea in sputo, tum in vrina apparentibus, ad salutem terminabatur, vt decimo quarto die perfecte sanata fuerit. Victus huic idem, qui pleuriticis confert, nisi quod magis attenuatorius esset, iuxta Aëtium: à falsistamen abstinendo, tum ab acerbis atque amaris: neque alium astringentibus, vt Celsus admonet, vsu sumus: sed leuioribus dando in principio, vel primis diebus sorbitiones ptisanæ, aut ptisanam ipsam cum melle. vel butyrum recens cum ptisana, vt Paulus facit: iuxta recens adeps iuxta Celsum incoqui posset: de primis enim diebus, ex Hippocrate tertio, de morbis, sorbitiones dulciores dat. Quarta autem die & quinta, & sexta non amplius dulces, sed pingues dat: nam ad sursum excreandum dat, vt ptisanam cum iure galli pinguis vel galli-***

na. Nos commo le in principio hordeata exhibemus, deinde & sorbitionem ex pane, zaccaro & butyro exiguo cum ceruisia leuiter coctam, vel panatam. Sed à succis frigidioribus abstinere, & aliquid hyssopi incoquant, & panem ex aqua mulla, subinde cum melle exhibent. Celsus etiam oua sorbilia concedit. Potus erat ptisana parata ex hordeo mundato, liquiritia & passulis, detraclis vinaceis. In fine etiam victum auximus, exhibendo colatitium cum emulsione hordei, zaccaro adiecto.

SCHOLIA.

Decimo quarto die in totum morbus solutus fuit, & nono iudicatus, menstrua euacuatione subsequente, qua & terminum suum compleuit. Iudicatur autem hic morbus (Hippocrat. res. 2. & 3. de morbis, & lib. de affectibus.) breuissimus quidem in diebus septem, aut quatuordecim: longissimus vero in duobus de viginti. Pauci autem hunc morbum effugiunt: verum postquam trigessimam diem transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus sputi, & pectus dolet & tussit: nam ex hoc morbo fiunt etiam pectore suppurati, si non in iudicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. Iisdem modis vero terminatur, vt pleuritidis: vel enim per sputum, & eadem signa aderunt, vt in pleuritide, si sputum bene exeat & bene coctum. Sed quod ad breuitatem attinet & longitudinem, solet esse aliquando longior pleuritide, cum à materia crassiore pendat: citius tamen à bile quam à pituita. Et ideo si post decimum quartum diem non resoluitur per sputum, transit quoque in suppurationem: & tunc aderunt eadem signa, quæ de suppuratione diximus, & postea dicemus, cum de empyemate agemus: & si non repurgatur, etiam in 40. diebus, ad tabem transit multo facilius quam pleuritidis: & ideo si in septem diebus non curatur peripneumonia, plerumque interficit vel suppuratur, vel in tabem transit. Interea aliquando inflammatione in pus commutata, si per vrinarios meatus aut venterum pus excreatur, omni statim molestia liberantur. Si vero acuatim in pulmonem irruerit, aut suffocat, aut in tabem permutatur. Terminatur etiam in alios morbos, in pleuritidem (quod rarius fit) & minus matum est; licet tamen non semper illud tutum est: & licet peripneumonia ex pleuritide transmutata securiores sint his, quæ ab initio sunt ex se, non obstante tamen, etiam si superuenerint, sunt male, vt patet 11. Aphorism. lib. 7. à morbo laterali inflammatio pulmonis malum: quia pulmonia, vt ante quoque dictum est, pleuritide periculosior est, quia malum magis vicinum cordi, & maius impedimentum in anhelitu. Siue igitur sit à pleuritide, siue ab angina, vel ab alio morbo, non caret periculo, vti quælibet peripneumonia etiam ab aliis causis prægressis, vt contusione, casu, vulnere, à valida frigiditate aëris ambientis. Hæc omnia externæ causæ peripneumonia esse possunt. Et sic quoque pulmonis inflammatio, quæ fit per materiam ex angina & pleuritide delatam, periculosior est, & difficilioris curationis, quam quæ ex deflexionibus à cerebro in pulmonem fit: ab acuto enim morbo maior fit læssio. Et sicuti cerebri defluxio (vt præceptor meus Benedictus Faentinus censebat) gignere valet pulmonis inflammationem, ita pulmonia phrenitidis gignere valet, recte quoque Galeno 7. Aphor. Forc. Tom. 2.

12. cum à calido humore fit inflammatio pulmonis, quæ multos vapores transmittit ad caput, cerebrum implet vaporibus, & facit phrenitidem: in quam si permutetur pulmonia, pessimum est, iuxta eundem Aphorismum à pulmonis inflammatione phrenitis malum: ratio est, quia mutatio fit in peius. Verum ad parotidas conuersam post aures, vel subalares abscessus excitasse, hoc innocentiore malo, ac augurio magis tuto accidit. Sed si prolongatur peripneumonia, vt quidam volunt, inducit pedum tumorem & hydropem, ob hepatis nocumentum communicatum: quod aliquando & in suppuratis euenit. Si induratur (quod rarissime contingit) vt quidam volunt, paulatim accrescit anhelitus difficultas, & tussis siccior, frequens, calor exiguus, dolor grauis, anhelitus constrictio modo alleuiatur, modo redit. At si in pulmonis fistulis earo paulatim excreuerit, febricula aderit, cum quodam pulsu in medio scapularum, & vocis patiter rauitas, cum oris, narium graueolentia, odore piscium: quæ si exulceratur, scedioris erit odoris, & sine salua tussis, & cum corporis interdum pruritu: illa tamen peripneumonia non est, quamquam hæc ipsa pulmonia, vel dissoluatur, vel in vomitum transeat, aut paulatim quidem indurescat in carbunculos, vt Benedictus Veronenis ex aliis annorauit. At si aquositas pulmonis fistulas vexat, differt plurimum à materia pituitosa; mouetur enim in diuersa latera, & æger fatetur sonitum sese percipere. Ex huius vapore continuo febricula excitatur, cum difficultate spirandi. At hæc legitima peripneumonia non est, cum & his salua tenuis aquosa & plurima ex ore prorumpit, & in cæteris hydropem imitatur. At inter reliquas species peripneumonia biliosa, reliquis alijs malignior est & quando magis ad erysipelas pulmonis accedat: cuius exemplum nunc adiungemus.

OBSERVATIO XLVI.

De peripneumonia biliosa.

Pulmonia grauissima & biliosa, Procurator in monasterio (cui Sion nomen erat prope Delphos) laborabat, annum quadragesimum agens, vir biliosus, ac satis rara constitutionis, & plus æquo vino deditus, quemadmodum tales ocio dediti apud amicos præsertim esse solent: salua huic rufescebat, & sputum citrinum subtile spirituosumque erat, sine grauitatis molestia, oris amaritudo aderat, pulsus celerior, vrina valde tenuis & citrina, dolor acutior pectoris sine grauitate, linguæ asperitas cum nigredine spectabatur, febrisque continua & satis ardens. Hæc enim bilem prædominari notabant. Ad quem decumbentem prius quinto die accitus fui, cui & in manu prius vena secta fuerat per chirurgum, nullo adhibito medico, & à coquo, qui medicum agebat, sed empiricum, electuarium de succo rosarum exhibitum: ex quo præter rationem multa excreuit sine alleviatione: nam quinto die cum illum accessissem, vigiliæ accrescebant, & sitis valida erat: parum cruentum cum flauedine exspuebat: prius tamen magis flaua & biliosa in pauca quantitate. Pro sui decoctum hordei mundat. & flor. violar. & liquiritiæ præscripsi, & vt sub noctem hordeatum, cum sero lactis concinnatum ei daretur, mandauimus, & ad expectorationem sequens eclegma. *℞. syrup. viol. syrup. inuibini, ana ʒj. syrup. de liquir. ʒj. B. loch.*

leob. de succo farsara, zaccari, viol. penid. ana 3 ij. diatr. frig. 3 ij. misce, & diatr. agam. frigid. in tabulis sepe capiebat. Sexto magis expectorabat. Sequens decoctum praescriptum. 2℥. viol. malua cum ruto, bordei mundati, ana m. j. semin. 4. frigid. maior. ana 3 j. semin. malua 3 iv. seminis anisi 3 j. liquiritiae rasa 3 ℥. fiat decoctio in aqua cucurbita, (sed quia non habebat pharmacopoeus, in aqua vngulae caballin.) prius adiectis minibus & sebesten-recentibus, scilicet num. vij. pro 1℔ j. colatura addendo syrup. viol. 3 ij. & syrup. iunibini, capill. vener. ana 3 ℥. misce. pectus inungebat ad refrigerationem oleo viol. & amygd. dulc. pauco adiecto olei de semin. cucurbitae, vel melonum, modo ad manum esset. Septimo die deliravit, & metus erat de phrenitide: non dormiebat, astantes illum pro deplorato habebant. Hic rursus coquus me ignorante male in die decretorio electuar. de succo rosarum propinauit: & quamquam tantum 3 ij. exhibuerat, ter alium deposuit. Unde & peius habuit, materia comota, & non omnino educta: nolui tamen aliquod medicamentum adhibere in die decretorio: sed tantum tempora sub noctem, cum vigil permaneret, iungi feci oleo papaveris: & syrupu violar. per se lambendum dedi, & subinde partem vnam diatr. agam. frigid. in tabulis. At in octavo dedi decoctum ex ferro lactis ex prunis paratum, viol. malua & hordeo mundato, liquiritia, cum zaccaro dulcoratum. Quo potu etiam prius quotidiano usu fuerat, quo probe etiam alius soluta fuit, & magis cocta cepit exspuere, etiam hordeato sub nocte assumpto, & prunis suffocatis & coctis in aqua utebatur ad oris siccitatem. Postea poma assata cibi loco sumpsit. Decimo die bene expectorabat, minusque delirabat, paraphrenitide magna ex parte sedata. Interea & hunc linctum sumebat. 2℥. syrup. de liquir. iunibini, viol. zaccar. penid. ana 3 ℥. misce. Undecimo vero die & 13. concocta magis expectorabat, & in 11. deliriu ex toto cessauerat, & mente constabat. Decimo quarto die ab initio morbi plurimum sudavit per totum corpus, bene lotium reddidit ac excrementa, sputo sine molestia quoque exeunte. Nocte sequente bene dormiuit, & magno nostro honore sanitatem consecutus est, neque amplius febricitauit, ac cum optime se habere diceret (nisi quod adhuc quandam caliditatem in pectore sentiret) id circo, vt colophonem huic curationi imponerem, hoc conditum illi praescriptum est. 2℥. conferuae violar. boragin. buglossae, ana 3 ℥. zaccar. viol. 3 iij. pulueris diatr. agam. frigid. recentis parati 3 j. syrup. viol. iunibini ana 3 ℥. misce. Quibus remediis pristinae sanitati restitutus est.

SCHOLIA.

4 **H**æc inflammatio pulmonis biliosa erat, proxime accendens ad pulmonis erysipelas, quod & sitis & deliria, tum alia in observatione dicta indicabant. In erysipelate magis vruntur: & saepe in phrenitidem mutatur, vt euenit Ioanni Henrico Statori Almariano, qui & perpetuo delirio moriebatur. Non solum hæc, sed & biliosa exitialis habetur, quamquam hic procurator euaserit, cum in 14. egregie sudasset: solet enim hic morbus magna ex parte solui sudoribus, vt iuuenibus fluxu sanguinis narium, larga & frequenti exspuptione: & ita in muliere illa iuencula quoque (de qua egimus obseruatione XLV. huius libri) menstrua purgatione pulmonia finit. Ita & puto etiam solui hæmorrhoidi-

dibus fluentibus, signis cæctionis prius in sputo & vrinis apparentibus, & debite in diebus decretoriis contingentibus. Ex quouis igitur redundante fiat succo id genus morbi (inquit Celsus) periculi quam doloris habet. At si creatio flaua non multo permista sanguine inter initia excernatur, salutaris admodum pulmonis inflammatio est: si 7. die pigrescat, minus secuta est, eodem Hippocrat. auctore 2. prognost. Quæ vero peripneumonia cum virtutis imbecillitate sit, perniciosa est, Galeno teste 3. pronost. & 10. method. medend. namque vna salus, tum pleuritidis (vt ipse refert) tum peripneumonias, adde etiam synanchicis, ipsum virium robur. Harum etiam partium, (vt etiam citatur à Donato) inflammationes, veluti etiam ventriculi, & iecinoris, non modo iis, qui ita imbecilli sunt viribus: sed etiam iis, qui valentiores ipsis sunt, mortifera esse solent. Si vero quid peritissimum efferatur in peripneumonia, spumofum ac biliosum est, & ali-quando cruentum, & floridum vehementer, vt Actio placuit, quod etiam pessima significationis existit: & si mortale quidem malum fuerit, vigiliae amplius aderunt, aut somni breues, stuporem ac delirium inducentes, & imaginatione mentem vicissim perturbante non sentiunt valde praesentia mala: extremitates frigidae, vngues liuidi incuruantur: quarta aut ad summum septima die hi moriuntur. Verum si ad salutem permutetur morbus (vt idem fatetur Actius) sanguinis eruptio ex naribus abundanter sequitur, aut alui exturbatio, multis exeuntibus biliosis & spumosis humoribus. Verum licet Actius dicat pulmoniam fluxu sanguinis narium terminari, Galenus 3. de Crisib. contrarium videtur docere, cum dicat: Contingit aliquando propter sanguinem de naribus fluentem phrenitidem fieri: non tamen lethargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amat. Sed si quis attente dicta Galeni inspiciat, intelliget eum loqui de peripneumonia, quæ à pituita sit, in qua sanguinis fluxus est de naribus non conuenit. Sed in biliosa & sanguinea, prodest, vt in phrenitide: & argumento est Galenum de pituitosa intellexisse, ex eo quod lethargo coniunxit: lethargus enim pituitosa est inflammatio, in qua sanguis non ita euacuari debet, cum in deterius vergunt post fluxum sanguinis pituitosa inflammationes. Sed in peripneumonia biliosa & sanguinea saepe fluxu sanguinis finitum vidimus. Præterea cum Actius scribat pulmoniam terminari alui perturbatione biliosis multis excrementis, id videtur esse contra Aph. 16. lib. 6. vbi Hipp. pronuntiauit, à morbo laterali vel pulmonia habito, alui profluuium adueniens malum esse. Et licet ita se habentibus id soleat aduenire (Galeno dicente in eodem comment. to) non potente hepate ad se trahere alimentum, neque conuertere in sanguinem, & quandoque ventriculo idem alimentum corruptente: idem tamen Galen. in mediocri morbo laterali atque pulmonia affirmat prodesse posse ratione euacuationis, & magis cum signa cæctionis apparuerint inesse passionibus: neque adeo timor sed morbus est citra periculum. Sed in morbo vehementiori, nullo signo cæctionis apparente, neque in sputo, neque in vrina, & cum venerit vi morbi, pessimum signum est: & quando perseverat, pessimum quoque est, ratione curationis. Nam illa, quæ aluum retinere debent, cum constri-gant sputum in pectore, retinent quod pessimum est: cum enim dulcibus & eclegmaticis opus est, quæ expectorant, aluum magis fluidum faciunt,

faciunt, quæ in his morbis facile vires proster-nunt, & minus conueniunt, fluxum irritantes. Quod si alia ex causa veniat, vt cibo aut potu aliquo, & non vi morbi, tunc eiusmodi profluuium alui non ita malum est: at malignæ peripneumoniarum superueniens, aut pleuritidis saeva, lethalis esse solet: vt in muliere illa asthmatica & pituitosa valde crassa, quæ extra portam, qua Schidamum itur, decumbebat, plusquam 50. annos nata, quæ in hyeme Anno 1562. pleuritide pituitosa correpta esset, cui & portio bilis & atrabilis admixta erat, vt ex sputo modo nigriusculo, modo flauo & subalbo, parum sanguinis mixto, constabat, cui vena secta quidem fuit in brachio è directo loci dolentis, & cum sanguis nigriusculus & valde corruptus fluxisset & limosus, pessimum signum erat, & plerumque mortem prælagens, cum aliis signis malis: quod quidem ego longa experientia in praxi quotidiana animaduerti, præcipue vero in pleuritidis, pulmoniacis, & aliquando in inflammationibus hepatis & lienis, & in phrenitidis, si sanguis demissus è vena corruptus, niger, limosus, tenuisque in fundo, & in parte superiori aquosus, corruptus, pituitosus, ac non nihil liuidus cernatur, neque ab aere externo congeletur, sanguine nullas fibras habente, qualis in lue Gallica subinde apparere solet. Talis enim sanguis in diuersa vascula receptus arguit maximam corruptionem, & humorum putrefactionem haud exiguam, & tandem caloris naturalis extinctionem, & in multis mortem ipsam. Est autem talis sanguis limosus in fundo, qualis est atramenti limositas, & non congelatur aut crassecit sanguis, vndique liuiditatem & nigritiem habens, quæ non spissatur. Eodem tempore & alius pleuriticus extra portam habitans, qua in Hagham-Comitisit, cui similis sanguis è vena dimissus fluxit, & quinto die etiam sanguinis multitudo è naribus erumpebat, morbo nondum concocto, & vrina cruda existente (idque in die non decretorio) pessime sputo crudo vix exeunte, septimo die fluxu quoque ventris oborto, morbo crudo permanente, nonno die obiit. Ita & alteri mulieri similis sanguis fluxit: etiam in nonno obiit: quemadmodum & hæc mulieri, (de qua paulo ante diximus extra Schiedamam portam habitanti) contigit: Quinto enim die febris aucta, sputa nigriora, vrina cruda in sexto: septimo vero die lateris dolor in totum euanuit, sed pectoris auctus: atque obtusi sensus, malis rubentibus in peripneumonia pleuritide conuersa, superueniente fluxu ventris, cum fetida nigra, quasi partes pulmonis excerneret, viribus delectis, in vndecimo facto prognostico obiit: Caterum pulmonia tamen, si ex phlegmate sit, minus pestifera est: verum diuturnior, sicut & ex atrabile: biliosa vero, vt ante meminimus, exitialis habetur, quoniam oculus ad cordis penetralia pertingat virus: tum remedia foris intusque imperata minus proficiunt, frigiditate ante penetrationem fere euadida: nam hæc, sicuti erysipela-toides phlegmone, ex feruenti oritur materia: & ideo inter acutos morbos enumeratur, qui quinto vel septimo die hominem interimit: quemadmodum euenit vxori Ianionis Delphenis, quæ cum anno 1598. mense Februar. in biliosam pulmoniam incidisset, & tre quinto die prius vocasset, cum nulla remedia admodum annosa tentasset, & astantes putarent illam peste laborare, cum plurimi hoc tempore morerentur: hæc sexto die, cum prætermilla esset vena sectio, &

vigiliae tum deliria eam vrgerent, mortua est. At Auicenn. ex mente Hippocrat. testatus est, si in pulmonia appareant pustulae circa mammillas & crura, & rumpantur, bonam esse significationem: materia ad exteriora conuersa. Sed intelligendum, modo minuantur accidentia maligna, & tales vel similes abscessus fiant circa aures vel inguina, modo post signa cæctionis cum bonis signis appareant: at delitescantibus carbunculis, febre acuta perseverante, pessimum pronuntiavit Hippocr. 2. progn. Vide egregia & plura de his 2. progn. à text. 64. donec peruenieris in textum 69. in commentariis, quos Benedictus Fauentinus præceptor meus edidit. Sed & hoc his adiungendum, quod aquilonia tempestate pleuritides & pulmoniarum iuxta aph. 5. lib. 3. magis orientur: nam hoc tempore cum hic procurator, de quo diximus in obseru. præcedente, decumberet, passim lethales pleuritides & pulmoniarum oriebantur, eiusmodi temporis constitutione per duos fere menses perdurante: quo tempore etiam euocatus Almarianus ad Mariam sororem mihi carissimam, cum eam à pleuritide & aphtis curassem, in pagis vicinis vulgus referebat nouum morbum grassari, nempe pulmoniam & pleuritidem, ex quibus multi non satis tempestiue medicos consulentes, non nouo, sed veteri morbo, nempe pulmonia vel pleuritide, exstinguebantur. Si igitur à calida causa pleuritis eueniat, sanguis liberior detrahendus in sanguinea aquam biliosa: attamen hæc ipsa neque in biliosa statim in principio negligenda: valent & clysteres secunda & tertia die lenientes & alterantes, vel in debilibus etiam glandes, si aluum non deponant: atque in hac opus est maiore extinctione, quam in pleuritide ob membri caliditatem & cordis vicinitatem; non tamen constrigentia, ne sputum retineatur: vt est aqua melonis, cucurbita, & eclegmata ex mucag. sem. cotoneorum extract. cum aqua viol. 3 j. & emuls. sem. 4. frigid. maior. 3 j. & zaccaro candi, penid. cum syrup. violar. q. s. ad formam lochi, tenuissimo quoque victu vtendum (qui humectet moderate, refrigeret sine astrictione) & quo acutior est morbus, eo magis ad tenuitatem debet accedere. Quare sint contenti tremore hordei, aqua bullita cum syr. viol. vel de cucurbita in biliosa. Aluus si constriicta sit, sollicitanda elementibus: sed solutiuis fortib. non irritanda; nam si fluxus ventris superueniat, mortem significat, & leuiter refrigerantibus & constrigentibus sistendus cum iis quæ etiam sputum non impediunt, vt de pleuritide quoque prius dictum est. Sed in biliosa exterius non applicentur emplastra, quia diu immorantur calefaciunt: sed potius vnctiones ex oleo violaceo conueniunt. Arculanus tamen in puro erysi-

Calida peripneumonia curatio.

Frigida & pituitosa curatio.

quibus vide Paulum & Aëtium, & quæ Donatus commendat ac alij; & quæ Benedictus Veronenſis cap. 40. lib. 8. ſcripſit valere in materiâ phlegmatica & melancholica.

OBSERVATIO XLVII.

De peripneumonia ex catarrho præcedente.

Petrus Bronckhroſtius, in Hagha-Comitis habitans, diu catarrho laboravit: quem parvi faciens, febris acutiſſima cum horrore cum inuaſit, & ſubito inflammatione pulmonis oborta, ſputum cruentum magna cum moleſtia & anhelitus difficultate ac peſtoris gravitate exſpuebat. Hugo Nieuenius Haghanus medicus cum eidem affligeret, electuarium lenitium exhibuit ad faeces communes expellendas: die ſequenti venam ſecuit, & ſanguis valde corruptus fluxit. Tertio die ego accitus ſum: decoctum peſtorale præſcriptum, & eclegmata apta ad ſputum facilitandum. Septimo die peſſime habuit, & dolor latius occupavit: ſed ſacculi adhibiti ex milio, ſtatim proſuere. Die octavo acceſſit & alius quidam medicus Amſtelodamus, cum autem in ſudore eſſet, & melius haberet, nihil innouatum, quamvis decoctum agarici, rhab. & coluteæ cum peſtoralibus propinandum propoſuerat alius ille medicus: ſed ſatis fecit colutea cum peſtorali decocto; & ſeſſum habuit. Nemo melius habuit, ſed non ſatis purgatus: nodulum ex agarico, rhab. ſenæ cum ſuis correctoriis in ceruiſia infundendum per noctem, & expreſſum, libenter alius illi propinaſſet: ſed quia debilis erat, & calor febrilis vehemens, caſſia ab Hugone & à me propoſita in bolo ad 3 j. deuorata eſt; & quinquies multa bilioſa & pauca pituitola excreuit cum alleviatione. Duodecimo die cum eam rursus expeteret, denuo exhibita; & optime eduxit, & ita proſuit, ut à febre liberaretur; & ſputa ſumptis eclegmatibus, magis concocta procedebant, alba neque cruenta: & vrina cocta cernebatur. Decimo tertio die & decimo quarto bene ſudavit, & ex integro curatus eſt, cum à multis pro deplorato haberetur. Hinc in principio diæta tenuis erat: & ſolo hordeato contentus fuit ad ſeptimum diem: deinde ad panatam cereuiſariam & poma deuentum: primo pro potu vtens triſana, & poſtea inclinante morbo cereuiſia tenuiori: & poſt undecimum diem victum auximus, & ad ius pulli, deinde ad oua forbilia venimus; & per totum morbi decurſum à vino abſtinuimus.

SCHOLIA.

Cvratur tamen peripneumonia, ut iam dictum eſt, ut pleuritis, miſſione ſanguinis & alui deiectione & expectoratione, atque hoc quidem intereſſe volunt (ut Rondeletius) quod in pleuritide reſtitudo ſeruanda, in peripneumonia ex vtraque parte fluit ſanguis. Differt etiam (eodem auctore) quod in peripneumonia prima detractio minorem copiam, ſecunda maiorem requirat: & ſi in aliquo morbo, in hoc copioſa facienda eſt detractio ſanguinis, quia affectus magnus eſt & circa cor poſitus. Fit tanta deſluxio vel attractio ſanguinis, tum ob cordis calorem, qui trahit, tum ob venarum frequentiam, tum ob ſanguinis tenuis copiam, quæ in cordis ſinibus eſſe ſolet. Ob partis affectæ dignitatem, & interni affectus magnitudinem, trahendus eſt ſanguis, & fiat à ſanguine vel bile naturali; in pituitola,

ut dictum eſt, minus. Ita & Celfus & Paulus dicunt, ſtatim venam ſecandam eſſe, ex quacunque cauſa ac quouis modo genita ſit peripneumonia, idque in cubiti externa ac ex vtroque brachio, ſi vires admittant: quamquam Paulus ex aliis morbis ſi obrepat & diu in ſtatu fuerit, & ſanguis in principio dimiſſus ſit, detractationem diſſuadeat; ita ut videatur Aëtij ac Celfi ſententia diſcordare: minime quidem, cum Paulus non prohibeat, ſi diuturnus morbus fuerit & inter initia ſanguis dimiſſus, ſed quod vires imbecilliores prohibeant; ubi enim valent, id etiam licet. Sic ego quondam feci in peripneumonia, quæ ex ſe ipſa incepit, in quodam liſtore, qui faciem rubram puſtuloſam ob craſſa ceruiſia potum habebat, & ex nimia ingurgitatione in eam inciderat, & ex ſuis combibonibus quendam empiricum ad ſe vocauerat, & potionem infra ſupraque multa deturbantem acceperat, tum alium tonſorem ad ſe vocauerat, prætermiſſa venæ ſectione, neſcio quæ medicamenta ebibens, cum res ad reſtim deuenerat, undecimo die ad illam accitus ſum; virib. mediocriter adhuc conſtantibus, cum ſputum cruentum eſſet, venam ſecari iuſſi: deinde aptis remediis 17. die ſanitati reſtitutus fuit. Quidam vero ſi quid venæ ſectionem prohibuerit, thoraci cucurbitulas admoovere iubent, ac lateribus deſigunt, quib. tantum ſanguinis eliciunt quantum vires ferunt, ut Paulus facit: vel acri clyſtere aluum ſubluunt, n eſt in principio emolliente: quibus ſi morbus non cedat, leuioribus purgationibus vtuntur, & eclegmatibus & decoct. ad exſpuitionem, adhibitis topicis digerentibus & diſcutientibus, de quib. ſatis dictum eſt, tum de pleuritide, tum paulo ante. Sed aquoſitas illa, de qua prius mentio facta eſt, quæ non reſertur ad legitimam pulmoniam, quæ in pulmone vel thorace collecta eſt, iis remediis educenda quæ aquoſitatem ducunt, ut eſt ſuccus ieros ad 3 j. cum aqua mellis exhibitus. Si autem in pulmone bothor vel alia puſtula parua vel apoſtemata generentur, ut alia apoſtemata & uti peripneumonia vel pleuritis ſanguinea curatur, interea propter paucitatem materiæ & paruitatem eiſdem eſt facilis curationis & citæ terminationis: quamquam ut plurimum eiſmodi apoſtemata parua, vel tumores ſuppurentur: & ideo ipſo erupto regendus erit æger diligenter cura vlcis, ut prius de pleuritide diximus in ſuppurationem verſa: & accuratiſſime ſunt repurganda, ne aucto vlcere ad malignitatem conuerſo in tabem tranſeat: quod neque mirum alicui videbitur, cum ex eiſmodi paruis tumoribus in abſceſſum tranſmutatis phthiſis ſubinde orta ſit; imo ex variolis pulmonem occupantibus tabidos quosdam factos vidimus. Et ideo magis ad honorem medici, tum ægri utilitatem pertinet, tales morbos plus periculi poſſe adferre, neque eos parui facere, ut & ipſe diligens ac prouidus, quo ſuis ſiniſtros euentus præmeditans, omnibus ſymptomatibus ſuccurrere poſſit; ne id quod ſolidis cõtingit, ubi mala ſubito irrepunt, dicant ſe hoc non putari: eſt enim homo omnium animalium præſantiſſimus, quæ ſunt infra cauum orbis lunæ, qui ſemel occumbens denuo non reuiuſcit, niſi in nouiſſimo die. Ideo omnibus modis operam dabit peritus & pius medicus, ne pleuritis aut pulmonia (de qua nunc agimus) in ſuppurationem tendat; omnibuſque modis reſolutioni operam dabit: ſi tamen ſuppuretur pulmone (cum facile in vomitum tranſeat) illico inuanda erit, ut cito rumpatur vel aperiat, ut

rupto abſceſſu citius repurgetur, ne in tabem tranſeat: quod etiam prius dictum eſt de pleuritide ad ſuppurationem tendente & in eam conuerſa.

OBSERVATIO XLVIII.

De empyemate ſeu ſuppuratione.

Adoleſcens Hornanus, nomine Ioannis Garbrandi inſignitus, cum annum 23. ageret, vulnusque illi anno 1551. 29. die Menſis Maij inſiſtens in parte peſtoris anteriori, eoque vulnere non ſatis repurgato & nimium cito conſolidato, puris collectio paulatim facta eſt in peſtoris concauitate, ut aliquot menſibus quotidie pus, ad extremam materiam redactus, exſpueret. Circa 12. diem. Sept. materia copioſa in vnum latum magis collapſa, dolorem & anguſtiam inferbat; duob. medicis tum chirurgo præſentibus. falſa opinionione deceptis, pleuritidem eſſe iudicantibus. Sed ſecta vena & ſotu adhibito, tum aliis remediis nihil profecerunt; dolore magis augeſcente & anhelitus difficultate, quare pro deplorato ægri habuere, quem & Euchariftia & extrema inunctione muniendum eſſe duxerunt. Camque ob purulentiam etiam heſtica febre conſumeretur, & vigilia vrgerent, ſemper in lecto erectus manebat; alioqui præ nimia copia puris ſuffocari videbatur. Decimo quinto Decembris die ipſe Hornam accitus, toto peſtore nudato iuuenem inſpicio; & animaduerti cicatricem ex vulnere inſiſtente, & ut locum mihi affectum monſtraret rogo: & cum tangerem, reperi etiam foris tumorem (qui quatuor aut quinque digitorum craſſitudine in eodem loco diſtabat à vulnere intermiſſe curato) intra coſtas apparentem, ut ſimul etiam puris fluctuationem perſentirem, quare hoc totum malum à vulnere ortum habere dicebam, nulloque modo pleuritidem eſſe: neque poſſe curari niſi locus ille tumidus inter coſtas ſtatim ſcalpello aperiretur; alioqui pure non effluente, ægrum ſuffocatum iri, neque ægrum per tres dies poſſe ſuperuiuere. Prima vice neque æger neque aſtantes vel amici hoc genus operationis admittere volebant, medicis præſentibus: ſed rationibus explicatis, cum Paulus, Aëtius, & ante illos tum Hippocrates, tum Galen. hoc ſuadeant, antequam pulmo corrodat, nullum aliud quam hoc ſuperſeſſe remedium, tandem amiſſere, & idem mecum faciendum cenſebant. Facta tamen prius inter nos conſultatione, num id viſione vel cauterio aut ſcalpello, peragendum, cum prædicti auctores, & præcipue Arculanus, de his omnibus mentionem faciant, quamquam tutius & citius eorundem auctoritate, tum Auiſennæ, poſſe fieri ſcalpello, oratione ſatis longa demonſtrauerim, ita ut in hanc meam quoque ſententiam irent, cum & Benedict. Veronenſis lib. 9. c. 26. idem probet. Tumorem itaque ſcalpello aperiri iuſſimus, pure per vices albo (quod bonum erat) effluente, ne vires deſicerent, præſcriptisque decoctis quæ pus intus repurgarent, reliquum curationis, ut tandem vulnus occluderetur, Chirurgus reliquimus; & ita his optimis prædictis ſanitati reſtitutus fuit: quamquam poſtea Chirurgus longo tempore, cum vulnus occludere non poſſet, tamquam in fiſtulam vlcus propter longam puris fluxionem & ob debilitatem partis mutatum eſt: nam per ſem. annum & ultra pus ex vulnere fluxit antequam conſolidaretur.

Pei. Foreſi. Tom. 2.

daretur, cum diuerſi chirurgi fruſtra conſolidationem tentarent. Quare cum denuo me accederet, conſului ut victu exſiccante vteretur; & decoctis etiam ad fiſtulam facientibus, ex agrimonia, pilofella, centauro minore & capillaribus aliſque remediis aptis ad fiſtulam; de cuius curatione videas Arculanum & alios auctores: his probe conualuit: cuius quidem curatione haud exiguum adeptus fui honorem, cum ab omnibus pro deplorato haberetur. Deo habenda laus, qui ſuis gratiam impertit ſanandi.

SCHOLIA.

Similem vero caſum ponit Amatus cẽnt. 1. c. 61. de muliere nobili, empyemate laborante; pro cuius ſalute cum in conſortio doctorum hominum eſſet, conſultum fuit, ut inter terram & quartam coſtam ſectio fieret: à qua mulier bene habuit, in qua Arculanum reprehendit, qui præcepit, quod inter quartam & quintam fieri debebat. Neque hoc nouum genus eſt curandi: cum Rondeletius cap. altero de purulentis ſub finem, de iuvene quodam à ſe liberato narret, qui per annum pus in thorace collectum poſt pleuritidem geſtauit, & quaſi abſumptus erat; qui tamen vltus fuit, & per vulnus pus purgatum: Adhuc, inquiens, ſuper eſt, & dicitur Salomon: ſicuti & multi quorum nomen ſupprimo. Et hoc de ſuppurationis vnum theorema addens: Omne pus factum & in quacunque parte collectum expurgandum eſſe. Quod per emiſſarium à natura inſtitutum expurgandum, ſiue trahendum & faciendum, ut in abſceſſibus partium, apertione facta, vel ruptura, vel phlebotomia. Si ſub cranio, trepano; in ventre, punctura. Si in thorace punctura vel viſione: punctura melior eſt, vel, ut nos fieri iuſſimus, ſcalpello. Quod ſi hæc pati quis noluerit, tamquam deploratus (ut idem ait) prognostiſis relinquendus eſt. Ita & Amilius quoque medicus inſignis Alcmarianus, Alcmaria ante me praxin exercens, quendam Nicolaum Delium ex vomica in peſtore laborantem & in thorace ſuppurationem habentem facta incifione curauit. Hanc formam curandi deſcribit Gal. comment. Aphor. 27. lib. 6. & eam fortuna iuuentam eſſe aliqui putant: nam miles quidam cum de ſua ſalute desperaret, ad bellum acceſſit, & ab hoſte punctum laſus eſt in thorace: pus fluxit, & liberatus fuit. Ceterum Purulentos vocant Latini, quos Græci *ἰμυρῶς*, communiter eos, in quorum corpore vniuerſo pus eſt conditum: proprie vero medici ſolent vocare eos, qui in thorace & pulmonibus pus habent; ex quo tabidi fiunt, niſi cito excernatur. Morbus qui à Græcis *ἰμυρῶς*, à Latinis Suppuratio, ſeu Purulentia dicitur (& propterea qui hoc modo laborant, *ἰμυρῶν* & *ἰμυρῶν* Græce, Latine vero Suppurati & purulentia appellantur) non vno duntaxat modo in Hippocrat. & Galeni doctrina intelligi debet: nam interdum ſignificat omnem tranſmutationem, quæ fit ad pus, in quacunque parte fiat; ut patet Aphoriſm. 8. 5. & 45. lib. 7. & 2. & 1. Prognostiſicon: interdum vero ſolos eos, qui in thorace ac pulmone vniuerſum pus contentum habent (prius tamen prædictis partibus inflammatione affectis) Purulentos nominant: ut dicatur ſuppuratione hoc modo tranſmutatio ſeu alteratio prædictarum inflammationum ad pus, ut antea quoque dictum eſt; vbi etiam liquet Aph. 8. lib. 5. & 2. Progn. Tertio ſignificat illam quæ proprie

T iij

Quot modis
dicatur ſup-
puratio.

7 dicitur Suppuratio; non siquidem conuersionem inflammationis lateris seu pulmonis ad pus, sed collectionem seu effusionem puris in spatio thoracis atque pulmonis intermedio, post prædictæ suppurationis disruptionem. De ea igitur agemus, non de primo, sed de iis, quæ pus in spatio thoracis inter thoracem & pulmonem habent: etiam per transfennam de altera, licet proprie dicta, suppuratione, aliquo modo faciemus mentionem, quamuis de ea diximus scholio obser. 40. huius libri, cum de pleuritide loqueremur in suppurationem conuersa, quæ tamen non præcipue suppuratio aut purulentia proprie dici possit. At in vere purulentis perpetuo thorax afficitur, præsertim secundum eius cavitatem, hoc est, inter mediam regionem, quæ inter thoracem atque pulmonem est, quapropter angustiam sentiunt laborantes loci illius, pure repleta intermedia ea regione, acciditque eis anhelitus difficultas ac tussis: & in imo thoracis grauitas quadam sentitur: Verum si nondum pus in idem spatium effusum sit, sed vniuersum constiterit in parte prius inflammatione affecta, pulmonem, aut subcingentem membranam affectam esse dignoscet, ex præcedente peripneumonia, aut pleuritide, quæ haudquaquam adhibitis præsidiiis discussæ fuerint. Præter hæc si in pulmone pus contineatur, & in vtraque parte potius, quam in altera, dextra scilicet & sinistra, pus colligitur, in vtrisque incidens, velut quoddam onus persentiscit æger, & æque calidæ ambæ partes sentiuntur, neque ægrius, aut promptius in vno latere, quam in alio cubabit: si vero in altero latere tantum fuerit suppuratio, in altera quoque parte thoracis, dextra scilicet aut sinistra, potius quam in vtraque, pus collectum erit: neque in dextra parte existens, in sinistram; neque contrario in sinistra, transire in dextram potest. Cæterum pars affecta cognoscitur, quia calidior est, quam reliqua, & in eadem quoque duntaxat dolore seu grauitatem sentiet æger: & in eo incolume latus cubante, veluti onus desuper aliquod illi pendere videtur, vt apud Hippocratem atque Galenum legitur 2. Progn. Suppuratio itaque præcipue dicta, quæ nihil aliud est, quam collectio puris inter thoracem & pulmonem, vt prius diximus, morbus est in numero, toto genere præter naturam, ac in excessu, vt lib. 2. de diff. morborum pater. At ea suppuratio quæ transmutatio est, seu conuersione inflammationis lateris aut pulmonis ad pus, cum eodem tempore fiat abscessus dictarum partium, morbus possit dici in magnitudine, velut quoduis aliud genus abscessuum ex Gal. sententia 14. Meth. med. Vtraque tamen morborum genera in numero scilicet, & magnitudine, sub vno prædicamento genere continentur, vt pote sub Quantitate, velut pater eodem lib. De diff. febr. Sed vt harum prædictarum suppurationum dignotio clarior fiat, eas separatim distinguere oportet; & quod ad suppurationem attinet, quam abscessum nuncupauimus, de ea satis dictum est scholio obser. 40. huius libri, cum signa huius suppurationis seu inflammationis, cum in abscessum vertitur, ibidem explicauimus, & principium collectionis & signa disruptionis eiusdem abscessus. Si longiorem sermonem de iisdem desideres, lege Donatum cap. proprio de suppuratione, & præcipue Benedictum Fauentinum præceptorem meum cap. 7. de suppur. in sua magna Praxi & paragraphe de signis demonstratiuis, qui hanc rem longiore sermone pertractat. At rupto abscessu, ac effuso pure in thoracem, ac pulmonem, tunc si

De qua suppuratione hic tractetur.

Pars affecta.

Suppuratio proprie dicta quid sit.

Quis affectus præter naturam.

Suppuratio proprie dicta signa.

gna suppurationis proprie dicta apparent: vehementes febres quiescunt, & magna ex parte dolor quoque licet indefinenter, vt prius quoque dictum est, febricitent, habituali quadam febris grauitatis autem sensus remanet intus in profundo thoracis, simulque transfluere aliquid apparet, iuxta multiplices reclinacionis permutaciones; & maxime cum ab vno latere in alterum decumbunt: tunc sane multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter auditur, prout legitur apud Galen. lib. 4. De locis affect. & apud Aetium lib. 8. cap. 65. totumque thorax iisdem attollitur: & si neque calidus sit ipsorum spiritus, neque exfuffando emittatur, nisi adurens fortasse febris accesserit, vt idem testatur Galen. potissimum vbi magna quantitas puris collecta sit. Educitur quoque eisdem pus nunc purum, nunc sæculentum, vt inquit Paulus. Ex pulsu item poteris diuersa suppurationis temporis interstingere (vt etiam à Donato citatur) nam initio suppurationis statim suppurati pulsum habebant, qualem habere solent in vigore inflammationis; nam hoc tempore initium est suppurationis: erit itaque pulsus durior quam antea, & vibratus magis; sed minor, quam dudum, non tamen languidior, quin etiam crebrior, ac celer: nonnunquam etiam erit inæqualis & inordinatus: verum omnibus erit hecticus; quoniam perpetuo est illa in motu arteriarum agitatio, donec fiat eruptio; licet cum pus prope maturum sit, æqualior sit pulsus; cum vero eruptio fiat, languidior, latior, tardior & rarior pulsus redditur, vt lib. de pul. ad tyr. & 4. de causis puls. scriptum est. Hippocr. vero eodem 2. lib. Prognost. omnes purulentos dignosci his indicibus fateatur nam principio febris non dimittit, sed interdum tenuior, noctu vero vehementior est. Copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adest, quamuis nequicquam commentatione dignum exspuant. Oculi cavi redduntur, genæ rubent, vngues curuantur, digiti vero, potissimum summi, calefunt, atque in tempore; neque cibum appetunt, ac pustula circa corpus erumpunt: quorum omnium Galenus eodem loco causam reddit, vt apud eundem ad longum videre poteris.

OBSERVATIO XLIX.

De suppuratione ex catarrho prius orta, deinde in tabem lethalem conuersa.

7 Cvm suppurationum diuersa sint differentia, video & plures quoque causas habet, vt Galen. 2. Progn. comment. 57. docuit: nam ex inflammatione in pus versa & demum disrupta, siue subcingentis, aut alterius thoracis membranæ, siue pulmonis, fieri potest, vt de pleuritide & peripneumonia in suppurationem conuersa diximus: veluti etiam ex iam dictis liquet; ac etiam Galenus, Paulus & Aëtius ac alij auctores testantur. Sed & propter sanguinis eruptionem, vlcere ad cicatricem non perducto oriri poterit, vt idem Paulus asserit. Sed & ab externis causis alterantibus, vt ictu, contusione, percussione, casu ab alto facto, vel ab obuiatione rei duræ, cum impetu & violentia membra thoracis lædente, fieri potest: & cum quævis alia dolore excitant, horum ratione humores toto corpore & potissimum à vicinis membris ad thoracis locum læsum confluunt, teste Gal. 5. Aph. comment. 53. & 3. qui ob membri læsi debilitatem relinquuntur ab

S C H O L I A.

ab opere naturæ membri, illicque inflammationem gignunt in putridum versi: qua inflammatione disrupta à die ruptionis incipit pus sensim acuari in medio spatio inter thoracem & pulmonem. Et hic modus est, quo suppuratio ab æterna causa gignitur, quæ in thorace & pulmone fatigat: sed ab ea non sumitur indicatio curandi, nisi firmet causam præcedentem, cuius sunt actus & intentiones modorum curandi. Ex angina quoque (vt antea de angina diximus) cum ab ea ægri liberantur, & ad pulmonem vertitur, si non in septem diebus pereant, sed eos effugerint, suppuratio fit; quemadmodum Aphor. 10. lib. 5. ab Hippocrate & Galeno scriptum est. Sed hic meminisse oportet, quod ab angina & à peripneumonia suppuratio in vtrumque fere capacitatis latus influit: à pleuritide in alterutrum duntaxat, in id quippe quod dolore vexatum est. Quandoque etiam per consensum à pulmone disrupta vena (vt sæpe in praxi vidimus,) expulsiuit enim sanguis primo, & inde pus, iuxta Aphor. 15. lib. 7. à sanguinis spatio, puris sputum; indeque suppuratio fit. Quæcunque vero prædictarum causarum suppurationem excitauerit, haud ægre dignosci poterit ex propriis eorundem affectuum signis: vt si pleuritis, aut peripneumonia, aut sanguinis eruptio, aut vulnera, offensiones, seu angina præcesserint. Ex confluxu etiam de capite ad thoracem manante (vt Paulus asserit) ortum ducit quandoque suppuratio; seu (vt inquit Aëtius) ex seroso aut pituitoso humore, ex reliquo corpore in vacuum thoracis delapso illicque putrefacto: id quod confirmari videtur ab Hippocrate simul atque Galeno Aphorism. 38. lib. 7. cum dixit Hippocrates: Destillationes in ventrem superiores suppurantur intra viginti dies; & lib. 1. De morbo ad eodem Hippocrate, dum asseruit, suppuratos interdum fieri, cum pituita de capite copiosa & acuatim in superiore ventrem fluxerit, quæ ibi putrescit & in pus vertitur: nec minus huius causæ notitiam habebis, si præcedentem destillationem considerabis, ac eiusdem signa pernotabis. De delapsu pituitosi præsertim & seriosi humoris, multi dubitant, cum pus generetur ab inflammatione ex effusione aut collectione puris in thoracem & pulmonem; aut vbi contusa caro fuerit, aut ex humore, qui phlegmonem produxit (vt 5. de simpl. med. facili. & 1. de diff. febr. de generatione puris per inflammationes & phymatoses) tumores omnes superante quidem natura, quemadmodum in humoribus intra vasa putrescentibus, id quod subsidet in vrina proportionem puri correspondet: respondent similes puri reddi, & non in pus verti. Vel erit non immediata, sed mediata causa suppurationis, destillatio. Sic nouimus mulierem & vxorem cuiusdam ceruicis, ex catarrho subito in pectus delapso ibique putrefacto tandem (cum statim non adhiberet apta remedia) ad suppurationem deuenisse, & per aliquot annos quotidie magnam copiam puris in concauo pectoris diu morantis tussiendo expulisse, & tunc varios medicos consuluisse, nihilque consecisse, donec per octo annos pus continuo extulisset, pulmone quoque corrupto & exulcerato; ita miseram vitam trahens ex tabe obierit. Hanc autem suppurationem ex catarrho ca. proprio De causis suppurationis præceptor meus Benedictus Fauentinus fieri dicebat per consensum, magis autem senibus asthmaticis tussi & destillationibus obnoxii, cerebri vitio etiam consentiente.

7 Vidam vero fieri suppuratos volunt, si pituita ex capite destillat ad pulmonem, ex qua temporis progressu exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhaerente, ac putrescente, vt visum fuit Hippoc. lib. De morb. 1. quos tamen aliqui potius tabidos vocari volunt, quam suppuratos. Cæterum in suppurationis diligenter signa prognostica sunt examinanda, cum aliqui ex suppuratione, vel paulatim vel subito pereant ac suffocentur, & quod plurimum suppurati pereunt, & nonnulli eorum supersunt: Potissimum vero hi supersunt (vt inquit Hippocrates secundo Prognosticorum) quos febris eodem die dimiserit post eruptionem, ac cibum citius appetunt, & siti liberati sunt, & venter exigua ac consistentia deiecit, & pus album lene, concolorque est, ac vacans pituita, & absque labore ac valida tussi expurgatur: tale enim pus, quoniam optimum est, futuram suppurati indicat valetudinem, & quod valida tussi pus expuunt, id indicat thoracis facultatem expultricem supra morbum & causam validam fore, & materiam eidem obedientem, & vias ad propulsionem patentes & paratas; & ij quoque supersunt, quorum spiratio & reliqua accidentia mitigantur. At horum quibus alia adueniunt, alia non, ij partim in multo tempore incolumes euadunt: verum ex iis incidiis omnibus, quæ in iis existunt, de cæteris quoque vniuersis coniecturandum: nam qui prioribus indicibus omnibus tentatur, proculdubio celerrime liberatur. Ita optime quidam sic ac celerrime vindicantur, quibus ad hæc proxime accedunt, moriuntur vero ij, quos febris non deserit, aut cum videatur deferere, denuo recalcenscens innotescit, & sitiunt, nec cibum appetunt. Alius humida est, pus viride liuidumque spuunt, vel pituitosum spumofumque: pereunt ergo si hæc adsint. Quod autem pus nigrum ac viride 2. prædict. tex. 63. malum sit, eo quod natiui caloris extinctionem, & offensam partis corporis mortificationem significet. Seniores quoque suppurati ob facultatem expultricem debilem non restituantur. De iis vero suppuratis, ac purulentis, qui ex pneumonia sunt, eodem 2. Prognost. Hippocrates sic scriptum reliquit: Quod si maiores natu fuerint, potius intereunt: per alias vero suppurationes, minores natu potius moriuntur. Et enim (vt inquit Galenus in commento, & citatur à Donato) purulenti ex pneumonia, quia propter exsecrationem sanari debent, viribus propterea egent validioribus, & ob id potius minores natu, quam maiores seruantur. In cæteris vero suppurationibus, iuniores natu antea moriuntur, propter vehementiores dolores ac febres, quæ magis dum suppurationes sunt, illis accidunt: quo fit, vt propter magnitudinem februm ac doloris morte præoccupentur, talem protulit sententiam Hippocrates, vt prius quoque dictum est, Aphorism. 15. lib. 5. Quod si in quadraginta diebus purgantur, à qua sit eruptio, liberantur; si vero non, ad tabem transeunt. Conuersa autem inflammatione lateris aut pulmonis in suppurationem, rumpitur nonnunquam sursum versus, quomodo etiam periculosior est, Aëtio & Paulo testibus: aliquando vero deorsum, vt antea quoque diximus: si sursum, & non quam citissime pus per sputum reiciatur, tabidi sunt, Aëtio teste; & Paulus id idem confirmat, nisi eisdem

Signa prognostica.

dem summa adhibeatur diligentia, protinus purulentia illa collectio tamen accerit, pulmone exulcerationem contrahente. Quæ vero suppurationes inferius tendunt; rumpuntur, non adeo periculosa existunt; cum in aluum & intestina (ut antea quoque diximus) aut in vesicam transfundantur per vasa quædam, transmissio ad ea membra facta, ut *disertissime Galen. 6. De locis affect. & comment. Aphorif. 30. lib. 7. docuit. At suppurationi*, quibus propter magnam puris copiam inter thoracem & pulmonem collectam totus thorax in respiratione attollitur, celerime suffocantur ex Galeni testimonio 4. *De loc. affect.* Tum ob affectum ipsum, ut ipse refert; tum quod vires omnibus suppurationis defessæ (si quidem propter pugnam ex necessitate) imbecilliores redduntur.

Quæ puris generationi opulentur.

Quæ compellant puri generi.

Quæ compellant medicamentum suppurationi proprie dicte.

10

Quod ad curationem attinet, quomodo illi curentur, quibus suppuratio incipit, diximus prius scholio obler. 41. huius libri, & quomodo puris collectio seu concoctio sit iuuanda, & ita fomentis per spongas natura, ex Paulo, adiuvanda, nempe hydrelæo, etiam farina triticea pura aut pane puro modice cocto cū hydrelæo, adeps suillus, vitulinus, gallinaceus, seu anserum cum malua seu althææ radice permixtus: vel cataplasma ex caricis decoctis in retardantibus suppurationibus, hordeacea farina, althææ radice, columbino stercore, & modica resina therebinthina, ex Paulo & Aëtio: & cerata ex butyro, ruta, iride, baccis lauri, & Aëtius iubet, adiectis radice malua, althææ; & adipe, prædicta farina hordeacea, triticea, oleo communi, amygd. dulce, chamamel. & cera adiecta. Formulas horum & cataplasmatum & emplastrorum vide apud Rondenel. cap. altero *De purulentis*, & alia quæ intus dantur hoc tempore & decocta & eclegmata. Quæ autem pure genito competant, eodem scholio obler. 41. diximus, quibus modis fiat ruptio: eo tempore danda mellea sorbitio, interposito tempore & ptisanæ cremore vtendum cum melle, & in valentioribus, ex Paulo, decocto hyssopi, & thymi cum melle: commendat & salforum esum, & pilulas de hiera ex colocyntide, à quibus tamen abstinere censeo: potius darem syr. ex hyssopo, marrubio, idque crebrius. Conducit quoque non parum ad abscessus rupturam, super sanum latus decubitus. Pluribus cibis & salis ac pinguibus & vino austero vtendum, & tussis inducenda ex Hippoc. lib. *De locis in homine*, & exscreationem facere oportet. Extra, iuxta etiam confert cataplasma ex solo stercore caprino præferim ubi ruptura tardauerit. Verum rupto abscessu adiuuare oportet puris excretionem, quocumque repere cognoscatur, ex decreto eiusdem Aëtii: si ad aluum, magis emollientia danda; si ad vesicam, ea quæ vrinam ciunt: si per tussim puris repurgatio fiat, ut loco citato antea diximus. Vallet ptisana cum melle mixta, & iuxta Paulum hyssopi, iridis aut dulcis rad. decoctum in mulla diluta, & Aëtius quoque sentit, & radice dulcis succus commanducatus. Aëtius ea quæ vrinam ciunt, cibis commode mista laudat: contra Galen. nimis actia medicamenta vrinam cientia, aduersa scribit puris ex thorace exspuioni, lib. 5. *de simp. med.* sed intelligendum quæ minus calida & actia sunt, etiam in cibis administrata, nempe humidis, iuxta Aëtium prodesse, & cum potionibus & sorbitiunculis. At ubi diuturnior affectus & vires imbecillæ, & calor febrilis moderatior euaserit, neque thorax multum puris contineat, iuxta Alexandrum lac dandum, asinum præcipue, ubi fordium, ac fædi odoris pus expurga-

tione indigens existat; post ipsum, equinum, & tertio loco bubulum & caprillum, calculus fluuiatilibus candentibus iniectis coctum. Sed de his plura, cum de vlcere pulmonis ac phthisi agemus. Reliquam vietus rationem quæ suppurationis conuenit, apud Paulum & Aëtium inuenies, & præcipue apud eundem Alexandrum Trallianum, qui copiose de hac re scripsit.

OBSERVATIO L.

De suppuratione à sanguinis spūto.

DICTUM est prius ex Aph. 15. lib. 7. ex sanguinis spūto puris spūtu malum. Dicit Galen. in commento, neque omne spūtum sanguinis sequens habet spūtum purulentum: sed quod malignum existit. Tale autem omnino est ex pulmone: tales vix euadunt, cum omnes, ut sæpe in praxi vidimus, ad tabem perueniant & moriantur. Et quanquam Galen. dicat ex pulmone id fieri, non negat tamen ex vena thoracis perrupta velerosæ posse euenire, & intus erosæ vena vel perrupta, spūto sanguinis postea succedat empyema vel suppuratio, pure in concavitate pectoris coaceruato. Nouimus enim quædam annorum circiter 35. ex spūto sanguinis, ex vena pectoris exelæ, in tantam suppurationem deuenisse, ut subinde, integram peluim puris fædi odoris, ac sordidi exspueret: qui tamen nostra industria euasit præter omnium hominum opinionem, qui eundem salutandi causa inuisebant. Iubebam ut acrem siccam in calido ac frigido temperatum inhabitaret, vel paulo ad calidum vergentem, quem & inquiete diligenter custodiu: cui & imperauimus motum aut exercitium iniret, sed potius fomno temperato vteretur, ac singulis diebus excrementa excerneret natura, vel arte, si per aliquot dies dura manerent, clystere præferim leni: namque exonerata natura ab eiusmodi excrementis, promptius suppurationi vacat, expurgando. Deinde ut immodicas animi afflictiones vitaret, consului; præsertim vero metum & tristitiam. Pro nutritione, cum debilis esset, ptisanæ succum dedi, & mullam, non vniuersam sed paulatim, & totam ptisanam & cremorem cum iure gallinarum seu pullorum gallinaceorum, phasianorum aut perdicum, & columbarum, vel vlcus magis detergerent, ventrem humidiorum efficerent, modo thymo, hyssopo aut feniculo adiecto, brassica subinde aut asparago: & ut carnes eorundem animalium ederet, concessi. Potus erat aqua hordei vel mulla: aliquando vinum (licet febrili habituali laboraret, sed non valida) ad dulcedinem declinans, lymphatum cum aqua hordei, vel admixto zaccaro candi, si dulce non adesset. Iridis radicem, hyssopum cum melle decocta & sicbus, adiecto syr. capill. ven. hyssopi, & marrubio ad magis abstergendum dedi. Nam ad pus fædi odoris & si sordidum exspuitur, scæugraci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum Aëtius propinat, & horum inopia sicus siccas modicas incoquebat. Lac asinum etiam ut daretur consului, quod & sordidum ac fædi odoris pus (ut ex Tralliano antea diximus) egregie expurgat: sed cum deesset, eius loco caprillum dedimus, cum febrilis calor moderatior esset. Atque his & similibus prædiis curatus fuit.

SCHOLIA

SCHOLIA.

Hic tantum copiam puris (ita ut in aliis suppurationis sæpe vidimus) sæpe extulsi, ut singulis fere diebus dimidiam peluim impleret. Imo multos vidi tantum puris eiecisse, ut tota peluis ad puris exspuionem vix sufficeret. Quod minus quis mirabitur si locum Galeni 5. *de locis affectis*, de suppurationis aduersus Erasistratum perlegerit, cum velut non paucos perire, ita & alios complures seruari viderit Galenus: quorum si quis per singulos dies reiecti puris quantitatem collegerit, interdum sex aut octo heminas, interdum quindecim, atque interdum plures totam summam æquare inueniet. At suppurationum per exspuiones purgationem eodem loco Galen. explicat: namque exspirationis tempore, inquit, vniuerso thorace vehementer constricto per validam tussim (sine qua fieri nequit) pus quod intus ipsum, & pulmonem continetur, comprimendo cogit, atque pulmonem ipsum impellit, concedente pulmone membrana, eiusdem puris, ac similiter cuiusvis alierius excrementi penetrationem, etenim thorax vehementer admodum hoc tempore pulmonem omni ex parte comprimit: & demum cum & maiores sint in eam exelæ, in tantam suppurationem deuenisse, ut tremitate asperæ arteriæ partes, quam venæ, & arteriæ lenes, ac multo ampliora habeat ora, nec ita coincidunt, neque omnifariam concludantur, propterea quod cartilagineæ sint, in asperas ipsius pulmonis arterias recipitur, & non in lenes, ac venas, & deinceps exspuitur. Hæc satis de curatione suppurationum: plura de his vide apud Benedictum Veronensem lib. 9. cap. 22. & 23. *De remediis quibus veteres medici ad purulentia vti sunt*, sic & ca. 25. addit curationem quæ manu fieri solet. Inter costas, inquit, scalpello infixo vomica subito aperitur (ut nos fecimus obler. 48. huius libri) idque à medicis laudatur plurimis. Hippocrates inuri docuit, tuto experimenter: sed cauendum est, inquit, ne plurimum puris subito effluat, ne anima deficiat, atque id remedium tempestiuum esse debet, antequam pus pulmonem erodat: sed si latus sinistrum feriendum est, cordis vicinitas cauenda. Si in utroque latere vomica fuerit, utrumque latus, non tamen eodem die, perforamus: ab eo tamen incipiendum est, quod magis tumet. Idem in pectore medio fieri quidam iubent, & deinde quæ ambullis prosunt, imponenda sunt. Dempto pure, vomica elueda est nullo aut hydromelite, donec perpurgetur. Hæc ab Arculano mutuatus est.

OBSERVATIO LI.

De suppuratione seu vomica totius pulmonis.

Pulmonem exulcerari nouum non est, sed totam eius substantiam in pus conueri, & nihil aliud quam pus esse, & sola membrana succingente pulmonem contineri, ut in cauitatem ea minime rupta defluerit, id rarum esse existimo. Id equidē euenit Domino de Abbenbrouck æconomus tunc existenti Regis Hispaniæ ac Angliæ, qui cum longo tempore catartho acti in pulmonem collapsus, tabe consumptus in domo Regia in Hagha-Comitis decubisset, variis afflictis symptomatibus, potissimum arthritide & gonagra, renum calculo, & pulmonis vomica: varia sunt præscripta remedia per duos medicos Haghamos: atque his nihil proficientibus, dum &

hæc febre consumeretur, ego tunc Almaria habitans, ad eundem accitus, primo Ianuarij die, anno 1555. perueni. Tunc nihil nisi ossa pelle circumducta restabant: cum nulla medicamenta iuuarent, dudum factis prognostico quod moreretur, ultra menssem apud eum hæsi. Cum alium medicum ablegasset, & alter ipse morbo detentus illum non amplius inuiseret, solus in curatione permansi. Sed paulo antecius mortem lotium ad quandam medicum transmissum, cum ex hepatis debilitate potius quam abscessu per vnum aut alterum diem sanguinem per aluum reddidisset, quod clam medicus intellexerat; quare iudicabat apostema in hepate latere: ita ut Domina de Abbenbrouck filia Domina de Bergen; me tum alios medicos, qui paulo ante me agrum tractassent, ignauia accusauerit, quod apostema illud in hepate minus agnouissemus. Ego vero inqueiebam (cum alij non amplius agrum accederent) id autem post mortui incisionem minime reperietur, sed tantum malum esse in pulmone, & calculos aliquot nos inuenturos renibus ipsis infartos: quod & postea incisio demonstrauit. Nam 10. Februarij die mortuus est, ægens 38. annum: & cum Domina de Bergen, & vxor Domini de Abbenbrouck filia eiusdem Domina de Bergen, mihi cum chirurgo iniunxissent, ut cadauer prius incisum à nobis balsamo (ut moris est) condiretur; corpore dissecto inuenimus pulmonem nihil aliud quam vomicam esse, & renes calculo infartos: hepar quidem integrum esse, sed flaccidum, nullo abscessu corruptum, ita ut forte ante mortem organum sanguinis ex debilitate sanguinem retinere non potuerit: pulmo enim plane suppuratus & putrefactus, membrana integra exstante, maculis tamen plumbeis & cæruleis interstincta: quam ipsemet digitis cum attingerem, perrupta membrana tanquam vomica magna, pus instar olei amuræ erumpebat valde fætidum & corruptum; adeo ut totus pulmo nihil aliud quam purulentia esset: quæ & mortis causa censenda erat.

SCHOLIA.

Hæc vomica totum pulmonem occupabat: sed vomica illa pulmonis, quem abscessum Lib. 5. c. 1. exiguum pulmonis vocat Fernellius, ab hac plurimum distabat: nam Fernellius ita appellat puris in pulmonis parte aliqua collectionem, quod membranula propriaque cysti arte adeo concluditur, vix ut quicquam de se tetrum in cor exspiret. Hæc frequens est in tabidissimis; sed & plerumque sine tabe fit, quum sanguis ex aperta, rupta, aut exesa vena, in paruam quandam pulmonis regionem secedens, illic putrescit, sensimque mutatur in pus, ac per summa siccescens, sibi cystim efformat. Latens profecto & in primis abditum vitium, sæpe nec laboranti nec medico notum, quo laborans ipse nec consueta munia intermittit, nec se morbo teneri putat, causamque interitus sui nesciens intus gerit sub pectore. Adolescens quidam à paulo vehementiore exertatione, quum acerba tussi, nullo puncto temporis intermisso torqueretur, vomicam integram columbini oui magnitudine excreauit: in qua aperta pus exquisitè album & æquale deprehensum est: cruenta excreatio integrum biduum persistit, magna febre magnaque corporis perturbatione. At nihilominus seruatus is est, atque sanitati restitutus. Nō pauci inopinatio è viuis horæ quadrante erepti sunt, in quibus disse-

Historia Fernellij de vomica pulmonis

Cris

Etis non alia mortis causa comparuit, quam repentina vomica disrumpio in pulmonibus, & quæ pus in cordis arcem penetrauerat, ipsius vim exstinguens atque obruens. Quamquam ex his duo (inquit Fernelius) medici essent percelebres, at tamen nec febre nec inappetentia, nec alio villo symptomate, impendentem sibi diem vitæ supremum præferunt. Id mihi quidē persape eius loci memoriam refricauit, quo inquit Hippoc. quibus suppuratio in corpore abdita non innotescit, ea propter crassitudinem, vel puris vel loci delitescit. Etenim haud raro efficit obvoluens membranæ densitas, vt nihil tetrum à pure in cor, vitæ fontem, inspiretur. Omnibus tamen sic affectis multo tempore, antequam vomica rumperetur, cruenta exsereatio processit & pulmonibus, eaque cum tussi: adfuitque spiritus grauis ac fœtidus, corporis grauitas, pectoris leuis oppressio, & spiritus difficultas, quibus tabes raro comes. Sed hæc quidem signa aliorum quoque affectuum communia sunt. Hactenus Fernelius. Sed vomica, de qua nos nunc loquimur, non erat in aliqua regione pulmonis, sed in ipso toto pulmone; quæ etiam ad suppurationem pulmonis referri potest: dicitur enim Vomica ab Alexandro Benedicto Veroneusi à vomendo, cum virulentum quid vomat: & sub empyemate quoque continetur, vt aliæ omnes abdite collectiones in aliorum viscerum partibus, pectore, iecore, liene, ac vluva, vt tradit Aegineta; quamuis proprie (vt ante dictum est) suppuratio collectionem in pectore notat. Differabat igitur à vomica ipsius Fernelij duplici modo, cum neque cystim haberet, neque tam exigua esset, neque sine tabe: imo hic phthisis erat, non sine vlere ipsius pulmonis, cum etiam pus cum pituita quotidie exserearet, quod quidem vlus suppurationem totius pulmonis induxit, manente intra pelliculam ipsius pulmonis pure: sed dissecto corpore, pellicula perupta nil nisi pus effluxit olidum, vt quis in loco, in quo sectio fiebat, vix permanere potuerit. Atque hæc causa mortis fuit.

6 Sine igitur velitis vlus appellare in pulmone purulentum, vel suppurationem pulmonis, mihi perinde est. Et quamuis in principio, dum nondum quis febris in habitu laboret, qui pusulentum vlus habet, neque sensibilis sit extenuatio, aliquando Galenus tentauerit curationem, tamen non semper perfectit. Est enim difficillima, nec de glutinatione spes est, vt aliqui somniant, qui ægrum eò curatione, quam imaginantur, deducunt, vt vlus purgetur, & glutinetur, quasi id fieri possit sine tussi, & tussis non dilaceraret partes pulmonis, vt dixit Galenus. Si tamen sicemus id, vnde & putredinem sistamus, tunc facile præseruabimus corpus illud, ne interius labatur. Callosum ergo & sicum quo ad labra vlus fiet, & velut sicca quædam labra habens, vnde neque sanguis profluat, neque sanies, nisi recrudescat accidente aliquo. Quod si eius prouidentia semper habeatur, poterit sic diu perdurare; perfecte sanari est impossibile: quamuis enim vlus semper aliquid tenuis saniei transmittat, vt vetusta, & callosa vlcera facere videmus; id tamen exiguum est, neque tale, vt febrem accendat: & quidem vidi sæpe diu sine febre perdurasse. Tales autem priusquam magna accederet putredo & febris, imo cum vlus purulentum sit, seu eius sit suspicio, Galenus ad Tabias mittebat omnes, cum à mari non longe abisset hic mons, & modice edens sit, nec ventis nimis sit expositus, & humidis nebulis irroretur, nec è paludibus

fluuiisque proximis id accipere possit: ideo Galen. acrem eligebat siccissimum, quod maximum auxilium adferre putabat, cuiusmodi describit eum, qui ad Tabias erat: nam hic collis Tabiarum etiam hoc commodum habebat (vti & Mafsetanus collis qui Pisas Lucamque interiacet, & Florentiæ Vesulanus mons) quod constitisset fruticibus & herbis siccis & odoratis, quæ ad sananda vlcera multam vim habent. Secundum remedium erat lac, vlus abluens & detergens, ad siccandum præualidum, ex herbis depaltis, quæ sunt rubi, arbuti, lentisci, myrti, abrotani, cythi, hederæ, cythi; quibus nullæ sunt, quæ æque siccant, & partem adstringant & roborent: ideo ad eiusmodi lac sunt mittendi. Et hoc primum quoque remedium est, quo vtiut Rhafes. Galenus præfert alinum, mox caprinum, cuius vsum exposuimus, 4. lib. obs. nostrarum De febr. hecicis: facile nutrit, eo quod natura familiares succos celesiter vincat & trahat, & ob id illo ad extenuatos commode vtimur: & ideo veteres mulierem lactantem his, qui tabe consumerentur, astare voluerunt. Tertium remedium erant medicamenta vehementer siccantia, vt Theriaca, mithridatium; & laudant quidam zaccharum rosæ & purpureis confectum rosæ: Vetus enim illud siccant, extergit, astringit, & non est calidum: vnde potest aliis dictis admisceri ad contemperandum. Hic tamen multum obsuit has curationes miscere: neque enim omnia in omnibus laudantur; sed & multa prioribus nocent, quæ subsequentes iuuabunt: de quibus etiam diximus de febr. hecica, sunt enim quibus febris iam adest, & extenuatio, sed non confirmata, id est, perfecta, quæ solida inuaserit. Hic enim non modo vlceri attendere oportet, sed & febris hecica & extenuationi: quamobrem lactis vsum exquisitissimus hic esse debet, de quo satis superque diximus 4. lib. obs. nostrarum De febr. hec. Sed & lactis vsum abunde est expositus 4. method. & loco iam citato. Verum cum vlus pulmonis tabem inducat seu phthisim, atque ea ipsa sit vlcerosa dispositio in pulmone existens, de ea nunc exempla quadam adducamus, quæ ad maiorem huius affectus explicationem, tum etiam curationem, plurimum iuuabunt.

OBSERVATIO LII.

De vlere pulmonis & phthisi, ex sanguinis sputo prius male curato.

5 Scribit Rondeletius magna ex parte phthisim (quæ fit à sanguinis sputo, cum sanguis remanet intra pulmones, & illic putrefactus acquirat acrimoniam, qua erodit substantiam pulmonis vnde & vlus eiusdem) euenire ob medicorum imperitiam sanguinis sputum curantium, qui nulla facta diuisione, vel per sanguinis missionem, vel per ligaturas aut cucurbitulas, aut alio modo, statim dant potiones adstringentes, quæ sanguinem defluxum ibi retinent; cum debeant potius aquam mullam, aut poscam dare, & postea quæ constringant. Quod istis diebus euenit cuidam mulieri, quæ cum ita perperam per empiricum curaretur, in phthisim postea incidit, adeo vt nullo modo curari potuerit, cum tardius ad eandem ingressi essemus. Ideo quoties timemus phthisim à sputo sanguinis, debemus ea vturpare (vt antea quoque de sputo sanguinis docuimus) post sanguinis detractionem & diuersiones, quæ venam consolidant, vel sanguinem sup-

supprimunt, cum facultate dissoluendi sanguinem coagulatam; vel quæ per sputum pulmones expurgant, vel contraria commiscentes, tale medicamen conficientes, quod vtrumque possit tum abstergere, tum venam consolidare: cuius exemplum antea posuimus, cum de sputo sanguinis egimus. Habes alias formulas huic rei accommodatas apud Rondeletium cap. 12. De vlere pulmonis & phthisi: vbi etiam ad vlus pulmonis curandum tum phthisin egregia habes medicamenta.

SCHOLIA.

3 **Q**uamuis Cornelius Celsus (vt ostendimus scholio obser. 97. De crurum atrophiam lib. 10.) tabem in tres species distinxerit, in atrophiam, cachexiam & phthisim; nos hic de tertia specie longè omnium periculosissima loquimur, quam Græci (vt idem Celsus inquit) *phthisin* nominauerunt; quemadmodum Hippocrat. nonnullis in locis, præsertim Aphor. 16. 7. lib. licet hanc etiam Græci potissimum Athenienses (vt Galen. in commento refert) *phthisin* appellent: *phthisin* quidam scribentes, per *v*, à *phthisis*, quod est sputo, deducunt: alij melius (vt Iacchius censet) per *d* deducunt à *phthisis*, quod est absumo & corroumpo, quod vniuersus corporis habitus in his corruptatur. Latini Tabem dixere, & Tabescere & Tabidos. Quæ autem melior etymologia sit, patet. Non enim solum phthisis ad sputa cruenta & pusulentata sequitur, sed ad alias causas, vt febres ardentes, & siccitates quarundam partium, quæ multam vim alticem tribuunt vniuerso corpori, significat igitur id nomen, morbum in magnitudine, & ab obeso distinguitur. Adeft vero vna & alius affectus, nempe corporis siccitas; & erit similitudinem sicca intemperies: atque his affectibus phthisis describitur: Est enim siccitas corporis. Sed pressius tum sumi videtur à scriptoribus, vt solum dicatur de ea siccitate, quæ vlus pulmonis consequitur: alias vero Marasmos solos appellauit; vt marasmus genus sit, hæc vero species quedam, licet nomina id significant. Possumus & definire tabem vniuersam, vt Gal. facit, quod sit animantis vel etiam viuientis interitus exsiccitate, lib. de Tab. Tale enim quid hic contingit, qui sic laborant, quale per naturam seni contingit: quæ etiam arefactio, inenitabilis est, vt Galen. docuit 1. De sanitate tuenda. Solidæ enim partes arefcunt; quarum humiditas propria restitui nequit. Est hæc siccitas modo sola & simplex tabes, cum actiue qualitates mediocriter se habent, modo cum alteri qualitati iungitur, idque bifariam: si calori, tunc torrida tabes appellatur; si frigori, ex morbo senium, quoniam sic afficiuntur, vt senes refrigerati, secundum partes omnes, & siccitati. Dicitur autem iuxta Iacchium, secundum partes omnes: nec enim tabes de vna parte dicitur, sed totius est morbus: vnde necesse est, necessario principem partem, scilicet cor, affici. Neque enim potest vniuersalis aliqua intemperies euenire vniuerso corpori, nisi cor afficiatur, vt sæpe ait Galen. Potest tamen hic morbus primo à corde ipso oriri; vel ab aliis partibus, quæ cor in consensum trahunt, ob vicinitatem, vel multam colligantiam, quæ partes à Galeno numerantur 10. meth. & 7. vii iecur, mox & ventriculus, tum hoc, tum vicinitate. Iecur autem citius siccatur in consensum trahit alimentum ratione: reliquæ partes, vt septum, renes, vicinitate vel colligantia similiter. A pulmone hoc modo tabes

fieri non solet, inquit Galen. quod humida pars sit, nec facile ariditatem sentiat: quamuis id prorsus non neget, cum & vlus patiatur pulmo; & eius ratione potest facere, quod cordi calorem impartit, & tempore hecicam febrem facit. Ex istis iam dictis habemus morbi naturam, & causas: nam siccatio hæc totius habitus, modo solum affectum cordis sequitur, vt in febre hecica; modo ab aliis partibus siccitas cordi communicatur, vt in sicca ventris & iecinoris intemperie. Febris vero illa hecica alias insequitur vlus pulmonis, vt Hippocrates inquit, A sanguinis sputo puris sputum; à puris sputo tabes. Sed num ex aliis quoque vlceribus pectoris? Profecto ex fistulis pectoris diuturnis non sanatis id fieri vidit & Iacchius. Sic & nos vidimus in milite in nosocomio Delfensi vulnerato in pulmone sæpe per fistulam in pectore multis annis pus regurgitasse, & ad extremam maciem deuenisse, & postea in tabem & mortem. Tum alium vulneratum in pulmone (de quo mentionem fecimus lib. 2. obs. De febr. scholio obs. 37. de febre typhode) etiam spectauimus, qui deinde vlceratus obiit. Post eius obitum facta sectione, causam mortis inuenimus mediam partem pulmonis consumptam à pure. Et in altero vulnerato in eodem nosocomio, qui vltra annum cum dimidio ibidem decubisset, etiam facta sectione post eius mortem, totam substantiam pulmonis (siue *παρυχημα*) in pus conuersam & paulatim excretam, membranæ pulmonem succingentibus in globum solum relictis, cor nudatum, sine pulmone, (dictu mirum) spectabatur. Quod paulatim ita per vulnus in pectore pus euomere vidimus, non solum ex fistulis pectoris eiusque vlceribus non sanatis & diuturnis; id quoque sæpe spectauimus ex fistulis aliarum partium, superueniente his hecica febre, quæ vlus ipsum exsiccat. Et 5. Aphor. 15. non alia ratione Hippocrates videtur dicere, quod ex empyemate post quadraginta dies tabes succedat: nisi quia pectus exulceratum est; quæ cum sordidum & insanabile sit vlus: quamuis Galenus dicat in eo casu pulmonem quoque exulcerari ex putrescente pure: cum vero multis modis tabes contingat (vt longiore sermone diximus lib. 4. obser. nostrarum de febr. hecicis) non de omni, sed de phthisi solum loquimur, id est de ea, quæ ad purulentam è pulmone sputa succedit, vel etiam quacunque parte pectoris: Non obstante quod *phthisis* seu tabes non vno modo iuxta Galenum dicatur, quum & tabidos nominat omnes, quomodocunque extrema macie confectos, & illos, quibus pulmo vlceratus est, & eos, qui prompti ac prouisi sunt ad hunc morbum; velut videre licet comment. 10. & 13. 3. lib. & 8. 4. ac 1. De morbis vulgaribus & sexcentis aliis in locis. Nos vero per tabidos audiri volumus, non eos, qui extreme emaciati sunt quomodocunque, nec eos, qui parati sunt ad hunc morbum, vt pote angustio & restricto thorace existentes, vt à tergo in morem alarum promineant, operta scoptula, quos proprie Græci *ἀερόεντες*, quasi alatos vocant, & quibus à capite ad pulmonem fluxio defertur (namque hi quoque facile tabescunt, cum caput facile impleatur, spiritusque organum multas distillationes demittat, Galeno teste eodem lib. de morbo vulg.) Verum nos eos duntaxat, quibus pulmo exulceratus est, Tabidos; veluti per tabem intelligi volumus vlcerosam dispositionem in pulmone existentem, quam idem Galen. describens com-

De quibus tabe extenuationem esse dixit, cum febre tenui, seu exigua,

exigua, consequentem ad insanabilia pulmonis vlcera. Huius itaque rursus exemplum adferamus: nam satis nunc de nomine egimus.

OBSERVATIO LIII.

De vera phthisi & vlcere pulmonis.

Matrona nobilis, vera & exquisita tabe cum vlcere pulmonis laborabat, vt ex sputo purulento cognoui & totius corporis macie. Videbatur enim complicatus affectus; etenim in toto siccitas aderat, & erat affectus magnitudinis & intemperies solidarum partium, & pulmonis vlcus, & febris hectica. Interea cum hic vlcus esset, cum erosione, & cum erosionem insanabilem esse (quibusdam amicis id indicantes) sciremus; attamen non erat plane dimittenda, cum nondum ad extremam tabem transgressisset, & tales diu detineri in vita possint, cum nondum magnitudo vlcis eo peruenisset, vt mortē illico vel breui futurā significaret, vt in illa cū qua vlcus frustula exspuuntur; vel etiam articularum iam erosio: hoc enim vlcus siccari pro magnitudine nequit. Sic enim putris pulmonis portio Clarae Adriani uxori Augustini Teylingij sororij mei contigit, quæ antequam tabe moreretur, per sputum ciiciebat: etiam duobus fratribus tanquam ex morbo hereditario laborantibus, similiter contigit, qui & bronchia pulmonis & asperæ arteriæ corrosa & putrilagine infecta paulo ante mortem excernebant, quibus & sputum carbonibus iniectum aut etiam per se graueolebat: nam & illud sæpe halitus contagione imprudentes inficit, vt quidam volunt. Hinc & nonnulli sunt, quos imaginantur occultas causas habere, tanquam hereditaria consequentia ex principijs generationis, propterea & commisceri cum talibus coniugio euitant. Quod igitur filij parentibus similes sint, & vt quo ad externa lineamenta sunt similes, nihil obstat etiam quo ad internas similes partes: quoniam formatiua vis naturalis extensa est per seminis corpus: ideo iuxta seminis partes, potest & partium oriri varietas. Sic & elephantici tales sæpe gignunt; & debili cerebro debiles, sic & articulis. Attamen cum formationem & temperamentum longe distare viderimus à parentibus, quid prohibet etiam longe à periculo morbi distare? At inter initia vitæ fere manifestantur iis expostiti (vt paulo ante diximus) ex capitis temperamento, & figura: & similiter pectoris, & corporis totius temperamento & habitu. Quod vero & contagione quadam ij, qui vna versantur, affici soleant, fama est apud omnes, & Gal. fatetur. Causa etiam prompta est (quam & Iacchinus adferebat) quoniam putridum spirant. At putredo illa vapore si per aërem trahatur, male potest pulmonem afficere. Et sic Iacchinus quoque nullum vidit contagio perisse. Cæterum istis tribus cum & capilli defluerent alimēti inopia, inualecente febre, & vngues in manibus curuarentur, malæque liuescerent, tetro vapore eo sublato, mors non diu post sequuta est. At matrona nobilis, de qua nunc agimus, longo tempore superuixit, bona victus ratione vtens præcipue. Aërem commendauimus purum, ad siccum vergentem; in calore vero & frigore temperatum, cum nobis locus ille desit, cuius meminit Galenus, Tabia scilicet inter Surrentum & Neapolim, 5. method. medendi ab eodem Galen. descriptus. Nos autem vt solem tum frigus vitaret, consulimus; & austri statū caliginisumque

aërē, vel pluuium, qua ratione autūmnus phthisicis inimicus est: nam & septentrionalis flatus acerrimus obest, si sine pluuiā fuerit: siccitas enim iuuat hunc morbum: montana propterea laudatur, è contra paludes ac plana damnantur: & propterea imperaui, vt pluuiis dieb. in conclau calidiusculo sese contineret, in quo largius respirandum: vtilissime enim iuuat attractus per seueranter spiritus ex Galeno, assuerante tota medicorum schola. Et quia frictions ac deambulationes vel gestationes initio morbi valent; ideo si vires ferrent, iis vt vteretur concedebam. Hinc medici quoque illustres longas navigationes & celi mutationes laudabant: ideo aptissime Alexandriam ex Italia iri Celsus dicebat, potissimum vbi à destillatione Tabidi fiebant. Nunc etiam cymba veli molli ac delicata iuuat, quali Venetiarum vrbs atatenostri inclya (vt nos vidimus cum Venetiis ageremus) inter delicias vtitur. Ad decem enim millia (vt refert Benedicte Veronensis) nauicularum singulis diebus peragantur innumeros canales, cuius delicia; præter onerarias & traiectionibus distributas: multum enim virum adijcit hæc navigatio, & corpora implet. Interea à cibo quietem imperaui, nec nisi post duum horarum intervallum ægra dormiret, & vt somno potius indulgeret, nocturno tamen, eoque moderato. A vigiliis abstinendum & modicis exercitiis, sed potius ambulacionibus lenibus vtendum, præsertim vbi febris sese remiserit, vel lenibus frictionibus ante cibum, tussique vt ab ira, tristitia, aliisque immodicis animi affectibus, tum à negotiis omnibus que rebus, quæ sollicitare animum possint, abstinere; & vt omnem crudelitatem vitaret, & vt sobrietatibus ex ptisana, alica, amylo vel oryza, lacte adiecto, vteretur; vel vt eiusmodi sobrietationes cum lacte amygd. gallinarum seu pullorum iure, componum, perdicum, phasianorum conficeretur: aut simul cum pedibus vitulorum, hædorum aut castoreum decoqueret: vel prædictas carnes confusas, aut earum succum sumeret, quem ius consummatum appellant; adiecta ptisana aut eius cremore exiguo. Amygdalas quoque amaras vt cum ptisana decoqueret, imperaui: eo enim vicitur & Aëtius: nam & ea eligenda, quæ maxime nutriunt, vt iecora gallinacea, gallorum testes, perdice, attagenes anniculi, columbaei pulli non alites, merula; tardi, alaudæ, hædus, ac vitulus, omnia assa potius quam elixa (vt vlcus magis exsicceat) ex succo arantiarum aut mali granati siue vix acerba succo laudantur. Alio vero præcipiti (quæ imbecillis agris periculosa) conuenit caseus recens, & panis ex vino mali punici acri, aut cydoniorum succo. Alioqui alio viciis astricte, atriplex, beta, asparagus, & quod spinachium à spinoso semine, dicitur, dari potest, ac melopepones, in esca enim cucumis ac curbita laudantur. Interea alius lenis licet conferat, non tamen hic immodice cienda erit. Sed & caneros fluuiatiles, crudos, tritos & cum lacte potandos concessi, aut coctos in cibum: nam ius eorum insuper absorbere laudat Aëtius. Admittuntur & cuniculi, leporesque iuniores aut capreoli: oua sorbilia, ius brassicæ & amygdalinum ferculum. Laudantur & saxatiles pisces, & cochleæ in cinere coctæ; testudines item, aut ranarum crura; mire enim recolligentibus vires conueniunt: ex quibus etiam morselli & in formam pignolati parantur in hunc vel similem modum: *Ulc. carnis testudinis, & cancorum ana 3j. nucleorum pini maceratum in aqua ros. vel vngula caballi. 3i. b. pul.*

pul. diarragac. frig. pul. Haly contra tabem ana 3j. diuinos simpl. 3 b. zæchar. albiss. dissoluti in aqua capill. ven. & ros. perfecte cocti q. s. fiat ad formam pignolati, remanentibus pincis integris; vel adde amygd. contus. q. s. fiat tarta. Plures habes eiusmodi compositiones apud Guainerium de hectica febre, de quibus etiam nos mentionem fecimus, cum de hecticis & tabidis ageremus. Aqua etiam ex cochleis, testudine, cruribus ranarum, ex sublimato vapore collecta efficacissima ad hunc morbum perhibetur. Quidam & pisticum miris laudibus præferunt, incerto tamen auctore. Inter præcipua remedia quæ præcipue à Galeno commendantur (lib. De marafmo, de cibus boni & mali succi; & 5. & 7. methodi medendi & sexcentis alius in locis) & ante ipsum ab Hippocrate Aphor. 64. lib. 5. quem sequuntur vno ore medici omnes, lac optimum in hoc morbo censetur: eo quod omnium fere, quæ mandimus, lac optimum, ac optimi est succi ac multi alimenti, & prompte concoquitur ac distribuitur: tale quidem exhibuimus secundum modum quem Galenus docuit 7. methodi medendi, & nos latius de huius vsu & modo exhibendi egimus lib. 4. obseru. de febr. hectica, scholio obseru. 5. Matrona hæc nobilis iisdem quoque medicamentis vtens in eadem obser. descriptis, tum lacte, licet hæc ipsa non conualuerit, tamen istis tum supradictæ victus rationi insistentis, etiam lac è mammillis cum sugere nollet, statim multum & calens sumens, (quod & ab Herodoto, Euryphone & Prodicio ac aliis medicis celebrioribus commendatur) longo tempore vitam traxit; quamvis paulatim omne corpus consumptum tabesceret, calorque narius exhaustio pabulo interiret: & sub finem alui fluxus accederet, qui plerumque lethalis esse solet: vnde cum multis mensibus decubisset omnino, in viuis esse desit.

SCHOLIA.

Quamquam Hippoc. præter eas species tabis, de quibus diximus, lib. 2. De morb. & li. De internis affectionibus, tres alias quoque posuit, quarum primam à pituita scribit fieri, è capite ad pulmonem fluente, secundam à latere; tertiam à spinali, seu dorsali medulla, quæ maxime corripit recentes sponfos, & veneri deditos: sed his posthabitis, tum aliis iam dictis, de tabe illa, quæ vlcerosa pulmonis dispositio est, loquimur: nam & hanc exquisitam tabem esse dicimus, quæ est corporis consumptio, seu colligatio cum febre lenta, ex pulmonis vlcere: quamvis auctor libri De definitionibus medicis per tabem propriam dictam, nedum pulmonis vlcerationem, verum etiam thoracis, vel faucium subintelligi voluit, quam & tussicula, & debiles comitantur febres atque in eis corpus conficitur: & licet dicamus, in exquisita vna cum pulmonis vlcere adesse & corporis consumptionem; improprie tamen ac non exquisite, tabes nuncupari posset ea quoque totius corporis demolitio, seu extenuatio, quæ thoracis, aut faucium, seu asperæ arteriæ vlcera comitatur, præsertim vbi non exactum adeo sermone occasio requiratur, licet re vera, qui hoc modo laborant, tabidi non sint; eandem tamen curationem exigunt: Tabescit siquidem & in his temporis progressu corpus totum, veluti in propria dictis tabidis; præsertim si in thorace aut asperæ arteriæ exulceratio fiat: propterea quod cor

ipsum similiter eisdem siccari oporteat: absque enim principis membri passione fieri non potest, vt animal in toto afficiatur, vt libro de Marafmo decretum reliquit Gal. quamvis non aequaliter singulæ corporis partes tabescant: verum cor & jecur minus quam partes aliæ attenuantur in tabidis: cor siquidem, quoniam facultate trahendi vehementer pollet, ea propter sanguinem vehementissime attrahit, & non prius quam vltima sit membris omnibus inopia, ipsum alimento caret: jecur vero, quod sanguis totus inde initium habuerit, vt apud Gal. legitur præcitato lib. De marafmo. Id vero quod in singulis partibus, & præcipue in corde (vt diximus) per tabem primo deperit, est humor in eisdem insitus, ac per loca media partium simularium dispersus, ex quo membra primum aluntur: verum quousque in corpore cordis aliquid ipsius seruatur, licet propius veram tabem accedant, tabidi reuera appellandi non sunt. Cum vero ad carnosam genus consumptionem pertransit aut ad fibrosam, seu membranofam substantiam, omnimoda facta consumptione, ob ebullitionem iam dicti humoris insiti, exquisitus tunc marcor existit, vt legitur apud Gal. 7. & 10. meth. ac primo De diff. feb. Nos vero vna cum Donato, qui adeo exacto sermone de extenuatione nunc loqui non intendimus nam longiore sermone de ea diximus lib. 4. De febris hecticis) etsi de ea loquamur, quæ vlcera pulmonis, asperæ arteriæ aut thoracis consequitur, quoniam exsiccatio humoris duntaxat dispersi per loca media partium simularium, cordis præcipue ac totius corporis, eiusdem corporis exsiccatio quædam, ac extenuatio fit, adhuc tabem eam esse dicimus; nam licet perpetuo exulceratio procedat, non tamen ex ea confestim carnosarum partium, aut fibrosarum seu membranofarum consumptio sequitur, sed prius nuper dictus humor consumitur. Ex tussi itaque ac anhelitus difficultate aliquam prædictarum partium affectam esse conicere poteris: quæ a. earum sit, percipies ex aliis signis postea dicendis, nunquid pulmo sit exulceratus, vel asperæ arteria vel thorax. Affectus vero hic cum exulceratio sit, morbus plane erit in soluta continuitate. Sed antequam de signis agamus, prius quædam de causis adiungamus, quamvis causæ & morbi natura ex præcedentibus iam fere nota sint. Phthisis itaque ex variis causis oritur, icu vel ex causa, alto lapsu, vulneribusque perlanatis, forti icu, aut percussione: nam eiusmodi causæ alterant corpus extrinsecus, & excitant præcedentes; sicuti vulnus in thorace factum in partibus pulmoni vicinis, aggregat in se paulatim materiam, quæ sensim intrans pulmonem, in eo vlcerosam inducit dispositionem: ita & fortis icus seu percussio, aut casus ab alto supra easdem partes, à quibus soluta vnitas in pulmone fit, & inde dolor, qui rursus attrahit multitudinem superfluitatum ad pulmonem; quibus & putredo accedit, & sui putrida acrimonia pulmonem corrodit, & dispositionem vlcerosam inducit; vt & fortis calor, sub radiis solis canicula æstuante cerebri humiditates colligans, quæ in pulmonem defluentes putrescunt, & acrimonia sua pulmonis substantiam vlcérant. Et ita fere oritur à capite tæbes, inde in pulmonem destillat; huicque exulceratio accedit ex Celsi decreto: etenim quæ capitis destillationes tussim primo concitant hominibus, & rauedinem, neque tandem consistunt, tabem generant, Galen. teste 1. De morbis vulg. Cuius duæ maxime sunt differentie,

differentiæ, ut ipse refert: vna ex illis quos caput demittit, fluxibus constat, altera, quæ ab ipsius pulmonis malis proficiscitur, omninoque postquam exspuitur sanguis, potissimum vase rupto; sæpenumero etiam fluxione impleto viscere hoc; alia de causa ex partibus aliis non ex capite. Et sicuti ex calore, ita & ex forti frigiditate per viam expressionis superfluitatem, quæ ad pulmonem deuenientes intrantesque eius substantiam; in eo generant ulcerosam dispositionem, atque hæc causæ externæ phthisis appellari consueverunt, ut Galen. inquit, 1. De procatarticiis causis, & lib. De causis morbi, cap. 2. Causæ vero præcedentes sunt quæcunque intus corpus alterant, ut catarrhus, qui sub tenuitate penetrans in pulmonem sui acrimonia mordens, vlcus in eo gignit; & ita fit ex destillationib. acutis, abscessibus peripneumoniciis pleuriticisve aut synanche, aut vomitis introrsum erumpentibus, vel ex propinquis peccoris partibus, diaphragmate (ut quidam volunt) nobilissima membrana, vel altera quæ medium diuidit pulmonem dissepito dicto, & in ipsa quoque pulmonis substantia hæc pestis oriri potest. Aliqui ad hanc etiam contagium referunt. Vel possunt hæc ipsa vltima, ut pulmonia (tum relicta dicta, ut præcedentes causæ phthisis) cum putruerit & in saniem versa est, & ulcerata, causa continens esse ipsius phthisis, ut Benedict. Fauent. præceptor meus cap. proprio declarabat. Ab aliis igitur partibus quoque euenire potest hoc malum. Sic & Aërius pulmonis exulcerationem ad sanguinis spuitiones consequi fatetur; cum videlicet sanguinis eruptione suppressa, vlcus non fuerit conglutinatum, neque cicatrix indurata, Paulus quoque & ante illum Hippoc. Ex vomica, inquit, si ex toto non perpurgetur; in phthisin protinus ager rapitur, tabescente pulmone. Quo autem modo interstinguenda sint prædictæ tabis causæ, facile patere poterit, si quis eas, quæ prædeceperunt destillationes, sanguinis reiectiones, suppurationes, vomicas, peripneumonias, & pleuritides ac anginas, ex his quæ in propriis earum affectionum capitibus hæcenus retulimus, considerauerit. Nunc ad alia signa progrediamur, primo adherentes exemplum pulmonis ulcerati.

OBSERVATIO LIV.

De ulcere pulmonis ac tabe, modo cum sanguinis spuito, modo sine eo pus exspuente.

Cyprianus medicus doctissimus, collega meus melancholia diu affectus, longa & diuturna tussi & catarrho, tandem in sputum sanguinis, mox & in tabem & pulmonis ulcerationem incidit, licet longo tempore vitam protraheret, antequam decumberet: tandem præsidii nihil inuuantibus vix 47. annum excedens, vera tabe ac pulmonis ulceratione obiit: nam signa, quæ perpetuo illi aderant, vlcus esse pulmonis & tabem significabant, tum ex frequenti tussi per quam pus excrebatur interdum & cruentum aliquid; quod & Celsus ad animaduertit. Hæc enim incipiente frequens tussis molesta est, quæ cruentum aliquid sine sensu doloris extunditur: hoc interdum subsistit etiam, dicente Fernelio, tussique sordidum quiddam editur, deinde purulentum. Tussi perpetuo perdurante dum subinde sputum cruentum esset, subinde purulentum, rur-

sus vero cruentum, denovo vero purulentum, non dubitauimus hoc vlcus in pulmone pati: cumque febris fixa, licet pusilla, semper sui similis eueniret, eo certius signum habuimus huius affectionis, multoque magis; cum prius præcessisset sputum sanguinis, & nunc etiam saniem exspueret; & ideo cum sputum cruentum subsisteret; & tussi sordidum quid ederetur, & febricula leui adorta; cuius nulla fiebat intermissio: quæ tandem etiam hectica facta est, mox à cibo aliarum enim ore inualecente, & sensim vniuerso corpore liquecente, certius adhuc indicium huius mali habuimus. Coniatur enim necessarium affictum hunc totius corporis extenuatio, ac catenium consumptio, & febris quædam lenta seu exigua, ut patet commentatio Aphorism. 16. lib. 7. potissimum ubi pulmo exulceratus fuerit: nam & iuxta Celsum, febricula leuis, etiam cum quiescit, tamen & repetit. Sed quod modo cruentum modo rursus purulentum excrebatur, id idem & Fernelius refert in hunc modum: Ulcere magis magisque serpente & sordescente pus excrebatur, fitque, quod dixit Hippoc. à sanguinis spuito puris sputum. Hoc quum syncerum est, aquæ iniectioni minimè alterius ritu innatat, sed (si purum est) in immum descendit subidetque. Ac nihilominus quoties vel labore, vel tussis impetu, vel exandescencia vlcus puris lentore obductum refrigeratur, cruenta excreatio redit. Vt & nostro collegæ eueniebat. Consummato ac iam inueteralcente vitio, putris pulmonis portio tandem exibat (vti & Laurentio Adriano Alemariano contingebat, de quo antea diximus) & sputum carbonibus iniectionum, aut etiam per se, graue odorabat; sæpe etiam halitus contagione id imprudenter labefactat. Quod cum in aliis quoque ægris spectauissemus, pulmonis parenchyma iam ulceratum esse cognouimus, quod ex eiusdem pulmonis essentia proprietate percepimus, cum ipsius pulmonis caruncula per tussim reiceretur, haud secus quam bronchij pars quædam tussiendo ab ipso Laurentio Adriano reiciebatur, ut exulceratio pulmonis secundum asperam arteriam processerat. Hoc enim proprium pulmonis ulcerati indicium erat (ut ipse Galen. 1. & 6. De locis affectis docuit) si vocatum ramentum, seu crustula quædam eius particulæ, à qua excernitur, Græcis ephelcis dicta, spiritalium instrumentorum, tussiendo excernatur; proprietates vero essentia eiusdem affectæ partis proprium indicium est. Quod de sputo carbonibus iniectionum diximus, plurimi hoc modo discernunt purulentum liquorem, ut ex Cælio Aureliano liquet 2. lib. cap. 14. Phlegmata carbonibus imponentes, quo exusta probentur: nam tetti odoris esse necesse est, omne quod natura fuerit mutatum, velut ex fluxione carnis veniens: ite in aquam mittunt ægrotantium sputamina: etenim naturalia facile soluantur, vitia vero atque mutata perscuerant, quadam tenuitate coacta, & subsidunt siquidem sint grauiora, & contra naturam ex defluxione carnis venientia. Verum tunc prius confirmatam tabem cognouimus præter carniū consumptionem, quod genæ liquecerent, tetro vapore eo sublato, & inualecente febre vngues in manibus curuarentur, & exalbidi & pallidi euaderent: & malis iam vincente capilli à capite profluiebant, idque alimenti penuria, alioque profluuium supernebat, quæ pessima signa ab Hippocrate quoque numerantur: iam & præcordia sursum con-

uellebantur;

uellebantur; cum & costarum extrema siccitate (ut Fernelius refert) sursum quandoque reuelantur, dum tandem corpus omne consumptum contabe fiat, calorque natiuus exhausto pabulo intereat. Sitis quoque illum magis tandem consuebat, & fastidium vrgebat, & id, quod sursum vergebat, ac per sputum reiciebatur, vehementer ac fædi odoris erat, quale & Paulus extreme laborantibus adesse scribit, pulsusque eidem, ut omnibus tabidis, languidus erat, ac paruus, propter imbecillitatem virtutis seu facultatis; non nimium celer, ut plerique febricitantes habent, quod non detineantur vrente febre. Aderat & pulsus hecticus, talem enim tabidi pulsus habent, hoc est, vndequeque similem: quoniam & febrem habent hecticam; sicut enim à febre, quæ vniuersum corporis habitum occupauit; appellatur pulsus, ut lib. 4. de causis pulsuum Galenus scriptum reliquit.

SCHOLIA.

Signa igitur pulmonis ulcerati, ex hac observatione satis cognita sunt. At signa hecticæ febris habenda sunt ex capite proprio & de marasmo & eius, tum hecticæ, speciebus, ut longo sermone 4. lib. obseru. De febribus hecticis, in quibus & diuisiones febrium hecticarum posuimus & marasmi, per gradus quosdam, ut horum signa non opus sit denuo repetere. Verum quod ad signa asperæ arteriæ exulceratæ attinet: sicut enim in ulcere pulmonis carunculam pulmonis per tussim aliquando reici diximus, haud secus, si bronchij particulam reiciant secundum asperam arteriam, pulmonem tunc exulceratum existimamus: ita quoque, si arteria quæpiam aut vena in ea exulcerata fuerit, ipsarum quoque portionem aliquam (præsertim ubi frustum vasis haud paruum fuerit) tussiendo expui oportet. Orto vero in asperæ arteriæ ulcere, præter hoc, quod sputum purulentum appareret, dolorem quoque in loco affecto, laborans sentire consuevit: ipsum vero per ea, quæ screantur, quia exigua sunt, ab ulcere, quod in pulmone natum est, discerni potest; quippe ab vlcerebus pulmonis plurimum reicitur. Ita quoque videmus interdum per exulcerationem excreari ex gutture corpusculum aliquod à lingua (Græci *emphelcis* vocant) cum pars ipsa afficitur; id vero non solum hoc indicio deprehenditur, verum etiam ex eo, quod in ulcerato loco doloris sensu laborans instatur, veluti de asperæ arteriæ dictum iam est. At si nullus in prædictis partibus dolor sentiat, nec aliquod iam distorum signorum adsit, verum cum purulento sputo in thoracis parte aliqua manifeste sensus doloris adsit, thoracem affectum esse censeto. At hic medicus non sine cruenta excreatione tabe resolutus est. Magna autem inter scriptores controversia est, possit ne quis citra cruentam excretionem tabe resolui? Nonnulli post solam screationem humoris liquidi & subflui, leui febricula correpti tabescere ceperunt, ac multo post tempore cruoris exiguum quiddam cum pure reiecerunt: ita & alius quidam flauam bilem excreauerat, & exili vel minori febre correptus, ac tussi purulentum exspuit, deinde cruentas excreationes: inualuit subinde febris, ex qua membra tabescebant: demum sanguinem reiecit; vnde tabefactis membris & deficientibus viribus,

Pet. Forest. Tom. 2.

mortuus est: vlcus enim, ut tradit Galenus, occultum, irremediabilem morbum reddit. Alius quidem sex mensibus sic affectus obiit: quidam vero pluribus vitam miseram traxerunt, donec morerentur. Sed non paucos animaduertit etiam Fernelius tabe sensim sublato, in quibus omnino nihil cruoris toto morbi decursu comparauit: & nos tales quoque in praxi quotidiana vidimus phthisi enecatos, solum pus exspuendo. Volunt quidem hoc fieri vix posse; neque ex catarrho, qui in phthisin labuntur, quin prius aliquid sanguinis exspuant. Vide de his lacchinum. Potest tamen fieri citra sanguinem, ut in externis vlcerebus, quæ citra sanguinem pus habent sæpe. Tunc ergo aliis notis inuestigare oportet, num vlcus adsit, sputum considerando quale sit. Etenim cum id ex catarrho accidat, color concocti in peccore catarrhi, & pus adeo sæpe inter se similia sunt, ut peritos quoque fallant colore & consistentia; sicut & fallit vrinæ hypostasis, quæ saniem refert, aut crudum succum. Primum igitur febris ipsa aderit necessario, hectica in processu, quæ signa euidencia referet, quæ de hecticis alias diximus. Deinde sputum considerando, quoniam saniem refert: nam in globum & rotunditatem multam se colligit sputum pituitæ: vnde & talia damnantur in prognosticis: At saniosum dispergitur, utpote minore visciditate, & crassitie iunctum; vnde & minus albeat ex incluso aëre, quantumuis coctum sit, secundo lib. 46. ubi candida, glutinosa ac rotunda sputa appellat: ut vero facili diuisionem agnoscant, in aquam spicere iubent. Nam materia facili medium diuidens descendit; quæ vero non descendit, crassa & glutinosa est. Sæpe tamen admiscetur; & impeditur agnitio: tunc ego sputa in aquam calidam fundi iubeo; atque baculo aliquo concutiendo, puris partes dissoluantur & subsidunt, & pituitæ superius natant & coherent. Aliud purulenti sputi signum est (etiam à nobis dictum præcedente observatione, quod ex 5. Aphor. 12. etiam describitur) ex fœtore, qui tum alias, tum maxime sentitur, cum supra carbones proicitur sputum effumando. Sic fœtorem annotauit in vesicæ ulcere. Nec obstat quod dictum est, optimum esse pus albumen, & minime fœtus 1. progn. vltimo. Neque enim sine fœtore est pus, cum sine putrescentia non fiat, & vestigia habeat putridi caloris: sed sicut graueolentia, ut Galenus ibi ait, est putredinis, non coctionis indicium; ita & modice fœtere bonum signum est: ideo non simpliciter pus eiectionem vult esse olidum, sed tunc sentiri, cum exurit. Sic enim maxime odores tetri, & boni quoque sentiri solent. Præ omnibus vero saniem significat colligi facile, & dissipari in aqua: quod pituitæ ob viscositatem non potest contingere: nam pus residuum est, cuius, quod est exustum in phlegmone partis, ut prælag. ex pulmone dicitur, & ita vrinæ hypostasis vera, non crudum humor. Illud tamen indicium ex sputo & pure, non semper significat verum, ut quidam annotarunt; cum ex empyemate & aliis vlcerebus peccoris & non pulmonis tussi reici possit. Illa tamen sanies, quæ expectoratur cum vehementi tussi, phthisin veram designat: & quando sputum saniosum sequitur sputum sanguineum proprium signum vlcus vlcis corrodentis: sicut & contra quandoque ad sanguinem sequitur saniosum. Sed ubi cum pure simul crustæ (quas in collega vidimus) vel aliud ex pulmonis substantia excreatur, tunc minime dubitandum

V ij

est de vera phthisi. Iam quoque falsedo arguit vlcus corrosiuum. De differentia vero puris & pituitæ, eadem fere refert Gradus, quæ superius attulimus; quem legere poteritis. Et ita signa demonstratiua phthisis satis enucleauimus: quæ etiam trium sunt generum, vt in locis diuersis ex Galeno colligitur; & per ordinem à Benedicto Faurentino præceptore meo in sua Praxi declarantur: quum primum sit indicantium eos, qui inclinati sunt, vt sua natura apte ad phthisin perueniant: secundum autem eorum, qui iam facti sunt phthisici: tertium vero, à quibus generantur causæ & humoribus ipsi phthisici, vt ad longum ipse explicat: quem consulere poteritis. De quibus quidem signis quoniam satis nunc egimus, ad prognostica signa progrediamur; sequenti tamen exemplo prius interposito.

OBSERVATIO LV.

De quibusdam phthisicis longo tempore supervinentibus
& tandem mortuis; & de quibusdam
præter spem curatis.

Refert Gradus cum loqueretur cap. proprio De phthisi & vlcere pulmonis, de induratione & exsiccatione vlcis, se mulierem quandam cognovisse Mediolani, quæ tamen non vtebatur medico, nisi regimine communi, sed quasi continuo igni adhibebat, & in locis valde siccis, cum furnaria esset; fuitque phthisica plus 28. annis, ambulabat per domum & laborabat, atque perpetuo cibano aderat cum panem coqueret; unde siccitas plurimum indurando & exsiccando vlcus, vitam multis annis prolongavit. At ego etiam mulierem Dordracenam novi, uxorem illius Petri Gualteri cerevisiarij Delfensis, pro cuius ædibus ciuitas Dordracena pro insigni erat; quæ octo annos phthisica superuixit, continuo quid pituitæ aut purulenti quid exscreans, licet tandem tabida obierit. Sunt & alij, qui ad 15. annos vel plures, eodem Grado recte, vitam protraxerint; sed de iis latius in scholio. Non defunt quoque Historiæ, quorundam phthisicos esse curatos: sic Arculan. suo tempore egregius medicus, dicit: Vbi phthisis parum impresserit, neque fiat vlcus ambulatiuum, neque pendeat à causa incorrigibili, sanari potest: sed non apud negligentem neque stolidum aut imperitum: vbi vero maxime processerit, vt plurimum cura cassa est & vana, nisi iussu Dei omnipotentis id contigerit; quemadmodum euenisse Mediolani monacho cuidam Franciscano scribitur, qui post annum quartum quo phthisi correptus fuerat, ex sanguinis spuro, pluries reiterato, tandem peruenit, post multam corporis tabem, ad impotentiam expuendi cum ore gromone: & cum credideret ipsum esse morti proximum, miraculo quodam evasit impingatus. Refert etiam Valescus cap. proprio, se quendam monachum etiam phthisicum verum curasse cum pulvere Haly contra tabem (quo & nos vsi sumus in fratre meo Theodoro Foresto ex tabe & hæctica laborante; & etiam curatus fuit, cum pus longo tempore subinde expueret; cuius historiam, tum aliorum etiam à marasmo curatorum, posuimus lib. 4. obs. nostrarum De feb. hæctica) cuius agritudo per annum durauerat, quæ videbatur interdum partem pulmonis cum spato eicere: cui & tantus fector aderat, vt nullus monachorum, neque in

refectorio, neque in mensa auderet illi appropinquare; ita vt perfecte adessent signa veræ phthisis; qui etiam per me (inquit Valescus) & multos alios, fuit indicatus de proximo moriturus. Sed cum illi esset amicus, curationem diligenter iniecit, atque remedia ibidem descripta continuando, Dei iussu (inquit ille) curatus fuit. Auicenna quoque ponit historiam de muliere phthisica, cuius iam parabantur funera: & frater eius (vt etiam citatur à Gradu) cum eidem supervenisset, eandem curavit cum zaccharo rosaceo.

SCHOLIA.

Quæritur nunquid omnis phthisicus hæcticus sit, vt magna ex parte medici celebriores sentiunt. Id tamen quidam contendunt, vt Gradus, non semper verum esse; cum aliqui vixerint x. aut xii. annis, imo pluribus, vt iam diximus, licet Gentilis de xii. annis meminit de iis, quæ vlcus pulmonis habebant cum hæctica adiuncta: quod vix fieri nonnulli credunt, inde colligentes vlcationem pulmonis hæcticam non subsequi, nisi vlcatio illa fuerit admodum magna, prava & saniosa. Sed Gradus potius respondendum patat etiam hæcticos antequam ad gradum debiti siccitatis perueniant, vsque ad 15. aut 20. annos posse superuivere, vtentes victu restaurante. Sed vbi hæctici ad illam siccitatem peruenierint, quod capilli defluant, & alius profuatur, mors iuxta Hippocrat. proxima est; quia adeo sunt siccata solida, vt nutrimentum pilis non adsit. Quod albus vero profuit, id contentricis ventris imbecillitate fit: intestina grauata facile depellunt, vt nec alimentum in corpus distribuatur. Cum igitur vlcus præ magnitudine siccari nequit, tunc magnitudo vlcis mortem significat, licet iam diutius superuixerint, vt cum vasorum frustula expuuntur, vel etiam arteriarum iam erosa, tunc moriuntur. Diu autem vivere possunt, antequam eo res deueniat. Ita in rustico quadam vulnerato in pulmone, in pago Scermerio dicto, ad quem accitus, cum etiam tabidum & in vlcus pulmonis malum conuersum signis præsentibus intelligerem, nec curari posset; nostra tamen industria vita ad semiannum protraxit: ita vt filius, qui patrem vulnerauerat, veniam sollicitaret, ac cum minori multa à principe gratiam inierit. Sed vtrum vere phthisici curari possint, multi hæsitant: quamquam id fieri exemplis & auctoritate medicorum illustrari posse ostendimus. Constat autem (teste quoque Benedicto Veronensi) innumerabilibus exemplis phthisicos cura & diligentia à medicis sanatos fuisse, & zacchari rosacei (vt scribit Galenus) auxilio: audita enim eius remedijs causa est, nec nisi experimento cognita. Attamen non defunt quidam, qui curationem vlcis pulmonis nequaquam admittunt: alij rursus dicunt distulter curari, vt liquet 4. De locis affect. tum. 5. method. medend. nam & ipse Galenus difficillima sanatu pulmonis vlcera esse fatetur, vt quæ nec citra tussim expurgari possint; & si tussim excites, laceraueris: itaque quasi per mutuas operas, malum iis in orbem redit: tum etiam quod ea quæ idonea vlcisibus medicamenta sunt; contingere vlcus sicuti in ventriculo, non possunt; adeo vt per medium intervallum, fere vim suam amittant, & præterea quod præter id, quod colendo lacerantur, respirando etiam mouentur.

Et proinde concludebat eodem 5. meth. med. quod cum in pulmone ruptum vas est, scire aperte licet (nisi protinus antequam phlegmone excitetur, glutinatum sit) id postea insanabile fore: quod si aliquando curetur, relinquitur tamen in ipso res quædam callosa fistulosaque, quæ tractu temporis à leui occasione expelli solet, vt 4. De locis affect. liquet: quamuis si exanthemata quædam in pulmone sint orta propter vlcis siccitatem, sanari possint; præsertim vbi aspera & scabiosa fuerint, vt idem Galen. testatur. lib. 5. meth. medendi, quemadmodum & omnino insanabiles sunt, qui ex succi vitiosi erosione vlcus in pulmone habent, cum longo tempore omnino opus sit, vt succi corrigatur vitium. Interea pro notitia specierum phthisis (vt Arculanus medicus insignis dicebat) sciendum est, vlcera membrorum spiritalium aliquando fieri in pleura; quod & prius ostendimus, cum pleuritici non soluuntur, sed ad suppurationem vertuntur: nam si illi in quadraginta diebus, vt dictum est, non repurgantur, teste Hippocrate, in tabem transeunt: quamuis idem Arculanus refert se in duobus ægris vidisse vlcus pleuriticum non repurgatum in quatuor annis, nec tamen ad phthisin peruenisse. Quod licet forte contigerit rarum est, imo rarissimum. Verum hic loquitur de pleura, ex qua fit, dum in ea suppuratio contingat, phthisis: modo etiam in musculis intrinsecis pectoris & ossibus eiusdem cum eorum corruptione; aliquando in diaphragmate, aliquando in mediastino, aliquando in canna pulmonis; quandoque in pulmone ipso. In quibus omnibus & phthisin & vlcera fieri contendit, quæ etiam ad tabem seu phthisin referuntur. Attamen deteriora, inquit, cæteris patibus, sunt illa, quæ sunt in pulmone, deinde in diaphragmate, deinde in mediastino, deinde in pleura & partibus ei continuis: ita vt quidam arbitrentur, nunquam vlcera pulmonis posse consolidari, eo quod est in continuo motu: quibus Galen. 6. De ingenio sanit. contradicit, motum non impedire consolidationem, cum vlcera pectoris & diaphragmatis, quæ sunt in continuo motu, possint consolidari. Sed materiam limitando dicit, quod vlcera munda siue pura superficialia pulmone consolidantur; putrida vero corrosiva, apostemosa, valde fordida, aut virulenta, & huiusmodi non possunt consolidari. Cui sententiæ Mesue consentit: hinc & Conciliator (quem & Gradus sequitur) voluit vlcus factum ex vulnere, vt ex ruptura, præsertim in canna pulmonis vel in partibus vicinis canna, posse consolidari; licet Auicenna testetur se tempore iuuentutis quendam curasse, in quo caro pulmonis plurima dissoluta esset. Quamquam tales (vt etiam mulier illa, quæ licet 22. annis vixit, tandem tamen tabe obiit) vt patet ex 5. de locis affect. omnes fere tandem extincti sint. Quod si de confirmatis dicatur conualuisse, id potius monstruosum esse quidam voluerunt. Sed tantum solutione facta in venis & arteriis, Auerthoes id fieri posse credit; & assentit quidem posse fieri, eo quod filij Auenzoaris simile illi nararunt, & retulerunt; scilicet quod in pluribus hominibus idem viderunt. Interea etiam credimus quosdam esse curatos, cum ex pure thoracis tabem paterentur, & pus longo tempore expuerint, cum medici etiam illos veros phthisicos esse putarent. Sunt etenim aliquando eo progressu ægrorantes, vt euidentissima signa extremae maciei & tabis

Pet. Foresti. Tom. 2.

præ se ferrent, & tamen præter medicorum illustrum opinionem sanati sint: ita vt in iudicio quandoque expertissimi medici sæpe aberrant, quod & doctissimus Iacchinus medicus de se ipso fatetur ingenuè, id sibi euenisse in filio egregio equitis, Cæsaris nobilis, qui præter spem est sanatus. At quæ in thorace vlcera sunt non omnino, veluti iam dicta, curationi resistunt, etiam si diuturna fuerint, vt eodem 4. de loc. affect. liquet. nino cura-
Et enim, quæ x. dore educuntur, triplex compositioni res-
pendium; p. i. i. quæ ex pulmone euacuantur, stant thorac-
habent: nam & vasa ipsa multo sunt minora, & cis vlcera.
sanies in spatium interius effluit, & in summa magis carnosum est pectus, quam pulmo, vt patet eodem 5. meth. medendi. Sic etiam refert Arculanus, Vlcera pectoris & immunda siue impura consolidantur multis de causis: Primo, quia pectus est carnosum. Secundo, quia est cum paruo motu. Tertio non habet substantiam mollem, pronam in corrosionem & putredinem. Quarto non habet carnem spongiosam, in qua sanies retineatur; imo quod ab vlcere pectoris refudat, aut per aliam viam expellitur, super diaphragmate colligitur, si non expuatur; postea paulatim expellitur secundum plurimum. Quinto non est multum subiectum catarrhis. Sexto, non nutritur sanguine calidissimo, multæ cholæræ admixto, impediens consolidationem. Septimo, non habet venas magnas & amplas sicut pulmo. Octauo, non ita cordi inseruit sicut pulmo. ^{IO}
Causas vero declarauimus antea cur pulmo difficulter curetur: addit Arculan. præter id, quod vlcera-
medicamenta exterius admoda pulmonem num raro cura-
attingunt, & intus sumpta si transglutiantur, tur.
multum transmittantur, & vis earum diminuitur, antequam ad pulmonem veniant, etsi in ore vel lambendo sumantur, parum de ipsis ad pulmonem penetrat: ita & calida febrem augent; frigida spumam impediunt, & tardius penetrant, si sicca, idem præstant & nocent hæctica febri; humida vlceri obsunt. Si vlcus ad membranam transeat, dolorem auget, & rursus dolor impedit consolidationem, humores attrahendo: quare raro & ob motum & alias causas superius ex Gal. citatas, vlcera pulmonis consolidantur, nisi fuerint munda, & superficialia, & non valde antiqua: quæ tamen exigunt medicum prudentem & diligentem. Profundiora vero ad substantiam pulmonis penetrantia, difficillime curantur; & si ad cartilagine perueniant, curationem non recipiunt. At crustosa superficialia & pauca saniei facilius rectificantur; & si non perfecte liberentur, longissimo tempore durant, ita vt tale vlcus, iuxta Auicennam, tempus prolonget ipsius phthisis circiter 23. annos. Cæterum vlcera, quæ in asperæ arteriæ interiore sunt tunica, & potissimum quæ summæ eius parti, quam ræpræa vo-
cant, sunt vicina, aut etiam ipsa; hæc & curatio-
nem recipiunt, & nos non paucos (vt Galenus præcitato loco inquit) eorum, qui ita sunt afflicti, sanauimus: quorundam autem eorum historiam ibidem conscripsit, potissimum vbi interna eiusdem asperæ arteriæ tunica exulcerata fuerit: namque ea sanatu est facillima, ac omnis, qui in ea ortus fuerit affectus, facile sedatur, nisi forte aliquando à putredine aliqua magna ipsius portio corrola cartilagine nudam penitus destituerit. Verum si ipsius cartilagine exulceratæ sint, aut insanabiles, aut sanatu difficillimæ erunt: ^{II}
V iij namque

namque cartilaginum affectus (*vi Galen. testis est, lib. 7. De usu partium*) omnino insanabiles sunt aut sanatu quam difficillimi. Quia de re priusquam malum ad cartilagine peruenit, asperæ arteriæ ulceratio protinus etiam ut sanetur, laborandum erit. Vlcera vero diaphragmatis in parte cartilaginosa (inquit Arculanus) rectificantur, nisi utriusque penetret; sed in parte nervosa, si sint aliquantulum profunda; raro vel nunquam curam recipiunt. Vlcera vero mediastini facilius rectificantur, quam vlcera diaphragmatis; & adhuc facilius vlcera pleuræ & musculorum intercostalium, & costarum, etiam si sint corruptæ; sed opus est sectione aut cauterio in parte extrinseca, ut perueniatur ad costam corruptam. Sed de his prius dictum est, quomodo sectione aliqui curati sint, antequam phthisin veram incurrerent. Sed hæc iam dicta etiam ad signa prognostica pertinent, sicuti illa quæ etiam sequuntur.

OBSERVATIO LVI.

De sacrificulo vlcere pulmonis lethali laborante, & ex pilulis mercurialibus sumptis subito vitam finiente.

Sacrificulus quidam apud nos Almaria, cui à puero facies combusta erat, facie admodum pallida & macilentus, & propria natura debilis; ex continuo catarrho falso in vlcus pulmonis incidit: ad quem, cum diu decubisset, accitus sum; & pus olidum expuebat, cum totius corporis extenuatione, imo ut iam crustulas spiritalium membrorum, nempe pulmonis, expueret. Quæ cum vidissem, & sorori prædixissem, fratrem non posse ab hoc morbo sanari; illa cum hæc audiisset, me statim ablegauit, atque in mandatis dedit, ne amplius redirem. Postea tamen minus prudens soror tonsorem empiricum quendam ad fratrem vocauit, qui se discipulum Paracelsi iactabat, atque sacrificulum lue Gallica infectum dicebat, ob faciem deurpatam (ut existimo) quam ex combustionis ignis cum puer esset, ut paulo ante diximus, contraxerat; atque iactabundus, ut hoc solet hominum genus, illico ægotantem se curaturum pollicebatur. Cum enim videret sacrificulum pallidum esse, & quod pili de capite fluerent) quod tamen inopia alimentis ex tabe lethali contingebat; de qua re latius in scholio pilarellani (ita enim vocant defluuium capillorum ex lue Gallica) esse existimabat, certum morbi Gallici indicium, homo insulsus ac ineptus medicus, quamuis medicinam sibi falso arrogabat, ignorans quod malo vincente in tabe confirmata capilli de capite defluunt, cui & alui profluuium succedit, auctore diuinissimo nostro Hippoc. ut mox latius dicturi sumus. Verum quid de prædictionibus Hippoc. dicam, cum eiusmodi Theophrastiani omnes prædictiones contemnant, ac suo malo (signis omnibus aliis posthabitis & neglectis) omnem morbum etiam quantumuis lethalem se posse curare apud miseram plebem iactant, uti hic Empiricus sibi persuaserat, & constanter ægro promiserat: hinc deprompta vna pilula mercuriali, ex sua chymica officina, ex argento viuo parata, quam omnibus aliis ægotantibus indifferenter præbebat, adeo illam extollens, ut illa sola, omnibus aliis præditiis relicta, sufficeret ad quosvis morbos curandos. Quam cum suo ægotanti obtulisset, alius supra

ac deorsum adeo perturbata est, ut iam pro morbo æger haberetur, ac extrema inunctione munitus ad superos remeare crederetur. Sed postquam paululum quasi reuiuiscere cepisset, ut colophorem curationi adderet, post octo dies iterum bis misero sacrificulo extrema macie confectio pilobrutit: quam cum deglutisset, enormi sublequente & vomitu & euacuatione, eodem die exspirauit.

SCHOLIA.

Mittamus illos Paracelsistas, qui egregias prædictiones Hippoc. rident: quasi si hic Cacus intelligisset, non ita hallucinatus fuisset in cognoscendo morbum hunc fuisse lethalem, & ideo minime curandum, sed prognosticis relinquendum, vel saltem iis præditiis protrahendum, qui vires tantum restaurarent; quas ad extremum debiles, ipse suis pilulis facili exstinxit, & mortem maturius attulit. Cum enim huiusmodi præcipua mala adessent, ut sputum graueolens, iuxta Hipp. aph. 11. lib. 5. deinde capilli defluentes, indicium certius, ex decreto aph. 12. lib. 5. Sp. 1. facile perceptum erat, huiusmodi tabidi mortem fuisse in ianua (ut dicebat præceptor meus Bened. Fauren. c. proprio. De phthisi & vlcere pulmonis.) Quod si hoc intellexisset insignis ille Paracelsista, tertium indicium non opus fuisset suis pilulis committere, cum & alui profluuium accedat, & tamen quam tertium indicium mortis esse solet; et si duo supradicta in diuturno vlcere pulmonis confirmata, & in homine plane extenuato vera tabe, ad significationem necis phthisici sufficere sent: ubi autem citra hæc alui profluuium comitatur vel contigerit, occisima mortis indicium existit; quoniam alui profluuium (ut idem præceptor meus aiebat) comitatur dolor, & assiduus labor subsidendi, timorem ingerit defectionis animi. Quæ multo vehementiora hic fuisse ex perturbatione illarum pilularum, syncopa vera accedente, cui illico mors subsequuta est: & ideo rectè dixit Gal. in commento 14. aph. lib. 5. à tabe habito profluuium alui superueniens, lethale: multoque magis morti propinquum sunt, si tria hæc in vnum conueniunt, videlicet male olentia sputa, & alui profluuium, & capillorum de capite casus. Tabe itaque laboranti si sputum, quod extulsiunt graue oleat iniectum carbonib. & capilli de capite defluunt, lethale: & iis alui profluuium superueniente moriuntur, ut aph. 11. lib. 5. & 14. lib. 5. patet. Verum idem Hippoc. de tabidis scriptum reliquit 16. aph. lib. 7. à puris sputo phthisis & fluxus; cum vero sputum retinetur, moriuntur: modum siquidem ostendens in hisce verbis (ut Gal. in commento refert) illorum qui ex tabe moriuntur: eo usque n. extenuati viuunt, donec per ea quæ expuant, possunt pulmonem expurgare: cū vero intus manent, obscurantur quidem viæ spiritus, patientes vero strangulantur. Moriturus vix anhelitus auditur, & qui non suffocantur, inter colloquia moriuntur: quib. vagues incuruantur, cum cibi tadio, difficultate anhelitus, nulla propulsione, ventris profluuium, & pedum tumore, subito moriuntur. Et quamuis in principio aliquando tuti videantur, postea tamen moriuntur, ut patet exemplo apud Gal. cum sic dicat: Phthisicum curare ausus sum vel curiosius: odoramenta primum, quale spicatum vogaentem est, & alia pariter exsiccantia paribus indita sunt diu nocturne.

Ac in potu Mithridaticam aut Theriacam, & Athanasiam antidotum obtulimus: ægro vitam per annum prorogauimus: sed tandem phthisicus interiit. Vidè etiam exemplum apud eundem de Antipatro medico Romano, qui annos quinquaginta excellerat, prius ephemera laborans, ob tuberculum in pulmone per sex menses tandem difficillima suppuratione oborta, resolutus tandem obiit. Ita & nos phthisicam mulierem Brielensem quandam habuimus præ manibus, quæ cum per interualla pus expueret, & subinde tanquam calcem induratum in calculos, licet diu superuixit, tamen postea & hæc tabe obiit. Quamquam & inter exempla monstrificam pulmonis naturam Gal. refert, quod ægrotus quidam tussiens viscosam primum materiam excreabat: deinde per aliquot dies in duritiem coacta, in calculos duriscebatur, qui grandinis modo eiciebantur. Hunc Gal. veluti asthmaticum curauit, qui de cætero erui duntaxat magnitudine ac raritate eiecit. Cæterum Hipp. lib. 2. Prædictionum, hæc de tabidus quoque scripta reliquit: Oportet enim eum qui probe liberari volet, facile sputum per tussim reficere: & id esse album & æquale, & eiusdem coloris, ac ab inflammatione alienum: quod vero a capite defluit, ad nates conuerti, febrem autem non inuadere, ut ne à cænis prohibeatur: neque sicut, venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum: copia pro ratione ciborum ingestorum. Hominem vero quam minime tenuem esse oportet: peccius autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum: & os ipsius parum sit, & robuste carnosum: quicunque enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit: qui vero nihil horum habet, interitui proximus est. Ideo considerandum num naturæ ad tabem pronæ sint tales autem sunt (ut paulo antea diximus) quorum humeri eleuati, & pectoris partes deprimuntur, ita ut à qualibet occasione pectus egeat dilatione, ipsum in motu illo aliqui violentiam patitur, ob oppugnantiam, quam inducit pectus per sui depressionem: quo fit, ut cogente violentia, aut in pectore, aut in pulmone vena aliqua disrumpatur, facile expuere faciat, inde pus & postea tabes, ut ex Gal. epi. comm. 1. colligitur: ita & asthmaticos plurimos noui ad tabem deuenisse, & multos cognoui eo non progressos, subito tamen extinctos etiam in platea: uti contingit M. Adriano Vventio Consil. & Hugoni Grotio, utrisque in platea extinctis: quos sæpe admonueram hoc illis euenturum, si temporis sibi non prospicerent. Cæterum in tabem quoque maxime incidunt iuuenes, auctore Hipp. aph. 29. lib. 3. in eam tamen & potissimum (ut Gal. in com. inquit) quæ ad sputum sanguinis consequitur. Illud vero non ob ætatis imbecillitatem, sed ob incontinentiam, seu intemperatum victum. Hoc idem confirmat Hipp. aph. 9. lib. 5. cum dixit: Tabes sunt præcipue ætatibus à 18. usque ad 34. annos, & Celsus morbum hunc ætate firmissima maxime oriri censuit, id est, ab anno 12. ad ann. 35. ubi id quoque iuuenes tabem incurrunt, disrumpit pulmonis vase: quoniam in vita & eius functionibus male morigerati existunt, ita ut male sciant tunicæ vasorum, eorum disrumpitioni obstitentem, difficiliter quoque restituuntur, ob inopiam humidi glutinosi, quo solita sunt membra solida ex densa disrumpita consolidari: vel elicitur ex Gal. 5. method. med. & 3. & 4. eiusdem. Minores natu iuuenibus, difficiliter tabescunt, facilius

vero suo habitui naturali restituuntur. Difficiliter inquam, ob humidum in iis abundans; tunicæ valorum cedens: facilius autem restituuntur ob abundans humidum glutinabile in iis viciens, ob vicinitatem quam obtinent ad prima semina, ut colligi potest ab Hipp. in lib. de genuina, & Gal. in lib. 2. de semine. Infantes itaque ac adolescentes ad pubertatem usque facile phthisi liberantur. Mulieres quoque ac viri robustiores, senesque durioris substantiæ haud difficulter sanantur. Diutius perdurat phthisicus, qui materiam bene maturando expuit, Gal. auctore. Verum non omnes, inquit, quibus trium mensium spatio exulcerantur, pulmones sanari possunt: quoniam altius insedit vitium. Acuti humores erodentes, vlcera magis exasperant: pari modo vlcus irremediabile, si in ore marina salugo adfuerit. Quicunque tabe molestatur, si eorum febri praua biliosa febris acuta superuenierit, malum: tum quoniam ex ardesciente febrili calore; ut præceptor meus Benedictus Faentinus dicebat, & sicco eius, vehementer tabidus exsiccabitur: ita ut alimenti inopia, phthisicus pereat. Et qui tabidi facti sunt cum lenta febre, & si iis accidat quartana febris, ut aliquando contigit cuidam matronæ nobili, deterrimum est: tum quoniam ex abundanti sicco ab humore melancholico prodeunte, tabidus ocyus perimetur, ut eidem matronæ euenit, vel eius siccitas augebitur, & tabes in longum prorogabitur: tum quoniam tabido acquiritur intemperantia frigida & sicca, cum qua vita hominis diu stare nequit. Quicunque vero tabe corripitur, si iis pituitosa febris acciderit, minori cum periculo est: quoniam ob pituitæ frigiditatem in iis remittitur calor habitualis factus, & in iisdem siccum humido infringitur: periculum tamen est ob pituitæ humiditatem, ne à debili calore phthisici in putredinem vertantur, sub qua vires corporis perimuntur. Atque hæc ipsa satis de signis prognosticis esse puto.

OBSERVATIO LVII.

De pleuritico suppurato, qui cum non reperiatur, in phthisin incidit, qui etiam postea obiit.

Prætor in portu Delfensi pleuritide correptus cum in principio neglectum haberetur, neque temporis remedia abhiberet, cum tandem medico adhibito, frustra remedia adhiberentur, neque pleuritis resolui posset, facta est suppuration: & cum illa non purgaretur intra 40. dies, ad tabem deuenit. Tunc & secundus medicus eum tractabat, vlcere tamen pulmonis semper in peius vergente, ac febre habituali magis accrescente, autumno iam magis appropinquante. Inter anni tempora autumnus grauissimus est, auctore Hipp. commoriantur enim ægri, quum plurimum decidit arborum foliis: eo tempore plerique etiam phthisi corripuntur: & autumnus tabidis malus, iuxta 10. aph. lib. 3. tam pulmone vlcerato, ut ait Gal. in Comento, quam omnibus aliis quomodocumque tabefactis. Ad huc quoque sub finem accitus fui: cumque viderem in homine extreme extenuato, & viribus iam dudum lapsis, atras viridesque excreationes, & quæ colore fuscarentur, procul dubio mortiferæ erant, cum & carbonibus iniectæ grauiter olerent, & cum capillorum præterea & barba ac superciliorum defluuium, mortale pronuntiavi apud amicos: eoque magis cum & ventris fluxus accederet. Et ita

facto prognostico, tantū illa esse adhibenda dixi: quæ vires restaurarent, vt sunt martij panes, pingulata, hordeata, amygdalata, & iura restaurantia, & confectiones ex carnibus cancrorum, consummata & colatitia, de quibus satis superque diximus in nostris lib. de obs. de hectic. & marasmo affectis: & cum ita discederem, paulo post hic obiit.

S C H O L I A.

Hic malo inter initia protinus occurrere necesse est, ex Celsi decreto: neq; enim, vt ipse inquit, facile is morbus cum inueterauit, euincitur. Ceterum quomodo suppurati tam ex pleuritide, quam ex peripneumonia curentur: iam prius dictum est, & cum de sputo sanguinis verba fecimus, cruentorum adhuc vulnere, tum pulmonis, tum aliorum instrumentorum respirationi deseruientium, curandi modum docuimus, & quomodo pleuritici curentur: si ad suppurationem conuertentur. In eis igitur qui pus iam exsereant, & in via sunt, vt tabidi fiant, aggredi curationem oportet. Nam spes est siccatō debitis remediis vlcerē, prius tamen repurgato, cessare febrem, & ita consummationem multis euenisse Gal. testatur. Sed eos qui iam ad tabem perueniunt, stultum est aggredi. Et cum neque in illis integram sanitatem restituere possimus, neque id polliceri: sed solum vitam protrahere, sistendo causas siccationis: ideo semper continua præcautione vti oportebit, vt in his omnibus, qui dubia sanitate fruuntur, & perpetua egent medici opera. Quibus autem modis vlcerā in eisdem partibus orta curentur, iam ex parte diximus: & quamuis, quæ in pulmone hæserunt, vel difficiliora ad curandum sint, vel eorum curatio perfici omnino nequeat, propter iam dictas causas: ne tamen tanquam deplorati desistuantur. Quomodo hi tractandi erunt, ac reliqui, qui in aliis partibus iam dictis ab vlcere oblati, curandi sint docebimus: id tamen prius commonefacientes, quod etsi nonnullæ traditæ sint pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ vlcerum causæ, de ipsis haudquaquam sermo faciendus erit, cum in præcedentibus singularum causarum curationem exemplis quibusdam ostendimus. Quare si quæ earum adhuc permanferit, ex iam dictis curationem petas: nunc autem de tabe duntaxat quædam addemus, quatenus vlcerā pulmonis, thoracis, seu asperæ arteriæ consequitur, deque ipsis vlceribus agemus. De victus ratione satis superque diximus obs. 35. præc. hoc semper commemorantes, quod generalis curatio vlceris sit exsiccatio, iuxta Gal. 4. meth. med. cap. 5. siquidem vlceris, quæ vlceris est, sanatio; medicatio siccatio est, 2. art. cur. ad Glau. cap. 2. Ad quam intentionem exsiccationis peruenimus, teste Gal. 3. & 4. meth. med. exactis duabus communibus intentionibus, mundificatione videl. & absterfione, ad eas enim sequitur exsiccatio vlceris. Post exsiccationem vlceris propensius fit: vt consolidetur & in cicatricem vertatur. Itaque initio abstergendum, siue repurgandum, atque resiccandum: vbi iam satis deterfum est, atque iam nisi saniosum repurgatur, glutinare oportet. Sed dum hæc sunt, extenuatio corporis restauranda est. Vtuntur ergo quidam mulsā initio ex aquæ potabilis lb. j. mellis 3 j. 6. per omnia, vbi detergendum, melle crudo quidam vtendum volunt, vbi glutinandum, melle cocto. Aliqui hic quæstionem mouent, mulsū non conuenire he-

cticæ febrī: sed diluta non nocet, cum abstergat vlceris, & marcori nec febrī obstat. Hanc quæstionem longius prosequitur Altimarus, quem perlegere poteritis, Et de lacte exhibendo, cum paulo zacchi. & mel. ros. vt minus in ventriculo coagatur: maxime caprillum. Initio dat 3 iij. vel iij. procedente tempore quantitatem augemus, de lacte dictum est prius, etiam 4. obs. nostrarum de feb. hec. Lac dandum est vacuo ventriculo, & mundato ventre. Quamobrem non imitandi illi qui lac præscribunt non purgato ventre: cum sua natura lac facile acescat; maxime in ventriculo. Ergo si opus est, ventriculus purgetur decocto galli antiqui, addita aliqua parte hordei mundati, vel integri iam semicocti: vel detur manna cum decocto galli: & ideo si alius resistat, possumus tunc quidem vt leni purgatione, cum materia adhuc fluat, vt manna cum iure pulli, vel cassia; cum semine anisi, vel decocto galli antiqui, in hunc modum parato, 4. passul. min. in iubar. ann. ix. sebesten 5. medulla sem. caribani 3 6. his ventriter galli impleatur, & coquantur in aqua com. vtiat ille in iusculo mane. Et si satis non leniat, adde manna 3 j. potest quidem capere: modo venter non sit supra modum laxus & solutus: nam vbi consumptum est, tunc omnino omittenda sunt medicamenta purgantia, quæ exsiccant corpus, & ad tabem perducunt: his enim fluxus contrarius est, ideo iis tantum vtendum, si durior sit aluo, quæ solum leniunt, & vires non deiciunt. His igitur, qui sunt parati ad hunc morbum, & qui incipiunt laborare, summum est remedium, hordeatum mundatum dare, cum zacch. ros. post tres horas, post cenam in introitu lecti. Nam qui obnoxij sunt huic morbo: calido sunt hepate, vel ventriculo, vel corde, à quibus eleuantur fumi acres ad cerebrum, qui commixti pituitæ, penetrationem addunt, & ad pulmones demittunt. Hordeatum mundatum obtundit acrimoniam vaporum, & eos incrasat: & prohibet ne aliquid superum ascendat, nec minus pulmones absterget, & corpus vniuersum humectat, vel vtatur confectio ros. antiqua à cibo, maxime post cenam, aut alia qua alia conserua, quæ consimilem effectum præstet. Tota enim cura medici esse debet, vt paulo ante diximus: in præcauendo, ne morbus fiat, vel si factus sit, ne crescat, nec citissime augeatur. Nam illos perfecte curare, difficillimum esse diximus. Pro curatione vlcerum vtuntur lacte asininio, vt prius diximus, quod quidem absterget vlceris, & corpus tabidum reficit: sed si fieri poterit, citissime mulsū accipiat. Alteratur facillime lac & corrumpitur. Lac etiam præparare oportet: nam interdum maior est intentio abstergendi, interdum consolidandi, alias refrigerandi. Cum refrigerare volumus, capram vel asinam nutrimus herbis refrigerantibus, vt salice, foliis vitis, lactuca, si autem abstergere, damus eis hordeum integrum: si magis nutrire volumus, hordei farinam, vt tritic. si plus consolidare sit intentio, nutriatur oryza, & halica, & carnibus viscosis, & nutriatur capra foliis quercinis, pyrorum, rubi, & similibus sic etiam profecto multo magis constringet. Quinum quoque & vacinum, quia crassiora magis nutriunt & consolidant, vt Auic. testatur. Statim mulsū vel tepidum dandum eo modo, quod dictum est, neque superdormiant, vel alium cibum sumant, donec sit concoctum: quod cognoscetur, si stomachus nihil eructet. Imo quidam ita lac commendant, vt solo eo quasi vtendum sit, etenim cum pane si lignico, modo febris vehemens, & putrida non

prohibeat, & torrida: tunc pitisanam præbent, & febre remissa denuo ad lac redeunt. Alij ad dejectionem imponunt parum mellis vel zacchari, ad consolidationem boli armeni momentum. Sed vinum nunquam cum eo miscendum more Anglorum, qui vinum cum lacte coquant, & serum huius febricitantibus omnibus dant. Lac vero cum amylo, vel tragac. magis glutinat. Aliqui & oxygala vtuntur, si valde siccant & febricitent, ad caloris extinctionem. Cum tussis valde subinde molestiam afferat, in ore semper detineat diatrag. vel diapenidiatum, vel saccharum candi: & noctu zacchar. ros. tabulatam, quo non est aliud præstantius in hoc morbo. Alij vero in principio post mulsam, dilutam exhibitam, fenugraci decocto, loti subinde, abiectione prioris aqua vtuntur, in qua octaua pars, vel zacchari in calidiorē conditione, vel alioquin mellis dissoluitur: & vbi magis detergendum est, conficiunt eclegmata ex succo marrubij & caulium, cum melle: vel man. j. marrubij. decoquant in lb. 6. aquæ ad dimidium: colaturæ addendo lb. j. mellis plus minusue, idque totum decoquant ad crassitudinem. Similiter è butyro, melle, & terebinthina duobus horum aut tribus mixtis. Eclegmata conficiunt: nam varian da remedia eiusdem generis, ne fiat satietas, diuersi vero generis sumenda, cum mutantur indicationes. Sed vt summam rem complectamur, medicari pulmonis vlceribus oportet (vt Aëtius refert) eo apparatu, quo facile sursum efferantur humores, cura simul adhibita, ne alij congregentur. Excogitata autem à medicis proinde sunt, vbi expurgandum ex pectore & pulmone pus est fortissima, vt inquit Gal. 1. mer. (quæque maxime dissecant) pharmaca: in quem vsum summo pere conducit, præter iam dicta, aqua mulsā per se, & cum amylo, aut iride, & rad. dulc. in ea decoctis, vel hyssopo marrubio, aut rostem hord. non decorticatum, si in ea coquantur: ita & syr. ex glyc. & ex diantho, hyss. aliaque eclegmata, & pulmone vulpis & pinorum alia de tussi & asthmae dicta, & præcipue de suppuratione. Atque dum hæc sunt, hordeatis cum sacch. aut melle, lacte amygd. vino albo tenui & subdulci, aliisque rebus quæ vires fouent, vtendum. Iam purgato vlcere iustauratis viribus: alimentis partim medicæ materiæ, partim resiccantibus & glutinantibus vtendum est. Consolidant hæc casus recens, lac vitulatum, testæ cancrorum fictili vase crematæ: ita enim glutinando seruatum, aut Theriacam terra sihil. carabe, gum arab. coral. rosæ: dantur ex vitellis ouorum, & alia quædam ex lacte vitulato, & propter tussim conficimus ex ijsdem eclegmata, adiecto aliquo syrup. ad tussim, quale est iniub. vel myrtinum, vel de sputo sanguinis dictum est. Iam quoque pro vlceris exsiccatione: quæ quidem eorum communis finis est, valida non existente febre, veteres tabidis per interualla Mithridatis antidotum, aut Theriacam exhibebant: quod & posteriores quoque fecerunt; Aëtius nimirum & Paulus: nec non & Ambrosiam & Athanasiam: quibus omnibus, pro forti pulmonis exsiccatione, vsus fuit Gal. vi. pater 4. de lec. aff. qua via tabidi id saltem lucrifaciebant vt vlceris non ultra progrediretur, nec maius fieret: sed siccatum, ac seu callo duratum longiora vita eos frui sinebat, si omnia præsidia rite fuissent administrata. Extrinsecus quoque per initia, vbi conquieuerit malum, Paulus & Aëtius applicant cataplasmata ex althææ foliis, & sem. lini, tritis tenuissimum pollinem, cum decocto. fenugrac. & althææ vel maluæ, oleo ac melle permi-

sta. Et post temporis intercapedinem ad cerata transeunt, ex butyro, oleo laurin. ac cera, & tempore repurgationis ex Aëtio, ex terebint. oleo cyprino. butyro, medulla ceruina, & adipe taurino, iridisque farina, & æsipo, æqualibus omnibus partibus commistis: loco autem cyprini olei, si desit, irino, vel violaceo vtendum. Tempore autem quo cicatrix obducitur, oleum myrtin. aut ros. extrinsecus thoraci inungendum, adiectis acacia, alumine, malicorio, & aliis apud Aëtium descriptis: etsi tussis molesta grauius, thimus tritus: & hyss. cum suc. rad. dulc. ac melle cocto excepta, formataque sub lingua tenenda dentur, vt iidem auctores sentiunt. Verum tum medicamentum hoc, tum & quoduis aliud humidum, quod ad eiusmodi curanda vlcerā faceret, ægro supino cubanti exhiberi debet; & iubent id in ore continere, paulatimque permitttere in asperam arteriam defluere, ex Galen. decreto 4. & 5. met. med. Qua ratione non solum pulmonis vlcerā, sed & thoracis, asperæ arteriæ ac gutturis curari debent: influit enim sic sensim ac paulatim de medicamento aliquid subtiliter & manifeste in ipsam asperam arteriam, & per eam ad pulmonem ac pectus, Alioqui veteres, desperatos vrebant aut relegabant ad mare seu Tabias. Attamen in tabidis non est vtendum caute. Cautum est, ex iis quæ actū, neque ex his quæ potentia inuendi vim habent, nec capiti vllum adhibendum, nisi malum à fluxu acrimie humorum ex capite factum sit: his tantum Gal. doctrina 5. meth. med. capiti admoendum, præsertim qua parte sagittalis futura coronali committitur: aut occipitio, inter primam & secundam vertebra, quo loco tutius fiet, non exiguo commodo, reliquis vero nequaquam vtetur, cum extenuationi eorum nullo modo prosint, imo maxime abstant; & ideo ab eis abstinendum.

OBSERVATIO LVIII.

De monacha phthifica, pro deplorata habita, & quomodo euaserit, de altero monacho quoque euadente.

Monacha quædam phthifica pro deplorata à medicis relicta, vt Romæ nobis relatum est cum ibid. agerem, sequenti remedio intra 2. menses sanitati restituta dicebatur. Pullum exenteratum capiebat, ac in ventre 3 iij. sacch. ros. ponebat, ac demum aqua lēto igne in olla cooperta coquebat: illoque decocto. supra cineres per totam noctem ollam relinquebat: mane vero ex pullo confuso cum suo iure manens in lecto sumebat, super dormiens, quo quidem remedio sana euasit. Alius monachus, cui ossa præ macie crepitabant, vt postea lecto decumbere coactus fuerit per singulos dies: is quoque à medicis pro deplorato habitus, duo oua recentia igne aduerso affabat in foco calido tantum, vt albumina vix coalescerent, albuminibus reiectis, vitella in scutella ponens: addebat pulu. sulphuris viui ad fabæ quantitatem maiusculæ, saccharo cando asperso eadem mensura, & salis momento: quæ simul mixta cum vitellis ouorum capiebat hora vna ante cibos alios: & desuper bibebat vini optimi dulcis cyathum vnum: modo sumebat aquam roris solis vna cum vitellis ouorum: interim & pro tussi vtebatur syr. de liq. viol. diatrag. frig. eclegmatis modo interim & aliis confectionibus destillationem inhibentibus. Idem destillabat limaces teneros ante ortum solis in vinetis collectos: cuius & cochlear cū duobus vitellis ouorum subinde capiebat: ita vt macie consumperet.

consumptus, pinguis paucis mensibus cuaserit, & præter spem quoque sanus factus sit.

SCHOLIA.

Scribunt veteres medici, sulphur linctis prodessetuffientibus purulenta, hinc & huic monachæ profuit cum vitellis oorum. Easdem purulentias pulmonis, pectorisque, & ab eo graueolentia halitus, butyrum efficacissime iuuat; cum pari modo mellis attici decoctum, donec rufescat, & matutinis horis insumptum ad linguæ mensuram; quidam & laricis resnam, ut ante dictum est, addunt. Sed hic pulvis descript. Haly contra tabem, valde commendatur, quo & monachus ille de quo dictum est, prius à Taran-

tano curatus fuit. *℞. pap. albi ʒ x. gummi arab. amygd. rag. ana ʒ iij. sem. portulacæ, sem. altheæ, mal. ana ʒ v. sem. cucum. melon. sem. cucurb. citrulli. sem. cydon. murr. an. ʒ iij. spodi. succ. liq. an. ʒ iij. penid. ad pond. omnium fiat pul.* Felicitissime ergo & diuerso modo hoc pulvere in multis usus sum, modo cum vitello oui, modo cum syrup. pap. vel iuiub. inde etenim conficio morfellos & confectiões in tabulis, qui pulvis complet omnes intentiones; prohibet enim descensum pituitæ ad pulmones, intransando, obsem. pap. albi admixtum in magna quantitate, & quatenus iuuatur à gum. arab. & tragac. lenit pectus, & materiam humectat, ut facilius per tussim extrahatur, exsiccat autem pulmo à spodio. Fieret autem pulvis hic præstantior iuxta Rondelet. *℞. sem. pap. albi ʒ j. b. gum. tragac. & arab. farinæ orobi, ana ʒ j. b. sem. altheæ, portul. cucum. melonum, citrulli, bombacis, ana ʒ iij. b. cin. caner. fluuiat. coral. alb. vsti, succi glycyrr. an. ʒ j. b. zaccb. ros. tab. ad pondus omnium fiat pulvis: denunt ʒ iij. cum syr. de pap. vel iuiubino.* Hic pulvis est efficacior altero, quia semen bombacis recipit, ac alia, quæ magis humectant, ut semen citrulli, cucumeris. In minori quantitate recipit pro spodio quod conficitur ex ossibus equi vel alterius animalis) cineres cancrorum, qui multum laudantur, in cancro & in morfu canis rabidi: & in hoc affectu, ob exsiccationem & similitudinem, quam habet eorum caro cum pulmonibus: ob id eius decoctum multum laudatur. Coralli & cineres cancrorum abluantur leuiter cum aqua hordei, post aduersionem. Nec oportet accipere astaces fluuiorum (vulgo *Eseruices*) qui habent similitudinem cum cancris: cancri tamen non sunt, ut dicebat Rondelet. ut ex Arist. constat, qui inquit solos cancores carere cauda, inter ea, quæ tenui testa integuntur. Sed adhuc astaces præstaret capere, quam leporem marinum, ut facit Syluius in suis Succedaneis: Est enim prorsus venenum, & sua natura pulmonē ladic. Ob id qui noxij sunt huic morbo, loliginem non edant, quia lepus marinus istis commiscitur: ita ut vix ab ea discerni possit: nisi tetra suo odore. Sed pro cancris fluuiatilibus qui passim reperiuntur in Italia, capiemus cancores marinos vel stagni, qui eandem habent facultatē, quamuis imbeciliorem: ut docuit Diosc. c. 10. lib. 2. Neque reticiantur ob falsedinem: nam ea aduersione deponitur. Cum autem in cibo vel iusculis apponuntur vel assumuntur, debent prius abluī aqua hordei, & caro & iusculum assumenda sunt. Valent etiam contra venenum leporis marini potum. Non me latet: inquit idem Rondelet. in exemplaribus Græcis pro cancro marino, legi leporem marinum: sed corruptus est codex, ut patet ex Diosc. c. de cancris. lib. 2. & ex Plinio: & pro lepore legendum cancrum. Utimur quoque ut iam diximus, non

Pulvis Haly contra tabem valēs ulceri pulmonis & tussis.

Pulvis Rondeletij.

Spodium.

Syluij error.

sola aqua cochlearum terrestrium, sed & decoctio eorumdem testudinum nemoralium. Vide de testudinum nemoralium & cancrorum condimentis apud auctores & apud Bened. præceptorem meum in sua Empirica, de vlcerebus pulmonis & sputo saniei: quibus ego felicissime aliquando usus sum. Ut de hæcicis febribus diximus. In sua verò magna praxi ad phthisin peruenierat: sed vita defunctus non potuit ultra procedere, cum Bononiæ in celeberrimo gymnasio in Italia per 50. annos & amplius publice docendo floruit: cuius & ego auditor fui cum Bononiæ agerem. Is & plura edidit commentaria, in Aph. Hipp. & in prædictiones, quibus clarissimum tanti operis testimonium nobis reliquit: ac veluti ideam cum ipsa ratione medendi: cuius & iucunda familiaritate vti sumus: quem nos apud Deum, nunc multo celebriorem esse speramus, cum & præfatio eius in Empirica pietatem erga Deum verum declararet. Verum quantum ad curationem attinet ipsius phthisis, seu vlcere pulmonis, quamuis nunc satis de ea dixerimus, si hæc nobis nondum satisfaciunt, poteritis illos adiungere, qui in Rhaf. scripserunt & potissimum quæ longo sermone narrantur ab Arculano: vel breuius à Gatenaria: Primo videtur præscribunt conuenientem, qui & causæ phthisis resistat: & hinc primo abscondit causam, quæ resistat: & phthisin deducere possit, curando causam, vel etiam anginam, pleuritidem, pulmoniam, sputum sanguinis, empyema: vel similia, si in causâ fuerint. Sed horum curationem iam diximus. Interea ista curando etiam habent rationem phthisis, Sed rationem causæ aliquando habentes, etiam ventrem solunt, & aliquando sectionem venæ adhibent, ut videre licet Arculanum. Sed vlcere iam factio, nullo modo conueniunt: neque phlebotomia, nisi noua fiat exspulatio sanguinis, aut venæ alicuius tecens apertio metuat, & vires ferant: sed iis deiectionis & exsiccationis: neque solutua, neque venæ sectio conueniunt. At vbi vlcus est pulmonis, duas præcipuas intentiones ponunt, nempe abstersionem, seu mundificationem, & consolidationem: quibus & tertiam adiungunt, correctionem accidentium. Vlcus in pulmone abstergunt cum syr. facilitantibus sputum, ut est syr. de liquiritia, hyssopo, marrubio, cum decoctis pectoralibus, eclegmatibus, potionibus. Deinde consolidant: quamuis magis studium esse volunt, in abstergendo, cum postea natura ex se ipsa sapius incarnet & consolidet: ideo præcipue vtuntur zacharro ros. Interea pro consolidatione vtuntur pulueribus supradictis, ex terra sigillata, bolo, & aliis apud Mesuem, tum Arculanum, & alios descriptis, cum lacte, aqua pluuiali, vel chalybeata: cum syr. è miua cotoneorum, & succo myrti, & similibus: cautionem tamen adhibent, quod si ex eiusmodi astringentibus sputum retineatur, exhibent cum syr. de hyssopo, de liqu. vel cum decoct. pectorali & similibus. His & alijs adiungunt adhuc intentionem exsiccati & resoluendi cum iis, quæ lambuntur & suffumigantur: de quibus vide Arculanum capite de tussi. Huius etiam summi mentionem facit Rondeletius. Hic tamen canonem obseruari volunt, etiam cum de tussi loquerentur, quod non sint administranda, nisi cum febre careant, vel exigua sit materia. Quare cum cautione istis vtendum, & videndum nunc quid sputum retineant. Habes formulas descriptas ad vlc. pulm. apud Rond. de med. int. fol. 141. & ad alios affectus. Volunt tamen quidam, ne iis vtantur in vlcere pulmonis, & vbi multa est materia

saniosa in pectore, ut Gradus admonerat c. de tussi ideo & Arculanus cum ea suspecta sint, nolabat uti nisi leuioribus ex gummi cedri cum melle, adiecto exiguo galbano: & licet etiam ad hæc intentionem Gal. vtatur theriacæ: eadem ut sufficit, illi suspecta erant ob hæcicam. Sed Gale-num Theriacæ vsum fuisse credendum, febre non admodum valida existente. Vltimo addunt correctionem accidentium: & præcipua duo ponunt, nempe fluxum ventris, & extenuationem: quibus alijs addunt tussim validam, sputum sanguinis: constipationem ventris, fastidium, febrem putridam, ut Arculan. facit, nonnulli & tussim addunt, fluxui ventris occurrunt cum pul. descripto apud Rhaf. c. proprio, qui sit ex pul. cum. arab. spodi. bol. armen. sem. myrti, an. p. equal. vel ʒ j. contritis in farinæ modum: ex ex syr. myrtino vel pap. saluberrimè datur drachmæ pōdere. In phthisi igitur rationem accidentium habere oportet. Sic pater meus charissimus Iordanus Forest. vir nobilissimus, p. m. cum senex annum 65. fere attingens, ex tabe moreretur: licet toto morbi decursu nihil cruoris expueret, circa finem vitæ guttur quasi inflatum erat, per abscessum, ut videbatur: sed eo iterum delitescente, in alui profluuium incidit, cui statim occurrebamus, cum iure restaurante ex capone & perdice, adiectis pyris & pomis cotoneis & semine berberis, adiecta pauca aqua ros. & sumach. & his similibus: ut magis constringeret, & exiguo vino cotoneorum, ut illum simul restaurare possemus: etiam ventrem inuinximus vnguentis restringentibus: nam fluxus ventris, ut recte admonerat Rondeletius, magis iuuatur ad extra astringentibus ventrem, vel remedijs infusis per sedem: quæ si per os sumantur, faciunt anhelitus difficultatem, & tussim excitant: vel sputum retinent, conserua tamen ros. cum terra sigillata vera, vel bolo cum syr. myrtino, minus nocet. Sed cum talis fluxus plerumque lethalis sit, præcipue in fine, ut diximus, parum in patre meo charissimo iuuerunt: ita ut vir & senex admodum pius, anno 1559. vltim. Febr. die in Domino quieuerit, postquam benedictione vltimo habita, nos filios suos tum filias Deo commendauisset Abrahami modo. Extenuationi vero occurrunt restaurantibus, de quibus iam satis dictum est, quale illud est; quod habet aliquid canis testudinis mundatæ, & cancrorum fluuiatilibus in aqua hordeacea decoctum, nunc pinearum. pistaciorum, amygdal. dulc. passul. mundat. seminis cucumeris satini & melopeponis purgati: singula separatim contrito, penid. addito & sacchari per purgati albisimi q. s. ex aqua cochlearum destillata ad vnitatem redigito. Quidam adiiciunt superstitiosius, ut putant aliqui, gemmarum quarundam farinam, porphyrie marmore vitæ, vel aurum: sed diligenter videndum ne aliqua fraude officinarum lapides illegitimi pro veris & pretiosis immisceantur. Sed de nutrientibus & roborantibus antea dictum est & auctorum libri his sciant. Tussi autem subuenimus, ut cap. proprio de tussi dictum est: ita & sputo sanguinis: de quo prius satis egimus. Si igitur in vlcere pulmonis denuo sputum sanguinolentum appareat, vel superueniat, vel præcedat, ad caput de sanguinis sputo recurrit. Constipationem ventris, quæ tamen non est adeo rimenda in hoc malo: facillime occurrimus cum

enemate leniente, in frigidantē & humectantē, uti ex lacte, zacharro, vitello oui, & oleo viol. & si necesse est, cassia adiecta, vel melle viol. idem præstat: Lac sumptum cum multo zacharro, & iure gallicano cum zacharro. Fastidio autem & deiectioni appetitus obuiant exhibitione cotoneorum & miua, & emplastris ex cotoneis & vino ac aceto rosifilque, momento galliæ muscatæ adiecto (modo non sint mulieres, quæ morbo vterino laborant) ventriculo appositis: ego vtor solo cerato ex mastiche ad ventriculum roborandum. Febris subuenitur aqua hordei & pitana hordeacea. Si inualescat febris putrida, constante virtute, digeratur humor febrem faciens, & euacuatur secundum exigentiam: sed leuibus ob extenuationem. Et si adsit hæcica sine putrida feb. succuratur balneo, eo modo de febribus hæcicis ad longum docuimus. Vigiliis subuenimus emulsione papauer. & syr. eiusdem: qui optimus est in hoc morbo, si non retineatur materia intra pulmones & crassitiem: nam tunc vbi sputum retineretur, ab eo abstinendum, & potius linimentis soporiferis circa tempora vtentur: syr. viol. cum aqua hordei: dabimus, si sputum retineatur, & relaxantibus vnguent. pect. inungemus, & eclegmatib. sputum ex pectoratibus iam superius dictis. Nunquam adeo attentum oportet esse ad id, quod magis vrget, ut omnino negligatur morbus aut aliud symptoma minus. Siti occurremus cum iis, quæ de siti diximus in febris & pilulis sub lingua ex mucagine cotoneorum, phyllis, semin. q. frigid. maior. mund. & succo glycyrrisæ, & diatr. frig. quæ omnia etiam ad phthisin & tussim ac exsiccationem faciunt. Si vlcera sint in aspera arteria, vel ut alijs scribunt, in canna pulmonis: curantur ut vlcera pulmonis cum medicamentis abstergentibus & consolidantibus, quæ potius ut eclegma lambendo diu in ore detinenda, & paulatim deglutienda, ut in asperam arteriam descendant sine tussi: ut diatr. cum pauco melle vel syr. conuenientibus ad consolidationem, diatr. cum bolo, vel terra sigill. cum syr. myrtino: ita & in vlcere pectoris procedendum, ut de pulmonis vlcere dictum est: si nec ita sanetur, sed in fistulam transeat, quales nos multos annos superuixisse vidimus: nulla alia est via in curatione, ut antea dictum est, nisi aperiatur exterius, vbi tumor est, vel cauterio, vel scapello aut phlebotomo, ut antea dictum est, & egresso pure, & repurgato vlcere, consolidetur. Quod si aliquid costæ sit corruptum, pars eius corrupta medicinis, vel cauterio actuali euellenda; postea rursus repurganda & consolidanda. Nouimus tamen in multis post apertionem, exterius vlcus non potuisse consolidari, & perpetuo virus è pectore euomuisse, & diu ita vitam protraxisse: imo noui quosdam ita fistulas in pectore habentes, alioqui bene valere (ut in quodam Cornelio Ioannis apud Delphenses puerorum magistro) præterquam quod fistula tale virus modo plus, modo minus euomat vsque ad vitæ finem sine incommodo viuentes, quanquam misere vitam trahunt ob virus & pus quod ita perpetuo euomitur & effluit. Et ita absolimus omnia thoracis ac pulmonis vitia ac morbos, tum partium vicinarum, quibus hunc librum finiendum duximus, & ad cordis mala accedendum.

Finis Libri decimi sexti.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus septimus.

DE CORDIS AC QVIBVSDAM MAMMILLARVM AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De cordis palitatione, variisque exemplis eiusdem, & de quodam vulnerato vehementissimam palitationem cordis incurrente.

Palitationem cordis (quæ nihil aliud est quam immoderata concussio venienti diastole ac sistole molesta) veteres vel in sanguinis exsuperantiam retulerunt, vel in humorem copiosorem in pericardio infixum, ut Fernellius censebat: & secundum eundem etiam retorrida bilis aliquando eandem peperit: quæ alias sponte vacuari consueverat, in arterias effusa. De hac meminit Fernellius, duos à valida pilæ exercitatione repentina morte sublato, cum in illis deprehenderit bilem in tophi nigri speciem concreuisse. In cæteris vero causam animaduertimus bilem esse perassatam: interdum in præcordiis, sæpius in liene congestam. Quamobrem in hoc symptoma plurimum propensi sunt, qui hypochondriaca melancholia laborant, ut sæpe animaduertimus: atque his diebus iuuenē quendam nobilem Mansardum nomine, valde ingeniosum, doctum, sed melancholicum præ manibus habuimus, qui frequenter palitationem cordis incurrebat, idque sæpissime ex tristitia. Vehementer exasperatur hoc malum inmodica exercitatione: astu, balneis, venere, crapula, excandescencia, meracioris vino. Is enim si præcipue vinum Rhenanum, quia subtile ut arbitror, sumeret, magis hoc malo tentabatur: & præcipue ex metu & tristitia: & quamuis sæpe per me curatus fuerit, ex leui causa in melancholico hoc malum redibat: aptis autem his remediis eo tempore à me curatus: quamquam idem postea hinc discedens, ut audio, non sine melancholia viuat, etiam hoc tempore anno 1590, cum hæc rursus colligerem, frequentissime contingit à flatuosis, fumosis, malignis, crassis vaporibus atque spiritibus in pericardio magna ex parte, aliquando etiam in sinibus cordis conclusis, qui aut in corde generantur, aut aliunde inferuntur: nimirum ex hypochondriis, in hypochondriaca melancholia, ut nunc diximus, & in iis quibus lien bilis atræ copia turgescit. In his etiam circa lienem & pancreas conspicua, & molesta percipitur arteriæ palpitatio: ex eoque loco per arterias, quibus multis lien perfusus est, teter, atque vapor prompte in cor vicinum subit, cuius vi & malignitate irritatum, vehementiori palitatione nititur: quod noxium est excutere: haud secus atque cerebrum in epilepsia. Iam etiam hoc malum oritur subinde ab utero, ventre, aliisque corporis partibus male dispositis: ex partibus n. prædictis facile multi feculentis, fuliginosisque vapores per arterias in cor subeunt. Sæpe quoque fit ab aquoso putridoque humore, vrinae similis, à quo malus odor quoque efflorescit, qui maiori copia

pericardio concluditur, quam ut cor libere se dilatare possit. Et licet ab ira, exercitio, tum supradictus sæpe irriteretur: animi & corporis quiete remittitur: contigit equidem cor à prædictis causis irritari, tuncque nititur, ut iam diximus, id quod noxium est valida palitatione expellere: potest idem malum nasci ex tumore aliquo aquoso, sanguineo, vel caroso in pericardio enato, vel à tuberculo, abscessu, vermibus, aut vellicantibus, subita euacuatione, imprægnatione, ut postea exemplum ponemus, inflammatione, item ab aqua tunicae inclusa, & humore putri ac maleolente, lapillis, venenosa qualitate in illa tunica hærentibus; aliqui addunt & à veneno, quod tamen negat Iacchimus: Ego, inquit, omnes naturas venenorum legens, sincopas quædam facere audiui: cordis palitationem non audiui. Ab halitu tamen & vapore flatuoso educto ex vitioso humore fieri volunt ob eandem causam & ictericis & splenicis melancholicis fere omnibus, & cachexia laborantibus puellis & similibus, & qui in aquam intercutem incidunt. Sed & interpres Hollerij etiam venenosa qualitate & spirituoso halitu, tum aliis omnibus iam dictis oriri asserit, siue ab extremis, siue ab externis, siue in ventriculis cordis: siue in substantia, siue in pericardio, siue in arteriis causa subsistat, siue accidat extrinsecus, ut utero, liene, hepate, ventriculo. Quæ omnia iam supradicta ab Hollerio obseruata sunt. Sic Archidiaconi, hoc malo interempti, corpore dissecto abscessus in substantia cordis inuentus: in alterius pericardio, aqua: in Britone quodam inflammatione cordis: in alio abscessus in vena arteriæ: in multis pericardium flatu distentum, qui tandem in aquam solet concreverunt: nisi cordis calore dissoluatur. In muliere quæ quatuor mensium spatio incredibili vrinae cruciatu laborauerat, duo calculi reperi in corde cum multis abscessibus: integris renibus & vesica. Sed notatu dignissima historia Præsidis primarij Rothomagensis, nomine Remon, qui abeunte ætate ad annum quinquagesimum quintum, quo obiit, cordis palitatione corripitur solebat, præsertim à summo meridiano, & ubi arcus tibiae contractas habebat: Sensus quidam tremulus, erat ad carotidas: huic pulsus vel nullus, vel parvus, & sine ordine. Soluebatur paroxysmis edito crepitu, ructu, clystere, dolore in mediis clauiculis excitato, deinde in fronte, vel tussi satis violenta sponte mota. Relictis tibiariis vinculis, & summo melius habebat. Eadem symptomata in muliere nobili apparuerunt. Vtrisque hepar calidius, ventriculus frigidior. Hinc multa fuliginosa excrementa, spirituosusque vapor & crassus, in arteriis interceptus, continebatur, qui in cor exhalans, incutiebatur tremorem vel palitationem: donec motu, attritu, aut calore, quod ad id non sufficeret facultas vitalis, dissolueretur, aut aliunde exitum haberet. Eodem modo, & ob eandem causam paulo ante & ictericis, splenicis & melancholicis

lancholicis ferè omnibus & cachexia affectis euenire diximus: eodem modo & Galenus, ex balneo & vitiosis lignis accensis mulierem solitam animo deficere & palitatione cordis laborare, scripsit: alteram ab vreri affectibus idem pati: cuiusdam, si vel per horam lauaretur, idem addere, nisi prius panis aliquid assumpsisset: hominem, dum exsolueretur: & cor fortiter palpitaret, repente interire. Sed omnibus neque eadem causa, neque eadem pars affecta modo enim in ore stomachi, modo in corde fit principium defectionis animi. Palpitatio quoque non semper causam habet in corde, sed pars affecta est, cum qua mutuum habet consensum, ut pericardium, & arteriæ, præsertim maiores & viciniore, inde vterus & similia. Causa autem modo per se morbum efficit, ut tuberculum, lapillus, aqua, inflammatio; de quibus paulo ante dictum est; modo aliquid commouet, quod morbum efficiat, ut balneum & ligna succensa in muliere, cuius meminit Galenus, & hepar ac ventriculus in præside Rothomagensi, quam causam Hippoc. manifestam appellat aphorismo adducto, sicut priorem non manifestam, è qua periculum mortis repentinae imminet, non ab altera, licet tandem quoque interficiat. Ob idque vitam præles ad 55. annum produxit, cum cæteri eodem morbo, sed causa dissimili, breui perierint. Verum hæc euenisse compertum est: sed quod nunc referam rarissimum & minus à multis visum, quod iuueni cuidam accidit robusto, vigesimum octauum annum agentis. Hic in pago Schaga dicto, an. 1549. mense lunio vulneratus fuit in dorso sub scapula sinistra, vulnere thoracem transeunte; qui mox febre valida continua acuta correptus est, & in cordis palitationem adeo vehementem & violentam incidit, ut etiam extra domum, in qua æger decumbebat, à transeuntibus (potissimum, si fenestra oclusa aures admovent) palpitatio cordis exaudiretur: ut in vita similem casum neque audierim neque viderim, neque à præceptoribus meis obseruatum compererim: quamquam Fernellius, medicus, si quis alius, clarissimus & doctissimus, scribit huius tantam vim esse, ut sæpe sit animaduersa thoracis vicinas costas effregisse; sæpe & eas, quæ supra mammam sunt, de propria sede depulisse; sæpe etiam arteria foras dilatasse in aneurisma, contracti pugni magnitudine, in quo & tactu & visu conspicua erat palpitatio. Ita quidem affecto corde arteriæ omnes vehementius pulsant ac interdum dilatantur, præcipue vtero, quæ supra iugulum sunt. Ad hunc iuuenem cum ingressus essem, hanc grauem palitationem animaduerti ortum habere ex sanguine intus remanente, vel ibidem concreto: quamquam chirurgus (ut ij homines solent) omnia venæ sectione potiones vulnerarias & sanguinem dissoluentes exhibuerat: cum tamen venæ sectio in recenti vulnere facta (nisi in ventre consistat) statim fieri debeat, & expediat quoque ipso vulnere statim sanguinem plus minusue effluente: quippe phlegmone sic minus tentabitur, tum vlcus ipsum, tum quæ circumposita ei loca sunt: & ideo etiam statim venæ sectionem adhibere oportet. Male igitur tonfores nostri, vel qui chirurgi esse volunt, in vulneribus magnis interiora penetrant, statimque tanquam ad sacram anchoram configunt ad suas potiones vulnerarias consuetas, easque subinde admodum calidas propinant, quibus amethodi perpetuo videntes febrem ad phlegmonem inducunt, mortis causam inferen-

Pet. Forest. Tom. 2.

tes. Siue igitur multus sanguis defluerit ad cor (nam & à multo sanguine obstructionem faciente palpitatio oriri potest) semper & ratione febris & potissimum palitationis conueniebat venæ sectio, idque in iuvene robusto, licet vulnerato, in quo sanguinis non satis ex vulnere fluxerat: cū & vulneris quoque ratione venæ sectio in eunda erat, ut 4. methodi medendi Galenus ex Hippocratis decreto docuit. Iam quoque multoties Galenus subito palitationem cordis sine alio accidente, aut vulnere euenientem detractione sanguinis curauit: imo omnes palitatione correptos (ut 5. de locis affectis habetur) venæ sectione sanauit: & quendam quotannis verno tempore incidentem in palitationem eodem modo præseruauit, cum tales, si ab ea abstineant, magna ex parte subito quandoque intereant. Memini non ita pridem rusticum quendam vulneratum in pago Scermerio dicto etiam in palitationem fere similem incidisse, & ob sectionem venæ prætermittam subito interiisse. Quare venam sinistri brachij rundero feci, sanguine satis pro viribus extracto; & illico à detractione sanguinis, incio chirurgus, melissam viridem & boraginem accepi, contritas inquam herbas, ne ab astantibus, cognoscerentur, easque supra tegulam mundam ignitam posui, aqua rosacea & acetici momento irroratas: qua cum cordis regioni admonuisset, miraculi seu incantamenti modo, illico cessauit cordis palpitatio omnibus admirantibus, qui præsentibus erant; adeo ut vix aliquis vulneratus in eodem pago (cum tunc Almarie in patria praxin exercerem) si postea decumberet vel male haberet, me non vna cum chirurgo in curatione admiserint, & tempestiue, ad quosuis vulneratos vocauerint. Hoc autem arcano, nulli nisi vero Pythagorico reuelando, aliquando uti videram præceptorem meum Elideum Forliuensem, vel Paduanum, in praxi versatissimum, in nosocomio Bononiæ vulgo appellato Vita. Verum is solo melysophyllo utebatur; nos boraginem hoc tempore adiecinus. Cæterum licet palpitatio curata foret, nec amplius rediret: attamen ratione febris tum vulneris, cum postea aluum non satis deponeret, sequens leniens medicamentum propinaui: ℞. diacaboli ʒvj. electuar. de succo ros. ʒi. b. dissolue cum ʒiij. decoctionis infuscriptæ: ℞. vngula caballina viridis, consolidide viridisque & maioris, & bellidis scabiosæ, bugle, sanicula, capill. veneris, agrimon. viol. ana m. j. radice fenicali, bugloss. glycyrrhizæ rasæ ana ʒj. cicurum rubr. ʒij. fiat decoctio in sero lactis pro ʒvj. rachebaro colat. dulcoretur, sumpsit autem in diluculo lenitina iam dicta cum ʒiij. huius decoctionis: altero die post venam sectam optime aluum excreuit, febre cessante nec palitatione cordis redeunte. Interea pro vulnere reliquo decocto bis in die utebatur ʒj. inter ebulliendum rubia tinctorum adiecta, & pro tussi, quæ tunc leuis aderat, modo ex syr. sequentibus, modo ex diatrag. in tabulis exiguum quid sumebat: ℞. syr. viol. glycyrr. an. ʒij. borag. ʒj. postremo & his herbis in ceruicia decoctis & colatura facta bis in die pro vulnere repurgando & consolidando utebatur: ℞. caulium rub. sanicula, buglossa, vngula caballina, artemisia rubescentis, melisse an. m. j. incise in ceruicia communi coquantur: quibus remediis vulnere intus repurgato, opera deinde chirurgi, breui vulnus sanatum est, ac nutu Dei æger conualuit.

X SCHO

SCHOLIA.

Hic quidam antequam ad cordis affectus descendant, cordis naturam describunt, eiusque structuram & situm, ac cordis & cerebri opera, de quib. quia nos in præfatione non nihil diximus, deinde etiam, quia Galenus, De usu partium abunde de iis egit, & post eum alij auctores, ut Arculanus & Iacchinus, tam alij plures, eos perlegere poteritis, & Bened. Veronensem. Sed quia hic breuiter de cordis affectibus agere institutum est; Cordis igitur mala hæc plerumque sunt, palpitatio cordis frequens, animi defectus, cardiacus morbus, habitudinis corruptio, sicut est hæctica dispositio, de qua satis dictum est in libris nostris, De febribus hæctis & marasmo. At vlcuscula non patitur membri nobilitas, nedum vulnera aut abscessus: protinus enim, teste Paulo Aegineta, subducuntur spiritus, & extrema sudore profuunt, & frigore corripuntur exitiales: imo auctore Plinio quouis modo læsum mortem adfert. Mulier tamen quadam Clara nomine & genere, apud Beniuenum c. 35. cordis dolore interdum vexabatur, quem medici à malo ipsius cordis habitu fieri arbitrabantur. Sed cum pluribus iam annis connubio iuncta non conciperet, & sterilitatis causam quæreret, ac tollere conaretur multis prædiis, ita demum dolor ille cordis incrementum cepit, ut perpetuus fieret. Ex quo sæpius etiam mulier ipsa deficiens, recreari vix poterat, donec, eo iam magis magisque inualecente, è medio sublata est. Cæterum mortuæ corpore inciso, & frustulum nigrioris carnis in sinistro cordis ventriculo supra arteriam, quod mesopili formam haberet: & vulua à medio infra versus imam eius partem iunctis oris obcalluisse reperiata est, quare ut tuberculum illud mortis, ita hoc sterilitatis causam fuisse cognouimus. Callum quoque cuidam in arteria magna, loco cordi proximo, natum obseruauit Dodonæus medicus mihi familiaris. Multis hic annis cordis palpitatio obnoxius crebro fuerat; sex vero ante mortem mensibus in sinistro carpo pulsum tam exiguum habebat, ut nullus frequenter apparuerit, ac sæpe sentiri non potuerit. Fuit quoque, palpitante corde, difficile admodum huic potum admittere, ita ut vix vnciam simul bibere potuerit. In pectore huius spatio sublutei coloris humor collectus quoque fuerat. At vulnus cor penetrans statim lethale est: uti meo tempore euenit in iuvene illo, fratre cuiusdam chorauli Alemariani, qui à quodam Veneo dicto vulneratus in pectore iuxta mammillam sinistram, protinus sanguine effluente mortuus est. Galenus hoc ipsum confirmauit, necesse esse hominem mori, idque præcipue si sinistra partis cordis ventriculus vel venter fuerit vulneratus. Si vero non ad ventrem vsque pertingat, sed in cordis substantia consistat vulnus, ex ita affectis aliqui non solum ea die, qua vulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte vivere poterunt, qui oborta deinde inflammatione exstincti sunt; ut vir ille in Scermerio pago, de quo diximus obs. præcedente, etiam mortuus est. Sed ij quam diu vixerunt, mentis compotes inuenti sunt: vnde euident sibi testimonium sumit Galen. & eiusdem cordis substantia secta, negat rationalem animæ vim in corde consistere. Mirabile tamen quid refert Beniuenus, de abditis rerum caus. cap. 42. De cordis parte patefacta: Inciso inquit, abscessu, qui supra septimam vertebra inueniuntur longo temporis intervallo sinum fecerat.

intimamque membranam sua sanie proflus erorat, minima ipsius cordis pars oculis cernentium patefacta est. Verum cum hominem summa & diligentia & solitudine curaremus, in pristinam redactus est sanitatem. Hic tamen cor læsum non videbatur, licet aliqua pars ipsius oculis cerneretur: nam sicut cor vulnera non sustinet, ita nec eius membranz inuolucrum, cuius aquosus humor effluit: eo quoque abundante macies subsequuta fuit in simia secta apud Galen. ut de Marasmo diximus in 4. lib. febrium hæcticarum scholio obs. 10. quæ cum ad extremam maciem deuenisset, vitam cum morte mutauit, cum & palpitatio cordis ex eadem aquositate abundante fieri possit. Refert tamen idem Beniuenus istum in cordis tunica conuulsi in quodam iuvene à fratre suo ad sanitatem perduxit, quem idem iuuenem tre laeso, in quo signa lethalia aderant, quem idem iuuenem leuiter fuisse ex vulnere perfricta. Huius videas historiam eodem lib. cap. 65. Verum hæc ad vulnera pertinent. Sed nunc de cordis palpitatio agamus, prætermittis iis vitiis, quibus, ut Aegineta refert, etiam cor afficitur, nempe ex phlegmone, erysipelate, cæteris vehementissimis distemperantiis, acutissimis febribus, de quib. in libris nostris obs. de febrib. egimus: cum multi ex animi mœrore, terrore & subita ingenti & insperata lætitia animo defecerint, & extincti fuerint. ideo vtile est ex quibusdam notis qualitates cordis prius dignoscere; de quibus Gal. in primis consulti in libello, qui titulo Artis paræ circumfertur, & de calidi, frigidi, humidi & siccis cordis signis; quæ ad longum etiam à Ben. Alex. Veronensis lib. 10. c. 3. referuntur. Sed illud valde admirandum, quod Beniuenus refert de quodam Iacobo latrone, qui è patibulo, quo suspensus fuerat veluti iam mortuus, cum tamen adhuc viueret, depositus atque curatus conuulsi. Verum ut erat homo ingenio malo prauoque, ad eadem statim scelera reuolutus, quib. antea extremum promouerat supplicium, iterum caput atque suspenditur. Quare hominis admirati (inquit Beniuenus) nequitiam, mortui cadauer incedendum curauimus: & inuentum est cor eius ob extremam caliditatem vndique pilis refertum. Hoc idem inuentum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibetur integras acies pugnando in fugam vertisse. Est ergo non tantum scelesti ingenij signum sed quandoque etiam raræ fortitudinis. Ita & alius quidam Iacobus apud Amat. cent. 6. curat. 65. pilos in lingua genitos habebat, satis longos. Sed & Ferraræ idem vidit alium consecutum, cor pilis circumspectum habuisse, eumque insignè quoque latronem & grassatorem. Verum quod ad palpitatio cordis attinet, cuius iam causas fere omnes retulimus, hanc caliditatem Galen. à frigidis tantum causis euenire putat, & ac extenuantibus remediis, tum attenuante victu curabant. At Arabes, & iuniores medici quidam, etiam qui Galeni doctrinam profitentur, ex calida posse oriri contendunt. Vtrinque inter se digladiantur. Sic alij priorem partem defendunt ex frigore solo oriri; uti longo sermone videre licet apud Altimarum, & etiam Iacchinum, & alios non paucos. Alij & ab intemperie calida fieri contendunt, ut Rondeletius, qui & contra intemperiem calidam, si ab ipsa oriatur, diamarg. frig. & diatrag. frigidum præscribit. Holerius quoque ab utraque intemperie posse fieri, ut & omnes, qui Arabum decreta sequuntur, autumat. Medici quoque etiam illustiores quidam confundunt palpitatio-

aut humorem in se continente, qualem pustulæ, quas Græci hydatidas vocant, emittere solent. Facile autem cognoscitur ex ægri relatione: quæ præter namque cor ipsum præter pulsum palpitare sentiunt, quem proprium motum cordis appellamus: affectus, & insuper & medici ipsi manu adhibita supra thoracem, loco quo cor ipsum situm est, tum tangendo sentiunt, qui adeo grauis fuit in nostro vulnerato, ut etiam exaudiretur, ut dictum est. Adest quoque spiratio exigua & rara, & pulsus inæqualis, ex eo, quod cor affectum est per se vel per consensum, ut iam satis in obseru. præcedente declarauimus.

OBSERVATIO II.

De palpitatio cordis ex sanguinis multitudine.

Iuuenis quidam tempore veris, integra valetudine vtens (licet antea, ut ab astantibus intelligere potui, multis alimentis multum sanguinem gignentibus vltus esset, etiam copioso vino, & carne multa) cum subito in cordis palpitatio incidisset, atque ad eum acciti essemus, statim mihi in mentem venit illud Galeni dictum, libro 5. De loc. affect. capite 1. quod palpitatio cordis, pluribus integra valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio manifesto accidente euenire visa est, atque omnes eos sanguinis detractio inuit. Atque hoc accidente plane liberati sunt, qui post missionem sanguinis tenui victu, medicamentisque similibus vsi sunt: quos vero rursus huiusmodi accidens infestauit, eadem via curati sunt. Cæterum noui quendam (inquit idem Galen. eodem loco) quotannis, verno tempore huiusmodi palpitatiois accidente vexatum: qui cum per tres annos à sanguinis detractioe se adiutum intelligeret, anno quarto, antea quam accidens ipsum inuaderet, sanguinem misit: idque pluribus deinceps annis faciendo, illa quæ post sanguinis missionem facere oportuit, diligenter obseruauit. At nihilominus hic quoque ante senectutem morte præuentus est: sicuti & reliqui omnes, quorum alij quidem per acutas febres, alij vero cum sani degerent, astatim syncope intercepti, interierunt: quamuis vnus vel duo, citra syncopam, alia quadam mortis specie perierint. At vero si affectorum magna pars, ætatem agebat quinquaginta quidem annis inferiorem, sed quæ quadraginta annos excederet. Hæc Galen. cuius verba diligenter animaduertens, statim in iuvene carnoso, (virtute ætate, seu alio quopiam non inibente) venam internam dextri cubiti secari iussi, cum totius corporis plenitudo adesset, quæ si non adfuisset, in sinistro misissem: & quia hic sanguis in bene valente satis multus esset & crassus, sua copia obstructionem faciens coarctatorem, victu attenuantem & medicamenta deinceps attenuantia & cordialia præscripsi, & mandauit ut in aëre mediocriter calido & sicco degeret, grauisque odoris experte, quinimo ut suauiter oleret arte id pararet. Omnia odorata cordi familiaria sunt. Somnum vero moderatum amisit, & iubens tamen ut vigilias immodicas vitaret, & maxime immodicos animi affectus, præcipue mœstitiæ & metum atque etiam lætitiæ immodicam, motuque vehementiorem & Venerem præcipue: & si leui exercitio uti vellet, illud quidem temperatum concessi; & ut alium leuem seruaret arte vel clysteribus aut balanis, & ut cibos eligeret immodicæ humiditatis ac flatu expertes, sed boni nutrimenti faciliq; concoctionis vt sunt

carnes pullorum gallinaceorum, starnarum, gallinarum, phasianorum, perdicum, merularum, turdorum, cuniculorum parvorum, ac aliarum avium parvarum montanarum, vitulorum, leporum; eisque vteretur præcepti modo assis, modo elixis, hyslopo, serpillio, fatureia, & præcipue melissa, borag, bugloss, pimpinella, & similibus adiectis, & in carniū iure caryophyllis vel macere aut cinnamomo & exiguo crocino iectis, quæ cor refocillant: & ad recreandum vires vino exiguo vteretur tenui & dulci mediæ ætatis, cum aqua boraginis, melissæ diluto, vel subinde iniectis floribus boraginis, buglossæ, vel ipsa pimpinella, si virides haberi possint. Deinde exhibui syr. de pomis, de epithymo, de corticibus citri ex infus. ros. cum decocto melissæ. Leniente medicamento deinde vtebar, sumendo ʒi. b. vel ij. syr. infus. ros. pallid. cum solis senæ cum ʒij. aquæ melissæ. A purgationibus fortib. oportet abstinere. Adhibui quoque medicamenta attenuatoria, vt diambram, diamol. dulc. & amar. subinde & diacymamomum. Postremo etiam theriacam dedi ad ʒi. b. superbibendo parum aquæ melissæ. Exterius etiam epithema hoc vel simile cordi apponebam: ʒl. aquæ melissæ, florum citrangelorum, modo habere possit, vel eius locū aqua borag. an. ʒb. aquæ ros. ʒij. maceis, caryoph. cymamomi, ligni aloes, corticis citri an. ʒb. seminis ocymij ʒj. croci gran. v. vini odoriferi ʒij. ambre, mosci an. gran. iij. (modo non sit mulier uterino malo laborans, tali etiam utimur maxime in viris) fiat epithema cordiale. Quibus remediis vel his similibus non solum hic iuuenis, sed alij multi conualuerunt.

SCHOLIA.

Signa demonstratiua palpitacionis per se nota sunt: at causarum & specierum quibusdam notis indigent, ita hic à sanguinis quidem copia, crassioris scilicet, non adeo calidi (alioqui febrem intulisset) hoc malum originem habebat, eratque similis casus à Galeno iam descriptus. Vbi enim sanguis valde calidus est, æger maiorem æstum sentit, respirationem vitiatā ac magnam & velocem. Sed hic erat potius crassus, vt pote sapius eueniens & in sanis, non præcipiti periculo, ita vt curam suscipere possit: nam altera, quæ fit ex sanguine admodum calido, periculosa est. At præter hæc, quod à sanguine obstruente continget, monstrabat anni tempus (quemadmodum & apud Galenum, eo quod vere euenit, cum funduntur humores, & per corpus mouentur. Sed & copiam animaduertimus in venis, quæ potius crudiores sanguinem significabat, etiam ex ætate, temperamento, victus ratione, colore corporis, symptomatis somni, inappetentiæ, & aliorum, de quibus in lib. De plenitudine agitur. Si vero à melancholia, vel ab humore melancholico, aderunt & symptomata melancholica, tristitia, sollicitudo, metus & alia, quæ de melancholia diximus. A frigore vero & humorib. frigidis & pituitosis, causæ præcellerunt, quæ calorem innatum extinguere solent, vt aer frigidus, & alia, quæ etiam per accidens calorem innatum extinguunt, vt euacuationes excedentes, cibi frigidi: aderunt & pulsus tardi, rari, prauī, & anhelitus similis etiam extra paroxysmum; frigoris sensatio, & alia signa addunt, quæ frigidus, crudus, pituitosusque humores abundare notant. Qui autem etiam à bile fieri volunt, causæ præcedentes exsiccantes calfacientesque & ægitudines biliosæ id demonstrabunt, pulsus, anhelitus magni, ve-

Signa à copia sanguinis crassioris vel calidi.

Signa ab humore melancholico.

Signa frigoris & pituitosis humoris.

locos, frequentes & duri, inflammatio, sitis, & reliqua, vt anni tempus, habitudo biliosa, æstus, qui & fame sitique & exercitio lædantur, vt pituitosi ab iisdē iuuantur. Aliquando ex aquositate in pericardio contingit: neque enim mirum videri debet, tantam humoris multitudinem cumulari aliquando (vt Galenus dicebat lib. 5. De locis affect. c. 1.) in ambiente cor tunica, vt ipsum ne attollatur, impedire possit. Quippe in animalibus affectis vidimus plerumque plurimum humoris, vtinā speciem referentis, in eo, qui ipsum inuoluit, panniculo contineri. Etenim simia quædam, quum emaciari indies videretur, eam tamen necessariis nostris negotiis impedit, secare in tempore non potuimus, post mortem vero, reliquis corporis partib. omnib. illæsis, inuentus est in ambiente cor tunica tumor præternaturam, humorem in se continens, qualem pustulæ, quas Græci hydatydas vocant, emittere solent. Atque in gallo quoque vidimus cordis tunicam, huiusmodi tumore, & quidem duro, affectam, perinde ac si plures crassæ membranæ inuolutæ altera alteri fuissent: verum in eo nihil humoris continebatur. Vnde verisimilis coniectura elicitur, homines etiam similibus posse affectib. infestari. Quod autem de simia dixit Galenus, id quoque de aliis aquositate habentibus in pericardio intelligi potest, nempe hominibus, quoniam & sine manifesta causa emaciantur & tabidi fiunt. Sed cur id eueniat, Galen. non dicit. At causa emaciationis est, quoniam succedit hectica febris: nam ex cordis angustia febricula fixa necessario oritur: nam supercalchieri est necessarium, si non libere attrahit aërem. Alij & hoc signum addunt ex ægrotorum relatione, quod ipsis videatur quasi cor aquæ innatet, & inde comprimitur, & deterius pulset. Gignitur vero & accenditur auctis causis naturalibus, vt scilicet densa admodum tunica sit, multaque humiditas circa viscus, vt in mulier. plus aggregari accidit, & animalibus humidis, sicut patet ex dissectione. Si vero consumitur humiditas exsistens in capsula cordis seu pericardio, corpus exsiccatur, vt Arculanus vult, & æstus indies absque febre; ubi enim fit à caliditate superflua, id per inflammationem in corde perceptam notatur, modo non fuerit fixa: si autem fixa per inflammationem sanatam ante fixationem, pulsus anhelitus sunt magni, veloces, frequentes etiam extra paroxysmum, ac causæ præcellerunt calfacientes, vt febris, motus fortis & similia. A flatu vero fieri indicant repentina accessio, asthma, motus tremulus in genis aut palpitatio in genis oculorum, vel in aliqua parte, aut dolores repentini, qui statim cessant sponte sua: oculi etiam quodammodo obtenebrantur, sonitus aut sibilus aurium his solet accidere: excitatur n. leuissima corporis motione, & tandem asthmatici fiunt. Si ab obstructione, per diuersitatem pulsus magni, parui, tardi, velocis dignoscitur. Ita & à debilitate non facit pulsus fortem, estque cum priuatione signorum repletionis. Si ex malo situ aut compressione, cor suffocari & constingi videbitur: ita & solutio continui per proprias causas noscitur, vel apostema, te præcedente vel abscessu aut vulnere, quod & in dissectione immediate demonstrabit. Si per communitatem totius, vt in febribus, id febres indicabunt: nam iis decrecentibus discedet. Si per consensum aliorum membrorum, vt à ventriculo fiat, id nausea, bilis vomitus, & similia facile aperient, & circa stomachum dolor. Ita & de aliis membris censendum. Et si à crisi, signa critica

critica aderant. A verbibus, punctiones id quoque indicabunt. At signa, quæ præstigiunt futuram palpitacionem, habentur ex causis concurrentibus, & malum cordi imprimentibus, atque cordis temperamenti excessu, & aliis causis disponentibus. Prognostica quoque nunc fere patent ex prædictis in obseru. præcedente: nam licet quidam videantur ab hoc symptomate liberati per venæ sectionem, victumque extenuantem, à medicamentorum ope, nihilominus permulti (vt ex Gal. ostendimus) post annum vel plures menses eodem malo rursus correpti, aut senectutem morte præenti sunt: alij per acutas febres, alij sani degentes, syncope correpti & extincti sunt; periculum enim repentinæ mortis impendit, si diutius superflueque affligat, crebroque repetat. Hoc malum quoque familiare est syncope correptis: quam ægitudinem & antecedere, & in quæ etiam mutari solet. Et iis quoque, quibus lien tumidum est atro sacculentoque sanguine, & qui hypochondriaca melancholia laborant, meticolosi mœstique quoque hoc malo familiariter perituri solent. Et licet adolescentibus tum adulescentibus euenire possit, magis tamen accidit iis, qui ætatem agunt quinquaginta quidem annis inferiori, sed quæ 40. annos excedat. Si quoque in pericardio multam generet materiam, vel humiditatem consumat, vel apostema adfit, subitas mortes infert. Ad ea, quæ ex flatu vel vaporibus fit, aut per consensum, minus periculosa est: sed quævis confirmata periculo non vacat, & quouis modo fiat, circa initia curatio non est negligenda: nam aucta vel perdurans in syncopen (vt diximus) permutatur. Sed hæc, quæ de signis diximus, clariora exemplis sequentibus euadent.

OBSERVATIO III.

De palpitacione cordis à frigore & materia pituitosa.

Diximus frequentius à causa frigida & pituitosa, iuxta Galenum, palpitacionem fieri, vt ex eiusdem curatione liquet, cum medicamenta potius attenuantia & dissecantia quam frigida præscribat: ita istis dieb. mulier valde pallida, si aliquo frigore tentaretur, in palpitacione cordis incidebat: caputque huic graue erat, frigeat, crudisque humoribus frigidis abundabat, eratque hyems valde pluuiosa & nebulosa, cum ad illam accitus essem, & cordis palpitacione afflictebatur, quæ & antea quoque correpta fuerat, vt ipsamet narrabat, præcipue si frigore aliquo modo obrueretur. Pulsus huic valde tardus erat: cui & hoc epithema statim præscripsi: ʒl. aquæ bugloss, melissæ an. ʒb. vni maluatici ʒij. pul. specier. electuarij de gemmis, caryophyll. an. ʒi. b. pul. diambræ. (cum fateretur morbo uterino nunquam se obnoxiam fuisse) ʒij. b. sem. citri, beben albi & rubri, ossis de corde cerui an. ʒj. croci ʒb. fiat epithema: quod calide cordi cum panno rubro scarlato applicabatur. Cum parum frigeret, habebam etiam tum manus, tum pedes panno calido calfaci: quo paroxysmus ad tempus cessauit. Verum, ne rediret, materiam pituitosam, adiectis etiam cordialibus, hoc modo vel simili digerendam esse, proposui: ʒl. syr. de bugloss, mellis ros. colati, syr. de byzantijs an. ʒj. aquæ melissæ betonica, hyslopi an. ʒij. misce fiat syr. p. ij. desibus, utatur cum syr. ʒij. pro vice elect. diamofci, dulc. in tabulis. Sympum adhuc semel cepit, deinde illam purgavi hoc modo: ʒl. syr. Per. Forest. Tom. 2.

ex infus. ros. pallid. cum solis senæ ʒi. b. diaphanici ʒj. aquæ melissæ, borag. & vorisinarini ana ʒj. misce, fiat portio: quibus optime aluum deposuit: postea dedi theriacæ optima ʒij. conserva florum borag. ʒij. capiebat posttridie mane sex horis ante pastum, & melius habere cepit: quamuis post mensem iterum eo malo apprehenderetur, sed non ita fortiter. Iussi vt singulis mensibus caperet has pilulas: ʒl. pilul. de hiera simplici, pilul. alepbang, agarici trochiscati an. ʒj. cum syr. conserva, citri, siant pilule vij. mane sumende. Interea quoque præcepi, vt ex hoc condito omni mane lumeret: ʒl. corticis citri ʒss. conditi, conserva, summatu melissæ, conserva borag. an. ʒj. conserva, flor. anthos ʒb. spec. laticif. tis Gal. pul. diambræ, diamofci dul. an. ʒj. seminis citri, ossis de corde cerui an. ʒj. myrobal. vnum emblicum conditum, fragment. omnium lapid. pretios. ʒj. cum syr. conserva, corticis citri q. s. fiat electuarium moderate liquidum. De quo sumebat mane & vespere tribus horis ante pastum, ad magnitudinem parvæ castaneæ: quo deglutito, vt parum vini maluatici minime diluti biberet, consului. Interea etiam si vellet, & si magis delectaretur solido electuario, vt modo hoc, modo præcedente vteretur, mandavi: ʒl. specier. elect. de gemmis, specier. laticif. Gal. diambræ an. ʒj. dissolut. in aqua melissæ, adiect. zacchar. albiss. ʒij. singaturque electuarium solidum in tessellarum figuram; singule singulæ ponderis ʒij. & sumatur vna mane, altera vespere, duabus aut tribus horis ante pastum; mox cochlear vnum vini maluatici superdeglutiebatur. Quibus hæc optime se habuit: interim ei præcepi, vt optimo victu attenuante (de quo superius dictum est) vteretur, ne recidivam incurreret.

SCHOLIA.

Hic autem mulieri, cum in hyemē essemus, venam non secuius. Attamen instante vere, cum morbo hic magnus esset, venæ sectio, vt fieret, imperauimus, saltem ratione partis affectæ, etsi intemperatum ad frigidum in hoc affectu sit cor, tamen quia princeps viscus est, & cum ipsa venæ sectio secundum Galen. saltem reuulsionis gratia conferat, prohibens ne ad ipsum excrementa confluat, tum quod imbecillum sit, tum etiam, ne propter hunc præter naturam palpitacionis motum excrementa quoque trahat, ideo vt fieret venæ sectio iussimus, ex sinistri cubiti vena lienari dicta, eo quod plenitudo totius corporis non adesset: interea tamen iubebam (vt etiam aliquando in principio facere consueuimus) ne multa sanguinis copia per venæ sectionem vacuaretur; cum & alias, si opus fuerit, potius iterandum esse ducimus: nam quanto maiorem in numerum particulas auxeris detractiones, tanto reuulsionem efficaciorē effeceris, vt à Galeno decretum est lib. De curat. per venæ sectionem. At in valde debilibus, frigidis & exanguibus, vt valde senibus, à venæ sectione aliquando abstinuimus. Ita frater meus carissimus, Nannius Forestus, septimi Senatus Consiliarius, cum anno 1589 palpitacione cordis in hyeme afficeretur, iisdem fere remediis supradictis sine venæ sectione, cum annum 62. superauerat, vt mulier præcedens, curatus fuit; vir exanguis, debilis & melancholicus, ita vt à venæ sectione, cum facile in syncopen incideret, eo tempore abstinuerimus. Sed huic mulieri tantum semel, instante vere, vt sanguinem, non tamen multum, detraheret, consului. Facile enim tales deficiunt.

X iij si

6
Si pituitosus
redundans
humor, quo-
modo in pre-
parandis
et deinde
purgandis
sit.

si plus æquo detrahatur: imo & pituitosus & melancholicus vidimus, si eis tres aut quatuor vaciæ auferebantur, præsertim si paulo debiliores essent, animo deficere. Sic cum Mansardo nobili melancholico (de quo in r. obs. huius libri mentio facta est) in vere palpitacione cordis sæpius obnoxio vix parum sanguinis detrahere-
tur, illico animo deficiebat, ut statim vena oc-
clusa in palpitacionem cordis & syncopen satis
frigida incurreret; à qua frictionib. & aqua in
faciem conspersa, magna cum difficultate ad se
redierit, etiam vertiginosus. In quibus tum pal-
pitantibus, maxima huius ratio habenda est, ut
pulsus tangendo, si is minuatur (ut nos hic fe-
cimus) venam occludi iubeamus. Si itaque cum
frigida intemperie, frigidorum quoque humo-
rum sit abundantia, antequam ad valde atten-
nuantia medicamenta perueniamus, à venæ se-
ctione, ea quæ iam dictos succos concoquendi
preparandique vim habent, tribuenda sunt; &
deinde purgandum: & sic in pituitoso conueniet
mel. ros. oxymel. simpl. compositum, aut scilliman, cum
syr. de cort. citri. aut de hyssopo, & decoctio sampluci pu-
legij, origani, melissæ, additis syr. cordialibus, de bu-
gloss. de borag. capill. ven. & similibus: deinde pur-
gandi cum myobal. embil. vel infus. agarici, aliquo car-
diali addito; & abstinendo à colocymbide, quia cor læ-
dit; aut hoc modo: R. agarici trochisc. in vino albo
infusi 3j. exprimatur fortiter, & cum decoct. pass. &
flor. cord. in aqua borag. decoct. fiat potio; addendo man-
ne 3j. vel 3i. & si non sufficit, adde decoctioni
summitatum thymi & seminis carthami contusi
an. 3b. A purgatione vero, ut usus postulat, me-
dicamentis calfacientibus & attenuantibus, ut
xylo aloë, diacalamentho, dianiso, tum aliis su-
pradictis, vtitor. Etiam electuaria vel opiata ex
diamar. calid. degemmis & de hyacintho, con-
fect. alkermes, conseru. rad. bugloss. borag. &
florum roris. bugloss. & helenij, conueniunt: quæ
etiam valent in humore melancholico. De quo
postea etiam exemplum dabimus.

OBSERVATIO IV.

De palpitacione cordis à materia calida biliosa.

Palpitacionem quoque fieri à materia calida & biliosa, non solum Rondeletius & Holerius admittunt; verum & Fernelius, & multi alij, de eadem exempla posuere: nos autem vnum tantum adiciemus. Iuuenis quidam biliosus, cum circa caniculam lusu pile incalesset, in syncopen quasi incidit cum cordis palpitacione, qua & pos-
tea ex leui incandescencia aut animi motu vehe-
mentiore corripiebatur. Hic autem consultandi
causa me accessit: erat admodum rara constitu-
tionis, qui ægre sanguinis detractionem fere-
bat: nam cum illi vena aliquando secta esset,
animo deficiebat; quare sanguinem detrahere
nolui. Nam recte Rondeletius dixisse arbitror.
Sunt qui (inquit) in omni palpitacione laudant
missionem sanguinis: qui laudandi non sunt, si
fiat iis, quibus non competat phlebotomia, sed
tantum euacuatio. Cum igitur à bilis copia hu-
ius mali origo fieret, consultus mihi videbatur,
primo syrups uti, & refrigerantibus & alteran-
tibus; deinde leuibus medicamentis; cum cor
fortia laxantia non sustineat. Quare ut hunc sy-
rupum vel similem per triduum biberet, manda-
ui: R. syr. de succo acetosæ de acetos. citri, de ribes ana
3i. & aqua cichorij, borag. bugloss. an. 3iv. misce. & ie-
iunare per triduum in diluente bibat. Postea hoc infuso

rhobar. illum leuiter purgaui: R. rhob. selecti 3i
b. spica 3b. infunde per noctem facta prius leui elul.
in aqua cichorij 3v. mane huius fortiss. express. accipe
3iij. addendo syr. ex infus. ros. pallid. 3j. pulpa tha-
marind. cum aqua borag. extracta 3ij. misce, fiat potio,
detur in diluculo; qua satis bene excreuit. Va-
cuato corpore consului, ut quotidie matutinis
horis vteretur electuari. sequenti iij. horis ante
pastum, ad paræ castaneæ magnitudinem: R.
conserua ros. vnus anni, conserua viol. conserua rad. bu-
gloss. an. 3b. conserua summitatum melissæ 3ij. pul.
specier. diuod. abb. trioniani. diamarg. frig. an. 3ij. of-
fis de corde cerni. sem. citri ana 3j. diamarg. frig. lapid.
pretios. commun. ana 3i. coralli rub. 3b. cum syr.
rup. de acetos. citri; fiat elect. molle. Sed & hoc epi-
thema vel huius æmulum similiter præscripsi: R.
aque ros. 3b. aqua borag. bugloss. ana 3ij. aqua me-
lissæ 3iij. coralli versutque omnium sanal. specier. dia-
marg. frig. an. 3j. capbura 3ij. croci 3b. aceti vini
optimi exiguum; fiat epithema cordi mane & vel-
peri ante pastum tepide admoendum. Consului
quoque, ut sacculum pyramidalis figura de serico
panno raro, cui & pulueres sequentes infunderetur,
cordi apponeret: R. florum ros. rub. exsiccat. florum
bugloss. borag. etiam siccorum flor. viol. siccorum ana 3j.
folior. melissæ exsiccat. 3b. omnium sanal. ana 3i. &
coral. rub. ofis de corde cerni pul. ana 3b. beben albi &
rub. ana 3j. misce, & fiat pul. qui sacculo, ut dictum
est, infundatur. Irrigetur cum aqua ros. & buglossæ, &
regioni cordis applicetur. Talia, ut etiam epi-
themata in materia frigida obseruatione præce-
dente descripta, aliquando adhiberi possunt, vr-
gente palpitacione cordis, extrinsecus, corpore
etiam nondum vacuato.

SCHOLIA.

Materia, quæ cordi conueniant, præcipue in
palpitacione & in syncope, alia frigida
sunt calida cause conuenientes; alia calida in
frigida, quæ & medicamenta cordialia appellan-
tur. Ex frigidis vero, viola, nymphaea, rosa, sam-
ali, capbura, acetum, emphacium, berberis, cerasa, prima
acidula, acetosa, succus malorum granatorum, citri, li-
monum, citræulorum, pomorum odoriferorum, persica,
carabe, coriand. præpara. cydonia, pyra, lac acetosum.
diuod. abb. sine specieb. diamarg. frig. trioniani. con-
dita ex his, conserua & syr. Ambigua, aurum, argen-
tum, margarita, coralli, os de corde cerni, unicornis, frag-
menta hyacinthi, smaragd. blata, byzantia, spodiuni,
doricum, melissa, borag. buglossa. Sed horum quæ-
dam ad calida referri possunt, Hollerio teste. Ex
his trochisci comparantur, sunt epithemata, po-
ma odorifera, stragula & vestes suauis odore im-
buuntur, potionisque & elect. solida, quæ &
palpitacioni & cordi conueniunt. At calida, in
ambra, storax, calamintha, muscus, lignum aloe, ca-
ryoph. cynam. cortex citri, & citræulorum croci,
nux muscata, macis, sem. maior. basilici, vinum aromat.
odoriferum, emula, feniculum, petrosel. galanga, zedo-
ria, amomum, cardomomum, cubeba, rosarum, menba,
polium, calendula, theriaca, miltiridatum, elect. laci-
fic. Gal. & Rhaf. diambra, diamarg. calidum, diuod.
cum specieb. alipra mofcra, gallia mofcra, pliris sa-
coticon, capus, perdis & volatilia. Similes vero cor-
diales medicinae descriptæ sunt ab Auicenna, cu-
ius catalogus recensentur ab Arculano; & harum
rationes adduntur, & qua ratione ita dicantur,
vel quod sint temperata aliquæ eis iis, vel quod
confortent virtutem secundam, ut stipicitate vel
odore, ut rosa & muscus; & à proprietate oc-
cultæ, adiuta à qualitate manifesta, ut spica, cro-
cus,

cus, per aromaticitatem (ut medici loquuntur)
& caliditatem, & temperamentum & stipicitate-
tem, vel per proprietatem occultam adiuta ut
hyacinthus, & similes. Veræque cordiales sunt
temperata medicinae, alia theriaca vel be-
zoartica dictæ. De quibus ad longum videas Ar-
culanum supra Rhaf. cap. 73. De passionibus cordis.

OBSERVATIO V.

De monacho melancholico sepe ex inani metu palpitacionem cordis incurrere.

Monachus quidam ex ordine Carthusiano-
rum, & is, quem Procuratorem vocabant,
natura melancholicus, & etiam ordinis ratione
(cum & solitarij fere omnes tales melancholici
euant) ex inani metu subinde palpitacionem
incurrerebat. Hic enim cum tempore pestis pere-
gre proficisceretur, domum forte ex improviso
accedens, in qua nonnulli peste extincti essent,
adeo horrore corripiebatur, ut statim accederet,
seque ex metu peste infectum conquerebatur,
qua tamen minime laborabat; & ut hanc imagi-
nationem quamvis falsam ab eo depellerem; re-
media quadam apta, tum euacuationem leuem
per pharimaca ad præcautionem facientia præ-
scripsi: quibus licet bene habere coepit; inanis
tamen ille metus per multa tempora, etiam men-
ses illi adhæsit, ut si solummodo de peste cogita-
ret, melancholia etiam laborans, statim horrore
concutiebatur, & palpitacionem cordis etiam
grauem postea incurrerebat, & tandem totus me-
lancholicus euasit, si vel stramina præ foribus
aeri exposita ad euacuationem cerneret, ali-
quem ibi mortuum esse ex peste sibi persuadebat,
& imaginabatur, neque ædes transire audebat; &
nunquam à longe tantum stramina per plateam
dispersa videret, quin mox palpitacione cordis
corriperebatur. Cum itaque succus melancholicus
huius palpitacionis causa esset, ut humor conco-
queretur, pro huius mali curatione præscripsi syr.
sequentes: R. syr. de pomis, de corticibus citri, de
suo borag. an. 3i. & decoctionis melissæ, borag. lapul-
rum 3ix. misce. pro iij. dosibus matutinis. Cocto hu-
more preparato purgaui cum decocto senæ
& syr. de epithymo. Postea etiam sanguinem
in moderata quantitate, cum in Aprili hoc sym-
promate afficeretur, & in vere essemus; extraxi-
mus ex vena basilica cubiti sinistri: & postea ea-
dem adhibuimus remedia, quæ ad melancholiam
hypochondriacam valere scripsimus. Eodem mo-
do & curationem institui in nobili quodam
iuuene Mansardo, diu melancholico & palpi-
tacione cordis affecto, de quo prius diximus. Post
syr. exhibitos ex succo borag. bugloss. de pomis,
de epithymo, & betonica cum decoct. melissæ,
cardui benedicti, borag. bugloss. & summitatum
lupul. eundem purgaui hoc modo: R. syr. ex
infus. ros. pallid. cum foliis senæ 3i. aqua melissæ
3ij. b. elect. lenitini 3ij. misce: reiterauius sape
syrup. supradictos, & è corticibus citri, cum de-
coctis cordialibus; & iterum illum purgaui
in hunc vel similem modum: R. syr. ex infus. ros.
pallid. cum foliis senæ 3j. confectiois hamech. 3ij.
aqua melissæ 3ij. misce. qua portione quinque vel
sexies alium deiecit. Dedimus condita ex conser.
borag. buglossæ, melissæ, betonica adiectis diamarg. ex-
lid. diambra, diamofci, cum syr. de limonibus, & co-
ricibus citri: & ad sacculos cord. & elect. ad solida
superius dicta commodè deuenimus: quibus
subinde palpitacio cordis cessabat, licet sapius

SCHOLIA.

Si autem palpitatio cordis fiat ab humore me-
lancholico, eodem fere modo curatur, ut me-
lancholia hypochondriaca, adiectis semper iis
cordialibus tum attenuantibus, quæ etiam ad pi-
tuitam valere diximus, interim humorem me-
lancholicum prius concoquendo & expurgando.
Si fiat à flatibus cuius signa antea posuimus, pri-
ma ventriculi concoctio perfecta procurari de-
bet, & status qui in ventriculo & intestinis sunt
collecti, discutendi: idque duabus intentionib.
perficietur, & materiam illam pituitosam ex-
purgando, & aqueam, ex qua status gignuntur,
pilulis aromaticis, de hiera & syr. materiam
concoquantibus cum syr. dictis in decoctis, ad-
ciendo aliquid anisi: & rursus euacuando cum
pilulis fortioribus, ut sine quibus, vel aggrega-
tiuis. In crastinum danda theriaca antiqua vel
confect. arom. ros. ut causa illa efficiens corriga-
tur, nempe calor diminutus. Huc referenda om-
nia illa remedia, quæ dicuntur capite, De infla-
tione ventriculi. Si sit ex melancholia flatuosa,
etiam illa adhibenda, quæ de hypochondriaca
melancholia diximus, additis semper status dis-
cutientibus in maiori quantitate: & si fiat ab
obstructione, addenda deobstruentia. Fere ea-
dem ratio erit curandi hunc affectum ab obstru-
ctione, cum illo qui fit à pituita: sed istis deco-
ctionibus addenda erunt, anisi, feniculi & alia
status discutiencia, ut galanga, garyoph. macis.
Nam magna ex parte morbus hic ex generantibus
status accidit, illis hominibus qui patiuntur
obstructiones hepatis & lienis, ut licet videre in
puellis patientibus cachexiam, ut antea memini-
mus, & male coloratis. Detur etiam theriaca, cum
aqua buglossæ & melissæ. Post purgationem con-
ueniunt & electuaria vel condita superius de-
scripta, & epithemata etiam in melancholicis,
& alia topica, ut olea, nempe coslinum, nardi-
num, quibus & pulueres addendi, vel ligni aloës,
cinnamomi, maceris, croci momentum, & ceræ,
ut in vnguentum coeant, pauco addito vino odo-
rifero. Quibus regio cordis iungenda statim
post epithemata; eodem modo & sacculi supra-
dicti ex cordialibus compositi. Rodeletius opti-
mum medicamentum parat & alimentum ex
corde porci (in quo inditi sunt garyophylli) in
veru assato, vel super prunas prius cocto in aqua,
ut caro tenerior fiat, alioqui dura est, quia fibro-
sa: ut Recipe cordis porci n. ij. cordis cerni vel bonis,
nu. iij. garyoph. galanga maioris & minoris sem. basil.
conis ana. 3ij. macis 3ij. florum bugloss. borag. ana. 3ij. florum
anthon p. iij. temperentur in vino malatico rabilis ad
per noctem, & destillentur omnia in alembico. aqua
vsi seruetur. Recipe aqua prædicta 3iij. zacch. pa-
rum fiat inlebe. Aqua illa valet in omni passione
cordis, à materia frigida, flatuosa, vel à vapo-
ribus, & in melancholica passione: sed in mate-
ria non frigida adde aqua ros. partes æquales, &
vtator cum aqua buglossæ vel boraginis. Dosis
huius aquæ est 3b. superbibendo vini hypocrati-
ci 3ij. Sacculi ad fatus cordis, qui etiam ab eo-
dem magis laudantur quam emplastra vel epi-
themata,

themata, fiunt hoc modo: Recipe caryoph. ros. flor. anibos 3 ij. cortic. citri, sicci, macis, ligni aloes, sancti albi, & rubri & muscati, lini, seminis ocymi ana 3 j. spica celtica & laudunda foliorum lauriana 3 lb. contindantur, & fiat pulvis, & ex eo sacculus interfectus, ut artis est, pro corde paretur: irroretur cum vino albo, & aqua buglossae vel melissae; applicetur calfactus. Est & hoc optimum: Recipe florum cordial. anap. j. caryoph. maioris, id est, anaphylli 3 j. decoquantur leniter in aqua buglossae & melissae in lb. decoctionis, adde vini albi vel clari lb. iij. caryoph. 3 ij. cardam. 3 lb. sacch. q. s. fiat syrup. avomaisem cum 3 j. cinnamomi. Si à serosis humoribus autis fiat palpitatio, danda est opera, ut euacuentur, qui in venis continentur. Nam id, quod collectum est in pericardio, si nil amplius in illud refudat, è venis, calore cordis absumetur. Scrofi autem humores, iuxta eundem Rondeletium, euacuantur visu feri caprini, vel asini, vel succo ros. decocto, brassicae marinae, seminis carthami, foliis fenae, & aliis medicamentis capit. De hydropne & cachex. In hoc tantum differt, quod haec remedia sunt imbecilliora & magis cordialia, & ea, quae minus cordi aduersantur, vsurpantur: Recipe rad. graminis, vnsi, asparagi an. 3 ij. rubiae maioris 3 ij. galan. & cypri an. 3 lb. berb. capill. fumar. cicb. end. an. m. j. sem. anisi, apij, petros. an. 3 iij. medulla sem. carthami, polypodij querc. fenae orient. an. 3 ij. cicurum rub. p. j. sem. bederæ, rad. nidis an. 3 j. fol. brassicae marinae m. j. flor. anibos, bugl. an. p. j. fiat decoctio in sero caprino ad lib. j. cui adde suc. ros. & syr. lax. an. 3 iij. sacch. solidi 3 vj. fiat sy. medica decoct. capiat 3 vj. pro dosi, alternis diebus vel quotidie, prout magis vel minus operabitur. Si paretur tempore calido, paretur sine sero, quia facile acefcit, & syrup. corrumpit. Prater illa remedia, describenda cap. de cachexia, sunt adhibendi sacculi supra pectus, qui vim habent siccandi. Recipe cort. citri, sancti al. omnium, galanga, cypri ana 3 ij. pul. de gemmis, & diamarg. frig. ana 3 j. caphuæ 3 j. lb. bombace excipiantur, & fiat sacculus muerbassatus, qui irroretur vino & aqua melissae. Idem etiam potest apponi, si à causa flatulenta fiat affectus, addendo tantum anisum vel cuminum, vel aliud flatum discutens. Opiata etiam cor magis respicere debent, quam quae in supracitatis capitibus describuntur: ut Recipe cort. citri conditi cum zacch. 3 lb. confer. anibos 3 j. confer. stechad. & florum cicbory an. 3 iij. confect. avomatici ros. 3 j. pul. diagalang. & diamarg. calidi, vel de gemmis an. 3 j. cum syrup. conseruationis corticis citri, fiat opiata. Hic aduertere oportet, quod neque conseruas violarum, neque buglos. vel borag. addimus, quia nimis humectant; & hic potius siccandum quam humectandum. Caphura in hoc morbo magnam vim habet, etiam in collo suspensa, à quacunque causa proueniat. Optima victus ratio in hoc morbo est maxime necessaria, quae magis exliccās sit. Rhases autem etiam, si ex aqua in pericardio fiat, sicci & calidis curat, sed non quibusuis, sed aromaticis, ut trochiscato muscato, quem in potu exhibet; & diamoschum pretiosum ad syncopen valens & ad tristitiam cordis & tremorē. Sed horum vsus vtilis quidem priusquam marasmus inuadat, nam tunc alia ratione hic affectus curandus. Refert Amatus pulcherrimam historiam cuiusdam monachae Florentinae, palpitatio cordis ab humore aquoso laborantis, & curatae, cui & assueti menses fluebant. Sanguinem detraxit ad libram semissem, & syr. propinauit ex succo melissae zacch. puri 3 j. syr. de pomis Saboris, de mentha an. 3 vj. decoct. fenae cum adalione pomorum

camusorum optime redolentium, ut Antuerpia innuuntur, vel eorum vice Apimorum in Italia reperiturum 3 v. cum albumine oui, clarificetur & 3 j. ligni aloes opt. aromatizetur. per aliquot dies continuauit. Viētus ratio huic erat exliccatoria, attenuatoria, sed optimi succi. Potus vinum meracius. Materiam per octo dies preparatam expurgauit phar-maco ex Rhod. & agar. concinnato: & si alium sponte non redderet, clystere vel balano soluebat: & post duos dies à purgatione cucurbitulam vnam magnam cum multa flamma ignitam regioni cordis affigi fecit, & cusi, post parua vulnuscicula incisa, sale respergit sub finem, ex quibus humor multus ad aliquot dies exsudauit: interim epithematis cordialibus saepe admotis in hunc modum descriptis: Recipe aquar. florum anantij, melissae an. lib. lb. Specier. diamosci, diambræ ana 3 ij. croci optimi grana iij. vini maluatici 3 ij. gallae muscatae Mes. 3 j. caryoph. corticem citri, an. 3 lb. florum anantiorum, pseudodiptami ana 3 j. omnia in olla noua, ut decet tractentur, & ad ignem admota, in iisdem pannus ruber de cocco vel charmusino infectus immergatur, & paululum expressus sic calidus cordi admoveatur, & saepe innouetur. Vsa est & conseruis ventriculi & cor corroborantibus: etiam hoc sacculo cordi admoto, quem semper defererebat: 24. Specier. diamosci dul. 3 ij. diambræ 3 j. florum anant. melissae 3 lb. an. m. j. xylorales 3 lb. cinnam. opt. & veri, caryoph. an. 3 iij. corticem citri 3 ij. omnia in puluerem redacta, sacculo infuantur, fiat sacculus serico interceptus. Quibus remediis hac intra mensem ex toto sanata est.

OBSERVATIO VI.

De palpitatio cordis ab vtero orta.

Mulier macilenta, procera, nigriuscula, attrabiliaria, quae Delphis in interstigio Portus Delphi habitabat, vteri suffocatione subinde detinebatur, cum magna cordis palpitatio. Empiricus puluerem (ut nos postea conspeximus) contra luem Gallicam ex argento viuo mixtum & cinabari, carbonibus ignitis inspergebat, fumigio facto ad nates. Quo malum ita auxit, ut etiam mulierculas medicastras in consilium adhiberet, quae & puluerem succini nigri (nostri suerie ameren vocant) propinarunt, ita ut circa ventriculum ita angeretur, ut se veneno intorcatam clamaret, palpitatio cordis plurimum aucta, vna cum vteri suffocatione, ut pro mortua ab astantibus haberetur. At tunc prius me vocarunt. Frictionibus partium infernarum per me statim adhibitis, & vinculis circa femora infectis, ad diuersionem globulum infra scriptum odorandum naribus obieci: Recipe assae foetide 3 ij. castorei pinguis 3 j. cum panno lino; fiat globulus, inferius quoque odoriferis subiectis, vmbilico emplastrum appolui. Recipe emplastrum contra matricem 3 lb. ducatur supra aliam rotundam, paulo ampliore daleto, & in euicuitu galbano obducatur. Quibus remediis ad se redire cepit. Sed & tunc pro palpitatio cordis, vsus sum iis, quae vapores dissipant; & licet aliquid aromaticitatis haberent, interim & amara essent, cum vterus vix aromata fera, si dulcia sint. Repurgato corpore & vtero cum pilulis mastichinis & de hiera, dedi decoctum florum chamomillae in cereuisia decoctum. Rustibus autem emissis plurimum iuuabatur. Exhibui quoque conseruam florum rorismarini, puluere zedoariae exiguo adiecto, postea etiam theriacalem

circiter 3 j. cum aqua melissae. Quibus bene se habuit. Rursum etiam purgavi cum infuso sequenti: Recipe folior. fenae 3 ij. lb. rhod. 3 lb. agarici trochif. 3 j. seminis anisi, feniculi, carui an. 3 lb. cinnamomi 3 j. infunde per noctem; facta prius leui bullitione in 3 v. decoct. communis, cum flor. cordialibus & mane fortissime expressioni adde syrup. de artemisia syrup. absinthij ana. 3 lb. misce & quinquies aluum depoluit, quia debilis & facilis solutionis optime tunc habuit, ut per multos dies malum non fuerit reuersum ita ut amplius illam non inuiderem. Postea vero, cum iterum sentiret cor palpitare ac tremere, mulier ignaua nec sui rationem habens, ex muliercularum consilio decoctum sceni putridi, granorum myrrillorum, & aliarum herbarum fortentium in vna valde olida, subitus vaporem excipiebat: unde iterum ad illam ingressus, blidam illum vaporem & fetidum sentiens, rogavi, quae circa illam acta essent: quae vix eloqui potuit, respondit se etiam diu rebus fortentibus sedentem in sella perforata, subitus vaporem illum excipere. Stultam autem mulierculam increpans, quae sibi necem ex insperato intulisset, ea omnia amoueri iubeo; rursumque praesidiis supradictis adhibitis, à paroxysmo ac vteri suffocatione tum cordis palpitatio libera est. Mox illam refecimus cordialibus medicamentis, & iterum cereuisia ebibita, in qua flores chamomillae incocti essent, ructibus emissis recte deinde habuit. Interim cum malum hoc ab vtero originem habuisset, & nunc in hyeme existeremus, consului, ut instanter vere vena maleoli pertusa sanguinem, moderate tamen, extraheret, ne idem malum incurreret.

SCHOLIA.

Si palpitatio cordis per consensum fiat, considerandum nunquid per communiatem totius fiat, ut in febribus, curatur tunc febrium curatio, & roboratio cordis, & resistendo matritiae intemperiei, impressa, vel à febre aut causis eiusdem, quae secundum plurimum est calida, & indiget frigidis cordialibus intra assumptis & extra admotis: licet aliquando sit frigida, sicuti in syncopali humore, cuius exemplum posuimus lib. 3. obseru. 29. De febre syncopali humore, de muliere syncopen & palpitatio cordis incurrente. Si autem fiat per crisi, eius finem attingere oportet; tamen cor tuendo secundum quod expediat. Curatio vero à membris particularibus, duabus intentionibus perficitur, habendo rationem membri communicantis; euacuando materiam, & diuertendo eandem vel vapores, & remouendo malam intemperiem in ipso membro existentem, vel alterius cuiuscunque nocuenti; roborando, ut sit minera laudabilium humorum. Secunda intentio debetur cordi, ipsum confortando, & resistendo nocumento impresso, & imprimendo in ipsum, secundum quod est expediens. Refert Rhases carnem accipitris à proprietate valere ad cordis palpitatioem, ex historia viri cuiusdam ex Syria. Si igitur à ventriculo, vtero, liene, vel hepate, aut aliis membris fuit, horum nocumenta prius curanda: & roborentur membra, ne transmittant, & ne cor recipiat. Sic de ventriculo, & aliis propriis locis dicitur: ita quoque (ut quidam volunt) si fiat à peste, àer alteretur, & curetur, ut de peste scriptum est. Et si à venenis assumptis, curetur educatione eiusdem per vomitum aut pharmacum, exhibeantur antidota propria & bezoartica, &

infistatur cordis roborationi. Si à vermibus, interficiantur sem. zedoariae, & educantur, ut cap. proprio De vermibus dicitur. Si ab aliis causis primitiuis, remoueantur, & cor roboretur. Si à rarefactione pororum & sudore diaphoretico, balneo, aut exercitio vehementi, fiant inunctiones refrigerantes, cordiales & modice astringentes, ut vng. ros. adiectis ros. santalis puluerisatis ad maiorem constrictionem, inuncta spina, dorso, pectore, pulsa, & hypochondriis. Cum cautione tamen, etiam zacch. rosaceo exhibito. A solutione continui vel cordis apostemate non curatur, nisi in principio inflammationis, cum sang. detractione, euacuatione, & diuersione. Si à dolore cordis, per remotionem causarum doloris curatur: ita si & à sensibilitate fiat, danda aromatica frigida, prohibendo omnes causas potentes laedere cor, & ipsum cor roborando, & iis, quae sensum remittunt. Sic etiam à debilitate remouendo causas debilitatis, & cor quoque roborando. Sic matrona nobilis de Loo, vxor Pensionarij Delfensis: cum diuturno fluxu menstruum laborasset, cordis tremorem passa est; sed restaurantibus medicamentis, & iure restaurante & cordialibus recreata & constringentibus; etiam cucurbitula sicca mammis apposita, iuxta Aphor. 50. lib. 5. ad tempus restringebantur: quamuis haec per annum eo malo laborans, viribus prostratis, hecticam tantum & marasum incurrens, frustra medicorum excellentium ope vtens, vitam finijt mense Octobri, anno 1562. Et contra si fiat ex vapore sanguinis corrupti, ut menstruum aut haemorrhoidum retentione, prouocentur, & vena ex talo incidatur. Domina de Merode, soror Dominae de Somerdyck, cum astaret forori morienti, ex tristitia me praesente in animi deliquium incidit, & vteri suffocationem, ac cordis palpitatioem, & vnius brachij tremorem; ut astantes, tum ipsa, apoplexiam metuerent: statim dedi exiguum theriacae optimae, cum oxymelite scyllino; & hunc puluerem cum cereuisia: Recipe rad. gentiana, seminis ostruij an. 3 j. semen. dauci 3 lb. misce: eoque assumpto, miraculi instar ad se rediit. Fuerat tamen antea iisdem symptomatibus obnoxia, ut referebat Domina de Cornes, vxor Domini de Asperen, quam Dominam de Asperen, alias cum praegnans esset, à dysenteria & vrinæ retentione curauimus. Frequenter etiam & haec praegnans, & alias cum grauida non foret, cordis palpitatioem vehementiori afficiebatur, ita ut in apoplexiam, vertiginem vel epilepsiam incidere metueret. Maritus cum apud Dominum Principem Auracum ageret, consultandi causa pro hoc malo me accessit. Conditum sequens per me descriptum vxori misit, quo omni mane utebatur ad magnitudinem castaneae; cuius vsu, ut postea idem ille Dominus de Asperen mihi retulit, ab illa palpitatio cordis in totum liberata fuit: 24. conseruae borag. buglossae, conseruae foliorum melissae, (nam haec vltima saepe ad cordis palpitatioem sola nobis sufficit) ana 3 j. corticem citri conditi 3 vij. myrrab. emblic. conditorum 3 iij. spec. latificantis Galeni 3 j. matus Christi cum perlis 3 lb. syrup. conseruationis corticis citri, syrup. de limonibus ana 3 ij. misce, fiat electuarium molle. Quod praegnantes aliquando palpitatioem cordis incurrant & syncopen, forte fit à vaporibus ex vtero delatis; cum eo tempore ob factum menses retineantur. Sic meminimus matrem meam carissimam, Margaretam Nanniam, ex familia Baierorum, cum praegnans esset, facile syncope tentatam fuisse, si modo al-

7
A serosis
humoribus
curatio.

8

9

Cens. 3. cur.
ra. 43. De
monacha
curata à
palpitatioe
cordis ab
humore a-
quoso in pe-
ricardio
conuenio.

6
A solutione
continui, &
apostemate.
A dolore
cordis.
A sensibili-
tate.

A debilitate.

7
Historia ali-
quos mulie-
rum nobilium
cordis pal-
pitatione ex
diuersis cau-
sis laboran-
tium curata.

8

A crisi.
Curatio se-
cundum consen-
sum aliorum
partium.

A peste, ve-
neno.
A vermibus
primitiuis.
A rarefactione
medullarum, &
sua diaphoretico,
balneo &
exercitio.

zui sederet: sed sale ori imposito ad feredibat, quo mulieres nostrae passim vtuntur, magno iuamento, forte ideo quod sal dissipat vapores tetros ex vtero eleuatos. Et ita omnem curationem palpitationis cordis absoluimus, iuxta veteres & neotericos medicos: quanquam aliqui, vt ante diximus, palpitationem non velint fieri ex causa calida, vt Altimarus quoque sentit, licet alij ex verbis Galeni, *Aph. 65. lib. 4.* velint ex maximo incendio vitalis facultatis, quae in corde consistit, palpitationem oriri posse; vbi Gal. ponderans verbum καρδιαγῶν ab Hippoc. positum, ipsum bifariam intelligi posse indicat; vno modo, vt idem significet, quod καρδιαγῶν: secundo modo, vt nonnullis visum est, motum quandam, cordis palpitationi similem per καρδιαγῶν intelligunt, hoc est, crebrum & velocem cordis motum, & praecipue similem palpitationi, de hoc quoque malo agit Paul. *lib. 3. c. 34.* Sed de forti cordis palpitatione vult Altimarus Paulum loqui; nihil aliud intelligens, quam crebrum & velocem cordis motum, similem palpitationi existentem, & non de vera palpitatione. Et sic idem, atque alij nonnulli, hunc morbum cardiacum, & cardiacam, & cardiogmon, ad oris ventriculi morbum referunt, de quo postea. Quamuis & hic morbus cardiacus etiam a doctissimis medicis confunditur cum cordis palpitatione; vt ab Alexandro Benedicto Veronensi fit, *qui lib. 10. cap. 5.* De cardiaco morbo modo refert ad palpitationem cordis, cum ita scribat: Cardiacus morbus, etsi sine dolore, tamen periculosissimus est; praeternaturalis est: supra modum enim cor palpitat, contremiscere exinde sentitur, tum diffilatur spiritus, ac in totum subducitur & paulo post asserit fieri ex causa calida modo frigida: vocatque cardiacam calidam, modo frigidam: quibus adiungit cardiacam diaphoreticam, quae in febrili sudore iungitur; de qua cum de febribus diximus. Vocat & aliam capit. sequenti cardiacam stomachicam ob vicinitatem oris stomachi euenientem: quam paulo ante ad Cardialgiam retulimus: de ea nos exemplum posuimus *lib. 7. De sympt. feb. obser. 12.* Nunc ad syncopen progrediamur, quae subinde palpitationem cordis sequitur, vel aliam ob causam fit: de qua licet longiore sermone egimus *lib. 7.* iam citato, de symptomatis febrium, & multa exempla ac varia in medium adduximus, & licet ea tyronibus medicis sufficere videantur, tamen pauca hic adferemus, ad maiorem huius mali enucleationem.

OBSERVATIO VII.

De syncope ab vtero orta, ventriculo etiam simul patiente.

Mulier admodum prolifica, ita vt 23. proles suae quinquagesimo, etiam menses non deficiebant, illis subito restrictis, post aliquot dies in stomachi dolorem incidit, valde nauasebunda, & praecordiis simul dolentibus subito syncopen passa est. Frictionibus & ligaturis partium infernarum, a paroxysmo levata, loqui coepit. Verum cum haec syncopis mox a cibo assumpto illam apprehendisset, & ad vomitum procliuus videretur, hordei decoctum tepide cum zaccharo & exiguo butyro adiuncto exhibui. Quo postquam plurima pituitosa vomisset, post horam vnam alius quoque per se soluta fuit, atque ab omni dolore subleuata. Quamquam inter auctores quidam questionem mouent, num in syncop-

pi vomitus competat, tandemque concludant competere quidem, his conditionibus, si aeger ad vomitum facilis sit, vel materia syncopen efficiens in motu sit, & nauasam & subuersionem (vt hic fiebat) incitet: quo & dolor ille circa ventriculum & praecordia cessauit; quamuis altero die, sed leuior, rediret absque syncope. At exhibita 3 j. pil. hierae simplicis Galeni, cum huic matronae alius facile moueretur, quinquies & pituitosa & pauca biliosa deposuit, ita vt dolor amplius non redierit: quamuis & huic postea semel menses fluxere; idque naturali modo. Ab eo tamen tempore defecere, nec amplius vili sunt, defectu naturae, illa ipsa deinde valida ad sana permanente.

SCHOLIA.

De syncope acturi, si omnia denuo excutere vellemus, quae de hac ipsa diximus in *lib. 7. De symptomatis febrium*, magis hic occurreret campus disputandi, quam in alio quocumque affectu. Primum propter causarum varietatem, quas in pauca capita non facile esset reducere; & tamen est necessarium, siquidem summa causa quaerenda est apud Aristotelem. Remota n. propria naturam rei non aperiunt, neque ab illis indicatio curandi sumitur, cum saepe recesserint, vt in ea, quae ex ira, vel aestu balnei fit. Praeterea neque exacte declararunt scriptores (teste Iacchino) quid per eam vocem intelligant, & qualis sit aegri status, & quo modo differant ea nomina *εκλυσις*, *ἀποθυμία*, *καρδιαγῶν*, *συνκοπή*. Nam si haec confundamus, magnam ambiguitatem faciunt, *εκλυσις*, Latini nominant Exsolutionem: non desunt qui velint neque ipsam *ἀποθυμία*, ab eo affectu quam Graeci *εκλυσις* nominant, Latini, Exsolutionem, dissentire, auctoritate quadam freti ipsius Galeni, *lib. 1. De arte curat. ad Glauconem*; etsi eo loco aliorum medicorum auctoritate loquatur: nam quod inter se discrepent, ab Hipp. decretum est *aph. 8. lib. 7.* cum dixit, *ὅτι φύματος ἵστα ῥήξας ἐκλυσις ἐμυσις* & *ἀποθυμία* *ζίνετα*. Similiter a Paulo *c. 34. lib. 3.* qui inter syncopes indicia cum exsolutionem, tum animi defectum connumeravit: *ἀποθυμία* vero nomen compositum est a verbo Graeco *λύω*, quod Latine sonat Linquo seu Deficio; & *θυμός*, Latine animus, Deliquium, seu Defectionem animi significat: qua ratione quidam putarunt aliud esse *καρδιαγῶν*, a *καρδιά*: cum *ἀποθυμία* animi defectum, *ἀποθυμία* autem non animi, sed animae defectionem significet: compositum etenim nomen est a verbo *λύω* & *ψυχή*, quae non animus, sed anima Latine dicitur. Verum quamuis nominum significata insipienti dissentire videantur, reperitur tamen Hippocratem interdum vno, quandoque altero vsum fuisse, volentem in re idem intelligere, vt patet *23. Aphorism. lib. 1. c. 8. lib. 7. quod Galenus primo, De arte curat. ad Glauconem c. 12. meth. meden.* Nam in primo praecitato loco, verbo Leptothymia ytitur, & *lib. 12. meth. ἀποθυμία*, idem per vtramque intelligens: ideo praedicta nomina haudquaquam dissentiant, sed inuicem confunduntur, ex Hippocrat. & Galeni sententia: nam eadem pars, quae afficitur in vtriusque, idem symptoma ac easdem dispositiones seu causas consequuntur; & ita quicquid de vno dicitur, de reliquo dictum putato. Nam nihil aliud per ea significare volumus, quam animi defectum; per animum intelligentes, animam ipsam animosam, quae ex Galeni decreto sedem in corde habet.

bet. Cum itaq; deficit animositas, tenor ac promptitudo haec animae, ex quacunque causa ortum habet *καρδιαγῶν* aut *καρδιαγῶν* appellatur. At quod Graecis *συνκοπή* nominatur, a verbo *συνκόπτω*, Latine Ferio, verbero, seu concido, deriuatum est, ita vt etiam animi concisionem, latine significare possit, licet Latini proprio nomine careant, etiam syncopen appellant, licet cum aliis dictis affectibus magna ex parte communicet, & quasi similis sit animi deliquio, ab eo tamen discrepat. Nam (vt Galen. inquit) defectus animi praecedere consuevit syncopen ipsam; vt patet eodem primo, *De arte curat. ad Glauconem c. 12. meth. meden.* inter lipopsychiam & syncopen differentiam tradit, cum maiorem causam syncopen requirat, quam lipopsychiam, etsi eadem possit vtriusque esse, tamen prout maior, aut minor existit, vnam vel alteram affectionem efficit. Idem refert Aëtius *lib. 5. cap. 96.* Nam animi deliquium (vt ipse inquit) derepente incidit, sensu & motu hominem priuans; & omnino non sudant: syncope vero & vigilantes & dormientes inuadit, & omnino cum sudoribus, qui *συνκοπή* appellari solent. Cum igitur ex eadem causa proueniant, & non alia ratione curentur, ideo etiam cum de syncope verba faciemus, quamuis maius sit malum, patebit quoque & defectus animi curatio. Syncope igitur nihil aliud est, quam praecipitium lapsus, & animalium, quoniam sensu & motu priuatur homo, cum syncope afficitur; ac primo omnium vitalium, cum & cor ipsum laeditur, vel per se, vel per consensum: nam pars affecta est ipsum cor; id, quod patet ex praecipiti omnium virium lapsu, ex imbecillitate paruitateque pulsus, ab extremorum frigiditate. Est autem symptoma pertinens ad actionem laesam omnium facultatum; omnium tamen primo vitalium, est enim syncope praecipitium virium lapsus; malumque morti finitimum, cum sit solutionis initium ipsius naturae: lipothymia autem praecedens syncopen, significat animi quidem defectionem, absque sudore tamen, frigiditatem tantum extremis corporis partibus; suntque tunc spiritus dissoluti, vel aliqua ratione vitali, facultate vitia non omnino dissoluta existente. At in syncope lapsus grauior est, quod etiam Galen. significauit per vocem *ἐξάντησις*. Nos enim multos vidimus, dum longo tempore (nam sunt iam 46. anni) praxim exercuimus, qui nihil a mortuis differre videbantur, quamuis postea reuiuiscunt: nam pulsus sunt modo insensiles, vel exigui, vt plurimum, languidi, inaequales, vt 4. *De caus. pul. 12.* saepe intermittentes, quod mortis aliquando signum existit: debilis quoque respiratio, aliquando & frigida. Vbi vero acutissima est, & morti proxima, motus deficiit, saepe & sensus, vel valde obtusus fit. Abit & omnis flos faciei, tum in figura vultus, tum in colore, quem statum describit Galen. *10. meth. in illo iuvene, quem scinerat syncopen incidere, qui prorsus sine pulsuerat: vix sentiebat impellentem: refrigeratus totus non loquebatur.* Sed vt rem melius complectamur, lapsus hic magis minusque suscipit. Quamuis enim quilibet subito fiat: at multa est differentia, maioris & minoris, quod experientia saepe visitur. Nam alij haec accidentia omnia habent; & inter hos, alij mitiora, alij vehementiora, alij quaedam horum tantum, quae symptomata a prioribus plurimum grauitate vincuntur. Igitur syncopen auctores grandem affectum esse significare voluerunt, terribilem, & qui mortis speciem multum referat: & ideo leuiore affectus vel dissolutiones, vel

animi deliquia dixere Graeci suis vocibus. Nam & gradu ab his differt syncope. Quod non aduertentes quidam, vt Auerrhoes, arbitrati sunt euacuatione Galenum ducere aegros ad syncopen: quod nunquam dixit ipse vel Hippocrates: sed *temere inuenerunt* & sic rationes Auerr. contra Galen. inefficaces sunt. Interea (vt diximus) cor laborat aliquando per se, cum videlicet nullus alius affectus antecessit, nullumque signum praecessit alicuius alterius partis affectus. Id autem accidit aut propter magnam eius intemperiem, tunc autem subito non perit animal: aut propter vitiosum venenosumque aliquem humorem. Subinde quoque fit propter inflammationem tumoremque ab aliquo alio humore excitatum, tunc plerumque subitanea comitatur mors. Alias laborat per consensum, quem habet cum ore ventriculi, diciturque tunc syncope stomachica, & tunc vomitus, nausea, aut dolor eiusdem partis, seu morfus quidam praecessit: sic quoque affectus primo reliquis partibus, vt vtero, vel aliis, corde vero consentiente, dicendum erit. Ex quibus etiam facile constat, ad quos cordis affectus consequatur syncope, nempe cordis intemperiem vel cum vitioso seu venenoso humore, vel erysipelas, vel inflammationem, aut quempiam praeter naturam tumorem, si per se fiat, vt patet *lib. 5. De locis affect. & simplex intemperies minus nocet: sed ea, quae ad instrumentales partes pertinet, subito enecat, ad similes minus: instrumentales subito id praestant, prius tamen praecedentibus quandoque signis quibusdam, quorum vnum meminit Hippoc. *Aphor. 41. lib. 2. sic dicens.* Qui saepe & multum exsoluuntur, sine causa manifesta, ij repente moriuntur.*

OBSERVATIO VIII.

De syncope, ab immodico mensum pressuio oborta.

Cum syncopē sit praecipitium virium lapsus (vt diximus) idque ex insigni spiritus euacuatione, alteratione, interceptione; euacuatur spiritus, quia subtilior factus est, quia corpus rarius est in acri vehementique calore. In vehementi animi motu, cum iis, quae excernuntur immodice, doloris grauitate, morbi magnitudine, fame, abcessus eruptione, & maxime in parte principe, aut quae arteriis plena est, neruo aut neruosa parte, affectis longo labore, ore ventriculi insigniter affecto. Iam etiam virium lapsus, qui ad solidorum corporum digestam substantiam succedit causam habere potest longissimos praecedentes morbos, extenuato aegro ex atrophia, id est, nutrimenti defectu: praeterea ex febribus acutis, quae corpus liquant, excitari contingit. Sic Galenus magnum causarum chaos ponit *1. ad Glauconem*. & ita fieri quotidiana experientia monstrat. Nam ad immodicas omnes excretiones succedit (vt a causis manifestis ordiamur) seu sanguis euacuatur, seu quilibet alius humor; tamethi aliquando noxia materia fit, vt de his quibus aqua extrahitur per paracentesin. Sic nos aliquando vidimus in iuvene quodam Delfensi, cui Ioannes Bokelli nomen erat, qui cum ex nimio vomitu sanguinis, incidisset in syncopen, per nos tamen recreatus, post aliquot menses, idem in hydropem ascitem incidit: de cuius ratione cum desperarem, multis deinde aliis adhibitis medicis & empiricis, semper peius habuit, ita

ut habita consultatio fuerit, nunquid paracentesis fieri posset: quam minime admittere volebam, ob certas rationes, cum eo debilitatis deuenisset, ut illam ferre non posset, altero vero medico tum chirurgo eam suadentibus, à curatione excludor, ob veritatem quam prætulerim. Post duos itaque menses facta paracentesi, & aqua copiose effluxa, mox syncope æger hic magna cum prædictorum ignominia extinctus est anno 1579. Ian. mense, qui præ macie niger erat, plane exauius, & viribus deiectis, antequam in hydropem incidisset: quam curationem homo extreme debilis & macilentus, spiritibus iam dissipatis, ferre non potuit. Ita quoque contingere potest in iis, qui vtuntur in empyemate, 6. aph. 27. et si abscessus rumpatur: ut Bellarmato, & vxori Boëthi accidit. Qui autem in syncopen inciderunt ex dolore, eorum exempla posuimus obser. 1. & 3. & 4. lib. 7. & qui ob calorem febrilem animo defecerunt, obser. 7. & qui ex fluxu, vomitu enormi syncopen incurrere, obser. 8. & 9. ex sudore nimio in febricitante, & obser. 10. ex sanguinis detract. & 13. de muliere, quæ in syncopen incidit ob exsiccationem in febre hectica, lib. 7. iam citato, quibus exemplis euacuationum facile causæ syncopis & deliquij animi innotescunt, ac eorundem curationes. Sic etiam ab hæmorrhoidibus, tum mensibus nimium fluentibus contingunt syncopes & animi deliquia, cuius nunc vnum exemplum proferemus. Sic mulier quædam Alcmariana, cui nomen Cornelia Cannia erat, anno 1547. mense Octobr. cum filia eiusdem in carcerem detrusa esset, & ibidem detineretur: hoc per nuntium ad eam delato, statim passa est abortum, cum grauida foret; & subsequutum profuuium adeo immoderatum, ut in syncopen grauissimam lapsa fuerit, cum loquelæ ablatione & sudore frigido, astantes eam pro mortua habentes, vltima inunctione tanquam hinc statim emigraturam munierunt. Interea & ego ad illam accitus sum: & factis frictionibus in partibus superioribus, nempe brachijs, & vinculis iniectis ad diuersionem, ad se rediit, ab orco quasi in lucem reuocata: & cum iâ loqui coepisset, submisit tamen, ut vix intelligi posset, confectionem manus Christi sumpsit: & ex hac mixtura sequenti, ad fluxus inhibitionem & virium restaurationem: ʒ℥. cor. ser. rosa. veteris ʒj. manus Christi perlata. ʒiij. fragmentorum ʒ℥. pulu. sem. myrtill. ros. rub. an. ʒiij. confer. bugloss. ʒiij. cum syr. coroneorum sua mixtura, superbibebat ʒiij. vel v. vini Gallici rubri & syprici & linimento subsequenti ventrem & lumbos inungebat: ʒ℥. olei myrtini, ros. mastichini, coroneorum an. ʒ℥. misce, quibus præsidij virtute roborata fluxus cessare cepit, simul & hoc electuario solido vtens, ʒ℥. sem. plantag. exsic. sem. sanguinaria trochisc. de carabe an. ʒ℥. pul. frag. lapid. pretios. gr. xx. specier. diarod. abb. triomf. an. ʒj. dissol. in aqua plantag. adiectione zacharro albiss. q. s. vt artus est, sua confectione in tabul. dos. ʒiij. superbibendo cochlear vnum vini rub. syprici sui à syncope liberata, & fluxu plane confrecto, perfecte curata est, ut eandem amplius non inuiderem.

SCHOLIA.

Sicuti quosdam ex insperata læticia scimus mortuos, ut etiam apud Valerium legitur, sanguine & spiritu subito ad exteriora retractis: sic etiam ex tristitia, sanguine & spiritu cor opprimente, syncope fieri potest, uti ex omnib. animi vehementibus affectibus. Et sicuti fit ab euacuatione nimia, ut nunc diximus, ita fieri potest à multitudine ventrem grauante, seu sola multitudine sit, vel etiam materie prauitas: ut in eo qui bilem æruginosam euomit; & omnino ex praua substantiæ cibis, ut fungis, fiunt, uti aliquando contigisse nobis relatum fuit, nobili cuidam, ut ex venenis sumptis fere omnibus. Fiunt quoque, ut iam diximus atque exemplis ostendimus in lib. 7. obs. nostrarum, ex doloribus vehementibus, non in intestinis solum, & ileo, sed & circa alias partes valde sensitiuas, ut in vulneribus quoque circa capita musculorum. Præcedunt & comitiales morbos, & apoplexias: vteri quoque strangulatus comitantur. Accidunt & in paroxysmorum initiis, ut etiam exemplis ostendimus in lib. nostris, de febris: & in statu quibusdam etiam inclinante febre, & in febris acutis malignis, citra manifestam causam: ut quibusdam adhuc sanis statim irruunt, & prægnantibus, ut sæpe conspeximus. Comitantur quoque crises laboriosas, præcipue prauas, quæ ad necem finiuntur, vel periculum inducunt. Accidunt & ventris inflammationibus, illo affectu, ut obser. 3. & 4. lib. 7. reuolimus, & validis interperaturis stomachi, cordis etiam, & post longas palpitaciones, ut iuueni nobili Mansardo contingit, & fratri meo Nannio, consiliario, à me curato; de quibus & antea dictum est. Ex immodico æstu vel frigore, etiam eueniunt iter agentibus, ex vigilijs, inedia, exercitijs fortibus: ut qui fugati sunt in bello, cum currerent, quod his nostris temporibus (prohi dolor) nunc per viginti annos bello grassante sæpe visum est. Eadem porro genere causæ faciunt, si leues sint, leues affectus; si vero graues, grauiiores, ut modolipothymiam modo syncopen facere dicantur. Omnes autem hæ causæ non primo agunt, sed necesse est (ut Iacchius supra Rhafen dicebat) aliquo vno genere vel pluribus comprehendere, quibus primo conuenit id efficere: eruntque illæ primæ, & summæ causæ, quas querere opus est. Videntur igitur vires concidere, vel quia grauantur nimium, & opprimuntur vel suffocantur calor innatus, vel quia eius vehiculum, spiritus scilicet, absuntur & pereunt: vel quia inepti sunt ad actiones, propter alterationem; quæ alteratione, aut est in qualitate euidenti, quia calfacti nimium sunt, vel siccati, vel refrigerati, aut in occultâ, quoniam venenosa qualitate inficiuntur: vel aliter vitiosus est sanguis à quo generari debent: ut si ex parui succi cibis sit genitus, vel in corpore corruptus, quod contingit in humorum corruptela. Igitur ad præfocationem pertinet, quæ in principio paroxysmorum euenit, ob id, quod calor omnis & sanguis in viscera confluit: quod si crudi sint & frigidi, ut non cito, sed sero incallescant, præfocatio talis fieri potest, ut prorsus opprimat, si leuior, syncopen faciet. De hoc vide Gal. 3. de crisi. Similiter accidit hoc, ubi magna phlegmone interna fuerit, ut in lypurijs dictis, ut dicit Galen. de inflam. iecinoris vel stomachi. Ad Glauc. Ad hoc etiam genus pertinet, quæ per principium partium obstructions fit: nam calor innatus, ubi ventilatio prohibita sit, suffocatur & perit. Sic apoplexiam comitatur, & comitalem prauum, id est, qui ad apoplexiam tendit, & illi est proximus: opprimatur enim copia obstruente calor innatus. Huius generis est, qui ex humoribus frigidis os ventris grauantibus euenit: infrigidatum enim & molestatum ab his, molestiam quoque communicat. Omnis autem molestia communicata cordi, potest

test syncopen facere, ipsum debilitando. Venter autem communicat adeo (dixit Auicenna) ob vicinitatem, etiam ob sensus acritudinem, unde valde molestias sentit. Alia causa est, spiritus resolutio; de qua obseruat, præcedente ex parte egimus: resoluitur enim nimium tenuitate cum raritate corporis. Et hinc fit syncope, in quibusdam febribus, digesto à calore febrili spiritu; præsertim si sit æstus, & æstuosus ut quibusdam exemplis in libris nostris, de febris ostendimus. Resoluitur & nimio motu, primum corporis, ut in exercitijs, etiam in Venere nimia, ut in syncopen quosdam compertum est hac ratione incidisse: præsertim quibus molle corpus est & rari. Unde delirantes sæpe incidunt in id malum. Resoluitur & ex animi affectibus, qui motus quidam sunt, sed exire non proueniunt, nisi præfocatio accidat ex conferto motu, vel ex bile mota os ventris mordeatur. Resoluitur, ubi paucus est spiritus in læticia expansus: in consternatione vero metus intro latus, & frigidus factus opprimatur, ideo ad primum genus pertinet. Non mouetur igitur ad externa, sed intro cogitur, & suffocatur, vel ab affectionibus animi vehementioribus, ut ingenti tristitia, anxietate, mœrore, dolore, cura, & similibus, unde sæpe syncope & interitus, ut Galenus docet de symptomatum causis. Vel fit à corpore, ut respiratione prohibita, multitudine & crassitie crudorum humorum exiguos meatus obstruentium; unde syncope: aut si non obstruant neque onerent, nempe iuxta oriuntur, ut Galen. docet 12. method. Huc referri possunt tumor aliquis præter naturam in corde vel pericardio, ut in distico, cuius ex Galeno meminit Philotheus, tunica inclusa in ventriculo cordis, plena humore putri male olente; tum alia, quæ aliquando obstruunt. Resoluitur quoque ex doloribus, dum natura multo motu mouetur, ut opem ferat, vndique sanguinem & spiritum perpetuo mouens impetu: sic ex morfu ventris. Resoluitur quoque in vacuationibus (ut iam diximus) immoderatis omnibus, quia vna vile quoque excernitur, siue sit vacuatio per naturam, seu per artem. Quod si sit per naturam, ut in crisi, si laboriosa sit multum, resoluuntur commotione multa, & agitatione spiritus. Sic in sudoribus, alui profuuijs, sanguinis fluoribus, etiam in partu, euenit. Sic & motu à corde affatum & repente aliquando foras dissipatur spiritus, & evanescit, eodem modo, quo intro cogitur; vel ab affectu animi vehementiore, ut in gaudio, voluptate, ira, vigilijs, risu: vel causa in corpore contenta (ut iam diximus) nempe insigni euacuatione, purgatione per medicamenta, quod sæpe vidimus à Paracelsis fieri, qui antimonio, turbitu minerali, tum ex iis alijs colocynthide, ventrem inaniant, non purgant, syncopen sæpe & mortem inducentes, vel concurrentium ad aliquam partem dolore affectam vehementi, aut erosam, ut os ventriculi valde sensibile, suppuratione, aut ruptione apostematis vel tuberculi, siue introrsum facta, ut in ventriculum, siue extrorsum, ut in aqua in hydropicis educenda, ut paulo ante diximus: simul enim exhauritur spiritus, & vna cum ruptione evanescit, ut aphor. 27. lib. 6. & 8. lib. 7. in partibus quoque exsolutionem fieri, ut vacuatione sanguinis, ita & puris, 2. Epid. Sic & Hollerius testatur se vidisse syncopen mortuos in huiusmodi ruptione à liene. Dissipatur etiam spiritus (ut modo diximus) pluribus moti-

Pet. Forest. Tom. 2.

bus, tenuitate, raritate corporum ipsos continentium, tenui humore & calido, sudore nimio. Alia vero & tertia causa erat, spiritus alteratio: unde vel ineptus fit ad opera naturæ, vel etiam inimicus; ut qui venenolam qualitatem acquisiuit, ex ebibito veneno, vel ex mala aëris infectione. Ad hoc genus pertinet euaporatio facta ex odoribus malis, ut cadauerum & aliarum putredinum, ut eorum, qui in foueis tritici præfocantur: sic & euaporatio à matrice sublata: praua enim putredo in ea gignitur, & per multitudinem arteriarum multum cordi communicat. Ita & alterantur spiritus, tum ex vitiosis abundantibus succis, tum ex ambientis malitia, qui alias alia de causa in hunc est mutatus, utpote ex metallis, caminis, aut barathris, aut ex leguminibus & eorundem putredine, olerum vel animalium, aut si halitum ex stagnis, vel paludibus, vel fluminibus recipiat, & ex venenatis facultatibus, aut animalium, quæ virus reieciunt, venenis. Cum itaque vires sint in spiritu calori nativo innæto, & temperamento solidarum partium calore infuso & humore primogenio siue radicali constante; ergo in tam præcipiti virium lapsu, vel spiritus vitalis, vel temperamentum, vel vtrumque collabatur. Spiritus autem vitalis cum sit in corde, duplicemque motum habeat, vel intro, foras: vel foris intro (ut iam ostendimus) deficit, vel non generatur, vel corrumpitur à proprio receptaculo, propter intemperiem fortem cordis, ut scribit Galenus 1. libro quinto, de locis affectis: vel defectu alimentis, vel alteratur, vel non mouetur, vel dissipatur, ut iam ostendimus. Cunctæ igitur causæ, aut cordis spiritus vel solidum eius corpus offendunt: quæcunque enim causa syncopen excitat, aut prædictorum corporum solidorum, aut spirituum essentiam corrumpit, vel saltem eorum temperiem mutat, quemadmodum apud Gal. legitur, 12. method. med. namque in his duabus substantiis virium essentia consistit: quæ insuper sic custodiendæ sunt, ut tum qualitate, tum quantitate (quod fieri licet) naturaliter se habeant. Iam vero quomodo alterentur spiritus, ex vitiosis succis, vel ambientis vitio vel veneno; & quomodo corrumpantur, iam etiam diximus, ex ingenti dolore, crebris motibus, vigilijs, & defectu alimentis. At quibus causis digeratur solidorum corporum substantia, id quoque ex parte dictum est, ob longissimos præcedentes morbos ægro extenuato, ob atrophiam & defectum nutrimenti, ex feb. acutis corpus colliquantibus, cuius exempla etiam posuimus in lib. de fibr. Alterantur autem intemperie mutata, immodica ventris inanitione: de quibus omnibus vide Gal. de caus. syncop. lib. 1. ad Glauc. & Martinum Acakiam, qui in eundem librum commentaria egregia scripsit. Morbi enim tam diuturni quam acuti temperamentum partium solidarum destrunt. Et hæc plusquam satis dicta sint de causis syncopis.

OBSERVATIO IX.

De syncope ex nimio sanguinis fluxu à naribus & de alia post medicamentum purgans aborta.

PVlla cum vehementer sanguinem funderet à naribus, nec vilo modo restringi posset, ad eam cum intrassem & syncope corripere, crura, iuxta doctrinam Galen. 1. ad Glauc. pluribus & valentibus ligaturis stringere iussi; Y jecori,

jecori, cum è nare dextra cruor emanaret, ventosam magnam affixi; quibus præfidiis à syncope liberata, etiam sanguis, qui affatim profuerebat, restrictus est. At iuueni valetudinario, cui medicamentum vehementissimum ab empirico propinatum erat, ex nimio alui profluuiio & fluxu concitatore synopen patienti, supra lectum posito, faciem aqua irrorabam, vel potius conspergebam, ut ita excitaretur. Brachia, tum crura vinciebam, manibus etiam pluribus & vehementibus vinculis inictis: talia enim ad se humores reuocant. Interea & frictionibus partium supernarum utebar, & exiguum theriacæ recentis propinavi: hæc enim (ut Rondeletius vir doctissimus asserit) valde confert syncopi obortæ post medicamentum nimis purgans; quod si non adfuit recens, antiquam exhibet, addendo opij gr. ij. cum vino: sed cum recentem haberemus, annum vix excedentem, dedimus ʒ ij. cum vino. Interim oleo quoque sequenti ventriculum tum ventrem inunximus: *℞. olei cotoneor. myrsill. ana ʒ j. olei absinthij ʒ iij. acis parum. Alteri dedi ʒ j. terre sigillatæ veræ, & micam panis vino intinctam*, cum viderem ex nimia purgatione signa animi deliquit futura, ex faciei pallore, ac pulsus varietate & deficientia: nam signis præfagientibus synopen, vel eam præcedentibus (de quibus latius scholio sequenti,) apparentibus, statim animum intendere oportet ad remotionem causæ synopis futuræ, ne ea ipsa confirmetur.

SCHOLIA.

³ *Signa præfagientia synopen.* Inter signa vero (de quibus nunc agendum, cum omnes causas enucleauerimus) synopen præfagientia, non erunt omittenda ea, quæ deliquitum præcedunt; nam hæc ad præcautionem valde vilia cententur, priusquam quis graui syncope prehendantur. Hæc quidem cognoscuntur ab excessu temperamenti ipsius cordis, & à strictura viarum ipsius cordis & pectoris, & raritate totius corpora etenim calida, rara, facillime resoluntur, & sicca & qui subtile humores habent, latoque poros, & acuti sunt sensus; tales enim facile synopen incurrunt: macilenta quoque corpora & extenuata, & sudoribus, & euacuationibus resoluta, & ex infantibus & senibus, qui difficulter famem ferunt, tam ægri quam sani, & maxime in ætate, potissimum macilenti, extenuati, aut longo morbo consumpti, cum id malum peculiare exsistit pueris senibusque micropsychisque omnibus conualescentibus, & fame laborantibus, & firmioribus quoque, nimio sudore profusis. Deliquitum quod à repentina causa non oritur, languidos prius arteriarum pulsus reddit, facies pallere videtur, palpebræ resoluntur, extrema frigescent, frigidus sudore rorescit cutis, tremulum redditur cor, ac languet cernix, oculorum debilis adest motus, & liuor, imaginationesque non consueta, visui obiciuntur, ex motu spirituum inordinato: tum ex vaporibus ad ipsos eleuatis, impotentia loquendi accidit. Signa ipsius synopis præsentis, ex se nota sunt, tum ex illis, quæ diximus, ex facie homini mortuo simili, pallida, cineritia, cum sanguis intro ruat, frigent extrema & sudor frigidus erumpit, anxietas suboritur & animi perturbatio, & tandem animus deficit, ita ut corpus resolutum sentiendi mouendique vi destituatur, in tantum, ut stans cadat: pedes, nec non manu s,

⁴ *Deliquitum præcedentia.* Signa præfagientia synopen. Inter signa vero (de quibus nunc agendum, cum omnes causas enucleauerimus) synopen præfagientia, non erunt omittenda ea, quæ deliquitum præcedunt; nam hæc ad præcautionem valde vilia cententur, priusquam quis graui syncope prehendantur. Hæc quidem cognoscuntur ab excessu temperamenti ipsius cordis, & à strictura viarum ipsius cordis & pectoris, & raritate totius corpora etenim calida, rara, facillime resoluntur, & sicca & qui subtile humores habent, latoque poros, & acuti sunt sensus; tales enim facile synopen incurrunt: macilenta quoque corpora & extenuata, & sudoribus, & euacuationibus resoluta, & ex infantibus & senibus, qui difficulter famem ferunt, tam ægri quam sani, & maxime in ætate, potissimum macilenti, extenuati, aut longo morbo consumpti, cum id malum peculiare exsistit pueris senibusque micropsychisque omnibus conualescentibus, & fame laborantibus, & firmioribus quoque, nimio sudore profusis. Deliquitum quod à repentina causa non oritur, languidos prius arteriarum pulsus reddit, facies pallere videtur, palpebræ resoluntur, extrema frigescent, frigidus sudore rorescit cutis, tremulum redditur cor, ac languet cernix, oculorum debilis adest motus, & liuor, imaginationesque non consueta, visui obiciuntur, ex motu spirituum inordinato: tum ex vaporibus ad ipsos eleuatis, impotentia loquendi accidit. Signa ipsius synopis præsentis, ex se nota sunt, tum ex illis, quæ diximus, ex facie homini mortuo simili, pallida, cineritia, cum sanguis intro ruat, frigent extrema & sudor frigidus erumpit, anxietas suboritur & animi perturbatio, & tandem animus deficit, ita ut corpus resolutum sentiendi mouendique vi destituatur, in tantum, ut stans cadat: pedes, nec non manu s,

plicabiles manent. Hoc etiam mihi semel in lecto contingit, cum nocte lotium in lecto existens redderem, & genibus incumberem, subito lapsus in synopen, matula, manibus cadente, lotio profuso & corpus vixoris meæ attingente, atque ita ipsa exprobrata, me syncope affectum sine loquela arripit, unde excitatus reuiuiscere corpi. Bene dixit omnium nostrorum parens omnipotens, hominem solum exilire non esse bonum: si enim Eua mea & nomine & re ipsa, mihi non adfuisset, syncope ita extinctus fuisset. Spectra quoque noua, malo inuadente, visui offeruntur; impotentia sequitur ad loquendum, & bene respirandi facultas intercepta, palpebræ concidunt, pulsus fit rarus, obscurus & quasi abolicus, nec non formicans. Signa vero causarum, & quæ synopen inferat, & quo modo affligat, scilicet in promptu cuique sunt. Nam si causæ euacuantes præcesserint, scimus ad inanitionis generis pertinere, seu profluuii, seu dolores, vel animi affectus, vel letitia, vel metus, vel inedia, vel vigilia, vel ambientis æstus. Si immanifeste sint & non prægressæ, statim suspicio incidit, esse succorum tenuitatem, & corporis raritatem: ideo naturam corporis contemplaberis: hoc enim tibi statim aperiet, ut si gracilis sit, calida & sicca præter modum temperies: quanquam nec sic synopen faceret, nisi aliqua dissoluens causa iungeretur, ut febris, vel ambientis æstus nimius. Sed erunt hæc tales, quæ in alio corpore id non facerent, ideo in eas occasiones referuntur ex habitu scilicet corporis. At si quis adeo prætenues succos & spiritus habeat, ut oculis exhalent, adeoque imbecillum habeat per vniuersam corporis molem retentricem facultatem, expulsiuam autem immoderatus concitatum, ut propter rea in synopen incidat in eiusmodi affectibus, mortifera illa species in facie celeriter apparet, natus videlicet acutus, oculi caui, astricta tempora, & reliqua quæ deinceps ab Hippocrate prognost. sunt conscripta: quamuis alius non multum excreuerit, neque vigilauerint, aut tristes fuerint, aut fame affecti ægri ipsi: ex his namque minus malum est, quamuis absque his emaciati fuerint, eodem Hippocrate auctore, & Galeno cum prognost. tum 12. method. medend. quem sectati sunt Aëtius cap. 98. lib. 5. & Paul. cap. 37. lib. 2. Si vero ex grauatione, pulsus monstrant: habent enim proprias inæqualitates: sed si iam premittitur multum æger, & pulsus, affectus ratione, sunt inæquales, conitices copiam, & copie qualitatem, scilicet cruditatem & frigiditatem humorum: præterea & multa stomachi nausæ præcessit, & cibi fastidium; & color corporis, ut ait Galenus, id monstrat. Si itaque ex magna humorum crudorum copia ex cruditatibus vel alia quapiam occasione congesta syncope excitebitur, vna cum oris ventris (quod stomachum voluerant) offensione, his namque & præcordia inflata, & totum corpus ampliori mole, quam pro natura modo cernitur: tum calor aliis ad albidius, quam pro naturali habitu, & aqua intercente laborantium magis simile, est mutatus, nonnullis etiam ad nigrius, aut liuidius, quos medici plumbei coloris appellant. Omnes vero pulsus minores sunt, quam pro caloris ratione, si febri citauerint: præterea obscuri, omninoque inæquales sæpe ea inæqualitate, quam systematicen Græci vocant; semper vero ea, quæ in vno est idem, ut legitur apud Galen. 12. meth. medend. & Aëtium cap.

cap. 46. lib. 3. ac Paulum cap. 36. lib. 2. Eos vero, quibus ex flaua bile, quæ os ventriculi infestet, syncope incidit, cum ex reliquis, tum etiam ex assidua oris ventriculi mordicatione, anxietate, vellicatione ac dolore cognoscet. Si itaque ex vitio stomachi, nausæ antecedunt, ac varij oculi colores subeunt: ex cerebro, vulua & iccore vitia aut offensiones antecedunt; & aderunt hominum propria signa: ita ex tincis seu vermibus eadem aderunt, quæ de vermibus dicuntur: præter dolores & crebras punctiones, etiam dentibus fixidos, importuneque clamant, & ij per superna vel inferna quandoque emittuntur. Quod si ab apostemate, signa eius quoque aderunt: si ex obstructione principium patium, hi vero subito concidunt, ut ait Hippocrates, & in accessione signa habere non potes: sed si releuantur, ex pulsibus hoc dignoscet, ut Galenus in medico illo sensit. Si ex alteratione spirituum, si ab externa causa, ex comesta nota erit: si ex euidendi aeris qualitate, similiter: sed si ab occulta, si ab aëre, communis erit multis. Prognostica autem hæc sunt, inquit Paulus, ut etiam Iacchius annotauit: Si affectus vehemens, si magna syncope, omnino peribit; nec est remedi locus: neque decipiaris, quia aliquando ex conatu naturæ rursus reuerti videntur; statim enim leui motu facto concidunt. Significabit prauitatem, quod licet leuati sint, pulsus carent, vel exiguum & obscurum habent; præterea neque color vnus reddit, neque sani facies: frigent quoque vehementer. Quæ vero significant prope aduentare (præter illa signa, quæ superius diximus) pulsus sunt, ut Galen. docet in lib. de venæ sect. cum ad obicurationem & inæqualitatem tendit. Præterea antecedunt crebra animi deliquia vehementes illas synopes, dum è lecto assurgunt, dum caput attolunt, sensus quoque hebetantur. Mortis etiam signum est, si calor non reuocatur. Ex speciebus vero, quæ per consensum salubriores esse videntur, ut omnis per consensum affectus generatim. Verum si syncope valida, medicinz locus non est, ut idem inquit Paulus cap. 34. lib. 3. ut etiam Altimarus annotauit. At si vires adhuc tantillarum constant, aliquando ad sanitatem recursus est, ut ipse refert: Ceterum ubi cor proprio affectu laborauerit in syncope, valido existente animæ robore, ex quibusvis animi affectibus, ipsa excitetur, nunquam æger succumbet, Galeno teste 5. de locis affectis. Si vero propter eius intemperiem syncope eneniat, perniciosior erit, quam ex cerebri intemperie: quemadmodum hæc periculosa est, quam si jecur primum effectum fuerit, ut testatur Paulus cap. 38. lib. 2. & Aëtius cap. 94. lib. 5. quamuis non ita subito synopes necate possint, quæ ex cordis intemperie oriuntur, quam illæ, quæ instrumentales eius morbos fecerant, ut patet eodem lib. de loc. affect. Pestifera autem est syncope illa, quæ extenuato spiritu ac sanguine originem trahit; potissimum ubi imbecillitas ad sit retentricis facultatis totius corporis, ac expulsiuæ immoderatus concitata fuerit. Profectus autem exitiosa syncope erit, si corpore succis crudis referto generetur; aut ex redundante flaua bile os ventriculi infestante: siue ex extenuatis succis, ubi jecur vel ventriculum phlegmone obfederit, quemadmodum scriptum reliquit Galen. eodem 12. meth. medend. Verum si citra phlegmonem stomachicæ synopes fiant, ventriculi ore affecto primo ac consentiente corde, curationem Pet. Forest. Tom. 2.

magna ex parte admittunt: nam minus periculosa sunt; quam si exsiccatæ fuerint ex aliquo trium principiorum; quemadmodum colligi potest ex Galen. *verbis præcitatis, lib. 2. meth. medend.* Arabes vero confirmatam synopen ex causa confirmata incurabilem constituunt, quæ ad ultimam malitiam (ut illi referunt) deuenit, in qua facies viridis apparet, calore innato extincto, vna cum colli connexion, virtute motiua tam debilitata; ut caput eleuare non possint ad inspirandum aërem, ita ut constructo pectore mors subsequatur. Sed ab vtero licet frequens sit, ut plurimum salua; & ab aliis membris modo causa ad extremum fixa non adsit. Omnis vero, quæ frequens est: & vehemens, damnatur, quoniam ocysime interimit. Longo quoque morbo consumptis frequentius animus deficit, ac lethalis est is morbus, & apoplexiam quandoque decurrit. Ex febribus, (ut etiam in libris de febribus egimus) maxime acutis, periculosa animi defectio, sicut ex carbunculis vel phlegmonibus pestiferis, sub principibus membris, ut in peste Delica sæpe obseruauimus, de qua egimus lib. 6. nostrarum obseruationum. Pueri quoque & imbecilles, præparci animi, ex animi merore vel leui deficiunt: & iis euenit, qui in maioribus musculis, vel genu præcipue, vulnerati sunt, & qui ex causa tacita interna oritur, hominem frequenter rapit, magisque si certo ordine ac sapienter redit. Cor præterea, quo magis angustum est, eo magis ab ea peste tutum est. Animæ quoque defectionis conclamatione indicium faciunt, vana sternutatoria naribus indita: pulsus formicans, exiguum præfagit spem. Quibusdam tamen senibus pulsus penitus conciderat, quo exinde reuocato, diu postea vixere. In vndis submersi post octo & quadraginta horas recreati reuixere. Fæminæ aliquando in vuluæ cruciatu elatæ in sepulchris ad vitam rediere: quo pro alterius mortui sepultura detectæ locum mutauere, atque ita miserimè mortuæ inuentæ sunt. Septuaginta propterea & duas horas antequam humentur decedere: patia quoque interualla debent iis, qui animo deliquere sine manifestata causa.

OBSERVATIO X.

De syncope ex nimio sudore.

¹ Vidam cum cursitando valde laborasset, sudore largiter è corpore emanante, animo delinquebat: cui neque frictiones adhibui, nec vinum propinavi, cum talia magis sudores moueant, cum potius sint meatus cutis obstruendi, ut sudor sistatur. Faciem irrorari iussi aqua rosarum etiam frigida, & apertis fenestris, ut aër intraret. Sicuti olim valde febricitans ex nimio sudore nobilis quidam synopen incurreret. Imperaui, ut leuiter operiretur & euentaretur, atque ut per cubiculum herbæ frigida spargerentur, ut folia falicis & vitis: quibus præfidiis & hic quoque ad se rediit, aqua quoque frigida in faciem conspersa. Huius & aliud vides exemplum à nobis positum lib. 7. obs. 9.

SCHOLIA.

² Cum causæ sint diuersæ, propterea non vnus modus curationis cuiusvis synopis est, sed singulæ earum propriam curam desiderant, ut ad Y ij longum

In quibus
communicat
omnes syn-
copes pro
easum su-
ratione.

longum docuit Galen, 1. ad Glau. pro diuersitate causarum, ex quibus excitantur. In vno tamen omnes communicant: quod si deprehensus syncope cubans est, omnis sollicitudo medentis ad symptoma vertitur: si necdum premitur, vtriusque curam habebit, vt & symptoma non incidat, & vt morbus paulatim discutatur secundum Galen. 12. lib. 12. meth. medend. Nec minus & in alio quoque inueniunt, quod siue per essentiam fuerit orta syncope, siue per consensum affecto corde, semper ipsi prospiciendum erit, cum & principalissimum viscus sit, saltem quo ad vitam: & propterea robur eius perpetuo seruandum erit; nec syncope aliqua gigni potest (vt prius diximus) nisi & ipsum cor afficiatur. Hanc etiam ob causam alij curationem in tria capita distinguunt: vel etiam imminet accessio syncopis, vel actu incidit, vel releuatus est ab accessione, sed non perfecte, vt facile relabatur: & in his omnibus quoque diuersam curam exigit. Nam si imminet, solum affectum summouebimus, a quo incipit: & ita hic incipiendo de resolutione, si sit ex euacuatione nimia, sistemus, cum primum aduentare ex signis iam superius dictis sentiamus. Si ex calore, educemus agrum; hoc saepe fit in febricitantibus, cubiculi ratione nimis calidi, cuius exemplum posuimus lib. 2. obseru. 30. de domino de Lokhorst: ita vbi ex distemperantia calida contigerit membrorum principalium, contrariis occurrimus remediis. Si ex odore malo, hunc tollemus bonis, & in vniuersum aërem alterabimus. Si corpus quia rarum est, & tenuibus succis resoluatur, non sinemus, quin ante accessionem cibemus, vt possit sufficere, idque cibis, qui non facile dissoluantur, qui enim ob prætenues succos syncope opprimuntur, accedente quoque corporis raritudine, diuersa ratione curantur, quam illi, qui ob crudorum humorum copiam laborant. Huius curationem quoque explicauimus lib. 2. obs. 41. de febre syncopali continua à bilioso humore, & lib. 2. obseru. 19. de febre syncopali intermittente, à bilioso humore orto. & obser. 5. lib. 7. de febre continua cum syncope ex acri & tenui humore, ventriculum vellicante, vbi & in scholio huius curationem, tum ex Galeno & Actio exposuimus. His frigidus aër astringensque conuenit ex rosas, aut myrti foliis seu vitium pampinis, in domo substratis, corpusque rarefactum pensandum. Vngendi quoque, si opus est, vnguentis astringentibus, rosaceo, omphacino; & refrigerantia, præcordiis & stomacho apponenda, cataplasmata ex ros. palmulis, hypocistide, & cibi dandi, qui non admodum prompte effluant, vt est sorbitio ex alica, fructus austeri, vt cydonia pyra, mala punica (de his vide Galenum, Paulum & Aetium, & vitellum ouorum 12. method. & testes gallinaceorum, qui lacte sunt aliti. Et si syncope sit ex flaua bile, quæ os ventriculi infestet, contrario modo curanda, quam illa, quæ ex crudorum copia fiat. Aër frigidus adhibendus, vt in obseru. citati ostendimus; somno liberaliori indulgendum; cibis frigidis & potu frigido vtendum, præsanæ cremore, pane non multo sed modico, ex vino aquoso frigida diluto: bilisque, quæ ventriculum lancinat, calida aqua vel exiguo aceto adiecto, aut syr. acetoso simplici, vomitu leuiter expurganda, vel alius cienda thamarindis, vel manna, aut rhab. cum cautione, si opus est, cum exquisitas euacuationes non ferant, vt in obseru. citatis latius docuimus. Ventriculum roborabi-

mus syr. granat. acidorum, ex acetos. citri, oxy-zacchar. quidam hic post purgationem exhibent decoctum absinthij. Sed videndum, si vna febris adest, ne nimium calefaciat. Si ex animi affectibus, hos & contrariis mitigabimus, nimium latos tristi nuntio, dolore animi afflictos, consolationis, & amicorum præsentia. Timor, qui syncopen facit, quod inspirato eueniat & casu, præuisionem habere non potest, vt fortes nec animi affectus. In summa, quibus ex resolutione syncope imminet, scopi sunt causas tollere & dissolutionem, quæ facta est, resarcire cibis: quod facile fieri adhuc poterit, quia vires infirmæ hæcenus non adeo sunt. Si ex ingenti dolore, curanda causa doloris erit. Huius syncopis posuimus exemplum lib. 7. obseru. 4. de muliere ex ilei dolore syncopen grauissimam incurrente: ideo si ex dolore affectus summouendus, si id facile possit, si periculum instet syncopes, etiam neglecta tantisper causa. Symptoma respicientes, solum stupefacientibus vtimur; cum cautione tamen, hoc enim est proprie aduersus symptomata pugnare, non aduersus causam symptomatis. Hæc lib. 12. method. Fugimus his præsens periculum resolutionis, quam per se facit dolor ob commotionem in spiritu, per accedens vero vigilia, quam inducit; quæ & ipsa motus quidam est. His omnibus obuiam hæc eunt: nam & dolore leuant, & somnum conciliant. Quod si dolor à causa calida sit, vt bile mordente, nihil oberit etiam effectui, vt eodem lib. Galen. testatur: nam temperat sua frigidity bilis acrimoniæ. Sed cum dolores diuersi sint, & diuersam causam habeant, ea semper erit tollenda quocumque, vt latius docuimus scholio obseru. 4. lib. 7. Si sit ex fame, saepe paulatim nutriemus, & leuibus cibis: contingit hoc in obsidionibus aliquando, quod nostro tempore in his bellis, quibus (pro dolor) affligimur, contingit in obsidione Harlemensi & Leydana. Restituimus vero, quod antea resolutum est, tum alimento, tum aëris temperie, tum alterando hunc prout oportet, tum etiam gratos odores adhibendo. Nam & aëris spiritus alitur. Hanc enim providentiam exigunt (vt etiam Iacchius docte expressit) qui mox à syncope releuati, in periculo tamen sunt, ne leui momento recidant. Nam & in his causis summouere oportet, dissoluentes, & resarcire quod est amissum, tum cibo, tum aëre, qui inspiratur. Sed maiore negotio instare oportet, quod maior est motus; & exquisitiore diligentia, quod vires imbecilliores. Primum igitur si ex vacuatione resolutæ sunt vires, cum primum releuati: si cessauit (quod in multis euenit) vt sanguinis fluore & ventris, tunc nihil circa hoc erit negotij; sin persistat, tentandum est propriis ingeniis succurrere; primum auersionibus, non per vacuationes, quia non ferunt; sed frictionibus (vt paulo antea docuimus) contrariarum partium, & vinculis. Iuuat & ad auertendum, cucurbitulas affigere contrariis, quæ recte respondeant, vt in sanguine è naribus, hypochondriis eas applicare; in eo, qui per vterum fertur, mammillis: si ex hæmorrhoidibus, non dicunt, credo, ratione bona, quod hypochondriis: nam ad superna traducere oportet, & in principia, vnde est fluxionis origo. Sed quomodo sistere oporteat, prius diximus, & alius quoque exemplis ostendimus lib. 3. obseru. de symptomatibus febrium. Sed vt subita & prompta remedia habeamus, si sit è naribus, astringentia

astringentia & frigida fronti & temporibus ad-mouenda, & per nares traicienda; & facies frigida saepe spargenda: & si astringens sit, melius erit vt ex myrti floribus, vel ligustri, vel rosar. etiam syluestrium, quæ sunt cani rubi. Medicamentum quoque Galeni 5. method. optimum est ad sanguinem sistendum, ex aloë, thure, albo oui, & pilis leporis. Ita & in sanguinis missione (huius quoque exemplum posuimus obseru. 10. lib. 7. De animi deliquio ea sanguinis missione in febre acuta eueniente) ægros præseruamus à deliquio, si supinis mittitur sanguis, ac naribus odorata subdita fuerint, rosacea, vino & aceto permixtis: vino quoque granato madens panis, si deuoratur, salutaris est. Si sit ventris profluuium, ea quæ capite proprio scribuntur, nempe astringentia, adhibenda, & fluxus cohibendus: si vero ex sudore & digestionem multa insensili (quæ euenit in febribus, his qui tenuissimum sanguinem habent, & continenter spiritum, & raro admodum habita sunt) tunc similiter profluuium sistere oportet, idque astringentibus, & vna frigidis, aërem alterando, tum aqua inspersa, & saepius aëre flabellis innouato, & admisto aceto, & aqua rosacea: etiam proderit stratum sternere germinibus frigidis astringentibus, vt & cubiculum irrorare iisdem. Similiter & vnguentis eius corporis habitus densandus, quæ astringant. Vomitionibus exhausti, vino aqua frigida permixto recreandi: verum febris & capitis ratio habenda est. Si animæ defectus ex vomica aperta, aut hydrope soluta oriatur, quæ spiritus retereant, protinus danda sunt. Tales omnes & sudores resolutos non oportet mouere, sed iacentes in omni quiete retinere. Iuuat veto & his saepe extremis refrigerantia adhibere, & pectori frigida epithemata, & vnguenta, maxime ad cordis regionem in iis, qui sudore diaphoretico resoluuntur frigus enim densat & sistit, & crassiora reddit, quæ tenuia sunt. Quomodo vero resarciatur, quod resolutum est, patet, quoniam prima materia spiritu generandi est sanguis bonus; ideo vt hic restituatur procurandum est. Qualis debeat esse cibus, Galenus exponit, id est, qui non prompte diffusetur, hoc est, à quo sanguis ille adeo tenuis, & dissolubilis non generetur; & dat exemplum de alica, quæ sit ex zea, cibarium ex farre. Et cibi astringentes, vt fructus & panis. Contra ea, quæ tardas habent excretiones, sero quoque nutriunt. At hic veloci nutritione opus est. Respondetur, Non est hic tanta necessitas, quando releuatus est, sed datur spatium concoquendi interim, vnde hoc est interim mederi affectui, qui est succorum tenuitas: sic enim crassior redditur massa sanguinea, vt optime dixit idem Iacchius. Aliud est, cum syncope accessit. Cum vero iam validior redditur, etiam validioribus vtetur. De vini potu Galenus dicit, his vinum aquosum dari: ipse vero paulo ante eodem libro vniuersim in omni syncope vult dari flauum, & quod celerrime nutriat. At hoc exiguum nutrimentum præbet (vnde ὀλίγη τροφή) & non ita celerrime ducitur, vt tenue flauum. Auicenna his dari vult vinum nigrum, crassum, austerum: ratio esse potest, ob quam Galenus quoque his austeram pomam dedit, vt languidas partes firmaret, & astringeret corpora. Paulus in hac cura vinum aquosum accipit. Respondeo, aliud est in accessione, vbi solum contra symptoma pugnamus: aliud extra, vbi etiam causam respicimus.

Pet. Forest. Tom. 2.

Loquebatur prius Galenus in omni accessione; hic vero extra eam. Quoniam vero communiter in his affectibus celeri nutritione est opus, ideo & aqua carnis vtimur, quam quidem gratissimam conficimus, capos non saginatos capientes, & irrorantes, dum assantur, aqua rosata, & aceto ros. vel succo granatorum: postea exprimimus. Si etiam febris absit, loco aceti vinum flauum admiscemus. Quantitas eius 3 ij. cum modico vino. Huius generis est vitellus oui. Vino austero crasso vtitur Galen. in fluxu sanguinis è naribus: quoniam tenuior calore & fusione potest affectui nocere: in cæteris calidum & tenue præligit. Hic quoque extra syncopen intelligit: nam in ea est alia ratio. Si enim vinum dandum, tenue & calidum dandum. Sed num actu frigidum? Galen. in hoc respicit consuetudinem & aëris temperiem, & corporis naturam calidam vel frigidam: & sic calidum vel frigidum propinat: vbi nota quod veteribus mos fuit temperare vinum calida: vt Horat. Quis aquam temperet ignibus, &c. Britannicus in calida venenū hausit. Nota etiam ex Galeno conditiones, quæ faciunt abstinere à vino, scilicet febris ardens, cruda, quia concoquendis succis iuuabit, 11. meth. lædet aliter calore, fusione, etsi adsit apostema, quoniam auget illud: sic si delirium instet, vel capitis dolor grauis: Auicenna addit, & si resolutio ex inedia non sit; lædit enim merum iuuenes, ob id, quod nervos lædit, vnde spasmus, vel delirium: eius loco aqua carnis semper & in syncope, & extra vel simul admista. Si ex morfu ventris, vbi affectum curaueris, iisdem vtitur. Debet enim interim causa tolli. Concludendo igitur, in euacuatione nimia reficiendus æger, vino diluto, theriaca recenti, irrigatione aquæ frigida in ipsa accessione, extra & ante, ventriculi linimento, frictione partium superiorum: & excretio, vt in cæteris, retinenda.

OBSERVATIO XI.

De quibusdam à difficili syncope releuatis & curatis.

Quoniam syncope extraordinarium malum est, ac saepe præsentissimum, omnia saepe morbi origine, deficientes excitandi sunt protinus remediis, & spiritus reuocandi ad extrema, modo aqua frigida, modo rosacea, aceto mixta, vel vt alii voluit, aqua rosacea moscata, si ad manum sit alioqui sola aqua frigida in faciem sparsa, de qua latius in scholio. Odoratus ad nares, frictionesque adhibendæ, prout ratio dicat, & pro varietate causarum. Sic mulier nobis vicina, ex violento partu & foetu mortuo dum vi pareret, sanguine etiam per inferiora copioso profuso, in syncopen validam incidit, vt omnes illam mortis vicinam iudicarent. Ad hanc subito ingressus, cum nihil capere posset, factis frictionibus digitorum, vinum pro odoratu naribus obiciens, & digito intincto in aquam frigidam, cum nihil ad manum esset, & in faciem conpersa ea aqua, & temporibus confricatis cum vino & aqua rosacea, quæ tunc adferebatur, oculos aperuit: mox cum videretur aliquid posse sumere, dedi cum cochleari exiguo parum aquæ cinnamomi, quæ fuit excitata, & ad se præter omnem opinionem rediit vino atque odoribus gratis, cum nodulo caryophil. Postea etiam aqua carnis & vino rosellata, optimis aliis prædiis adhibitis, non

Y iij amplius

amplius redeunt syncope fuit probe curata. Cui-
dam, qui ex fame in obsidione, spiritibus resolu-
tis, in syncope inciderat, aquam frigidam non
inpersi in faciem; sed vino & odoribus bonis
naribus admotis quieti permittebam, panisque
frusta, tum cum ad se non nihil rediisset, vino di-
luto immersa exhibui, quod cum adhuc ex synco-
pe nondum perfecte releuatus, comedere non
posset pulli ius sorbendum exhibui, & aliarum
recentium carnum cum vino. Et hic quoque dein-
de leuibis cibus, tum vino utens, diluto etiam
cum pane, firmam sanitatem consequutus est. At
fororcula apud Clarissas, quæ adhuc uiuit, cum
mamillam cancerosam chirurgus funditus exci-
deret, me & Cornelio Heydio collega meo præ-
sentibus, tam ex fluxu sanguinis, quam ex ingenti
dolore animo defecit: sed odoribus vini, &
temporibus ac fronte cum aqua rosæ. & aceto
dilutis, irrigatis leniter cum leui frictione, tan-
dem excitata, & emplastro restringente mam-
millæ appposito, optimis deinde aliis præsidiiis
adhibitis, & alimentis bonis ac lenibus refocilla-
ta, etiam ad sanitatem peruenit, carcinomate
quoque egregie curato, eadem adhuc uiuente
anno 1591. mense Octobri, dum hæc in ordinem
redigeremus.

S C H O L I A.

3 **A**D syncope accessionis & irruentis curatio-
nem deueniendo, statim præsidia optima,
quæ egros reuocent & excitent afferte oportet,
ratione id dictante, ne statim succumbant. Hi er-
go bifariam se habent: vel enim adeo oppressi
sunt, ut nihil possint capere, vel ut possint; qua-
lis erat ager ille iuuenis apud Gal. lib. 10. meth.
medendi, cuius historiam legere poteritis: pri-
mo modo erat Boëthi vxor. Hic vero primum
generalia quædam proponant medici, ut & Iac-
chinus doctissimus annotauit in omni scilicet ac-
cessione: & sunt excitatio (est enim velut tor-
por quidam facultatum) prohibitio resolutionis,
& quanto citius fieri potest restauratio. Galenus
ita eos tractat: primum frigida faciem spargit,
& est remedium mulieribus vñtissimum, quo
passim in quaque syncope vtuntur, & illud ex-
perientia videmus excitare. Non desunt tamen
aliqui, qui volunt, ut in syncope si causa frigida
aut immodico alui fluore, non fiat, quem frigida
intus comprimens auget, & in fame quoque ab
ea abstinere volunt. Sed in aliis, ut demittatur in
faciem, iubent, ut sopiti spiritus excitentur, & si
qui adhuc in partibus externis remanserint, re-
solui prohibeant: & hanc præcipue imperant, in
iis, qui ab æstu, aut febris incendio, aut alia cau-
sa calida oriantur. Sed expositores hoc præsi-
dium cum legerent apud Auicennam, non exci-
tandi gratia fieri credere, sed densandi, ne scilicet
exhalent spiritus, sed detineantur: facies
enim ea est, ad quam multi concurrunt. Sed
prior ratio sanior est, quoniam maxime sensilis
pars & nervosa, ideo subito illo occurso maxime
commouetur, & spiritus ad eam vertuntur, si-
quidem omnino his destitutum cor non sit, ali-
ter peribit. Assiduare igitur vult Iacchius do-
nec excitetur. Secundum remedium est, eos no-
mine compellere ad aures, donec excitentur.
Nam ex sono feriente vis sensitua aurium excita-
tur, & reuocat spirituum mensuram, & caloris.
Subdit Galenus & nares apprehendere similiter

ad excitandum, in cura vxoris Boëthi. Alij & os
& nares; ut comprimantur iubent, ut inspira-
tus aer interiora petens, & paulo mox egredi vo-
lens, calefactus ad cor redeat, ipsumque calfa-
ciat, spiritusque reficiat & excitet: id forte in
causa frigida magis conducit. Addit Galenus &
odorata naribus admouenda: quæ ea sint, non
scribit. Hæc vero tum ad vim euigilantem, tum
ad spiritus restaurandos faciunt: quæ tamen hoc
casu eligi debent, quæ grata illi esse solent, ut
vim animæ alliciant, nec refugiat. Vinum ergo
maluaticum, aut aliter maxime odorem conue-
nit. Auget vero vim eius, si tostum panem assu-
mas calidum, ac perfundas: quod si fortorem
odorem velis, etiam acetum acerrimum rosacea
temperatum, & garyophyllis, & santalis simili-
ter offeres, & in faciem irrorabis: quod si can-
phoræ grana iij. addas, vehemens erit odor &
gratus. Sic & Aërem totum cubiculi odoratum
reddes ex rosacea, & garyophyllis. Componun-
tur quoque poma ex speciebus epith. cor. cum la-
dano, sed reuocatis deseruiunt magis. Hic alij in
causa frigida spiritus instaurant aluntque, qui
non solum naribus ægotantis admouent, ut ol-
faciant, sed etiam instando naribus immittunt
odoramenta in tenuissimum puluerem redacta:
algalia, moschus, styrax, calamita, ladanum, &
id genus alia permulta boni odoris, ad hanc rem
sunt idonea. In causa calida odoret santala, præ-
sertim citrina, rosas, caphuram. Interea cautio ha-
benda, si a præfocatione vteri fiat, vel mulieres
(ut ex interrogatione astantium discere licet, si
non loquantur) ei sint obnoxie, à iucundis illis
odoribus abstinendum, quin grauius olentia na-
ribus quidem iniucunda, ac vuluæ suauiter olen-
tia admouenda. Quidam altis vociferationibus
& clamoribus spiritus circa cor sopitos excitant.
Prodest quoque ad excitationem artus confrica-
re & ventrem: artus quidem ut calor rursus ad
externa redeat, qui ob paucitatem in cor erat re-
tractus, idque si ad brachia fiat, vino calente odor-
ro, optimum erit. Sic & in historia Boëthi Gal.
facit. Ventrem vero odoratis confricat, ut erit
quondam nardinum vnguentum: ego potius no-
stro spicaæo vterer: nam iuuare sæpius vidimus
ventris affectus. Hoc fit, ut ventrem roboret, qui
sæpe lædi solet in syncope affectu ex confluxu
bilis, & sine ea affligi cordis consensu: præterea
cum valido sit sensu, eius contractatio ad euigi-
landum facit. Sed quid iubet, ut vomat? an quasi
humor in ventrem confluxerit? At hoc acciden-
tarium est, neque enim ex ventris morfu, vel do-
lore statim syncope euenisse. Aut similiter ut
excitet, nauseam excitando? Nam nec vomitum
dat Galenus, hoc casu, sed prorit solum: simi-
liter ad excitandum postrema sunt, quæ sternuta-
tionem mouent, zinziber & piper: illa vehe-
mentiora sunt. Sed quibus modis curetur synco-
pe ex bile flaua, iam prius quoque diximus: sed
quando ea tentantur, vinum etiam flauum tenue,
vel aquosa & antiqua vina propinant Gal. alij &
panem in vino granato madentem dant. Et ita
prohibere ne amplius resoluantur, fiet remouen-
do causam (ut etiam de febricitantibus diximus)
etiam externam, si adsit, ut calor aeris, & alteran-
do: præterea & auersione ad vacationes fa-
ciendo ad contraria, quamuis fisti soleant, sudore
excepto, imo hic augeri ex debili contentrice
naturali corporum, vel etiam raritate. In sudore
igitur vtuntur his, quæ ad præuisionem dicta sunt.

Cum vero à syncope releuatus est ager, causam,
si adsit, respicere oportet. Habes exemplum apud
Iacchinum de dolore, si causa existat, à quo ager
leuari debet: alioqui recidet. Causa tollitur aut
mitigantibus, aut lenientibus, aut stupefacienti-
bus: cum cautione, ut 5. simpl. 18. & 12. meth. 8.
& 5. meth. Reliqua vide apud Iacchinum, & quæ
nos de dolore diximus lib. 7. obser. de feb. Auicenna,
si sit materia dolore faciens ipsam vacuat,
causam tollendo, vomitu, clysteri, vel sectione
venæ; cum à syncope est releuatus ager. Verum
id videtur fieri non posse: nam virtus necessario
est debilis: ideo vacuatio nocet: si ita debilis ma-
net, tentanda non est: sed cum à symptomate re-
ficitur: at non nisi sedato dolore, semper enim
dissoluetur spiritus. Quid si dicas, quomodo de-
bilis stante sanguinis copia in venis? A sanguine
enim vires. Respondetur, non esse necessarium:
sed primo à spiritus copia (non enim semper vi-
res augentur) ut in lib. de plenitud. Vnde & Gal.
cum de synocha loquitur, quam fieri ait in bono
habitu, & multi sanguinis, cum sanguinem vult
mittere, addit, si vires ferant: stat enim cum
sanguinis copia, spiritum multum vacuatum, vel
alteratum, vnde vires labant. Si stupefaciendum
vtuntur philonio, vel pilul. de cynoglossa, vel
theriaca noua sex mensium, modo robusta sunt
corpora natura & colore, dant theriacam fere ad
5 j. pueris vero ciceris forma. Sed Philonis anti-
dotum fortius est, cum restinguat, sistat: somnum
faciat. De aliis causis, ut vacatione immodica,
certum est quod retineri debeat, si sequatur: sed
de his suo loco, & cap. de dysenteria, cum &
quasdam sponte deficere diximus. Sudores quo-
que prosequuti sumus. Si animi affectus, ut paulo
ante admonuimus, contrariis sedandus, aut moni-
toriis præceptis vtendum: ubi vero timor, ne eue-
niat ad causam maxime respiciendum, eam tol-
lendo: tollitur vero propriis remediis: quæ his in
affectibus enumerantur. Si Auicenna dimittit,
& dolor si est similiter sedandus, primum ten-
tando causam remouere, aut per paregorica, alio-
qui stupefacientibus. Si ex febris vehementia, ad
ipsam refrigerandam accedemus, ut de febris
diximus. In resolutione itaque spirituum, ali-
menti optimi succi: facile & cito nutrientia, hu-
meantia. Diogenes Laërtius scribit Democri-
tum multos annos effluentem spiritum retinuisse
medulla panis albi intincta vino optimo, ut Cre-
tico, & conspersa puluere menthæ, appositæque
stomacho & naribus. Ita quoque si ex febris &
inordinatis motibus fiat, quies iniungenda, ex
respirato prohibito, respiratio procuranda, ex
animi affectibus statim ab eo affectu reuocandi.
Si vero ex aliqua trium principiorum intemperie
fuerit excitata, per contrariam intemperiem, mo-
derate tamen vindictam, syncope curabitur. Si
ob inflammationis magnitudinem, aut vehemen-
tis febris malignitatem, syncope generetur pro-
priis curationibus, inflammationis scilicet, aut
febris, curanda sunt, tempore quo syncope de-
prehensi cubantes non sint: quous enim modo
fiat ob defectu spirituum post labores, vel mor-
bus, vel medicamentum: nutriendus erit ager
alimentis optimi succi, cito nutrientibus, & hu-
meantibus, de quibus vide auctores. Ad causa-
rum genus pertinent ea, quæ calorem suffocant:
ut si copia solum in viscera irruat, aliquando &
ea frigida sit; aliquando non quod copia sit, sed
quia exilis est calor, ut ager lib. 10. meth. Causæ
verò sunt, quod vel ex victu in visceribus acer-
uata est, ut is qui crapula vtuntur, & in quo de-

gunt vitam: sæpe vero & intempestiue exercitan-
tur, ut humores fundantur crudi: & viscera pe-
tunt: sæpe ex retentis vacationibus. Causas co-
piæ videre licet lib. proprio de plenitudine. Ad
hoc genus pertinent obstructions factæ in mem-
bris principalibus: sic quidam in iocinore tales
obstructions habebat, & crebro exsoluebantur,
quem & Iacchius curauit. Fit ex confluxu etiam
confertim facto, ut in timore, & februm princi-
piis: vel ob prauitatem vel caloris inopiam in re-
solutis, vel apostema. Ex apostematibus autem
magnis, ut 4. Aphorif. 48. Eadem intentiones
in eiusmodi curatione, causam remouere: nem-
pe multitudinem, & euigilare, & calorem ex-
tinctum restituere. Primum autem & secundum
scopum explent, quæ euigilare faciunt: retrahunt
enim ad externa humores, qui in viscera fereban-
tur, & qui manent. Id faciemus per eadem inge-
nia: aqua tamen non inspergimus, ut monet Au-
cenna, sicut in superiori: sed extra vehementius
fricabimus (nam sæpe crudorum copia in eo est)
& ventrem odoratis inungemus, & nares ut oleo
iasmino, benzoino, styracino, sunt enim hæc
acriora. Hic quoque sternumenta magis iuuant.
Sic & cordi calida epithemata adhibemus, ut
melissæ, cardui benedicti, & sampsuchi aquam
cum vino aromatico & speciebus diambra: & ca-
lide actu apponimus. Tertia intentio calorem ex-
stinctum excitat & restituit. Quid si sponte sua
fiat, ut in febris, laborandum non est: sed fe-
bris curanda remediis propriis. Si non fiat, sed
adhuc langueat, ut in timore, & causa tollenda
est, & cibo & potu calido sanandus ager. Sic si
sit oppressus calor ex debilitate: quamquam præ-
stabit antea id fecisse, ut 10. meth. med. Gal. ait.
Si vero ex inflammatione, vel febris malignita-
te, Galenus abstinere iubet prorsus, & euigilan-
tibus uti: nam si dederis, inquit, necabis: quam-
quam exitialis affectus non debeat à medico tra-
ctari. Si vero ex crudorum copia, hic varius esse
videtur, illorum artus plurimum fricat, calfacit
ac ligat. Caterum à vino & cibus temperare iu-
bet, atque etiam à balneis, si febris adsit, & ut
contenti sint mulsæ potu, in qua thymum, ori-
ganum, pulegium, vel hyssopum concoctum sit,
Confert autem & acetum mulsam. Mulsæ varie
apparantur: vide Acaciam in Commento supra
Gal. ad Glanc. Abstinet igitur cibo & vino Gale-
nus, potat incidentibus medicamentis. At lib. 12.
vinum & cibum dat quo periculum in præsen-
tibus curret. Si tamen vehementer non febricitent, aquo-
sum vinum statim exhibet, & in eo panem dila-
tum, modo in aliquo viscere non adsit phlegmo-
ne. Vide de his ad longum Altimarum, quæ ipse
tum ex Galeno, Aëtio, Paulo, ad syncope ex
crudorum humorum copia refert. Dubitatur &
de inflammatione: nam perpetuo accidentibus
vires præseruantibus vtendum est, & dandus ci-
bus. Respondetur, cum dicit abstinendum, in
copia recte dicit, indicans causæ medelam, non
symptomatis. Itaque distinguendum est, prout in
accessione est vel extra. Signum quod hoc velit:
quoniam subdit dandum oxymel, & mulsam cum
herbis illis incoctis. Et sunt remedia, quæ ad
hunc affectum Galenus affert, quæ causam respi-
ciunt, ut recte dicebat Iacchius, & ita vtilia
sunt quando à syncope est excitatus. At in acces-
sione cibi aliquid offert, si potest, & vini, 12.
meth. Contra affectus eget distractione. Imo er-
rant, inquit, grauius, qui his, qui ex dolore, &
morbi magnitudine deliquium patiuntur, cibum
offerunt, sed potius detrahendum est 2. de vict.

48. Respondet. ipse, concedo: sed id facimus, ut periculum euitemus: & hoc annotauit Auicenna cum ait: & non cogas sumere cibum, nisi vinum: quoniam à syncope cogimur, & recitat curam affectus, itidem ut Galenus & Galeni verba, quod multi ab ignavis medicis pereunt, dum robur addere viribus volunt, & præfocant. Patet autem quod vinum calida mixtum dari debet, nisi æstus impediatur. Quæ autem sit integra affectus crudorum curatio in lib. de febr. diximus, lib. obs. 26. de feb. synopali humoralis: ubi & egregium exemplum habes de muliere egregie curata. Et lib. 7. obs. 6. de muliere pituitosa febricitante; in syncope incidente, ex collectione humorum pituitosorum in stomacho. Si vero adfuit febris, horum curatio, dum adhuc modum non creat magnum, ad 4. lib. sanitat. spectat: si syncope affert, ad hunc locum: contra si accidentia vires deiciant, dandus est cibus, 1. Aphor. 8. Respondetur tantum ut remedio sit, non ut sanguinem & copiam augeat: & ubi cuitauerimus periculum, ad abstinentiam reuertimur. Contra cur non, ubi inflammatio? An duplex est periculum à cibo, & ratione inflammationis, & ratione principij febris præfocantis? Vnde si oneretur virtus, prorsus præfocabitur: hic vero non nisi cruditas: nam si esset motus principij, prorsus non daretur, etiam in hoc: sed euenit his syncope, etiam sine retractione, quæ sit in principio. Contra cur his syncope affectis tribuis, non illis? quomodo viuificabis vires? Respondit Galen. 12. meth. cap. 13. quod si destituuntur alimentis: quoniam crudi succi non nutriunt priusquam concoquantur: ideo noui aliquid damus in præfens. At in illis non est alimenti inopia, sed copia. Sat est ergo reuocare ad extremum spiritum, & calorem: habent viscera quo alantur. Præterea nisi detur aliquid, stomachus languet, & in afflicto alio corpore, & debili virtute: facile syncope accersit, hoc prioribus non accidit. Nam & in cruditatibus; maxime à ventriculo offenso, & ita imbecillo factis eius ore: syncopas euenire innuit. Gal. 12. meth. 8. Quærendum etiam est, num quod vulgo suadet, faciendum, ut in timore: postquam animi affectus ablatus est, vacuationem aliquam moliamur? Respondetur, visum esse, ne fiat, sæpe magna euenire mala, ut in quartanario vidit Iacchus, subita respirandi difficultate & palpitacione, & syncope mortuo. Sed quid potest facere timor, ut hæc exigat? An ex confluxu illo, aliqua obstructio in valis, vel in plegmone, vel abscessus aliquis fieri potest: quamuis multæ copię nota non appareat, est faciendum. De causis vero quomodo obuiam euodum, ne rursus in syncope decident, ex propriis capitibus habendum quomodo tollantur.

OBSERVATIO XII.

De syncope ex vtero.

1. PVella nobilis, octodecim annos nata, cum vteri suffocationi sæpius obnoxia esset, in grauissimam syncope incidit: huic enim crura potius quam brachia, iuxta Galenum 1. ad Glauconem, deligauimus, atque præfocauimus, & quia sursum reuulsus retractusque in latus vterus esset, cucurbitulas femoribus apposuiimus, & naribus obieciimus grauissimos odores, ex castoreo, ex assa fetida: vtero vero suauis, atque circa vterum olea relaxantia & calfacientia adhibuimus, quibus præfidiis mox restituta fuit, & à syncope re-

leuata. Vterum repurgauimus cum pistulis mastichinis. Sed & postea viro copulata, ex nostro consilio, amplius hoc malo: admodum prolifica non corripiebatur.

SCHOLIA.

A Nimo destituuntur mulieres (ut de causis diximus) quibus vel sursum, vel ad latus retrahitur vterus, & quibus large menses fluunt. In priore affectu crura deliganda sunt, ac perficienda, ut humoris copia, quæ hos affectus parit, foras euocetur. Communitatem enim vterus per venas, per quas possit is humor derivari, cum cruribus habet, hac ratione inguinibus & coxis admovenda: cucurbitulæ sunt, quibus potenter trahendi facultas inest. Naribus quoque obicienda sunt quæ grauior olent: vtero vero quæ suauem spirant odorem. Natura enim ad id quod obicitur, si iucundum familiareque est, mouetur, si triste alienumque, auersatur à tetro odore naribus obiecto; inferius depellitur in locum suum, ad suauem vero inferius admodum se se conuertit. At in largo vteri profluio, ut obs. 8. huius libri diximus: brachia liganda: & vinculis constringenda, & mammis cucurbitulæ affigendæ sunt. Ita & in alicuius partis sympathia, topica, vntiones, cordis roboratio, partis affectu curatio, ex stomachi quidem imbecillitate: imponenda, iuxta Galenum, quæ roborandi vim obtinent: emplastra ex palmulis confecta, vino, polentis, croco & aloë: & mastiche, oleo absinthino, mastichino, nardino inungendus. Altuant stomacho aliquid refrigerans admiscendum, ut cucurbitam, lactucam: portulacam, & vnt æcerbæ succum. His vero qui alicuius frigoris sensu afficiuntur, diatrion piperon exhibendum, aut absinthium in potu. Si vitiosissimi humores os venteris mordeant: aqua calida epota, vel hydraleo vomitus imperandus. Si non facile vomant, prius partes stomacho adiacentes, & manus & pedes calfaciendi sunt. Quod si nec sic vomant, immisis in os pennis vel digitis: stomachus irritandus est: si nec sic, rursus oleum calidum adhibendum, quod non solum vomitum prouocat: sed ventrem quoque emollit. Postea absinthij coma, aqua mulsa incocta: in potu danda: deinde vinum, modifque omnibus roborandæ partes sunt, tum medicamentis forinsecus impositis, tum absinthij potu. At non perinitia, sed repurgato ventre, quando succos continet, non abstringendus, sed calfaciendus, ut prius dictum est. Si pituita in ore collecta, multam dabimus, in qua vel hyssopum vel id genus aliud maduerit, & acetum mulsum & piper: & postea diatrion piperon: plurimumque stomachum fouebimus oleo; in quo absinthium decoctum sit: victumque attenuantem adhibebimus. Plura vide 1. ad Glauconem, De arte curat. apud Galen. cum ibidem ad omnes causas præfidiis vitia ad syncope ad longura referat.

OBSERVATIO XIII.

De syncope à veneno assumpto.

Mulier quæ pisces in foro Delphi vendebat, interficeret 3 ij. auripigmenti in ceruicia sumpsit quæ post grauissima symptomata, ut venteris torsiones, conuulsiones: tandem in syncope incidit: sed frictionibus à mulierculis adhibitis à syncope quidem releuata, pessime angebatur. Hæc tempore

tempore cum in Hagha Comitibus essem, accersitus est pharmacopœus, qui oleo oliuarum propinato vomitum prouocabat, & mox theriacam potandam dabat: quæ me in simili casu recte vsum fuisse viderat. At me reuerfus meridiem ex Hagha vocant, quæ tunc pro deplorata habebatur, tam ob continuum spasmodum, quam venteris torsiones, supernas quoque ac infernas deiectiones: sitibunda æstu se præfocari clamabat: ideo decoctum sequens propinaui. 2℥. folior. maluæ, viol. bordei mundati, ana. m. j. sem. maluæ, cotoneæ, ana 3 j. sem. lini 3 ℥. coquantur in aqua communi pro lib. j. colatura, adde syr. viol. 3 ij. quo iulebo & ventrem deiciebat & vomebat, syncope non amplius reuertente. De dimus etiam lac calidum. Illud enim iuxta Aëtium lib. 13. ca. 40. si assiduo vomitu reiecent, valet his, qui calcem, sandarachem & auripigmentum potarunt: nam hæc dolorem venteris & intestinum, cum vehementi morfu inducunt. Inuuantur etiam eodem Aëtio auctore, succi maluæ potu, aut seninis lini, aut orizæ, aut halicæ, pinibus iusculis potatis & aqua multa. Cæterum symptomatis dictis cessantibus, decoctum iam dicto, pro corroboracione & siti continuo sumebat ex diatr. frig. & subinde syr. violar. Omnia enim lenientia hic valde commendantur, ut oleum amygd. dulc. expressum, quo non solum in hac, sed in aliis (ut de venenis dicturi sumus, si Deus me superstitem fecerit) commodissime sæpe vsumus: propinando quoque indefinenter butyrum cum ceruicia, huic negotio admodum conueniens. Quibus quidem præfidiis hæc mulier euasit: quauis postea post annum vnum atque alterum ad cachexiam deueniret, & postea obierit.

SCHOLIA.

3. H Oc genus synopis à veneno vel ab aëre infecto, ut in odoribus, seu cibis, ut esu fungorum, ex praua horum putredine, pertinet ad caput de alteratione spirituum: siue prauitatem in corpore acquisierint: & qualitatem venenosam: ut cum corripuntur succi aliqui, ut de his ætericis quoque Galenus habet 6. de locis affectis, vel etiam venenū potatum sit, vel morfu relictum: fere enim omnibus superuenit hoc symptoma. Fit etiam maxime in frigiditate: vnde ad frigidum disemperantur, ut in vltu stupidorum euenit. Nam à calore potius resolutio multa esse videtur: ab aliis qualitatibus longi potius morbi fient, quam syncope, quod tardæ sint actiones. Cum igitur de natura causæ certus fueris (quod hic facile est) quod quidem ad eius summotionem attinet, dum æstu est implicitus æger ad frigidum affectum: calidis vteris, ære, epithematis, odoribus, frictionibus, fouendo ventrem, & omnibus modis hos excitando: mox vino maluatico; & aqua carnis & ouis restitues. Si vero venenosa qualitas sit, si quidem ab vtero, eisdem modis reuocanda erit, pessis, suffitu, odore tetro ad nares, infernorum frictionibus, cucurbitulis ad coxas: & pubem, vinculis, ut scholio præcedente docuimus. Cum vero resipuerint, causa spectanda: & ei obuiandum. Si materia venenosa, ut in vomitu æruginoso (de quo etiam mentionem fecimus in lib. de febr.) ea quæ abluunt propinanda: etsi adueris antequam incidat, quæ temperant exhibenda, ut aqua & oleum dulce: vel amygdalinum, mulsa. lac potare debent. A vomitu, terra sigillata exhibenda, & theriaca: naribus odores, cordi epichemata. Si vero iam inciderit in syncope, exigua spes est, si sit valida: tentandum tamen

iisdem, facto prognostico, ne remediis vacui videamur, ob artis honorem. Si extrinsecus accerserit ex odoribus malis, communibus auxiliis vtemur, excitando, & odoribus gratis instando, & cibo & alteratione temperando. Nam & prouocatos ex fumo carbonum nos restituiimus, qui robustiores erant, etiam nautas in nauibus conclusos, ceruicia ebulliente: quosdam subito extractos è navi reuocauimus: quamuis & hoc modo subito extincti sint quidam in navi permanentes. Si ebibita venena, proprias habet notas & curationes, de quibus suo loco. Rondeletius in syncope ab hausto veneno, statim vomitum prouocat, eoque prouocato dat theriacam, aut Mithridatium, & postea si sentitur ardor & acrimonia ventriculi, vel punctura, exhibet lac, butyrum, vel pul. cord. ex refrigerantibus & acrimoniam obtundentibus, ut 2℥. diamarg. frig. 3 j. trochisc. de camphora, confect. de hyacinth. ana 3 ℥. aque ros. nymphaeæ, bugloss. ana 3 j. syr. de acetos. citri, vel de limonibus 3 j. misce. fiat potus: detur pars media altera post aliquot horas. Si autem venenum frigidum sit, vel affectus frigidus inducat, fiat sic. 2℥. confect. de hyacinth. 3 ij. pul. de gemmis 3 j. aquarum meliss. beon. bugloss. beleni, ana 3 ij. syr. de bugloss. 3 j. dentur ij. vicib. Si deprehendatur quale fuerit venenum, dentur propria antidota, alioqui zedoaria in omni veneno valet, uti & tormentilla ad omnem syncope. Quibus modis excitentur à syncope in paroxysmis febrium: de febribus diximus.

OBSERVATIO XIV.

De paralysi facis, vniuersali, animi deliquio leui asthmate.

Iacobus Iunius quæstor Dominide Wafanaer: apud Haganos, senex annu sexagesimi octauum iam attingens, alioqui vir minime melancholicus, hilaris & facetus, subito incidit in paralyfin quasi vniuersalem, cruribus, tum brachiis, ac manibus resolutis, loquela etiam nonnihil impedita, valde debilis, ut animi deliquium quauis curreret, cum asthmate subinde ac pectoris angustia. Ad quæ primo accitus est Antonius Schinkelius medicus Haganus, qui aqua lauendula tempora & membra paralytica irrorari & confricari iussit, & eidem syrupus infra scriptus aliquando exhiberetur. 2℥. syrapi de saccharide, de betonica, rosacei solutiu. ana 3 j. olei vitrioli guttas nouem, misce. Hæc præscripta fere 16. Augusti. Altero die me vocarunt: cumque eundem reperissem in hoc statu & debilem, neque alium deponeret, visum mihi fuit: ut glans statim iniiceretur ad diuersionem & alui subductionem, quod cum medico præfenti quoque vtile videretur, hæc glans, iniecta fuit. 2℥. puluis specierum hieræ picæ: trochiscorum albandal. ana 3 j. salis parum, mellis q. s. fiat glans seu suppositorium, quo bis terve alium deposuit, atque hæc glans, cum facili solutionis esset, secundo vel tertio quoque die reiterata fuit, ut 20. Augusti. 27. & 6. & 14. Semptemb. Deinde reliqua subsequencia medicamenta, vna præscriptissima: statim quoque à venteris solutione, cum prima glande, inunctionem sequentem, 2℥. olei samfuchini, olei costini, ana 3 ℥. misce. Inungatur mane & vespere tota spina dorsii, à nucha incipiendo, usque ad os sacrum. Interea cum paulo melius medicamenta ferre posset, has pilulas vna præscriptissimas. 2℥. pilul. cochiar. 3 ℥. pilul. anser. 3 ℥. siant pilul. vj. maiores deuorare difficile poterat, & deuenerunt. Habuit inde vij. sedes: cum admodum facilis

facilis solutionis esset, ut paulo ante diximus. Postea 20. Augusti etiam & hoc solutium exhibitum fuit. ℞. Syrup. ex infus. ros. cum foliis senae 3 j. B. agarici trochisc. specierum benedictae lax. ii. ana 3 B. aqua salina 3 j. B. misce. qua potione ultra sex habuit secessus: tunc etiam imperauimus, ut crura & membra paralytica hoc linimento inungeret, saltem bis in die. ℞. olei samfuchini, olei colini, ana 3 B. aqua vitae 3 j. misce. 21. Augusti. hoc apozema praescriptum est. ℞. corticum radic. ciborij. paeonia, ana 3 j. florum stachados, rorismarini, ana p. j. herba paralytis, betonica, maiorana, salvia, origani, foliorum lauri, ana m. j. pin. damasc. num. xij. vuar. passul. ab avillis repurg. 3 j. semin. caribami parum contusi 3 B. folior. senae a stipitibus repurgatorum 3 vj. poly-podij quercini 3 j. seminis anisi 3 j. B. coquantur in aqua communi, pro 1b j. colatura addendo Syrup. de beton. ex sola betonica confecti: oximelitis simplic. ana 3 j. B. misce pro quatuor dosibus: deinde & hoc quod sequitur. Recipe confer. florum betonica, salvia, borag. rorismarini, ana 3 B. nucis muscae conditae 3 iij. confectiois mithridatica 3 ij. oximelitis simplicis, Syrup. de succo betonica, ana 3 j. B. fiat conditum: ex quo capiebat bis aut ter in die, ad magnitudinem castaneae 23. Augusti sequens etiam conditum praescriptum ℞. conferuae boraginis 3 j. conferuae betonica, salina ana, 3 B. manus Christi cum perlis, propter leue deliquium animi 3. ij. misce. erat autem valde exiguum illud deliquium, uti & asthma, quo subinde afficiebatur, ut prius dictum est, cum pectoris angustia: pro quo accidente lingebar aliquando Syrupos sequentes. Recipe Syrup. capill. ven. 3 iij. Syrup. de hyssopo 3 j. misce pectus inungebat cum oleo amygdal. dulc. Quibus remediis dicta symptomata cessabant. Sed rursus ad paralytin, quae omnium grauissima erat, 24. Augusti decoctum infra scriptum in officina fieri iussimus Recipe corticum radicem ciborij, demis leonis (cum breuiter febricitaret) ana 3 j. B. florum cordialium p. j. ciborij, boraginis, betonica, capill. ven. poliric. herba paralytis ana m. j. sem. 4. frigid. maiorum, ana 3 j. passul. ab avil. repurg. 3 j. coquantur in aqua communi pro 3 ix. colatura, adde Syrup. capill. ven. (ob tussim, licet leuem, quae aderat) Syrup. de beton. ana 3 j. misce fiat apozema pro iij. dosibus. Postea & hoc decoctum sumpsit, cum adhuc febricitare videretur. ℞. corticum radic. ciborij, demis leonis, ana 3 j. B. florum cordial. p. j. herba paralytis, betonica, cardui benedicti: chamad. ana m. j. sem. 4. frigid. maior, ana 3 j. seminis caribami parum contusi 3 B. vuar. passul. ab avillis repurg. 3 j. fiat decoctio in aqua communi: pro 1b j. colatura, adde Syrup. rasacei solutini 3 ij. misce. fiat. apozema pro iij. dosibus matutinis: semper ad minus ex eo bis in die excreuit. Et cum aliquando dormire non posset, hoc hordeato sub noctem aliquando vti sumus. ℞. hor-dei mundati 3 j. B. sem. quat. frigid. maior mund. ana 3 j. seminis lactucae 3 B. fiat hordeatum pro 3 viij. dulcoretur sacch. perlato, ut artis est. Hoc hordeato tantum bis aut ter vltus est, cum paralytis magis calidiora requireret, & sicciora & attenuentia, ut est diambra, diamoscus, confectio mithridatica: qua prius vltus fuerat, & theriaca. Quamobrem cum iam bene dormiret, & febricula eum non amplius apprehenderet, & supradicta symptomata cessassent, ad paralytin omnino curandam magis attentius sumus. Et sic 28. Augusti pilulas supradictas iterum exhibuimus, & 30. Augusti, ut magis sudaret, accepit mane 3 ij. theriaca optima cum pauco vino Rhenano, & egregie sudauit, alioqui rursus exhibuimus ad 3 j. Deinde continuando inunctiones suprascriptas, manus iam ad caput mouere poterat, & simul sustentata-

tus a famulo per cubiculum leuiter inambulabat. Septimo Septembris ad paralytin & maius robur membris paralyticis inducendum, hoc quoque apozema praescriptum est. ℞. rad. paeonia 3 B. florum rorismarini stachados, ana p. j. salvia, betonica, maiorana, herba paralytis: folior. lauri, cardui benedicti, ana m. j. vuar. passul. ab avil. repurg. 3 j. sem. coriand. preparati 3 B. cubebae 3 j. coquantur in aqua communi pro 3 ix. stent. infusa supra herbas, mane colatura, adde cinnamomi selecti 3 j. pro aromatizatione, addendo Syrup. de stachade, de betonica, ana 3 j. misce. apozema ad modum claretii, pro iij. dosibus. Hoc apozemate bis ter reuerterat, & conditis supradictis, & illis omnibus remediis cum vltus esset, continuando inunctionem quoque iam dictam: ad membra paralytica destinata, non solum loquela, sed omnia membra paralytica intra mensum suo robori restituta sunt, adeo; ut hic senex miraculo quodam perfecte sanatus, non solum recte incedat, & omnia membra moueat, sed quouis modo, quo velit, ambulet & proficiscatur, nullo vestigio paralyseos relicto, & nunc anno 1592. 2. Iunij, cum haec rescriberem atque colligerem, optime ac pancreatico valet. Hic autem inter curandum fuit obsequentissimus, & strictus quae ad victum tum potum probe extenuantem & exsiccantem conueniebant, & ut sitim toleraret, imperauimus: quod hic maxime vtile est. Haec, inquam omnia quam diligentissime obseruauit, ne latum quidem digitum ab amborum nostrorum praescripto discedens: quae equidem maxime ad curationem iuuerunt, & cum venter per se satis solubilis esset: & lenibus quoque pharmacis adiutus: topica remedia & continuata inunctiones membris paralyticis eo magis robur addiderunt.

SCHOLIA

Quantum ad animi deliquium attinebat: valde leue erat, & vix effatu dignum, a quo facile euasit remediis ad asthma valentibus, ut Syrtipo de hyssopo & similibus: ut filius Procuratoris Regij apud interpretem Hollerij, de quo ante dictum est, qui asthmaticis remediis quoque curatus fuit: quibus & hic asthma, quod similiter leue erat, facile discussum est. At paralytis omnino vniuersalis multo vehementior erat quamquam & haec magna cum nostra laude in se ne curata a nobis sit. Ceterum licet lib. 10. obli. nostratum, aliunde diximus de paralyti, tamen cum & hic senex nobis familiarissimus, alique viri non minus graues quam docti, me instigauerint, ut hunc casum hic infererem, quique hunc virum ita laborantem & viderunt & norunt, voluerunt, ut hac curatione eximia librum meum quoque condecorarem. Quod nullo modo omit-tendum duxi, cum in vita nunquam expertus fu-erim curationem feliciorē hac ipsa, licet 47. annis nunc medicinam fecerim. Imo id ipsum libenter egimus, idque in laudem medicinae, & potissimum omnipotentis Dei, cui non solum haec, sed omnia alia nostra debemus. Hoc enim casus: licet difficillimo, mecum & alij omnes medici docentur, ne statim animum abiciant in morbis difficilibus curandis, qui & continuam ac indefessam diligentiam & maiorem, quam ceteri morbi, qui minus contumaces sunt, requirunt. Quod etiam infra scriptus casus, non minus admirabilis & rarus, quam iam dictus: indicabit.

OBSER-

OBSERVATIO XV.

De praegnante, quae peperit infantem sine osse coagulato à cubito usque ad humerum, qui infans egregie curatus fuit.

Alcida de Renes, matrona nobilis, vxor Ioannis de Oestrum, viri nobilitate clari, & quondam vrbs & arcis Wordenae praefecti, anno 1587. Delphis habitans in aedibus Adriani Ioannis Ichthyopolae in platea Frandrica dicta. Quae quidem praegnans mane ancillis suis absentibus: audiens ploratum infantum, subito ex lecto surgens per scalas admodum praecipites inferius descendens: inopinato cecidit supra latus dextrum, & dextrum cubitum versus humerum, & circumuoluta etiam in caput prolapsa est, non sine contusione eiusdem cum vulnere. At paulo post restituta sanitati 8. menses cum dimidio in Haga Comitum tunc agens in domo Praepositorum, anno 1588. 3. Iulij die peperit puellum: cum brachio dextro à cubito usque ad humerum non tantum resolutum; sed omnino osse non coagulato, ut brachium instar lori in omnem partem flexile, flacidumque concideret, ita ut in brachio à cubito usque ad humerum os abesse videretur. Ad infantem ego accitus vna cum magistro Ioanne Quartellario & Iacobo Timano Capitone dicto, chirurgis. Ex communi consilio adhibuimus medicamentum defensiuum & conglutinans (ut in ossum fracturis communiter fieri solet) ex bolo armeno, farina volatili, puluere myrtillorum, oleo rosaceo, & albumine oui concinnatum, mox superimpofitis ferulis, primo ligneis (quas infans ferre non poterat) deinde chartaceis, ex charta paulo duriore & crassiore (quas nos magis laudamus) insuper super inductis debite fasciis à cubito usque in humerum: ut ita os paulatim coagulari posset. Quibus remediis praeter omnium hominum opinionem hic infans (cui Bruynne de Oestrum nomen erat) miraculose intra tres septimanas sanitati restitutus est, non solum osse coagulato, & paulatim indurato, tum brachio etiam valido existente, verum etiam belle puel-lus nutritus, si quis alius, inter multos infantes & robustissimos & pulcherrimos euasit, adeo ut ad libitum etiam quo velit brachium moueat in omnem partem, non sine admiratione eorum qui puerum viderunt & nouerunt.

SCHOLIA.

Casus hic apud omnes Haganos celebris ac notus, certe dignus est, ut tyronibus medicis & chirurgis, nec non & aliis omnibus innotescat, ut sciant quid medicina & chirurgia prestare possint, etiam in illis morbis, qui in vtero materno originem habent; modo opitulante Deo ab artis exercitatis recte & debite tractentur. Hic autem omnes puerum nunquam ad sanitatem posse peruenire censebant. Attamen Deus Opt. Max. suam benignitatem in puella restituendo demonstrare voluit, qui semper laudandus in mirabilibus suis, & qui medicinam caelitus ad nos demissam ad sanandos agros eum colentibus, liberaliter concessit. Sed mirabitur hic aliquis, unde puer in vtero tale vitium contraxerit. Cui facile respondebitur, cum aliam causam ignoremus, non aliter quam ex metu vel imaginatione, ut in praegnantibus subito metu percussis, ex improvisis diuersa stigmata pueris in vtero materno existen-

tibus imprimuntur, vel alia vitia in vtero contrahunt, tantum valet imaginatio subito expressa, ut longiore sermone dicturi sumus: lib. 28. nostratum obser. de mulierum morbis. Si Deus me superstiti fecerit. Placuit igitur hunc casum hic interserere, quamuis proprie ad illa loca, ubi de praegnantibus & puerperis agemus, pertineat, ad quae etiam transferri poterit: cum ex professo de iisdem impressionibus tunc agemus. Ita puellae ex casu matris in vtero exsistenti tale vitium in brachio inflictum fuit, ut os à cubito ad humerum usque non recte nec debite coagulatum fuerit. Sed rursus alius inferet: cur non etiam in capite puellae aliquid vitij relictum est? An hoc ex metu primo & subitaneo per imaginationem factum, cum mater prius eaderet in latus dextrum supra cubitum, postea circumuoluta in caput, ita ut primus metus & subitaneus, vel prima imaginatio vehementior fuerit secunda, cum in caput pro-laberetur. Nam & alia stigmata quam plurima ex momentaneo metu, vel subita imaginatione contingunt pueris in vtero matris exsistentibus, quae & natis in diuersis partibus corporis per totam vitam permanent: quanquam hic puellus à tam insigni malo recte curatus fuerit. Deinde cum puerpera, scilicet mater ipsa, recte habens & bene valens puellum optime lactauerit, & commoda victus ratione vltus fuerit, cibisque boni succi, & optimi nutrimenti, iisque quae & lac augmentare solent, unde quoque magno cum successu, etiam adhibitis remediis ad hoc aptis, puellus citius sanitatem consequutus fuit, cum & domi quoque nutritrix adesset, ut infans modo lac matris modo nutritrix sugens, debite nutrire-tur, ita robustior euaserit: & attracto nutrimento ad os ipsum, admodum breui intra tres septimanas, ut diximus, debite & recte coagulatum fuerit. At omnibus morbis & symptomatibus cordis paulo ante absolutis, nunc ad nonnulla mammam vitia progredimur, quae post pectoris & cordis mala etiam ab aliis auctoribus explicari solent.

OBSERVATIO XVI.

De lactis defectu.

Cum thoracis affectus ac cordis absoluerimus, etiam mammillarum aggredi consens-taneum est, quae cum thoraci incumbant, & cor attingant (Galeno teste de vtu partium. lib. 7.) de his quoque agemus, non tamen de omnibus, cum nonnulli mammillarum affectus ad libros potius pertineant de tumoribus praeter naturam. Mammae itaque & ipsae pectori impositae: cordi praesidio sunt, ipsum subiectum contingentes pariter & calore fouentes, glandulosa substantia, in quo loco in mulieribus copiosum benigni alimenti superfluum colligi potest: lac videlicet, cuius causa extiterunt. Propterea & mammarum ac vteri maximus consensus est: ita ut neque lactatio, neque menstrua purgatio simul esse possint. Quomodo autem generetur ex optimo sanguine, ex Galeno loco citato, quis intelligit. De albatum quidem natura, licet ex sanguine: ne videretur crudele, inquit Rondeletius, pueros sanguine nutriti. Reliqua de his apud Gal. loco citato, & Rondeletium. Nos autem hic primo de lactis defectu agemus. Cum igitur lac in mammis ex sanguine generetur (idem enim est cum sanguine, colore tantum differens. Et cum sanguis sit lactis materia, mulieres quae lac habere volunt, multo sanguine praeditae esse oportet, & ut sanguis ad mammas fluat, curandum.

curandum. Quare duæ erunt potissimum penuriæ lactis, aut quia paucus est sanguis, aut quia ad mammarum venas non pervenit: sed de causis latius in scholio. Cæterum matrona proba Iodoca Teylingia Augustini Teylingij vxor socrus mea, quæ viginti proles ex vno marito exceperat; ne lac deficeret, semper solita erat vti lacte decocto cum hordeo excorticato in partes contrito: vulgares appellant *gort*, alij *gruten*: quo cibo perpetuo vtens: miraculi instar lac ad mammillas euocabat. Solent enim mulieres Alcmariæ hoc solo præsidio vti. Refert Amatus centuria 4. curat. 92. de muliere puerum lactante, cui deficiebat lac, non propter mammillarum aut corporis totius siccam intemperiem? neque ob sanguinem altera qualitatum infectum, calida, frigida, humida, sicca, neque ob puerum imbecilem lac sugere è mammis non valentem: sed quia sanguis bonus, sed paucus in corpore esset; ideo iubeat, vt cibariis optimis & sanguinem gignentibus vtatur. Sic & nos istis diebus talem quoque nacti, consulimus, vti *ovis recentibus, testiculis gallorum, succedularum, turdorum, perdicis, phasianis, atlagenis, tum assis, tum etiam iurulentis, adiecta origano, vtatur*: carnibus quoque vitulinis, veruecis, & ferculo Hispanico (Græci *ρουσφαρον* appellant) quod per se sufficit. Dedimus & maritos panes, amygdalas saccharo incrustatas, vnam passam, & varia bel-laria, vinum quoque optimum & odoriferum. Quibus lac ad mammas attractum fuit. Anconitanæ mulieres hippocampum pisciculum flexuosum, in puluerem redactum: & vino exceptum, ad lac prouocandum bibunt, & optime votis respondet.

SCHOLIA.

Lactis defectum appellamus: vel quod exiguum admodum existat, vel omnino deficiat. Facile etiam hic percipitur, mammillas affectas esse. A partu enim cum natus est infans: mammis rursum totum alimentum affluit. Quo fit, vt lac menstruo germanum esse inquit Hipp. & quod eodem tempore menstrua belle procedere nequeant, & fœmina lactare: vt Galen. asserit. Proinde quibus menses mediocriter feruntur, iis lac in mammillis non colligitur: quibus vero hoc large suppetit, iis plane menses supprimuntur. Hoc itaque tempore, ac reliquo toto, quo mulier lactauerit, si lac deficiat, mammillas affectas esse non abs re fatemur: siue per essentiam, siue per consensum affecta sint. Earum vero affectus symptoma est in genere retentorum immodice. Causas duas potissimum esse diximus penuriam lactis, aut quia paucus est sanguis, aut quia ad mammarum venas non pervenit. Si multus sit sanguis in corpore, & ad mammas non perveniat, hoc fit, vel propter venarum angustiam: vt Rondeletius dicebat; aut obstructionem, aut propter sanguinis crassitiem. Defectus sanguinis est, aut propter totius corporis atrophiam, quam mulier ob pitcam: aut alimentorum fastidium contraxit tempore in prægnationis, vel quia post partum tanta sanguinis copia fluxit, vt retractus sit ad partem inferiorem, aut quia venæ plus iusto inanitæ sunt. At quoniam lactis materia sanguis est, vel dictum est prius, in venis contentus, quantitate aut qualitate contemperatus, tum ab aliis partibus transmissus: tum etiam à mænis ipsis attractus, vt 5. de simpl. medic. facult. est videre, propterea non ab ipsum sanguinem contemplari eodem loco precipit Galen. & citatur ab Altimaro, quo prom-

pte inueniatur causa paucitatis, aut omnino defectus lactis. Namque inuenies quod aut paucior est quam conueniat, aut deterior, vt ipse inquit: paucior autem esse poterit, vel quod in toto corpore exiguus affuerit sanguis, vel quod licet exiguus in toto non fuerit, paucior à mammillis attrahitur: id autem interstinguere poteris ex totius corporis temperamento, ac habitu sicciore existente. Ex immodicis item sanguinis aut aliorum humorum euacuationibus præcedentibus, vehementibus exercitiis, laboribus, vigiliis, fame, mœrore, vel solitudine: aut arida æstuantem febre, vel id genus aliis: quæcunque plus quam expediat: corpus deficcaverint ac calefecerint. Hæc enim sunt: quæ inter alia lac lædunt, ipsique provenire prohibent, vt legitur apud Gal. eod. lib. 5. de simpl. med. facult. nedum sanguinem ipsum minorem redditentia, sed partim etiam qualitatem ipsius vitiantia: quamvis & immodice refrigerantia huiusmodi quoque natura sint. Si vero hæc non adsint: inspexeris autem aridas, macilentas, ac sagittas graciles mammillas ipsas, ob propriam earum imbecillitatem, ac aridam intemperiem provenire: ne valeant tantum, quantum indigent pro lactis generatione, sanguinis copiam attrahere. At si propterea quod sanguis deterior seu vitiosus fuerit, vt pote biliosus aut pituitosus, vel melancholicus existens, lac ipsum deficiat, id tum ex lactis colore, tum substantia, & sapore potissimum interstinguere poteris, præsertim si non omnino defecerit: non tamen posthabita cognitione temperamenti habitusque totius corporis & ætatis. Namque si biliosus fuerit, præter eius tenuitatem ac flauum colorem, amari quodammodo saporis lac erit, aderitque temperamentum biliosum, habitus gracilis, ac ætas florens. Si vero pituitosus sanguis, crassioris substantiæ, albi aut pallidi coloris: acidi saporis, odorisque lac existit, lactantisque intemperies, habitus, ac ætas pituitosi quoque erunt, quemadmodum si vehementioris fuerit spissitudinis, ac paucitatis: obscuriorisque, ac quodammodo nigri coloris lac ipsum & reliqua quæ diximus, melancholica fuerint, melancholicum quoque sanguinem adesse significabunt. Hæc tamen affectio, quamvis insantibus magis quam mulieribus grauis sit, teste Aëtio, cap. 33. lib. 16. non propterea despicienda erit: cum abque aliquo eiusdem mulieris præter naturam affectu, etiam gigni non possit: quapropter ubi imminuitur lac, aut omnino extinguitur vel corrumpitur: aut spissatur, vel attenuatur: præstat quidem alterius nutricis lac præbere, quemadmodum Aëtius præcipit lib. 4. cap. 6. Sin autem id non permittat res aliqua infans, victu nutritrix curanda est, vt ne in morbum incidat infans, vt ipse inquit, ac ipsa sibi quoque meliorem vindicet sanitatem. Neoterici, vt Vallescus, hæc insignis prognosticis adiiciunt ex Rhaz. 4. Almanz. Lac illud melius est, cuius gurgula vna supra vnguem stillata neque multum subtile sit, nec vaide crassum aut coagulatum: bonum habens odorem & dulcedinem convenientem optimum est: ac salsum, male olens, nullo modo infanti conuenit. At mulieri in vtero habenti, lac ex mammillis multum fluens, debilem fortum (ex 5. aphor. 52.) notat. Si mammas duras habeat, fœtum sanum designat: si mulier quæ neque prægnans est, neque conceperit, lac habeat, huic menstrua defecere 5. aph. 38.

OBSERVATIO XVII.

De muliere satis extenuata & graciles mammas habente, ex defectu lactis laborante.

Matrona quædam proba cum peperisset & defectu lactis laboraret, neque libenter infantem alteri nutrici commisisset, ad eandem cū consilij causa intrasset, atque animaduertissem, eam mammas satis graciles habere, & quod ipsa esset vitumque extenuata, huic alimenta optima calida mediocriter & humida, quæ plurimum nutrent, & multum sanguinem generarent, præscripsi, cum & ipse Gal. in lactis defectu ex sanguinis paucitate victum humectantem & calfacientem vtilem esse scribat 5. De simpl. med. facult. & cum medicamenta, ait, quæ non deficiant & modice calfaciant, lacti generando vtilia sint: quorum copiam habes apud eundem, & Paulum & Aëtium, lib. 16. c. 33. Ideo & alimentum augere duxi, & melioris succi cibos dare, panem optimū scilicet, una recentia forbilia, iuscula, carniū succos, & vinum optimum, cum satis diues esset, & pullos gallinaceos, & ex fructibus. vvas passas, pitachia, amygdalasque dulces: Iussi quoque vt mammas confricaret, & aqua tepida cum spongiis fouerent: hoc enim modo venæ, quæ ibi sunt, dilatantur: tum vberum frictione moderata ac fomentis per spongas, Aëtio teste, sanguis etiam ad mammas trahitur. Animi affectus immodicos, præsertim mœsticiam vt vitaret, imperavi, & vt bene dormiret ac aleretur: caseum quoque recentem concessi, & præcipue lac cum oriza & hordeo mundato. Radices quoque pastinacæ domesticæ in iure pulli ac veruecis commode fumebat. Quibus quidem cibis medicamentosis non solum habuitur euasit, verum etiam infantem alere potuit, vt non opus fuerit aliena nutrice.

SCHOLIA.

In defectu lactis, causæ ipsæ diligenter prius perscrutanda, deinde amollienda. Si enim diminuat lac ob exercitium, dimittendum, & nutritrix in quiete & tranquillitate seruanda: si ob aliquem fluxum vel ventris, vel menstruorum, vel hemorrhoidum, is prius restitui gaudens erit. Ideo si menses nimis fluant, retinendi sunt. Si itaque ob totius corporis atrophiam ob famem, vel quia post partum sanguinis copia fluxit, & venæ plus iusto inanitæ sunt, nutriendæ erunt optimis alimentis calidis & humidis euchymis, vt iam diximus. Si propter crassitiem sanguis non fluat, leuiter incidentibus & attenuantibus, neque multum exsiccantibus, est vitendum, & illa sint potius alimenta medicamentosa, aut condimenta alimentis permixta, vt herba fœniculi, apij, petroselinæ, vel radices aut anethi virid. Illa sunt iusculis admiscenda, & recentia esse debent, ne siccitate sua potius lac extinguant, quam generent. Zinziber magis tamen conditum, vel siccum, non tamen exangue, & cinnamomum in pauca quantitate in condimentis sunt vtilia. Vinum quoque tenue, album, vel fuluū conuenit. Neque illis vsus est interdicendus cœparum cocturum, vel in iusculis vel sub cineribus. Valent & foras mammarum cum rebus humectantibus, decocto malvæ, althææ tam rad. quam foliorum, post frictiones, vt venæ dilatentur. Sed minime audiendi practici illi, vt admouit Rondeletius, qui pul. ex sem. fœniculi & aliis calfacientibus

Pet. Forest. Tom. 2.

& attenuantibus, & resiccantibus componunt, vt corallo, qui nec sanguinem generat, cum non concoquatur, nec in sanguinem vertatur ob siccitatem & duritiem, neque propter eius qualitatem, cum sit frigidus & sicus, potest iuuare concoctionem, neque sanguinis generationem. Herba fœniculi ob suam humiditatem minus siccatur, & ad sanguinis distributionem multum valet, & proinde ad lactis generationem; semen, cum siccum sit, deficcatur: sed recens, vt eruca recens, auget; sicca minuit. Ad res calidas & humidas, multum sanguinis generant, vt lac animalium in cibis sumptum, dulcia, & alia id genus. Si autem sanguis non fluat ob angustiam venarum, optimum erit aqua tepida mammas fouere, vel sinapismum debilem, aut dropacem supra pectus ponere, vt sanguinem ad partem trahant. Sed diutius non oportet supra mammas sinere, ne id quod attrahunt, digerant, aut inflammationem in ea parte procreent. Hoc modo fiet, iuxta Rondeletium. ℞. sicum maceratum in aqua lib. j. pissentur diligenter, postea adde sem. synapi tenuissime triti 3 j. misce. ponatur supra mammas vel dissoluatur, & pix misceatur multo oleo: & post aliquam frictionem applicetur supra mammas, vel potius in circuitu mammarum, sub clauiculis, & sub alis; nam per illas regiones venæ ad mammas perveniunt. Frequenter sugere mammas, vel exprimere, lac effluere facit. Curbularum appositio cum paucio igne, paulo infra clauiculas ad sanguinis attractionem prodest.

OBSERVATIO XVIII.

De defectu lactis ex lacte vitioso.

Laudatissimum lac est, moderatum (inquit Paulus lib. 1. cap. 3.) spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Commendatur & quod in vnguem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito, neque tarde videtur defluere. Iam vero in hunc modum probari potest: infuso lacti in vas vitreum, coaguli exiguum admiscetur, digitisque agitur. In quo postquam concreuerit, inspicitur, num casei portio minor fuerit quam serum; hoc enim lac inuitale est. Contrarium huic concoctu contumax: probatissimum, quod vtraque habet mediocritas. Sic nos ad nutricem acciti, vt lac probaremus, biliosum, quod & deficiebat & corruptum erat tenue, flauum & aliquo modo amarum: vt illud corrigeremus, dedimus prius syr. ex succo intybi, & ex succo infus. ros. communium, vt ita ad purgationem magis præpararetur humor biliosus. Deinde purgans medicamentum elegimus, quod humectaret, & minime exsiccaret; & sequens dedimus. ℞. syr. ros. pallid. sapini infus. 3 j. casei recens extracta, mamma selecta, an 3 ss. aqua casei 3 ss. misce, fiat potio brevis forbitionibus, in quibus lactuca & hordeum excorticatum incocta erant, alimus: & vt nutritrix laborib. abstineret, iussimus à vigiliis quoque, tum fame ac mœrore: & ad lac etiam augendum, fœniculi radicem in ptisana decoctum præbuimus.

SCHOLIA.

Si ex deteriore sanguine bilioso lactis defectus contingat, bilis erit contemperanda, & leuiter purganda cum syr. ex pluribus infus. ros. & similib. ubi enim actius tenuiusque lac euaserit, iuxta Paulum, multis quidem tunc laboribus nutritrix leuare, forbitionibus autem & carnib. suillis,

foillis, sepeque & vini dulcis potu reficere conuenit: omne vero lac vitiosum, siue crassum siue acre fuerit & scetidum, puerum, qui prius suxerit, eadem qualitate inficit. Lac autem acre numquam ieiuno exhiberi debet. Fastorem eius vinum odoratum & cibi dulces (eodem Paulo auctoritate) emendare possunt. At pari ratione nigra bilis, si ea causa vitiosi sanguinis fuerit, ac defectus lactis, expurganda erit medicamento, quod talem vim habeat, nec tamen exsiccat; veluti est diacatholicum seu syr. Domini Augustini, si cum manna aut cassia fistula ea permisceas. Verum si pituitosus fuerit sanguis, medicamenta requirit, Galeno teste, excalfaciencia, aut primo aut secundo ordine, non tamen desiccantia; & inter ea potiora sunt medicamenta nutritoria, ut scniculum & anethum, virentia tamen & humida; radix & semen scniculi pitisanæ incocta, iuxta Paulum. Et ideo si lac crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, epoto oxymelite laboribus cibum præcedentibus eadem extenuabitur: & in cibo conducunt hyssopus, origanum. Ad lac quoque generandum valet, pastinacæ radix; ita & lini semen cum melle linctum; iuxta Aëtium. Sic & radices siferis, caryotæ coctæ cum iure pulli, & comestæ, lac præstant.

OBSERVATIO XIX.

De lactis redundantia.

Redundantia lactis laborant mulieres primis diebus post partum, quia multus sanguis mittitur (inquit Rondeletius) & non absorbitur; aut quia non fugitur. Quando enim plus alimenti ad mammas defertur, adeo lac redundat, ut ex eius ampliore plenitudine mulier grauetur ac doleat, ita ut copiam eius ferre nequeat: præsertim cum è mammis non effluat, & propterea intus detinetur. Contingit autem sæpius puerperis, non raro autem reliquis lactantibus, ut in scholio latius dicturi sumus. Sic nutrix quædam ad nos venit adeo lacte abundans, ut mammae dolerent, lacte intus retento. Huic statim occurrendum esse putauimus, ne inflammationem mamillarum incideret, vel casei instar lac coagularetur, seu in grumos verteretur: facile enim, si & lac vitiatum fuerit, mammarum vasa exulcerat, scabiem, panos, & papularum eruptiones quoque inducit, ut Aëtius annotauit, & nos quoque sæpe in praxi quotidiana vidimus. Quapropter ut lac minueremus, paucissimos cibos minusque alentes ut caperet, consulimus, exiguum quoque potum & ceruissiam tenuem; ita & crassiore & vinum inhibuimus: partium vero infernarum exercitia concessimus, & quia sanguine abundabat, & vires ferebant, venam mediam in brachio secari iussimus. Sic quidam, si in toto corpore sanguis abundat, fieri iubent, vel internam venam secant: postea & tali venam incidunt, modo vires serant: imo circa initia, si quid non impediens, poplitis vel tali venam secant, copiosumque sanguinem ex ea vacuant, per eam enim fieri inflammationem prohibent. Et si altera mamillarum magis oblata sit, è directo venam secant, potissimum autem id seruari iubent in puerperis, ubi menses retineantur, totisque viribus præter venæ sectionem, eos prouocare vincunt: nam quibus menses mediocriter feruntur, ut prius dictum est ex Galeni sententia, iis lac in mammillis, multum præsertim, non colligitur. At si non retenti sunt, mediam vel internam secant.

Post venæ mediæ sectionē spongia puram, mollis posca egelida imbuta expressamque super mammas, fasciis accommodauimus, atque linteum aceto imbutum imposuimus, & assidue iuxta Aëtium humectauimus, ita ut non sit subleuata inflammatio: & corpus etiam purgauimus medicamento non admodum calfaciente, in hunc modum. *℞. syr. ex infus. ros. pallid. cum agarico ʒi. ss. aquæ acrimonia ʒiij. misce*, & victu attenuante utens, ac incidente, & copiam sanguinis minuente, à dolore mammarum ex lactis plenitudine sanata fuit.

SCHOLIA.

Lac autem ut plurimum colligitur, oppletis sanguine communibus venis, quæ à mammis pertingunt ad vteros. Id etiam contingit mulieribus vtero gerentibus, interdum ob conceptus imbecillitatem, interdum vero cum neque grauida est, neque peperit, sed ei mensura defecerunt. Hipp. auctor *Aph. 39. & 52. lib. 5.* de quibus modo noster sermo non est, cum de his verba facimus, quibus à partu, aut reliquo lactationis tempore, adeo creuerit in mammillis, ut propterea mulieres grauentur, ac doleant, ita ut metus sit, ne vbera inflammatione corripiantur. At in mulieribus, quæ primis diebus post partum hac redundantia laborant, Rondeletius suadet, ut potius ante partum aliqua repellentia apponantur supra mamas, ne tantam sanguinis copiam recipiant. Nam postquam lac multum receptum est, non potest repelli, sed per mammas euacuari debet, aut suctu aut alia ratione. Attamen Soranus ubi mammae assidue doleant, scribit non debere à mulieribus neque infantibus exsugri, nam suctione plus materiæ attrahi asserit: id quod Paulus confirmat *cap. 35. lib. 3.* Altimarius ex Aëtij sententia, *cap. 34. lib. 16.* ab adultis ac peritis mulieribus mammas puerperarum leuiter exsugri posse scribit: præsertim ubi non immodice doleant, seu inflammatae sint: effertur namque foras leni hac exsuctione, quod in mammillis lac continetur, neque plus materiæ ad eas trahitur, & propterea inflammationem fieri per eam prohibetur, potius quam irriteretur. Prohibetur quoque lactis exsuperantia, dorsum trahendo, & appositione cucurbitularum in emunctoriis & pectus, si sufficienter non fluat sanguis: deinde linimento in circuitu mamarum & sub alis imposto, ut *boli arm. ʒiij. spongiae bedeg. rad. bistortæ, an. ʒi. ss. cum oleo ros. & pauco aceto reducuntur ad formam linimenti*: illinantur prædictæ partes. Supra mammas cataplasmata digerentia ex hord. far. cum oxymelite, vel ex herbis digerentibus cum quadam adstrictione apponenda, ut mentha, absinth. & aliis. *℞. mentha sicca, m. ij. absinth. m. j. fiat decoct. tundantur, & per cribrum excipiantur: quibus adde farina fabarum vel orobi vel lupinor. an. ʒiij. cum decoct. & pauco oleo lior. fiat catap.* Supra papillam vtile erit. *rad. chelidon. maioris decoctam & conuexam apponere, si hæc non iuuent, cerusiam, litharg. cadmiam in vinum aqua reducere, commodum erit, & alia adhibere, quæ citra calfaciēnem digerunt, & medicamentis pituitam purgantibus corpus vacuare, & tenui victu attenuante & incidente utendo, copiam sanguinis absorbere.* Aëtius palmulam, cum pane ac posca tritam apponit: deinde eas moderate vincendo constringit, vel ouo toto cum rosaceo inducit, vel lentes aqua marina incoquit, & cum decocto mammas abluit, lentelque contusas imponit. Quod si lac omnino reslinguere volueris, alu-

alumen & psyllium cum aceto & coriandri succo ac rosaceo adhibere, ex eiusdem Aëtij testimonio. Hæc tamen in puerperis, quæ vitro lactis exsiccationem postulant, ut sequenti Obser. dicemus, cum cautione adhibenda existimo: nam sæpe vidimus, qui multa repellentia mulierum mammis post partum apposuerunt, pessima symptomata induxisse: præsertim si asthmate vel ex pectore laborent, ut euenit Barthildæ Verlanæ, uxori Bartholomæi Teylingij sororij mei: cui cum appositum esset ex alicuius medici alioqui doctissimi consilio, emplastrum supra mammas post partum exsiccantium, facta est deinde magna obstructio in membris spiritalibus, etiam oborta tussi cum catarrho ad pectus destillante, ut per sex deinde annos continuo pessime habuerit, perpetuo catarrho ac tussi obnoxia, ut tandem tabida quasi euaserit, & ad finem perpetuo valetudinaria vixerit, licet nostra industria, Deo auxilium præbente, longius vitam protraxerit.

OBSERVATIO XX.

De lactis exsiccatione in puerperis nobilibus.

Non desunt delicatæ & nobiles puerperæ, quæ proles suas minime nutrire velint (quod tamen præstare esset) ita ut à partu statim lac in mammis exsiccari iubeant, vtique mammae solidiores maneat sine lactatione: ideo quædam obstetrices mammas oblinunt melle, hoc enim modo Gheertrudi Bronkhorstæ cognatæ nostræ lac exsiccatum fuit. Noui & alias, linteum aceto inculcatum, in quo prius ebullierat crocus hortulanus, commode applicuisse: nonnullas & folia viridia nucum apposuisse. Sunt & qui prohibent lactis generationem in mammillis, cum vnguento populeo, aut panno lineo, succo menthae inculcato & appposito: aut cataplasmate induto, ex radic. caulium, farina fabarum & lentium, cum croco & sale, & nuce cupressi. Matronæ Veranæ, quæ crescere mammas non patiuntur à partu, inhibent lactis prouentum (teste Alex. Bened. To Veronensi, lib. 11. c. 16.) emplastro ex melle, croco, terebinthina confecto, mammis imposito. Atque eo tempore iuscula non sumunt, neque vinum album bibunt, neque tenue. Sed & aqua marina fotu prodest. Obstetrices Delfenses lac exsiccant in puerperis panno lineo, oleo raparum intincto, vndique mammillis imposito: aliumque pannum linteum melle intinctum vel illinitum primo panno superimponunt: interim sub parte inferiore incipiendos mamillas debite constringunt, ut minus propendeant, illud in Iodoça Teylingia cognatæ nostræ experti sumus.

SCHOLIA.

Mulieribus nobilibus ac ditioribus, quæ à partu lac omnino restringere petunt, præstat minus repellentibus ac reprimentibus uti, sed tutius iis medicamentis, quæ ipsam siccant atque digerunt, adhibitis, tamen prius per vincula, cucurbitulas, frictions, seu venæ tali sectionem, modo vires ferant, prout postulat usus. Tale habes medicamentum per Altimarium expertum, miraculo quodam id præstans, sine metu futurae inflammationis. Habet autem *feniculi, apij, petroselinij, maluarum & althææ cum rad. an. p. j. foliorum lauri, florum chamæmelis, an. m. ss.* quibus in aqua arte decoctis, ac in largiori vase proiectis, tectis

Pet. Forest. Tom. 2.

desuper panno lineo mammillis, eas fouere præcepit: deinde eodem decocto mammas abluit, ac post ablutionem, rosaceo omphacino illinit, quo tempore, ut leuiter quoque exsugantur, permittit, ut reliquum quod in mammis continetur lac fusum ac liquatum promptius foris effluat, nec materia aliqua ad eas trahatur. Resinæ terebinthinæ deinceps quantitatem, quæ satis sit, assumens, vino albo & odorifero, ac aqua ros. sapius abluere iubet; cui duo aut tria oua tota, ac croci ʒj. adiacere permittit, & in emplatri formam seu cerati, cera addita, redigit: quod super lineo linteo, eoque crasso extensum (perforato tamen in duabus partibus, ex quibus mammillarum papillæ extra prominere possint) imponit, ac fasciis circumligat moderateque constringit. Singula autem dicta iterari facit bis saltem in die, videlicet mane & vespere, ante cibum, ita ut prius mammae foueantur, abluantur deinceps & illinantur, exsuganturque leniter, & demum emplastrum dictum imponatur: & fasciis moderate constringatur, ac ligentur. Elidæus Paduanus medicus & præceptor meus Bononiæ, lac exsiccabat inunctione olei ros. & menthae, etiam mammis emplastrum de mentha imponens.

OBSERVATIO XXI.

De lacte in grumos conuerso.

Apartu aliquando, teste Paulo, lac in mammillis casei modo coagulatur, vel in grumos concreuit: quamquam hic affectus neque idem sit, ut aliqui sentiunt, neque eandem causam generationis habeat, cum lac in grumos concreuit ex sola causa frigida, sed tantum coaguletur in speciem casei causa calida, ut ad longum videre poteris ex mente Galeni, Pauli & Aëtij apud Altimarium: & ambo affectus pertinent ad morbum in numero seu magnitudine, & facile ab inuicem distinguuntur, grumescens quidam à frigida intemperie, & lac coactum casei modo, à calida. Vterque autem affectus statim curandus est, ut inflammationem pariat aut ulcerationem mamillarum, præsertim, si etiam vitiatum lac fuerit. Ita Maria Ioannis, vxor Iacobi Teylingij, sororij mei, cum post partum lacte in mamilla dextra abundaret, & inter sugendum mamillam nimis nudasset tempore admodum frigido, mamilla indurata est, & dolorem incurrebat. Cum itaque suspicionem haberem lac in grumum esse conmutatum, præcepi ut mamillam inungeret oleo liliaceo anyg. dul. & butyro recenti simul mixtis, addita adipe gallinacea: quo remedio dolor imminutus est, & durities mitigata, ita ut denuo effluente lacte infantem lactare poterit.

SCHOLIA.

Amo, nempe coagulatio in caseum vel grumum, modo sunt ex lactis copia, modo ex lactis crassitie: vel potest lac concrevere in mammis, post usum medicamentorum refrigerantium, vel nimis calfacientium, aut post contusionem aliquam. Hæc facile innotescunt, ut iam diximus ex ægræ sermonibus, & temperie: lac enim, teste Gal. non aliter quam sanguis extra vasa existens, in grumum conuertitur frige factus. Et quia ex variis causis sunt, curatio etiam varianda. Si enim ex crassitie lactis eueniat, extenuante victu utendum. Si ex redundantia lactis, & nondum in grumum conuersa, à peritis mulierculis,

Z ij vt

ut prius dictum est, leniter exsugendum, atque sensim mentha & fenugraci succo illinenda, & alia peragenda, quæ de lactis exuberantia diximus. Si ab immodico calore calefactum sit, victus ratione ad frigidum inclinante instituta, eisdem fere medicamentis, præsertim circa initia, utendum erit, quæ scholio Obs. 17. De lactis exundantia diximus, ex Paulo & Aëtio: priuatim autem Aëtius furfures in aceto coctos, cum decocto rutæ mammis imponit, vel mentham cum polenta, aut iuglandes cum ruta ac melle: vel cuminum cum polenta, & crocum cum lacte, aut apium viride, vel folia solani seu haliacabii, cum brassicæ foliis, pauca myrrha ac croco adiectis, & exiguo aceto iuant & epithemata ex fenugr. sem. lini & althææ decocto, cum oleo viol. & exiguo aceto. Si in grumos sit conuersum lac, victu extenuante utendum, ad calidum inclinante, lentium decocto, & aqua marina fouenda, aut oleo calido dulci: inungenda cum oleo amygd. dulc. aneth. amygd. & polline farinaceo, cum sem. lini apposito, coagulum leporis potum, vel pauco aceto, butyro mixtum cum oleis dictis illinenda. Alij cataplasmatib. & vng. incidentibus & detergentibus lac dissolunt: vt 24. succi apij quart. ij. oxy-mel. 3 ij. farinæ cicerum rub. & oryza, an. q. s. ad incorporandum fiat cataplasma. Si his medicamentis non dissoluatur, vel glandulæ indurentur, & suppurentur, tunc suppurantibus iuuanda est natura vt rad. althææ. lilior. alb. an. quart. j. ficuum paru. xx. decoq. in aqua donec mollescant quibus adde axungia porcina non salita, aut butyri recentis quart. 6. coquantur, & cocta contundantur, & fiat cataplasma, adde olei communis parum. Quando materia est suppurata, aperitur locus, & curatur postea vt vlcus sordidum, de quo postea. Est & aliud quoddam vitium in ipsis mammillis, Græce γειρία, Latinis Pilare malum dictum: cuius & meminit Aristoteles lib. 7. cap. 2. de quo & Benedictus Veronensis medicus etiam mentionem facit lib. 11. cap. 12. Plinius & pilos in mammis è partu innasci tradit: eos mastos herba (inquit) sanat indita. Gisbertus Horstius medicus nosocomij Mariæ consolationis Romæ, cum ibi esset, hoc malum fieri dicebat, tum puerpera pilum hauserit, tumque dolor magnus mouetur in mammis, nec sedatur donec pressus exeat, vel sponte, vel cum lacte exsugatur, vt ebantur in nosocomio vng. ex lithar. aceto, & oleo, sed præstantius est, vt exsugatur.

OBSERVATIO XXII.

De dextera mammilla inflammatione.

Puerperæ bene purgata in partu inflammatio oborta est, post tres septimanas in mammilla dextera: in febrem tertianam quoque incidit hæc ipsa. Ad quam acciti, cum mammilla rubicunda esset, cumque aluum non deieceret, lenitium exhibuimus: deinde altero die, cum minus febricitaret, internam gibberivnam secumimus, moderate sanguine extracto. Quod si in principio mentes non satis fluxissent, & retenti fuissent, ex tali vena id fieri iussissem. Mammam quoque statim inunximus vng. popul. & ros. simul mixtis. Sed cum inflammatio non sedaretur, rosaceo vsu sumus, etiam succo solani cum aceto, postea etiam adiecto decocto chamæmeli & sem. lini. Cum autem transacto inflammationis principio nondum cessaret malum spongiis in hoc decocto madefactis, & etiam cum linteis lineis impositis, id

mitigare in hunc modum studuimus. 24. folior. maluæ, viol. an. m. j. flor. chamæmill. meliloti, an. m. 6. rad. althææ 3 j. se. althææ, lini fenugr. an. 3 ij. simmitatum anethi m. 6. bulliant in aqua communis. q. s. adde olei ros. chamæm. an. 3 ij. aceti 3 j. misce. postea ex farina hordei, lini, fenugraci cum panetrito in oleo sesamino & aqua decoctis, adiectis duob. vitellis oui & croci exiguo, fiat emplastrum, quod mammis apponatur. Et cum rursus purgata esset cum infus. rhab. febris cessauit, & topicis dictis ab inflammatione etiam liberata fuit, neque ad suppurationem malum deuenit.

SCHOLIA.

Mammæ, vt cæteræ partes corporis, sape inflammationem incurrunt, non solum confluentem ad eas sanguine, verum etiam ob lactis copulam vel coagulationem casei instar. De quibus dictum est prius, & propriis signis facile interioscuntur. Quæ à sanguine sit, omni tempore euenire potest: reliqua non nisi puerperis & vterogentibus, vel quib. menses detenti sunt præter naturam. Ex quacunque causa fiat, non est spernenda eius curatio: nam cum latior & adnosa earum substantia sit, nec multum obtineant innatum calidum; metus est, ne in scirrosam tuiorem & demum in cancerosum vergat, aut ea suppurata, ac ad abscessum progrediente exedens vlcus consequatur. Iuat autem hic in principio, modo vires ferant, venæ sectio, vt iam diximus, etiam purgatio, quæ leniendū purgat, vt manna, cassia, elect. lenir. diacatholicon. Postea hæc ad topica confugiendum, quæ reprimunt & repellunt: non tamen valida, vt madefacti linei ex aceto, vini albi & aqua gelida mammis impositi, sape reiterati. In incremento, farina hordei cum oleo rosaceo, repellentia cum digerentibus permiscendo, vt farinam hordei cum succo semperuiui, olei chamæmill. & pul. ros. postea in statu addendo magis digerentia, vt oleum aneth. chamæmil. acetum, cum decoct. rad. alth. & seminis lini, & emplastr. ex sem. lini, fenugraci & rad. althææ: & in declinatione etiam de mucilaginitibus. Quibus si non discutitur, & ad suppurationem veniat, tunc erit iuuanda suppuratio, vt exemplo sequenti docebitur.

OBSERVATIO XXIII.

De inflammatione seu apostemate mammilla sinistra in suppurationem conuerso.

Mulier intra mœnia Delphi, ad fossam aqueam dictam, decubens, cum inflammationem mammillæ sinistrae pateretur, quæ neque resoluti possit discutientibus, & ad suppurationem tenderet, illico suppurationem adiuvandam esse diximus, idque medicamentis temperate calidis & humidis emplasticam vim habentibus, quæ & maturationi & suppurationi, iuxta Gal. 5. De simpl. medic. facult. opitulantur. Ideo post fotum emollientem ex rad. althææ & foliis maluæ, rad. lilior. & foliis viol. ac flor. meliloti, etiam sequens cataplasma mammillæ imposuimus. 24. folior. maluæ, an. m. ij. rad. althææ, 3 ij. rad. lilior. albor. 3 ij. coctis & confusis, adiecta farina tritici, ac hordei farbar. an. 3 j. butyri recentis, 3 ij. ping. gallinæ, caponis, porci crassati. an. 3 i 6. olei liliaci q. s. fiat cataplasma. quo sine incisione ruptus est abscessus, alioqui inflammatione in pus permutata ad disruptionem ferro vel acrioribus medicamentis deuen-

deuenissem. Quemadmodum istis diebus in nostra vicina, filia Ioan. Montfortij Machtilda nomine, præcepimus, vt scalpello aperiretur: quam empirica mulier tractans, cum ingenti dolore & febre magis afficeretur, etiam postea ex pure corrupto, noluit adhibere, nisi prostremo coacta eam admisit, & scalpello per chirurgum aperta pure effluente, nocte subsequente egregie dormiuit, cum multis antea dieb. dormire non potuisset. Et ita huic, tum alteri mulieri supradictæ, repurgato vlcere, chirurgica ope ad consolidationem tandem abscessus deductus est. Libet hic apponere quoddam arcanum, licet supersticiosum, ad inflammationem mammillarum, vt si quis occiderit manu dextra 25. ranas, manumque mammillæ postea applicuerit, idque in principio, curabitur inflammatio sine suppuratione. Aliud quod non est minus supersticiosum, si quis manu tenendo talpam occiderit, tam diu comprimendo donec moriatur, is si manum leuiter ad mammam apposuerit initio; & hic inflammationem curabit absque suppuratione. Talem fuisse in Hagha-Comitis virum constat, nomine Cornelium, cognomento Cannium, mercatorem vestium holosericarum, vt nobis retulit matrona alioqui honesta. Numquid verum sit, penes matronam sit fides.

SCHOLIA.

Apostema calidum, præmissis vniuersalibus remediis, in principio sanat aqua solatri, cum aceto & oleo ros. concussa & apposita. Apponatur emplastrum ex far. fab. foliis solani, oleo ros. aceto & melle paratum, coctum cum succo caulium. Discutit & resouit materiam paratam & dolorem sedat. Alioqui si non resoluatur, 24. far. fabar. fenugr. sem. lini, medulle panis, farina hordei an. 3 ij. croci 3 i 6. rad. bisulue coctæ & confusæ 3 ij. vitellor. opor. num. vj. olei viol. chamæm. an. q. s. fiat emplastrum. Valet in augmento & statu. Vbi maturum est, aperiat: mundificetur cum melle & succo apij & vitello oui; vt linamentum imponatur, & curetur vt aliud vlcus. Si sit frigidum, non conferunt repercutientia sola in principio, nisi misceantur cum resolutentibus & corpore prius purgato. Chirurgus quidam magna cum experientia in apostemate pituitoso utebatur emplastro ex rad. lapathij acuti, maluæ, rad. fenic. in lacte decoctis: quidam in principio adhibent fotum ex vino albo, aqua & aceto spongia tepida admota; postea & emplastro, iuxta Auicem, ex foliis apij bullitis cum vino, atque confusis. Si maturandum, fiat emplastr. ex caricis pinguib. rad. lilior. & cum farina fenugraci & lini, & axungia porcina: illud enim maturat & dolorem mitigat. Maturum aperiatur, vt dictum est. Amatus aperit candente ferro, vt in vxore Eduardi cent. 1. curat. 47. Sed is admonet, quod raro mammilla affecta ad sanitatem reducat, nisi altera sana à lacte excicetur. Excicabitur autem lac, si modo infanti mulier lac sugendum non dederit. Idem si lineis pannis frigida madefactis, mammillam frigeferit, vt super eam puliculam ex fabis & aceto paratam imposuerit. Nec enim timeas de lactis exciccatione; quia bene habente mammilla, vel facillime lac reuocabis; præcipue infantis attractione succuue. Visa enim sunt mulieres, quibus menses ob ætatem grandiorē suppresserant; & tamen illis lac copiosissimum ad māmillas deuenit, solo puerorum succu; quo postea lactarunt, & ad annum & plus, atque ita ac si eos pepererant, Pp. Foleji. Tom. 2.

tractarunt. Ex iis autem mulierib. ab Amato vna Ferrariensis, ætatis quinque supra quinquaginta annorum visa est: altera vero nobilis apud Lusitanos Santaraneensis, nata annos prope sexaginta. Lac aliquando in mammillis virorum admodum calidorum & earosorum, in exigua quantitate visum est; sed rarissime, vt quidā medici referunt.

OBSERVATIO XXIV.

De scirrho mammarum, & duritie.

Scirrhus mammarum fit post inflammationes, aut concretiones lactis, aut diuturniorem vsu repellentium, quæ materiam congelant; aut post fortiter detergentia, quæ id quod tenue est, euacuant, & quod est crassarum partium, crassius reddiderunt. Si autem glandulæ indurentur, strumæ, siue choræades à Galeno dicuntur, cum adenes induratas ait volens esse. Curatur a scirrho eadem ratione, vt in aliis partibus, nempe partim emollientibus, repellentibus & digerentibus: ubi enim inflammatio ad duritiem vergat, ea quæ molliendi vim habent, adhibere conuenit: in quem vsu laudauit Aëtius, cap. 38. lib. 16. semen lini aut fenugraci, cum aceto multo coctum & impositum, aut sesamum illotum modice tostum, cum melle tritum, & calidum appositum: vel sterus caninum album, terebinthina exceptum superimpositum. Cæterum si ex coagulato lacte inflammatio fuerit excitata, eisdem circa initia utendum medicamentis erit, quæ paulo ante de coagulato lacte conferre diximus. Verum si neque eis inflammatio cedat, ad ea, quæ modo commemorauimus, medicamenta progrediendum erit. Et si ad duritiem tendat, ea ipsa quoque adhibenda, quæ modo retulimus. Sic mulieri, cui mamma ad duritiem peruenit, ceratum ex mucagine foliorum liliorum alborum & bisulue, cui oleum lilaceum incoctum cera erat, modica addita, sparadrapo instar liquata, per pânnum lineum rarum seu detritum nonnihil tractum, mammæ apponere iussimus. Est egregium medicamentum, ad omnem duritiem, etiam conferens puerperis, si puerum ablactare velint; ad lactis quoque resolutionem: nam appositum non solum mammam induratum emollit, verum etiam lac intra 24. horas resouit, & in apostema vt transeat, præcauet, etsi videantur suppurari, estque leniens atque emolliens medicamentum & leue maturatiuum. Vt quoque ad mammarum duritiem cerato de mucilaginibus. At Barthildæ Verlanæ, de qua alias diximus, puerperæ existenti, mammillarum apostemate correpta, cum ad suppurationem veniret, & abscessus per chirurgum scalpello apertus esset cum pus postea non bene exiret, dum repurgantibus medicamentis vteretur, duritie quoque oborta in mammilla exulcerata, pus minus effluebat, oborto quoque dolore. Chirurgus cum pulstem ex farina filiginis cum vngu. populeo mammis imposuisset, dolor magis increuit, duritie etiam aucta, neque pure debite effluente. Ad quam accitus, febrem metuens, amota pulste hoc emplastrum admoueri iussi. 24. rad. alth. 3 ij. rad. emulæ campanæ 3 6. folior. maluæ, viol. flor. meliloti, an. m. j. coctis in aqua ad molliem, & confusis adde farin. hordei & olei amygd. dul. quod satis est ad emplastri formam; eoque mammillæ prius oleo amygd. dulc. bene inunctæ apposito, durities cessauit, ac dolor & pus, quod antea crassum erat ac retentum, commode effluere cepit; ita vt breui facta vlceris mundificatione, ope chirurgi deinde probe curata fuerit.

Z iij. Schol.

S C H O L I A.

⁴ *Ad duritiē
mammilla-
rum.* **T**riticum ad molliem coctum & contusum cum fabulo, quod ex cotib. in lintribus, dum ferra acuuntur, defluit, immixtum & appositum, iuuat ad duritiem mammarum: & dialthæa cum vnguento Agrippæ ros. oleo simul mixta & inuncta. Et quod habet *farina hordei, fabar. an. m. j. farina fenug. lini, an. 3. b. vel m. b. olei ros. 3. iij. croci 3. j. misce.* & mammis duris imponantur, Nodi vero ac glandulæ foliis persici mali recentibus & ruta vna contritis sanantur, vt quidam referunt: tragac. gummi arab. vitella ouorum simul mixta cum oleo viol. imponantur. At in muliere mammillas vlceras habente cum duritie, cum pus retineretur, emplastrum emolliens & simul maturans apposimus: & pure effluente, rupto abscessu eandem, vt vlcus, curari imperauimus. ⁵ *Ad vlcera
mammilla-
rum corro-
dentia.* Ad vlcera mammillarum corrodentia scribit Tharantanus eadem valere, quæ ad linguam & os vlcera conueniunt & ad aphthas, ponit lotionem ex mente Auicennæ ex decocto vini nigri styptici, sumach tinctorum, nucis cupressi, cassie lignæ, gallarum & agrimonie. Bayrus ad vlcera mammillarum componit cataplasmata ex foliis hederæ, & cum decocto vlcera foueri iubet. Refert & cannabem syluestrem tusam cum axungia tumores & durities mammillarum curare, saniem expurgare, & dolorem auferre, mammis impositum. ⁶ *Ad fistulas
mammilla-
rum.* Ad fistulas mammillarum ex Valeco valet quotidie bis cum decocto agrimonie, aluminis & myrrhæ lauare, & vnguentum cum tenta imponere. *℞. succi agrimonie 3. j. aloes, myrrhæ, sarcocolla, aluminis de pluma, ana 3. j. cum melle incorporetur vnguenti instar.* Vlcus sigillatur puluere sequenti. *℞. aloes hepat. myrrhæ sarcocollæ, thuris, farine volatilis, sanguin. draconis, terra sigillatæ, aluminis rocha combusti, corall. rub. myrob. citrinorum, balanst. ana 3. j. fiat pul. subtilissimus.*

OBSERVATIO XXV.

De mammarum incremento.

¹ **M**ulieri nobili, cum imprægnata esset, consilium petenti, ne mammillæ supra modum crescerent, præcepit vt panno duplicato in medio perforato, per quod transit papilla, tepide balnearet hoc liquore. *Recipe aquæ portulacæ 3. iv. aceti 3. b. misce.* Hoc modo ante me Ioannes Tyngius medicus Amstelrodamentis, idem ponebat supra mammillam eo die, quo mulier cognouerit se imprægnatam esse, vsque quo sentiat infantem. Alij aquam pomorum arboris quercus in alembico destillant, & panno lineo inculcato apponunt, ne mammae augmententur; quod etiam à partu fieri iubent, ne lacte repleantur. Idem præstare volunt aquam tegulæ ignitæ & sapius exstinctæ.

S C H O L I A.

² *Causa cur
mammæ in-
creuant.* **M**ammæ non solum crescunt prægnantibus vel puerperis ex abundantia lactis; verum etiam puellis, postquam ad eam magnitudinem fere peruenierint, ad quam natæ sunt peruenire: vel quia incipiunt pinguescere, ob redundantiam alimenti, vel quia multus sanguis ad eas partes præfluit, ante mensium eruptionem. Aliis quoque increverunt mammae, quia aluntur flatulentis alimentis, vt castaneis, rapis: quod mulieribus

monticulis accidit, vt refert Rondeletius; quæ mammae admodum indecoras & magnas habent. Quare si quis velit earum incrementum prohibere; sanguinis attractionem impediatur, & partes illas densas reddat, vt non facile sanguinem influentem recipiant. Commendatus succus cicutæ (*prohibet enim incrementum*) aqua myrti, peculi rosar. & aqua destillationis pinearum, cum pauco aceto, & alumine posita super mammæ, intin- & is pannis. Vt mammae parvæ & duræ maneant, nouem diebus mane & vespere cum succo cicutæ fomententur; & herba trita superligetur. Gale- nus spongiam ex aceto madentem superimponi iubet. Erigit mammillas pannus lincus madefactus in decocto gallitrici, mammis superpositus. Valiores minuit, iuxta Paulum, cuminum tritum ex aqua impositum; & spongia aceto madens superimposita, & fasciis alligata. Plura vide apud Valescum, Gordonium, & Benedictum Vetonensem, *cap. 17. lib. 11.* At extenuatæ mammae non ita facile agmentantur, facilius est enim exsiccare, quam siccum humectare, teste Gal. 7. *method.* Frictionibus in principio augmentantur, contrectationibus, & emplastro de pice, & omnibus iis, quæ sanguinem augent, & illis, quæ ad atrophiam ante valere scripsimus. Vide Berti Bononiensem de *ingrassatione & extenuatione mammæ*. Verum hic minime prætereundum, quod papillæ mammillarum puerperis intus lateant absconditæ, vt pueros lactare non possint; quod pauperculis molestum est, multoque magis si puellæ exstentes papillas frictione in totum aboleuerint. Quibus autem latent, phialam vitream (*vt Amatus inbet cent. 5. curat. 51. in muliere Veneta nobili*) oris non admodum latam circumferentiam habentem, feruenti aqua impleri iubemus, ac illico ab ea aquam totam deponi: cuius phialæ sic calentis os ad papillam admouemus (mirum in modum attrahit) qua attractione papillæ formatae manent. Quamvis huius phialæ attractio prius dolorem patiat: quem facile postea coterminunt mulierculæ, cum tantum iuuamentum se inde cõ- secutas videant.

OBSERVATIO XXVI.

De mammarum cancro.

¹ **Q**uamquam hic affectus ad chirurgiam pertineat, pauca hic adferemus. Cum enim tumor durus sit cancer, qui sensim incipit, scirrhus similis, nisi quod dolorem parit: scirrhus vero sine dolore est. Licet graue sit malum, solet aliquando diu protrahi antequam vlcere: vt euenit Catharinæ Bokelli Delfensi mulieri, septuagenaria, quæ per sex annos cancerum non vlceratam in mamma sinistra habuit; postea etiam vlceratam: quo cum integro anno correpta esset vetula, mense Augusto, anno 1650. me prius in consilium adhibuit, cum hætenus nullis præfidiis vsa esset, re iam deplorata, ita vt neque opera manuali, nempe abscissione, curari posset in tam senili corpore, neque enim eradicari poterat sine periculo mortis; cum neque Bertapalia vnquam viderit cancerum curatum, etiam incipientem, (quamvis multa de eius curatione medici scribant & nunc quidam temerarij multa promittant) absque incisione. Sed vidi, inquit, cancerum instar ciccris in muliere pulcherrima; & rogatu amicorum, totali incisione & ruptorio radicitus extirpauit: & partim mihi male successit; & iterum reuersus fui ad curationem, cum euacuationibus

tionibus debitis præcedentibus, & bono regimine & localibus remediis, quæ meo iudicio putabam conuenire. Sed qui aliter se intromittit curationi, vitam agrotantium ad mortem deducit. Et narrat quomodo vetula post illum in curationem admissa saluam pistam & dentibus masticatam apposuerit, & præter spem sanata fuerit; vt sic ipse habuerit laborem, & altera honorem. Et quamquam Galen. fateatur. *Lat. Glanc.* se recentes cancos curasse: confirmatos tamen nequaquam; ideo prognostico habito, hanc nostram septuagenariam curari non posse prædixi. Idem & mecum sensit Henricus Vergerius medicus Haghanus doctissimus, qui vna mecum ad consilium accitus fuit. Post purgationem materiæ melancholicæ (quamquam incipienti sanguinis missione & purgatione & topicis remediis, iuxta Rondeletium aliquando curari possit, vel abscissione si fieri potest) sectionem venæ hic in vetula adhibere nolimus: sed purgationem potius, sed leuiorem, in vetula: deinde & hoc medicamento topico communi consensu vsi sumus, ad palliationem vt vocant: *Recipe succi solani repurgati seu despinati, & diu in mortario plumbeo, pistilloque plumbeo contriti ad leuem spissitudinem 3. viij. Recipe iuræ vulgaris decies lotæ in aqua solani 3. ij. plumbi vsti & similiter loti, vt supra 3. j. olei ros. 3. b. succi solani, vt supra repurgati q. s. in mortario plumbeo ac pistillo plumbeo ad linimenti formam ducantur.* Sic Gal. lib. 2. ad Glanc. solani succum imponit hoc enim medicamentum est eiusdemmodi affectibus. vtilissimum. Quod si agrotus, inquit, tam liquidum medicamentum imponi nolit, præsertim cum domo exire, solitaque opera exercere cogitur, medicamentum ex pompholyge imponendum, quo ad vlceros cancos me vti (inquit Gal.) vidisti. Et ita neoterici quoque vtuntur vng. albo de tutia, de plumbo, de pompholyge. Ceterum longiore tempore hæc vetula sic tractata, nec vlcere admodum præcedente, superuixit, donec annosa obierit. Memini istis diebus nobilem virginem nomine de Meer, quæ cancerum vlceratam in mamma non haberet: cui consului, vt nullo modo vteretur iis, quæ cancerum ad vlcerationem deducerent, cum iam satis longo tempore eodem malo laborasset, licet satis confirmato: sed vt venæ sectione vteretur, cum vires satis constarent, & non adeo vetula esset, & purgationibus insisteret, & iis topicis vteretur, quæ ad palliationem cancri facerent. Sed nostro consilio minime auscultans, ad empiricam mulierem lapsa, & mammillæ vltione vsa est: & magna facta eschara locus apertus fuit: vnde vlcus magis serpens, totam mammillam occupauit vsque ad alas: & tandem totum brachium inflatum fuit, & magna miseria & dolore exhausta, cum cruciatu ingenti, misere vitam protraxit, donec moreretur. Eodem fere modo Margareta Cornelij in insigni Rosa Delfis, mulier crassa & satis vetula, cum cancerum occultum in mamma habebat, ac consuluissim, ne eum medicamentis irritaret, vel aperiret, ad empiricam mulierem conuersa, ad cancerum confirmatum exedentem & vlceratam deuenit, cum tanto fetore, vt quis apud eam vix consistere posset, etiam ad alas & brachium inflatum deueniens, misere tandem obiit. Palliatione ad tempus in ea vsi sumus, post venæ sectionem & purgationem, cum denuo nostro consilio vteretur, his medicamentis ad tempus pro palliatione chirurgus utebatur. *Recipe gummi tragacanthi dissoluti in aqua solani 3. j. vitellorum ouorum (propter dolorem & erosionem) nun-*

ij. camphora 3. b. ducantur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, adiecto oleo ros. q. s. pro vnguento: de- super ponebatur vnguent. diapompholygos, postea vng. priori vng. ros. & simul oleum ouorum, ad 3. b. aliquando succ. solani cum oleo ouorum. etiam postea adiecto oleo cheirino, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo. Aliquando ex oleo ouorum solo cum cera, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitatis. Sed etiam febri continua lenta paulatim cum magno fetore & miseria vitam tandem clausit, anno 1589.

S C H O L I A.

⁶ **C**arcinofitumores in omnibus consueverunt fieri corporis partibus; sed præcipue in mammillis mulierum, quando potissimum naturali sua purgatione priuantur, vt testatur Galenus lib. 2. *art. curat. ad Glanc. cap. 10. & lib. 14. method. medend.* maxime vero in monachis religiosis & melancholicis, vt in hac vltima domicella de Meer dicta in Campo regio quondam canonica. Vidimus innumeras religiosas apud Clarissas Delfenses hoc malo laborasse, & etiam obiisse; & vnâ quæ adhuc viuuit, quæ abscisso cancro restituta fuit, nostro consilio, de quo alias diximus. Huius etiam exemplum quoque habes apud Amatum, *cent. 3. curat. 32.* Quorum originem etiam ad dignoscendirationem ante Galen. diuinus Hippocrat. prosequitur lib. 2. *de morbis mulierum.* Zoar vero in crucibus potissimum cancos nasci lib. 2. *sui Theor. cap. 27. commendat.* In crucibus ego tantum mulierem affectam vidi; & Amatus vnum tantum se vidisse commemorat in cruce cancerum patientem. Vidi & rusticum, qui in mento & circa labia cancerum habebat: quem Guillelmus de Dalen chirurgus, me præfente, excidit & curauit. Vidimus & mulierem in nosocomio non solum cancerum circa mentum & nasum, sed per totam faciem habuisse, ex lue Gallica prius ortum: & nunc totam faciem exederat ita, vt monstrum potius, quam mulier videretur; quæ longo tempore vitam misere protraxit, donec cum horribili dolore moreretur. In locis quoque arenosis, maxime vero in collo, axillis & inguinibus, euenisse visum est. In corporis quoque partibus penitioribus sæpe in nascuntur, palato, sede, & vtero muliebri, vt sæpe vidimus (præcipue in duabus mulieribus Delfensibus, ex qua vna obiit & altera misere vitam traxit, donec moreretur) quod & Gal. testatur lib. 6. *Aphor. 38.* quos & cancos occultos appellat, non solum eos qui absconditi sunt, & non apparent, sed & eos qui apparent, & sine vlcuratione fiunt.

⁸ Præcipue tamen contingunt in sceminarum mammis, quæ quia fungosæ & inanes, ideo materiam promptè excipiunt: sed in eas, tum de capite, tum ex vtero facilis est decursus. Huius obscura sunt rudimenta, ac plerumque tumor exoritur ciceris magnitudine, cum dolore & calore, quasi ferientis candentis acus (ita hisce quoque diebus Haza Cæsareæ vulgo dictæ in mamma originem habuit) interdum etiam dolore multo: hinc fabæ, deinde iuglandis & cui magnitudinem æquat (ita & in eadem Haza seu Hester vetula muliere iam dicta admodum biliosa & melancholica exercebat) dum tandem in ampliore molem attollatur & increseat. Vidimus sæpe totam mammam occupasse in tribus religiosis seu monachis, vsque ad axillas, quæ omnes tandem misere vitam hauserunt. Quam iam illius materia

Causa

materia aut vetustate, aut errore viuendi, aut medicamentis incalescit, dolor calorque citra inflammationem vehementer exercet: pars conspicue liuescit, aut nigricat, venæ in ambitu crasso nigroque sanguine turgent. Huius continens causa est bilis atra, sanguis feruidus ac retortidus: sæpe ex suppressis menstruis, aut hæmorrhoidibus, nonnunquam ex quartana febris cumulatus. Quo pigrior & ignauior humor est, hoc mitiorem cancerum infert: grauiorem vero, quo is calidior acriorque fuerit. Sic cancer latens citra vlcus, secundum Gal. ab humore melancholico miti oritur: at exulceratus ab aciori & contumaciore fit, vt Galen. *de atra bile & variis locis docuit*. Ille non nisi irritatus excandescit, diu citra perniciem consistit, vt in vetula illa septuagenaria. Hic vero coerceri vix potest, qui breui exescaute se detegat, fiatque cancer exulceratus, vt postea eidem septuagenaria tum domicella supradicta euenit. Sed domicella propter irritationem, in qua & corrupta carnis speciem tumor exhibebat, cum fetore & sordida illuie, horrido aspectu (vt quibus cancer exulceratus) labris præduris & inuersis. Ex quo & sanies tenuis, nigra aut fulua manabat: vapor enim cordi exspiratur cerebroque grauis, febris assidua (vt Fernellius doctissime annotauit) eaque læta inest, frequens animi defectio, quum præsertim cancer mammis inhaeret: exesit sæpe venis sanguis profunditur (vt in domicella prædicta & monacha apud Clarissas) & nisi malignitate ocyus interimat, longe lateque proripit. Curatio clarior euadet exemplo subsequenti.

OBSERVATIO XXVII.

De cancro mammilla per modum Consultationis.

MAlū hoc, quo vxor tua laborat, vir doctissime, cancer est, toti mammilla inhaerens, vt eam quoque apprehendisse videatur: qui licet nondum serpat procedendo, est tamen occultus & latens, quamuis sit tumor inæqualis liuescens & aspectu teter. Incepit autem per se (licet alias scirrhus succedere soleat) quantum ex tua carissima vxore intelligere potui: licet primo exiguum locum tenuerit: nunc tantam in molem excreuit, vt totam mammillam occupauerit instar canceri animalis fluuiatilis (vnde nomen habet) cum in isto pedes ex vtraque parte sint corporis, ita in hoc malo venæ oppletæ, & in ambitu tenæ, pedes huius animalis repræsentare videntur: vel quia adeo pertinaciter hærent loco, quem apprehendunt, vt cancer animal. Puto hoc malum ab atra bile originem traxisse, etiam à mensibus suppressis: nam præter id, quod menses suo tempore non debite fluxere, etiam vxor tua sterilis est, cum nunquam proles susceperit: supra modum etiam melancholica esse videtur. Et quamquam hoc malum per sui initia, priusquam in membro figitur, curari potest: tamen vbi in molem satis insignem attollitur, insanabile efficitur, nemoque illud sine manus opere curabit. Idipsum a. accidit propter sui crassitiem: nam nec repelli nec discuti potest, nec totius corporis purgationi cedit: sed tanta eius vitij malignitas est, vt mitiora plane contemnat remedia: vehementioribus vero irritetur, excandescatque atque efferatur. Præterea cum ipsa iam longo tempore vsa sit optimis remediis per insignes medicos adhibitis; & sanguinis missione & purgatione, & parum medici iuuarint, vix sperandum est, quod curari

possit medicamentis: neque etiam abscissione, cum iam multum locum occupauerit: quoniam si cum paruus esset, neque altas radices egisset ac abscindi posset, sectionem admittere noluit: certe nunc minus sectio est admittenda, cum nullum inuamentum adferre potest. Sola igitur palliatione vtendum: atque trib. scopis; primo humorem atrabilem prohibendo, cum victu conuenienti & concoctu facili, & sanguinem bonum generante, vtendo carnib. gallinæ, caponis, hœdi, ovorum luteis, cremore hordei, borag. buglos. malua, beta, atriplice, sero lactis, & piscibus saxatilibus; abstinendo à carnibus bubulis, salis, fumo induratis, ceruinis, leporinis, cafeo, & ab omnibus cibis melancholicis & flatulentis. Secundo humorem genitum, & per totum corpus dispersum vacuabimus, prius eundem præparando cum syr. de fumo terre, de pomis, de epith. de aceto, de buglos. deinde euacuabimus, semper à lenioribus incipendo, vt cum epithymo in sero lactis syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis fenæ postea cum elect. lenit. confect. hamech. diacath. Idque sensim & per intervalla. Et si medicis præsentibus visum est, menses euocabimus; etiam secta vena in talo. Tercio humorem, qui in particulam affectam procubuit, digeremus, & particulam firmabimus, ne quid humorum redundantiæ ad eam confluat. Regetendi vel repellendi quod influxit, tempus accommodum est in principio, tam in ipso purgationis tempore, quam ante. Vbi vero totum corpus exquirit purgauerimus, tunc digeremus. Vti poteris vng. de tutia seu pompholyge: & mihi videretur commodum, laninam illam plumbeâ, quam diu gestauit, relinquere; quia virus è mammilla exhalat, ita vt breui vlcerebitur & aperietur: nam cancer hic magnus est satis, & videtur materia in eo satis collecta esse & putrefacta: satius itaque erit materiæ exitum dare, & non retinere per laminam, aut materiam illam putrefactam ibidem relinquere: cuius habemus egregium exemplum apud Rondeletium: nam experientia (inquit ille) didicimus, materiam illam grauissimos dolores inferre, qui post operationem mitigantur. Adde, quod ex dissectione nouimus, thoracem repleri sero sanguineo, nimio vsu repellentium: quod superiori anno 1553. mercatori cuidam euenit in Montagnac. ciuitate Gallia Narbonensis; qui priusquam moreretur, laborauit magna anhelandi difficultate: nihil aut parum exspuebat: tandem vita discessit, & in thorace reperta sunt seri amphoræ quatuor. Quod accidisse puto propter laminam illâ plumbeam, quam semper gestabat, & medicamenta fortiter refrigerantia, & repellentia, quibus vsus est, etiam post suppurationem. Argumento est sanguinem resudasse in pectus, quia tumor maximus erat, qui detumuit & longe minor factus est post vsu illorum remedium: & cum prius laboraret difficultate anhelandi, ab eo tempore diffculter anhelauit, donec è vita discesserit. Serum illud erat sanguineum, id est, videbatur sanguis paucus in sero dissolutus, nec tale esse, quale reperitur in peritonæo & pericarpio. Ideo chirurgus vel medicus, qui vxori medetur, admonendus erit, vt à valde repellentibus & refrigerantibus abstineat. Audio medicum apponere aquâ cardui benedicti; illa quidem non ita refrigerat & repellit. Non defunt Neoterici, qui ad palliationem apponant herbam Roberti, scabiosam, chærefolium, caprifolium, tapsum barbarum, puluerem stercoris humani, cum anetho. Nonnulli procedunt cum appositione carniū gallinarum propter

propter quod vulgares Lupum appellabant, eo quod cancer in die gallinam vnam comederat; quam si non comederet, agrum comedisset. Sed caro talis facile putrescit, & putredinem, qua cancer vlceratus facile afficitur, auget; ita vt eiusmodi remedia muliercularum, quæ & carnem crudam collo apponere iubent in dolore capitis, factorem inducendo, plus noxæ quam commodi adferant. Hæc sunt, vir humanissime, quæ ad palliationem huius mali, quo vxor tua laborat, valere putamus: quæ in commune hoc tempore consilium voluimus. Vale. Raptim Delfis, 26. Iulij, anno 1585.

SCHOLIA.

Hæc mulier Amstelrodami habitabat: verum non diu post, cancer hic exulceratus fuit, cum tanto fetore, vt vix quis adesse potuerit, totam mammillam occupans, ad axillas vsque; ita vt post duos deinde annos misere quoque vitam trahens (vt postea mihi relatum fuit) tandem obierit. At causa canceri vlcerati eadem est cum superiiori, ex humore atrabili, sed acriore, vt diximus; & ideo exulcerat. Signa quoque in hoc solummodo differunt, quod in cancro vlcerato, præter dolorem, duritiem tumoremque, vlcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris prætumidis, aspectu horrenda, & concreta humorum, colluue ingrata. Iisdem scopis & remediis curatur, venæ sectione, purgatione humoris atrii acrioris; & in mulieribus menses defuncti, tali venæ incisione; vel menses euocentur. In viris hæmorrhoides proripiant, si modo eas pati consueuerint. Locum laborantem firmabimus cum supradictis topicis. Insigniter etiam leniunt, & solantur plurimum in ipsis exacerbationibus, & cruciatibus tempore, malua aut althæa in mulso subacta liquefactæ, & rosaceo paululo lanigata, instar cataplasmati illita. Quod ad abscissionem attinet, modo paruus sit & altas radices non gerat, hæc ad chirurgiam pertinent: de quibus suo loco: hoc tantum nunc admonito, quando abscinditur, oportet sectionem incipere à parte sterno proximior, procedendo ad superiorem partem, propterea quod venæ maiores ultimo loco sint abscindendæ. Nā copia sanguinis vtriusque (scilicet venarum & arteriarum) agrum seu agram & assistentes perterret, & agri seu agræ vires deicit: ideo oportet hoc modo incidere. Deinde cauteriis vel potius caustico medicamento constringente (vt nos in lithotomo Guillelmo de Dalen vidimus) sanguinem sistere. Neque statim compescendus est sanguis, propterea quod vtrumque infectus, est euacuandus. At Rodolphus lithotomus, cum nostro consilio mammillam cancerosam in Gerthrudæ Nicolai excinderet, quæ frustra causticis remediis curabatur, ita vt deueno cancro mammilla multo maior intumesceret vlcerato, cum acu filo perducto, vt manu vna mammam eleuare posset, cum nouacula dextre abscindebat, venasque sanguinem effundentes filo alter minister cōstringebat; & radicibus cancro cum tota mamma abscisso, mox restrictorium medicamentum applicabat; postquam crassiorem sanguinem ex ipsis venis expressisset, deinde aliorum vlcere modo curabat. Hæc autem mulier habitabat Delfis in Elephantæ; quæ recte per abscissionem fuit curata: vti & altera mulier è Viar, me præsentis; & tertia satis vetula. Hæc petitis chirurgis committenda. Cuius modum abscindendi apud alios au-

dores, qui de tumoribus præter naturam scripserunt, tum apud chirurgiæ scriptores inuenies, ita vt non opus sit hæc omnia hic commemorare: quamuis ille modus excindendi, quo Rodolphus supradictus utebatur, præ cæteris mihi placebat.

OBSERVATIO XXVIII.

De fissuris papillarum.

Papillæ aliquando finduntur vel vlcerantur, vt puerperæ & nutrices pueros præ ingenti dolore sugere non permittant aut ferre possint. Sic Atalia vxoris Hugonis Iacobi pharmacopolar, papillarum scissuras habentis, oleo liliaceo, in quo pul. tutiæ immixtus esset papillæ inunctæ sunt, insperso deinde puluere tutiæ exiguo, & superimposito folio violaceo viridi, ne camisia adhereret: quibus præsidii sana facta est. Vxor Ioannis Foresti fratris mei, in puerperio axungia canina inuncta sola profuit: & anno sequenti etiam pomatum album. Sed & in alia vsus sum feliciter vnguento ex pul. tutiæ lotæ in aqua ros. & vngu. ros. simul mixtis. Vxor Adriani pharmacopœi nostri, gummi tragacanthæ dissoluto in aqua ros. adiecto exiguo tornesol, vt magis rubeat, ad spissitudinem mellis soluto, inungebatur, & statim sanata est, Retinuit hoc remedium in officina semper paratum; quo etiam ad lichenas, vulgo (Haar-Haarvinn) utebatur magna cum experientia, vti & nos sæpius experti sumus. Commendatur præterea oleum de spermate ceti, si eo papillæ vlcerate & fissæ inungantur. Bickerus quidam solo zaccharo papillis insperso vxorem suam curauit, super imposita argentea capsula ad papillæ formam eleuata, ne camisia adhereret: Zaccharum enim vim abstergendi & mundificandi habet: ideo vlcera leuia ac vulnera minuta, nequaquam effatu digna curat: post absterisionem natura ipsamet postea eadem consolidante. Ita & vulnera in manu cultello leuiter incisa solo zaccharo insperso idem curabat: sed huius rationem ignorabat, quam eidem aperui, propter absterisionem hoc fieri. Sibi satisfactum dicebat.

SCHOLIA.

AMatus ad papillarum dolores & fissuras hoc vnguentum commendat cent. 6. curat. 38. 2℞. vng. populei, ʒ℞. de plumbo, an. ʒj. opij thebaici gr. v. misce fac vnguentum, & eo inunge mammillarum papillas: quas cum mulier lac dacti voluerit puero, vino diluto lauet, & postea iteret; est sane remedium hoc certum & indubitatum. Aliud Petri Spinolæ quondam pharmacopœi nostri, nunc Dordraci agentis, quod in officina paratum erat, ad fissuras papillarum (& ideo à mulieribus vulgo vocatum Tepel salf.) valet etiam ad vlcera inueterata, tum crurum vlcera, & ad noli me tangere. Recipe lapidis calaminaris præparati (scilicet in vrina pueri non polluti, igniti, & ter quaterque extincti, & in pollinem seu puluerem subtilissimum redacti) ʒiij. terra sigillata ʒj. oliban. cerussæ, sevebimbina, cera, an. ʒj. massicis, aluminis vss. olei ros. lini, an. ʒb. seui ouilli ʒij. axungia porcina recentis seu insulse ʒb. vini Rhenensis ʒb. fiat vng. vt artis est, vel ad formam emplastrum; & super pannum lineum ducatur, & papillis applicetur. Illa quoque valent, quæ obser. 1. lib. 14. scripsimus vtilia esse ad fissuras labiorum. Sed illud hic minime prætereundum puto, quod labra infantium

infantium ex papillarum duritie & calore, subinde scindantur & fissuras incurrant: quas facile cum lana succo plantaginis minoris, butyro & adipe gallinaceo recenti inuoluta, & rimis indita percurabimus. Absolutis mammillarum vitiis, quidam hic annectunt ea, quæ vitia alarum, & grauem odorem abolent. Ideo vnum exemplum addemus.

OBSERVATIO XXIX.

De fetore alarum.

Iuuenis quidam biliosus, cum alas & axillas fetentes haberet, vt puellis fere ob odorem fetidum exosus esset, huic consului, vt bile prius euacuata & temperata, cypero cum oleo illineret axillas. Ad alarum enim vitia valent, & grauem odorem totius corporis abolent. Si vitio sanguinis est, Benedictus Veronensis lib. 11. c. 18. illum demere, inquit, prius necesse est, ac corpus perpurigare. Si bilis in vitio fuerit, eam perpurabis: in vtraque causa humores temperabis. Graueolentiam abolet iris, scholimonque per se, nam per vrinam effluit id vitium. Rosæ quoque succus per se, oleumque myrteum, seminis fenugræci decoctum graueolentiam alarum emendat; nitrum quoque ex aqua quotidiano fotu, virus earum tollit, & alumen: nam & sudores sedant. Aegineta has mixturas commendauit, *alumen liquidi p. j. myrrha p. j. vino diluta illinuntur.*

SCHOLIA.

Causæ huius mali possunt esse procatarctica, vt motus excedens, & labor, tempore calido, tarda vestiti mutatio, & coitus superfluous. Antecedentes sunt multitudo humorum corruptorum in corpore. Gordonius etiam ab humore melancholico fieri putat, & corruptione propriæ substantiæ. Causas coniunctas ad vapores refert ab humoribus corruptis elatos. Axillæ in iuuenibus magis fetent, quam in senibus, licet materia corrupta senes quoque abundant; deficit tamen calor mouens: nam & iuuenes peioris sunt regimini; & calor est fortis; Crassiores quoque quia facilius sudant, plurimum fetent. Sed cur febricitantium corpora in febribus, putridis, in quibus

li sunt humores putridi, ita non fetent? an quia calor febrilis vehemens & fortis consumit illam putrefactionem, cum & fortior cum febrili calore expellatur? neque corruptio diu manet, sed incipit immediate cum febre, & cum eadem cessat. Quod coitus superfluous fetorem excitet, fit eo, quod materiæ ad exteriora moueantur & exeat ad cutem vapor putridus. Præterea sciendum, quod coarctatio & non euentatio vaporum venientium ad axillas, inguina & pedes, iuuant multum ad inferendum fetorem: nam illi conuersi in sudorem, non euentantur. Is vero sudor corrumpitur, & facit fetorem. Hinc pedes frequenter propter sudorem retentum & inclusum neque euaporatum, emittunt fetorem. Plurimum hoc vitium familiare est, quibus conuenit, vt caligas sæpe mutent, & foecos lineos sæpe induant & mutant, præcipue æstate; hoc n. tempore magis obnoxii sunt: pedesque frequenter lauantur aqua decoct. nucum & foliorum cypressi, & aliarum rerum atque herbarum aromaticarum. Signis hic non opus est, cum satis innotescant (sive in axillis sive in pedibus, sive in toto corpore) per suas causas & effectus: cum & is, qui apud eos versetur facile odorem olidum & fetentem percipiat. Hanc quidem putredinem ex prog. 1. com. 16. Gal. non abhorret; cum & eandem laudet: tamen odor vehementis fetoris, notat putrefactionem, & non maturationem. Idem dicit Gal. 3. prog. com. 22. Axillarum fetor & totius corporis per longum tempus durans, sive manifesta causa, lauram prælagu, iuxta Gordonium, & Gerardum Cremonensem super Viaticum. Curantur fetores humoribus prius præparatis & expurgatis, vel venæ sectione, si opus est. Deinde confert vti balneis, decoctis, herbarum odoriferarum, vt sylmbrij, melissæ, lauari, rad. ireos, & similibus. Et in exitu balnei axillæ, tum totum corpus, lauari poterunt hoc decocto. *℞. anisi, cumini, ros. rub. an. ʒ ij. cyperi, spicæ nat. schenani, an. ʒ ij. rad. ireos sicce pul. ʒ j. fiat decoct. in ʒ ij. aqu. Poterit & camisia in eodem decocto lauari, & demum exsiccata indui, iisdem, tum vestibus sæpe mutatis. Reliqua vide apud Bened. Veron. loco citato, & apud Paulum. Nunc tempus est, vt hoc finito libro, ad ventriculi affectus transeamus.*

Finis Libri decimi septimi.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus octauus.

DE STOMACHI ET VENTRICVLI AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De oris ventriculi inflammatione.



Vibis os ventriculi inflammatur, in maximum dolorem, ob eius exaceratorem sensum, incidunt: quibus & vrina rubra est: sitiunt, & febre continua affliguntur: vt quidam euenit. Huic statim clysterem emollien-

tem & detergentem, cum aluum non redderet, iniiciendum esse consulimus: & vt aluo soluta sanguis statim ex vena interna plenitudine appareat, mitteretur: cautione tamen adhibita, ne plus sanguinis euacuaretur, quam opus esset: solet enim hunc affectum syncope & virium imbecillitas, ob vehementem dolorem, sæpe subsequi. Et ideo in sanguinis missione hic summa cautio adhibenda est. Nam præcipuus scopus est in eo remedij genere, virium robur. Mox à venæ sectio-

OBSERVATIO II.

De ventriculi imbecillitate, ex intemperie frigida & humida: cui postea etiam materia pituitosa accessit.

ne, ad dolorem sedandum, hoc vel simile cataplasma applicandum esse duximus: *℞. farina hordei ʒ vi. florum chamæmille, meliloti, ros. rub. ana p. ʒ. sem. coriand. sancti. an. ʒ ij. spicæ ʒ b. olei ros. ʒ ij. olei chamæmille, cotoneorum ana ʒ b. misce. fiat cataplasma. Interea mandauimus, vt subinde syrpos caperet, eosque prius adstringentes, quales sunt tyrop. cotoneor. de agresta, ex ros. liccis, in progressu vero hos vel similes: *℞. syr. viol. nymphææ, porulacæ end. ana ʒ j. aquæ ros. cichorii, end. ana ʒ ij. b. equæ methæ ʒ b. misce. Cataractica per os sumpta hic minus conueniunt: quia ad affectam partem trahunt. Sed post doloris sedationem, sola cassia cum pauco rhab. satis est: qua etiam hic, tum in aliis, commode vsi sumus: etiam confectiombus cordiatis, circa initia hoc modo vel simili, confectæ rosæ, & aliorum adstringentium dosim agentes, & violarum magis minuentes: vt, *℞. confect. viol. buglossæ ana ʒ j. confect. rosæ ʒ b. coriand. citri conditi ʒ ij. pul. diamaagarii frigidi ʒ j. diarad. ʒ b. coralli rub. ʒ j. manus Christi perlacæ ʒ ij. cum syr. cotoneorum, fiat conditum. Pro siti quoque egregie profuit rob. de ribes, & confect. foliorum acetosæ, & cerasæ amarellæ dicta, & lactuca condita: quibus & in feb. continuis ad sitim feliciter vtimur, vt in libris nostris De febris cernere licet. In fine etiam tabulis trionfant, commode vtebatur. His & similibus remediis hic conualuit: & alij similiter sanitatem consequentur. Deo iuuante. Interea hic magna diligentia opus est, cum malum sit periculosum, & minime contemnendum.***

SCHOLIA.

Similibus quoque affectibus os ventri, vt Stenophagus (de quibus diximus lib. 15. scholia Obser. 31. 32.) tentatur, vt doctissimus Fernelius dicebat: quos & isdem licet notis deprehendere. Præterea vero & mentis alienatio accedit, ob eos nervos, quos à sexta coniugatione suscipit. Mulierem vidi (inquit) gravidam, cui tuberculo duro coque ingenti ita os ventriculi obturabatur, vt quicquid indebatur, attracto ventriculi ore mox remearet atque redderetur. Sic astanti omnium iudicio nihil cibi potusve bimestri vel conatu maximo eo vorauit. Tandem morbo, desipientia febreque confecta decessit, edito partu, quem vitæ superflitem reliquit. Affectus enim ventriculi (vt interpres Hollerij summam enumerat) in Stenophago, stomacho, siue orificio, fundo, tunicis, pyloro infiniti prope reperiuntur: tanto periculore, quanto coctio & distributio, cibi magis necessaria vniuerso corpori. Quales sunt intemperies omnis generis, tumores præter naturam, obstructions, defluxiones, excrementa illic collecta vel nata, vel aliunde immissa, cibis intepescens nimis biliosus, deiecta appetitæ, nausea, vomitus, humores in tunicis infarti, aut in fundo fluitantes, inflammatio, inflatio, dolor, exulceratio à causa interna, vt humore acro, phlegmate, cibo, osse acuto, præcedente abscessu: ierosio, fames canina, immoderata sitis, & similes, quorum signa, causas, remedia explicare maioris est operis. Multa ex Galeno colligi possunt 3. & 6. De morb. & sympt. 5. De loc. affect. de sanit. tuenda. 7. Methodi. Signa ex Arte parua desumuntur. 8. nam nunc describit stomachicorum, contra Andromachum, qui stomachicas confectiões sine discrimine scripserat prodesse stomachicis. Quod & vulgo hodie etiam empirici faciunt. Nos de singulis exempla quædam adferemus, certa & vera methodo curationem influentes.

Iuuenis, annos circiter viginti natus admodum studiosus, & doctus, Guillelmus Cripus Haghanus, cum longo tempore valetudinarius fuisset, in ventriculi imbecillitatem lapsus est, ex intemperie frigida & humida: quam sitis nulla vel exigua, acidique ructus, & saluæ copia comitabantur: & humiditatem aliquando vomitus subuequebatur, sine vilo magno dolore, post horam vnam à sumpto cibo: ita vt tandem ventriculus ex nuda primum intemperie adeo imbecillitas facile humores pituitosos receperit, qui eo confuxerunt: ita vt non tantum nuda intemperies morbum constituat, sed & humor pituitosus: ideo & vomitu pituitæ sine dolore, & etiam sub finem vomitus cibis, qui reiciebatur, subacidum quid sapiebat: ad frigidum enim ventriculum, iuxta Galenum, proprie accitus rectus refertur. Aderat similiter inflatio quædam & ventriculi durities, ob flatulentos humores & frigidos, in fundo ventriculi magis hærentes. Quibus autem remediis hic sanitatem consequeretur, me consuluit. Huic igitur præscripti cibos faciles bonique succi, vtque auius montanis, cuniculis, assisq; potius quam elixis vteretur. Concessi vinum medicatum ex absinthio: & cereuisiam absinthitem, capares, diacydonium, cum speciebus. Et vbi ad vomitum proclius esset, vt exiguum decoct. hordei, cum raphano, pauco adiecto oxymelite, debite biberet: & vt pro præparatione, decocta menthæ, absinthij vtriusque sumeret: adiecto syr. menthaceo, cotoneorum, & absinthij. Et subinde cum pilulis leuioribus expurgaretur: vt alephanginis, ex hiera simplici, vel mastichinis. Deinde, vt vteretur elect. arom. ros. diaron pipereon, diacalamembo. Et, vt stomachum inungeret oleo nardino, mastichino, maceris, pauca adiecta cera: & emplastrum ex mastiche, stomacho apponeret; & vt subinde vinum generosum sumeret. Quibus remediis hic optime habuit: vt alius iuuenis licentiatu iuris studiosus (nam studiosi magna ex parte stomachum imbecillum habent, quæ imbecillitas plerumque iis adhæret, vt vniuersa corpori: ad quam plerumque consequuntur ciborum cruditas, ructus acidus, nausea, vomitus, fastidium) qui præter imbecillitatem ex diuturnitate mali natam, multam pituitam in ventriculo humido & frigido collectam habebat: cui & oxymel sæpe lambendum dedi, & mel rosa, modo cum decocto absinthij: tandem & pilulas mastichinas ad ʒ j. postea triplicata purgatione per hieram picram Galeni, assiduo potu vini absinthij, & subinde assumpto syr. menthaceo, & aromatico ros. & stomacho exterius roborato cum cerato stomachico Galen. & mastiche, adiecto exiguo croco & cinnamomo, ac rad. cyperi, & oleo absinth. tandem hic, tum alij plurimi, vt frater meus Theodorus Forestus, sanitatem adeptus est. Et alij quoque haud pauci conualescentes, imbecillitate stomachi laborantes, prius aliquando hiera purgati,

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Imbecillitas stomachi seu ventriculi, fit multis de causis, non solum studiosis, ut istis duobus euenit: verum & conualescentibus, & aliquando sanis. Conualescentibus vero frequens est: magis etiam ab imperfecta crisi: in quo reuocanda sententia Hippocratis: Si à morbo cibum assumens quis non corroboratur, largiori alimento corpus uti significatur. Quod si non assumenti cibum hoc accidat, scire oportet, quod indiget euacuatione. Conualescentes à morbo aliquando multum appetunt, ob extenuationem membrorum, non solum ab inanitione spiritus & humoris, balneo, profluio (quod & interpretes Hollerij recte animaduertit, & nos in praxi quotidiana sepius vidimus) sudoribus quoque & insensibili perspiratione, colligatione, & similibus: sed etiam à ieiunio, inopia alimenti, calore languesciente, ut flamma quæ in elychnio insita, ab oleo & aëre fomitem & pabulum sumit. Aliquando vero appetentiam habent deiectam, ob vitiosos humores relictos. Vtrique sape, nisi accurate tractentur, in recidiuam incidunt. Priores quidem, quia cum extenuata membra multum appetant, non tamen sumpta conficere potest imbecillus calor. Nota est enim historia multorum, qui à longa inedia sese repleuerant, adeo, ut inde suffocati fuerint: uti nos cognouimus nostro tempore, tam in obsidione Harlemerensi, quam Leydana præcipue contigisse: quando obsidione liberati ciues victu pleniore se replentes mortem quam plurimi incurrerunt. Posteriores vero, quia reliquias morbi tandem natura stimulat aggredi cogitur: Quanto enim plus nutriuntur, tanto magis læduntur: donec accrescente malo, morbus repetit. Hi igitur curantur vacuatione, ut docet Gal. De sang. miss. contra Erasistratum, & historia 6. Eride. Illis vero remedia sunt, rerum non naturalium commoderatis, labor, cibis, potus, somnus, Venus, omnia modiciora: deinde longo tempore substantia reparatio per alimenta pauca, bene nutritia, facilia coctis, sepius exhibita. Nam pauca non sufficiunt, nimia non coquuntur. In conualescentibus ergo, quibus reddita est appetentia, imbecillitas ventriculi non potest tantum concoquere vel conficere, quantum appetit. Modica itaque quantitate, sed breuibis intervallis cibi boni succi & qui facile coquantur reliciendi sunt. In aliis, quibus appetentia non redditur, reliquias morbi in causa sunt: quæ optime vel rhubar. vel hiera picra, ex decocto cicero aut absinthij, repurgantur. Sed de conualescentibus satis diximus, & exempla posuimus de febricitantibus: at nunc loquimur potissimum de sanis: in quibus imbecillitas est vel à sola temperie. Ventriculus enim varios morbos patitur, & symptomata varia, quæ à diuersis morbis nascuntur. Morbi autem sunt, in temperies calida frigida, humida & sicca: sine materia, vel cum materia: eaque pituitosa, biliosa, vel melancholica. Quare, si quis velit symptomatis occurrere, morbos agnoscat oportet: quod ex dolore, functione laesa, & alui recreationis dignoscetur. Difficilius vero dignoscuntur, quam curantur. Intemperaturæ sine materia raro sunt: quod si fiant, diu sine ea esse non possunt, uti ostendimus in istis duobus iuuenibus. Nam omnis intemperies ventriculi nata est coctionem impedire. Quod si frigida intemperies vel sicca præsens sit, cruditate faciunt, à qua multa pituita asseruatur in ventriculo. Si calida

Intemperies
sola diu
existere non
potest.

vel cibos vrit, vel corrumpit, vel aliam cruditate facit. At frigida indicia sunt frigoris sensus in parte infirma, nulla sitis, saluatio, aliquando multi ructus acidi: quos & sequitur appetentia & coctionis tarditas. Cui valent vina generosa & antiqua, præassumpta duabus aut tribus horis ante pastum, vinum Hippocraticum dictum, vel cui addita sint piperis grana aliquot, confer. aro. ros. diagal. diacinnamomum, rosata nouella, plirissarcot. diamos. diambra, diatriopipereon, diospoliticum: quæ & calfaciunt, & ventriculo grata sunt. In tabulis vel opiatas, confer. anthos, stæchad. & superbibant aquam menthæ absinthij, cum vino generoso, syr. de mentha, de absinth. hic conferunt, propter caliditatem & adstrictionem, quæ grata est huic parti & necessaria. Calida signa sunt, astus in medico corpore, sitis assidua, lingua arida, iactatio corporis, à cibo nidorosi ructus: licet sitis magis siccitatem notet. Valent refriger. opjata, ex confer. viol. ros. flor. cicbor. vionis. diambra. frig. diavagacant. frigidi. & lactuca condita, & carnes cucumbræ conditæ, quæ refrigerant, ventriculo & palato gratissima sunt: abluantur aqua frigida: & per duas horas ante pastum dentur: superbibendo parum aquæ: & fiat hæc vel similis opjata: Recipe conf. ros. 3 j. conf. flor. cicbor. vionis. ana 3 ss. pul. vionis. 3 ij. diatri. frig. 3 i ss. diambra. frig. 3 j. confer. viol. 3 ij. cum syr. end. simpl. fiat opjata vel conditum. Humida vero intemperies fluctuationem & sitis inappetentiam, & coctionis tarditatem facit. Curatur facilius sicca intemperie, quia partes humidæ facilius vim medicamentorum suscipiunt quam sicca: sicca enim propterea quod partes conciderunt & densiores factæ sunt, non facile (ut dicebat Rondeletius) cedunt medicamentis. Adde, quod medicamenta humida, non multum agunt, neque multum resistunt. Curabitur igitur humida intemperies, inedia, aut victu tenuiore aut exsiccante: abstineat à multo potu vini diluti: & potius generoso meraciori vtatur: vel posca, vel oxymelite, hydromelite parum coctis, & multum dilutis, ut magis detergant & minus nutrant. Abstineant iusculis, vtantur carnibus & piscibus salis, pane biscocto, cum multo sale. Rondeletius commendat cineres viperarum: vale pul. galangæ, cinnamomi, piperis, & cineres hirundinum, conferua acori, saluie, anthos, & vinum antiquum, cum aqua absinthij, ceratum masticeis, & alia, ut apud Rondeletium videre licet. In sicca intemperie tarda etiam fit concoctio, adest linguæ siccitas, corporis extenuatio, saluæ paucitas, sitisque vehementissima. Intemperies sicca omnium difficillime curatur, ut omnes alij morbi: quæ enim consummata est, insanabilis existit: sed quæ sanari potest, curatur vsu lactis, quia humectat & nutrit: & balneo: & statim à balneo, oleo dulci inungendum: & in lectulo à balneo, ubi quieuerit, lac propinandum: de quibus diximus lib. 2. De feb. hectica: de quibus etiam vide ad longum Iacchinum doctissimum, supra Rhaf. cap. 43. De affectibus stomachi, à quibus vitatur concoctio. Habes ibidem egregia ad omnem intemperiem conferentia, tam sine materia quam cum materia: quæ etiam ad causam, signa, & curationem spectant, de imbecillitate stomachi, & ibi historiam egregiam ponit, se eiusmodi affectum curasse ex nimia circa ventrem diligentia in parco victu, & sape longa abstinentia, medicamentis ad roborandum ventrem datis: ac præfecto ed deuenerat, ut mortuum deambulare credidisset.

diffes. Sed & ex vacuatione talis euaserat, quod senex iam & gracilis iuenculam duxerat: hoc autem maxime corpus siccet, curatus autem est iisdem prædictis, quæ Galenus ponit: id est victu humectante. His valent vinum dilutum non antiquum: iuseula pingua ex capis, gallinis, caribus vituli lactantis, hædi, adiecto vino exiguo, ad faciliorem distributionem, & concoctionem: cremor ptisanæ, cum oleo amygdalæ dulcis lactuca, violis, boragine, in iusculis decoctis, inunctiones ex oleo violarum amygdalarum dulcium adiecta axungia gallinæ, pro linimentis, lactucæ conditæ, cucumbræ carnes conditæ, conferuarum violarum & similia, vel si olea dicta nimis relaxant, adde parum olei rosarum cotoneorum: & tempore inunctionis guttas vini ad penetrationem. Si compositæ fuerint, signa utriusque posita coniungenda. Verum si intemperies fuerit cum materia, copiam vitiosorum humorum nauæa, vomitus, granitas ventriculi, & ructus potissimum à cibo ostendunt. Ideo videndum quomodo adesse materiam distinguamus. Primum ergo materiam frigidam adesse status monstrant, qui etiam sine cibi assumptione sentiuntur. Secundo percepta grauitas quædam & angor, præsertim si os ventris opprimitur valde sensile. Tertio grauitas capitis, & dormitatio: præsertim si cruda pituita sit: à qua etiam appetentia tollitur, ut Galen. lib. De plenitud. ad finem testatur: & de vsu partium ad principium, quod scilicet opprimitur & grauent. Contra acida, quæ tenuis est, appetentiam facit, ut de canino appetitu diceamus: quod si nauset vel vomat, erit apertum. Pituita quoque nullam prius ventriculi erosionem excitabit, nisi salsa fuerit: hinc & acidi ructus, nulla sitis, tensioque ventriculi adsunt. Quod si flaua bilis, & nauæa & vomitus accidunt, & tristitia & morus: & iracundi sunt: aperitur eius qualitas per vomitus, caput vero dolet: vel somnos turbatos efficit & breues: & sapor amarus sentitur, præsertim si pilosculum ieiunauerunt. Hippoc. 2. De victu. Et sic si atra bilis abundet, tristitia metusque, ructus & excretaiones fetidæ, piscisque olentis, somnus cum acceptione imaginationum alienarum, contradicque & dolor poplitum & surarum. Sed num in ipso gignantur, aut aliunde influant, apparet primo De loc. & 2. de temperamentis ad fin. Distingues considerando temperamentum principum partium, si tale sit biliosum: & si ut in ventre, ita & in intestinis continetur: quod ex deiectione reprehendes, considera à quibus partibus potest ventris recipere. Demum excrementi qualitas consideranda est, si euomat: nam porracea in ventre; in jecinore vero flaua vel pallida gignitur. Erit etiam pulchra tentatio, nam si à sola intemperie, si cibos dederis, qui resistant, non vitiabuntur: si ex humoribus, quoniam illis admiscuntur, vitiabuntur. Sed illarum partium notas & effectus perpendes. Hæc quidem exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO III.

De imbecillitate ventriculi ex laxitate & mollietate, in quo pituita postea coarctatur fuit.

Scribit Rondeletius, ventriculi aliquando imbecillitatem fieri ex partis mollietate & nimia laxitate, citra intemperiem aliam, vel citra materiam.

Pet. Foresti. Tom. 2.

riam; ut ipse colligit ex Galeni verbis 1. ad Glauconem: ubi ait, lyncopen fieri ab imbecillitate ventriculi: quam solis curat astringentibus appositis supra ventriculum, quam affectionem fieri autumat Rondeletius post multas comestationes, quæ ventriculum multum distenderunt; aut quia ventriculus suapte natura est magis laxus, aut maior quam oporteat: & quia vsus est ager nimis relaxantibus. Omnes istæ causæ distentionem ventriculi faciunt; quæ facit ut minus bene cibos amplectatur: quod si non facit, non bene concoquit. Apponenda igitur medicamenta primis qualitatibus temperata & adstringentia. Quod si minus profint, sunt augenda frigida adstringentia, quia magis adstringunt quam calida, & ad intra repellendo calorem excitare possunt. Post cibum assumenda, quæ per partem superiorem ventriculum possunt contrahere, ut sunt pulu. adstringentes, ex ros. cinnamomo, cort. cyperi, corallo & aliis. Sed quia ventriculi infrigidatio magis periculosa est, calida etiam adiungenda, ut galanga. Sic nuper puella laxitate ventriculi laborabat: cui à cibo præscripti cotonea mala, pyra cocta, vel condita, & extrinsecus cum oleo myrteo, cotoneor. & absinthij, ventriculum inungebam. Verum cum eiusmodi ventriculus laxus imbecillis non diu sine coarctuatione materię persistere posset, uti huic puellæ euenit, pituita coarctata est in ventriculo, ut intemperies materialis accesserit, quæ non aliunde pendebat: quæ plerumque frigida & humida est: nam generatio humorum plerumque attinet pituitæ, lib. De atra bile, & 2. De facult. naturalibus, fit enim ex citis, qui ob frigiditatem & humiditatem, caloris ventris frustrantur actionem: præsertim si natura venter sit debilis. Erat autem hæc pituita in spatium ventris, non autem infixæ tunice inharrens; eratque pituita aliquantulum crassa. Ideo oxymel simplex, postea & scyllinum dedi, deinde ut vomitu leuiter pituitam expelleret, consului ut acciperet mellæ potum cum oxymelite, co quod pituita minus contumax esset, alioqui deuenissem ad decoctum raphani. Postea exhibui syropos magis incidentes, & exsiccentes, & roborantes, syr. acetos. compos. & syr. de byzantiis: & purgaui cum pilulis masticeis, & alephanginis & stomachicis ana 3 j. cum syr. menthaceo, fiebant pilule vij. Deinde vsus sum iisdem remediis, quæ diximus conferre ad intemperiem frigidam & humidam: nempe calida & sicca, ut sunt aromata omnia, intro assumpta & extra; ceratum ex mastiche & speciebus aromaticis. Adhibui quoque sacculos, & fomenta ex absinthio, mentha, schœnantho, rad. cyperi, & caryophyllis composita; cauendo hypochondria: vsus sum & diatriopipereo, ex mente Galeni: quia hæc puella subinde extensionem ventriculi percipiebat, ex flatu. Talibus enim flatus gigni solent, & succedere: unde duplici ratione concoctio vitatur, tam ex intemperie, quam ex mala cibi comprehensione. Huc enim facit historia illius, qui post horas quatuor cibum euomebat, ob flatum: ut etiam eueniebat fratri meo Theodoro Foresto. Ideo diacyminum exhibui subinde, carnibus assis & aromaticis conditis vtebar, vino generoso aliquando, prout sumptus ferre posset: alioqui ceruissiam absinthitem concessi. Vtimur & oleo anisi. Quiddam pro arcano habent (ut Matthæus de Gradi refert cap. de dolore & apothemate stomachi) ad consumendam ventositatem 3 j. aquæ vitæ.

Aa Sed

Sed considerandum nunquid ad sit caliditas hepatis vel renum ut tunc enim valde suspecta est. Noui ego studiosum quendam Louanij, cum ibi adhuc studerem, qui omni mane pro humido & frigido ac debili stomacho utebatur aqua vitæ, licet admodum pauca: ita, ut tandem maximam ventriculi siccitatem incurreret, & vna hepatis calorem: ut vix tandem corrigi potuisset.

SCHOLIA.

Primum vero in sananda intemperie, quam humor aliquis in ventriculo collectus fouet (quæ etiam frequentissima est, ut diximus) videbimus an ex ipsa ventris intemperie & frequenti cruditate sit accretus: ita, ut venter ipsi sibi malum foueat. Hanc autem materiam plerumque frigidam & humidam esse constat. Si ergo primum pituita in ventre; si crassior, in spatio ventris: altera inheret tunica affixa, viscidorum modo. Sint & tenuiore irrigata & madida ventris tunica, unde & intemperata sunt. Hæc ergo omnia simul iungi possunt. Ideo à prima causa ordiendâ curatio: hoc est, à vacuandis humoribus, qui in spatio ventris continentur, qui si contumaces fuerint. Galenus adhibet oxymel aut scylliticum: & si æger nauseabundus ad vomitum, per vomitum educit, cum mulla & oxymelice, ut nunc diximus, aut cum decocto raphani. Id bis facere utile est, si tunicis humores infixi, cum hiera expurgata; cuius hæc magna est utilitas: ut & aloës, licet bilem purgat; etiam pituitam, ob speciem admixtas in hiera. Quod si bilis sit in causa (prius dictum est quis nam bilis modus in ventre gignatur) statim expellenda erit; quia facilis suapte natura est, ut expellatur. Est enim venenosa, syncopen faciens, & per consensum conuulsiones. Expelletur vero vomitu quod potest: quod si quid in hæc sit, per hieram; exhibendo, non ut prius solam, vel ex vino, vel aliquo decocto extenuante, scilicet ex aqua. Ventriculi itaque intemperies calida, frigida, humida, sicca, cum materia, eodem, quo supra, modo curatur; nisi quod frequentius utimur pilulis, vel pulueribus laxantibus humores redundantes; qui magna ex parte sunt, bilis pituita, & aliquando melancholica, sed raro. Euacuatur autem vomitu, si nihil prohibeat, ut affectus thoracis, aut corporis constitutio. A cibo facilior est vomitus: ante cibum plus materię euacuatur. Si bilis vacuanda, post iuscula multa, vel post potationem liberaliorem provocandus est vomitus. Nam bilis, ut oleum his supernatat, & ob id facilius euacuatur. Adde quod acrimonia eius temperatur mixtione harum potionum. Datur syrup. viol. cum aqua tepida, vel iusculum pingue sine sale, aut decoctum beta, cum oleo viol. vel communi, vel amygdal. Si autem pituita euacuanda sit, mane ante cibum euacuatur: quia pituita semper est in maiori quantitate, quam bilis; & in fundo ventriculi magis hæret: ob id vomenda ante cibum, vel si lenta sit & nimis hæreat, syrup. acetos. simpl. dilutus aqua vel decoct. betarum vel parum agarici, vel asati, propinandum erit; prius relaxata regione ventriculi, oleo liliorum, vel amygd. inuncto, aut immisso digito, aut penna oleo intincta. Quod si fiat post corporis agitationem, vel frictionem super ventriculum in gyrum, facilius & plus vomit. Pituita pilulis de aromate, aut de hiera cum agar. euacuanda, sine aliquibus adstringentibus. Bilis

Curatio intemperiei cum materia.

Vomitio biliosa.

Vomitio pituitosa.

autem thabarb. infuso, syr. ros. & aliis mitioribus purgantibus bilem. Lenissima medicamenta ob duas rationes sunt usurpanda: tum quia materia è longinquo non est vacuanda; tum quia ventriculus non est vexandus fortioribus: clysteres ad id multum faciunt: sed acres esse oportet. Hæc autem agnosceret ex supradictis, & ex oris sapore; amarus bilem puram notat: salus bilem & pituitam permixtam: acidus pituitam & atram bilem: insipidus pituitam aqueam, vel dulcem: id melius deprehenditur ex vomitu. Attra bilis commodissime euacuabitur decocto polypod. vel senæ, vel epithymo decocto in iure galli antiqui, vel pulli, vel decocto mercurialis. Syrupi ad concoctionem vel alterationem sufficiunt: ad bilem end. simpl. vel absinthij cum aqua end. vel cum syr. de cichor. sine hab. aut cum rhob. vel cum syr. ex infus. ros. si volumus euacuare bilemque detergere. Syr. ad pituitam valent, hydromel. creta mor bordei, cum melle, aut oxymelite. Incidentes magis sunt syr. acetos. si compositi, & de byzantiis, qui leuiter incidunt, attenuant & detergunt. At si materia aliunde influit, tunc intentio esse debet, ut toti prospicere, vel parti, si pars sit. Si tamen venter, ut syncopen morfu adferat, relicta prima causa hunc affectum tollemus, donec affectus mitigetur; interim causa non neglecta. Ita in copia crudorum humorum 12. meth. horret purgationes: sed eas curat frictionibus & inedia: & optimum erit semper recellere humores ad contraria, & deriuare fluxiones ad alias partes, ut ad inferiorem aluum clysmatis; ad vrinam, post extenuantium usum. Causam non negligemus, ut in pituita incediam impetrandum, potum exiguum, cibos siccos, calidos, & reliqua quæ pituitæ generandæ sunt contraria, alioqui si parati sunt humores postea leuiter purgauerimus cum hiera, quæ à longinquo aut remotis non attrahat. A sanguine melancholico si oriatur, & si is sanguis in toto abundat, Galenus sanguinem mittit, cum nec facile corrigi possit, nec absumi præ crassitie. Si fluxio biliosa, purgabitur similiter in stomacho, primo vomitu, mox absinthij decocto, vel hiera. Quoniam vero venter est, qui recipit, non debent præter suas horas hi à cibo abstinere, cum præsertim non solcant famescere. Unde præceptum illud Auicennæ (ut recte dixit Iacchinus de hissi. m.) suspectum est: quod ad cibum famem expectanda sit. In cibo vero oportet præcedere lenientem, aliquid semper, mox sequi quæ roborant adstringendo: & vinum adstringens sit, album, tenue, ut per vinas bilem expurget. Patet autem, quod vniuersa victus ratio esse debet, quæ biliosa excrementa non generet, id est, frigida & humida, in cibis, balneo, somno, quiete: quæ omnia vni aphorismo comprehendit Hippoc. 6. Epid. In calida natura, refrigeratio, aquæ potio, quies. Sic vero & temperabitur bilis, & quæ circa jecur est, per intestina repurgabitur. Num vero purgantibus instandum sit, dubitatur: credunt alij quod non, nisi lenientibus, ut natura bilem tradocero affuescat per loca consueta; dum corporis malus habitus corrigatur. Quod si influxus bilis in ventrem sit naturalis, ut ex portione pori fellei ad ventrem tendente: quem errore naturæ in quibusdam maiorem esse contingit, quam oporteat; quod malum est incurabile. At si pituita à capite descendat (& est casus, qui crebro euenit. Florent. præsertim, ut asserbat Iacchinus; magis tamen apud nos Batauos & Hollandos; ratione regionis)

regionis) ipsi providere oportet, postquam ventri melius habuerit: etenim humoribus in ventriculo collapsis & expurgatis, post derelictam malam membri intemperiem, ipsum roborando, ne facile recipiat, ipsi capiti quoque tanquam membro mandanti providere oportet, postquam venter melius habuerit. Propria vero capitis providentia erit per contrariam intemperiem. Quoniam vero multa pituitosa excrementa generat, erit exempli gratia, intemperies eius frigida & humida, caput igitur calefaciemus & siccabis. Sic enim & alimentum bene concoquet: unde nec ex alimento pituitam generabit, & quæ ab inferiore susceperit excrementa, expurgabit per insensiles transpiratus, & etiam per sensiles vias: neque etiam prompte suscipiat ea, iam firmatum. At qualis providentia capiti frigido & humido debeat, dictum est de morbis capitis. Capita vero eorum sunt, ut si adest multitudo pituitæ, vacuetur, si est communis toti, per totius providentiam: si partis solum per notas vias, per quas caput purgatur: per nares, inquam, & os, & insensilem transpirationem, & per ea quæ calore & siccitate siccant, cum noctu assumunt. Si vero melancholicus est humor, si totius vitio, dictum est supra quomodo prospiciendum: sin partis, ut lenis, quoniam male affectus, humorem melancholicum expurgabimus, eodem modo, ut dictum est; & victum instituemus, quo maxime eius succi generatio euictetur: & lenis affectum curabimus.

OBSERVATIO IV.

De Cardialgia, seu oris ventriculi dolore, cum quodam morbo, cui bilis vomitus subsequatur.

Fater mens charissimus Nannius Forestus, si aliquo vehementi exercitio vteretur fatigatus, vel ieiunium paulo diutius toleraret, & præsertim cum curru veheretur, iuuenis biliosus, in cardialgiam aliquando incidebat, seu oris ventriculi dolorem, cum morbo & erosione bilis, vomitu erodente subsequente, ita ut syncope facile apprehenderetur, cum os ventriculi valde sensibile haberet. Hæc panem ex vino albo tenui frigidoque ac diluto, ut caperet consulebam; tum succum mali punici acidi: cui & lactucam cum aceto concedebam, pullosque gallinaceos, & perdicæ, cum omphacio & succo limonum. Sic Hippocrates libr. 2. vulg. mulieri cui os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor, polentæ pollinem in mali punici succi inspersum, semel in die in cibo tribuens, ipsam curauit: & non remouebat, ut ipse inquit. Et quia ad vomitum pronus esset frater ex natura, confestim ubi bilis roderet, syrupo acetoso vel oxyzacch. cum aqua sumpta facile vomebat: alioqui ubi syncopen metueret, micam panis mediocriter torrefactam maceratam in vino austero tenui & albo, & degulis tribus horis ut caperet 3 iij. iubebam, idque frigide, donec pulsus robustior fieret. Propterea iussi, cum facile afficeretur cardialgia, ex ieiunio, ut non tarde, sed citius cibum caperet, & ut ieiunium vitaret. Et quia ex natura melancholicus esset, & facile ex morore flaua bilis in ventriculum confluere, & vehementi exercitatione, & præsertim motione curus idem pateretur, præcepi ut mororem & vehementiorem exercitatio-

Pet. Forest. Tom. 2.

nem & vexationes in curru vitaret: & ut continuo apud se pyxidem conferret consului, in qua rosæ rubræ & myrtilli ac santali pulueres cum aqua ros. & vino odorifero aspersi, inclusi essent: vel spongia hoc odoramento (quo Celsus utitur, liquido immersa pyxidi inclusa, ʒ℥. aquæ ros. & myrtill. ana ʒ iij. vini odoriferi ʒ ij. santalorum ʒ ij. & fiat odoramentum: vel huius æmulum medicamentum, ut conficeretur utile duxi.

SCHOLIA.

Kardialgia ut Alcmarius ostendit, perpetuo affectus est oris ventriculi, eiusque infestum symptoma à succis mordentibus eueniens: nam diuina vero interim, non oris ventriculi, sed eius visceris, quod in thorace continetur, est affectus. Cardiacus quoque perpetuo oris ventriculi morbus, sed cum febre, eaque acuta; quæ etiam ratione differt à cardialgia. Et ideo cardiacus morbus cum in acuta febre & maxime æstuosa sit, perpetuo particulum minatur: confirmat id eius causa, cum à rodentibus ac venenosis succis fiat, seu ab alicuius visceris inflammatione: adeo, ut quidam os ventriculi valde sensibile habentes statim ex eo intereant, teste Alexandro, nec minus particulosus est à lumbricis ascendentibus ad ipsum os ventriculi, quibus nonnihil roduntur, & statim intereunt. Frequentius iuuenibus euenit in augmento ægritudinis circa sextum diem: & quam maxime eo tempore, quo æstas calidior incanderit. Cardialgia etiam in febribus mala iudicanda: de qua 7. lib. De febr. diximus. Quantum ad curationem spectat, cum prædicti affectus ratione maioris minorisque differant, ideo communis ratio tum victus, tum medicamentorum instituenda: ac frigidus eligendus, & domus depressior, nec alta, nec valde lucida, fenestris patentibus, ut perflatus accedat, lenique veste contegatur æger, in cardiaco præsertim morbo. Pavimentum folijs vitis & ros. consternatur. Vigiliæ vitandæ; somnus moderatus competit; & quies motusque omnis interdicendus, alius natura vel arte sit lenis, valent pyra, perfica, vua, & quæ moderatæ refrigerant. Sed de his diximus De febribus. Potus sit aqua hordei. Acutus pituitæ succum aut alicæ per clysterem infundit, reliqua vide apud Aëtium & Alcmarium. De vomitu leui iam dictum est. Si vomere non possunt, lenia medicamenta adhibenda, thamarindi, infusum thab. vel syr. ex infus. rosa. & topica ventriculo adhibenda, ut inula, cotonea, cum pane vel plantagine, vel polenta cum palmis. Exsudantibus sudor inhibendus cum oleo myrteo vel melino, myrto insperso. Extremæ corporis partes refrigeratæ, concalfaciendæ, cum multa frictione ipsarum partium, linteisque calidis adhibitis. Quod si ex visceribus quoddam inflammatum, unde cardialgia aut cardiacus morbus, eadem inflammatio curanda erit. Si ex ascendentibus lumbricis, ea tribuenda quæ ipsos interficiunt, & ex corpore expellunt: amaris expellas, iuxta Gal. 14. method. medendi. Hoc autem vitium, ut etiam sequens, ad os seu ventriculi ostium pertinet, in quo ciborum sit appetentia. Atque hæc prima ventriculi pars est: uti secunda (quam eiusdem ventriculi spatium seu cavitatem appellamus) in qua eorumdem ciborum sit concoctio: de qua parte etiam postea suo loco.

OBSER.

OBSERVATIO V.

De appetentia canina.

Monacha apud Delphenes, cum longo tempore cibum deuoratum euomeret, & in fine acida quædam & aquea, rursusque appetentia incitata iterum cibum assumptum cum rursus euomeret (quod vitium canibus solet accidere;) facile intelleximus eandem canina appetentia laborare; atque hanc causam internam esse ex sapore eorumdem, quæ euomebantur, etiam ex ægræ relatu cognouimus, tum ex ructibus præcedentibus vomitum, tum ex acido sapore oris, dum acida euomerentur. Cum autem hæc multis medicamentis vsa fuisset, nec per alios medicos curari posset, cum valde debilis esset, vt has pilulas leues quidem sumeret præcepi, cum ad eam accitus essem mense Martio, anno 1563. *℞. pilul. de biera simplici Galen. 3 j. rhab. optimi pulu. 3 ℔. cum syr. ex infus. ros. sunt pilula 5. valde exigua.* Quas cum in diluculo deglutisset, bis aluum deposuit, quas cum iterum atque semel cepisset, stomacho corroborato, vomitus desinit. Vomebat autem hæc primo non solum aquea, verum postea & acida, vt diximus; sed in fine vomitus sentiebat aliquid amarulentum, quod & gulam vellicabat: ideo rhab. 3 ℔. pilulis de biera addebam, iisque deuoratis malum, quod irremediabile videbatur, atque diu durasset, miraculi instar cessauit. Ita & quendam alium iuuenem, hoc eodem malo, solis pilulis de hiera, liberaui.

SCHOLIA.

Quatuor sunt accidentia ordine quodam sefe consequentia, quæ ventriculi appetentiam præcedunt, cum secundum naturam quis appetit. Primum namque omnium totius corporis inanitio, seu vacuatio est: secundum, naturalis euacuationum partium: tertium, ventriculi suctus: quartum ipsius suctus sensus: hinc sequitur iam dicta ventriculi animalis appetentia. Si hæc præter naturam vitiosa redditur, modum in quantitate excedens, dicitur tunc canina appetentia, 1. *De caus. symptomat. & comment. aphorism. 2. l. libr. 2. a canibus sic appellata, apud Alexandrinum Trallianum, lib. 7. cap. 5. Agri vomunt pituitam, & cibum, cum assumunt, quem retinere nequeunt; & post vomitum alium appetunt: estque vehemens & insedabilis ciborum appetentia: in aqua afficitur os ventriculi, vt 1. De caus. symptomat. & 5. De locis affectis.* Affectio vero symptoma est in genere noxæ functionum animalium, atque ipsius sensus tactus: ipsa quidem functio est deprauata, non diminuta nec ablata. Agri enim plus cibos appetunt, & cum appetitum cohibere nequeant (teste Aetio lib. 9. cap. 2. l.) in ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum aggravati, & absumptos citra nocumentum ferre non potentes, ad vomitum diuertunt: deinde rursum cibo se explentes, iterum ad vomitum reuertuntur, quemadmodum canes. Volunt autem hunc morbum fieri, vel propter intemperiem solam frigidam, vel ob pituitam acidam vel ob melancholiam, vel ob totius corporis dissolutionem magnam. Trallianus etiam a caliditate fieri scribit. Iam quoque a causis procatarteticis incitatur, vt a nimia æris infrigidatione; quod acci-

dit iis, qui per montes frigidos & niuosos iter faciunt. Ita & bulimon fieri volunt, de quo postea. Sic & ex potu aquæ frigidissimæ refrigerato ore ventriculi. Ob id scripsit Hipp. aquam & ærem facere voracitatem; sed magis aquam, quam & voracem appellat. Fit & cum æger nutritus alimentis exigui nutrimenti, vt si vescatur oleribus, fructibus acidis, asparagis, radicibus, leguminibus, aut aliis alimentis imbecillioribus. Fit etiam ob longum vsu alimentorum detergentium, vt ficuum vel gari; quod se Rondeletius in se ipso expertum scribit: qui cum me vellem (inquit) cogere ad vsu piscium, vteretque frequentissime gato parato ex lycoctoniis (vulgo Gallice Anchovy vocat) & oxylyzo, fucus etiam Massilienses fere omnibus horis comederem, ita fuit pituita illa ventriculi & intestinorum deterfa, vt mihi superueniret appetentia canina, deinde bulimos; qui me adhuc hodie infestat. Hæc Rondeletius. At causæ procatarteticæ huius affectus deprehenduntur ex reatu ægrotantis, & his, quæ præcesserunt. At si ex frigida intemperie, egestionibus multæ ex ipsorum ventribus procedent, crudis existentibus, nimicum cibis aut semicoctis. Si vero adfuerint acidi quoque succi, aderunt simul cum his acidi ructus: nec mirum si frigida intemperies, frigidique vitiosi succi in ore ventriculi redundantes propter frigus, alimentum & non potus desiderium excitant. Ex imbecillitate retentricis facultatis in toto corpore, contingat ob caliditatem, contraria magis iis (teste Tralliano) qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque acidum humorem vomunt: unde & his magis alius affectus est, quam citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborant, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti excernuntur. Quare etiam tales continuis illorum corruptionibus laborant. Plura de his vide apud Gal. 4. & 6. De locis affectis, & 4. de sympt. caus. Hi autem faciles, iuxta Paulum lib. 2. cap. 51. dilabuntur in cæliacum affectum, aut dysenteriam, & aquam intercurrentem, si ad consuetudinem vomendi peruenierint; cum & alios ingerant cibos cum priores nondum sint concocti. Et si diu perduret, in bulimon permutatur; interdum in soporem & interdum ad mortem. At canina appetentia, quæ ex immodica dissipatione ortum ducit, si periculum ad summum peruenerit, cognoueris (teste Gal. 6. De locis affectis) non difficile curabitur. Si itaque ex frigida intemperie vel siccis frigidis oriatur, ac eligatur ad calidum & siccatum vergens, videntur vigilæ immodicæ & somnus alliciatur: exercitium moderatum confert, alui excrementis prius arte vel natura depositis. Declinandos timor & mæsticia. Vini potus his, non cibi multitudo, remedium est: statum quidem vel rubrum adstringens id vinum sit, & merum: edulia pinguis, oleosa, ex Galen. & Alexand. & phasianorum femora, & carnes suillæ. Multos equidem Galenus sanauit, qui indefinenter famecebant, vinum abundanter exhibens, statum, vel rubrum adstringens: & primum offerre pinguis oportet. Potus ante cibum multus calidus, ex Aetio, cerebella, pulsetque cum melle & oleo, sorbitionesque appetitum destruentes. Ex fructibus, pistachia, noces pineæ, colymbades, & oliuæ ex melle; allium, porrum, & herbæ disseccantes, thymus, satureia: ex medicamentis oxymel simpl. scil. mel ros. Vomitus ex iufculis pinguibus, cum decocto raphani.

OBSERVATIO VI.

De grandi fame, quæ Bulimos Græce dicitur.

Iuuenis quidam Brabantinus, cum iter longum per frigora & niues faceret, vel externum frigus aliquod pateretur, illico ore ventriculi affecto, bulimon incurrebat, & ab eo statim syncope afficiebatur. Quod cum illi in itinere ter contigisset, ita vt vix à syncope à sodalibus, qui illi in via aderant, leuari potuerit, hunc casum famulo meo hoc tempore in Brabantia existenti narrauit: & is reuersus ad me, cum & Diestensis esset, ac huic iuueni familiaris, eius nomine me consuluit. Præcepi vt iuueni rescriberet, vt omnium primo cum syncope incurreret, ex mente Galeni, tum Alexandri Tralliani, extremæ partes constringerentur, continerentur, & pungerentur vndiquaque; & astantes aures perfricarent, & capillos attraherent, atque odoramentis ex aceto vel pane vino, intincto ægrum resciferent. Hoc enim plerique idiotæ sciunt: vtuntur autem ad vitalem facultatem, quæ digeritur, recreandam recolligendamque. Ex iis autem quæ odoratum mouent, est panis potissimum in vino imbutus: ægroque reuerso ad se, & defectione animi finita idem panis cum vino imbutus ante omnia dari debet. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre mutatur conficiturque ipsi exhiberi oportet: necnon quod confirmare potest: Ab eiusmodi namque, inquit Trallianus, iuuantur, & temporis processu ad bonam temperiem reducuntur. Generatur enim hoc malum, ex Galeno & Aetio, ex stomachi frigiditate ac virium imbecillitate: quæ semper fere ab externo frigore ortum ducit, vt hic. Hinc, teste Galeno, aucta oris ventriculi frigiditate immodice, propter eius exactum sensum, ac ratione viciniam, eam ipsi cordi impertitur, ipsumque valde refrigerat. Non abs re igitur causa existit, vt animo deliquium accidat. Imo propterea Galenus hanc affectionem dixit nihil aliud esse, quam animi defectum. Et cum hæc fames ingens ab externo frigore oritur, propterea peregrinationes (vt inquit Aetius) & itinera longa maxime per niuem facta (vt hic) affectionem hanc inducunt. Propterea & huius curationis ratio exigit, ne iuuenis iste neglectum habeatur, cum & quidam in locis desertis, aut in balneo in hoc malum collapsi ex instanti perierint, auxilij facultate destituti. Quapropter auxilia consellim pro eius curatione adhibenda. Namque assidue etiam bulimiam & exsoluunt, & in animi deliquia inducunt ægros; quibus ægre auxilium reperitur, ex eiusdem Aetij auctoritate. Et quia affectio hæc nempe frigiditas adiuncta est siccitati, vt Gal. asserit 5. De simpl. med. facult. ideo calidis tum humidis cibis, tum medicamentis vtetur. Itaque ægrum reuocabimus (vt etiam Galen. docet 8. De compos. medicam.) odoramentis aceti aut pulegij, etiam recenti pane odorato si ad manus sit. Vltro etiam panem cum vino maceratum offeremus, & oua sorbilia & carnem suillam. Valde commendat Rondeletius lucanicas Bononienses, quæ cum integro pipere parantur: Aliqui his addunt curationem à melancholia: in

qua lienis ratio habeatur: & purgaretur humor melancholicus, & stomachus roboretur exterius. Vide de his ad longum Alex. Benedictum Veronensem lib. 1. cap. 22. De curationibus variis inexplabilis auiditatis.

Si impacti humores pituitosi, hiera danda. Sufficit aliquando leuis euacuatio, & reiterata: quia multos humores non continet ventriculus, ob frequentem vomitum. Deinde electuaria propinanda, quæ calefaciant & robovent ventriculum, ex cinnamomo, arom. ros. diagalanga. Et exterius inuncto ventriculi ore, oleo nard. absinth. mastich. & vino maluatico pattem fouebis, tum aliis de imbecillitate ventriculi dictis. Si sit ab intemperie sola frigida, alterabimus calfaciendo, & leuiter constringendo medicamentis & fasciis. Si dat ex immodica corporis dissipatione, abstinentum à continenti calido ac vini potu, & ab omnibus, quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt, ex Aetij mente. Aër frigidus eligatur, quies iniungatur, somnusque mediocri, & vigilæ immodicæ vitentur. Alij volunt, si propter resolutionem magnam totius corporis fiat; aut quia vsi sunt alimentis detergentibus & euacuantibus immodice, optimis alimentis illos ali oportere; vitellis ouorum, succo carnis optimo, & generoso vino, pane intincto in maluatico vino, vel Hippocratico, vel mufcatellino. Hæc alimenta differunt ab iis, quæ ad bulimon præparantur, quod in bulimo dantur (vt sequenti exemplo dicetur) multum alentia & multum satiantia: atque ob id eligimus pinguis, quæ sunt fugienda in appetentia canina, quod vomitum proritent, vt & oleaginosa omnia, & magis liquida, quæ suapte natura facillime vomuntur. Istis tantum alimentis vtitur cum volumus ab initio augere vomitum. Si propter alimenta, aut medicamenta plus iusto detergentia hæc affectio acciderit, viscosa sunt danda, vt cremor alicæ, ptisanæ, decoctum pedis veruecis, aut aliorum animalium. Alexander iis, qui ex caliditate appetitus canino laborant, vinum non dat; sed cibos, qui ægre conficiuntur. Calida his inimica sunt, qui ex pipere parantur. Quibus enim ex immodico calore dissipatio fit, clysteribus lenibus vtendum: animi immodici affectus declinandi, & potissimum ira: cibique stabiles & ægre corruptibiles dandi, aquæ potus vel sem. coriand. præpar. decoctum. Cuiusmodi condensabimus oleo ros. omphacino & myrteo astringente. Valent lauacra frigida, si nihil prohibeat. A balneis calidis abstinendum. Vnguenta restringentia & refrigerantia profunt. Curationem retentricis facultatis infirma ex frigiditate, Alexander absoluit cibis & medicamentis calfacientibus, braslica vino percocta, cinara, pulset ex alica, cum vino, olyra, zea, perdice, attagena, carne leporina; inter bellaria, vuis passis: vnditionibus, epithematibus ex laudano, myrrha, aloë & similibus. Dat theriacam; & balneis calidis vtitur, & quæ mediocrem habent adstrictionem. Exercitia commendat, gestationes, nauigationes, & longas peregrinationes. Ad facultatem retentricem imbellem ex calore, oua dura exhibet: inter ouera lactucam, intybum. Ex auiibus gallinam cohortalem non admodum costam. Anserum alas & pectora, & phasianorum. Ex piscibus, dura carne præditos, orphum, glaucum, cuculum & sepias. Ex testaceis, astaces, buccina, peccines, cochleas. Ex leguminibus, phaseolum, fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis, mala dulcia, citria, vnam duram carnem præditam: peporum carnem, cucumerum medullam, lycimora, duracina & persica. Balneæ aquæ dulcis commendat, naturales refugit. Aliqui his addunt curationem à melancholia: in

Pet. Forest. Tom. 2.

A a iij multum

multum enim alunt & ventriculi calfaciunt. Bulimon enim eodem modo curari scribit, qua appetentia canina: in hoc tantum differens, quod alimenta oporteat esse duriora, & tardiora ad concoctionem, ut alimentum inde factum diutius duret. In his oportet cauere longiorem cibi dilationem ac inediam, & singulis horis simplicissimum modicumque cibum offerre. Hæc sunt quæ iuueni huic valde vitia esse putamus.

S C H O L I A.

4 **V**entriculi ostium indigentia simul ac refrigeratione & imbecillitate virium laborans, incurrit symptoma, quod à Græcis βούλιμος, à Latinis ingens fames vehemens esuritio dicitur (teste *Pars affecta Gal. lib. 1. de sympt. caus.*) βούλιμος enim Græca dictio, adiecta vocibus, vim habet augendi significationes earum. Os ventriculi hic afficitur, ut 1. *De caus. sympt. constat*: & eius affectus est symptoma ex genere noxæ functionem propriam ipsius appetentia deprauatæ. Differt autem à canina appetentia, quæ vniuersalis est: Bulimos magis specialis atque particularis, & deliquium accedens habet. Etiam causa differt: nam à frigore perpetuo fere accidit bulimos; canina appetentia ex nonnullis aliis causis, ut diximus. Signa per se nota sunt, cum adest fames & deliquium sequitur. Modum generationis & causam iam diximus, & etiam curationem. Quibus adiunges, ea quæ & Galen. & Aëtius de hac affectione scripserunt. Volunt tamen aliqui & in febribus hanc affectionem oriri, ut Aëtio & Paulo visum est: licet ea raro accidat. Inspiciendum tunc quo accessione tempore contingat: nam si in remissione seu declinatione febrium exacerbationum accidat, intrepide eis cibi sunt offerendi, quos diximus. Si vero in principio eueniat, aut in vigore apparuerit, conabimur eos primo reuocare, potissimum pane calido, vaporem adhuc emittente, vel polenta, aqua seu posca madefacta. Frictio quoque tunc temporis extremarum partium adhibeatur, & cataplasmata ex palmis, cotoneis, in vino diluto decoctis, ventriculo applicentur. Atque hæc usque ad remissionem facere oportet, ut oportune cibum offeramus. Quod si ex his nihilo melius habeant, audendum est per ciborum ingestionem auxilium offerre, vnam atque alteram in vino madefactam buccellam panis tribuendo; ut exinde refollicitari, usque ad remissionis tempus perueniant: in quo tum corporis curatio, tum sufficiens cibus ordinetur. Nam neque Galenus ipse verius est in principio, incremento ac summo vigore exacerbationum febrium potissimum calidis siccisque corporibus, quibus etiam stomachus fuerit imbecillus, cibum offerre, non vni duntaxat, aut alteri, sed pluribus, ubi usus postulare; præsertim panem ex vino diluto, ut liquido constat apud eundem lib. 10. *meth. med.* Si vero à frigidis in ore ventriculi & siccis succis redundantibus hæc affectio fiat, idè prius concoquendi, præparandi ac expurgandi sunt. Propterea, si bulimos fiat ab humore acido, euacuationem tentare oportet: sed cum maiore cautela id faciendum quam in appetentia canina. Nam hi, ut dictum est, facillime in animi affectionem incidunt, post euacuationem. Sunt autem statim (ut iam dictum est) rescindi vino & rebus odoratis. Inunctiones & omnia alia præscripta cap. De appetentia canina hic conueniunt.

6
A frigidis
succis succis
quomodo
curatur.

Id quoque considerandum, numquid à vermibus contingat: cuius habemus egregiam historiam apud Alexand. Trallianum, sic scribentem: Noui mulierem quandam, quæ cum multa & immoderate assumeret, omniaque concoqueret, & nunquam satiari se diceret, rofionem vero in stomacho experiretur, & capite doleret: medicamentum purgans accepit: erat autem hiera. Facta igitur euacuatione vermem proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures habere putaretur. Atque tunc immoderata & furiosa appetentia conquieuit. Innotuit igitur non bulinum, sed bestiam fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, omniaque consumeret.

OBSERVATIO VII.

De Citra sine Pica & Malacia.

Pvella annos nata 15. filia illius Theodori Cornelij mercatoris frumentarij Delphensis distissimi, habitantis in foro frumentario. Hæc quidem facie admodum pallida, statura exigua, citra seu malaciam patiebatur: frumentum enim & triticum crudum & cretam in maxima copia comedebat: uti & Maria Petri Sasboti filia, prægnans, in maxima copia cretam vorabat. Et enim hoc symptoma & puellis & prægnantibus familiare aliquando, ut in scholio latius dicturi sumus. Sed quod ad hanc puellam attinebat, cum deprauata appetentia ex causarum promotione tollatur, nempe prauorum succorum purgatione, ad eam curandam, ex communi consilio Henrici Vergerij Medici Haghani doctissimi, qui vna mecum ad curationem accitus erat, post syrupum de absinthio sæpius propinatum hoc sequenti infuso vi sumus; *℞. pul. folliculorum senæ ʒij. infunde per noctem in aqua betonica (cum & capite doleret) aque sumaria, absinthij, boraginis ana ʒj. mane post expressionem adde pul. specier. hieræ picæ simplicis ʒ ss. syr. borag. viol. (qui & vomitum incitat) ana ʒ ss. misce sumebat mane hora vi. in diluto: & post tres horas soluta est aluus: his aluum deposuit, & semel egregie vomuit. Deinde stomacho exterius corroborato, oleo cotoneorum, nardino, & mastichino, & cerato stomachico superius posito, hæc sanata est.*

S C H O L I A.

Affectio quædam est, Græcis πίκα & πικρία, à Latinis Pica: quæ secundum quosdam à pica auicula nomen recipit; vel à picæ avis varietate (ut Paulus ait lib. 1. cap. 1.) vel quod ea eadem subinde hoc malo corripitur: secundum alios ab hederæ similitudine, qui vides Græcis vocatur, nam sicuti illa variis plantis (prout occurrunt) se implicare solet; ita mulieres ex pica laborantes, varia edulia appetunt, atque ea contraria, quæ tum voluptatem tum insuauitatem gustandi exhibent, Aëtio teste lib. 6. cap. 1. Malacia vero dicitur, quasi mollities. Pica enim corrupta est appetentia, quæ vtero gerentibus frequens est, & potissimum accidere consuevit tertio à conceptus mense: nam tunc fetus (teste Paulo lib. 1. cap. 1.) omne quod ratione alimeti ad ipsum fertur, tamquam imbecillior, nequit consumere: unde fit, ut cum varia ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundant, varia & naturæ aliena appetat: exempli gratia, carbones extinctos cretam, cimoliam, aliaque

aliaque complura, ut etiam terram, carnem crudam. Nouimus & nos aliquas mulieres grauidas crudas angillas deuorasse, & nuper istis diebus Delphis pellem ouillam crudam vna cum lana, aliam comedissemus percipimus: alteram vero Alcmariæ picem naualem cochlearibus excepisse atque deglutiisse. Hæc non solum mulieres, sed & pueros & viros nonnunquam infestat. Tantum vis malaciæ est (inquit Fernel.) ut vir quidam nobilis edenda calceis viuæ desiderio iam diu pressus, illam tandem pugni magnitudine vorauerit recreatus: nulla ventriculi, nulla viscerum offensione. Vidimus & infantes & pueros aliquos adultiores, carbones, cineres & arenam & cretam deuorasse, & calcem à lapidibus excussam. Contingit & puellis cachexia laborantibus, ob mensum retentionem, aut feminis, à viciatis & corruptis humoribus in ventriculo collectis. Atque ex his iam dictis facile patet, & quæ sit pars affecta & qualis affectus. Constat autem ventriculi ostium, ut 1. *de causis sympt. & 5. De locis affect. constat.* Estque symptoma ac noxa eiusdem appetentia, quæ deprauata est in qualitate tamen, & non in quantitate, velut canina appetentia, excedens: ut 1. *de causis sympt.* habetur. Aberrant facultas appetendi, cum non cibos, quin imo prauas appetat qualitates, ut acida, acerba, acris, cimoliam terram, testas & iam dicta. Ita puella nata annos 12. apud Amatum cent. 3. cur. 86. facile pallida & gracili, indiserete lapillos, terram, calculos, cretam, gypsum, lanam & varia similia comedebat: & ita eisdem delectabatur, ut inter suendum eius pulvinaris, super quo mulieres suere solent, gossypium suauis appetentia comederet: tamen à matre & assistentibus increpabatur. Nec enim prædicta tantum comedebat, sed absurdissimos alios cibos, quæ & ab eodem curata fuit, ut ibidem videre licet. Apparet etiam taliter affectis assidue expiratores, oris ventris morsus, ac anxietates. Insequitur autem prauam eiusdem oris ventriculi intemperiem: cum eius tunica prauo aliquo excremento fuerint imbuta: quo fit ut mulierculis vitioso humore repletis, euenire solet affectio hæc: maxime cum vterum ferunt. Pro varietate autem, peregrina edulia appetunt: & propterea alio signo non indigent pro eorum diginitione: quamquam etiam per vomitum iidem manifestari consueverunt. Contingit autem & puellis cachexia laborantibus, ut diximus, & à viciatis humoribus in ventriculo collectis, ut hominibus aliquando accidit melancholia laborantibus, aut diuersis humoribus. Nam fere euenit, ut Rondeletius existimat, ut ventriculus appetat similia alimenta humoribus in se contentis: ut si atrabilis non vltia in ventriculum effusa sit, acida appetunt: si vltia sit & incinerata: carbones, cineres & alia alimenta sicca appetunt & assument, & illis delectantur: qui falsos humores, falsa, qui alios, alia: ita ut ex eorum appetentia humorem coniciamus collectum. At Iacchinus hos sic affectos remedium querere putat ex assumptis: remedia vero queri per contraria. Hinc alij qui viciis abundant, acida petunt: qui frigidis: multum acris: qui calidis, acerbis: qui indubilibus qualitatibus, etiam indubilibus qualitatibus cibos. An & hinc monstruosæ libidines in iis, qui semen retinet: Sed cur fieri dicas, ut in retentis mensibus conceptionis tempore eueniat, non grandioribus, cum sponte detinentur? Vtrumque tamen per naturam. Respondet, semper si intra tempus purgationum naturale detineantur, noxam faciunt hanc: non si extra. Natura enim alio ea excre-

menta in senioribus sensim deducere assuescit: & eiusmodi excrementa in senioribus non adeo multa gignuntur. Solet autem hæc affectio contingere iuxta Aëtium, vtero gerentibus, fere circa quadragesimum diem à conceptu: & sæpe usque ad quartum mensem durat, vel compluribus, teste Galeno, usque ad secundum & tertium mensem: in quarto vero quiescent, partim quod vomitione viciati humores expurgantur: partim quod concoquantur, ut pote exiguum cibi tum sumente muliere, ob fastidium: partim etiam quod multitudo vacuatione sit diminuta, quippe primis duobus mensibus fetus paucum ad se sanguinem attrahit, eo quod parum adhuc auctus sit: ubi vero iam creuit, tunc plurimo indiget alimento: atque tunc non id, quod optimum est è venis allicit, verum etiam: quia maiorem alimenti copiam requirit, aliquid vitiosum simul attrahit: & ita fit, ut vniuersum corpus plenum esse desinat, & minori humorum vitio crucietur. Idem tamen affectus cum viros inuadat, ut diximus, ob humorem vitiatum ad os ventris delapsum, nequaquam etiam despicendus est. Vicius autem hic instituendus pro varietate vitiosus & prauis redundantis humoris. Sed hoc cum his commune est ut cibis vtantur moderatis, & qui non facile corrumpantur. Sic panis succo cotoneorum aut malorum puniceorum maceratus confert, & cichorium. Ex auius neque pingues, neque virosæ, pedes maxime ac rostra, & ventriculi porcorum: & erinacei marini recentes cibi sunt quantitate moderati, & si cibos auersentur: obsoniorum varietate ac iucunditate illectentur. Abstineant tamen à dulcibus obsoniis: verum iis, qui terram appetunt: nihil ita prodest, veluti amylium recens. Cunctis ante cibum confert olius albus, muria conditas cum pane molli exhibere, atque quinque vel septem amygdalas amaras: post cibum autem vix passæ, mala punica ac pyra præbenda. Porus sit moderatus, ne alimenta ventriculo innatent, ac vinam fuluum, odoratum antiquum & subastringens bibant. Si vinum auersentur aquam ex ciunnamomo decoctam potabunt: nostri vero, qui vinum non bibunt, cereuisiam: non tamen recentem, sed defæcatam. Quod ad medicamenta attinent: quidam hic dant magis digerentia, quam fortiter laxantia. Si vero stomachus ab acris, acido, aut falso humore mordetur, ad excitandum vomitum tepidam aquam bibere poterunt: ut humor affligens euomatur: alioqui si difficilis sit vomitus, aliquid aceti seu syr. acetosi addendum volunt. Si crassius fuerit, quod euomunt, & ob difficultatē, difficulter excernitur: raphani etiam decoctum cum aceto mulso exhibebimus. Nam omni studio conandum, ut infestus humor citra molestiam per vomitum educatur: præsertim ipsis vtero gerentibus, quibus nec medicamentum purgans dandum iuxta Aphor. 1. lib. 4. cum in primis mensibus hic affectus oriatur. Sed viris si accidat, neque per vomitum sedari possit: purgans medicamentum dandum, prius tamen syr. quibusdam adhibitis, pro ratione redundantia: quui succi: oxyrach. acetos. vel oxymel, vel scillimum: deinde hieræ picæ purgandus, vel agar, & rhubarb. alij vomitum à cibo frequentem iuuare aiunt: & medicamenta laudant, quæ ad anorexiam commendant, ut cass. thamar. diachaul. & triph. persicam, syr. ros. laxat. de sumoret. compos. & serui lactis cum infus. myrobol. vel sol. senæ: quæ frequenter exhiberi volunt, nempe quatuor vel quinque vicibus (ut Rondeletius iubet.) Deinde ventriculi intemperiem corrigunt, si qua sit contraria

Aa iij ex recre-

Topica.

excrementis, idque topicis remediis, prius de intemperie ventriculi dictis, cum de imbecillitate eiusdem ageremus. Aëtius euacuato humore vitioso, lib. 9. cap. 23. exhibet mali punici dulcis succum, mentha sicca insperfa, & portulacæ cremorem, & ipsam quoque in cibo, & alia quæ apud ipsum inuenies: & forinsecus topica languido stomacho imponit, cenanthe, balauftium: ros. & citinum cum vino cataplasmatim modo, aut absynthium cum palmarum carne, vino incoctum vel cotonea cum posca & rosaceo, vel nardino cerato excepta: tum alia quoque quæ ipse commendat.

OBSERVATIO VIII.

De anorexia seu inappetentia, vel cibi fastidio.

Ioannes Theodorus Harperus, consularis vir apud Delphenses, cum inappetentia laboraret, ad incitandum appetitum vna cum Henrico Vergatio medico Hagano, sequentia præscripsimus. *℞. syrupi de limonibus: de acetos. citri ana ℥ ij. syr. acetos. simplicis, syrup. ros. ex multis infus. vel sacchari ros. ana ℥ j. syr. menthaei ℥ j. ss.* Capiebat omni mane duo cochlearia, paucis vino Rhenensi addito. Egrege profuit. Verum post discessum alterius medici, cum medicamenta abhorreret, macerabam per noctem absynthij Romani comam, & dentis leonis radicem vnam atque alteram paululum contusam, in vino Rhenensi; mane vinum expressum propinabam. Et dictum mirum vir septuagenarius, vermem mortuum, postea & viuum deiecit, & appetitus miraculi instar rediit.

SCHOLIA.

Si functionis sensus in ore ventriculi pereat (teste Galen. 1. De causis sympt.) vel functio non fiat, aut corpus ipsum non inanitur, affectio excitatur à Græcis communiter dicta *anorexia*, & à Galeno: modo *anorexia*, ut patet comment. aph. 17. lib. 4. ab Hippocr. autem prædicto aph. 3. lib. 6. *anorexia* nuncupatur: & aph. 61. lib. 5. *anorexia*, cibi fastidium ab Hippocr. & Galeno appellatur: à Latinis modo cibi fastidium, interdum inappetentia dicitur; quamquam inter *anorexia* & *anorexia*, hæc differentia tradatur à Galeno 1. De morbo, vulg. ut etiam Donatus annotauit, quod illi appetentia carentes, cibum non sumunt: alij oblatio fastidiunt, quæ quidem affectio contraria exilit caninæ appetentia. Namque in illa modice appetunt: in hac nullo modo, ac nihil appetunt. Appetentia nedum oblata, sed absoluta, pertinet ad symptoma in genere noxiæ functionis animalis, & proprie pertinet ad affectum. Estque pars affecta, os ventriculi, nempe pars officinalis, & huius curatio etiam deseruit ad exitum, & quæ inappetentiam. Dictarum affectionum, seu inappetentia, iuxta Alexand. cap. 7. lib. 7. aut intemperies quædam aut humores in stomacho contenti causæ sunt. Sic & Paulus lib. 3. cap. 37. duas fastidij causas ponit: aut vitiosam stomachi intemperiem, aut humorum redundantiam. Fit autem à causis contrariis his, à quibus fames excitatur: scilicet propter plenitudinem ventriculi, vel quod inanitionem nullam sentiat os ventriculi. Non sentit autem, si plenus sit ventriculus recrementis dulcibus: illa enim satietatem faciunt, ut acida appetitum. Pituita etiam insipida, vel sanguis in ventriculo collectus faciunt satietatem. Biliosa recrementa non quod ventriculum replent, sed quod cum

supra modum calfaciunt, appetentiam deiiciunt: calor enim solida corpora laxando dissoluit, atque ad attractionis functionem reddit imbecilliora. Nam ut frigus appetitum auget, sic caliditas eundem destruit: quemadmodum & medicamenta, calida, dulcia, pinguis, & vina generosa, ut Hippocr. scripsit: Tororis famem sedat. Vinum autem quia calfacit, & subito nutrit, famem auferre dicitur. Quare qui cenam aut prandium à potu vini inchoant, hi parum aut nihil comedunt. Bibones quoque raro appetitum habent. Pinguis vero, quia ventriculum relaxant, & quodommodo resupinant, appetitum deiiciunt. Deiicitur & post morbos acutos: in quorum principio multum alimenti assumere, id quod Hippocr. scripsit aph. 32. lib. 2. Omnes fere qui male se habent, circa initia cupide comedentes, nec quicquam proficiunt, ad postremum nihil appetunt: qui vero circa initia cibum fastidiunt, postea bene appetentes, hi in melius euadunt. Post chronicos etiam morbos fit, quod ex his facultatum naturalium vis sit deiecta: in morbis præterea, in quibus non est facta insignis euacuatio per ventrem: item in omnibus internis inflammationibus, ob calorem ventriculi: in fluxibus præterea ventris, vel propter imbecillitatem, vel quia recrementa desuunt in ventriculum: ut quando pituita à cerebro in ventriculum descendit, & excrementa sunt spumosa. Deiicitur & appetentia ob relictum exercitium, aut quia nulla est, aut parua sit resolutio, ut in multis obesis: in iis qui consueverunt frequenter coire, & non amplius coeunt. Aliqui cibos non appetunt, quia priusquam esuriant, iuscula, aut alia alimenta assumunt: quod sæpe ægrotantibus contingit, ob muliercularum importunam diligentiam. Vidimus in morbis quibusdam adeo creuisse inappetentiam, ut nihil vel modicum sumpserint. Sic Religiosam quandam apud diuam Barbaram Delphis, annos 65. natam, anno 1562. iustero morbo correptam (cui fluxus ventris perpetuo aderat) instar saponis nigra deiicientem, cui & vrina veneta, nigra, pastosa, copiose profluebat, corpore squallido & exsiccato, post sex septimanas plane exhaustam decubuisse, nihilque bibisse, aut edulij sumpsisse: præter grana quædam malorum granatorum, illa in ore detinendo, & exiguum succum sugendo. Ad quam pater illius conuentus me deduxit, non sanandi, sed miraculi causa, quod iam diu vixerat sine potu ac cibo: quamuis altero die quo ad illam me deduxerat pater, hæc obierit. Sed & illud quod nunc referam, magis admiratu dignum esse existimo. Puella erat annos 27. nata cum dimidio, quam anno 1566. 11. Maij vna cum Chirurgo inuisimus, ad partem orientalem ipsius vrbis Delphensis decumbentem. Hæc autem ab anno 16. ætatis suæ perpetuo lecto decubuerat, atque iam vndecim annis nihil aliud sumpserat, quam casei momentum vulgari lingua Stolckij dicti, muliere assistente nobis narrante: nihil enim liquidi aut potus deglutierat, licet mediocriter mingeret: verum singulis octo diebus tantum semel aluum deponebat. Insuper cæca nata erat: quamuis mediocri valetudine frueretur ad annum decimum sextum ætatis suæ. Ab eo autem tempore, terrore correpta, in hanc malam corporis dispositionem lapsa fuit, ita ut vndecim deinde annis subsequenter, nunquam lectum egressa, etiam nunc lecto decumbat, ac semper in deteriorius malum pregressum fuerit: adeo ut anno ætatis suæ vigesimo, venter in tumorem haud exiguum attolleretur, atque omnes eam eo tempore (ut affligens muliercula narrabat) pro hydropica haberent.

7 berent. Sed paulo post detumuit, venter, præter rationem, & subortus est rugitus in ventre vehementior, ac murmur quoddam, tanquam ranarum crocitantibus in ventre latitarent, cum motu quodam ingenti ac vehementi sublatione, mox depressione tum ventris, tum thoracis, instar fluctuum maris se se commouentium: qui motus adeo validus erat, ut etiam nos manum ventri admoventes, eundem cohibere minime potuerimus: ita ut is motus manum nostram attolleret. Rogauimus puellam nunquid dolorem sentiret? Imo maximum, respondit. Insuper aiebat (quod valde admirari dignum erat, etiam muliercula adstante idem annuente) quod motus ille ad plenilunium augeretur, & simul cum affluxu maris, in maiorem elevationem totus venter tum pectus mirum in modum attollerentur: & maris fluxu recedente simul motus ille decreveret & minueretur. Hic autem motus septem annos durauerat. Mirum quod puella tota vitiosa superuixerit. Rogabam quoque numquid mensis tempore consueto fluxus esset. Sed pudica, ac mente constans rubore quodam suffusa non respondebat: muliercula tamen assistente annuente, singulis decem septimanis certa quasi periodo profluere: sed admodum corruptas purgationes esse referebat. Cum autem animaduertere portentosum morbum esse, minimeque naturalem, licet astantes causam referrent, in terrorem, à quo male habere prius coeperat: ideo habita huius puellæ genitura, quæ nata dicebatur anno 1538. 25. Octobris die, circa quartam fere horam post meridiem, iuxta Astrologorum decreta perscrutari volui numquid ab astris aliqua causa probabili coniectura haberi possit. Erant autem tunc in medio cæli stellæ nebulosæ, quæ sunt cum oculo sagittarij, & in occasu nebulosæ, quæ est in aculeo scorpionis: luna in octaua, & Sol in septima, in loco opposito vitæ. Hæc cæcitatem decernebant, iuxta Ptolomæum. Sol quoque cum cauda Draconis, & Saturnus in sexta, & Luna in octaua, & Mars dominus ascendens, decumbens cum venere, portentosam, & valde vitiosam genituram declarabant. Solus Iuppiter in tertia domo in quadrato Saturni vix vitam sustentabat. Ita ut hæc miserâ videatur & brevis vitæ ac valde vitiosa: licet ad hoc usque tempus vixerit, tamen morbosâ. Sed hæc extra metam medicina, cum ad Astrologiam pertineant. Coniecturalibus enim signis ac causis non ita insistendum, ut iis, quæ ad medicinam faciunt. Hoc tamen pro miraculo, aut magis pro ostento habetur, quod tam diu sine potu vixerit, solo modico caseo vtens. Ideo à curatione desistimus, cum & illa omnia remedia tum medicos ipsos respuerit. Multa certe apud nos latent; ut etiam de illa triennali inedia puellæ Spirensis, de qua meminit Ioannes Langius medicus doctissimus 2. epist. suarum miscell. epist. 27. Quæ quidem causæ adeo obscuræ sunt, ac soli Deo cognitæ, licet ex terrore (ut huius puella contigit) pessimos posse oriri morbos sciamus: uti etiam ex ista bombardæ, ut alias narraui: militem enim cognouimus, qui ingenti eius fragore: cum bombardas admodum magnas emitteret, in perpetuam maniam inciderit. Narrat etiam Benedict. Veronenfis medicus insignis 46. diebus continuis, quandam Venetiis ieiunium habuisse, habitudine membrorum frigida, crasso phlegmate intus & incocto, meatibusque corporis adstrictis. Pudet etiam (inquit) referre de virgine sacerdotali, quæ ætate nostra in ediam pluribus mensibus sustinebat. Illa quoque in micaculum patribus Romæ venerat, vnde experi-

mentum; pluribus custodientibus dedit, Columbelli nomen. Sed ad causas anorexiæ reuertamur, quas iam paulo ante enarrauimus: quæ ipsæ etiam exemplis subsequentibus facile innotescunt, ut quibus modis eas ipsas distinguamus: & sic etiam melius curemus.

OBSERVATIO IX.

De anorexia ex humore bilioso, cum ventriculi intemperie calida.

Appetentia amissio quamuis contingat, si corpus non inanitur, vel ob calidam ventriculi intemperiem, vel à sanguine immoderate misso; aut si venter intestinaque immodice fluxerint: plerumque tamen appetentia prosteritur, humorum aut biliosorum, cum intemperie ventriculi calida: aut pituitosorum cum intemperie frigida in ventriculo contentorum vitio. Sic iuuenis valde macilentus, ob biliosos humores cibum auersabatur, cui & sitis tum nausea aderant, & præcipue ventriculi morsus. Quem hoc modo curauimus: cum enim mordaces humores biliosi ventriculum lancinarent, & hic nauseabundus, & in vomitum satis procliuus esset: statim ieiunio ventriculo ℥ vi. aquæ tepide propinauimus, ℥ j. ss. syr. acetos. simplicis adiecta: digitos in os & fauces demittendo vomitus commode eliciebatur. Aliqui hic, ut Paulus & Alexander, priusquam aquâ tepidam cum aceto; vel syr. acetoso exhibeant, tepide ægro alimenta humectantia; veluti pituita cremorem, vel ouorum lutea dant: deinde exiguo tempore interposito, vomitum prouocant: nam is sine noxa iis est vtilissimus, teste Alexandro Tralliano. Alioqui, si difficilis æger vomuerit, melius est materiam ad ventrem prouocare, copiosiore temperatoque alimento prius humectatam, ut idem Alexander refert. Sic alteri, qui difficile vomebat, aquam hordei, paucis zaccaro immixto, cum syrupo viol. modo aquam hordei solam cum syr. viol. ex infus. ros. & de succo cicherij, aliquot vicibus dedimus: quæ etiam huic, post vomitum, ad contemperandos humores, & alterandos, exhibuimus. Deinde pro leui purgatione propinauimus syr. ex infus. ros. palid. ℥ ij. cum ℥ iij. feri lactis: qua potione breui, bene excreuit biliosa: alioqui exhibuissim rhabbar. infus. vel mannâ; aut cassiam, cum decoct. thamarindorum. Bilioso humore euacuato: calidi ventriculi intemperiem in hunc modum alteraui: *℞. syrup. de succo acetos. citri, & granatorum, acidorum ana ℥ ij. dentur ℥ ij. ante pastum, bis & confere syrup. de persicis.* Et pro alteratione & roboratione miua cotoneorum, & cotoneum ipsum zaccaro conditum, & syr. citri acidus, cum aqua hordei. Imperaui quoque, ut persicam in principio pastus assumeret: hæc enim maxime appetentiam incitat, si à causa calida prostrata sit: uti hic erat. Serapium vero de persicis hunc in modum fit, quo uti possumus in tali casu. *℞. succi persicorum, quæ nouum plenam maturitatem sunt affecta ibi iij. decoquantur usque ad dimidij consumptionem: permittantur subsidere facies: deinde adiciuntur succi malorum puniceorum ℥ vi. zaccari q. s. simul perfecte coquantur, depurentur, adiectisque samalis citrinis q. s. suauiore odore reddantur.* Dantur ex hoc syrupo ℥ ij. mane & vespere, duabus horis ante pastum. Si persica defuerit, pro illis sustitui potest succus pomorum acidorum redolentium, minime dulcium. Interea hoc condito vti iussimus. *℞. confere acetosæ ros. ana ℥ j. ss. corticis citri conditi ℥ j. ss. dantur*

donij sine specibus 3 j. pul. specier. triens. 3 j. corall. rubr. 3 j. cum syr. up. ex malis puniceis, vel persicorum, si adfit: fiat conditum molle. Capiebat ad magnitudinem castaneæ, mane & vespere: horis duabus ante pastum. Modo etiam capiebat rob. de ribes, & rob. granorum Veenlandiæ, apud nos egregie incitans appetitum: ex causa calida deiectionum, & ad stomachum calidum & sitim extinguendam valens: quod in multis felicissime usus sum. Exterius vero forum adhibuimus: 2℥. ros. rub. m. 3 j. folior. acetos. & intybi sativi latoris ana m. j. absinthij fisci & communis Romani ana p. j. semin. coriand. præp. 3 ij. sumach. bacchar. oxyacantha ana 3 j. specier. diarab. abb. 3 j. decoquantur in f. q. aquæ, adiectis succi coroneorum 3 ij. aceti ros. parum: fiat fons cum spongia immersa & expressa. Eaque calente ventriculi regio foueatur mane & vespere ante pastum: deinde vngu. infra scripto vngatur. 2℥. olei cydon. ros. myrti ana 3 j. olei absinthij 3 j. corall. rub. coriand. præp. santal. citrin. & rub. ana 3 j. flor. ros. rub. puluer. 3 ij. roch. de capbura 3 ij. aceti parum, cera q. s. fiat vngu. Deinde apponui ceratum santalinum. Victu quoque refrigerante vtens: & moderato somno, & quiete & cibis refrigerantibus (Paulus autem dat panem posca imbutum, etiam in potu) vt lactuca & cichorio, ex aceto, ex volucris montanas sumendo, pedesque suillos, tum alia (quæ etiam ab Aetio commendantur) hic recte deinde valuit.

SCHOLIA.

6
Signa.

Signavero quæ calidam intemperiem notant, siam antea diximus: adest enim sitis, oleosusq. ructus, Paulo auctore. Quibus si & biliosi humores accesserint: etiam ventriculi rofiones, nausea, & sitis, subinde & febris hos sequitur. In intemperie frigida, contraria superius adesse diximus: illi enim non sitiunt, & acida eructant, si simul ad sint crassi viscosique succi, ij neque rofionem ventriculi, neque sitim experiuntur, & si in sinu humores existunt, nausea & vomitu premuntur. Si infanti tunicis inhaerescunt, nausea solum, non vomitu afficiuntur. Immodica autem corporis plenitudo, præsertim humorum crudorum inanitionem prohibens, si inappetentia causa fuerit, quemadmodum vris, & quibusdam latentibus animalibus euenit, quæ per multum tempus à cibo abstinere: maxime hyberno tempore, haud difficulter dignosci poterit. Similiter etiam si propter quampiam aliam causam, vt pote cutis densitatem, aut otiosam vitam impedita fuerit inanitione, & per consequens excitata inappetentia. At si calidi fuerint viscosi succi, totum corpus occupantes; præter alia signa, rigor aderit, & febris cum cibi fastidio, seu inappetentia: quæ haud negligenda erit, cum sit ad vitam necessaria ipsa appetentia, Gal. teste aph. 3. lib. 6.

Prognostica.

Quamuis si iuxta principium morborum accesserit, aut iuxta vigorem: cum vires adhuc sustinere possent: nihil molestiarum inferret, Aet. ant. cap. 20. lib. 9. modico tunc alimento agri opus habent. Si vero in declinatione totius morbi appetitus perditio accidat, aut in diuturna imbecillitate aut viribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo non vacat, ex eiusdem auctoris sententia. Augere etiam affectio hæc ab ætate: incommode enim pueri hoc malo afficiuntur, vt pote qui voraces natura sunt, & assiduo fomire opus habent. Quare magnus præter naturam excessus significatur, si pueri perditione appetitus fuerint affecti. Quomodo autem curetur calida intemperies, iam diximus; nempe victu refrigerante:

eligendo ærem frigidum, & singulis diebus excrementa alui educendo, natura vel arte: nempe clysteris: vitando anxietates & reliquas animi perturbationes. Quidam hic commendant cibum refrigerantem, etiam oua forbilis, testes gallorum: & ex volucris non graueolentes. Alij conantur & appetitum reuocare per odoramenta, ex posca aut vino diluto, aut malorum cotoneorum, seu odoratorum pyrorum decocto: vel aquæ rosæ 3 ij. aceti vini albi 3 j. santalorum omnium 3 ij. miscantur, & fiat odoramentum. Extrinsecus quoque, vt iam ostendimus, stomachum fouemus, corroboramus, & intemperiem calidam alteramus: vt oleo ros. omphacio, cydoniorum, adiect. succo lactuca, cichorii, portul. vel solani 3 j. santalor. & corall. rub. 3 j. cum pauco aceto & cera exigua. Fiat vnguentum, vel cydonium posca decoctum & confusum stomacho apponito. Eo tempore valet & frictio corporis atque pedum, manuumque palpitatio & contritatio moderata, teste Aetio, & sacelli, de quibus sæpius dictum est. Si ad sint etiam humores biliosi, curatio iam satis constat exemplo superiori. Quomodo autem curetur intemperies frigida, etiam cum humore pituitoso sequens exemplum ostendit.

OBSERVATIO X.

De inappetentia ex pituitoso humore, cum intemperie frigida ventriculi.

Puella pituitosa, mali habitus, ventriculo frigido cum afficeretur, pituita etiam collecta fuit in stomacho, vnde ructus acidi, & ventriculi inflatio subsequatur: nulla sit premebatur, feruentia amabat, pituitam crudam sæpe euomebat, quæ appetentiam adeo læserunt, vt dulcia omnia & vinctuosa & insipida, & omnem cibum tandem abominaretur. Ad quam curandam admissus, tentabam nunquid pituita vomitu educi, indeque auelli posset. Siue enim is humor in ventriculi tunicas sit impactus, siue secundum internam spatij latitudinem in eo contineatur, experiendum, an vomitu educi ac euelli possit. Et quia videbatur, non admodum difficulter vomere, dedi aquam tepidam, cum oxymelite: digitorumque immisione cibum cum pituita simul euomit: quæ tamen erat tenax, quamquam aliquando coningit, vt biliosa & pituitosa quadam euomantur, quæ perdit appetitum in quibusdam sunt causa, atque ita ab hac accessione liberantur. Cum hic igitur humor pituitosus esset, quique vomitu non perfecte ductus erat: nobis vile visum fuit, vt is incideretur, atque extenuaretur in hunc modum: cum crassus & viscidus esset. 2℥. oxymel. simplicis scyllini, mellis rosæ colati ana 3 j. aqua absinthij, mentib. faniuli ana 3 ij. misce. pro ij. dosibus. Fuitque hoc repetitum bis terque, donec materia probe cocta videretur: quam tunc ita purgauimus. 2℥. elect. hiera picra Galen. 3 j. dissolue cum 3 ij. iuris cicurum rubr. & detur in diluculo: quo medicamento alnum satis bene deposuit. Alias ob amaritudinem damus pilulas de hiera, & ita postea, cum hæc ipsa nondum satis purgata esset, post tres aut quatuor dies subsequentes pilulas deuorauit. 2℥. pill. alephani. de hiera simplici ana 3 j. cum aqua absinthij: fiant pilula v. postea etiam ex 3 j. pilularum dictarum consecimus pilulas vj. de quibus tres per horam ante cenam semel aut bis singulis septimanis sumpsit. Vltimo tam medicamentis assumptis quam admotis ventriculum roborauimus: sumebat enim singulis diebus duabus horis ante pastum mane

mane & vespere duo argentea cochlearia syr. absinthij, per se: vel cum liquore stillatio chamæmeli. Deditimus quoque diacalamimben, vel diatrionpip. ad 3 j. modo tabularum arom. ros. sinensis, duabus horis ante pastum 3 ij. Sic alteri viro eodem malo laboranti, post vniuersalia remedia commode exhibui 3 j. theriac. At nostra puella etiam hoc condito utebatur. 2℥. confer. absinthij 3 ij. corticum cini 2℥. conditi 3 j. specier. arom. rosæ sine musco, specier. diacimamom. ana 3 j. cum syr. conferuationis citri: fiat conditum molle: capiebat omni mane ad magnitudinem paræ castaneæ: duabus horis ante pastum: & superbibebat parum vini meri. Exterius vero ventriculum inunximus vnguento sequenti. 2℥. olei nardini, mastichini, ana 3 j. olei absinthij 3 ij. menthe sicæ, ligni aloes, caryoph. puluer. ana 3 j. olei maceris 3 ij. ceræ q. s. fiat vnguentum. Vti sumus, & ante inunctionem fotu ex decocto absinthij: mentha, calamintha lisybri, cui specier. arom. ros. 3 ij. vel iij. in fine potu colaturam iniecit erant in vino mero decoctis: in quo calente spongia, aut lana succida, madefacta & expressa, ventriculus mane & vespere ante pastum fouebatur. Deinde inuncto ventriculo, vltimo hoc emplastrum apponebatur: Recipe emplastrum stomachici: emplastrum mastichis, ana 3 j. coralli rub. 3 j. absinthij fisci 3 j. galanga 3 ij. subigantur cum oleo nardino & menthaceo, & fingatur emplastrum vel ceratum (adiecta cera si opus est, ad maiorem soliditatem & coherentiam) ad leuiri formam, quod ventriculo post fotu vel inunctionem applicetur. Auferebatur autem, cum cibum agrotus sumeret, hoc est, prandii & cene tempore, ne sua stypticitate cibum in ventriculi fundum descendere prohiberet. Præterea præcepimus, vt pastus initio pane alio cum vino macerato, adiecto pauco saccharo vteretur: in pastus vero sine pulvere sequenti, aut huius æmulo. 2℥. coriandri præparati 3 j. diacydonites cum specib. 3 j. anisi, cinnamonomi selecti. ana 3 ij. pellicul. ventriculorum gallinarum præpar. 3 ij. sacchar. albiss. ad pondus omnium: fiat puluis: quo in fine pastus utebatur. Hoc enim modo non solum hæc puella, sed alij plurimi appetitum deperditum ex intemperie frigida cum humore pituitoso receperunt.

SCHOLIA.

Hæc affectio curatur contrariam causam inducendo: si enim ex intemperie calida, vt iam præcedenti scholio diximus, oriatur, curatur eam tollendo & alterando cum frigidis. Si ad sit humor simul vitiosus, nempe biliosus: vomitu: tum deiectione vacuandus, vt iam diximus, quibus etiam conuenit: decoct. tamarind. pran. acid. & sebesten. cum syr. rosæ. vel rhubar. In crastinum medicamenti duabus horis ante pastum, quidam propinant aquam frigidissimam, modo ventriculi imbecillitas, aut aliud non prohibeat. Cibi condiantur multis acidis, omphacio, succo arantiorum, oliuæ, cappares, faniuli, marinus & conditi & salita conueniunt, & pisces salsi non pingues ex aceto. Clysteres iniiciantur, quibus recrementa intestinorum abluantur. Et, vt breuiter dicamus, in quibuscumque deficit appetitus ob causam aliquam ventriculum calefacientem, vt medicamenta, & alia refrigeratione curantur: ita quoque si ob satietatem comedere nequeunt, ieiunent: quibus vero ob plenitudinem ventriculi appetitus tollitur, totius corporis euacuatione curandi; quibus ob relictum exercitium: aut venerem:

exerceant se & coeant modice. Si frictiones solitæ non fiant, iterum procurentur. Qui ob recrementa in ventriculo collecta hoc morbo teneantur, sunt euacuandi vomitu, aut deiectione. Si vero ob frigidam intemperiem fastidiunt, contrariis etiam medendi sunt: tum cibis tum medicamentis. Ab Alexandro commendantur ius columbæ, vix pastæ, pro potu vinum vetus, decoctum rutæ: anisi, feniculi, aut cinamomi, aut piperis ex aqua, diatrionpipereon, diaspolitidacum: ex Gal. 6. de sanit. tuenda, & theriaca iuxta vie fiat curatio. Alex. & succi absinthij potio & syr. medicamentum ex zizimbere & pipere confecta, de quibus videas Donatum. Extrinsecus stomachus corroborandus fotu, sacculo vng. & ceratis: vt iam antea ostendimus. Si vna adest pituita, curetur, vt iam in obseruatione præcedente dictum est: quibus valet syrup. acetos. incidendo & detergendo pituitam & vomitum prouocando. Valet oxymel & cappares, cum oxymelite, & oliuæ ex muria, vel oxymel. conditæ, vel oxymel Iulianum, iuxta Paulum & Alex. Profunt & pilulæ ante cibum sabellinæ, de hiera & compos. ex hiera picra 6. de sanit. tuenda. Etiam illa, quæ postea corroborant, tam inutus assumpta, quam extra admota: vt iam exemplo præcedente ostensum est. Si vero ex virium imbecillitate appetitus perditio contingat, considerare oportet qualis intemperies vires resoluat, & per viam suam, contraria eam ipsam corrigere. Ita quaque si post euacuationem aut morbum, reficiendi. Si in febre, vel post febrem appetentia auferatur, vel diminuat, recurrere ad exempla, quæ in libris nostris de febris retulimus. At si propterea quod suctio non sentitur, cibi fastidium accidat, cerebro aut nervis ab eodem ipso stomacho distributis, prospiciendum erit, & cognita eiusdem causa, eam prius auferre necesse est. Si autem propterea quod totum corpus plenum existat, eiusdem corporis inanitione non peracta inappetentia fiat, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam conuenit, vt siate. Si ex visceris inflammatione vel ab vlcere stomachici, cum febri, idem vacuandus est, diuersimode tamen, pro varietate redundantis succi: quo casu etiam valentiores exercitationes conferunt, iis etiam quæ eum rarefaciunt: vt pote balneis ac frictionibus vt oportet, vbi ex cutis densitate eadem inanitione fiat. Cæterum si ob alicuius visceris inflammationem aut obturationem appetentia deperdat, illius etiam haberi curam

ptis, cum hepatis oppilatione, quæ appetitum deiciebat. Ideo apozema sequens præscriptum. *℞. corticum rad. petros. fœniculi, apii, cicchorii, ana ʒ ʒ. ab-
simbii Romani, demis leonis, cum rad. cicchorii, menbæ
rub. flor. ros. rubr. an. m. j. flor. cord. p. j. sem. coriand.
præparati ʒ j. folior. fenæ à stipitibus repurgatorum ʒ vi.
sem. anisi ʒ iij. myrob. citrinor. Indorum obfluxum
vi paulo minor procederet euacuatio, ana ʒ iij. vinarum
cum arill. ʒ j. fiat omnium decoct. in tribus part. aque
communis, & una parte vini Rhenensis odoriferi. Et ra-
tione artis decoquantur in duplici vase ad ʒ ʒ.
stent deinde per noctem infusa, & confectis ma-
nibus fiat colatura cum forti expressi. addendo
ʒr. de cicchor. Nicoti, cum rhab. ʒr. de mentha, de ab-
simbio ana ʒ j. cum albumine oui: depuretur decoct.
ac secundum artem clarificetur, & in eo pendeat
nodulus infæscriptus. *℞. rhab. seletti incisi ʒ ʒ.
agar. troch. specier. arom. ros. descript. Gabrielis, specier.
diacud. ab. ana ʒ j. spice, schœnamb. ʒ iij. b. ana.
gran. iij. fiat nodulus filo constrictus: exprimen-
dus dum potio sumatur: quotidie vero in dilu-
culo ex eo decocto sumens cyathum vnum tribus
horis ante pastum, modo ter quaterve quotidie
aluum excernebat: etiam foetida excrementa de-
iciens. atque ita profuit, ut aliis medicamentis
opus non fuerit, imbecillitate ventriculi cessan-
te, atque hepatis obstructione ablata. Simul to-
tius corporis citrinitas, tum etiam cachexia ita
cessarunt, ut illico conualuerit.**

OBSERVATIO XI.

De siti immensa.

Vir quidam biliosus immensa siti laborans, cum maximam caliditatem & siccitatem oris ventriculi pateretur, huic aquam solam exhibui-
mus cum pauco vino, nam aquam ferre non po-
tuit: sicuti alius, qui optime illam tulit sine vi-
no. Alteri autem, cum nec vinum ferre posset cum
aqua, aquam cum aceto multum dilutam com-
mode dedimus, & ʒr. viol. cucurbitæ, aliaque
refrigerantia & humectantia illis dedimus: qui
ab esu rerum salutarum admodum sitibundi euase-
rant. Multi sunt ventriculo imbecilliores: qui ne-
que aquæ potum, siynocho vel febre ardente la-
borantes: ferre possent, etiam sani existentes.
Vide de his exempla à nobis relata lib. i. de febr.
scholio obser. 12. de synoch. non putrida. Quibusdam
enim frigidissima potio cordi insedit: cuius ex-
emplum quoque habes apud Beniuenum de abdi-
tis rerum causis, de quodam Blasio suo familiari.
qui cum ardentissimo Sole lusu pilæ incaluisse, &
& in cellula vinaria subterranea frigidissimum
vinum ob sitim bibisset, illico defecit, quem ta-
men non sine gravi noxa restituit. Noui etiam, in-
quit Galenus, qui exhausta siti cruciabantur cum vi-
peram deuorasset (forte fuit dipsas) & messor, qui
forte fortuna vinum biberant, in quo quedam fere sue-
rat extinguita: & eum qui ex veteri vino fuerat inebria-
tus: item & eum, qui sitim tolerare decreuerat: deniq;
eos qui in naui deficiente aqua, marinam aquam bibere
ausi sunt. quod siti immoderatore, quam reliqui crucia-
rentur: celerius quam reliqui interierunt. Noni etiam
quendam ardente febre laborantem, qui incrementum etiam
nunc morbo, aquam frigidam liberaliter bibens, satiare
non potuit, donec moreretur. Itaque circa ventriculi ap-
petentiam huiusmodi evenire possunt errata. Hæc Gal.
Scribit Amatus cent. 2. curat. 62. de tribus qui ob
potum frigidæ aquæ mortui sunt.

SCHOLIA.

In siti immoderata, vel vehementi perpetuo,
iuxta Gal. De caus. symp. & 6. de loc. affect. os ven-
triculi affectum est, quamquam non semper pri-
mario, sed quandoque per consensum vel ieci-
nore, & maxime summa eius parte, vel pulmone i
mesenterij venis seu ieiunio inflammatis: ex loco
citato Galen. & apud Alexand. c. 8. lib. 7. Est itaq;
ingens sitis symptoma in genere noxæ functio-
num, atque ipsius appetentiæ depravatæ. Nec
pro eius symptomatis notitia alia conscribenda
sunt indicia, cum res ipsa ex laborantium rela-
tione pateat. Quod ad sitim inexplibilem atti-
net, quidam siticulosi sunt consuetudine conti-
nuata, ita ut nonnulli continuo bibant & conti-
nuo vitiū mittant, inter potores ingenti pal-
ma. Græcia etiamnum potores maximos effert,
ebrios vero damnat. Neque Germani, ut Itali,
aut Hispani ebrietatem pro vitiō habent. Apud
Græcos tamen, matronas vinum bibisse iniuria
est; inter nuptias in Creta solis viris datur vinum
inter mulieres lagenæ aquæ circumferuntur. Eam
commendationem bibendi L. Piso vrbis Romæ
curator à Tiberio factus tulit, quod biduo duabus
que noctibus per potationem continuauerat apud
ipsum iam Principem, Tricongij rara gloria, in-
quit Plinius, quando & hæc ars suis legibus con-
stitabat, non labasse sermone, nec leuatum vomit-
ione, & similia diligenti legum scito, contra
bibendi fallacias: namque bibendi consuetudo
aviditatem auget. Scitumque est Scytharum le-
gati, quanto plus biberint, tanto magis siue Par-
thos. Inuentumque est mira vitiōrum solertia, ut
aqua quoque per Hispanias: Galliasque, ac vlti-
mam Britanniam, Germaniamque, cum frugibus
suam ebrietatem faceret. Delphica vrbis (in qua
iam 34. annos medicinam feci: dum hæc secundo
colligerem anno 1592.) ea gloria clara est, ob cer-
uissimam, quæ ad alias vrbes defertur. Sed Cre-
tense vinum (inquit Alexander Benedictus Veronensis)
Moromiticum dictum, gratiam ceruicis ademit,
magno pretio ebrietatem apud exterarum nationes emi-
tur, 30. aureis dolium venundatur. Veteres in ea
bibendi gloria varia quærebant sitis incitamenta
punicis farinam, aut cicutam: ut metu mortis
bibere cogerentur. Hoc in vino instituto Macho-
metus, aliqui salacissimus legum conditor, non
damnandus est, quia vinum gentibus lege sustu-
lerat, ut ebrietatis portento fami libidinem, iucū-
dumque in homine nefas adimeret: is halitus feci-
tidi non sunt, nec aliam quarunt ebrietatem: vn-
de iurgia & vulnera oriantur, nec mortifera lo-
quuntur, non obliuio fit, faciei pallor, non fu-
riales somni, non tremulæ manus effundentes ple-
na vasa, sunt: interceptis non putrida iecinora in-
ueniuntur: unde frequens morborum iniuria ha-
betur. De hac siti locuti sumus, schol. obs. 29. de cap.
dolore ab ebrietate lib. 10. de qua siti nunc non lo-
quimur, quæ ex mala consuetudine fit: sed de ea,
quæ ab aliquo vitiō in corpore latente, aut aliūde
orto fiat. Sitiunt itaque ob oris ventriculi calidam
vel siccam, vel vtramque intemperiem, vel ob hu-
mores vitiosos in ore ventriculi putrescentes, bi-
liosus atque salios: & non tantum ob ventriculi
os, sed etiam ob calorem iccoris, pulmonis, & ie-
iunij intestini, tam à causis internis quam exte-
nis calfacientibus & siccantibus: & fit ab humido
deficiente, aut calido superante. Ad ipsam serpente
mors, inexplibili siti ardente: etiam in diabete
& ii qui veteri vino indulgent: sic feruus apud
Gal.

Gal. ex veteri vino inexplibili siti laborans, insō-
niculosus factus, febre ardente oborta cum mentis
alienatione, interit. Contra alter in ardenti febre
& accrescente morbo, multa frigida epota, & in
ventre subinde ebulliente, sitim validissimam
passus est, ita ut inexplibili demum aquæ potu in-
tereret. Sitiunt & vulnerati sanguinis defectu. Alij
quoque ex cibis & potionibus calidis venenatis, ex
piscium fassamentis, garo, carne salita: etiam in
phlegmatica febre, magis vero ex falsa pituita, in
hydropismis. Signa generis per se nota sunt; sed
causarum indigent distinctione. Dignosces a. cū
per consensum ab aliqua prædictarum partium
inflammatione os ventriculi fuerit affectum, ex
propriis signis inflammationem earumdem partium.
At si primario oblatum sit, nullum tale ap-
parebit indicium inflammationis prædictarum
partium. Si ex intemperie calida & sicca, ex iis,
quæ superius diximus, facile dignosces: etiam si ex
humoribus biliosis vel salis contigerit: salis enim
& biliosi ventrem mordent, ut diximus. Si quoque
ex humoris inopia exciteretur, facile ex infirmi lo-
quelat, tum ex iis, quæ præcesserunt, percipies (ita
quoque de diabete) & tam causis internis quam ex-
ternis. Nam ex caliditate & siccitate copulatis, siti
premuntur in feb. ardentibus, & adurentibus om-
nibus, ac æstate, graui æstu. Plurima in lib. de feb.
nostris habes exempla. Causæ etiam externæ à vi-
no veteri, tum aliis calfacientibus, & exsiccantibus,
ab ægris vel astantibus cognoscuntur. At si ex
contrariis causis sitis nulla est, hoc fit, quia sen-
tiendi facultas demortua est in ventriculo; idque
in febribus ardentibus & maximis exitiū denun-
tiat. Est cum, præsentē iusta causa sitis, non si-
tiant, tantum qui febricitant: tum quia, ut modo
dicebamus, extincta est sentiendi facultas ventricu-
li; tum quia à capite humiditas defluit, atque inde
irrigatis partibus, unde sitis incendi solet, non si-
tiant. Verum ingentis sitis, de qua modo loqui-
mur, non parui facienda curatio est, cum si nimium
inualecat, ex ea ægri perire possint: quemadmo-
dum Gal. nonnullos vidit immodice sitientes pe-
rire ex diuersis causis, ac modis quoque diuersis: ut
pater apud eundem lib. 1. De caus. symp. Quomodo
sitis curetur, passim in libris nostris De febribus ali-
quando diximus, & præcipue lib. 7. obser. 24. de
siti valida in feb. biliosa, præcipue in scholio, non
solum quomodo sitis curetur in febricitantibus,
verum etiam quomodo illi curentur, qui ex sic-
citate sitiunt, & qualia illis vtilia sunt: deinde
qui ex copia caloris sitim experiuntur, vel ex sic-
citate & caliditate sitiunt, vel ex humore bilioso,
vel pituita salia, aut ex partium inflammatione.
Sed quod ad præsens negotium attinet, causæ ip-
sæ sitis considerandæ. Nam sit ut aliquis sitiāt
post cibū, ut solēt contingere iis, qui carnes salas
vel aliud quippiam salū ingesserunt: sin ante cibū
aliquis sitiat, oportet alterum duorum esse, aut
humorem biliosum vel falsum in ventriculo colle-
ctum, aut siccitatem ob insignem aliquam euacua-
tionem vrinæ, aut sudoris, aut aliam à medicamē-
to factam. Si propter siccitatem pulmonum aut
tracheæ arteriæ proueniat, tunc sit vel à febre ca-
lida & ardente, vel ab aere inspirato nimium ex-
siccante. Curatur itaque sitis, si sine materia sit,
potu humido, aut aqua sola, ut pauco vino per-
mixta, aut aceto etiam multū diluta, aut ʒr. viol.
de cucurb. & aliis humectantibus & refrigeranti-
bus. Idem faciendum, si ab esu rerum salutarū fiat.
Sin ob exsiccationem tracheæ arteriæ & pulmo-
num fiat, magis inspiratione aeris frigidi; quam
potu recreantur: ob id oportet fenestras aperire,
Pat. Foresti. Tom. 2.

per quas aura lenis ingrediatur, ad aeris cubiculi
refrigerationem & agitationem. Inspergere oportet
folia salicis, lactucæ & aliorum frigidiorū &
humidorum, maceratorū prius in aqua & aceto. Si
à salis humoribus, vel biliosis, euacuatione illius
humoris, & alteratione opus est, quæ fiet frigidis
& humectantibus. Si igitur humor (inquit Alexand.
Trall.) in ventriculo habetur biliosus aliquod refrigerans
& humectans adhibere: quemadmodum etiam, si pituita
sua fuerit, & id quod redundat, faciat, sitim, falsum, ea
quæ eiusmodi humorem repurgent, & abstergant, offerre.
Ego sane (inquit idem) noui eiusmodi sitim à falsa pi-
tuita ortam, per salios cibos sitim fuisse, ut fassamenta
& capparem. Quare non semper refrigerantibus humecta-
tibusque utendum est: sed ubi causam accurate distinxeris
atque internoueris, tunc tandem congrua adhibenda cura-
tio est. Proinde iis qui ex siccitate, humectantia; il-
lis autem qui ob caliditatem, refrigerantia; conue-
niunt. Ita quoque si post largam aliquam euacua-
tionem fiat, cremore hordei, vino bene diluto in-
sperfo, aut iusculo pulli sine sale sedabitur, in quo
decocta sint semina frigida maioris & herbæ hu-
midæ. Si ob linguæ & palati siccitatem, abluant
saepè os aqua frigida, additis duabus vel pluribus
guttis aceti vel vini albi. Ad mitigationem sitis in
febribus, cum timemus nimium potum, vel ob hy-
dropis periculum, vel ob fluxum ventris, impera-
mus ut teneant in ore vel pruna, vel cerasa sicca
macerata in aqua frigida, & frequenter mutant;
aut frustum pomi, aut ex mucilag. cydon. & psyl-
lij vel gummi Arab. extract. cum aqua viol. reme-
dia paramus: potius quam cum aqua ros. cum illa
exsiccet: sed propter odorem gratum non nihil
eius apponi potest, nisi dolor capitis addit. Radix
glycyrr. recentior è terrâ euulsa masticata, sitim se-
dat. Vide apud Alexand. catapotia ad sitim arden-
dam; & ad febricitantes, quibus parum bibere conducit:
item ad insolatus & profectioses ubi sitis urget dulc.
radicula ʒ vj. semin. cucumer. satini ʒ iij. trag. ʒ iij. le-
uigata in vnum misceto, & albuminibus ouorum adiectis
subigito, singitoque catapotia, sub lingua continenda. Si
plura desideres de feb. vide lib. 7. obser. 24. & quæ
Donatus ex Galeno, Aëtio, & Paulo collegit. Si ex
defectu potus contigerit, abundanter tribuatur
viribus consentientibus. Si ex diabetica disposi-
tione, ea curetur. Si ex caloris copia ob edulia ca-
lida, vel merum vinum, medela erit frigidi potus;
ex Gal. De morbis vulgar. & Aëtio lib. 5. cap. 11. Si
stomachus æstuat, succus rad. dulc. vel. radix ex-
aquæ; & thyrū lactucæ cōditæ. Si ex inflammatio-
ne iccoris vel aliorum viscerum illa prius curetur:
ita quoque si ex pulmonia fiat. Si à veneno, illud
prius curetur: deinde adhibeatur quæ sitim sedat.
Et ita quoque si aliorum membrorum communi-
catione fiat, blandiendi sensum est; donec morbi
curentur. Et quæ ex œsophago & gula arefacta
euenit, somno (ut Hippoc. scribit.) sedatur. Profundè
& gargarismata, hordeacea, & cibi frigidi assum-
pti. Hæc de siti: Si plura desideres, vide Alexand.
Benedictum Veronensem med. lib. 11. cap. 23.

OBSERVATIO XII.

De Singulis.

Os ventriculi aliquando cōuulsionē affectū;
quæ à Græcis νύκτις, ab Hippoc. aliquando
νύξ dicitur, à Latinis Singultus: & est quidam mo-
tus vehemens ac violentus stomachi, quo rem infestam
expellere conatur, ex Gal. 3. De causis symp. & com-
men. aph. 39. lib. 6. Forcipior & vehementior est
Bb iplo

Singultus
qui a vo-
mitu diffi-
nitur.

2
in f. 6.

3

4

ipso vomitu: Nam quæ vomitu expelluntur, in capacitate stomachi continentur: In singultu vero villis stomachi impactus est humor. Atque hoc modo differt hic motus à vomitu. Afficitur hic os ventriculi, ut 3. & 5. de loc. affect. constat, eo quod sit exactior sensus: quamquam, iuxta Galen. comment. aph. 3. lib. 7. non solum os ventriculi, sed totius ventriculus ipse & pars ea, quæ proprie stomachus appellatur (gulam nominant) affici potest; licet non adeo exacti sit sensus. Continetur autem sub communi genere motuum illegitimum seu depravatorum 2. De causis symptomatum, & sic est symptoma in genere noxæ functionum naturalium ipsius stomachi depravatum; duarum nempe, tam expultricis interdum quam re- tricticis; primo expultricis motus non legiti- mus; secundo loco re- tricticis; de qua vide Galen. & Donatum. Bisariam autem generatur, vel ex re- pletione, vel ex inanitione; aliquando & febrici- tantibus oboritur, ut exemplo ostendimus lib. 5. De feb. obs. 15. ubi etiam in scholio agitur de singultu, qui erat ex repleione. & lib. 7. obs. 31. de singultu cum febr. acuta. Addemus & hic vnum exemplum: pastor ille in pago Ryfwickio, homo crassissi- mus, statura oblonga, per antiphrasin Nicolaus par- nus dictus; vir si quis alius ventricosus & gulæ deditus, post febrem satis continuam & fluxum ventris ac vomitum, incidit in singultum. Huic, cum ab omnibus pro deplorato haberetur, deco- xi semina anethi, carui, & portulacæ, & papav. albi in cervina tenuiore. Ex quo decocto tantum cyathum vnum bibens, miraculi instar, præter omnium opinionem, à singultu hic curatus est. Quamquam idem valde ingluviæ deditus & inordinate vi- uens, quod ad potum & cibum, alioqui homo sa- tis senex, post annum in hydropem incidit, ex qua etiam obiit. Sed illi, qui singultum in tertia- na habebat perdurantem 3. diebus ac noctibus, Ioh. Tyengius decoxit m. j. semin. anethi ligati in globulo, in duobus pintis cervina, quam æger bibebat calide. Prius tamen illum purgauerat cū cassia & diacabolo, cum decoct. end. cicbor. viol. fum. borag. bu- gloss. hordei mundati semin. 4. frig. maior. prim. & se- ne, ob febrem, in sero lactis; & post decoctum ane- thi sumptum stomacho applicabat sacculos in aqua calidissima positos, & expressos ventriculo ap- plicabat: 4. flor. chamæm. meliloti, anethi ana m. j. orig. calamith. ruta, ana m. ss. incidantur, & fiant duo sacculi; quibus remediis cessavit singultus. Oportet autem in singultu curando (ut in scholio laus) causam prius animadvertere. Sic ille, qui singultum habebat ex ventositate, sequenti re- medio evasit: 4. philonij ʒj. diagalanzæ ʒij. detur cum vino. Alteri & hoc sequens profuit: 4. theria- cæ optima ʒj. pul. diptami ʒj. exhibitum fuit cum vi- no exiguo. Quemadmodum alteri cuidam An- toverpiano, qui per continuos 10. dies ac noctes singultum habebat, frequenter exhibitum est cochlear vnum calide ex sequenti decocto: 4. rad. imulæ recentis ʒj. coquantur in aqua fontis ad lb. j. dul- coretur rhabaro. Deinde sub noctem vna vice ac- cepit ʒj. philonij Romani: & statim cessavit sin- gultus: quamquam & stomachus inunctus est oleo mastich. corneor. & tereb. & absinthij; corpore tamen prius purgato cum electu. de dactylis & succo ros. Noui vetulam octuagenariam, matrem uxoris illius Ortelij à regina Angliæ missi ad comitia Bataurorum: quæ per semi-annum subin- de singultiebat; remediis nihil iuvantibus, nisi deuorato loch sano, quo se tantum iuvare asserebat. Quæ vetula postea relicto singultu, etiam nunc cum hæc adderem, vivat; quamquam post duos

annos lecto perpetuo incumbens, viribus exhau- stis vitam finivit.

S C H O L I A.

Singultus causæ inanitio & repletio. Qui ab inanitione, fere lethalis est. Sequitur insignes evacuationes, ut sanguis è vulnere, è locis mulie- ribus, aut aliunde: sequitur dysenterias, diar- rhœam, & cætera eiusmodi: ardores quoque & graues inflammationes viscerum. De quo prius- quam præfagium instituas, vide num sit à reple- tione: minus enim periculosus est, sæpeque cum multa per ventrem euacuantur, singultus à reple- tione est; quia pars materiæ, quæ à reliquo torpo- re confluit in ventrem, tunicis ventriculi imbibit- tur: quod etiam huic nostro ægro, viro ingluviæ dedito, eveniebat; licet multa per vomitum & fluxum expelleret; & quæ adhibita essent par- tim ventositates expellentia, partim quæ bilio- sam materiam reprimerent, ut sem. portul. pap. hic curatus fuit. In febre licet periculosus est singul- tus, nisi sit criticus, & signa coctionis manifesto apparent: sic enim sæpe indicat crisis vomitione futuram. Ita hic singultus primo ante vomitum, postea etiam post vomitum, nihil mali intulit. Cum tamen vomitus, qui remedium esse debet, singultum gignit, ab inflammatione cerebri vel stomachi metuendum. Et hic vomitus malus cen- setur, ut singultum gignat; quemadmodum à san- guinis fluxu singultum malum ait Hippocrat. sed Galen. recte addit, ut plurimum. Quod & Hollerius vidit in nobili quodam quinquagenario, vel se- niore, & familia D. d. Antiquæ, cuius ille erat oco- nomus. Effusa enim incredibili sanguinis copia, evasit à convulsione, deliquis animi, singultu, ad- hibita cucurbitula: & sanus superuixit. In histeri- cis vero ab utero non ita periculosus est singultus. Ab inflammatione vteri deterior: à musculis & ossibus temporum lethalis. In inflammatione he- patis sæpe etiam lethalis, ut experientia his antea vidimus. Curatur multis modis, pro varietate cau- sarum. Si à frigidityte, calfacientibus, teste Galeno & Aetio; tum cibis, tum medicamentis. Ruta in potu cum vino, apium, cuminum, calamintha, pulegius, dictamnium, nardus celtica, quodlibet per se aut mixtum aquæ mulsæ decoctæ: vel etiam seseli & daucus, & castoreum ex Galeno Aetio & Paulis etiam sumendo diacalaminth. vel avom. rosa. vel dia- cinnam. ʒj. cum paucor. vino. Ventriculus quoque fo- uendus oleo rutaceo, vel in quo cuminum aut ab- sinth. decocta sint, vel exterius inungendo cum oleo nardino, costino, mastichino: & sacculi ex vtraque membra, abs. calamintha pulegio an. p. j. mace- re, car. yophyllis, ligno aloes, mastice ana ʒj. vino albo as- persi & apposti. Si etiam ex frigidi humoris copia, & viscosorum, tenuantibus & incidentibus vten- dum, oxymelit. scillino iuxta Trall. Aetium & Paulum, & ita si pituita viscida sit infusa in tunicis, quæ illam incendant, detergeant, euacuent, propinan- da, etiam per vomitum, cum aceto syr. simpl. & oxymelit. simplici & scyllino: & si non vomant, satis, pilulæ de hiera exhibendæ: & si ægre vomant, per inferna, ex hiera & agarico, vel per clysteres (quod tutius est) purgabimus. Si diuturnus est morbus, concoquendus melle ros. oxymel. syr. de by- zantiis, de stochade, si sine feb. fuerit: fugienda quæ adstringunt, ut syr. menth. absinth. nisi facta iam evacuatione humoris, tunc enim conveniunt ad corroboracionem ventriculi; alioqui materiam infartam magis impingunt. Concocto humo- re, rursus euacuandum cum pilul. cochisi, de hiera, adie-

adiectionis illi, græ. castorei. Post illam evacuationem syr. de absinth. convenit cum aqua menth. & diagal. & diacyminum, & exterius fons iam dicti calfa- cientes, discentibus flatibus, ex oleo abs. aneth. ruta- ceo: & post folum vel inunctionem fascia diligen- ter venter comprimendus. Egrege iuvat aëris re- tentio ex Galeno, ita & sternutatio curat singul- tum ex plenitudine, teste Aetio, cuius exemplum posuimus De feb. lib. 5. obs. 15. & in scholio ratio- nem attulimus. Erysimachus medicus in conuivio Platonis Aristophanem singultientem docet tria remedia singultus: Continere spiritum (de quo lege Gal. de difficult. spirandi 3.) colluere fauces frigida (contra æstus aut interiora calore, vel obroso sensu) irritare sternutamentum in vehementi, nec aliis auxiliis cedente. Id (inquit) si bis aut semel feceris, etiam fre- quentiſſimus est, tollitur. Respondit Aristophanes non prius cessasse singultum, quam sternutamento repressu- rit. Galenus in aph. distinguit, si singultus fiat à con- celsis humiditatibus: eos enim, qui ex inanitione sunt, qui sunt variores, non sanæ sternutatio: concusso enim capite & ventre, tum reliquo corpore, maxime nervoso, excutitur materia, quæ singultum facit. Sicuti eadem calidissima succisione, tenuitateque, partim vacuata & dis- cissa, partim translata in partes ignobiles singultum finit; ut scribitur quarto De rat. vict. in acutis. Sunt quedam vulgaria; ut experimentum, quod inter- pres Hollerij probari vidit; compresso virinque ad latera medico digito dextro, rei tristiſſi narratio aut in- solite timer, alio videlicet seducta virtute animi, quæ respirationem facit. Cuidam nullis remediis cede- bat singultus, nisi vino Hippocratico albo: cui re- frigeratum fuisse ventriculum par est. Si singultus fiat à caliditate, refrigerantibus curatur. Si autem vna adsint humores biliosi, acres, corrupti, roden- tes, vel corruptis cibis biliosis, si contingat; id ex præcedente victus ratione dignoscitur, & ex ru- citibus, vomitione, sapore, colore flauo, & calore. Quare non minus erit provocanda vomitio, quam in pituitosis humoribus. Sed his detergentia ma- gis danda sunt, quam incidentia. Humor enim est nimis tenuis, & sua tenuitate ventriculum pene- trando, & acrimonia pungendo, singultum facit. Galenus & Aetius vomitum medelam esse satis putant. Syr. end. simpl. vel compos. dari potest ad humoris concoctionem, & vomitus provoca- tionem. Sed quando ad vomitionem datur, cum aqua tepida vel aqua decoct. hordei in magna quantitate & tepidus est propinandus post cuius assumptionem debet corpus moveri, & ventricu- li regio saltem confricari. Quod si non vomant, Rondeletius exhibet cyathum vnum decoct. glycyrr. vel passul. cum syr. dictis, aut cum multo rhabaro, aut hydromel bene dilutum. Quod si opus est leui pur- gatione, adhuc detur infusum rhab. cum decoct. pas- sul. vel hordei vel glycyrr. vel cum syr. ros. lax. uin. Val- lent & clysteres, à quacunque causa fiat singultus, ad humoris deriuationem. Trallianus ubi recre- menta rodentia & corrupta fuerint, vitur con- temperantibus & abstergentibus: vinum his cir- cumcidit, & omnia acria decocta: vitur aqua temperata & pane ea imbuta, pitana, copiosa, pil- ciculo qui aceti paululum habeat, & pullis co- lumbari. Abstinere à purgationibus. His valet in- tybi succus potatus, cucumeris semen exortica- tum tritumque bibitum, & lactuæ semen & por- tulacæ succus, vel ipsa portulaca in cibo sumpta, & myxarum decoctum in potu. Lac asinum, ca- prillum, syr. viol. nymphae, pap. Sic & à serosis humoribus medicatisque & mordentibus vomitu præcedente: quibus si mordacitas non alteretur, abstergetur, discutiatur iis, quæ sensus stupefa-

curatio sin-
gultus a ca-
litate ori-
tur ab in-
anitione
biliosis.

20

21

Pet. Forest. Tom. 2.

tionem inducunt; opus erit, ex decreto Galeni & Aetij, ʒj. philonij vel theriacæ recentis, sed cum cautione. Exterius valent oleum rosaceum, coton, pap. nymph. Si ab alimentis vel medicamentis acerbis factus fuerit singultus, citra magnam plenitudi- nem, præfens remedium est, oleum amygd. dulc. re- cens, vel oliuarum, vel butyrum assumere, vel pitana cremorem, vel multum aquæ frigida bibere, modo ven- triculum non habeat imbecillum. Extinguit enim medicamenti acrimoniam, & sensum mi- nuit. Ligaturæ fere in omnibus causis fieri pos- sunt, quia inducendo dolorem singultum sedant. Verum si ob ipsius ventriculi aut alterius visceris in- inflammationem singultus fiat, ex eiusdem in- flammationis curatione sedabitur: ita nos in quo- dam rustico inflammatione hepatis laborante & postea singultiente fecimus: qui prius secta vena & aliis remediis adhibitis ad inflammationem hepatis, & frigida ventriculo adhibendo, curatus fuit. Ita quoque si ex abscessu vel vlcere ventricu- li contingat, eius curatio petenda ex propriis lo- cis. Recte dixit Trallianus. Si ob evacuationem aut febrem singultus accedat, non dubie etiam firmius perse- verans, tunc ob siccitatem immodicam affectus oritur, & talis merito quidem periculosus est. Quare in eius- modi humectantibus & refrigerantibus auxiliis, præser- tim temperata aqua creberrima, vtilione, & omnibus quæ euacuat adhibentur, utendum. Noui autem quen- dam (inquit idem Trallianus) ex iis, qui ob hanc in- temperiam singultum, frigida sobrietate conservatum. At in inflammatione, ea, quæ actu frigida sunt, vitari debent: magis etiam continue tepida uten- dum, paulatim eam sorbendo: extremas autem manus calidissimæ frequentius madefacere oportet: & pedes deligare, continereque non est alie- num. Eadem cauenda, quæ de ventriculi ac he- patis inflammatione dicuntur. In inanitione etiam si desperata res est, iuvandus tamen æger destilla- tis, colaticis, iusculis & expressionibus, cibis hu- mectantibus, inunctione docti & ventriculi, ex oleo viol. hydrelæ quoque. Ita etiā si ex euacua- tione ortus fuerit singultus, curabitur per alimen- ti conventionis assumptionem, & per ea, quæ de- fectum explent, Aetio teste: & si perseveraverit adhuc immodicus sanguinis fluxus aut alui pro- fluxum, iisdem prospiciendum erit. Inanitione etiam conducit oleum amygd. dulc. potum per se, aut cum aqua tepida pariter: & pitana cremor per se, vel cum confusa pullorum carne. At ægro- tanti, quem hæc diebus inuimus, singultus ab illo ortus, malum portendebat, ex aph. 10. lib. 7. & magis, iuxta Aetium, singultus in altiore sopo- re, aut animi deliquio; aut tetanis obortus, mor- tem non longe abesse præfagit. In herniosis seni- bus sæpe sunt singultuosæ febres: in quibus sin- gultus non curatur, nisi reposito intestino. At si febris, reponas vi, paulo post moriuntur. Anno 1547. (ut refert interpres Hollerij) iuxta ædem S. Stephani de saxi, puella assidue singultiebat: nihil deglu- tiebat, dolore facto in œsophago. Antea pulmo- nibus bubulis largiter vsa fuerat. Huic gravitas in stomacho, nausea, vomitus. Frustulum tamen pulmonis, quem ederat, in œsophago restiterat. Cucurbitulis & idoneis remediis tandem reie- ctum frustulum: sicque liberata est. Refert quæ- dam remedia Trallianus contra singultum phy- sica: sed quia superstitiosa, ea relinquemus.

Ab alimen-
tis vel me-
dicamentis
acerbis.

Ab inflam-
matione
ventriculi
vel alterius
visceris en-
visceris ratio.

12

Si ob febrem

Ex inanitione
curatione

24
Singultuosæ
febris.

OBSERVATIO XIII.

De Nausea, ex lacte concreto in stomacho, cum
pessimis accidentibus.

Mulier 25. annum agens, Amstelrodamo Alcmariam venerat, mense Maio, anno 1550. recreandi se causa, vna cum marito, & vt cum amicis se oblectaret. Quæ cum copiose florem lactis seu crema deuorasset, ac vinum rubrum stypticum superbibisset, lac in ventriculo concretum, pessima symptomata intoxicati similia produxit: inprimis nausea sine vomitione afficiebatur, cum ingenti ventriculi dolore; adeo vt syncope subsequeretur & anhelitus præfocatio; ita vt astantes illam morituum putarent. Ad hanc accitus (quæ tunc ad sessam novam in adibus Lauentij Gualtherij cognati nostri decumbebat) statim decoxi florum chamemille m. j. sem. anisi feniculi an. 3 j. in aqua communi: & huius colaturæ capiebam 3 iv. cui addebam aceti vini modicam, & zacchari nominib; ac totum tepide propinaui. Quo remedio lac concretum dissolutum est, atque illa ipsa in vomitum prorumpens lac concretum vna cum vino euomuit; & accidentia iam dicta magna ex parte sedata sunt. Glande etiam imposita ex mellis 3 j. pulu. hiersæ picæ 3 ij. diacryd. 3 ij. salis parum, ad diuersionem: alium quoque excreuit. Insuper his tabulis vtens statim conualuit: ʒ. pul. calamenthi 3 ij. specier. diacymini 3 j. marg. perfor. & non perfor. subtiliss. tritar. an. gran. iij. dissolutis in decoct. aque flor. chamemill. & meliss. adiecto Zacch. q. s. fiat confectio in tabulis. Venit nobis tunc in mentem, id quod Gilbertus Angelicus lib. 7. De venenis cap. de sanguine & lacte concreto in stomacho, scribit, quod sentiantur frigus corporis & præfocatio anhelitus, vt huic mulieri contingebar. Is abstinere iubet à salitis, quia faciunt caliditatem. Dat acetum cum aqua in potu, cum succi calamenthi 3 v. Quia statim resoluit lac, & prohibet lac à conglutinatione. Sed quia flores chamemille erant ad manum, commode iis vsi sumus: cum ad nauseam faciant, & præcipue ad dolorem stomachi. Sed eo non vitur Villanovanus in grauidis; in quibus abortum mouet, vt ille refert. Sed hæc grauida non erat. Aliquid calamenthi in tabulis probe miscuimus.

SCHOLIA.

Quod ad lac concretum attinet, ad venena pertinet. Quod autem nauseam incitat, quæ nihil aliud est, quam appetitus vomendi sine effectu, signum erat iam lac concretum, vna cum vino, in ventriculi tunicis fuisse infartum, vel intra tunicas collectum. Verum cum vomitio succederet, nausea cessauit. Quæ etiam fieri solet, vel ob obiectum nobis parum gratum; vel ob alimenta putrida & male olentia, quæ assimilare ventriculus refugit; vel ob recrementa pauca tunicis ventriculi adherentia, aut intra tunicas collecta. Quare si nausea à viscidis humoribus adherentibus fiat, oxymel. dandum, vel syr. acetosus. Si à bile detergentia sola sufficiunt, vt decoctum hordei, cum Zaccharo, vel cum syrup. end. simpl. vel addendo parum succi ros. dilui aqua tepida; vel magnam copiam decoctionis pulli, cum multo zaccharo assumere, & postea digito in os immisso vomitum provocare. Bilis facile euacuatur, & detergetur: pituita magis contumax est. Quare decoctum raphani cum syrup. acetoso dandum, vel cum decoct. rad. & oleo vel butyro rancidis, vt vomant facilius: sed magna

quantitas est propinanda; vel vinum vel ius multum assumendum est, vt eorum copia ventriculus stimuletur ad vomitionem. Deinde pilulæ dandæ de hiersæ, cum agar. formandæ cum oxymel. dandæ vero mane sunt, & detur decoctum asari pro vomitu, ante vsum pilularum: deinde ventriculum corroborare oportet. Alij sub vno capite tractant de supinitate, Græce *ὑπινότης*, de stomachi subuersione, quæ à Græcis vocatur *ἀναστροφή*, & nausea, Græcis *ναυτία* dicta, quam alij *ναύνησι* appellant, & de vomitu. Differunt tamen hæ voces, licet ad deprauatum motum ventriculi pertinet, prout diuersimode offensus ventriculus ipse à diuersis causis fuerit, & *ὑπινότης* & *ἀναστροφή*, Latine *supinitas stomachi* appellatur: qui effectus contingit quandoque iuxta intemperiem quamcunque ipsius stomachi, circa ramen vitiatos humores: fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignæ qualitatis, vt constat ex Galeno 8. De compos. medicament. secundum locos: Irriguum enim stomachus (vt ipse inquit) per largam humectationem, similiter vt ligamenta nervorum lassatur. *Ἀναστροφή* à Græcis, à Latinis *subuersione* dicta, indifferenter duo significare poterit, ex Galeno. Nam quandoque appetitus perditionem sic appellare possumus; interdum vero nauseas affectiones ab accepto cibo fientes: contingit etenim quandoque hoc vnum solum symptoma accepto cibo; vt si paulo fortiori motu moueantur, statim vomunt; vt fratri meo Theodoro Foresto contigit. Appellant etiam aliqui tales *stomachicos*. At si anorexian, hoc est, perditionem appetitus, significat, antea eius curationem conscripsimus. Si accedat sumpto cibo, paulo fortiori motu, & statim vomant, tunc curabitur, vt nausea, & vomitus, cum parum à nausea discrepet; quando à modice vitata humiditate exoritur. Verum si ob oris ventriculi solum fiat imbecillitas, curabitur vt supinitas. Supinitas autem facillime curabilis est, quia aut altringentibus solis, aut quæ siccare humiditatem possunt, ac constringere laxatum corpus, tollitur. Græci vero *ὑπινότης*, à Latinis vomitus dicitur. At hic vna cum nausea (quam Græci *ναυτία* seu *ναύνησι* appellant) magnam cognationem habet, ac vnus affectus reliquum præcedit. Nam nausea vomitionem præcedit; licet non perpetuo ad nauseam vomitus consequatur, cum nonnulli nauseam searint, nec tamen vomerint, Gal. teste 2. De caus. sympt. & Paulo c. 1. lib. 2. Nonnulli vero turbantur; sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbuto: qua nausea deprauatus est quidam expultricis facultatis ventriculi motus: quo venter ipse ea, quæ eius corpus contristant, quam citissime per stomachum euacuare appetit. Vel breuius, irritus quidam est conatus ad vomendum, & inanis quædam vomendi irritatio, quæ interdum ad vomitum impellit, interdum & citra vomitionem fit; vt ex Galeno declaratum est. At vomitus, paruos quoque est eiusdem facultatis expultricis ventriculi motus, quo ea, quæ in eius capacitate, seu latiori spatio existunt, ac ipsum contristant, & in se fluitant, rejiciat quam citissime per stomachum, eodem Galeno auctore, lib. 2. De caus. sympt. In vtriusque afficitur (vt ibidem liquet, & 5. De loc. affectis) os ventriculi: vel est affectus totius ventriculi cum ventriculus per se & quandoque per consensum afficitur. Est autem vtriusque symptoma modo expultricis facultatis, præter naturam, modo naturalis, vt ex Galeno constat, & longiore sermone ab Alimano explicatur cap. proprio. At nausea cognoscitur, quando ipsa in illa inani vomendi

irritatione lancinat tantum ventriculum ipsum, & nullum humorem educit, teste Actio. Distinguitur etiam à subuersione; quoniam ea non nisi cibo assumpto; hæc autem sine cibo assumpto fit, iuxta Paulum, lib. 2. c. 54. Quamuis Galen. aliam præter hanc afferat diuersitatis causam, quoniam ea aut propter solam ventris debilitatem, aut cum vitata alicuius, modice tamen, humiditatis complexu fit: hæc vero ex multa, & etiam valde vitata, citra quoque cibum afficitur. Vomitus autem signa frustra quispiam conscribere tentaue-rit. Verum à nausea ipse differt quia per vomitum perpetuo aliquid excernitur; per nauseam nequam, vt iam diximus: quamuis eam vomitiones interdum consequantur, vt diximus; interdum vero non. Et, vt summam complectamur, nausea & vomitus causæ duæ sunt præcipuæ; nempe copia; vel humorum vitium seu prauitas; copia nempe ventriculum grauando; prauitate morsum inferendo. Vide plura de his apud Galen. 2. & 3. De caus. sympt. & 8. De compos. medic. secundum locos, & apud Alexan. cap. 13. lib. 7. & reliqua apud Alimarium. Quæ causæ facile innolescent exemplis sequentibus de vomitu, quales sunt succi, qui eam moueant. Ita biliosi vel fetosi in ore ventriculi in nausea absorpti sunt; viscosi vero ori ventriculi infixi, vt Trallianus docet. Ex quibus modis nausea cutetur iam diximus. Vide eundem lib. 7. c. 13. De nausea & vomitu. Copiosos euacuabimus; prauos & vitiosos contemperabimus, & malignitatem ipsorum imbecilliores reddemus; præsertim vbi biliosi & melancholici fuerint: pituitosos extenuabimus, & crassos & viscosos; crudos vero in solo ventriculo redundantes & non ex toto influentes, medicamentis non sollicitabimus, sed victu curabimus, & humores in ipso contentos immutabimus. At si ex toto corpore influant in ventriculum, medicamentis maioribus vtetur, modo per sanguinis extractionem, si abundet; modo per purgationem, si magna prauitas humoris existat. Si in nausea nihil efferatur, humores iam imbibiti sunt ventriculo: qui vomitu, vt diximus, expellendi, &c.

OBSERVATIO XIV.

De Vomitu, & Nausea præcedente vomitum.

FRIGIDOS succos puella ex esu fructuum hortariorum in ventriculo longo tempore collectos habebat: unde in ore ventriculi frigus sentiens, immodice cibum appetebat, minimeque situlosa erat, & sæpe sentiebat in ore acidam qualitatem, ita vt cibi quoque in ventre acrescerent. Adeo & huic aliquo tempore pondus quoddam, & tensio quadam circa ventriculum; ita vt subinde cibum ferre non posset ventriculus, & nausea afficeretur. Ad vomitum excitabatur, & cibum subinde euomebat, vt nobis narrabat. Ita vt hæc pallida, & cachexia quasi affecta, si cibum copiosius sumpsisset, nausea & vomitu corripere. Nullam medelam adhibens, tandem & sine cibis tensionem & pondus sentiebat: ita vt coniceremus etiam copiam humorum adesse, nempe succorum frigidorum; quod postea etiam cognouimus, ex vomitu nauseam subsequente, cum humores pituitosos crebro intenseretur, nulloque insigni spatio interposito, euomeret; ita vt & stomachum primario affectum esse perceperimus, & redundantes humores in eo esse genitos. Deinde, quia vomitus statim post nauseam oboriebatur, & citra vehementiam vomebat, intelleximus quoque

2 et. Forest. Tom. 2.

humorem noxium in lato ventriculi spatio esse, cum & in stomacho fluctuaret. Ideo cognita iam causa, succum pituitosum ac frigidum esse, præcepimus vt in aere calido versaretur: & quia iam in hyeme eramus, vt in cubiculo semper focum luculentum haberet, imperauimus: vt etiam somnus, quies ac inedia moderata essent: nam per moderatam inediam, iuxta Trallianum, non solum pituita alteratur, & extenuatur, verum etiam in sanguinem benignum probumque conuertitur; vt eiusmodi quoque humor per inopiam alimentum nutrire possit, præsertim vbi dulcis fuerit: sed hic parum acida appetitum edendi magis inferebat. Interea tamen, si vires inediam moderatam ferre non possent, carnes concessi potius assas, vt gallinarum; pullorum gallinaceorum. Columbarum iuuenum, phasianorum, perdicum (cum satis diues esset) turturum, turdorum, merularum, leporum, adiectis quibusdam odoratis, caryophyllis, cinnamomo. Pro potu concessi vinum rufum, aliquando subastringens & vetustius. Vinum namque adeo calefacit ventriculum, vt in qualitatis eius calorem non intendat; licet eiusdem substantiam augeat. Cervicis abstinentiam si aliquando bibere vellet, concedebam: & vt in fine mensis exiguum diacydonij cum speciebus sumeret; nihil deinde superbibens aut edens. Excrementa quoque subducebam alui, natura vel arte, fere quotidie: & imperabam vt omnes immodicos animi affectus vitaret. Quantum ad medicamenta attinet, si difficulter vomeret, dabam cochlear, vnum atque alterum oymelitis simplicis, modo scyllini. Sed quia facile vomebat, sufficiebat oxymel simplex. Interea decocto vsi sumus in hunc modum calefaciente & nonnihil indicente, & pituitam concoquente: ʒ. calamenthi 3 iij. mentha, hyssopi, serpilli, pulegij an. m. j. absinthij m. ʒ. rad. feniculi, cappar. ana ʒ. ʒ. seminis feniculi ʒ. i. sem. anisi ʒ. j. fiat decoctio in aqua communi pro ʒ. j. coletur & aromatisetur cum ʒ. j. ʒ. cinnamomi electi, & ʒ. j. arom. ros. sine musco, addendo oxymelis simpl. ʒ. i. ʒ. syr. mentacei ʒ. j. & clarificetur. Deinde purgavi ventriculum cum pilulis ex aloes lotæ & hiersæ picæ ana ʒ. ʒ. componendo ex iis pilulis septem; quas mane deglutit. Postea dedi subinde syr. mentacei & absinthij, & species diacinnamomi, diacod. abb. & arom. rosati in rotulis confectas, singulis ʒ. iij. ponderantibus: ex quibus vnum quotidie sumebat, parum vini absinthij superbibendo. Interea ceratum ex mastiche, olei nardini aliquot guttis additis, ventriculo imposuimus; prius inuncto oleo nardini, mentha, haccæ, & maceris, aliquot guttis olei caryophylli. adiectis. Quibus hæc probe curata fuit: quemadmodum altera mulier Alcmariana, annum 26. agens, quæ in insigni felis, in platea vulgo *Drakenordia* dicta habitabat. Laborauerat autem per vij. continuos dies vomitu pituitoso, vix aliqua interposita mora, cum ingenti stomachi dolore ac torsione. Ad quam ingressus, mense Octobri anno 1547. inprimis sequens decoctum propinaui: ʒ. decoctionis hordei communis chalibeate ʒ. i. ʒ. syr. de mentha, mellis ros. colati an. ʒ. i. ʒ. mure coroneorum ʒ. j. misc. Primo die, cum cyathum vnum sumpsisset, euomuit. Secundo die, cum valde debilis esset, & continuo euomeret, sine febre, rursus dedi cyathum vnum, & retinuit: & ex reliquo sumebat bis in die. Deinde ad maiorem constrictionem, cum semper magis debilitaretur, præscripti conditum frequens & vng. ʒ. conseru. ros. veteris, conseruæ rosiflorinæ an. ʒ. ʒ. corticum citri conditi ʒ. iij. spec. diacymini, arom. ros. sine musco an. ʒ. ʒ. specier. diacod. abb. ʒ. j. B b iij diacy-

diacydonij cum speciebus 3 b. syr. mentacei q. s. fiat conditum: capiat sapius: 2℥. corticum gram. sem. myrrill. sumach. cinnam. electi, mastich. corall. rubr. an. 3 j. flor. ros. rub. trochisf. de carabe an. 3 b. olei mastichini, nardini, absinth. mentacei an. 3 b. cere q. s. fiat vng. Quibus remediis & hæc curata fuit.

SCHOLIA.

6 **I**N nausea, uti & in vomitu, diligenter causæ per signa sua distinguendæ sunt, antequam ad curationem accedamus: nam hæc cogniti necessaria sunt, & viro indigent exercitata considerationis. Sicuti enim in furo frigido nullo modo agros siticulosos esse; aut ardore in ore ventriculi sentire & aciditatem contingit: ita in salsa sitis augebitur, minueturque appetentia, ac fortasse abolebitur; præter id, quod similem quoque sentiet in ore qualitatem. Si biliosi fuerint, oris amaritudo, sitis atque ardor simul cum morfu in ore ventriculi & inappetentia aderit, & assumpti cibi in amarum seu nidorofam qualitatem vertentur. Quod si vomitus ad has causas consequatur, facilius per vomitionem redundans succus dignoscetur, tum visu à medico, tum gustu à laborante. Ita & vitiosi cibi deuorati vel corrupti in vomitu, quoque facile percipientur. Et si fuerint saniosi, vel serosi ac tenues humores, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum vomitum inducunt, ut Aetius refert 10. cap. libr. 9. Iam quoque considerandum num in ventrem fluxerint: si enim à toto corpore, plethoricum erit, & ex signis plethoræ habebitur: & vitiosis humoribus sit repletum, ex colore & eruptionibus papularum circa cutem cognoscetur; atque ex urina, teste Aetio. Si autem ab aliqua parte, ut capite, splene, seu hepate, humor ad ventriculum transmissus fuerit, æger ipse primum affecti membri læsionem sentiet, vel calorem, vel frigus, vel gravitatem, vel duritiem in tactu. Neque nausea intensa neque crebra excitabitur, & vomitus leuior, & insigni aliquo spatio interpositus, habitusque totius corporis considerandus: tum qua victus ratione sit usus, verum frequenti cruditati aut satietati inciderit, idque in vita otiosa, ac præcipue præter consuetudinem, an contra, numquid & membrum certo temporum circuli vexari solitum nunc non vexetur: vel aliqua excretio iis retenta sit: alioqui si crebro intenseque nullo interposito spatio, ut in puella nostra, contingat, certum erit ventrem per se & primario affectum esse, & redundantes humores in ipso genitos. Si nausea laborant & nihil notatu dignum vomant, humores noxii ventriculo infixi sunt; alioqui fluctuantes facile vomunt. Et ita humores mordaces si valde molestant, calidi vel frigidi singultum inferunt; sed non adeo mordaces, nauseam. At à vomitu singultus & oculorum robur, malum, ex Hippoc. aphor. 3. libr. 7. quemadmodum etiam à tuberculi intorsum ruptione vomitiones malæ, aphor. 8. libr. 7. & ab ileo malus est vomitus; quando ilei exitiales sunt, ut sæpe vidimus in herniosis, maxime vero senibus, aphor. 10. qui, cum nulli clysteres iuuarent, vomitu continuo exspirabant. Nausea autem (ut quidam volumus) signum crimum existit: interdum vero signum malum, ut in febribus pestilentibus: & quando in conualescentibus multiplicatur, indicat recidivam. Quod nausea in pestilentibus febribus sint perniciose, ratio est; quod qualitatem venenosam arguant. Nausea sæpe decernit vomitum; & vomitus superueniens nausea, eiusdem curatio sæpe existit; si ma-

Signa prognostica.

teriam adiunctam habet. At vomitio vilissima est, si pituita ac bili permixta quam maxime fuerit; si non multa nec crassa sit. Syncerior enim deterior est, siue fuerit porracea, aut liuida, aut nigra; quicumque ex his fuerit color, malum esse censendum est, teste Hippocrate. 2. Prognost. Vidimus tamen, inquit Alexander Trallianus, mulierem, inter exempla, mensis unius intervallo singulis diebus: miram porraceæ cholera quantitatem euomentem, & conualuisse. Accidit quoque (teste Arculano) febricitanti spasmus aut epilepsia; & euomit æger humorem floris aris similem, ut euasit: ut puellæ istis diebus (cum hæc scriberem) cuenit, quæ in epilepsia eiusmodi humorem euomit Delphis, & sanata fuit. Hippocr. bis in mensis vomitum in corporibus sanis probauit. Aliis tamen sufficit bis in anno, Vere & autumnæ. Nam cum æqualiter fiat, ægrum præseruat à plurimis morbis, & renum & pedum vitiis: diuertit enim ab inferioribus malis, & à superioribus malum eradica: vitiosusque est omnibus morbis, qui à materia in ventriculo fouentur: & prodest, autem Auenennæ, ægritudinibus ventriculi materialibus, absque tamen apostemate aut vlcere. Ideo si rarus est, conuenit: assiduus vero ventriculum vitiat & debilitat, imbecillitate abducta: & veluti cloacæ proluiui vniuersi corporis facit. Quidam volunt bonum esse in apostematibus hepatis & propriæ concavitatis ipsius, ac splenis, modo sit proportionatus materiæ apostemata facienti, frequenter tunc bonus existit; uti & in febribus in die critica (ut multis exemplis ostendimus in libris nostris De febribus) modo non sint febres pestilenciales: in iisdem enim niger & male olens, subitam perniciem denuntiat. Exitiale quoque admodum est, si quis vomit omnes colores: & vomitio liuida graueque olens oculis mortem indicat: uti & omnis subputris & fetidus odor in omni vomitione malus est, eodem Hippoc. autem. Contingit tamen aliquando (ut scholio obser. 15. lib. 5. De feb. exemplo probauimus) eos curari qui nigram & atram bilem euomerunt. Niger ut fex sanguinis, malus: nisi in apostemate lienis, aut in fine veris contingat, ut Gradus amonuit. At excrementitius vomitus, cum anhelitus fœditate, intestinorum abscessum denuntiat: in colicis & iliacis pestifer est; quamquam vetula (cuius historiam posuimus lib. 7. De feb. obser. 4.) iliaca per octo dies recrementa rejiciens, per me curata fuit. Quod autem interdum vomitus valetudinis causa recte fiat, experimentis credens Celsus approbavit. Commonet tamen, ne quis, qui valere, & senescere volet, hoc quotidianum habeat: ut liquet lib. 1. c. 3. Vomitus quoque sæpe singultum clamorofum curauit. Et si quis sine febre est, malus tunc esse non potest, quando robur naturæ sequitur: etiam si è cerebro vel toto corpore humor in ventriculum effluerit, vel à iecinore, à liene, aut mesenterio, modo eo tempore neque tumor in hepate, neque in liene sentitur. Et sic quoque spontaneus vomitus seu arte paratus, iuxta Hippocratem. aphor. 2. lib. 1. Si talia euomuntur, qualia oportet, & bene ferunt, sicuti alia quæuis euacuatio utilis est. Sed assiduus ventriculo nocet, pectori, visui, dentibus, & antiquis capitibus doloribus, præter eum, qui fit per ventriculi consensum. Qui cum vermibus est, in feb. pestilentibus, malus, ob putredinem: potissimum si mortui euomantur, cum & omnis vomitus pestilentibus febribus (ut de peste diximus) malignus habeatur. Aliquando in aliis febribus vermes reiecti nihil mali attulerunt, ut exemplis in febribus declarauimus.

OBSER.

OBSERVATIO XV.

SCHOLIA.

De vomitu, ob ventriculum non potentem cibum continere.

Vomitio aliquando fit, quando ventriculus cibum non potest continere. Non continet, vel quia alimenta sunt plura, quam continere possit, ut ebriis accidit: vel quia alimenta nimis sunt pingua, & lenia, aut ordine suo non assumuntur; ut si quis assumat (ut Rondeletius asserbat) magnam quantitatem iociforum, qualia sunt pastillorum caro, aut quæ vulgo passer en pot Gallice dicuntur, vel si liquida multa ingerantur, post astringentia multa & dura, vel quia ventriculus plenus statibus, alimentum suspensum in superiore parte continet: aut quia multa dulcia super alia sunt assumpta, ut pepenes, ficus, cerasa, & omnia alia dulcia, vel quæ parantur: cum multo oleo, lacte vel butyro: vel si cum suspicione alimenta aliqua assumpta fuerint: vel ubi ex immodica humiditate ventriculi, etiam citra vitiatos humores fiat, sola quantitate & copia affligente & veluti irriguum os ventris seu ventriculi redente: adeo ut totum ventrem ob eandem multam humiditatem exsoluam ac laxum habeant laborantes: uti iuuenis quidam, ad me veniens consultandi causa, laborabat; qui omnem cibum facile euomebat, præcipue si butyrum & pingua sumeret, quibus videbatur delectari. Hic autem omnia paulo ante dicta inhibuimus, & quia videbatur humida tantum intemperies, & aliquantulum frigida, facile illum nos posse curare diximus, modo optimam victus rationem obseruaret. Quare eidem astringentia edulia & potus quoque astringentes, & quæ moderate calfacerent cum quadam alitricione, commendauimus, ut cuniculos paruos assos, & pullos galinaceos, & columbas iuuenes. Si elixis quandoque necesse esset uti, ut adiceret quædam odorata, ut caryophyllos, cinnamomum, exiguo omphacio adito aut vino odorato. Sicuti enim graueolentia omnia stomachum subuertunt; ita odorata eundem corroborant. Quod si carne veruecina, vel aliis elixis vteretur, id faceret quidem, cotoneis vel malipunci granis incoctis. Et si vino vteretur, concessi rubrum & astringens. Omnia enim his, quæ ori grata sunt, & actu frigida vel calida, erunt adhibenda; & minime tepida, quæ vomitum prouocant; uti & omnia pingua vitari debent. A cibis cotonea mala vel pyra allata, absque tamen saccharo, commendabam. Medicamenta vero calefacientia, & quæ stomachum roborarent exhibui, & diacotoneum cum speciebus, & aromatis, ros. superbibendo exiguum vini absinth. & exterius ventriculo adhibui linimenta & vnguenta; quæ statim transiunt, & citius operantur quam emplastra, quæ tardius vim suam exerunt: quale hoc est vng. Recipe olei mastichini, nardini, absinthij ana 3 b. mentha sicca, cinnamomi, maceris, galangæ, flor. ros. rub. ana 3 j. masticeis 3 j. cere medicam, fiat vnguentum, ut artis est. Etiam apponebam crustam panis vino & aceto irroratam, asperso pulvere caryophyll. maceris, cinnamomi, calami odorati, ligni alori, modo puluerem inspergendo, modo irrorando. Adeo ut his remediis hic iuuenis, tum alij plurimi (quibus vomitus tandem cessauit, & ventriculus roboratus est) curam sanitatem consequuti sint.

Vomitio non vno modo, sed diuerso ac vario curatur, ut antea diximus, cum plures eius existant differentie: Nam alius Spontaneus est: atque is rursus vel Criticus est, & laudabilis quidem, ex quo speratur salus morbi, ut quibusdam exemplis ostendimus in libris nostris De febribus: Nam criticus plerumque terminus existit multorum morborum; potissimum febrium acutarum, apostematum hepatis, quæ sunt in cœcavo ipsius, & similitum: neque hic retinendus, quemadmodum sæpe dictum est in obser. nostris De febribus: & ideo sinemus naturam operari, si ex coctione præcedente & virtutis tolerantia videatur fore sufficiens, neque enim cibo nec alio remedio impediemus, imo si fuerit diminutus, aliquando iuuandus, cum leuibus tamen medicamentis. Si vero excedat & omnino virtutem deiciat, ita ut mors subsequeretur, constringendus erit. Symptomaticus autem vomitus etiam ad spontaneum pertinet, qui etiam accidit magna ex parte in accessione febrium: unde modo Naturalis est, modo Violentus. Et quamquam aliquis laudabilis esse possit, omnis tamen est præter naturam, ut nos docuimus de vomitu, qui in febre fit: sicuti enim fluxus symptomaticus vires deiciat, ut scholio obser. 13. lib. 2. diximus, & raro aliquid boni adfert; ita & vomitus symptomaticus: quamquam aliquando iuuare possit, modo non excedat; & si excelsit, restringi quoque poterit, uti alia excretionis symptomaticæ, de quibus in febribus diximus. Atque ex iis exemplis facile discas num sint constringendæ nec ne: & quando symptomaticæ excretiones sint bonæ vel malæ, ut scholio obser. 26. libr. 2. numquid etiam sint impediendæ nec ne, inuenies. Alius vomitus est Naturalis, quo natura alleuiatur: alius Quietus, qui accidit stomachicis & facile vomitibus: alius vero Violentus, acutus & astuosus, ut in cholera, qui & præter naturam est. Alius est Artificialis, qui præcauet ægritudines futuras, vel præsentis curat. In quo quædam sunt obseruanda ante vomitum, & in vomitu ipso, & post vomitum. Ante vomitum in primis cauendum, ne vomitus iis prouocetur, qui sunt inepti ad vomendum, de quibus minus vomitus confert, uti prægnantibus: si enim fortia vomitiua ceperint, facile abortum patiuntur. Difficiliter quoque vomunt, qui stricti sunt pectoris, & villos latitudinales tunice extrinsecæ stomachi debiles habent. Parati vero ad vomitum sunt, habitudinis mediocres, lati pectoris, stricti colli, neque apti ad sanguinis spiritum, stomachi robusti, scilicet fundi, & debiles secundum os ipsius: & si sint assueti. Ideo Auenenna, præter iam dicta, quatuor proponit obseruanda ante vomitum: Primum, ut insueti ad vomendum assuescant, leuibus vomitibus 3 ne subito fiat transitus ad inconsuetum, quæ corpus plurimum immutat. Secundum, ut ante vomitum præcedat ventris lenitio facibus communibus sponte eductis, vel arte, balneo, aut clysmate, aut pharmaco leniente. Tertium, ut ante vomitum cibetur cibus diuersarum virium, mixtis ex incindibus, detergentibus, viscosis, dulcibus, acidis, sed maxime pinguibus, & his, quæ diuerso modo parantur tam fixis, assis, quam elixis. Quod si metus sit vomitum futurum diminutum, ex difficultate euomentis, vel ex humorum ineptitudine, miscetur cum iisdem cibis aliqua vomitum irritantia seu rigorantia: uti est eruca, rapanus, ficus, arida, pingues, cape, porrum cum aqua bordei & melle; melo-

B b iij

nes, cucumeres, vinum dulce, de quo copiose bibat, & cibi non bene masticentur. Quamvis praestantius erit praemittere cibos bonos, si timeas vomitum non subsequendum. Quartum est, ut stomachus & extrema sint satis calfacta & collum, pectus: & tempus anni sit calidum, vel hora meridiei, nisi magnus adsit aestus, tunc magis eligatur tertia hora pomeridiana. In actu vero vomendi, cum tepida sumperit hora vomitus, vel paulo ante ipsum, motu inordinato sese moueat, ut cibus in stomacho agitetur: oculi fascia circumligentur, ne laedantur, venterque leuiter vsque ad umbilicum stringatur: & cum vomere incipiat, digitis in os immisissis aut penna anseris oleo intincta fauces irritabit, & iteratis vicibus vomitum excitabit, donec stomachus à cibis & superfluitate exoneretur. Situs commodior est, ut sedeat capite inclinato & pectore, quo vomitus facilius procedat. Quod si accidentia difficilia superueniant, danda erit aqua calida, aut enim euomet, aut venter soluetur, & sedabuntur symptomata. Prodest & clyster leniens. Finito iam vomitu, quiescat, & facies lauetur aqua ros. cui parum aceti sit admixtum: vel abluat os cum vino & aqua mixta; & cibum ac potum tardet, saltem per duas horas si possit. Dentur deinde cibi boni odoris, & suavis saporis, paucæ quantitatibus & optimi nutrimenti, ac paucarum superfluitatum, facilis digestionis & citæ penetrationis: & dormiat, neque bibat aquam frigidam, aut alium quemvis potum frigidum. Si excedat, succurratur & inhibeatur, Arte igitur cum fiat vomitus, is utilis est in morbis longis, ut in quartana, morbis articularibus, ischiadicis, hydropticis, stomachicis, quibus pituita aut bilis abundat, etiam atra, quæ omnibus modis perniciofa est. Morbis comitialibus prodest, & melancholicis, & calculosis: cephalæam & renum ac vesicæ vlcera sanat, ictericos ex oppilatione, epilepsiam ex stomachi vitio, ut in pueris sæpe conspeximus: curat & cutis sceditatem: asthmaticos, cardiacos, & paralyticos leuat. Singultus lassitudinem corporis remouet, ut Aristot. refert in suis *Problematis*. Leuis vomitus desiderium cibi facit, & à nausis conciliat stomachum: torpori, somno graui & agrypnocomati viridis vomitus auxiliatur: vel ex humoribus mixtus, & epilepticis ex stomachi vitio, & conuulsis. A superioribus partibus auerit materiam, sensus omnes inuauat, & aciem imprimis oculorum exacuit: & ab inferioribus materiã inanit, si modicus est. At immodicus vomitus vehemensque sordiditatem & tinnitum, sibilumque affert, & oculorum obsecritates; ac epilepticos obest, virio capitis contigerit, & capite dolentibus, nisi ex crapula vel stomachi cruditatibus fuerit. Acetosus vomitus dentes offendit, quos pariter denigrat. Iecori etiam & pulmone nocet: nam & ex pectore venarum tunicas non sine periculo rumpit: stomachum demum affligit, & vires dissolunt. Si humores itaque superflui reiciuntur, nulla egent curatione; tales vomitiones iuuandæ, donec corpus sufficienter à recrementis fuerit mundatum. Regio enim illa est aptissima ad reicienda excrementa, quæ sunt collecta in superiore ventriculi regione. Ob id navigatio illa in mari, & vetustio, quæ vomitum excitant, sæpe curant dolores ventriculi diuturnos & contumaces. Neque etiam retinendi sunt vomitus in illis morbis superdictis, neque in his, qui sunt à plenitudine ventris; neque in colico, nephritico, aut arthritico doloribus. Biliofus quoque vomitus non protinus cohibendus est, nec morborum initio sym-

ptomaticus, à natura non temerè illatus; sicut in febrium accessione (ut Paulo ante diximus) nullo pacto inhibendus; materiam enim minuit & subinde radicatus euellit. At symptomaticus, impetu coactæ naturæ expulsus cohibendus omnino est, si superflui præsertim fuerit, alioqui periculosus erit: is quoque qui æqualis est in corpore sano, siue spontaneus seu arte paratus, non cohibendus, cum à multis morbis hominem liberet, ut paulo ante dictum est. Criticus item, maxime iudicatus, cum laudabilibus signis præcedentibus non est restringendus, modo non excedat & virtutem deiciat. Interea, licet symptomaticus (ut in libris de febribus ostendimus) sit malus per viam signi (quia arguit materiæ multitudinem vel malignitatem eiusdem) tamen sæpe sit bonus per viam causæ, cum euacuatur materia, quæ morbi causa existit. Cibum tamen euomentibus crebro siue inconcoctum siue corruptum, ne perseverando debilitetur stomachus, & praua contrahat vitia, remediis occurrendum est. Et licet humores superflui nulla egeant curatione, & statim non sint constringendi: tamen ne consuetudine vitium oriatur, & ne frequenti conatu rheumatismis facile repleatur venter, compescendus est. Ideo Auicenna. & illi qui illum sequuntur, vomitum cibalem vel humoralem superfluum, & non æqualiter factum, constringere iubent. Sed is qui diuertit ab inflammationibus inferioribus, internis vel etiam à superioribus, ut in doloribus capitis aurium, &c. non est inhibendus, modo non affecta sint collum, aut partes thoracis. Vomitus itaque omnes optimorum alimentorum, qui sunt post alias vomitiones ob debilitatem retentionis, vel irritationem expultricis, compescendi sunt: ut si sanguis per vomitum reddatur. Neoterici duplicem differentiam vomitus quoque faciunt, illum distinguentes in cibalem, & in humoralem: sub cibali comprehendunt vomitum cuiusvisque rei in corpore sub humoralis, cuiusvisque rei corporeæ. Cibalem ita curant: eius causam primo remouendo, siue ab aere, cibo, potu, aliisue rebus non naturalibus, orta sit, ea remouent & nocumentum impressum, contrariis: & malam temperiem corrigunt assumptis medicamentis tam intus quam extra appositis: & stomachum roborant adhibitis ne in stomachum confluant, diuersionibus: etiam euacuatione, si humores videantur fluxuri in ventriculum: manus quoque ligant supra cubitos & pedes supra genua: quamquam inferiora membra constricta melius vomitum diuertunt & compescunt. Corrigitur accidentia, ut si syncope superueniat: & victum præscribunt superdictum, exiguum, bonum, & coctum facilem, & delectabilem saporis, quæque cito penetrent & proprietate roborent ventriculum, & resistent intemperiei impressæ. Si fiat à percussione supra stomachum, vel à membro; ut cerebro stomacho communicanti, (tunc enim vomere solent) curetur percussio, vulnus; venæ sectione, & amoueatur nocumentum eidem impressum: inhibeantur humores, ne fluant in ventriculum, & membri ratio habeatur laxi, & comunicantis, & ventriculi. Si à medicamentis venenosus, vomitum & secessu educatur: & datur antidota propria: stomachus ac membra nobilia roborentur. Si hic vomitus cibalis fuerit per communitatem, siue à cerebro, hepate, liene, vel à toto; habeatur ratio totius: si à toto, caueant interim fortia solutiva, & ea quæ ventriculum debilitant. Vel habeatur ratio illius membri laxi, siue fuerit hepar, lien, siue cerebrum, inhibe-

bendo, ne humores confluant, diuertendo, euacuando si opus est, & roborando membrum communicans & mandans. Eodem modo si sit per essentiam, auferendo causam, nempe intemperiem nudam, si quæ sit, solummodo alterando contrariis: si cum materia, & adsint humores, curabuntur, ut de pituita dictum est, & de bile, ut exemplo sequenti docebitur. De his vide Arculan. aliosque auctores, qui supra Rhafem scripserunt.

OBSERVATIO XVI.

De vomitu bilioso.

Iuuenis quidam biliosus, frequenter in æstate circa caniculam, bilis vomitum experiebatur, cui os amarum erat: habebat autem & sitim vehementiorem, & ventriculi morsum ructusque nidolosos. Ad quem acciti, cum circa ventrem grauaretur, & os stomachi morderet, nolimus vomitum cohibere, sed potius epoto leni vomitorio, quod ex aqua tepida & vj. constaret, addito syrupo acerosi, simplici ad 3 i b. illum curate proposuimus, tepide à cibo lumpo. Ex quo cum mediocriter vomisset, absque dolore multa biliosa (bilis enim à iecore in ventriculum transmutabatur, cum ipsa in ventriculo nequaquam oriatur: verum à iecore vel à vesica bilis in eundem transmutabatur) os abluui suffi cum aqua & aceto. Deinde dedi syr. alterantes, in hunc modum: ʒl. syr. de ribes, syr. acerosi, simplici, syr. de end. ana ʒ i b. aqua acerosa, cichorii, end. ana ʒ iij, misceantur, & bibat ieiunus per triduum. Recipe nimsant. in tab. ʒ b. utatur cum syr. Purgauimus decocto thamarind. in sero lactis. Sed quia euomebat, dedi bolum sequentem: elect. lemnini ʒ b. pulpa thamarind. ʒ i. pul. rhubarb. ʒ j. fiat bolum. quo ter excreuit biliosa. Interea cum bilis ex hepate in ventriculum conflaret, ceratum sequens hepate apponere iussi: ʒ. cerati santalini ʒ i b. olei myrsinæ, ros. ana ʒ b. lauentur aqua frig. vel rosa. addendo spice nardi pul. ʒ j. ducatur leuiter supra pannum lineum, & hepate apponatur. Ad ventriculum roborandum & vomitum compescendum dedimus subinde syrup. ex succo mali punici & mentha, & stomachum inunximus vng. sequentibus: Recipe olei myrsinæ, cotoneorum, masticini ana ʒ b. hipocistid. acacie ana ʒ b. boli armeni, corall. rub. pul. an. ʒ j. aceti parum, & cera q. s. fiat vng. & sumpto ante cibum in prima mensa diacydonite sine speciebus, & iis, quæ moderate restringerent, hic tandem curatus fuit.

SCHOLIA.

Quomodo vomitus biliosus curetur, vide Alexand. Benedictum Veronensem lib. 14. cap. 28. De vomitu bilioso. habes ibidem plurimas compositiones, quæ intus exhibentur, & exterius applicantur, tam totus quam vnguentæ, ceratæ & emplastra. Hic vomitus non est cohibendus, nisi excedat: cum & immodicus tamen consuetudine nocentior fiat, magis quam si vires prosterant, leni tum vomitorio duntaxat opus est: quod & Alex. Trallianus lib. 7. cap. 13. De nausæ & vomitu dicebat. Si enim fuerit serosus tenuisque & non nimium ventriculo impactus, haud curiosum esse oportet ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberatiore tepida potu vti, vel cremore pisanæ ventrem recrementis liberare. Si aliquo modo sit infixa, & purgatione opus est, syr. ex infus. ros. pallid. vti possumus. Sed si nimium sit tenue excrementum quod reii-

citur, & acre, à calidis abstinemus, & potius roborabimus & astringemus, ut est antidotum simplex ex malis cotoneis, vel ex succo solo eiusdem, cum zaccbar. aut melle. Id multum roborat & acria recrementa temperat: ideo & infirmo & calido stomacho, humori in bilem commutanti accommodatum est. Prægnantibus si vomitus biliosus fiat, vti alius, periculosus est ne abortum irriter: his vomitum sedant pampinorum vitis cimæ, vel clauicularum succus in potu, sed & mali citrij succus, vix acerbæ. Quæ assumuntur, sicuti & citri, nullam graueolentiam habeant, sed ægro grata sint. At quæ vomitum ex phlegmate mucoso curant, sunt attenuantia, ut syrupo acerosus, additis speciebus calidis aromaticis, si ex crasso viscoso humore, syrupo acerosi. compositus valet. exemplum huius, quomodo curetur, dictum est obseruat. 14. præcedente. Vbi enim acida & dulcis pituita affixa videatur, extenuantibus, iuxta Trallianum, medicamentis vtendum est: oxymelle, raphani rad. & capparium præparandum est humor, & purgandus. Et si in ventriculi cavitae innatet, valet etiam, si inhiereat, vomitus ut adiuuetur (nam non oportet statim constringere) decocto raphani, semini, anethi, arispl. adiecto oxymell. simplici vel scyllino. Dissecta pituita etiam euacuanda cum pilulo hieræpicæ: etiam clysteres ad diuertendum valent. Deinde stomachus roborandus, hoc vel simili vnguento exterius. Recipe olei abissi, nardini, masticis, coran. ana ʒ b. corall. rub. memba sicca, caryophyll. ana ʒ j. spice nardi ʒ j. flor. rosa. rub. ʒ i b. cera q. s. De tur tunc à purgatione syr. abinthi de mentha. Vide alias compos. apud. Alexandrum Veronensem cap. 9. lib. 14. De vomitu phlegmatico. Verum his qui cibum frequenter euomunt (cuius rei exemplum quoque posuimus, obseruat. 15. præcedente) non solum cataplasmata ori stomachi, sed etiam iugulo imponenda sunt, ex mentha masticæ. A cibo, quæ adstringant assumenda sunt: cibus, potus, parcius assumendus. At ex ciborum acrimonia post vomitum, quæ refrigerant & adstringunt in esca danda sunt, & quæ styptica sunt & acetosa. At si stomachi exundatio ex cibo nimium diluto fuerit, aut nimio potu, à vomitu stomachus ex calefacientibus ac exsiccantibus inuatur; & paulo post cibis siccioribus, quibus aromata admisceri debent. Et panis crustam tostam Cretico vino infusam, superiniecto masticæ, caryophylloque, conferre haud dubium est. At si spiritus in vno ventre inclusus, cibum attollens, rarefit, cucurbit. maiuscula umbilico imposita mire facit, ante cibum impacta; ne subinde rutaceo oleo galangæ puluere & cimini iusperfo. Alij vero vbi vomito sit ob status cibum qualia postea scribemus conferre ad ventriculi inflationem: & inungunt iis quæ status discutunt. Commendant clysteres; quos in omni vomitione vtilis esse volunt, modo pauca quantitas iniiciatur, neque fortiter laxantia aut olentia apponantur. Horum formulas habes apud Rond. c. proprio De vomitu.

OBSERVATIO XVII.

De vomitu melancholico.

Quamuis atra bilis vomitus sit periculosus, tamen, ut ante ostendimus, aliqui ab eo sunt curati. Talis minime est restringendus: nam materia melancholica cum retinetur, præcipue adusta, infert symptomata grauissima. Ita melancholicus

cholicus quidam, qui circa lienem subinde dolebat, per certa quadam intervalla humorem melancholicum, saepe etiam atrum, vomebat. Huic igitur consului, cum remedia contra hoc scdum malum & molestum à me peteret, cum in autumni principio essemus, & etiam videretur aliquo modo laborare sanguine melancholico (licet quadragesimum annum ageret, vir tamen niger & hirsutus ac venas satis amplas habens) ut paulo ante vomitum, qui fere certis periodis illum infestabat, post leniens medicamentum sumptum, altero die sanguinem in brachio sinistro ex vena lienari sibi detrahare iuberet. Mox atrabilem expurgavimus, cum decocto sene myrob. indor. sumaria & flor. bugloss. boraginis. Deinde splenem tum ventriculum roboravimus. Ita ut facile is tandem curatus fuerit. Et ut magis deinde vomitus confringeretur, mandavi, ut syr. menth. acem. cum aqua melissa, adiecto exiguo vino mali punici, suaveret.

SCHOLIA.

Hic vomitus, nisi immodicus fuerit, non est inhibendus, præmissis uniuersalibus remediis: si superfluat, uti alius excedens, est constri-gendus. Solet plerumque hic vomitus contingere, si melancholia facialis multipliciter, & non descendat ad intestina, sed copiosius transluat ad stomachum, illum grauando, vel forsu irritando. Maxime atra bilis vomitus inferi: qui equidem vomitus ubi excefferit, nihil præstantius est imprimis, quam humorem illum inferius clysteri ad intestina retrahere, non tamen acris: & stante repletione sanguinis melancholici, venam incidere. Et ideo etiam, quia hic in liene dolebat, basilicam sinistram secare fecimus. Et propterea aliquis mirabitur, cur aliquando venæ sectio in vomitu conueniat: imo etiam Græci, præter Arabes, id suadent. Ita Alexand. Trallianus c. 13. De nausea & vomitu, lib. 7. inquit: Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur? & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum venam scire, tum purgare oportet. Si igitur aditu repleto totius, & aditu omnium humorum qualitas, aut sanguis dominetur, fiat venæ sectio ex vena communi: alioqui si ex hepate originem habeat, ex basilica dextra; uti à liene ex sinistra: vel ex saphena, si à repleto sanguine mensuo, vel ab hæmorrhoidib. Huius exemplum posuimus de moniali iuencula 25. annum agente, singulis periodis menstruum purgationem per vomitum reicientem, à me curata, lib. 16. obs. 25. Refert quoque, fere incredibilem historiam de moniali quadam Matth. de Gradi, Papie commoranti; quæ tribus annis delicatissimum, quantumvis cibum semper euomebat, cum humorum aquosorum haud exigua portione: quæ deinde exastuans maximo dolore afficiebatur, ut furiosa & phrenetica impetuose admodum sese moueret: aliquando & in syncopen collapsa per semihoram pro mortua habebatur; ita, ut nullæ diuersiones iuarent, nisi post quatuor aut quinque horas: deinde per se alleviatur. Huic frequens sanguinis missio facta est ex vena communi dextri brachij, ita ut singulis tribus diebus per duos menses semper extractæ fuerint ad minus semper septem uncie sanguinis pro vice, cum etiam viueret septendecim diebus absque cibo & potu, sumendo tantum modicum vini Veruacini singula die. Postea de gæto in octo dies demissus est sanguis, & quod

Si enim venæ sectio aliquando in vomitu conueniat.

Historia mirabilis Matthæi de Gradi.

magis admiratu dignum erat, bona habitudine læta ac iucunda videbatur, cum tamen nihil cibi retineret. Fuit tamen hæc phlebotomia curata, præter spem medicorum omnium excellentium, qui eam viderunt. Vnde Gradus infert, hunc vomitum à toto origine habuisse, ab humore in os ventriculi delato: & hinc quoque sanguinis detractionem iuuisse credebatur. Recte Auer. 7. Collectaneorum suorum dixit, c. de curatione cancri, quod sicut in natura sunt monstra; ita & in medicina monstrositates apparent: de quibus multa refert Rabbi Moyses part. 24. suorum aphorism. In vomitu igitur sæpenumero sanguinis missio non improbat: nam si corpus morbidum est, ac venæ sanguine turgeant, plurimum fracta vena ex stomacho reicitur, vel duarum librarum interdum pondere (ut nos lib. 15. retulimus & exemplis approbamus) tum à iccoraria vena incipiendum est; quæ acuto scalpello secanda est, teste Alexand. Veronensi medico) ne latiore vulnere spiritus vitalis subducatur. At scæminæ sanguinem euomentes, profluentibus mensibus, protinus liberantur, auctore Hippocr. Vtrique sexui sanguinem euomenti, narium aut hæmorrhoidum profluuium subuenit, si parcius, tunc phlebotomia prodest. Sæpe etiam in vomitu melancholico, ut hic in sinistro brachio vena vulnerata, auxilium attulit, ex liene facta flexione in ventriculum, ut à iccore ex basilica dextra: propterea si sit vomitus humoralis, periodicus, tunc plerumque vel à toto, vel à parte per consensum sic machus afficitur, humorem ad se fluentem recipiens: & curandus est eo modo, quo dictum est. Sed antiquam stomachus in vomitu effundatur, ea primum diligenter obseruanda sunt; ut materia, in diuersum trahatur, ut iam diximus; & ut membrum recipiens validius fiat, & membrum, à quo materia fluit corrigitur. Ante accessionem dandi syr. refrigerantes acetosi & parum styptici, si materia fuerit calida ac mordens. Tum die integro deiectio ventris, ex thamarindis prunisque nostratibus fieri potest: vel venter clysteri molliori. Et stomacho ac iccori deinde imponenda emplastra ex santalis, ros. rub. myrti baccis, ciper. mastich. Spondio & similib. cum oleo ros. & cera compositis, confuso aceto acerrimo. In phlegmatico melancholico humore, qui periodice effunditur, valent balani Indici seu myrob. epithymum, agaricus cum sale Indo, finita accessione, & lienem imponendum emplastrum de meliloto, myrto, ac ladano ex vino meraco vel aceto. In phlegmatico quoque humor deiciendus, ac alio propellendus, & stomachus confortandus est, ac cerebrum, si inde emanat humor, firmandum est. Si vomitus à pharmaco excitetur, pharmacu in primis educendum est, & venenositates detergenda, vel vomitu, vel per alium deiciendum: nimium enim stomachi tunicas lancinat, aut mordet: huic curatio omnis necessaria est, quæ supra de bili humore posita est. Quod si vomitus venerit ab apostemate, vel vlcere, aut dolore ventriculi, tunc curatio petenda ex propriis capitibus, de quibus mox agemus. Si contingat à ventriculi raritate, vniatur & roboretur stomachus; cauendo à solutiuis & iis, quæ vomitum incitant: & à vomitiuis & valde resolucentibus. Et intus sumantur, quæ stypticam viscositatem habent, ut coroneum, pellicula interna stomachi, & vinum moderate stypticum, tum alia viscosa, de visu dicta, & ab auctoribus latius explicata. Si sit ex oppilatione pylori, si naturalis, non recipit curationem: alia causa remouenda: & ideo si ab humore crasso & viscoso, uti magna ex parte euenit,

euenit, curetur abstergentibus, incidentibus, & exhibitione hieræ picræ, in forma elect. de quibus iam aures distum est. At nunc pauca de vomitu sanguineo adiciamus, quamuis de eo prius loquuti sumus lib. 16. De cruenta spuitione.

OBSERVATIO XVIII.

De sanguinis vomitu.

Vir ille, qui ex ventriculo sanguinem recentem naturalem per vomitum reiciebat; cum ut compescerem à me postulauit. Quod efficere studiui primo sanguinis missione, etiam diuersione per ligaturas & cucurbitulas in cruribus, postea sequens exhibuimus: Recipe trochis. de carabe, de terra sigillata ana 3 ss. aqua buxæ pastoris, portulacæ, plantag. ana 3 j. misce. quæ illico iuuerunt. At alter iuuenis, cui exhibitum fuit medicamentum acre per empiricum, sanguinem, laxatis venis seu venarum orificiis, vomuit. Huic commodè consulimus, ut lactis heminam cum vini dimidia aut tertia parte, idque paulatim & continuo haustum sumeret. Hoc enim virus medicamenti mitigat, eluit & pariter conglutinat, Alexandro Veronensi medico teste, lib. 13. cap. 10. Valet & syrupus ex mali punici succo: aliqui acerolum præferunt, niue refrigeratum, ut torpescere membrum faciat, & punctiones obtundat. Acetosus namque conglutatum, si quis intus relictus fuerit, sanguinem discutit.

SCHOLIA.

EVomitur nonnunquam sanguis ventriculi venis à copia sanguinis cum impetu ruentis apertis (idque maxime, si venarum ora imbecilla fuerint) etiam à vitioso acrique sanguine erosis. Assumpto quoque veneno plurimi vomitionibus perierit. Quidam cathartico epoto vomitorio sanguinem euomuerunt, antequam morerentur. Inaferuntur etiam interdum in stomacho caruncula hæmorrhoidibus similes: ex quibus per intervalla sanguis vituliter profluat: raro tamen id euenit: uti etiam ab impacta gula sanguifuga: vel fit iis, qui aquam palustrem vpa cum bestiola incaute bibunt: & interdum sanguis ex capite, e iccore, liene, in stomachum profluit & transfertur, vel in scæminis mensib. suppressis aut hæmorrhoidibus, aut sanguinis missione vel venere intermissa, ut viduis & religiosis etiam pluribus contigit: vel ab ictu hæmorrhoidis serpentis: plurib. corporis partibus, & à stomacho sanguis profluit, vel latius ad longum lib. 16. De sanguinis spuitione docuimus, & præcipue obs. 25. eiusdem libri; ut non opus sit ea hic repetere, aut diuini huius curationi insistere. Quod ad præsens attinet, satis est, quod is sanguis, qui ex ventriculi venis vomitur, concretus non est, nec inde magna sanguinis eruptio potest contingere: quod graciles ventriculi venæ sint. Aliquando qui vomitur sanguis, à remotis corporis partibus in ventriculum deferretur: ut si cui membrum quodpià excisum fuerit, natura non minus sanguinis quam antea generante, sanguis quo membrum illud ali debuit, ad ventriculum deferretur. A toto, adest plenitudo. A iccore aut liene, tunc adest in dextro aut sinistro latere tumor. A mensibus suppressis vel hæmorrhoidibus, aut hæmorrhagia, ex astantibus dignoscitur, & euacuatione solita suppressa. Et qui ex aliis partibus deferretur ad ventriculum, qui enomitur, concretus esse solet, vel facile concrefcit. Sanguinis itaque vomitus nisi fuerit periodicus,

cum corporis robore, periculum præfigit: cui nisi protinus subueniatur, animi deliquium affert. Ex venæ scissura diu emanans, vlcera minatur, & abscessus, ob eam causam (ut Gal. demonstrat) medico opus est solerti & ingenioso, magnæque experientie. Si itaque sanguinis vomitus ob membrum aliquod excisum fuerit, aut ab uniuerso corpore in ventriculum deferatur, incidatur dextri cubiti vena media: si ab hepate, dextri interior cubiti incidenda: à liene, eadem incidatur vena, sed in sinistro cubito: si à mensum suppressione, à saphena pedis dextri: si vero ab hæmorrhoidum consuetu fluxu retento, ischiadico vena in parte sinistri pedis minimo digito vicina, ut quidam volum: si ab hæmorrhagia è nari-bus solito fluore suppressa, ex exteriori cubiti vena sanguis mittatur eiusdem lateris cum nate, unde sanguis fluere solebat. In hoc pathemate, quacunque à causa ortum sit (quoniam vires eo laborantis imbecillæ plerumque esse solent) modicæ venæ, dum inciditur, diductio fiat; ne maior quam par sit, spirituum resolutio fiat. Parcè præterea detrahatur sanguis, idque repetitus vicibus, si opus est. Ante venæ sectionem, si alius resistat, sequens enema alio infundatur, vel si sua sponte (ut conuenit) excrementa non deiecerit: & castæ extractæ, & sacch. rub. ana 3 j. olei viol. 3 iij. salis parum, cum decocto quatuor remolliuorum prim. & bordei: fiat enema, quod ante pastum iniiciatur: deinde fiat venæ sectio, ut dictum est. Deinde tam intrinsecus, quam extrinsecus adstringentia adhibeantur: qualis hic pulu. est. & lapid. hæmatit. 3 j. bac-car. myrti 3 iij. acacia, boli arm. veri corall. rub. ana 3 iij. fiat pul. subtilissimus, ad modum alcohol; & sumatur 3 j. cum aqua plantag. adiecto exiguo aceto: idque mane ventriculo vacuo, & vesperi, si opus est, adiecta 3 j. syr. ex ros. siccis, vel & confer. ros. ysteris, confer. rad. symphytis maioris ana 3 j. boli arm. loti in aqua ros. 3 j. lapidis hæmatit. pulu. 3 iij. corall. rub. 3 iij. cum syr. cydon. fiat elect. molle: capiat ad magnitudinem parue castaneæ, trib. horis ante pastum. Valet rob. ceras. syluest. acid. vel oxyacanthæ, & syr. ex cotoneis, & de agrestia: si duo cochlearia sumantur. Extrinsecus crura fricentur valide: iisque vincula dolorifica iniiciantur, ipsique cucurbitulæ sine scarificatione affigantur. Si ab hepate sanguis deferatur, supra hepar cucurbitula defigatur, si à liene, supra lienem: si à matrice, supra matricem. Sumpto cibo, si ægrotus ipsum retinere nequeat, cucurbitula ventriculi regioni affigatur. Si neque restringatur sanguis, deinde foru sequenti vel simili vtendum: Recipe balast. psidia, gallarum, rhois dioniorum, baccarum myrti, ros. rub. ana q. s. decoquantur in aqua plantag. & aceto, in quo decocto calente spongia madefacta & expressa, ventriculi regio foueatur: deinde & hoc vnguento sequenti inuncta: Recipe olei myrti, coronei, mastich. ana 3 ss. hypocyssid. boli arm. corall. rub. acacia, baccar. myrti ana 3 iij. aceti parum, cera modicum, fiat vng. quo ventriculi regio mane & vesperi post fotum inungatur. Reliqua vide lib. 16. obs. 24. & 25. & alios auctores.

OBSERVATIO XIX.

De vomitu atra bilis, vna cum vermibus & scarabæis.

Cum Balduinum Kerck veruuium Brielsensem mense Octobri, anno 1567. duplici tertiana correptum, curassem, deducor ad puellam annum 22. attingentem, quæ vomitu continuo longo quidem tempore laborauerat, & bilem tanquam

quam piecem valde atram vna cum vermibus deiebat, quos tunc spectauimus ad palmam fere in longitudine, coloris cineritij: & paululum ante meum accessum nouem numero euomuerat, omnes fere mortuos. Atram vero bilem picis instar, quam spectabam, prima fronte sanguinam concretum esse putabam, qui ab vtero in stomachum transmissus esset: sed cum statuto tempore menses prodirent, atram bilem esse intellexi. Verum, cum esset bonæ constitutionis, neque febricitaret, & circa stomachum doleret, nonnihil appetitu quoque deficiente, hoc ipsum ex humoribus corruptis fieri existimabam; Vnde & vermes generabantur: eo quod fructibus autumnalibus valde crudis antea vsa esset. Alium non probe deiebat, nisi duobus diebus tantum semel; & stercora quidem dura faeculenta satis naturalia & minime nigra. At vomitus admodum frequens erat. Medicus assistens dederat pilulas ex aloë: verum parum profecit. At apozemate sequente per me descripto, vomitus, qui prius creber erat, nonnihil cessauit; postquam plurima nigra recrementa per inferna deiecit: vnde & melius habere videbatur: Recipe absinthij communis, centaury minoris, agrimonie, portulacæ ana manip. ℥. semin. anisi portulacæ ana ℥. j. foliorum senæ ℥. ℥. rhabarb. selecti ℥. ℥. schenanthi ℥. j. glycyrr. rasæ ℥. ℥. passul. emulcear. vj fiat decoctio pro ℥. viij. colatura zaccharo parum dulcoretur. Dimidium cum sumpsisset, bene excreuit: primo faeces, mox atram bilem copiose: ac vomitus & ventriculi dolor nonnihil cessauit. Die intermisso, reliquum sumpsit. Interim ad appetitum incitandum capiebat duo cochlearia subinde ex syr. sequentibus: ℥. syr. de limonibus. syr. absinthij, de scolopend. syr. capill. Veneris (quia parum tussiebat) ana ℥. ij. sumebat ℥. ij. ex tabulis hoc modo descriptis: ℞. specierum diarod. abb. ℥. ij. specierum diarag. frig. ℥. j. semin. zedoarie puluerisat. rad. tormentill. puluerisat. ana ℥. ℥. dissol. in aqua portulacæ & agrimonie, adiecto zaccharo optimo qu. s. fiat confectio in tabul. Et istis remediis utcunque habuit. Verum anno 1568. 18. Iulij die, rursus ad Cornelium Philippum Consulem vrbs illius ex febre continua acuta decumbentem euocatus, puellam denuo inuisi: quæ licet utcunque nunc se haberet, tamen paulo ante scarabeos vomitu reiecerat (res portentosa & incredibilis, nisi ipse conspexisset) quos mater nobis ostendit, præsertim Petro chirurgo Brieleni, & viro consulari, amico nostro haud vulgari. Referebat & mater viuum scarabeum reiecit, qui per duos dies superuixerat: referebatur autem ad incantationem hoc malum.

SCHOLIA.

Vermes vomitione reieci, haud insolens est nobisque non raro visum. Testatur & idem Amatus Lusitanus *curat. 5. 6. ac 10. cent. 1.* Generari autem posse in ventriculo, vt Amatus existimat, difficile fuerit affirmare; verisimilius & ad ventriculum peruenire. Vide Beniuenum de crassiore pituita expulsa, & cum ea etiam verme, longitudinis digitorum quatuor, satis pleno, capite rubro, leni, rotundoque, pili magnitudinem excedente: cætero corpore lanugine quadam contecto, cauda furcata ad similitudinem nouæ lunæ: pedibus quatuor, duobus in dexteriore, totidem in sinistram partem coaptatis. Admiratus Beniuenuis vermiformem, medicis eruditioribus ostendit. Nullum inuenit, qui monstrum simile se vidisse ynquam fateretur. Aderat tamen senior

quidam, sed medicæ artis imperitus; qui testuati est similem se vidisse vermem, vomitu quoque propulsum, ab Alexan. quodam cœnobita: qui statim, vt ille aiebat, pro iecto eo, mortuus est. Vocitabat autem hoc monstrum cordis vermem. At contra æger ille Beniuenui circa cor & ventriculum dolens, cum medicamento vomitionem fieri iussisset, vt primum vermem ipsum euomuit, ad pristinam reuersus est sanitatem. At vermes reiectos sape vidimus: sed scarabeos, nisi hoc tempore, nunquam: quāquam alij quoque videntur vidisse, cum & Gordonius medicus suo tempore illustris, scribat part. 5. cap. 20. De vermibus. vermes, serpentes, scarabeos generari ex putredine in corpore humano; sicuti exira in mundo vermes & musca ac similia generantur. Sed & Iulianus (teste eodem Beniuenuio) medicam artem professus, dum grauitate ægrotaret; & aduenienti medico dolorem, quo circa ventriculum miserabiliter cruciatur, exponeret, tangente illo (vt sit) ac manibus locum pertractante, erupit in vomitum: quo & ipse frustum carnis ad parua pilæ magnitudinem, in quo vermis, non fecus ac bruchus in siliqua recludebatur, reiectans, ad pristinam statim reuersus est valetudinem. Ego quoque Delphis puellam monialem in curatione habui, quæ cum diris doloribus per integrum annum afficeretur, se tandem præ angustia circa ventriculum mori exclamabat, & nisi in vomitum prorumpere posset, se morituram vociferabatur. Quare medicamentum vomitorium cum adhibuissem, frustum magnum carneum albo colore, albuminis oui instar, magno conatu reiecit, ita congelatum ac induratum, vt cultello acutissimo vix diuidi posset, & ab omni dolore statim liberata, deinde sana vixit. Carnis quoque frustulum, cum de pectoris morbis ageremus, tussi reiectum à muliere, ex Beniuenuio scripsimus, & quod etiam nos in aduocato vidimus, de quo alias diximus. Sed, quod æque admiratu dignum, refert Bened. Veron. lib. 12. c. 22. de generib. vomituum, quendam lapidem, nuncius iuglâdis magnitudine, euomisit. Refert quod Niccolus c. proprio de vomitu, inter reliqua admiranda digna, lapidem oui magnitudine vomitu reiectum esse. Cæterum qui eiusmodi vomunt, non oportet vomitum inhibere, cum omnia talia præter naturam sint. Et sic qui hæc vel atram bilem vel vermes vomitu reieciunt; vt hæc puella faciebat, non oportet inhibere, sed eius causam tollere, & talia quoque medicamenta præscribere, quæ vermes necant, & expellunt: de quibus latius suo loco dicemus, cap. proprio De vermibus. Iis quoque expulsis ventriculum quoque robotare oportet. Hæc de vomitu. Si de iis plura desideres, quæ vomitum excedentem & reprimunt & constringunt, vide Aëcium, tum alios auctores, iam superius citatos, & qui supra Rhasem scripsere.

OBSERVATIO XX.

De stomachi dolore.

IChthyopola Delphensis, qui in Flandrica plures commorabatur, ingenti stomachi dolore afficiebatur, cum insigni clamore, vt sese quietum tenere non posset, ob nimiam angustiam, qua affligebatur. Ad hunc accitus, cum decoctum florum chamæmillæ in ceruicia communi præbuissem, emissis ructibus & in sudorem solutus, incantamenti instar omnis dolor euauit: vt nullis aliis præstidiis opus fuerit vti.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

OBSERVATIO XXI.

De ingenti stomachi dolore in potatore.

Omnium inter scruissima symptomata habetur stomachi dolores; deinde inflammationes, inflationes, abscessusque molliores, ac vlcerationes. Sed nunc de stomachi prius dolore agemus, qui interdum impatibilis est, & mortem sæpe accelerat. In eius ostio scruior sentitur, quem & cardiacum quidam vocauerunt dolorem, alij cardiacum vocauerunt, de qua prius dictum est; quæ refertur ad intemperiem calidam, cum materia biliosa. At stomachi dolor interdum & morbus longus est; in quo affectu breuioris sunt vitæ. Dolorem ipsum aut inflatio sequitur, aut ardor modo inflammationis, intercisiones tortionelq; vel rosiones sequuntur, quæ tormenta stomachi alij appellauerunt. Est autem stomachi dolor, tristis & peruersa sensatio, ab aliqua lædente causa. Et dolor omnis, aut stomachum distendit, aut degrauiat, aut pingit, vel mordet eroditve: aut in imo afficit ventrem, aut medio, vel ipso ostio. Dolor quoque continuatur, & interimit: aut periodicus est: qui interdum confecto cibo sedatur: interdum hominem exinanito ventre vexat. Aliquando assumpto cibo tortiones solent quiescere: modo ingens dolor est, cum cibum tantum conficitur. Alius vero dolor vomitu bilioso sedatur aut acetoso, qui in terra ebullienti similis est; alioqui continua pena est. Aliquibus quotidiano piteuit vomitu, mane præsertim, quiescit dolor. Acutum stomachi dolorem quædam consequuntur: frigidus sudor, cordis palpitatio, pulsus frequens, ac formicans, ac animi defectus. Dolor ventriculi, sensus est nociuus eiusdem, & symptomata tactus læsi. Quæ pars sit affecta, iam satis constat: vel in ore ipsius ventriculi, vel in ventriculo, aut parte eiusdem, nempe in concavitate, vel tunicis ipsis. Atque hoc symptoma pendet à morboj intemperaturæ materiali vel immateria- li: à materia quidem humoralis, vel ventosa, vel à solutione continui. Hic dolor ratione suæ essentia distinguitur, grauians, extendens, perforans, pungens, mordicans, quamuis plures haberi possint, vt ex Montano c. de dolore capitis diximus. Sed dolores stomachi communiter, iuxta Neotericos, ad quatuor referuntur, ad grauantem, extendentem, pungentem, corrodentem. Vel alia diuisio ex parte loci, partium stomachi læsarum. In toto, vel in parte, vt iam paulo ante diximus, vt in orificio vel fundo. Rursus quilibet ex his, intensus, remissus, mediocris, continuus, periodicus, & sine periodis. Et qui interpolatus est, ab euentu ipsius doloris varius quoque esse potest, dum cibum in stomacho est, vel descendit; vel stomacho vacuo, aut inanito, vel intenditur, cibo iam digesto, vel cum digeritur. Sedatur etiam (vt iam paulo ante diximus) vomitu, ructu (vt huic nostro ægro eueniebat) aut ventositatibus superius vel inferius emissis, vel sensibili expulsionione humiditatis aquosæ; vti contigit patri Io. Matth. de Gradi. Et nos hoc tempore puellam in curatione habuimus, cui idem eueniebat. Iam quoque dolores alij noui, recentes, breues, diuturni: quidam ad alios morbos succedentes, vel per se incipientes, vel simul concomitantes, cum aliis symptomatibus, vt fluxu ventris, spasmo, vel stomachi singultu. Hæc enim omnia ad morbi cognitionem, prædictionem, & curationem faciunt, vt exempla subsequencia ostendunt.

Pet. Forest. Tom. 2.

Albertus chirurgus Delphius, si quis alius potator egregius anno 1565. sub Martij finem, cum plurimos dies noctesque vario potu ventriculum impleuisset, modo vinum rubrum bibens impurum, modo ceruiciam crassissimam, eamque valde faeculentam & recentem, cum puluere zinziberis & zaccharo; domum rediens, post mediam noctem excitatus intolerabilem dolorem in stomacho patiebatur, vt se veneno infectum clamaret: dolore enim adeo grauis erat, vt se in lecto continere non posset; cum totius corporis concussione, vt astantes hominem jamjam moriturum existimarent; ac pro deplorato habentes, extrema inunctione per sacrificulum peracta, ita illum in dolore relinquerent: donec mane ad eum accitus, deprehendi crura rotumque corpus adeo tremore concuti, cum totius lecti commotione. At vix mihi interroganti locum affectum ostendere potuit: tandem ostendit se circa mucronatam cartilagineum adeo dolore torqueri, tanquam pugione perforaretur: astantes autem narrabant, post potum insignem & diuersum, hoc malum originem suscepisse. Vrina quam tunc inspiciebam, minime tineta erat, sed admodum cruda: non stitibat, nisi exiguum potus flagitand, cuius si vel guttam in ventriculum demitteret, mox in gutture & in stomacho se suffocari clamabat; lingua minime arida existente, neque potu descendente. Aderat inanitus vomitus, vel nausea, cum ad vomitum frustra incitans. Sequens igitur vomitum præscribo: ℞. bordei mundati p. j. flor. chamæmillæ (ob dolorem) p. ℥. semin. anethi ℥. ℥. bulliant in aqua communi; & huius colat. accipe ℥. iij. addendo syr. ex infus. ros. communis oxymeli simplicis, syr. de cich. Nicoli, cum rhabarb. ana ℥. ℥. misce, sumebat tepide; & euomit ceruiciam satis copiosam & pauca biliosa. Dolore tamen æque permanente, vocatur & secundus medicus, Cornelius Ericius, collega meus. Pulsus erat contractus; & ne copia ceruiciæ & vini suffocaretur, sequens medicamentum vna præscripsimus: ℞. solior. senæ ℥. vi. agar. semin. albi leuiss. ℥. ij. cinnamomi ℥. j. semin. anisi ℥. ℥. bulliant in ℥. ix. decoct. communis; & fortiss. expressioni addendo ℥. ij. syr. ex infus. ros. commun. misce pro ij. dosibus. Vnata cum statim sumpsisset, medietatem potionis euomit, interim bis copiose excreuit multa biliosa, fetida & aquosa, in maxima copia; & simul plura euomit. Ab huius medicamenti operatione mox incidit in somnum, deinde & sudorem: & bene se habuit. Interea ad ventriculi roborationem capiebat subinde ℥. ij. vel iij. spec. diarod. abb. in tabulis. Altero die cum rediremus, nullo dolore torquebatur: vti & nocte subsequente: vt se iam sanatum diceret: ideo reliquum potius non dedimus, nisi tertio die alteram dosim: & alium commode reddidit, & perfecte sanus factus est; quamuis in primis ab astantibus pro mortuo habitus.

SCHOLIA.

Infinite sunt causæ doloris stomachi & interprocatarticas præcipue cibis potusque inordinate sumptus; vti in hoc chirurgo: nam oriri

Causa potest

potest ex cibo, ut porro, c.ape, alioque, & his similib. vento quoque septentrionali: vel si post labores sudoresque nudum fuerit corpus frigori expolitum; nam & dolor ex gelida porta subito quandoque interimit, aut in colicum commutatur. Potionis vero veneno, intolerabilior dolor habetur; & ex medicamentis valde adurentibus, vel solventibus, vel ex percussione, casu, offensione. Sic causæ mediæ doloris duplices esse possunt; vel Primitivæ, de quibus nunc diximus; vel Corporeæ: vel Immediatæ, ut intemperies calida, frigida, sicca: humida, sine materia, dolorem non facit: vel est cum materia, aut acuta intus mordente, aut corrodente, & mordente intus humore, vel adurente, vel utroque modo, ut in calida inflammatione, ex humoribus simplicibus, aut compositis, quale est acetosum (alsum crassumque phlegma, vel viscosum, vitreumque omnium terribilissimum. At melancholicus item humor acetosus dolorem excitat periculosum. Sed inter omnes cruciatus, qui inter tunicas insedit humor vitatus, facitiores penas excitat; vel oris stomachi præsertim. Ita & continui solutio, spiritus interclusus. Quod ad causas corporeas attinet, duplices quoque habentur: vel per communis seu consensum, vel per essentiam: per consensum, ut à toto, quemadmodum in febribus; de quibus satis dictum est in libris nostris de febrib. aut crisi, aut à membro particulari, ut cerebro sibi communicante, aut absolute, aut mittendo materiam catarrhalem; ita à nervis, splene, atram bilem in ventriculum euomente vel mittente; à bile, ut in hepate seu fellis vesica: ab intestinis, ut vermicibus, ventositate & vaporibus, ex facibus malignis eleuatis in ventriculum: sic à renibus, ut in dolore calculi. Ab utero, ut mensum retentione, hæmorrhoidum. Per essentiam vero, sunt humores iam dicti in ventriculi fundo aut tunicis inhaerentes. Ad causas remotas referri possunt nocumenta concoctionis, & quæcunque intemperiem ventriculi labefactant. Hæ causæ perquirendæ certis signis, ut exemplis doceamus, antequam curationem instituamus.

OBSERVATIO XXII.

De dolore ventriculi intolerabili, cum hypochondriorum suspensione.

Geatridis Bartholdi, cognata nostra, mulier si quæ altera pulcherrima, 30. ann. cum complevisset, anno 1546. mense Iunio intolerabilem dolorem stomachi incidit, cum hypochondriorum suspensione. Lotium huic extreme crudum & album erat, instar puræ aquæ. Cum variis medicamentis curati non posset, dolorque magis intenderetur, & difficulter alius solueretur, post absinthij decoctum, cum liquida pharmaca plane & semper abhorreret, summo diluculo huic adhibui stomachici laxativi calidi in tabulis confecti 3 vj. unica dosi, cum difficilis solutionis esset: quo medicamento octies alium deposuit: & multa putrida & pituitosa excrevit. Et quia operabatur non sine torminibus & angustia; pro ablutione pharmaci dedi cyathum vnum iusculi pulli: à quo postea cum vnum secessum adhuc habuisset, dormiuit per totam noctem subsequenter, usque in maximam lucem diei subsequenter, cum antea præ dolore per quatuor aut quinque dies, aut noctes non dormiuisset. A somno au-

tem surgens, ab omni dolore liberata sana omnino evasit. Cæterum, quod ad stomachicum laxativum attinet, quod in officina à pharmacopœo paratum habebatur: hæc erat eiusdem descriptionis: ℞. sacchari optimi lb j. cinnamomi, zinziberis ana 3 ij. caryophylli, galangæ ana 3 j. nucis muscatæ, spicæ, ligni aloes, cardamomi, macis ana 3 ss. Si vero laxativum facere volueris (quo nos hic uti sumus) addatur 3 j. scammonæ præparatæ, coquantur cum sufficienti quantitate aquæ saccharatæ; & fiat confectio in tabulis. Attamen hic cautio adhibenda, quod ea non liceat uti in magna dole: nisi in corporibus robustis, expertis & notis. Ideo cum hæc mulier (ut alias sæpe externi eramus) difficilis solutionis esset, & fortis admodum, dosin auximus ad 3 vj. alioqui vix 3 iij. aut iij, dedissemus. Est autem medicamentum forte, ob scammoneam, & vehementis operationis; in hoc tamen calu conferens, ad pituitosos & crudos humores in ventriculo collectos habentes: utile quoque iliosis, colicis doloribus à materia pituitosa vel ventositatibus crudis, nequaquam vero in morbis calidis; ut eo tempore medicus quidam, sed Empiricus in omnibus fero morbis, etiam calidis & febricitantibus, male dabat: & nunquam fere laxans pharmacum propinabat, quin aliquid & huius laxativi stomachici admisceretur. Præceptor meus Bononiæ, Elideus, medicus egregius, hoc sequenti in simili causa utebatur: ℞. electuarij de dactylis 3 ss. philonis Romani 3 j. cum aqua chamæmille, fiebat potio brevis. In summo dolore dabat aliquando 3 j. philonis, prout particularia suadebant. Vide & hoc sequens: nam commodè ab ipso quoque adhibebitur aliquando fuit: ℞. elect. de dactylis 3 vj. philonis Romani 3 j. cum 3 iij. aquæ florum chamæmille. At mulieri Brabantinæ, Alcmariæ, 60. duorum annorum, simili dolore correptæ cum tabula post purgationem ex elect. de dactylis ad ventositatem & pituitam stomachi infartam & suspensionem hypochondriorum exhibitæ essent, & non inuarent neque linimenta apta, neque ventosæ sicæ applicatæ ventriculo (seu potius inter umbilicum & stomachum) solo hoc foru tandem dolor sedatus est: qui ita habebat: Recipe rad. alibæ 3 ss. flor. ros. rub. flor. chamæmille, summitat. absinthij ana m. j. coquantur in aqua chamæmille, & aqua communi q. suf. pro lb i ss. in sine addendo vini Rhenensis optimi, aquæ ros. & aceti ana parum, & fiat solus, quo omnis dolor cessavit. Adeo illud medicamentum approbravit, ac diuinum appellabat, ut memorie scriberem, ut alios simili malo laborantes à dolore curarem. Ita quoque Margareta Cornelij Ioannis illius viri consularis filia, mense Novembri, Anno 1571. cum in dolorem stomachi intolerabilem incidisset, post purgationem vniuersalem adhibitam, hoc sequenti foru ab omni dolore incantamenti instar fuit liberata: Recipe absinth. communi 3 ss. & Roman. flor. chamæmille ros. rub. mentha. omnium exsecat. ana m. j. sem. sumach. myrtill. ana 3 ss. flor. meliloti p. j. coquantur in aqua communi pro lb i ss. colat. adde spec. diavod. abb. 3 ii ss. specier. arom. ros. 3 j. aquæ ros. 3 ij. aceti ros. 3 i ss. iterum senel ebulliant: & fiat solus pro ventriculo.

SCHOLIA.

Frigidam vero causam flatibus quidam haud imperite iungunt: nam vehementer dolores, tensiones eorum excitantur, Materia vero

flatuum pituita est. Ita in duabus istis mulieribus aderat pituitosus humor crudus, flatuosus, hypochondrium non minus quam ventriculum extendens. Est quoque pituita hæc crassior; unde turbidus vapor, multusque eleuetur, idque à tepido calore. Sic 12. meth. medend. Galenus cap. 8. ait: gravissimos à retentis flatibus dolores fieri: retentur obstruptione vel densitate loci, in quo cohibentur, & transpirare nequeant: alias si soli humores sint crassi & viscosi, non fit dolor vehementis. Gignuntur vero flatus, cum calefunt humores crassi & glutinosi: sic enim in flatu crassumque vaporem vertuntur. Neque enim necesse est exhalationem semper illam siccam esse & terrestrem, quam in meteorologicis materiam flatus dixit Aristoteles: sed sat est spirituosam & tenuem esse substantiam, præ ea, ex qua gignebatur. Agens vero est calor: locus autem (ut quidam volunt) in quo flatus includuntur, ventriculi tunica sunt. Nam si in medio spatio aceretur, facile vacuatur, ex ea vero parte diffillit, & longo tempore, ac non nisi vehementer extenuatus, & dissolutus: quod cum non nisi calidis fiat, metus est, ne rursus plus, eorum visum, flatu eleuetur, quam solatur. Facit ad difficultatem cura, quod non sicut in acrimore, tuto sopientibus vi possumus, quæ & dolori profunt, & causa humorum sua frigiditate temperant: at hic causam augent, cum rebellem discutiunt crassum spiritum faciunt, & tunicas densant, per quas debet excerni. Hæc fere Galenus de flatuoso dolore loco iam dicto. At 14. meth. cap. 7. fieri flatus ait, vel cum calor debilis est, vel cum humidum crudum, crassum & glutinosum humorem contineat. Unde excrementum, quod natura excrevit insensibili transpiratione consueverat, iam non transpirat: præsertim si densa sit pars, in qua continetur. Quin subdit, Calor quoque auctor hoc facere potest; dum tamen tantus non sit, ut digere possit. Idem etiam 5. Aphorism. ultimo: Est flatus vel imbecillitate caloris, vel ex crassitie humoris, ut hic fiebat. Ex quo patet, non esse temere admittendum, quod quidam sine discrimine dicunt, tepida esse, quæ flatus gignunt. Nam à valido calore ibi fieri aliquando ait, materiam ratione; & frigidis curat. Præterea id asserit lib. 12. cum multo melius curavi colicos, ait, sine calidis fomentis: quoniam ab illis sæpe augetur dolor, aucta doloris causa, ex 6. De locis affectis. Dolores à flatibus fiunt, vel cum frigidus crassusque humor acernatus est in corpore crasso, & densogenitus, qui egredi nequeat, vel à flatuoso spiritu: has inquit causas esse probabiles. Retinetur crassitie, & densitate corporum: & humores tum alterare, tum tendere partem possunt, ut spiritus tendere. Quod vero imaginantur quidam, calorem plurimum extraneum facere flatum, cum naturalem minuit, fabulam esse putat Iacchinus, vir doctissimus. Quicunque enim calor vigeat, flatus tollit; nisi, ut diximus, qualitatis materiam ratione etiam multos flatus faciat. Unde neque in febribus ventibus fiunt, neque in autiginosis, inquit Aphorism. Quod si in pravis febribus appareat inflatus venter, id venit, quoniam non sunt calore vehementes, & cum multa cruditate humorum. Materia vero aggregatur tum ciborum ratione, qui crassi natura sint & viscosi; tum ex multitudine & crebra cruditate: & in summa ex omnibus causis, quæ pituitam gignere possunt. Quæ vero calorem debilitant, vel spiritus resoluendo, vel per se refrigerando, ut frigidi potus, aut frigida vina, dolorem faciunt, ut fieri frequenter videmus. Imo post frigida potum doloribus ventris quidam periclitantur; quibus scilicet id viscus natura erat imbecillum, & aderant materiæ, à quibus flatus gigni poterant, in ipso ventris corpore aggregatæ. Sic dolor ab externo frigore excitatur: præcipue si extrema patiuntur: quæ sunt partes nervosæ & frigida, & exsangues; à quibus facile frigus pervenit ad ventrem. Auget etiam frigus dolores: quoniam densat tunicas adeo, ut non transpirat, quod in eis continetur: hinc magis dolor excitatur, cum flatus exitum non inuenit. Et quia una cum pituita flatus aderat, tensio sentiebatur ut dirumpi putarent tunicas ventriculi: & etiam nos tensionem sensu seu tactu percipimus, quæ etiam super abdominis musculos sentiebatur. Sed de ventriculi inflatione postea latius. Sed hic etiam aderat simul, ob materiam frigidam, gravitas ventris, sine siti atque ardore: & sentiebatur in stomacho quadam frigiditas. Nunc aliud exemplum adferamus.

OBSERVATIO XXIII.

De dolore stomachi, ex pituitoso humore ac tensione.

PVella admodum pituitosa, tempore hyemali; paupercula, cibo crudo utens, lacte, & aliis cibis pituitosis, incidit in dolorem ventriculi vehementiorem, cui aderat distentio quadam. Simul sentiebat magnam ventriculi gravitatem, propter quam spirandi difficultas accidebat, ventriculo distento septum transversum comprimentem. Non sitiebat, neque aderat ardor aut calor: cibis quoque ad infimas partes ventris descendibus levabatur nonnihil: & flatibus sine ru-tibus emissis, vel per alium exclusis, & calicis iuvabatur: ita ut facile intellexerim, ex pituita flatulenta, hunc dolorem originem cepisse, qui & summo studio statim anodynus placandus erat, ob os ventriculi exacto sensu tactus præditum. Ideo statim hunc fotum præscripsi: ℞. flor. chamæmelle, meliloti ana m. j. absinthij, flor. ros. rub. summitatum anethi ana man. 6. seminis lini, fenugreci ana 3 ss. seminis anisi, carui, feniculi, ana 3 ij. coquantur in aqua communi q. s. pro lb ij. in qua calida mactetur spongia: quæ deinde expressa ventriculo admoveatur; eaque foueat: & deinde oleo subsequenti inungatur: ℞. olei chamæmelle, anethi, li. lior. ana 3 ss. bis commissis fiat inunctio. Quibus aliquo modo sedebatur dolor, gravitate adhuc permanente. Ideo & has pilulas deglutendas præbuimus: ℞. pilul. de biera simpl. mastichinarum, trochisc. agarici ana 3 j. cum aqua absinthij: fiant pilule xliij. tempore matutino dentur. Quibus optime alium deponebat. Verum cum adhuc materia tenacius ventriculi tunicis inhaereret, & dolor in totum non cessaret, licet nunc non ita vehemens esset; post decoctum absinthij, florum chamæmille, seminis feniculi & anisi in aqua decoct. addito oxymeli. simpl. & compos. hanc purgationem exhibui, cum satis robusta esset: ℞. diaphanici 3 ss. aquæ florum chamæmille 3 iij. misce, & sexies multa pituitosa excrevit, etiam ventositatibus emissis. Et dolor ita mitigatus est, ut vix de eo amplius conqueretur. Tunc ventriculum roboravimus intus sumptis tabulis sequentibus, seu rotulis: Recipe specierum aromatatum rosarum sine musco; specierum diacymini ana 3 j. dissolutis in aqua absinthij, & florum chamæmille, adiectis 3 iij. sacchari albisim. fiant rotule ponderantes 3 iij. vel 3 ss. & capiat ante primum iij. horis vnam. Præterea iussi, ut hunc pulverem in officina pararet: Recipe coriandri præparati 3 iij. anisi,

anisi, cinnamomi selecti, feniculi, carni ana ʒ ij. mace-
ris ʒ j. sacchari ad pondus omnium, fiat pulvis, cuius
detur ʒ j. vel plus in sine passus: & præcepi ut eo
sumpto nihil biberet, neque amplius ederet. Ex-
trinsecus vnguento sequenti ventriculum com-
mode inunximus: ʒ. olei absinthij ʒ ss. olei nardini,
mastichini, cotoneor. ana ʒ ij. caryophyl. mentha sicca,
cardamomi coralli rub. mastichis, flor. ros. rub. ana ʒ j.
cera exiguum, fiat vnguent. quo ventriculi regio
inungatur mane & vespere ante pastum: & po-
stea applicetur ceratum Galeni stomachicum, ad
scuti formam. Quibus præditiis ab omni dolore
liberata fuit.

SCHOLIA.

4 Signa. **S**igna doloris stomachi diligenter perscrutan-
da, antequam ad curationem accedamus. Si
fiat ex nuda intemperie, iam diximus signa, cum
de imbecillitate stomachi ageremus. Et si cum
materia, etiam ex parte signa declarauimus: qui-
bus hæc adiungere poterimus. Si igitur à causa
materiali frigida, grauitas ventris aderit, ut iam
diximus, sine sui ardoreque & in stomacho frigus
sentitur, calidis iuuatur: quibus si ætas, tempera-
mentum, anni tempus & constitutio, victusque
ratio præterita respondeant, plurimum ad causæ
inuestigationem facient. Ex pituita falsa, in ore
salitudo molesta est, non sine sibi valida. Ex
phlegmate acetoso vel melancholico humore (ut
melancholice, sepe iam dictum est) rosiones aderunt stomachi si-
ne æstuatione: aut vomitus acres acetosi melan-
cholicam demonstrant, quibus dolor sedatur, &
lien tumet, tum difficilis malaque concoctio in
ventre fieri solet, quod & ex phlegmate contin-
git. A causa calida materiali, quæ hominem su-
pra modum inquietat, punctiones, intercisiones,
morsus sicutque ac oris siccitas, vel amaritudo,
stomachi ardor æstiuans, & febris interdum sen-
titur, ac pulsus, ut initio febris, coarctatus; tum
vomitus: alius biliosus est. At stomachi instabi-
les rosiones à jecore materiam effundi, indicium
sunt: inde pulsus ad interiora remittitur, ac ex-
trema frigescunt, animusque linquit. **Quæ præte-
rea** (inquit Galenus) ægum iuuare solent, humoris
naturam denunciant: dolor à materia calida (ut
tradit Hippocrates.) hordeacea pulte sedatur. Ita in
frigida, castoreo cum aceto scillite. Si doloris
origo ex imo ventre oritur, nihilominus cibi de-
siderium aderit, illæso stomachi ostio: verum sin-
gultus ac erisiones molestæ erunt. At humoris
crassitudo, quo crassior est, eo maiorem affert do-
lorem atque tormentum, cum ventris grauitate;
vnde pulsus inæqualior fit, & fomentibus ægris
pulsus ad temperamentum redit. Periodicos do-
lores patiuntur, cum plurimum melancholici, &
qui præcordiorum dolores sustinent. Ex vento,
adest flatus crepitusque ventris frequens ac sin-
gultus: tum nec in eodem loco figitur dolor: qui
tamen veluti clauus infixus hæret. Et cutim ex-
tendit: tum ad motum cucurbitulæ profunt. In iis
tormentis extrema si frigescent, ut Hippoc. scribit,
malum augurium faciunt, si perseverant instan-
ter; si vero insuperabiles pustulæ ortæ fuerint nig-
ræ, ac protinus exulcerentur, lethales sunt: le-
thalis est & grauior somnus, sique præterea dex-
ter pes vesicam extulerit, exitialis habetur: ma-
gisque si æger dulcia adamauerit. Verum gestan-
tibus peculiare malum est. Dolor quoque qui ex
homine fuerit inter tunicas cohibito, ægrius cu-

ratur. Dolor stomachi à causa externa vel primi-
tiua, minus malus: cum facile remoueri possit,
excepto illo, qui à medicamento ventoso aut cor-
rodente, vel veneno fiat, vel gladij percussione:
tales difficulter tolluntur, ubi etiam illi magis
mali, qui ex causa corporea oriuntur: minusque
malus ex vna causa, quam ex multis simul con-
plicatis, etenim si ex mordicatione febris epheme-
ra, vel alia subsequatur perdurans aut continua.
At dolores stomachi ex apostemate vel vlcere vis-
vel nunquam curantur, nisi nacti fuerint diligen-
tem & expertum medicum. Omnis dolor rodens,
acutus, aut diu perseverans, deducit ad syncopen,
imo ad mortem, teste Gal. 5. De loc. affect. cap. 6. cum
ex eo narrat subsequutum spasmodum aut epilepsiam.
Ita hisce diebus cum puer icturnus esset, ac radi-
cem angelicæ sylvestris comedisset, ingenti dolo-
re stomachi correptus, mox epilepticus concidit,
corpore toto, ac manibus simul conuulsis ad
quinque horas: qui tandem difficulter à me cu-
ratus fuit. Erat puer quinque annorum, alioqui
valde agilis. Prægnantes facile stomachi dolore
quoque apprehenduntur, ob menses restrictos;
& facile tunc animo linoquent, ut matri meæ cha-
rissimæ Margarete Nannæ, ex Baiatorum fami-
lia, contingere solebat: sed talis momento in os
indito, mox reuiuisebat; ut antea quoque dictum
est lib. 17. nostrarum obseruat.

OBSERVATIO XXIV.

De dolore stomachi à rebus calidis assumptis.

Mercator ille, qui in foro Delphensi habita-
bat, pro cuius ædibus Rex inter signum erat,
tormina in ventre & circa utraque hypochondria
cum pateretur, cibis plusquam dimidiam pin-
tam vini Romani vulgo dicti, cum ʒ ij. pulueris
granorum paradisi: nam hic aromatarius erat, sed
eo vino ebibito incidit in ventriculi dolorem,
tum ventris crudelissimum & atrocissimum: ita
ut præ angustia & rumpi & suffocari videretur:
neque euomere neque secessum habere potuit.
Vociferabatur, se ignem in stomacho habere. Ad-
hunc eodem die accitus 20. April. die, anno 1563.
ac eadem hora, qua mori putaretur, statim dedi
ʒ iij. vel plures decoct. hordei, in qua ʒ j. feminis an-
thi incocta erat, adiecta ʒ j. syr. ex infus. ros. Eaque
porione tepide sumpta, vinum euomit, & libe-
rius anhelitum trahere potuit: & à vomitu paulo
melius habere cepit; & incidit in somnum. Post
somnum, quamuis minus doleret, circa præcor-
dia grauitas quedam remanebat cum dolore: &
cum alium non redderet, paulo plus quam dimi-
dium porionis sequentis propinaui: ʒ. fol. senæ
ʒ vj. femin. anisi ʒ ss. rhab. selecti ʒ iij. schenanthi
ʒ ss. ebulliant in ʒ ix. decoct. communis, & fortiss. ex-
press. adde oxyacch. simpl. ʒ j. syr. infus. ros. ʒ ss.
misce pro duabus dosibus: vna assumpta quinquies
alium deposuit, & à dicto symptomate in totum
liberatus est: ita ut alteram dosim non sumperit.
Potus huic erat prisana hordeacea, eo quod seu-
breum timerem. Sed ea non superuenire, optime
deinde habuit.

SCHOLIA.

Cardamomum (quod vulgo granum paradisi
dicitur) ultra tertium gradum calidum & sic-
cum est, vel saltem in tertio gradu. Habet enim
vim

vim valde excafactoriam. Dioscor. potum ex aqua
ad comitales, ischiadicos, iussus, nervorum resolutiones,
rupta, vulsa, tormina, latus ventris vineas valere,
scribit; & ex vino potum venibus, difficultati urinae,
& scorpione ictu, auxilio esse. Verum hic aromatarius
cum in substantia sumpsisset, præter iustam do-
sim, plurimum obfuit, & pene hominem neca-
uit: quamuis eidem alias (ut narrabat) ad fini-
lem dolorem in minori quantitate sumptum pro-
fuerat: nunc autem plurimum, & ad internecio-
nem fere læsit. Cæterum dolor stomachi cum ex
variis causis fiat (ut diximus) vario modo quo-
que curatur. Si enim ob intemperiem calidam,
vel frigidam doleat, eodem modo curatur in-
temperies rebus contrariis & alterantibus. Sic &
dolor ex vento frigido, aut aqua gelida aut epota,
contrariis remediis sanatur. Stomachus enim pa-
ne calido sæpe fouendus est, aut lasceris assere ca-
lesfacto, aut cupressino, aut piceo: alij feruente
cinere vtuntur in sacculo. In potu vero betonica
farina cum vino efficaciter sumitur, si sine febris
fuerit; alioqui cum calida aqua datur. At hic ob
cardamomum sumptum, aqua hordei, & eius
cremor conueniebat: inuabat & vomitus, quia
calore & copia ventriculum extendebat: ita &
tormina ac rosiones ex malo cathartico, vomiti-
onibus iuuantur, clysteribusque; ita & ex cibis
patiter acutis fieri debet, pinguique cum insipi-
dis dari iubent. Ex malo medicamento, venen-
nato, erodente, æger vomere debet, atque pro-
veneni ratione remedia communia ac particu-
laria ex libris venenatorum querenda sunt: sicuti
& veneficiorum auxilia ex iisdem libris haberi
debent. Vbi dolor vehementissimus est, & sus-
picio sit de aliqua materia venenosa aut medica-
mento venenoso assumpto, theriacam recentem
dare potest. Si ex quavis causa primitiua vel ex-
trinseca venerit, ea ipsa tollenda. Et si ex intem-
perie nuda, siue calida, siue frigida, curetur, ut
de imbecillitate ventriculi prius dictum est. Si
dolor sit à materia frigida, huius curationis
exemplum posuimus. Hic in cibis, porionibus,
styptica vitanda tradit Galenus, ante stomachi
exinanitionem, si pituita nimium redundet. Nam
crassa, dura, sicca, terrestria sunt materia, (ad-
siplante Zoay) quæ dolorem stomachi inferunt.
His exiguis cibis ac potus offerendus, facilis
concoctionis, bonique alimenti, aluique utili-
ter exinanitur. Sed prius necessarius, modo in
ieiunio, modo post cibum vomitus, utilis exerci-
tatio, gestatio, nauigatio, frictioque. Nihil
edendum, aut bibendum nisi calidum, vitatis
tantum iis, quæ pituitam contrahere consue-
runt. Sed in iis considerandum est, an stomachi
duntaxat causa fiat, an alterius membri propin-
quitate fuerit? Primum igitur materia digerenda;
ac exinde purganda; ultimo stomachus om-
nino recreandus est. De vomitu vero, leuibus
conciandus est, aqua tepida cum acetoso syrupo
simplici, aut composito: si id fieri minime potest
alius commode mollienda est, nam alium tra-
here violenter, periculosum est, quandoquidem
materiam vndeque contrahit. Aquosa pituita
hydromelue ac syrupo acetoso simplici compositione apte
præparatur, vel mentha syrupo: ad viscosum phleg-
ma oxymelie compos. vel scillitico; vel si ex jecore
fluxerit materia, vel venis. At quamquam dolori
ventriculi à causa frigida calidis medicamentis
succurratur; tamen si hepar calidum est, venen-
dum, ne dum vni mederis, alteri noceas; & ca-
Pet. Forest. Tom. 2.

lidis medicamentis ventriculum iuuans, hepatis
caliditatem augeas. Mitigetur itaque dolor ano-
dynis supra descriptis: cauendum tamen ne he-
patis regio fomentis illis vel vnguentis tanga-
tur. Mitigato dolore, pilulæ exhibendæ ex hiera,
adiecto rhabarb. Si à cerebro vero, stachadis syr. di-
geratur. Digesta materia aquosa, deiciatur cum
aloë lota. At quod in tunicis ventris impactum
est, hiera quoque perpurgetur: vel si valde vis-
cosum, hieris maioribus. Deinde stomachum, ut
prius, tam sumptis quam admotis roborabimus:
ut speciebus arom. ros. & similibus, & cerata sto-
machica, emplastra, linimenta apponemus; &
inungemus: vel sacculos iam sæpe dictos adhibe-
bimus: quorum copiam vide apud auctores &
præcipue apud Arculanum, vel Benedictum Ve-
ronensem, qui ea magis Latina in vsum suum
translulit. Si à bile dolor stomachi; rosionibus
æstuat: solent autem, qui tentantur stomachici,
interpositis quibusdam diebus, hunc humorem
euomere. Sed qui perseverat dolor perniciosus
est, & interdum hominem necat. Iis recte alius
ducitur, poriones absinthij dantur: & si calida
sit materia, in continuato dolore potiones ex vio-
lacco & rosaceo, syr. nymphææ, & papauerinus,
ex albo semine, ac calyce. Si autem bilis ventri-
culo innatet, vomitu euacuanda aqua tepida ʒ vj.
syr. acetis, ʒ i ss. misce, & post cibum bibantur,
digito inde aliquanto in os post & fauces immis-
so, aut penna vomitus eliciatur. Si vero ægrotus
suapte natura non facile vomat, euacuetur sum-
pta potione sequenti: ʒ. syr. ros. laxatiui ʒ i ss.
rhabarb. puluerisati ʒ j. cum aqua cicchorij & absinthij,
fiat potio, quæ hora quarta matutina sumatur. Si
vero bilis ab hepate in ventriculum per interual-
la transmitti videatur, hoc electuario vtetur: ʒ.
diacydonij sine spec. ʒ j. conseru. ros. acetosa ana ʒ ss.
pul. elect. trium santal. diacyd. abb. ana ʒ ij. ss. cum sy-
rup. ex ros. siccis, fiat electuarium molle: capiat ʒ ss. vi-
bus horis ante pastum. Extrinsecus malua iuuat ex oleo
rosarum vel violarum addita santalorum farina, &
inungatur oleo myrteo, & cotoneorum. Experimento
valet ventris gallinacei interior membrana are-
facta in farinam, ob eam causam, tunditur & da-
tur. Quibus præditiis si non cedat dolor, sopori-
fera non sine metu danda sunt. Si dolor sit ex atra
bile, iis necessaria gestatio, nauigatio, si longus
morbus est, ac diebus interpositis accedat: & si
fieri possit, ex nausea vomitus. Vitanda cruditas
est, sumendi cibi faciles & stomacho non alieni,
vinumque austerum bibendum, interea humor
digerendus cum siliquis senæ, polypodio, & aliis
melancholiam digerentibus; & venter repurgan-
dus pilulis ex hiera & indis. Deinde roborandus
stomachus. Et si ex liene veniat, eius ratio quo-
que habenda, ut prius dictum est. Reliqua vide
apud auctores.

ANIMADVERSIO.

IN Scholio observationis huius, Lector beni-
gne, diximus Cardamomum à vulgaribus quod-
dam granum paradisi vocatum fuisse. Sciendum
tamen, quod granum paradisi sit semen diuer-
sum à cardamomo vero, quamuis pro cardamo-
mo maiori quis accipere posset, cum videantur
eiusdem fere esse virtutis. Cæterum granum pa-
radisi, vulgari nostra lingua Greya appellatum,
ab Arabibus vero Mellegeta, aut Millegitta
dictum, à semine crebro, pharmacopœis tum
Cc iij medicis

medicis satis notum, & in officinis etiam nunc ab Aromatariis frequenter venditur, & nostri quoque hoc semine in puluerem redacto aliquando cibos suos condiunt: ita ut non opus sit eius loco cardamomum sumere, cum & frequentissimum sit, & hodie magna copia ad nos aduchatur. Verum quod ad cardamomum attinet, quatuor eius species nunc in officina habentur, maius (inquam, minus, medium, ac minimum. At minus pro vero habetur ac sumitur. Quamobrem cum mentio sit in aliquibus confectionibus aromaticis de cardamomo, intelligunt cardamomum minus. Et ideo cum simpliciter cardamomum scribunt auctores, cardamomum maius, ut vsuale, accipiunt. Plura de his si desideres, vide Matthiam Lobel, in aduersariis fruticum, subfruticum, cremorum & arborum, pag. 445. & in obseruationibus stirpium, pag. 616. & commentar. Andr. Matthioli in lib. 1. Dioscor. c. 5. de cardamomo eiusque consideratione.

OBSERVATIO XXV.

De dolore ventriculi & pylori, per modum consultationis.

1. **R**egnerus insignis Iurisperitus & Aduocatus, quondam Pensionarius Amstelrodamensis, consilium a me petiit, de dolore ventriculi fundum occupante, paulo supra umbilicum, diuturno & per intervalla recurrente. Cui haec scripsi: Ut à dolore illo paulo supra umbilicum, vir doctissime, liberari possis, quamvis medicorum illustrium multis remedijs vsus fueris, radicem huius mali omnium primo inuestigare oportet. Dolor hic ex ventriculi fundo, ob repletionem & obstructionem, nascens, vno tamen tempore subinde magis affligens, quamvis raro omnino à dolore videaris plane liberatus; oriri quoque videtur etiam ab exortu intestinorum, quem ex pyloro intestinum recipit. Quidam tamen hunc non prius vocare intestinum dignantur, quam in oves anfractusque circumuoluatur: atque ideo alij simpliciter productionem, alij cum appendice duodenum digitorum, Graeci *ἡ δώδεκα δακτύλων* appellant. Cum autem hic dolor saepe sua intervalla habeat, longinquae protrahatur, locum affectum & causam diligentius indagare oportet: antequam curationem moliamur. Locus affectus, iuxta circumscriptionem doloris, videtur esse in locum dictum. Est in his locis quaedam obstructio seu impedimentum, quae etiam ob imbecillitatem locorum dictorum facile redit; cum loci dicti iam longo tempore affecti facile recipiunt, non tantum novum humorem, verum etiam sua imbecillitate eundem, nempe pituitosum, gignunt vel fouent: qui cum crassior existit, diutius ibidem moratur, ac difficilius soluitur: unde malum diutius quoque protrahitur; cuius causa etiam concoctio impeditur, quae sit in ventriculi fundo: & sic ventriculus crudum humorem quoque dimittit ad pylorum. Atque huius consequitio, videlicet ex illa materia pituitosa, etiam ventositates crassiores & tenaciores, loca affecta extendunt, usque ad umbilicum fere, & maiorem dolorem inferunt. Verisimile est ac concludimus, quod sit pituita inhaerens fundo ventriculi; deinde quoque adhaerens & pyloro & intestino iam dicto. Nam superuacua quidem pituita in cerebro, in ventriculo, & in intestinis gigni consuevit: sed in cerebro tenuis & aquosa: in his vero crassa & atque lenta: haec enim peculiaris est ventriculi & intestinorum excrementum, non sex aliorum; quippe quae ceteris excrementum est commune: etenim cum illorum substantia frigida sit atque membranosa, crassum certe ac viscosum de se excrementum pro-

feret; quale est pituita lenta. Haec igitur secundum naturam gignitur concretisque in intestinis: de quibus cernitur alias sponte fecibus circumiecta descendere, alias purgatione vel clystere manifeste deduci, alias dysenteriae vi corradis. Quum autem parius ea vacuatur sensim anxia caloris vi, in vasis tandem crassecit, ut prorsus obstruens intestina quasi infarciat, fiatque latentium difficiliumque morborum causa. Talem pituitam crassam ego in fundo stomachi, tum intestino iam dicto collectam & adnatam esse existimo, magis tamen vno tempore, quam alio: ex qua etiam status gignuntur: unde etiam tenso sentitur. Sed cum fomentum causam magis habeat ob pituitam inclusam crassamque; ideo haec ipsa remedia aptis detergenda & purganda erunt: deinde loca ipsa affecta roboranda quoque erunt, ne eadem gignant vel foueant, recipiant, colligantque. In curatione itaque, (ut in omni stomachi oppilatione) damnum astringentia, & quicquid crassum humorem generat; sed potius attenuantia, aperientia, simul detergentia & incidentia, ob pituitam crassam. Erit itaque vtile oxymel simplex, etiam compositum & scyllinum, & pilula ex hiera. Quare cum hunc vitum inuideremus in Hagha Comitibus agentem, & apozemata incidentia & detergentia, & simul pituitam expurgantia praescripsissemus, melius habere cepit. Egrege profuit post pituitam crassam purgatam, vinum absinthites, & ceruisia absinthites; etiam stomacho exterius postea corroborato.

SCHOLIA.

Dolore urgente, quoad possumus, cibo & potu abstinemus; quoniam concoctio bona esse nequit. Postea dabimus cibos tenues, & qui vim extenuandi habeant: eritque exiguo potu contentus aeger, & meracior; vitabitque frigus in toto corpore, sed extremis praesertim: & cum materia adhuc absit vna cum dolore & flatu propter obstructionem; licet fomenta (de quib. paulo ante diximus) dolorem sedent & insensibiliter vacuent, nequaquam iis vtetur in hoc casu; quoniam affectum magis proritant, ubi adsit talis oppilatio & materia infixa est, vomitu non educemus, cum illud adeo crassum sit, ut educi non possit, nisi prius extenuatum fuerit, & via aperta. Transiunt vero inter lienem & stomachum, si ibi adsit oppilatio, iis parare debemus: de qua agemus, cum de ictericis atris loquemur; & de iis, quae ad lienis tumores faciunt. Bilis autem atra repurganda, ac ne eadem regeretur, victus rationem emendabimus. Si via quoque inter stomachum ac bilis folliculum, ex morbi regij curatione, praecclusa fuerit, remedia perquiremus, si cuti ad intestina, ubi praecclusus transitus est, ab iliis & colicis doloribus. Ita & iis vtetur, quae vias inter iecur & stomachum, vel mesentericarum poros aperiunt; humores incidendo, si crassi sint, & detergendo & repurgando. Durescit & interdum stomachus sine abscessu vitio: unde aegre in coquendo rogas contrahit, maleque digestit. Ex frigore oritur, aut materia frigida in tunicularum meatibus combibita, atque in altera earum infixa. Verum interior magis officit, apoplemati quam simillima duro: in eo tactus durus est, difficulterque inclinatur aeger: nam in poris tenuibus malum insitum est: tum demum styptica dissoluentibus vtendum: & in duritia sine abscessu has potiones vtiliter damus, ex mentha, calamintha, & absinthio, & catapota, ex hiera cum agarico: & emplastrum vtiliter imposuimus

ex mastiche, croco, meliloto, spica, bdellio, cera, & oleo lini, vel oleo ex violis luteis. At de dolore ex abscessu calido, vel frigido, & ob stomachi vomitam, postea latius.

OBSERVATIO XXVI.

De dolore stomachi ex casu abortio.

Quidam Sacerdos (cui nomen erat Cetrarius Bacherus) Almaria in via Regia dicta habitans, cum anno 1546. à scala cecidisset, cubiti radium fregit: quem chirurgus tractabat. Huic autem post octo dies superuenit stomachi dolor vehementior, & totum pectus occupans. Lotium huic crudum erat; non febricitabat. Ideo huic syrupum propinavi. *℞. oxymelis simpliciis 3 j. b. aquae hyssopi, foniculi, scabiosae ana 3 j. misce: & cum aluum non deponeret, ita eundem purgavi: ℞. diacubolici 3 vj. castorei recens extracti 3 ij. mummie 3 j. b. dissol. 3 iij. decoct. pectoral. addendo sp. capill. reuer. 3 j. misce. Et sexties aluum deposuit, & dolor magna ex parte cessauit. Et sequenti die, cum adhuc aluum deponeret, cyathum vnum ioris puli dedi. Cum adhuc exiguus dolor in stomacho permaneret cum appetitus deiectione, hoc vnguentum inuncto dolor cessauit: & ventriculo corroborato appetitus rediit. *℞. olei mastichini 3 j. olei absinthij, menthae ana 3 ij. flor. ros. rub. pulueris alborum, corallorum granat. coralli rubri, cinnamomi, mastice ana 3 j. & exiguum. Fiat vnguentum. Quibus praesidiis à dolore fuit in totum liberatus.**

SCHOLIA.

Hic dolor licet post octo dies à casu prius aegrum affligebat, non est dubitandum, quin aliquo modo cadens à scala stomachum laeserit, & si nos in principio fuisset acciti, ea de causa sanguinem detraxissemus: sed quia lotium nunc crudum erat, & aluus resistebat, haec purgatio satis ad rem fecit. Quomodo cumque stomachus laedatur siue casu; siue offensione, siue percussione, vel ictu: periculosum est. Nam refert Alexander Benedictus Veronensis, lib. 11. cap. 9. ex ictu, propter membri nobilitatem permultos praeterisse mortuos. Nonimus, inquit Beniuenius libro suo de abditis causis morborum capit. 115. fullonem quendam nomine Petrum, qui vnicuique pugno stomacho cuiusdam iuuenis violentius impetito, hominem interemisse. Ceterum in eiusmodi casu inedia aeger continendus est, ac protinus sanguis demendus est ex iecoraria vena, modo vires serant: in cibo prisana vel alica danda est sine vino: aluus singulis diebus mollienda est ac materia extrema auertenda est. Alij suadent leniter astringentia dari in cibo & potu. Et quandoque ex eo ictu sanguis erumpit: prodest rhabarb. cum vino styptico vel rubrica lemnia, emplastro imposito ex farina hordeacea; scilicet 3 iij. ladanij 3 b. ros. 3 iij. doct. 3 vj. cum succo plantaginis & oleo lini. Si sanguis coagulatus sit, curetur vt iam alias dictum est. Interea quoque sciendum, quod stomachus interdum vulneratur, aut compungitur, aut mordaci humore exulceratur: vel sciunditur: sed incaute acicula acuta deuorata, vel acu vel vitto: quandoque perforatur & vento: vt prius diximus, aliquando doctus inclusio, magno distenditur cruciatur. Vidimus (inquit Alexander Benedictus Veronensis lib. 11. cap. 7.) mulieres duas, quae acus pariter crinales vitri frustra, capillosque (vt nos quoque vidimus.) vomita reiecerunt: quarum altera, vt refert idem Benedictus, exanimata interiit,

altera tres ingentes cauda caninae arefactos nodos euomit, qua ratione, aut quomodo prius ea hauserint veneficia, in dubio est. Sic nos quoque vidimus pannum, clauos, ferramenta, & nescio quae vomitu non reiecta. Sic etiam Beniuenius. De abditis morborum causis scribit capite 20. Mulierem quandam, aeneam acum deuorasse, quae nulla inde noxa percepta, integrum annum, ita vt erat sana, permansit. Quo peracto cepit dolor facis acutus mulierem ipsam circa ventriculum vigere. Cum remedia à diuersis medicis nihil proficerent, & sic annis iam decem tali dolore, miseram vitam traheret, ecce acus illa terebrato ventriculo, & paruo demissa foramine profluit. Quam acum Beniuenius vidit, & mulierem curauit, quae paucis post diebus, vnitae vulneris facta, in pristinam sanitatem restituta est. Accidit & huic, quod Ioannes Langius epistol. 40. lib. 2. refert, in gynaeo, ait, Ducis Iuliacensis, virgo dum sese exornaret, perterrita ingemiscens, acus quaque in ore mordicus tenebat, deglutivit, & per vrinam illa eadem reddidit. Idem Benedictus Veronensis refert de virgine veneta lib. 2. cap. 9. & causam huius reddit lib. 5. cap. 17. in suis Anatomicis libris. Ergo quoque vidi mulierem Delphensem, in insigni calcaris, ad quam accitus sum cum altero medico: quae cum in gutture doleret: Chirurgus incaute stylo immisso (vulgo probam vocant) ferro è manibus elapso in ventriculum: saepe dolore tenebatur, & paulatim macie consumpta, cum praesidia hic nihil iuuare possent, tandem obiit. Vti & iuuenis quoque Harlemonensis, qui cum squillas (vulgari nomine *garnaren* dictas) circa oceanum mare cum puellis luderet, deglutisset viuas, abortu dolore in ventriculo: hic quoque mortuus est. Ceterum illis qui ex veneficio acus & alia enormia reiciunt, tum crines, quidam genistae flores recentes aut arefactos in poru dedere, vt concitatis vomitionibus, omnia ex faucibus erumpant. Nos quoque vidimus puellam Delphis in ventriculo dolentem, per inferiora modo excrementa, picis instar nigra, vt saponem excreuisse, & lapillos & ossium frusta etiam per vomitum: quae longo tempore laborans, & macilentior facta, tandem etiam interiit. Ea vulnera aut alteram tunnicarum duntaxat laedunt, aut ambas lacerant. Latoria stomachi vulnera, quae pro Hippocratis sententia exitalia sunt, singultus & bilis vomitus sequitur, sanguisque per aluum interdum: & si quid cibi vel potionis assumptum est, ex patefacto vulnere redditur: venarum subinde pulsus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes exitaliter frigescent. Signa tunicae interioris laesa sunt, dolor vehemens, assumpto acetoso aliquo, vel acuto, vel salso: tum vomitus, aut excrementa sanguinea, tumet deinde venter, ac dolet, non sine febre. At si circa os stomachi punctura fuerit aut vulnus, ubi malum granatum est, in anteriori parte, ad decimum tertium spondylium vehemens dolor infigitur, vel magis aliquo acuto assumpto, tum anhelitus difficilior redditur, animus linqvit, sudore extremorum pergelido. At si vna ventris pars percussa fuerit, minus periculi facit: tum supra umbilicum dolor habetur: & aluus sanguinea reddit. At in medio si offenditur venter, inter utrumque augurium est. Leues stomachi ictus, Galeni verbis sanari possunt. Aeger primum temperato conclani: non in plano, sine vento, fumoque cellorandus est, animo securus, sine multo sermone, sed tacitus quiescat, vel resupinus dormiat. Cibus liquidus damnatur; quippe plurimus, ac difficilis concoctionis: laudatur stypticus, aridiusculae substantiae,

stantia, non multi alimenti, & ad septimum vsque diem à vini potione abstineat. Exactis septem diebus, stypticum nigrum extincti sapius chalybis aqua dilutum, prodest: quo nec nimium à siti vindicari debet, ante septimum: ex eadem aqua: cum syr. rosato; aut rhodo zaccharo vetere, vel cum syr. myrtino interdum bibat, & parcius: tum & vinum mali punici, saporis medij, modice bibat. Alius, iniecta glande oneranda est, aut clystere mollienda. Eo membro vulnerato, sanguinis protinus missio necessaria est, aut vtrius levis deiectionis, ex aloe loa: ac rhubarb. torrefacto, aut myrob. citrini. Vomitus hic damnatur. Aut si humore mordaciori contigerit malum, eundem matutinis potionibus preparabis, ac deinde cathartico perurgabis: deinde iis, quæ leuiter vulnera agglutinant, dabis: nec differendum est: mora enim difficiliora redduntur vulnera. Profundiora stypticis sanantur balsam. plantag. ros. & similibus. Agglutinantia styptica sunt, terra Lemnie, bolus Armen. ibus, mastix, tragac. aut emplastrum ex resinis secus impositum. Sed quia hæc ad chirurgiam pertinent, ex iis petenda, quæ & vulnera ventriculo extrinsecus inflata sanant.

OBSERVATIO XXVII.

De Stomachi dolore, à parte dorsi posteriore ad anteriorem transiente.

Iuuenis quidam Delphensis, Ioannes Vanderauus dictus, intensissimo dolore dorsi afficiebatur, è regione ipsius stomachi, tanquam pugione perforaretur, cum ingenti clamore. Dolor autem à parte posteriori incipiens in dorso, ad partem anteriorem stomachi transibat, cum maxima difficultate anheliatus: ita ut ex punctione vehementiore, tum dolore suffocari videretur. Ad hunc in nocte accitus sum: cum sine febre esset, cum pulsu æquali, licet parum veloci, & vtunque magno, minime tamen duro: & vrina tenuis, cruda, parumque subspecta spectaretur, nequaquam tincta decoct. flor. chamamill. 3 iij. & syr. ex infus. rosa. 3 j. exhibuimus, & quia tempus valde frigidum erat, inunximus tam partem posteriorem, quam anteriorem oleo anethino, & chamamelino. Mane cum rediissem, licet melius dormierat, dolor tamen nondum erat sedatus. Ideo hanc potionem sequentem propinaui. 2. folior. senæ 3 iij. seminis anisi 3 ss. bulliam in 3 v. decoct. pectus. d. & fortiss. express. adde electuarij lenis. syr. ex infus. rosa. 3 j. an. 3 ss. misce. qua ter quaterve ventrem deiecit: ac post excrementa deiecta, & rutibus emissis, illico hic dolor sedatus est.

SCHOLIA.

Dolor stomachi non semper in parte anteriore hæret: sed etiam è regione ventriculi dorsum fatigat: vt saepe vsu venit, cum dorso incubat: quemadmodum etiam euenisse Mariæ Comitissæ illustri, filia Domini Principis constat, cum de tali dolore & inappetentia apud me conquereretur. Valde etiam quidam, si dolor sit in parte anteriore, dorsum quoque inungunt, vel cataplasmata applicant: quod & nos frequenter cum magna utilitate fecimus. At alij cuidam, qui simili dolore afficiebatur, vomitorium medicamentum dedimus, & egregie cõtuli. Refert Amatus Cæsar. l. curat. 73. de ingenti ventriculi dolore: Venerabilis Abbas, inquit, cum grauissima ventriculi dolore infestaretur, vt alta voce exclamaret: post multa

adhibita remedia, vomitorium ex belleboro illi propinaui: quo alba quedam ororum albo similia eueniunt, & sanus illico factus est, veluti nobilis quidam Neapolitanus, qui cum simili dolore premeretur, post cibitiam integram libram aquæ florum Naraziorum tepidam, similia euomuit, & sanus factus fuit.

OBSERVATIO XXVIII.

De ventriculi dolore ab assumpto veneno.

In pago quodam non procul à ciuitate Pithurienti, in qua vrbe tunc praxin exercebam, iuuenis existens, cum ex Italia, ex Iacobi Syluij medici Regij commendatione Anno 1545. Pithueros accessisset: eo tempore tres comedierant ex vno pastillo, & veneno infecti sunt, atque omnes dolore intensissimo circa stomachum corripiebantur. Vnus autem ex iis lotium ad me misit, quod cum spectassem, tenuis substantia erat & viridis coloris: suspicionem veneni præbens. Nam vrina viridis, teste Auicenna l. b. 1. fen. 1. summa 2. doct. 3. c. de significatione vrine viridis. Spasmodum in pueris significat, aut venenum in potu sumptum: & si fuerit in ea hypostasis, spes erit vitæ: alioqui metum incurrit. Cum is, qui vrinam adferebat, rem gestam narraret, magis suspicionem agebat. Præscribo itaque vomitorium medicamentum, & vt simul pinguis deuoraret, quibus, vt postea intelleximus, statim ab omni dolore euasit, & curatus fuit. Alter vero, antequam consilium peteret, subito interiit. Tertius autem cum intellexerat priorem per me sanatum, tardius tamen & ille lotium ad me transmisit, in re tam seria ludens. Huic quoque vomitorium præscriptum est, ex decocto raphani & oxymelite, vel simili, & sumpta theriaca, & hic conualuit. Est enim theriaca commune remedium contra venenum sumptum: proprium antidotum præscribere non poteram, cum non scirem, cuius generis venenum esset. Quibus remediis consopito stomachi dolore: vterque curatus est.

SCHOLIA.

Veniebat eo tempore mihi in mentem historia illa, quæ anno 1538, mense Iulio Bononiæ contigerat: de tribus fratribus nobilibus & valde diuitibus, in vnis ædibus, cohabitantibus, & duobus uxorem & liberos habentibus. Quorum fratrum natu minimus, nescio quo odio aut si multate, vel hæreditatis desiderio impulsus, duos fratres, tum uxores ac liberos veneno perdere decreuit, & fere totam familiam perdidit, arsenico in vini cadum iniecto, ex quo bibebant ignari. Postquam longo tempore ex eo vino bibissent: ceperunt tandem veneni symptomata in ventriculo ac ventre & venis persentiscere. Quando & amicorum quidam ab iisdem conuiuio excepti deprompto ex eodem cado seu vase vinum liberius bibissent, statim & illi, vbi domum redeunt, dolorem & puncturam in ventriculo sentiebant: atque mordacitatem quandam & corrosionem & inextinguibilem sitim tandem senserunt, nam hæc plerumque sunt symptomata arsenici: est enim calidum & siccum, vt refert Auicenna cap. proprio. Horum vnus suborta veneni suspicionem, statim epoto oleo euomuit, & liberatus est: adiit tamen ad propinquos, eos de veneficio instigans. Hi se excusant, atque similiter iam dies aliquot se affligi

affligerentur. Exausis exploratisq; omnibus, denique in cado vinario arsenicum inueniunt, quod in fundo crustas effecerat. Comperta re statim medicis accersuntur. Cum iam malum in venas grassari cõpisset, & putredinem vnâ cum febre creauisset, Dominus Matthæus Curtius, medicorum in Italia tunc facile primus, consuluit ad reprimendam putredinem, intentionem exsiccandi habendam. Ergo balum Armen. cum zaccharo rosato, exhibuit item syr. de corticibus citri, acetosum, limones, arantiorum & granatorum succum, & id genus acidorum per se edere, tum cibis miscere iussit. Quod si inter initia, dum adhuc in ventriculo venenum hæretet, fuisset vocatus, humectantia & lubricantia conducere dicebat, ad expellendum vel vomitu, vel alui deiectione: perire ex isto veneno tres. Hispanus tamen medicus, qui adhuc meo tempore vivebat, cum Bononiæ agerem, quem & saepe in praxi comitabar, cum consilia haberentur, humectantia & instigantia intentione vtendum esse suadebat, & iis dabat, quibus in hoc casu succurebat, pharmacum ex agar. trochisc. 3 j. ss. rhubarb. tuncumden, diacastia 3 ss. elect. de succo rosar. 3 iij. sacchari 3 j. Hæc inueni robusto viro exhibitâ bene eduxerunt, & eundem febre probe liberarunt. Agaricum tamen in aqua nenapharis infudit, & eam expressam miscuit. At tormina quæ in intestinis manserant, clysteribus lubricantibus est vsus. De veneno pulcherrimus est locus apud Galen. de loc. affect. l. b. 6. cap. 5. vbi inter reliqua, ita inquit de veneno per os assumpto. Cum enim homo suapte natura probis humoribus abundans, ac sanorum more educatus, de repente moritur (vt lethali assumpto veneno fieri solet) deinde corpus aut liuens, aut nigricans, aut varium esse, aut diffusum conspicitur, aut præ marcore sedum, molestumque reddit odorem, tunc venenum sumpsisse aiunt. Memini ego puerum apud Delphenes, cum pulcem ex arsenico, qua glyres interficiuntur, incaute sumpsisset, solo vomitorio ex oleo & iusculo pulli venenum euomendo statim curatum fuisse. Solent in Italia in principio hausti veneni assidue lac bibere, cum oleo amygd. dulc. Et hoc quidem iam saepe expertum est Auicenna De cura acteritis in fine decerptum. Ego solo oleo amygd. dulc. epoto cum ceruissâ butyrea in multis vsus sum, quos caravi: de quibus suo loco dicemus cum de venenis agemus. Narrat Amatus cent. 2. curat. 65. de puero, qui epoto arsenico post annum prius obierit. At ego noui, qui multos annos superuixit: sed in magna miseria, cruribus resolutis, vt vix incedere possent: & mulierem post duos annos tandem vita orbatam. Ita & Religiosa quedam Delphis veneno infecta, longo tempore, sed misere, superuixit.

OBSERVATIO XXIX.

De ventriculi dolore ex obstructione hepatis, & vteri inflatione.

Elisabetha Guilelmi, 36. annos nata, vxor Ioannis Stopij, Alcmariæ anno 1551. dolore intolerabili ventriculi afficiebatur, & circa hypochondrion dolebat, partim ab hepatis obstructione, partim ab vteri inflatione, qui dolor admodum vehemens ab imo ventre vsque ad stomachum ascendebat, quæ eiusmodi doloribus alias obnoxia ex ventositate: quibus valde agebatur. Ad illam ingressus, libenter enema inieci: sed cum nullo modo admitteret, decocto sequenti bis in die utebatur: cum alius resisteret, 2. scilicet

biose, feniculi cum toto: viol. capill. ven. melisse flor. rum chamemilla, meliori, anam. j. cassubæ, agymonia (ob hepatis oppilationem) anam. B. rad. glycyrr. 3 ss. seminis anisi, carui, aneos, ana 3 j. seminis feniculi 3 ss. flor. cord. p. j. follicul. senæ 3 j. epythimi 3 iij. polypod. quer. 3 ss. prun. damas. num. xv. vuar. ab arill. repurg. 3 j. hordei mundati p. j. ininbar. sebesteni, an. num. v. coquantur in sero lactis, pro 3 j. ss. zaccharo dulcoretur colatura: in qua pendeat globulus sequens, exprimendus tum potio lumeretur. 2. rhubarb. selecti 3 j. (erat enim ipsa magna ex parte biliosa, quamuis nunc etiam pituita præcipue erat collecta) agarici trochisc. 3 ss. spica, schamamibi ana gr. m. vj. fiat nodulus. Alius vtcumque eo decocto soluebatur, dolor tamen non sedabatur. Locū igitur dolens inunximus vng. sequenti, prius fomento infrascripto vtentes. 2. vnguenti nostri pectus. d. althææ, olei chamemelini, anethini ana 3 ss. misce. 2. rad. althææ 3 ss. folior. malua, flor. chamemilla, meliori anam. j. artemisia, absinthij, cassubæ, anam. j. sem. lini, fenugr. malua, anisi, ana 3 j. sem. feniculi 3 j. coquantur in aqua pro 3 j. ss. pro foru in fine decoct. addendo vni Rhebenensis optimi parum & acetii 3 j. ss. Quo & hypochondrium dextrum & ventriculus, & imum ventris circa vterum fouebantur cum spongia calide immersa & expressa. Et aliquo modo dolor remissus est. Verum cum rursus aluum non deponeret, hoc modo illum purgaui. 2. diacatholici 3 ss. diaphenici 3 iij. agarici trochisc. 3 ss. pul. zinzib. gran. ij. dissolue cum 3 iij. decoct. su præscriptæ. In aurora cum sumpsisset, egregie aluum deposuit, multa pituitosa deiecit, & emissis multis ventositatibus, dolor sedatus est. Die subsequente tamen rediit, & cum balneo rursus aluum deposuisset, rursus sequenti fomento vsi sumus: 2. flor. meliloti, chamamill. ana m. ij. artemisia m. j. absinthij p. j. rad. althææ 3 iij. sem. fenugr. 3 j. ss. anisi: feniculi, malu. ana 3 j. acetii 3 iij. coquantur in aqua communi pro foru: etiam hoc deinde emplastro infra umbilicum imposito versus dextram partem, vbi tunc dolor erat. Recipe flor. meliloti, chamamill. stommatum anethi cum flor. anam. j. sem. malua 3 iij. seminis feniculi 3 j. rad. althææ 3 iij. coctis in aqua ad mollitudinem & conuulsis adde farinam seminis lini, fenugraci ana 3 ss. olei lilior. amygd. dulc. ana 3 j. ss. olei anethini, chamamill. scorpionis ana 3 ss. misce. Ventriculus tunc minus dolebat: sed magis dolor erat circa imum ventrem, versus dextram partem, sed inferius, vt locum hepatis non attingeret. Interim pro corroboracione stomachi cum oleo absinthij, ventriculi regionem inunximus. Vrina huic minime inflammata erat: ideo obstructio illa, quæ in hepate erat, potius erat ex humoribus frigidis quam calidis: & quia dolor ad venteres tenderet, versus inguina, etiam ad regionem rethum: ideo commode aliquid olei scorpionis adieci: & egregie profuit, & liberata ab illa obstructione: quæ locos dictos affligebat, plurimum lorij profundeabat, & tandem cataplasmate seu emplastro appposito, dolor iterum cessauit. Interea his tabulis utebatur. Recipe specier. diacimini triasant. (vt hepar minus calfieret) ana 3 iij. diab. (ob vterum) specier. arom. ros. ob stomachum, ana 3 ss. dissolutis in aqua artemisia & absinthij, adiect. zacch. albiss. q. s. fiat confectio in rotulis, ponderantibus 3 iij. sumebat ante spastum per ij. horas, dolore non amplius redeunte. Eodem fere tempore alia mulier, illius quoque vicina, iisdem malis cum affligeretur, iisdem fere prædiis, vel parum immutatis, & hæc similiter conualuit.

SCHOLIA.

Dolor ventriculi si ex vitio aliorum membro-
rum fiat, siue ex vtero, iecore, liene, patet
ex iam dictis: quod illis membris prospicere opor-
teat: & in qua minera mali, seu materia lateat,
& ad ventriculum transferatur: primo tollenda
est: & quia hic erat materia frigida atque flatuo-
sa, & eductu difficilior, cum dolor quidem re-
mitteretur, sed postea rursus rediret, repetenda
erat purgatio. Interea & ventriculi quoque ra-
tio habenda erat: eundem roborando oleo abstin-
tibus exterius inuncto, ne vapores flatuosos reci-
peret. Ideo & diaciminum & arom. ros. conuincit-
bat. Quare cum talis morbus aliquando per inter-
ualla huic mulieri reuenteretur, de praeuentione
consului, vt optimam victus rationem insti-
tueret: vt minus pituita gigneretur, neque ven-
tositas accederet ex iis quae fomitem praebeant:
quare imperavi vt omnia frigida & crassa vitaret
olera, carnes vetulas, duras, & molles nimium,
fructusque frigidos, legumina, & vt somnos lon-
giores fugeret & vigilias superfluas, quaque vis-
cera grauant: vt & extrema membra ac ventrem
potius calida conseruaret quam frigida, praecipue
pedes, & iis vteretur, quae status discernerent: &
pituitam attenuarent modice, non tamen valde
calfaciētibus, ob hepatis caliditatem. Et ita nunc
fere omnes dolores stomachi absolui: quibus
distinctis remedia sunt petenda ab affectibus su-
praenumeratis. Quod si dolor fiat à nimio sensu
vt qui facile in animi defectionem incidit, non
erit praeter rationem imperare vsum theriacae re-
centis, factis quibusdam prius euacuationibus
per clysteres & pilulas conuenientes. Ceterum
si dolor fiat ab inflammatione, apostematē, ab-
scessu, vel vomica, aut vlcere stomachi, de iis
nunc per ordinem dicemus: cum seorsim de iis-
dem tractandum sit.

OBSERVATIO XXX.

De ventriculi phlegmone seu inflammatione.

Cum stomachus, veluti cetera corporis par-
tes, inflammatione tentari possit, modo in
ore ventriculi, vt in x. obs. huius libri diximus, mo-
do in alia quavis ventriculi parte: id ex dolore si-
mul cum posito dignosci potest: quae pars affecta
si: similiter & ex proprii eiusdem partis muneris
oblatione: appetentia, si quidem in ore ventri-
culi; concoctionis autem, si in eius cauitate exci-
tetur. Sic iuuenis occurrat, qui nobis proponeba-
tur curandus: qui cum continuo febricitaret, ac
loctum valde rubrum haberet, dolorque immen-
sus ac assiduus in ventriculo adesset, qui nullis
medicamentis admotis mitigari poterat, tumo-
rem manifeste conspiciens; & altum tactu perci-
piens, cum & manifesta grauitas ei aderat, simul
& febris continua, vt diximus (quae omnia inflam-
mationis ventriculi signa sunt) inflammationem a de-
sepecepi. Quare tenui & exquisito victu praes-
cripto, vt Galen. monet lib. 13. Method. prisanæ cre-
more contenti, à carnibus, vino & aliis cibis ca-
lidis abstinuimus, potuque aquae hordei manda-
ti & glycyrr. vtentes, malisque acidis, aeternque
temperatum seu parum ad frigidum vrgentem,
elegimus, & somnum moderatum aut paulo bre-
uiore admissimus: nam si longior fiat, quam opor-
tet, potius inflammatio augetur, detento simul
in tali somno intus non solum praeternaturam ca-

lido innato, sed alieno, & eo qui praeternaturā est
ad quorum detentionem non immerito inflam-
matio (vt diximus) augetur. Similiter quietem
inunximus, & vt motum omnem vitaret praeci-
pimus. Nam prima sunt in curatione ipsa (vt Galen.
lib. 4. lib. 4.) quies & abstinencia: ideo & im-
modici animi affectus non parum nocent, & pro-
pterea vitandi sunt. Et hac quoque de causa man-
dauius vt parum loqueretur. Quod ad medica-
menta attinet, confestim, cum nihil prohiberet,
ex vena interna cubiti dextri sanguinem vtuunt-
que detrahere iussimus. Deinde oleo rosaceo, coto-
neorum, paluere rosae, siccatum adiecto, vel huius emu-
lo, cum pauca cera, ventriculum inunximus. Purga-
tionem eo tempore non dedimus, cum in prin-
cipio essemus: sed frictionibus & ligaturis ad di-
uersionem commode vtebamur: & si alium non
redderet, vt lenibus clysteribus ea tantum lenire-
tur, consulimus, mox & foui ex floribus rosae, rubear.
absinthij Romani, & portulacae decocto parato, vt vte-
reutur praecipi, & vt per os exhiberetur id quod
sequitur. Recipe syr. de end. ex succo acetose, syr. de
ribes ana 3 j. aqua plantag. ros. acetosa ana 3 iij. vini
granat. acetosum 3 j. misce pro iuleb. tam ob situm,
quam febrem. Postea cum materia magis fluxa
esset, ne aliqua sumeret, quae intus materiam con-
stringere possent. Quare & hunc syr. vel similem
cepit. 2. syr. viol. ex infus. rosar. rub. syr. de aceto, ci-
tri ana 3 j. aqua end. cibor. boag. ana 3 j. b. aqua ab-
sintij, feniculi ana 3 b. misce pro iij. dosibus. Et nunc
prius pro leui purgatione cassia accepta, quam
antea dare tutum non erat. Oleis superscriptis
olei chamemilla. & absinthij parum addidimus. Fo-
tum quoque adhibuimus ex floribus chamemilla, me-
liloti, rosae, absinthij, viol. maluae rad. alibae & sem.
sumach. decoctis in aqua rosae. & chamemilla, addito
in fine pauco aceto: & dolore sedato, inflammatio
cessauit, tum febris ipsa, apostematis resolutione
facta. Tunc quoque praescriptum, ad ventriculi
roborationem diacod. abb. in tabulis, & perfecte
conualuit. Venit tunc mihi in mentem historia il-
la Amati de mercatore, quem Anconae curauit,
qui in ore ventriculi inflammationem patiebatur:
qui saeuissimus alioqui morbus saepe est: à quo qui
evadit Iouis filij, & albae cornicis dicendi sunt. Le-
ni itaque clystere facibus eductis internam venā
dextri brachij pertundere iussit, sanguine ad vn-
cias decem extracto, & loco dolenti sequentia ap-
posuit. 2. olei cydon. myrrill. ana 3 b. pul. myrob. ci-
trin 3 j. boli Armen. 3 b. coque tepide locus affect. inun-
gebat. At cum his parum proficeret, & dolor in-
gens, cum anxietatibus & nausea perseueraret,
ex eodem vulnere brachij iterum sanguis missio
ad uncias octo repetita fuit: & emplastrum hoc
admotum. 2. farinae hordei 3 j. ros. rub. siccat. san-
tal. rub. ana 3 b. pul. sumachiorum, hypocyssid. ana 3
ij. olei rosae, omphacini, succi omphacii, ad est agrestis 3
b. cum succo end. & ros. q. s. fiat emplastrum: quod sic
frigidum, ob intensam caliditatem, dolenti loco
admovebat, & saepe innovabat: quo vir ille me-
lius habere cepit, neque dolor ita intensus eun-
dem vexabat. Porro vt alius singulis diebus res-
ponderet, admodum sollicitus erat praecipue le-
nibus clysteribus, vt hoc sequenti. 2. iuris pulli,
decocti maluar. 3 xv. olei ros. viol. ana 3 ij. vitelli ovi-
rum numer. ij. zaceb. 3 j. b. cass. extractae 3 j. salis com-
munis 3 j: misce: fiat clyster. Elapsis vero quinque
diebus: locus, vt antea, male affectus, fomento
ex ros. & chamemilla parato fovebatur: ac postea
hoc aliud emplastrum apponebatur. Recipe acanthi,
id est brancae in sine, rosae, rub. rad. maluanis ana p. j.
in aqua fiat decoctio: & abiecta aqua in mortario mar-
moreo,

moreo omnia optime pistentur, quibus adde farinae hor-
dei, chamemilla, seminis lini, fenug. ana 3 b. san-
tal. rub. alb. ana 3 ij. cum oleo ros. & chamamelino, &
pauca capi pinguedine fiat, emplastrum, & loco dolenti
tepidum admotum fuit. Tertio die post admotionem
emplastri, ruptus & phlegmon, & ager per vo-
mitum saniei parum reiecit: veluti per egestionem:
se tunc multo melius habere sensit. Sequentibus
aquam mellis ad vlcus lauandum bibebat: cui quā-
doque thuris mannam, Galeni consilio miscebat:
quibus intra 20. dies sanitatem obtinuit. Cibus
huic prorsus erat ad octo praecipue priores dies,
cuius vice ad amygd. multa destillatitia rosacea
paratum, quandoque veniebat: postea vero ius
pulli gallinae ille largiebatur, aut ex eo para-
tam panatellam: vel eius caruibus continuatum
consutum. Potus vero aquae hordei per se, aut
mixtum illi granatorum vinum erat. Sed & aer
circumdans, frigidus quoque erat. Hae Amatus
cent. 3. curat. 93. At iuuenis de quo prius dictum,
per modum resolutionis curatus; ruptionem non
fuit expertus.

SCHOLIA.

Ventriculus secundum suas tunicas, siue in-
ternam, siue externam, potest pati tumores
praeter naturam; & praecipue phlegmonem: quam
quidam volunt fieri ex calidis succis, vt ex san-
guine, vel ex bile, vel ex vtroque humore per-
mixto; idque in ore ventriculi, vel in alia qua-
vis eius parte: quam ex dolore simul cum posito
dignosci volunt (vt paulo ante diximus) & ex pro-
priis eiusdem partis muneris oblatione, appeten-
tia si quidem in ore ventriculi: concoctionis in
eius cauitate. At quod ipse morbus compositus
sit in magnitudine primo, & secundo intemperie,
& tertio in soluta continuitate, patet apud Ga-
lenum, lib. de diff. morb. tum 3. de temper. lib. de inae-
quali intemperie, ac reliquis plerisque locis. Quapro-
pter non abs re eam insequuntur: tumor praeter
naturam grauitatis, ac multi caloris sensus & do-
lor circa partem affectam. Accedunt ad haec sitis
valida & febris ardens. Tumor autem & calor
etiam tactu à medico iudicari queunt. Nausea quo-
que consequetur, propterea quod inflammationis
causa in ventriculi tunicis coineatur. Verum ubi
biliosus magis redundet succus, ita vt inflamma-
tio erysipelatis naturam referat, vehemens erit ar-
dor, sitis immoderatio, ac ardentissima febris:
sed minor tumor ac grauitas. Ex quibus etiam si-
gnis intertingui poterit diuersa causa eiusdem
inflammationis: praecedente victus ratione, & a-
tate, temperamento, anni tempore, ac reliquis non
praetermissis. Est omnium horum tumorum ea dem
generatio, scilicet ex superuacuae materiae afflu-
xu, siue ab initio inutilis sit, siue utilis sua nata-
ra, sed parte molesta. Influxit autem generatim per
venas, per quas nutritur. Quod si sanguis sit, pri-
mum maiores tenduntur, mox minores, donec re-
sudet in ipsam carnem humor, eamque spongiae
ritu madidam reddit, ac spatia quae fibras inter-
iacent, & in quibus arteriae non mouentur, replēt:
vnde durus repletionem tumor sit & tensio, & re-
nititur comprimenti, & dolor adest. Calor vero
tum ex natura humoris gignitur: tum quia colle-
ctum in arcto loco impactum, non transpirat: vnde
necessario putrescit. Putredo vero calorem gi-
gnit: qui in ea parte sit, quae vel ob vicinitatem,
vel ob praestantiam cordi calorem communicare
potest, febrem facit, aut ephemeram aut putridam
prout maior vel minor est communicantia. Vnde

10. Method. 6. febres ex phlegmone aliquo modo
dici possunt putridae, si causam respicias, licet re-
vera sint ephemerae naturae: quando solus calor co-
municatur cordi, non autem putridus vapor, vide
1. De feb. diff. 5. & de vena sectione ad initium. Sed
nunc sicut ex sanguine plus iusto influente, phleg-
mone in eo gignitur ita & ex aliis humoribus tu-
mores alij fieri possunt. Videtur enim quod simili
ratione fiat generatio, iuxta Iacchimum doctissi-
mum, eodem scilicet influxu, ex 13. meib. 1. & de
vena sectione. Quod si res ita habet, cur ergo au-
tores phlegmones solius meminere? Responde-
ret Iacchimus. At qui erysipelatis stomachi alibi
fecerunt mentionem, vt 10. Method. & 4. de viti. 2.
Quod vero scirrhi tumores fiant, nos, inquit Iac-
chinus, vidimus in dissectis: vt Florentiae in mu-
liere è domo puccina. Respondetur primo sub
phlegmones voce, comprehendendi etiam erysipelata, ubi non
est ex parte loquendum. Alij vero tumores raro acci-
dunt, quoniam in membranas duras non facile
confluere potest crassus & viscidus humor, praeter-
tim in internam. Aliquando in externa constite-
re, & memini (inquit idem Iacchinus) me ad tactum
scirrhusos tumores sensisse, duos inquam, sine
dolore. Hi ergo si accidunt, ex communiratione
curandi scirrhus, curantur, addita solum curatio-
ne à parte: quam in vno exemplo phlegmones mō-
strare sat erit, & iure: quoniam maxime pericu-
losa est, & curatio multum artificij exigit. Sed
hic videndum, etiam ventriculum posse in tumo-
rem eleuari ex solo vento: cuius habemus exem-
plum apud Beniuenum. De abditis causis capit. 40.
Annum 16. agentis Petri Guicciardini filio ita ceruix
ventriculi sine ulla doloris sensu eleuabatur, vt magni-
tudinem cyclonis pami aequaret, nec manifesta causa viden-
debat, cum omni notamento caret. Quare rem ad-
modum diligenter resigare cepi, admittens quatenam
abditae huius mali cause esse possent. Sed cum nullam
provis praeter ventum inuenirem, à quo, ventriculi ca-
pitae paulatim eleuato, ita eiusmodi fieret tumor, & vt
ossa talem situm adepta, nec vltra ad pristinum statum
reuerfa, figuram illam illis impressam, tanquam natu-
ralem custodirent: ferrea demum lamina, quae ex cingu-
lo quoque surgebat ferreo, stomachum comprimi iubeo:
quo paulatim ad sedem suam retrocedere coegeretur: quod
factum est. Nam haud multo post hoc vno tantum prae-
sidio ita repressus est tumor ille, vt ad pristinum ac natu-
ralem formam ipsius ventriculi ceruix penitus reuerfa sit.
Hae Beniuenus. In iliaco dolore, cum excremen-
ta per os redduntur, ventriculus quoque in tumo-
rem quandoque attollitur (vt nos vidimus) partim
quidem ex flatibus, sed magna ex parte ab excre-
mentis eo perlatis. Quandocunque autem tale
aliquid contingit, non modo spes vitae superest:
sed mors fere imminet. At stomachum indurisce-
re diximus paulo antea scholio obser. huius libri,
eiusque curationem, sed breuem adieciimus: sed
durities illa non est omnino sine dolore. At erysi-
pelas: licet aequae aut magis periculosum, quam
scirrhusos tumor ventriculi praeccepta tamen cura-
tiua habet simplicissima, scilicet solis frigidis in-
tus, & extra admotis. Sed nos de phlegmone prius
agamus, id est: tumore factio à mediocri sanguine
& vili. Hic ergo in partem influit ex maioribus
venis, quae eò confluunt: confluxus vero causa est:
vel ex ipsa parte attrahente, vel ex quapiam alia
transmittente (inuat enim modo suffusimas Galeni de-
monstrationes 13. Method. in Epitomen cogere.) Quae
transmittunt, robustiores necessario sunt: vel na-
turae, vel ex accidente aliquo suspicientibus com-
paratae. Transmittunt autem, quia ipsa se grauari
sentiunt, vnde vi vtuntur noxiorum, seu eneroso-
rum

Quomodo
tumores
stomacho
atque ex alijs
humoribus
vti ex san-
guine fieri
possunt.
Scirrhusos tu-
mores post
dissectionem
in stomacho
inueniunt.Duri tumo-
res in parte
externa ali-
quando con-
sistunt.

10

11

Erysipelas
stomachi.Phlegmon
ventriculi
ex sanguine
mediocri &
vili consus-
tens.

12

rum expultrice. Quae vero grauant, aut quantitate molesta sunt, aut qualitate visiosa & noxia: vt calida, frigida, acida. Ex altera parte, quae attrahunt confluxum causant: attrahunt vero calore partis, aut dolore. Opus vero caloris Asclepiades nolebat attractionem dicere, vt Galenus scribit: ipse vero vult attractionem dici: cum ille influere humores, non autem attrahi in partem calefactam diceret. Et quidem non facile decernitur (dicente Lechimo) quis horum rectius sentiat. Asclepiades calore, vt puto, considerauit fundi & liquari circumstantium partium succos: aperiri partis meatus ac laxari. His facilis sit confluxus, vt contra frigiditatem arceatur. Nec Galenus aut ratione, aut experimento monstrabit, quod colore attractio fiat. Nam quod in magno mundo a sole sursum feratur vapor, attractio non est: si quidem per se mouetur sursum, ex forma quam a generatione acquisiuit. Ratio vero, solum rarefactionem & heterogeneorum solutionem a colore heri inuenit. Secundo De diff. feb. 11. loquitur distinetur, quod calor vel attrahit, vel recipi facit. Adde, pio Asclepiade, quod calor, cum intemperiem efficit, dolorem efficit. At dolorem non propria attractio nem reducit Galenus, sed ad transmissionem, vt statim dicemus: Dolor enim, inquit, confluxum excitat, quoniam natura dum causam contritantem expellere tetat, si quidem primo impetu non prospere succedat: maiore impetu uixta, sanguinis aliquid & spiritus eo trudit. Sic ad dolores plagarum, tumorem insequi cernimus. Hoc ergo non est dolorem attrahere, sed doloris occasionem esse, vt humores in partes transmittantur. Quod si 2. De diff. feb. & alibi cernit attrahere dolorem, inquit, non proprie de attractione loquitur: sed cum ea similitudinem habet, quatenus pars dolens ipsa dolore repletur. Ideo rectius loquitur. 3. method. cum inquit. Dolor est fluxionis causa: non dicit fluxionem trahit. Et rursus 6. de usu partium, attractionem triplicem ponit: vacuo calore, familiaritate: doloris vero non meminit: sed hoc quia non erat ad propositum, cum de attractione cordis ex arteriis loqueretur. Considero ex eo loco expectum attractionis caloris: vt flamma ex ellychnio oleum attrahit, & hoc caloris vi ex lucerna: vnde eam exhaustiri videmus. An non videas magis num fieri ratione attrahat, an calidi? Sicca enim humidum attrahere vehementer videmus, vt spongiam, lium: hinc ergo ellychnium. Sed tunc aliam causam attractionis dare oportebit: nempe quae a siccitate fit. Praterea si haec esset attractio, tunc siccum, id est, igneum, humidum sibi contrarium attraheret: contraria vero se refugiant. Sed haec alias. Signa phlegmones ventriculi, si ex ipsa natura haberi, partim affectus natura sapient, partim affecta partis. At qui affectus signa haec sunt: dolor primum, qui ex solutione continui fit, facta ex materia replet. & tendente sensitiuas partes: mox tensio, seu enixus partis, quae repletionem accedit. Cum enim durum vniuersum sit, quod tactui: non cedit, 5. De simplic. alia dura erunt concretionem: cuiusmodi est phlegmone. Quod vero materia, a qua fit, sit sanguis, necessario calor aderit parti: & non solum ex natura materiae: sed etiam ob putredinem quae ex necessitate sequitur. Semper enim humida & calida corpora cum in calido loco manent, non perflata citissime putrescunt. At non perflantur: quod omnes meatus, per quos transpiratio fit, sunt adstricti, vel obstructi. Vnde & probe Thessalici phlegmonem adstrictam passionem dicebant. Rubor vero ex natura humoris

Hac doctrina multis partibus erit communis.

accidit. Haec indicant omnem phlegmonem, quae sub sensum venit: sed si interna sit, non omnia haec sentiuntur: quaedam tamen. Primum ergo dolor sedem affectam demonstrat, si praesertim non extimas partes attingat, quod tactu distinguatur. Vnde internas partes afficere monstratur: quae & ex vehementia eius coniectura sit. Mox sensus tactus aut visus tumoris circumscriptione sentit: sed hoc non semper euenit, vt cum remotas partes obfuderit. Ideo, quod dicit, & apostema manifestum fuerit, id est, tumor apertus: effica quidem nota est, sed quae non semper sentiat. Fit tertio coniectura ex febre, quae necessario adiungitur. Est autem necessitas generationis ex putredine: vt in lib. de vena sect. habetur, & 1. de diff. feb. 5. Quae cum necessario putridum calorem excitet in parte: si quidem pars illa, vel quia vicina est, vel quia nobilis, multis vasibus abundans, vel ob multitudinem materiae collectae calidae communicabit cordi calorem suum igneum: vnde vniuersum corpus incalcescit praeter naturam: & ita fit morbus febrilis. Quod si non modo calorem, sed putridum vaporem insuper in partem possit, iam non febris modo: sed putrida fiet. Cum igitur venter vicinum positum habeat, arteriae & iecinori facile febrem faciet, & eam putridam & continuam: cuiusmodi sunt omnes febres (vt quidem in libris nostris de febr. b.) quae ex viscerum tumoribus & inflammationibus fiunt. Haec Rhases. Sed super eundem scribens Iacchimus (cuius verba habemus vsu sumus) coniecturam, inquit, solum affectus facies, nisi & aliter addatur: calor loci perceptus, & ab aegro & astantibus, cum palmae ventrem attingunt. Adde & sitim, quae necessario euenit: nam cetera symptomata, quae Galenus numerat, insequuntur, praecipue os ventris afflictum: ideo adaugent coniecturam affecti loci: sed non affectus. Siue enim conuulsio seu delirium sequatur, siue cibi horror: omnia, inquam, ad ventris morbum sequi dicuntur: sicuti & deliquia. Ob has causas Auicenna vaga quaedam signa addit, vt certificet coniecturam: Si, inquit, dolor remediis non soluitur, & durat, significat apostema. Sed signum est inefficax, nisi intelligatur continuus calor: hoc enim aliquid facit ad agnitionem cum reliquis. Similiter & vitia pulsus & anhelitus, communia aliis causis esse videntur, non propria phlegmones. Haec de signis phlegmonem indicantibus. De prognosticis postea dicemus.

OBSERVATIO XXXI.

De ventriculi phlegmone, seu inflammatione lethali.

GRAUIER & continuo febricitabat Harko iuxta Sacellum Sancti Spiritus, ex phlegmone ventriculi decumbebat, & ex continuo singultu, qui procul dubio etiam ex inflammatione ortum habebat: Ad hunc cum circa quartum diem prius accitus essem: vix remediis adhibitis, facto etiam prognostico, eodem die obiit. Neque admirari dignum, cum morbus hic semper periculosus sit: nam & de morbi magnitudine quid attinet dicere, cum & per se ledat plurimas & necessarias actiones: vt nutritionem, & dolorem prostermentem vires inferat: habetque id praecipuum, vt principes partes in consensum maxime trahat. Sed de his latius in scholio.

SCHOLIO.

SCHOLIA.

Vbi stomachus inflammationem sustinuerit, magna opus est diligentia, teste Alexandro Tralliano lib. 7. cap. 14. quoniam maximum morbum & necessitatem corpori affert. Quod si imbecilles fuerint vires, iis, qui ea laborant (vt huic seni erant) mortifera vt plurimum esse solet. Quamuis non solum iij, sed etiam qui valentiores ipsis sunt, ab ea interimi consueverunt. Nam quibus vel iecur, vel ventriculus phlegmone obfidet, veluti pleuriticis, peripneumoniacis ac synanchicis, vna salus est, videlicet ipsum virum robur, ex Galeni decreto 10. meth. med. Curatio quamquam ex communi phlegmones curatione pendeat, vt augmentum inhibeamus, & factam phlegmonem curemus: ea tamen oportet ad ventriculi phlegmonem accommodare. Praescribimus itaque victum refrigerantem (vt iam diximus) & tenuissimum, & si naturam erysipelatis magis referat, magis refrigerantibus vtendum, vt lactuca, cichorea, vel endiuia, vulgo schirola dicta, in aqua hordei decoctis, & praeferam, postea in uino pullo- rum gallinaceorum decoctis: abstinentes a vino & carnibus, vt dictum est. Venam quoque statim secabimus, praecedente clystere emolliente, si alius strictior: pariterque ad diuersionem frictionibus, ligaturis, cucurbitulisque ac reliquis diuersionibus vtetur circa initia: abstinentes a medicamento purgare, ne materiam ad locum affectum & inflammationem trahamus: ex Galeni decreto. Huius habemus historiam apud Grad. supra 9. Almarianus, cap. proprio, de puella iuene robusta, quae cum die 3. ab initio apostematis medicamentum solutium, contra opinionem alterius medici, cepisset, 5. die obiit. Vomitus hic perpetuo etiam euitandum voluit, cum ventriculum dilaceret: alij tamen tempore maturacionis conuenire existimant, vt rumpatur, praestat tamen ab omni vomitu abstinere. Quod purgatio non conueniat in principio, constat ex Gal. 13. meth. medendi. Post haec ad ea, quae extrinsecus applicantur confugiendum, & mixta curatio debet esse, ex astringentibus & laxantibus: quamuis circa initia semper astringentia intendi debeant, iuxta eundem Alexandrum: & si eis duntaxat utaris eo tempore, non peccabis, ex Galeni auctoritate 13. method. medendi. Valet itaque oleum omphacitum, osaceum, cydoniorum, vel de absinthio, si validum non fuerit inflammatio, aut feruor: vel ex rosaceo & absinthio. p. j. flor. chamomel. radice, ac folijs althaeae pimedia in aqua pluuiali decoctum facit, & paulo accito aut vino albo sicut epithemata vel vnguent. vt iam ostendimus exemplo paulo superius dicto. Et vbi iam laxantibus magis indigeas, vt pote incremento aut vigore, adde praedictis laxantia, & augcas vt chamamelum, althaeam, semen lini, meliloti & fennicis & adipe anserinum, oleum chamamel. anethi, man. lilaceum, & mastichinum: ac vtriusque amygdalis omnibus aut quibusdam simul permixtis, varia medicamenta compones, vt vltus postulat, & epithemata, cataplasmata, & vnguent. De quibus vide Aetium & alios auctores. Vbi moderata fuit inflammatio, etiam ceratum Galen. 4. method. sufficit: & vbi stomachus magis corroborari postulet, aloem augere conuenit, admisce- reque cum eo succum absinthij, aut cranthem, aut succum capreolorum vitis. Ceterum vbi phlegmone prorsus inclinauerit, & alius non deiecitur: tunc poteris exhibere mannam, thamarindos, syr. ex infus. ros. viol. Vbi vehemens sentia-

Quo tempore purgatio praestari possit.

Ret. Forest. Tom. 2.

tur ardor, vel cassiani, cum cichorij aut hordei decocto. Et quamuis Galen. 13. method. & filicula & corticem nigri veratri approbat: iis hoc tempore praestat abstinere. Si quid vero scirrhum relictum est, vt phlegmone est, ita vt emollientia requirat, etiam corroborantia ac astringentia cum eis permisceri debent, ex Tralliani decreto: quorum medicamentorum magnam copiam reperies apud eundem, & Aetium & Paulum. Si itaque durus tumor appareat: siue quia ab initio vera phlegmone non erat: vel erratum est in remediis, resoluendo fortius quam expediat: tunc malagmaris est vtendum: quale ex meliloto fit. Cuius generis est & illud a Rhase, vltimo loco descriptum. Egregie valent, cum & vim abstringentem adiunctum habeant. Oportet vt illa medicamenta, quae ventriculo vel iecinori apponuntur, habeant aliquid adstrictionis, vt Galenus monet in historia ex Theagene Philosophi Cynici. Est namque ventriculi (vt paulo ante diximus) sicuti iecinoris, maximus, & toti animali communis vsus. Stomachum enim, prouidentissimus artifex, Deus in medio totius corporis profuit, tanquam ciborum receptaculum, aut promptuarium quoddam, vt ab eo cetera membra nutrimentum sibi ipsis exposcerent, captarentur. Ideo semper roborandum est. At erysipelatis intentio magis est refrigerandi, vt phlegmones vacuandi, 13. meth. & 14. hinc fit, vt eius curatio sit refrigeratio: quali vtitur 10. methodi 5. & 9. method. 5. Modice tamen fiat, id est, quantum exposcit affectus, ne forte in affectum frigidum transmigret: sic enim scirrhi gignuntur.

OBSERVATIO XXXII.

De apostemate frigido ventriculi ac diuturno, in abscessum & pus transmutato.

PUELLA paupercula 18. annos nata, in platea diui Petri dicta, Almaria habitans, per integrum annum circa stomachum intolerabili dolore cruciatur: quae cum medicis non vteretur ob paupertatem, forte fortuna me transeuntem vicini ad puellam introduxerunt. Magnum tunc tumorem circa mucronatam cartilagineam conspeximus, valde eleuatum & duriores, tactui resistentem. Quem locum cum leniter attingerem, ferre non poterat. Crura autem tum reliqua membra stomacho non concoquente, macie con-sumpta videbantur, nutritione minus accedente. Prae nimio dolore misera exclamabat, se apostemata ac abscessum in stomacho habere: quod & signa praesentia indicabant. Astantes mulierculam nescio, quae non adhibuerant ad dolorem tollendum: prius existimantes, hunc dolorem tanquam ventosum se posse auferre tegula calefacta apposita: modo etiam tabula lignea, vt vulgares facere solent: eaque externa causa vel simili, sua caliditate materiam ad stomachum conuertunt, eaque attracta, cum non possit debite a natura regulari: porositates concauitatesque medias stomachi subintrat, ac vnitatem soluit, ac apostema per se aliquando inducit: talis error plerumque ab astantibus imperitis inducitur: etiam subinde a medicis indoctis, dum ventosam magnam ventriculo, corpore impuro existente, apponunt, vel pannos calidos, aut frictions fortes ventriculo adhibent, idque in principio existimantes omnem dolorem ex ventositate oriri. Cum hac itaque integro apino dolore confecta ad extremam

D d maciem

maciem deuenisset, facile ex signis presentibus intelleximus, ibi abscessum diuturnum frigidumque adesse, cum nulla siti premeretur, quamquam subinde leuiter febricitare videbatur. Et quum iam longo tempore aluum non deposuisset, & libenter clysterem emollientem prius iniecissem, quem nullo modo admittere volebat, mandauit ob dolorem, ut talis fons fieret, prius epoto decocto sequenti, parato ex foliis fenae, foliis caulium rubrorum, scabiosae (quae omnia apostematam interiora resoluit vel maturat, vel rumpit: quod non solum in hac puella, sed etiam in alio abscessu interno sine pectoris seu alterius cuiuscunque expertus sum.) sicubus adiectis & uis pastis absque arillis, dentis leonis (ob febriculam) foliis maluae, & rad. althaeae, decoctis in fero lactis: qua bis in die, cum paupercula esset, utebatur ad aluum emolliendam. Quae licet in principio minus conuenissent, ut scholio praecedente dictum est: tamen hic, cum in declinatione diu malum extitisset, & maturatione opus esset, commode hoc decocto usi sumus: tum fotu ex decocto foliorum maluae, rad. althaeae, scabiosae, menthae, & absinthij virisque tam ad dolorem sedandum, quam ad maturationem; reliquiis contusis, & butyro recenti mixtis, cataplasmatibus modo stomacho apposis. Et praeter spem intus ruptum est apostema; & abscessus ille annuus, vomicae instar: & euomit saniem sanguinolentam: & per inferiora satis copiose saniem excreuit, tumore detumescente, & dolore omnino consopito. Quare statim ad deterfionem putris, usi sumus decoctione hordei non excorticati, pauco melle rosato adiecto, ad detergendum vlceris: & egregie haec ipsa conualuit, cum admiratione multorum. Quidam vulgares eo tempore, qui tunc aderant, huic puellae dedissent oleum oliuarum pro vomitorio, etiam post abscessum disruptum, ad leniendum vlceris, ut illi adferebat: quibus restitui, neque admittere: auctoritate Galeni edoctus, qui nos lib. 3. meth. med. ita admonuit: Ceterum (inquit) qui de ventriculo eluere pus volunt, non sine periculo vomitum promouant: sicut si aliter infixam illi pituitam per oxymeli & radiculae detergerem. Tutius itaque parte deiectione uti, cum vomendi periculum sit, ne & quod vlceratum sit, dilaceret, & succum quempiam inuilem ex vicinis attrahat. Absque mora itaque continuo decies in hora capiebat cochlear vnum atque alterum, vel paulo plura ex decocto hordei, cum pauco melle rosato. cum subitanea eiusmodi vlceris indigeat mundificatione, ne profundantur, aut tunicae stomachi penetrent. Hoc enim modo hanc miseram & pauperculam puellam, vlceris absterfo, sanitati pristinam restitimus, diuina gratia nobis assistente.

S C H O L I A.

Apostemata & abscessus, iuxta iuniores, qui Auicennam sequuntur, & supra Rhafem scripsere, sunt, vel per modum congestionis paulatim; vel per viam defluxus, ab omnibus humoribus: vel ex vno, vel duobus simul mixtis, & calidum quidem ex sanguine vel bile; frigidum ex pituita vel humore melancholico: cui nonnulli addunt apostema ventosum, si & ventositas simul adsit. Si igitur calidus est abscessus, aut ex cholera vel sanguine oritur, aut utraque humore, aequaliter, aut inaequaliter. In bilioso abscessu, dolor tactu vel uti clauus infixus, inest feruentissimus, cum ardenti febre, naturalique circuitu, siti audissima, cibi tadio, vomitu quandoque bilioso, cum furore phregetico, vtina citrina vel flaua

conspicitur. Et sanguineo vero abscessu ventris superior pars magis tumescit, ac extenditur, cum maiori pulsu, ac grauitate; vrina purpurea cernitur, venarumque pulsus maiores sentiuntur, tumor ipse mollior efficitur: si vitium vetus fuerit, corpus ac macie conficitur, cavi oculi sunt, vrina subsistit, aluus liquida redditur, & assumpto cibo stomachus male afficitur. Abscessus frigidus, nempe humore congesto mala concoctione, nimio otio, humoreque eodem confluentem. Ex pituita abscessum grauitas sine siti indicat absque ardore stomachi: tum nulla febris adeft vehemens, vel periodica tantum, os salua abundat, venter ac macie pallent, turgent sine duritie, nullum cibi desiderium est, pulsus mollis, vrina crassior, alba, corpus graue redditur, ac torpore quodam afficitur, qualis lethargicus euire solet, lasa ex aliqua parte memoria. Ex melancholica apostema durum est in quo dolor non perpetuus est; sicuti peque cibi appetitus: venter in eo quandoque sponte fluuit: sed semper corpus macie conficitur, ructusque acidos edunt, agri insomniculosi: vrina tenuis, ad glaucum vergens, pulsusque tenuis est, ex abdita febris: iis anhelitus grauis est, ac animus tristis, ac semper mœrens. Ostium ventriculi, praefertim in abscessu calido, saeuissimo dolore afficitur: animus enim vel primo die protinus linquit, non aliter quam praecordiorum abscessu: unde neruorum distentiones, mentis animique furor oboritur: multi namque & attoniti sunt, ex cerebri & cordis haud dubia communicatione cum ore stomachi, in quibusdam nimia inedia sensibilitate adeo obfuerit, ut similiter caderent, spasmatibus membris omnibus. Maxime mentis alienatio comitatur si sit apostema calidum: si frigidum, caros, stupor: Si sit in fundo stomachi, dolor est minor, & excreuit, non immediate post cibum, sed per horam post eius assumptionem: tumor quoque & dolor prope umbilicum, per duos digitos aut tres, aliquando declinans magis versus dextrum, modo sinistram: magisque laeditur concoctio quam appetitus: & in fundo magna ex parte subsequitur maior lubricitas ventris. Si in parte anteriore, magis subiacet sensui, & dolor in parte anteriori sentitur: & non tolerat æger compressio nem. Si in posteriori, contra dolor in posteriori parte sentitur. Si sit in omnibus partibus, accidentia omnibus partibus sunt communia. Si in tunica interna, symptomata valde intenduntur: iri dolet supra modum, appetitus deiecitur: syntopis, tremor ob cordis consensum sequuntur: & vomitus, si in superiori parte; vel secessus si in fundo: ut licet in contrarium euenire posset, dolor augetur, quasi immediate sumpto cibo, & in descensu: & dolor circa spatulas, ob cælophagum seu galam extensam per deorsum. Si ex terna tunica, accidentia magis remissa, neque sit dolor maior sensibiliter post assumptionem cibum; nisi esset multa quantitas. Tumor & durities exterius magis percipiuntur; neque aliquid sensibile per vomitum aut secessum educitur de apostematis materia: neque ita laeditur virtus appetitiua aut coëtrix: modo habent ventrem mollem, modo duriores, deficiente virtute retentiua, aliquando expulsus. Hic addunt signa temporum apostematis & resolutionis, maturationis, ruptionis & indurationis: de quibus de pleuritide dictum est. Reliqua vide apud Arculanum, tum reliquos.

Prognostica signa ex superius dictis etiam patent, quod confirmatum ventriculi apostema,

ut plurimum interficiat, calidum tamen velocius quam frigidum. Et si ad maturationem & exituram tenet, saepe desperationi propinquior quam spei est. In caucrofo nulla spes relicta. Pituitosum magis quam biliosum sanatur. Et in tunica externa minus malum quam in interna: exterius medicamenta imposita magis iuuant: & in tunica interna magna ex parte calida sunt per viam defluxus: frigida per congestionem. In fundo minus mala quam in ore, imo pessima. Ratio in promptu est: fundum minus sentit, & fortius est in resoluendo, ob caliditatem. Hæc quoque mala censenda, si frigus membrorum extremorum accedat, imo lethale, iuxta Hippocratem, si frictionibus & pannis calidis non remoueat. Biliosum quoque deterius sanguineo: & melancholicum pituitoso. Interna quoque si ad saniem perueniant, vix vel nunquam curantur, ob membrum nobile: quamuis hæc puella curata fuerit, est ex raris contingentibus. Ita & Gradus in toto tempore suæ præceps, tantum bis terque curatus vidit. Quomodo calidus abscessus seu apostema curetur, iam ex parte dictum est. Cælo primum frigidum & humido æger contineri debet, ubi sine animi perturbatione, sine lectione, balneo, sine frictione stomachi degere oportet. Nec somnus longior conuenit. Valet & cibis facilis coëctio: ac paulatim frigida ac humecta natura: tum actus, tum potentia offerendus est. Vinum ebescit & carnes, & omnia tragemata ex saccharo & melle. Valet syrup. viol. ros. thamarind. & pulvis hordeaceus, cum succo pumici: & syr. ex succo myrtili: & vitellusque iam dictus vsque ad septimum: deinde attritæ, cucurbita in cibo danda. Suppurato abscessu, refrigerantia & adstringentia paulatim remitti debent. Aluus lenienda clystere tantum molliente. Et si ex sanguinis vitio sit, valet syr. ros. oxyacch. In bilioso, viol. nymph. pap. & protinus vena secanda, ut diximus. Sed & cathartici abstinentur: Parti affectæ frigida prius imponenda, leuiter adstringentia: in crescente malo partim dissoluentia, partim adstringentia: ubi constitit morbus, dissoluentia & laxantia augenda: ita tamen, ut non careant restringentibus, ob partis nobilitatem. Inclinate malo, ad maturantia, & dissoluentia veniendum. In fine demum, si non resoluatur abscessus, suppuretur, maturantia ac emollientia conueniunt: adiecto tamen leui constringente, & ventriculum roborante, ut succo absinthij. Prorumpente demum pure, vlcerum curatibnes sequuntur. Quorum copiam praefidiorum inuenies apud Alexand. Benedictum Veronensem: quæ magna ex parte ab Arculano excepit. At in abscessu frigido, si initio discutientibus non curantur, (sicuti priores abscessus) materia enim crassa est, ac parum obsequens: diaphoretica plurimum valere volunt, hoc est, resoluentia. Quidam ea admiscere ausi sunt: quod alij minime censent, nisi commixta quoque cum calida materia foret. In phlegmatico igitur conuenit in principio oleum ros. & absinthij æquis portionibus, imposito emplastro ex far. sanug. lini, hordei, lupinorum, meliloti ana 3j. absinthij, schœnanthi ana 3ij. ros. rub. myrti, aloes ana 3iv. tula & cribrata rosaceo excipiantur, adiecto adipe gallinaceo, anserino, & succo plantag. sanguinalisque. Alij sacculis vtuntur duobus, aut spongij decocto perfusis, & expressis inter duas tabulas, ex decocto ros. cauliculorum myrti, menthae, absinthij, santal. schœnanthi, nardi que paribus portionibus, exiguo vino austero decoctis, & percolato succo. Interea rhodomet in potu iuuat, cum plantag. & absinthij aqua. Incref-

Pet. Forest. Tom. 2.

cente abscessu inungemus oleo ros. chamæmel. anethi. no, nardino ana 3b. cere quod satis est, adiecto spica, maceris, schœnanthi exiguo, & superimposito emplastro ex farinæ lupinor. sanug. ana 3ij. ros. meliloti, chamæmel. anethi, ana 3b. cum brassicæ succo, & oleo chamæmeli. In statu, vtuntur oleo nardino cum spica, schœnantho, cyperio & aceto, & emplastro ex melilot, chamæmill. radic. alth. ammoniaco, adipe anserino & gallinaceo, & similibus: & si ad collectiones, veniat radice liliorum cocta & imposita, & quicquid collectiones aperiat, si suppuretur. Sed vnum imprimis animaduertendum est: si venter intempestiue fluat, tum emollientia plurimum obsunt: sed adstringentia imponenda sunt, donec subsistat aluus, ex palmulis emplastro frigido, aut calido pro abscessus qualitate cum succo vnae acerbæ aut absinthij, aut si opus sit, materia mixta vtrumque commiscebimus. In abscessu melancholico, inter initia, rosaceum, lilinum, luteumque violarum, aut narsissimum cum aceto commixta valent, inuncto stomacho, & subinde hoc emplastro imposito: 2. farinæ fenigræci sem. lini, althææ ana 3ij. melilot, rosace, anet. myrt. ana 3b. ex iisdem oleis cum adipe gallinaceo, ac anatis miscantur. Cum increscit tumor, inungimus violaceo oleo ex luteis viol. lilin. adipe anatis, anserino, gallinaceo, ceruin. viulim. ana 3j. styracis liquid. bdell. myrt. spyc. mastic. cyperi, cartham. sem. interioris ana 3b. amyg. amar. 3j. gummis in vino dissoluantur: deinde tulas amygdalas conijceto, & reliquas species; adipem postremo infunde: id emollit, discutit & confortat. Si phlegmone indutescat, valet emplastrum de meliloti & Nilei malagma, quo veteres utebantur, quæ gloria sua fraudandi non sunt.

O B S E R V A T I O XXXIII.

De ventriculi vlcere.

Puella 15. annorum, per biennium fere cum dolore ventriculi conquereretur, anno 3. tumorem manifeste viderunt parentes in eo loco: neque tunc quicquam consilij aut remedij tentatum. Hinc ruptionem animaduertunt: excreuitque puella materiam biliosam, pituitosam ac saniosam per aluum. Ex his apostema apparuit. Hæc cū Bononia in Italia decumberet, tunc prius vocatus est Elidæus, medicus hospitalis Bononiensis Vita dictæ, præceptor meus. Is indicatione sumpta ab ætate, virtute, temperamento, loco male affecto (quoniam locus vehementer sensibilis existit) continuique solutione; iudicauit necessarium exsiccantibus abstergentibusque vtendum esse, ac magna opus fore diligentia, tum quia locus est principalibus membris subministrans; tum quia toti corpori nutrimentum præparans. Quare loco potus & digestionis, præscripsit aquæ mellis usum. Cibum vero facillimæ coëctionis, exiguae quantitatæ, ex hordei cremore nonnumquam ex panata, exiguo cinnamomo adiecto: & aliquando vinum in pauca quantitate admisit. Pulsus huius erat creber, debilis, paruam habens inaequalitatem ut sit in affectibus ventriculi: vrinae albæ, crassæ, non coctæ. Stomachum inunxit oleo mastichino, cum lana succida applicando. Tertio die vidit eam lienteria laborare: & quemadmodum Gal. 6. par. aph. 1. causam eius fore dicebat, vel imbecillitatem virtutis retentiua, vel vlcerationem ventriculi & intestinorum; sed præceptor certo persuasum fuit, hanc provenire ab exulce-

dd ij ratione

ratione stomachi, ob loci dolorem, ruptionem & saniosam materiam; non ab ipsius virtutis debilitate. Ideo adhibuit fomentum exsiccatum & confectum; nempe ex *absinth. mont. flor. ros. malicorij gallis, balauft. myrrill. maslich. olib.* exhibendo præterea miuam cotoneorum, cum quibusdam adstringentibus. Hinc tandem excrementa melius cocta visa sunt, & sanata est.

SCHOLIA.

Exulceratur sæpe stomachus, leuiter tactu tunicarum superficie; modo grauius ambabus tunicis, erosus, vel perforatis lethaliter. Exulceratio alia recens est, alia inueterata, ex acutis humoribus in stomacho congenitis, aut capitis acutis destillationibus, aut abscessum adaperto pure (ut in hac puella non precedente) aut pustulis in eo ortis, ex quibus pestifer exit liquor. Ex vulneribus quoque præsanatis, aut perperam, vel per incuriam relictis. Venena item philtre potione exulcerant, & stomachum & intestina omnia, sicuti & cathartica ab imperitis oblata; veluti scammonium & euphorbium. Refert Benedictus Veronensis obiter exemplum vnum cuiusdam religiosi vicinam quendam in podagra nullo auxilio præsentissimo curaturum se promiserat: audierat enim hic bonus homo, pilulas, quæ ab euphorbio in officinis nomen habent, huic morbo sæpe profuisse; ex solo igitur euphorbio confici pilulas à specuario non minus quam ipse erat imprudenti, iussit: assumptis catapotis, dysenteria eo die ager correptus fuit perniciose; atque altero sepultus. Exulcerato stomacho febris adest, subinde lingua aret, sitisque viget, animus quoque subducitur, si vlcera ingentia fuerint, & in ostio præsertim stomachi. A cibo falso præsertim quoque frigido, aut calido, vel acuto, veluti sinapi, aceto assumpto, summus dolor. Purulentia præterea vel cruentæ vomitiones, immixtis tunicarum crustis indicio sunt. Oris item graueolentia ex crudis veluti piscibus, vel adustis ossibus, & ventris lienteria adest molesta. At exulcerationis varietas, magnam differentiam habet: in primis oris stomachi summum dolorem ac accidentia sequuntur terribilia; difficultas anhelitus, sudores extremorum frigidi, ac animæ demum defectus: cibus quoque deuoranti cum os stomachi pertingit, maximum dolorem infert; delapsus exinde, quiescere statim permittit ægrum. At quæ in imo ventre sunt vlcera, minus lædunt: sed male digerit ager. Verum si vlcus in œsophago infederit, inter scapulas (ut narratum est) dolor figitur, ac in deuorando cibo excruciat æger, minus tamen, quam si in ostio fuerit. Intestinorum gracilium, ac stomachi vlcera cum in eodem fere sint confinio, doloris loco fere non discernuntur: tempore tamen cruciatus, differunt, gracilium enim intestinorum tormenta læuius sentiuntur, ac inter excrementa tunicarumamenta conspiciuntur; sicuti inter vomitiones vlcera crustæ cernuntur ex stomachi vlcerebus: qui acri cibo assumpto, protinus læduntur, quo intestina tenuia non læduntur. Quibus stomachus supra modum exulceratur, numquam sanantur: & si vetus vitium est, lienteriam inducit, aut ex acutis humoribus vel corruptionibus, dysenteriam minatur: iis plerumque os graue olet, uti apud Dodonæum cap. 25. de honesta matrona constat, annos (plus minus) 40. nata, quæ ex ore foetentem spiritum multis emiserat annis; quæ longo tempore morbo confecta è vita decessit:

& ventriculus extërius ab omni parte superficie tenus inuentus est exulceratus, & quæ ipsum contingebant vniuersa, non tamen alia, quam qua ventriculo contingua erant, parte. Exulcerato stomacho (ut Paulus scribit) in omnibus quidem edulis oblonisque acria vitanda sunt: atque eadem pariter in potionibus. Sed mitigatoria vique laudantur, quales pulles sunt sine oleo, ex amylo, hordeacea farina, ac terra. Samia Lemniæque rubrica, ex lacte aut melle. Et quoque sine medicamento mordaci purgandus est æger. Noltri recentiores, præter acris temperamentum, animi securitatem laudant, ac temperatum somnum. Ac inter cibaria quicquid actu vel potentia leuiter exsiccat, qualis panis simlagineus est, sine sale, sineque multo fermento, ac ptisanæ, alia, far ac amylo, lens excorticata, oryza, & faba fracta. Auicula quoque profunt, ut galienus, perdicæ, atagenes, phasianus, turture, turdique; inter quadrupedes, lepores immares, capreoli, hedi, vulgus, verneceq; imunes: laudauere & intestinorum hædi ac viruli ex aceto conditura, ac eorumdem extrema pariter condita, tum oua sorbilia in aceto cocta, aut caseum recentem: vel ipsum lac, cum abstergere volumus, cum ferro ignito aut lapidibus. Ignitis vlcera sanat, vinum rubrum subacrum, virium, ex aqua in qua chalybs ignita multoties extinctus fuerit; vel ipsa eadem aqua cum syr. ros. valet & in ipsis cibariis posita. Initio enim abstergenda sunt vlcera tum cibo tum potione: tum styptica damnant. Tum cum vlcera persananda sunt, styptica damus: prodest panis cum mastiche, aut balauistiis confectus: & caro ipsa veru assata, ex cydoniorum succo, aut mali punici vino, vel cum omphacio vix. Sorba quoque immatura arida in puluerem redacta dantur in ædulis. Ex potionibus, quæ mordacem humorem compescunt, singulis propinamus. Interea vomitiones & cathartica vitamus. Si purgandus, sufficit cassia. Quibusdam valentibus adhuc, profunt venæ sectio, vel vrinam ciere. Si eueniat ex destillationibus, iis succurrendum, ut dictum est. Abstergunt zaccarum cum aqua; vel mel, vel mulla, cum passulis. Si vlcera sint in gula aut ore stomachi, ad glutinantia admiscemus: ut antequam in ventrem descendant, hæreant, quale gummi arabicum est aut tragac. ac si in imo fuerint pura, vno haustu assumi debet. Rupto vero apostemate, lac caprinum mane in potu valet, si recens ac tepens fuerit: ante cenam vero duorum horarum intervallo hordeaceam cum zaccaro rosaceo aut melle damus. Quæ in omnibus fere vlcerebus generibus calidis ac æstate offerimus: hyeme vero ac materia frigida, rhodomelite vitum salubriter percolato: aut hyssopi decocto cum melle. In phlegmate vero falso, aqua brassicæ opus est, aut oliuarum muria: modus est à quatuor ad sex uncias. Mundis & absteris vlcerebus, quæ vulnera consolidant damus, pastillos ex succino. Quæ ad œsophagi vlcera valent, prius dictum est: reliqua vide apud Arculanum, & Alexandrum Veronensem, qui eadem habet. Balnea ferrata & aluminata laudantur. Vlcerebus vetustis, ex quibus corrupti humores fluunt, oliuæ & rutæ folia, ac agrimonie in nigro vino cocta ad duas partes, percolato decocto, mane & vespere detur ad 3vj. vlcera enim omnia interiora sanat. At si stomachus erosionibus perforetur, iis præfidiis vtetur, quæ in sanguinis vomitu diximus. Si fluxus acciderit ventris, valent trochisci ex spodio: quo tempore adstringentibus opus est. In vehementi vlcere-

vlcere tormento, philonium ocyssimo præfidiū iuvat: exicando plurimum refragatur vlcerebus, ac absumendo humores fluentes. Alij athanasia compositionem prætulere: & ad vlcera & ad ruxum Paulus dat cydonium malum cum pulce.

OBSERVATIO XXXIV.

De stomacho natura angustiore.

Vidi, inquit Gal. lib. 2. artis parue, ventriculum cuiusdam ita paruum, rotundum, ac pensum in illa, ut propria circumscriptio perspicue appareret spectanti & attrectanti. Ita & apud nos puella quædam Delphica perpetuo mala habebat in stomacho: nam à natura angustior factus erat. Quem his notis deprehendimus: nam plurimo cibo distentus stomachus lædebat: sed exhibitio exiguo cibo, idque frequenter, minus offendebar, & commodius tunc cibum concoquebat. Hoc autem innatum vitium, iuxta Galenum, immedicabile iudicauimus: & ideo eandem incuratam reliquimus. Tandem in mandatis dedimus, ut parum & frequenter cibum concoctu facile sumeret, ut minus dolore afficeretur.

SCHOLIA.

Sunt autem & naturalia vitia incorrigibilia: ut si stomachus natura angustior factus fuerit: cuius notas nunc posuimus. At si venter natura laxior est, cibus intus importune innat: nec in coquendo quod satis sit, corrumpitur stomachus: ita enim à natura materia diminuta, aut nimia efficitur: plurimum tamen cibi sustinet magnitudo stomachi. Si instrumentarij morbi sunt. Parem offensionem habet stomachi rotunditas; in quo cibus grauior sentitur, qui ad ima haustus protinus delabitur. Ventris quoque positus notatur: nam si ad extrema vergat, aut nimium diaphragma supprimat, damnat: quoniam ille concoctioni, hic respirationi aduersetur. Inter instrumentarias quoque affectiones annumeratur staminis leuior contextus; vnde & naturalis calor infirmior redditur: textura tamen aliqui crassior quam par sit, ad concoquendum incongrua est: rugas enim eo modo difficulter contrahit: tenuitas ipsa, aut ex humilitate laxante; aut siccitate consensu generatur, aut calore continuante absumitur; ut in morbis longis accidere solet: ex frigido quoque (et si raro contingat) extenuatur venter. Est & aliud stomachi organicum vitium, nimia quædam stomachi asperitas, aut aliquibus leuitas importuna, qua cibus ad intestina citius quam opus sit, labitur. In illa venter asper est, veluti in bubus, denticulatus callus est in ore, & in ventre, vbi crenes maxime conspicuæ sunt: in homine multo minoris ad os stomachi, ut scobina fabri, læuior asperitas, sicuti pyloron versus in medio in modum rubri ad conficiendos cibos extans callus cernitur: nec in omnibus pares crenes (ut vidimus) apparent; esse etiam Alexandro Veronense. Noltri recentiores non ad concoquendum cibum, sed ad retinendum facere putant; vnde nimia asperitate, qua diutius cibus retineatur, siue nimia leuitate, qua cito profluat, corpora facile consumitradidere. Asperitas pinguibus, molli- busque cibis, altera stypticis leuatur. In positu aliud quoque vitium est naturale, qui tumor ventris dicitur: extrinsecus enim prominet, prouli-

Ret. Fores. Tom. 2.

OBSERVATIO XXXV.

De ventriculi cruditate.

Puella annos 24. nata, textoris filia, nobis vici- cina, aliqui pulcherrima, facie supra modum pallida, ventriculi cruditate longo tempore laborabat; cibum non concoquebat, neque recte permutabat: Lotium in ea valde crudum, album, in- concoctu, sine hypostasi spectabatur: ructus perpetuo emittebat, & subinde acidus: si nulla premebatur. Hæc cum adesset, facile intellexi, hanc cruditatem procedere ex ventriculi frigidi- tate, & simplici intemperie frigida, etiam humi- da admixta: nam facile cibus in stomacho cru- dus innatabat; quem subinde euomebat, tamen rarius, frigidity magis superante. Vsa fuerat longo tempore cibus crudis; & ut ab aliis intel- lexeram, victus rationem non obseruabat. Hanc autem, ne in maiorem cruditatem incideret, ad- monui, ut neque in multitudine, neque in quali- tate eorum, quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis oportunitate, neque in ordine delin- queret: & ut quæcunque concoquere valeret, ea tantum ingereret; & non quæ appetitus expostu- laret. Propterea recte dicebat Aëtius, ne quis in cruditatem incidat, cautione in omnibus prædictis est vitandum, ut neque in multitudine eorum, neque in quali- tate, neque in ordine sumendi delinquant; & ea tantum ingerant qua concoquere possunt. Mensuræ itaque ut maxime omnium curam habere imperaui, & ap- petentiam refrenaret, neque plus quam vires to- lerarent, acciperet. Iuxta quoque tempus acci- piendi cibi neque impetuoze, neque acuatim, neque solidis partibus, aut absque commanduca- tione eos ingereret: neque etiam potus cibum in- terpellaret, id enim vñionem ciborum impedit, singulosque ventri innatare facit: ut idem Aëtius refert. Iussi præterea, ut & ordinem præpositum eaueret, ne scilicet mala cotonea aut punica, aut aliquid aliud tale inprimis ingereret, deinde vero olera assumeret, aut alia quæ aluum emollirent: nam & intempestiuam assumptionem euitare oportet: ne antequam hesternus cibus probe def- cenderet, pranderet, aut etiam præter consuetam horam. Cum enim nulla exercitatione sese exer- ceret, peius habebat, nam sedentaria erat, & sar- trix. Tales enim semper desides, hoc malo magis afficiuntur, quam aliæ puellæ, quæ ambulando vel aliter se exercent. Concoctu difficilia quantum posset vitaret, etiam admonui: ut sunt carnes na- turæ dura, salsa, fumo indurata, bubula, aut etate serio- res. Et ideo abstinere iussi quantum posset à pin- guibus, salitis ac vetustis, & ab oleribus frigidis, quæque flatu pariunt, à cibis corruptis, foetidis, ac graueolentibus, ac fructibus, dulcibus flatuque ge- nerantibus, & immaturis, bellariisque quæ diffi- culter concoquuntur, & cibis peregrinis & in- consuetis, placentis. Deinde ut post assumptum cibum, motus inæquales ac conturbantes vita- ret, consului, & æstum nimium, ac refrigeratio- nem: hæc enim concoctioni ciborum resistunt; Sed ut præcipue hypochondria ac pedes mode- rate calidos custodiret: manuque inter dormien- dum os ventriculi apprehenderet: id à Gal. magis

Dd iij laur

laudatur, s. de med. simpl. fac. cap. 5. quam calor ille, qui à fomentis paratur. Somnus & quies his conferunt, & erectior decubitus: & ea quæ capiti subijciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistram latus fiat. Frequentes agitationes etiam si vigiliis instentur, cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt. Sed cum hic intemperies frigida esset & humida, tam aer quam cibus, & alia magis ad caliditatem & siccitatem vergant: & sic potius assis quam elixis & valde humidis vteretur, iussimus. Et cum intemperies simplex facile tollatur, amotis causis, ut de imbecillitate diximus, ideo hanc frigiditatem calidis curare nitendum esse duximus: & cum vna humiditas adiuncta esset, etiam siccantibus: ideo & aromata concessimus, & carnes assas cum aromate conditas. Et exhibuimus diatrion piperon & diacalamentum cum vino, vel, quia non satis diues, cum ceruisia, in qua decocta erant hyssopus, mentha, absinthium, & calamintha.

Sic alteri puellæ eodem malo laboranti, magis diuiti, sequens claretum commode dedimus: *℞. cinnamomi electi ʒss. zinz. ʒj. maceris ʒss. nucis muscata ʒj. caryoph. piperis longi, gy. mor. paradisi ana ʒss. cum vini Rhenani vel alterius odorati lbj. fiat claretum, addito zaccb. ad ʒviij.* Puellæ vero prior, cum non ita diues esset, etiam dedimus decoctum absinthij in ceruisia coctum: & ventriculum commode inunximus oleo nardino, mastichino, & absinthij: adiecta cera exigua: apposito cerato ex mastiche, speciebus aromaticis quibusdam adiectis, & oleo nardino. In eiusmodi male coloratis & non concoquentibus cibum, hoc puluere commode utimur: *℞. anisi ʒij. seminis fœniculi, cinnamomi, cardamomi, zinz. ana ʒj. spicæ croci, basiliconis, carui sem. apij, petros. ana ʒss. limaturæ ferri preparati, ad pondus omnium adiecto zaccbato, fiat pulvis: detur ante prandium ʒss.* Appetitum excitat, cibum concoquit, stomachum calefacit; ventositates dissolvit, frigidos crassosque humores ad intestina pellit, colorem plumbeum corrigit, bonumque reddit, ac sanguinem purificat. Hic pulvis quoque sæpe expertus dicitur ad male coloratos: *℞. limaturæ ferri preparati ʒvj. cinnamom. ʒij. spec. diatrid. abb. succini ana ʒj. zaccb. ʒss. fiat pulvis.* Hic quoque valet decoctum azari & alia diuretica, cum in talibus sanguis aquosus fiat ob improbam concoctionem. Etiam his sequens decoloratis conualecentibus prodest. *℞. specier. diatrid. abb. carabe, cinnamomi ana ʒij. sem. anisi ʒj. galangæ ʒj. limaturæ chalybis preparati ʒvj. zaccb. lbj. misce.*

SCHOLIA.

Complura sunt, quæ concoctricem facultatem lædant: sicut enim concoctio alteratio est, qua stomachus sibi cibos assimilatur: ita cruditas, seu mala concoctio est, ubi à scopo illo degenerat. Hoc autem fit trifariam, inquit Galenus, vel quia nihil immutantur cibi; & hanc quidem proprie cruditatem dicunt: vel, quia non mutantur perfecte; & hæc bradypepsia nominatur, quando etiam semicrodi manent: vel, quia in alienam qualitatem mutatur: quæ dyspepsia dicitur. Hæc vero duplex est: vel enim in acidam qualitatem vertuntur, (ut iam sepe diximus,) etiam de stomachi imbecillitate: vel in nidorofam. De his vide Galen. & præcipue de alteratione seu concoctione (qua nihil aliud est, quam ciborum in convenientem animalis qualitatem alteratio) lib. de diff. symptom. Cæterum accidit quandoque frustratio: quæ qui-

dem alterationis, seu concoctionis symptoma est, eodem Galen. teste 3. de causis symptomatum. Verum quum frustratur, propterea, quod nulla omnino alteratio fiat, id symptoma præcipue à Græcis ἀνέψια, à Latinis cruditas nominatur (modo quo in animi functionibus immobilitas, & insensibilitas dicitur,) significantibus his vocibus actionis amissionem ac priuationem. Quandoque vitiosa alteratio fit, quæ iterum à Græcis ἀνέψια, à Latinis quoque cruditas appellatur: significatur tamen non sicut prius priuatio, sed deprauatio duntaxat ipsius alterationis. Atque hæc rursus deprauatio duplex esse potest, vel quod tarde & non conuenientem mutationem cibum suscipiat, vel quod corrumpatur omnino, ita ut naturæ gratiam prorsus recipere nequeat. Priorem quidem Græci βλαβερὰν, Latini talem concoctionem nominare solent: secunda vero nomen proprium non inuenit: ut patet eodem 3. de causis symptom. Sed quamuis diximus ἀνέψια nominari posse tam priuationem concoctionis, quam etiam eius deprauationem: tamen æquiuoce, quæ vitiosa facta est, cum ea, quæ omnino non fit, sic nominatur. Propterea clarioris doctrinæ gratia priuationem alterationis ἀνέψια: eius vero vitium βλαβερὰν sicuti tarditatem seu imbecillam alterationem βραδυπέψια nominabimus. Omnes tamen vniuersali vocabulo, poterimus iuxta Alimmarum vocare cruditates: cum in qualibet earum concoctio ipsa frustretur: & ex eisdem fere causis oriatur: maioris duntaxat & minoris rationibus dissidentibus. Venter hic secundum eius spatium seu cavitatem oblatum est: cum & ipsum concoctionis instrumentum sit à natura fabricatum, quomodocumque concoctio vitiosa fuerit, modo vitia eiusdem à quopiam externo errore non proveniant. Fieri namque poterit cruditas aliqua (ut dicemus) absque hoc, quod ventriculus afficiatur, ut apud eundem Galenum liquet 1. & 5. de loc. affect. tum 3. de causis symptom. Erunt itaque facultate ipsa oblata prædicta symptomata in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis videlicet. Verum in vno symptoma, ut puta in βραδυπέψια ipsa actio erit diminuta: in ἀνέψια, ablata, & in βλαβερὰν deprauata. Duo autem priora symptomata facile dignoscuntur: nam ciborum assumptorum qualitas, siue ructare velint, siue vomere, plene seruat: licet in βραδυπέψια acidi quandoque ructus fiant: interim ventriculus habituosus impletur spiritu. Verum depravatam concoctionem vitium iucundus proueniens, manifeste indicabit: qui modo vnum, modo alterum vitiosum saporem præ se fert. Et si per alium corrupti cibi deiciantur, necessario aderit deiectionum graueolentia. Exempla infra scripta hæc melius indicabunt.

OBSERVATIO XXXVI.

De duobus agris ægre cibum concoquentibus.

Stomachus (ut iam diximus) aliquando ægre cibum conficit & immutat, aut ferius, quam naturale sit, concoquit. Ut nuper accidit in iuvene quodam, qui consilij causa nos accedebat & conquirebatur de gravitate & præcordiorum inflatione, & quod diutius indigestus cibus in stomacho detineretur, nobis notam vehementioris imbecillitatis ostendens: decem enim horis quandoque incoctus permanebat: idque vitio humoris calidi: nam stomachus morderi, ac erodi, in nauseam effundi videbatur, vento intrus-

murmurante: ructu quoque ad os ex imo ventre, prorumpente, fumido & grauiter olente: caputque huic graue erat: & quiescere nesciebat: siti urgebatur, vola vtræque feruebant, cum cibi tactu. Huic longum somnum vitalem esse diximus, & ut in quiete maneret, sine exercitatione, & ut in latere sinistro dormiret. Id enim mire ex Aristotele conuenit: & rursus in ventre redormire, plurimum ad concoctionem facere, quidam volunt. At tamen, qui in dextro latere somnum ineunt, alio magis cōsulant. Sed ambulationes somnum antecedere debent, quoad cibum ad imum ventrem resideat. Et quia videbatur hic materia aliqua biliosa, erodens, & quod nauseam pateretur, ubi cibus inconcoctus permaneret, nec alio auxilio iuuaretur, aqua hord. tepida cum syr. viol. expellendam esse proposuimus: quod si difficulter vomeretur, ob nauseam: infusum rhas. vel syr. ex infus. ros. pallid. cum rhab. ut fumeret præcepi: & ventre exonerato, ut stomachum roboraret, vino mali punici, medijs saporis sumpto; ac ut edulsiis acetosis acidulsiq. iuuaretur, vinoque austero nullarum virium epoto, & aqua ante infrato. Propter capitis dolorem etiam fronti adhibui oleum ros. exiguo aceto infusum. Ac stomachum inunximus oleo ros. myrt. emplastro imposito ex malo colon. baccis myrt. santaliq. farin. & spod. pulu. inspersis, oleo ros. vinctis & cera q. s. vel absque malo colon. Quibus prædictis hic iuuenis bene habuit. Quem admodum & alter, qui ex humore frigido acidum ructum emittebat: ac sapor in ore acidulus erat. Huic, cum pituita etiam ventriculum gravaret, decoct. absinth. sumpto, cum oxym. cumque ad vomitum procliuor esset, decoct. raphan. exhibui, cum oxymel. tepide. Rursus post ment. calam. melissæ, absinth. decoctum, purgavi cum pil. infra scriptis: Recipe pil. de hier. Gal. pil. stomat. ana ʒj. pil. de agrie. rhab. electiss. ana ʒss. cum syr. de ment. fiat pil. vij. denur mane. Postea capiebatur aromatic. rosa. & subinde utebatur vino generoso, & diatrionpi. & stomachum inungebat ol. nar. & spic. Atque itis tum alij, his vel similibus remedijs, à mala concoctione & imbecillitate stomachi à causa frigida, conualuere.

SCHOLIA.

Causa autem eorum symptomatum (etiam diatrion scholio præcedente) communis, alteratricis facultatis frustratio est. Prima vero eiusdem frustrationis causarum genera duo sunt, ut Galen. lib. 3. de caus. symptom. inquit: Alterum ex facultate ipsa læsa: alterum ab externo quopiam errore proueniens. Virtutis autem læsio adhuc bifariam esse potest: aut culpa proprie substantiæ, ex aliqua primarum qualitatum intemperie: ut pote cum præter naturam calefacta, infrigidata, humectata, aut exsiccata fuerit. Vel læditur virtus ipsa ab aliquo instrumentali morbo, ut erysipelate, phlegmone, œdemate, scirrhus, abscessu, & alijs eiusmodi: quorum omnium occasione, venter facultate eius concoctricem oblata male concoquit. Verum in eiusmodi ventriculi temperamenti vitii propria eius substantia labefacta, concoctio læditur: in cæteris morbis, qui tantum sunt instrumentales, duntaxat impedita. Quæ vero ex intemperie simul, & instrumentali morbo compositi affectus sunt, utroque modo sunt noxij, ex sententia eiusdem Galeni præcitato loco. Ex tot itaque internis causis affectus ventriculi male concoquit: ut doctè etiam annotauit Alimmarus cap. proprio de cruditate. Verum ipso minime affecto, à nonnullis

etiam causis concoctio impediri potest: ut propter cibi ac potationis immodicam copiam, vel propter eorum qualitatem alienam, aut summptionem intemptiuam: intelligo acceptionem ciborum, antequam prior cibus probe subiret, ac etiam præter consuetam horam, similiter propter incongruum ordinem, vel somnum exiguum, & immodicas vigilias, exercitationesque mox à cibo factas: aut vitiosum excrementum. Quamquam si ex eo concoctionem frustrari contingat (etiam ventriculo minime affecto) inter internas causas connumerari debet. At si ex immodica cibi ac potationis copia, vel praua eorundem qualitate, seu intemptiuitate, vel incongruo ordine aut exiguo somno, haud ægre à laborante ipso seu æstuante percipi poterit. Interim vero, ubi corruptela assumptorum sequatur, ex ipsa corruptionis differentia alimentorum qualitas præsumpta argui poterit: nam si in fumosam qualitatem corruptela vergat, argumentum est ex calidioribus magisque biliosis cibis prouenire: si vero ad acidam, ex iis, qui frigidiores natura sunt, magisque pituitosi. At si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transmutentur, & quispiam fumosum ructum emittat, efficiens huius causam, calidam ipsius ventriculi intemperiem esse, coniciendum erit. Si vero saporem acidum referat, eam frigidam esse necesse est: quamuis similiter in excrementis fiat, cum in ipso ventriculo contineantur. Nam acidas qualitates quidem creant, quæ pituitosa sunt & frigida: fumosus vero, quæ calida & biliosa, ut liquet eodem 3. de caus. symptom. Ut vero distinguas, utrum intemperies aliqua duntaxat calida vel frigida, an vitiosus quispiam humor ventrem infellet, dare oportet cibos, qui suapte natura, modo incorruptionis, quam maxime aduersentur, ex Galeni auctoritate 1. de loc. affect. ut panem illis, qui in fumum transmutare cibum consueverant; mel autem iis, qui acidum à cibo saporem percipiunt. Deinde considerare excrementa, tum ea, quæ euomuntur, tum quæ per alium deiciuntur; num humor aliquis cum illis quidem biliosus ac calidus, cum iis autem pituitosus ac frigidus excernatur: an nullo vacuato humore, ipsa exigua quandam mutationem habeant. Nam si sine humore, perquam exigua in ipsis facta mutatione, deici videbis, intemperie duntaxat ventriculum laborare percipies. Si vero humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videbis cibos huiusmodi humore leuissimos, & ab ipsius ventriculi actione manifestius alteratos. Verum ubi in tunicis ventriculi impactum contineatur excrementum, id quod ex inani nausea, sine vomitu, quæ irritat duntaxat & nullum humorem euacuat, dignosces; si calidum fuerit, præter nauseam, sitis vehemens aderit (ut iam sepe dictum est) & interdum febris, si frigidum, maior ciborum cupiditas excitabitur, nec siti, nec febri affligentur. Intemperie calida aut frigida breui eo perducitur ventriculus: in humiditate & siccitate non ita actionem amittit, nisi prolixo temporis spatio: eodem Galeno teste 3. de symptom. causis. Signa hæc intemperiei & humidæ, uti & frigidæ & calidæ, diximus de imbecillitate ventriculi. Humidam itaque intemperiem, præter ea, quæ ibidem diximus, hydrops plerumque præcedit: uti & siccam, senium vel marasmus: eodem Galeno auctore. Si vero ab instrumentalibus quibusdam morbis prædicta symptomata oriantur, ex eorundem instrumentalium morborum proprijs indicijs cognoscantur: de quibus satis in præcedentibus quoque

Signa causarum ab errore commisso.

Ex corruptela assumptorum. Si ob calidam aut frigidam intemperiem ventriculi fiat cruditas signa.

7

8

De siccitate & humida intemperie.

Signa morborum instrumentalium.

Dd iii; dixi-

Causa bra-
dyperstie.Causa pro-
pria ape-
stie.Causa dy-
perstie.

Prognostica

30

31

Causa dy-
perstie.

diximus. Sed, quæ ex iam dictis symptomatibus magis parata sint hæc incitare, videndum est. Sciendum est autem, quod promptius *Causa bra-
dyperstie.* oritur exiguus somno, ex cibis, qui difficulter cor-
rumpuntur, & si ultra, quam vires tolerant, su-
mantur; iuxta *Galenum & Aëtium capit. 24. lib. 9.* Quæmadmodum, ubi citra corruptelam conco-
ctionis omnino privatio sit: ita, ut quales accepti
sunt cibales permaneant, iuxta omnem eorum
qualitatem, proprièque *Causa propria ape-
stie.* dicitur, scire licet
prorsus superatum esse ventriculum, aut ob im-
modicam ciborum multitudinem, aut ob virtutis
imbecillitatem, aut à valido frigore, aut ob ve-
hementem in siti caloris refrigerationem; ut *apud
eodem liquet.* Adeo enim in tali statu venter non
concoquit, ut etiam concoquere prorsus non ten-
tet. Circa mediocres etiam, & consuetos cibos,
si nihil in totum effecerit ventriculus, maximam
eiusdem esse intemperiem prodit. Cæterum si
cum corruptione cruditas oboritur, quæ proprie
*Causa dy-
perstie.* dicitur, ex calida vel frigida intemperie,
præsertimque ex calida excitatur, cum nullum
esculentum calefactum durare impetere possit, ut
constat *apud eundem Galenum.* Similiter oritur ex re-
crementis calidis aut frigidis, aut vitiosis cibo-
rum qualitibus iuxta ventrem consistentibus:
aliquando etiam ex inordinata sumptione cibo-
rum, aut potuum, aut intempestiuitate sit, ut
apud eundem Aëtium patet. Ex quibus itaque cau-
sis, quodlibet prædictorum symptomatum oriri
paratum sit, ex his liquido constat. Nunc ad
prognostica accedamus. Cruditas assidua maxime
vitanda, cum ex ea vitiosi humores, morbi-
que gignantur, siue ex boni, siue ex mali succi cibus
fuerit orta: quanquam ea deterior sit, quam vi-
tiosi succi cibaria effecerunt: ut *liquet apud Gale-
num lib. de cibis boni ac mali succi.* Aque mala quo-
que est in amara bile redundantibus cruditas: sci-
tissime enim febrem accendit: quodcumque ta-
men prædictorum symptomatum ex cibis oritur,
ex facili corrigetur. Mala quoque intemperies
stomachi, postquam est inueterata & antiqua &
confirmata, curationem non recipit. Quod autem
ex ultimo virtutis collapsu in lenteriam, aut
tympaniam hydropem finiatur, testis est Gale-
nus, eodem 3. de causis symptomatum. Omnes quo-
que magnæ ventriculi intemperies, veluti &
aliarum partium, virtutem deiiciunt; ut *ibidem
patet, & comment. aphor. 20. 2. lib.* Et propterea
cum circa mediocres, & consuetos cibos nihil in
totum effecerit, maximam ostendit ventris in-
temperiem. Pessima in amara bili; in qua cibi in
nidorulentam & fumosam qualitatem corrup-
pantur: quando ea, quæ in acidam vertit, ut ra-
ro talibus naturis contingit, minus nocet, *Galenus
autore 8. meth. med.* Nidorosa ac fumosa cruditas
tunc minus noxia est eisdem, si alius lubrica fue-
rit: sin astringitur gravis est: si quidem ex adstri-
ctione eius vitiosæ naturæ, in febres prompte in-
cidunt; præsertim si ad solita conuertuntur ope-
ra, eodem *Galenus teste.* Omnia etiam prædictorum
trium symptomatum pessimum est *Causa dy-
perstie.* vitio
facultatis fiat: sicut *apud Aëtium* minus affert peri-
culi. Ex assiduis cruditatibus colicæ & iliacæ
passiones contingunt. Ex corrupta digestionem seu
concoctione, *hydrops, carcinomas, herpes, noma, erysi-
pelas, viriligo, lepra, scabies & similia, ut quidam volunt,*
oriri solent. Sic ex corrupto succo sanguis cum
cæteris humoribus corrumpitur. Et sanguis cor-
ruptus, omnium pessimus est. Quod ad curatio-
nem attinet, qualis vitus omnibus communis
sit, *Observ. 34. præcedente diximus.* Diversa tamen

ratio vitus pro causarum diversitate, uti & me-
dicamentorum, præscribenda est. Quæ autem
conveniunt frigidæ, calidæ, & sicca, & humidæ
intemperiei, ea petenda ex iis, quæ imbecillita-
tem ventriculi curare possunt: & si sit cum hu-
morum abundantia, ex iis quoque, quæ ibidem
diximus, tum etiam de nausea & vomitu, quomo-
do tales sint curandi, facile intelliges. De imbe-
cillitate itaque ventriculi, tum etiam, quæ dicta
sunt de nausea, vomitu, quæ alterant, purgant, ac
roborant & corrigunt intemperiem, & quæ ex-
crementis corrigendis satisfaciunt, conscripta in-
uenies. At si ex aliquo instrumentali morbo præ-
dicta excitentur symptomata, nemini dubium
est, quod in eorum curatione, & ipsa quoque de-
lentur: aliam enim inflammationem, aliam erysipelas,
aliam abscessus, & scirrhus requirit: de quibus om-
nibus in præcedentibus dictum est. Verum, ubi ex ali-
mentorum multitudine, quæ concoqui nequit,
aut eorum vitiosa qualitate cruditas fiat, conse-
ntim procurandum erit, vomitu, aut purgatione
per infernas partes, ipsos expurgari. Eiciendus
etenim est cibus, si coeuit intus, aut computruit,
ex *Celsi auctoritate, lib. 4. cap. 5. modo suapte natu-
ra vomant:* nam cogere eum, qui vomere non po-
test, absurdum est ex *Galen. 1. de loc. affect.* Si faci-
le vomant, ut promptius id fiat, danda illis sunt
aque tepidæ multæ, paucæ aceto aut syr. acetoso
permixto, seu oxymelite: at si vomere haudqua-
quam valeant, præsertim ubi multum aut cor-
ruptum nutrimentum notabiliter ad inferiora
ventris sit motum, adiuvandum est, ut citius
descendat, aut glande subdita, aut leui per infe-
rius infusione, per clysteres videlicet, ut *8. meth.
medend. à Galen. scriptum est.* Veluti etiam, si cru-
dum, aut diminute concoctum in superiori ven-
triculi parte alimentum adhuc consistat, modo
concoqui possit, aliquid diatrion piperis con-
simplicissimo quidem modo, quo ab eodem *Gal.
4. de sanit. tuend. scriptum est,* vel si id haberi ne-
quit, tantundem piperis longi aut albi, si hoc ad-
sit, aut nigri exhibere convenit. Similiter extrin-
secus adhibitis concoctio iuvanda erit, ut si ex-
pansa manu (ut paulo ante admonuimus) os ventris
apprehendatur, aut puerulus carnosus admo-
ueatur: ut *Aëtius refert.* Vide de his *Galen. 5. de
simpl. & 7. meth.* ubi scribit, & humanum corpus ille
impositum iuvasse. Alij in quiete paruus catellos
ventri imposuere. Sed puellus ne sit humecta-
ture; sudore profuso refrigerant potius quam
calfaciunt, inquit *Gal. Valens & calida exterius
adhibita:* quorum sylvam inuenies in præceden-
tibus, & apud *Gal. 8. meth. conscriptam.* Quod si
non modo ex alimentorum prava qualitate, sed
intempestiuitate, aut inordinata eorum sumptio-
ne, seu exiguus somno, cum corruptela cruditas
generetur, non alia ratione curari debet, quam si
ex prædicta alimentorum vitiosa qualitate, aut
multitudine fuisset excitata. Illud tamen parti-
cularim attendendum erit, quod quibus ob fluxu
bilis copiam in ventriculo contentam, vel cali-
dam admodum eiusdem intemperiem *Causa dy-
perstie.* sen-
cruditatem cum corruptela accidit, cibos cor-
ruptu difficiles, difficileseque concocti offerre
conuenit. Nam quæ concocti difficilia sunt, non
facile alterantur, ac corrumpuntur. Sed si in
multum calorem inciderint concoquantur ma-
gis, quam si moderato occurrerint, ex *Galen. de-
creto 1. de aliment. facult.* quod etiam confirmavit
Celsus eodem cap. 5. lib. 4. Hæc libuit hic addere
ex *Altimaro.* Sed exempla subsequentiū variā
esse curationem pro causa adhibendam ostendit.

OBSER-

OBSERVATIO XXXVII.

De quodam ex cibo corrupto in stomacho existente, labo-
rante digestionis corruptione.

Quidam hoc tempore cum circa stomachum
male haberet, & cum excrementa, aut ven-
tris crepitus statusque supra modum & præter na-
turam olerent, corruptam digestionem seu con-
coctionem animaduerti. Hic enim præcipue ex
edulis quibus delectabatur, nempe piscibus, ru-
tus acidus emittebat: quod signum erat frigidæ
intemperiei ipsius ventriculi. Deinde cum ex lie-
ne (nam subinde in hypochondrio leuem obstructionem
seu dolorem sentiebat) melancholicus humor ad ven-
trem effunderetur, cibum magis corrumperebat:
quod non solum ructus acidi, sed ea, quæ cum ci-
bo euomerentur, subinde aciditatem habebant.
Quamobrem huic, cum nauseabundus esset, per
vomitum prius cibum corruptum, deinde per
ventrem educere decreui. Post cibum assumptum
dedi decoctionis betæ, auriplicis, sicum 3 iij. syr. ace-
tos. simpl. 3 j. oxymel. 3 ss. prius inuncto ventricu-
lo, ut paulo laxior esset, cum oleo amygd. dul. ut
melius euomeret: facile enim vomerebat. Postea
dedi decoctionem betonicæ, menthæ, absinthij, hyssopi, ad-
diti syr. acetos. simpl. & compositi: & comode eum
purgavi cum pilulis de hiera cum agarico, & pilul.
arom. mastich. ana 3 j. cum syr. menthæ; consi-
ciendo pilulas septem. Lienem inungebam cum
oleo de capparibus. Et ventriculum quoque cor-
roborabam cum speciebus diagalangæ, & aroma-
tico rosato; exterius inungendo cum oleo men-
thæ, absinthij, & maceris adiecta pauca cera:
superimposito deinde emplastro seu cerato ma-
stichino.

SCHOLIA.

Diximus digestionis corruptionem fieri, cum
in stomacho cibus boni succi corrumpitur,
aut aduritur, aut acore, vel terro sapore vitatur,
quem exinde natura refugit. Cibi vero qualita-
tem acidam faciunt pisces, caroque gelu coacta:
ut & qualitate fumosam, mel, raphanus, allia,
nasturtium, sinapi, & similia; & oia stricta faci-
le in fumum mutantur. Sæpe vero in conuale-
centibus, materia acetat & reciduat minatur,
reliquis putrescentibus: quod in acutis febribus
male pronunciat ex caloris defectu; at in longis
morbis diuturnitatem morbi prælagit. Contingit
aliquando, imo sæpius, & ventriculi debili-
tatem & malam concoctionem siue ciborum cor-
ruptionem relinqui in conualecentibus, morbo
acuto seu longo superato; aliquando quidem
tantam, ut neque assumat alimentum, aut assump-
tum non elaborat: estque indicium reliquias
morbi relictas in causa esse, quod suctionis sen-
sum non percipiat: alias autem quoque accidit,
ut suctionis sensum percipiat quidem, quæ à
membris extenuatis ipsius corporis sit, eaque ra-
tione alimentum expetit, elaborare tamen as-
sumptum non potest, ob debilitatem relictam.
At in sanis hæc eadem contingunt ob nudam in-
temperiem, ut diximus, vel cum materia: sicuti
enim acescunt ructus ex causa frigida, ut diximus;
ita & fumosa superfluitates sine cibi vitio, ex
calore malum oriri significant. Agneta ex cali-
da habitudine frigidam cum omphacij succo dari
suadet, aut cytoniorum malorum decoctum.
Sed de his, uti etiam de bile, si cibos corrumpat,

illa ipsa, aut vomitu deiicienda; aut leuiter per
alium expurganda, denuo roborato ventriculo;
ut iam sæpius dictum est: quibus adiungere pote-
ris ea, quæ nos de imbecillitate ventriculi prius
diximus, & quæ ad longum referuntur apud Be-
nedictum Veronensem lib. 13. c. 1. 2. & 3. de imbe-
cillitate stomachi eiusque notis & curationibus, & quæ
idem de ægre concoquentibus & vitiosa conco-
ctione agit in eodem libro. Interea diligenter
cauendum, ne frigidissima etiam in bile, aut ex-
temperie calida stomacho affecto applicentur:
cuius vide exemplum apud Benuenium de abditis
morbis causis cap. 15. de quodam, cui ex incuria
medici emplastrum frigidissimum stomacho ap-
positum fuit, morte subsequente; & cap. 15. de
quodam interempto ex frigidissimo aqua potu:
de quibus alias diximus, tum aliis quoque & lib.
1. obser. nostrarum de febr. scholio obseru. 13.

OBSERVATIO XXXVIII.

De stomachi resolutione.

Is aliquando in stomacho attrahendi, vel
ex toto corrumpitur, vel læditur: aut enim
(ut *Galen. docet*) nil attrahit, aut ægre, aut parum
trahit, ita ut ex toto auferatur aut diminuat,
aut omnino corrumpatur. Id vitium aliqui resolu-
tionem vocauerunt, quod æsophago (ut alias dixi-
mus) plurimum euenit: morituri enim aut omnino
defecti viribus, nihil deuorant, aut difficulter
assumunt. Idem & in perniciosis febribus vel ipsa
inflata crisi extraordinaria & præter naturali fri-
giditate vel humida addita resoluente; aut calida
& sicca rarefaciente, ut in acutis contingit febrili-
bus, in quibus sine alio faucium vel gutturis
vitio neque cibus, neque potus aut æsophago ca-
nicula apprehendi potest. Mirum est, inquit Be-
nedictus Veronensis, nec tamen abs re, quod cibum
nonnunquam cathetlica videlicet ita resoluta, ca-
piunt; potum autem nequeunt. Hoc quidem ma-
lo, ex imbecillitate stomachi laboranti cuidam
spica & nuce muscata, adiecta exigua mastiche,
cum paucis vino rubro sumptis, recte occurreba-
mus: nam calidis & siccis vis attrahendi confer-
uatur: caryophyllo, cinnamomo, cymino & iis
similibus iuuatur: sicuti in ardenti febre succo,
cucumeris aut cucurbitæ decocto. Refert Benue-
nius se nobilem quandam, Iohannem nomine,
Neapolitanum (cap. 66.) hoc vitio diu affectum,
eum à medicis aliis curari non posset, curasse (cum
ex calidioribus habitu ventriculi vitium contraxisset
indiciis intellexisset) iis, quæ aridum ac iam tabe
consumptum corpus desiderat. Primo die solas
lactucas ex aceto & oleo comanducare præcepit,
veruecinam carnem potius quam aem exhiben-
do, & vinum frigidum & aulterum ac genere vi-
ctus frigido ac frigidioribus medicamentis
vtens, intra duos menses agrum restituit.

SCHOLIA.

Pessimum vitium est resolutio stomachi à La-
tinis dicta, cum cibi non tenax est; quo corpus
(ut *Celsus tradit*) non alitur, sed tabe consumitur.
Sed qui hoc vitio, seu imbecillitate ventriculi
laborant, stomachici quoque appellantur: quam-
uis & illos quoque, qui nec cibum continent, nec
desiderant, aliqui & dissolutos invalidos voca-
vere; vel textura ratione affecti, imbecilliterque
attrahentes, vel parum appetentes, stomachi in-
validi etiam dicuntur. Quamuis etiam vulgus eos
quo-

quoque stomachicos vocat, qui appetentiam perdidit; vel quibus post cibum ventris os grauat; & quibus nausea contingit, & ad vomitum impelluntur, cibique corrupti sunt, & nidorosi vel vitiosi, & eos quibus ructus molestiam parit, vel cibi vix descendunt. Quorum tamen curationes (ut iam ostendimus) pro varietate causarum tum affectus perficiuntur. De imbecillitate stomachi vide Benedictum Veronensem lib. 13. cap. 3. habes ibidem diuersas curationes, tam ex frigida & humida causa: & quæ studiosis videri ratio conueniat: cum fere omnes, uti religiosi & togatorum fere magna pars, stomacho sint infirmiores, cum plurimum sine corporis exercitatione viuunt. At de resolutione agit cap. 9. & 10. ubi quædam selectiora remedia breuiter quidem enumerat. Si retentrix vis sit laesa, vel quia stomachus nihil retinet, aut parum comprehendit, nec concoctionem aut digestionem opportunam expectat: aut si pertinacius quam opus sit retinet, vel digesto etiam cibo, retinet tamen interdum, sed tremulo, ut dictum est, modo, vel spasmoso, siue singultu. Sic in lenteria cibis non continetur. Summa retentrix corroboratur stypticis frigidis. At vis expultrix laesa vel ex toto sublata, inertem in ventre cibum derelinquit; sicut in ileo morbo: aut debilitatur & lassescit, ita, ut serius irritata cibum expellat, vel partem duntaxat, aut modum exsuperat irritata virtus, aut corrumpitur, unde ructus, vomitus, fluxus. Expellendi vi concitata, cibum non diu patitur concoctum, & prauum humorem expellit, & cibum indigestum emittit. Nimio enim frigore vel humore laxatur, combibito inter tunicarum flamina, ut dictum est. In causa est & membri leuitas, humoris mordacitas, leuitas grauitas, vel vlcus, abscessus, aut fluxus bilis inopia, vel si pyloroni nihil recipiat, & arida sine putu & styptica. Expultricem corrumpi rarum est; rariùsque euenit, ut ex toto cibis expellatur, præterquam in vomitu symptomatiko: at si expultrix infirmior, digestionem corrumpit; vehementior vero, ut in lenteria, concoctionem affert: remedia de lenteria dicemus. Sed si nihil expellat, ob frigiditatem, laxantia quædam vmbilico imponunt, ex succo cyclaminis, cucumeris erratici, colocynth. cum felle vaccino, & aliis. Ex caliditate & siccitate, ex herba mercurialis succo, & in ebulli rad. cum oleo viol. & cucurbitino, & similibus, diacrydio adiectis. In communi expultrix potentia ex calido & siccato laeditur: frigidis & humidis succurritur. Interea sciendum, quod non omnibus eodem modo cibis in ventre moram trahit; quidam, quoties assumunt in die, toties ventrem exonerant; alij semel, alij sæpius, quidam alternis diebus; nonnulli quarto aut octauo quoquo die. In stomacho plurimum à sex horis ad 12. vsque, ad quintam, vsque decimam moram trahit, pro stomachi, ac aëris qualitate, & modo, proque corporis exercitatione. Causæ variae ex cerebri affectu, laesa animali potentia, aut studiorum occupationibus, aut retentrice validiore, vel imbecillitate expultrici, aut ventris exterioris musculorum infirmitate, vel si bilis in intum ventrem non effusa fuerit: plurimum facit ea, de qua dictum est, leniens, aut nimia crementum asperitas: obest & spiritus intus inclusus, abscessus, vermes intestinorum, ac varia membrorum oppilatio. Huc spectant styptica commanucata ante cibum, retardantia digestionem. Quæ autem duriorem aluum emolliunt, iuuant ad expulsiōem, ut caro pinguis pulli, ouum sorbile,

De potentia
retentrice
laesa.

De expul-
trice.

De mora ci-
bi in ventre.

De ventrem
non morantem.

adiecto zaccharo, emolliens: pingue, lac recens, ius gallinæ veteris, aut gallinæ, ventrem cathartico modo turbat: pruna, cerasa, mora, ficus recentes, arida præpingues, & carica, vna masticia alba, & passula, ex oleribus beata, atriplex spinachium, blicum, mercurialis, brassica semicotta, vel efficacius, si nudis pedibus æstate pavimento aqua aspersa ambulauerit; duranti enim aluum emollit, nec alio auxilio quandoque leuatur; lupulus quoque iuuat. Frequentius in prandio bibere aluum liquidum reddit, pruna Damascena matura, & dulcia Hispanica leniunt ventrem: ex ptunis compositio simplex & cassia, & syr. viol. butyrum vero recens, aut adeps galinaceus, aut anserinus, cum psyllij decocto lentore, vel althææ, illinitur ventri; asperitatem enim stomachi emolliunt. At si bilis flaua interclusa fuerit, aperientibus opus est, ut posse de ihericis dicitur. In intestini oppilatione, quæ iliaci profunt damnis. In summa, calida & humida in communi expultricem vim corroborant; sicut per intervalla acuta & amara salsaque excitant in prima mensa, propterea cæparum & sinapis vsus, piperque longum quandoque assumptum prodest. Cibus vero ex stomacho citius defluit, ex nimia nervorum cerebri ad ventrem pertinentium debilitate; sed rariùs: frequentius vero retentrice infirma, aut nimium valida vi expultrice, & humida quandoque stomachi habitudine immateriali, vel cum humore falso, acuto vel acetoso aut lubrico, aut vlcere innato, ab exiguo naturali calore prope exstincto, cibis protinus, Galen. teste, profuit. Hic videri ratio priori morbo dissimilis esse debet. Prodest animi securitas & quies: cubiculo calido ac siccato, temperantia proximo, uti debet, somnoque longiore; à cœna vero statim procumbendum est, in sinistram fere semper latus ante cibum fricari supremas partes conuenit. Panis ex simlagine confectus edendus est; parumque fermentari debet: exigi o sale addito vel nullo: mastichicis pollinem ingerito, ac coriandrum præparatum. Pro plebe sorba arida tussa misceri iuuat. In oblationibus aucula, turtures, phasiani, perdices, turdi, lepores & similia, assa præsertim. Vinum rubrum adstringens bibendum; aqua ferrata temperat. In prima mensa, quæ leuiter adstringunt offerimus frigidiuscula, si calida causa fuerit; aut contra si frigida; stomachus oleo lentiscino, mastichino illinendus.

OBSERVATIO XXXIX.

De ventriculi inflatione, cum ingenti dolore.

Inflatur aliquando venter, crasso intus incluso vento, ex damnatis cibis; qualia sunt legumina omnia & dulcia, vna recens, ficus, poma præstium, allium, cæpe, seruca, brassica, bulbi, lac, omnisque caseus; aut si cibis, qui facilius concoquitur, secunda apponatur mēsa, aut Venus crudo stomacho frequens: vel summatim, si infirmus fuerit calor cum crassus & crudis humoribus, vel melancholicis, ut in hypochondriaco affectu. Sic pictor quidam Alcmarianus familiaris noster, cum in autumno flatulentis cibis uteretur, & subinde multum bibisset, annos 28. natus, stomachum quoque debilem habens, incidit in ventriculi dolorem intollerabilem, cum eiusdem inflatione etiam exterius apparente; quæ & tactu sentiebatur. Ad hunc accitus, cum medicamentosis potionibus omnes, quæ in officina pharmacopœi parantur, respueret, nec ulla admitteret, imperavi ut chamæmillam com-

communem & Romanam concisam, adiecto momento seminis anisi & cari, decoqueret in ceruisia communi: quam cum bibisset, flatum per superna & ventris crepitum emisit, & illico leuamen sensit, præcipue ventositatibus vna cum ructibus superius emissis. Sed cum dolor nonnihil adhuc perseveraret, certis tandem rationibus persuasus, pilul. vij. ex 3 j. pilul. hiera simplicis Galeni, deuorauit. Quibus ter aluum deposuit; & ventriculo mox inuncto oleo chamæmelino, anethino, rutaceo simul mixtis, tumor atque inflatio ventriculi cessauit. Interea tamen iubebam, ut ad magnitudinem fabæ maiusculæ omni mane ex hac mixtura fumeret: 2℥. pul. seminis dauci, petroselin. 3 j. sem. anisi 3 j. conf. bugloss. 3 j. conf. flor. roris. 3 ℔. specier. diagalang. 3 j. syr. de corticib. citri parum; fiat mixtura. Etiam sumebat diagalang. in tabulis, duabus horis ante cibum 3 ij. vel iij. Quibus prædictis hic sanitati probe restitutus fuit. Huic tamen laetis vsu interdixi, quo maxime delectabatur; minime enim iis conuenit, teste Hippocrate, quibus præcordia plurimum prætenduntur; magis si sonant intestina, ex multa intus materia.

SCHOLIA.

Accidit quandoque (ut etiam Donatus recensuit) ipsi ventriculo, ut instrumento coctionis, retentrice, seu completente ipsius facultate imbecilla existente, affectus quidam, qui à Græcis, præsertim à Paulo cap. 38. lib. 3. & à Galeno 3. de caus. symptom. τρυπανισμός dicitur; quævis quandoque ab eodem Galen. (ut patet 14. meth. med.) τρυπανισμός nuncupetur; à Latinis autem inflatio ventriculi appellatur: qui affectus nihil aliud est, quam eiusdem ventriculi distensio & dolor, ex flatuoso spiritu: Flatuosus enim spiritus in eo gignitur, aut per os excernitur, & sic ructum creat; aut per sedem. In ea autem venter seu ventriculus ut coctionis officina afficitur. At affectus à Galen. 14. meth. med. inter morbos reponitur in quantitate seu magnitudine. Differt tamen ab ædemate, quoniam ædema prementibus nobis cedit, digitique admodum alte in ipsum descendunt: inflatio vero digitis pressa, vestigium non retinet, ac sonitum veluti tympanum reddit, ex eodem Galen. 14. meth. med. Grauitas quandoque & distensio non solum circa ventrem ipsam, sed iuxta totum pectus: aliquando vero retro, iuxta collum, ac deorsum, & ad ipsa vertebra inruit: sæpe autem vtrinque occupatos tenet: aliquando & tumorem circa os ventris efficit; ructusque inanes sunt, modice alleviantes; & inhibito flatuum, qui per aluum externi consueverunt. Quibusdam eorum dolores accidunt, ac appetitus perditiones, ac capitis dolor, ut patet ex Aetio, Archigenis auctoritate. cap. 27. lib. 9. Si vero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore distenduntur: leuantur autem alimento inferne subeunte, & flatibus siue per ructus, siue per intestina exclusis, ut idem Aetius inquit. Vbi vero flatuosus spiritus per intestina mouetur, multiformes edit sonitus: quorum non omnes nomina sunt sortiti: verum prudenti viro ex diuersis sonitus differentiis, quale quantumque excrementum sit, ac quo maxime loco voluatur, patere potest: ut eod. 3. de caus. symptom. apud Galen. legitur. Quomodo spiritus flatuosus vel flatu ipse generetur, iam ex parte diximus scholio obser. 22. huius libri. Breuiter, cum inflatio ventriculi fiat à multis flatibus, qui solent fieri à debili calore

tanquam à causa efficiente: ab alimentis flatulentis & humidis, vel à pituitosis succis: alij volunt fieri spiritum flatuosum à mediocri calore: vel (ut alij volunt) ex humoribus, vel cibis languida caliditate in vapores dissolutis, in ventriculo generatur, iuxta Paulum in Aetium: nam refrigeratio, (inquit Paulus) hoc nomine, quod extenuare & dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatus generationem impedit: minor vero caliditas, diffundit quidem & transmutat alimentum, verum minus quam opus sit: unde flatu excitantur. Verum si ex flatuosis cibis inflatio oriatur, ex exiguo, & brevis temporis spiritu flatuoso orto, qui vno vel altero ructu vacuatur, comprehendere poterit. At si ex eisdem cibis natura si quidem non flatuosis, sed in vapores per mediocrem caliditatem resolutis inflatio fiat, ab assumptione eorumdem, paulo post tempore, inflatio generabitur: & proinde ex laborantium, seu astantium sermone id prompte percipies. Verum si neque assumptio ciborum præcesserit natura flatuorum: pituitosos humores in ventriculo contentos ac in halitum solutos, inflationis causam existimabis. Nam si ex atra bilis in eundem ventriculum effusione flatu quidem generetur, quam affectionem hypochondriacam, ac flatuosam nominant, præter reliqua peculiariter metus & mæstitia aderunt: quæ admodum de melancholia cap. proprio diximus. Sed exempla infra scripta hæc melius docebunt.

OBSERVATIO XL.

De ventriculi inflatione, cum dolore, ex succis pituitosis.

Ventriculi dolor (ut alias diximus) à flatibus in ipso generatis plerumque fit, aut ex pituitosis humoribus in eo contentis, aut ex cibis in vapores ab imbecillo calore resolutis. Atque hæc ipsa ventositas raro sine ventriculi dolore est. Hoc malum in me ipso expertus sum anno 1556. mense Iunio, cum imbecillo stomacho laborare, tormina ventriculi vna cum ventositate sentiens, ingentem stomachi dolorem passus sum. Cum itaque cibos flatulentos non sumpsissem, ex pituitosis excrementis dolorem & flatum ortum coniciebam. Ergo, ut huic symptomati occurrerem, omnium primo causam auferre decreui: nempe medicamentis pituitam deicientibus, leuiter laxantibus: intemperiemque auferendo, ut & calor naturalis diminutus augeretur. Ideo optimum duxi pilulas sequentes fumere, quæ utrumque faciunt, scilicet leuiter purgant & calorem ventriculo suppeditant: 2℥. pilul. commun. seu pestilentialium, aut Ruffi 3 ij. pilul. de hiera, 3 j. cum aqua senic. fiat pilul. v. Quas mane hora nona deuoravi: & cum tardæ operationis essent, mane sequenti quatuor prius secus habui, valde copiosos & pituitosos, & corruptos, cum emissione ventositatum: quibus tormina, dolor atque rugitus & flatu magna ex parte cessauit. Sumpsi quoque decoctum flor. chamæmel. seu cinnam. & anisi in ceruisia communi: quibus ventositates expulsa sunt, & à dolore fui liberatus. Alioquin si non cessasset, omnino post pilulas illas leues, ex hiera vel aromaticis (quæ idem præstunt) pituitam coquendo accepissem: & vna ventriculum roborassem cum symp. de mentha, de consuetud. ex corticibus citri, cum decocto mentha, byssopi, beton. absinth. flor. anibos. & similibus. Deinde rursus reiteratis pilulis, de-

mum acceperim attenuantia calida, flatusque discutientia, ut decoctum cymini vel fesei, cum mentha vel hyssopo in vino decoctis. Quibus etiam in rusticis felicissime usus sum. Sic Anno 1565. hortulanum curavi, cui ventriculus ex ventositate prominebat, ita, ut fere abscessum metuerem. Cui cum medicamenta flatus discutientia propinassent, adiectis quibusdam amaris & detergentibus praesidiis, idem per vomitum & secessum post multos ructus, vermes plurimos reiecit, ventriculo mox subsidente. His hortulanus iste, dum maximo ventriculi dolore & distensione torqueretur, egregie conualuit.

SCHOLIA.

Hic affectus minime contemnendus est: nam inflatio ventriculi, ubi diu perseverauerit, metus erit, ne in hydropem siccam praecipue terminetur: & si multiplicetur ventriculi inflatio in conualescentibus, recidivam significabit. Namque, qui a morbis immodice se fatiant, flatuosi, ac toto corporis habitu turgidi redduntur, ut 3. de caus. symptom. Gal. nos docuit. Quod vero, qui morbo regio laborant, non multum ventosi sunt, ab Hippocrat. 72. 5. lib. scriptum est. Indicatio vero curatipnis (ut et Alimarus ex 14. method. medendi annotavit) inflationum omnium communis est, ut quod praeter naturam est vacuetur, in quocunque id contineatur loco. Propria verum indicatio post hanc communem est, ut tenuissimis & calidis potestate medicamentis id perficiatur: ut aere calido, somno longiore, qui ex toto affectus leuat, teste Paulo, & mirifice coctionem inuat, ut habetur 12. meth. med. Et primo exercitatio levis, deinde maior adhibenda, maximeque ea, quae superiores partes moveat, quod genus (ut Celsus refert cap. 5. lib. 4.) in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Frictiones item extremarum corporis partium, si exhibeantur, conferunt. Alius omnino sit levis, & ubi adstricta, statim clyster infundendus, ut Aetius inber. Interponenda quoque abstinentia, iuxta Celsum: praecipue vero, teste Aetio, ubi ex dissolutis in vaporem cibus orta fuerit inflatio. At si eam ferre non possint, cibi exhibendi sunt calidi, attenuantes, minimeque inflantes, boni succi & cocti faciles, quatuor exiguu. Diuidantur autem ex mente eiusdem Aetij, ita, ut prandio tertiam, in cena vero reliquas duas accipiant partes. Fructuum vero ac olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Potus cibum non interpellat. Per omnem tamen cibum vinum meracius exhibeatur, aut non multum. Nam multum potum, tanquam infestissimum hostem, deuitent, ut Aetius admonet: & si non ita diu ante cibum sumpserit, aut cibum fuerit natura flatuosus praesumptus primum vomere praecipue, cum iis, quae iam saepe commemoravimus: post vero vomitum, eos fouere oportet, ex oleo, quod tenuium sit partium, quodque rutam habeat incoctam, aut aliquod calidorum seminum, ut cymini, apij, petroselin. ex Gal. 14. meth. Inter ea praefertim si dolor sit medicoribus: vel ex semini hordeacea, & loliacea farina, cumino & sem. anethi, aut apij, aut feniculi, oleo rutaceo, aut hydromelite, cataplasma conficiatur, modo adiecto oleo laurino vel centaurei coma, aut eryngij semine, vel lauri baccis, & melanthio. Cucurbitula cum multa flamma admota, bonae magnitudinis, umbilicum vndique comprehendentes, egregie iuvant incantamenti instar, teste Paulo & Ga-

Medicamentum
vitiis vitiis.

Curatio a
gastritis
vitiis.

leno 14. method. med. & 12. Glandes etiam supponenda, ex sem. rutae, cumino & melle confecta, sale addito. Et clysteres ex decoct. folior. rutae flor. chamaem. puleg. calamint. fursure, adiectis seminib. fenic. dauci, & cumini, & caricis: & in ib. 3. adiciendo olei anethini, chamaemel. rutacei ana 3 j. diaphan. diacarb. benedict. laxat. ana 3 ss. sale addito, fiat clyster. His addere poteris quae apud Celsum, Aetium, Paulum scripta sunt: ut castorei quoque 3 j. cum aceto scyllino, iuxta Aetium sumpta. At si ex pituitosis humoribus in halitum solutis contigerit stomachi inflatio, succi prius digesti euacuentur. Euacuabuntur autem vomitu, si acri in illum proni sunt; si minus & per inferiorem ventrem, per clysteres paulo acriores, teste Galeno: vel per purgans aliquod. Galenus & hic, ubi dolor urget, ex spiritu flatuoso genito ex praedictis humoribus ante purgationem cucurbitulam adhibet, cum multa flamma copiosa: deinde humorem euacuat, ut videre licet 12. meth. med. Humore iam repurgato, eadem topica, quae iam dicta sunt, & ab aliis auctoribus descripta, conveniunt, ut emplastrum de baccis lauri, supra totum ventrem & supra stomachum, emplastrum stomachicum Galeni: & intus exhibenda potio absinthij, hyssopi aut rutae. Paulus dat ouillum talum vltum: confert & diacinnamomum, diacyminum, dianisum, diaxyloaloes, diacalamenanthum aut diatrionpiperon, cum exiguo vino diluto. Nunc aliud exemplum addamus.

OBSERVATIO XLI.

De stomachi & hypochondriorum inflatione ex humore melancholico.

ANNO 1588. mense Februario Serenissimus Elector & Episcopus Colonienfis, qui hoc tempore in castello Honsfeldickio dicto agebat, incidit in ventriculi inflationem ac hypochondriorum, non sine magno dolore; ita, ut me accersiri iuberet. Sentiebat etiam tensionem quandam in hypochondrio sinistro, ex lienis inflatione & obstructione, ut melancholicum: quam procul dubio ex variis suis aduersitatibus contraxerat. Hypochondria ac ventrem cum tangerem, valde distenta erant: injecto clystere carminante ventositatem, prima vice parum profecit; tandem cum & dolor urgeret, & totum fere ventrem occuparet; & urina aliquantulum tineta esset (credo ob dolorem) cumque ructus subinde experiretur, sed difficulter exeuntes: & nihil per ventrem neque flatum emitteret, clysterem partim emollientem (eo quod alius durior esset) partim dolorem sedantem, & partim ventositatem expellentem, in hunc modum praescripsi: cum & circa lumbos se dolere diceret, etiam calculo saepius obnoxius: Recipe rad. alibae mand. 3 j. folior. branciae visinae, pavierariae, maluae, mercurialis, florum chamaemel. meliloti, summitat. anethi ana m j. seminis anisi, feniculi, carui, ana 3 i. rutae m ss. sem. lini 3 ii. coquantur in aqua communi pro lb j. colat. adde castorei pro clysteribus 3 j. diacarb. 3 ss. benedicti laxat. 3 ii. olei chamaemel. anethini ana 3 j. olei rutacei, amygdal. dulc. ana 3 ss. vitellum unius oui, salis 3 j. misc. fiat clyster: eoque diutius detento, ter alium excrevit flatibus quoque multis tam per superna quam inferna emissis. Vetriculum postea etiam repurgavi, cum sequenti potione (prius etiam carminante potione ebibita) quae ita habebat: 2℥. syrup. ex infus. ros. pallid. cum solis fene 3 i. ss. diaphanici 3 ii. aquae decoct. flor. chamaemel. 3 ii. misc. stomachum inun-

inunximus, deinde cum oleo rutaceo, mastichino, & maceris. Postea & hoc vng. 2℥. olei mastichini, coron. maceis ana 3 ii. cerati stomachici Galeni. 3 ii. elei caryophyll. gnt. iij. cera q. s. fiat vnguent. Inter ea & hac confectione utebatur: 2℥. Specier. aromatici ros. diacalamint. diarod. abb. diacumini ana 3 ss. dissolut. in aqua absinth. adiect. zacebar. albiss. 3 ii. fiat confectio in rotulis ponderantibus 3 ii. vel 3 ss. Egregie haec iuvabant. Alioqui addidisset aliquot guttas olei anisi, in dicta confectione; quibus uti soleo: etiam oleo ipso cum modico vino per os sumpto, commode vtor ad ventositates expellendas, etiam in colico dolore. Hypochondrium sinistrum inungebam linimento sequenti: 2℥. olei de capparibus, olei rutacei ana 3 ss. olei amygdal. amar. emplastri de meliloti & (quia levis durities aderat) emplastri de mucil. ana 3 ii. olei caryophyll. (ob meliorem odorem) guttas tres, ammoniaci dissolui in aceto 3 ii. cera q. s. fiat vnguentum. Inter ea quoque imperavi, ut Excellentia sua abstinere & multo potu, & a multis iusculis, leguminibus, & oleribus, minusque dulcibus: quia talia flatos gignunt. His autem malum cessavit: alioqui diatrionpiperon dedissem aut theriacam.

SCHOLIA.

Hae ventriculi inflatio, ob melancholicum humorem in ventriculum infusum, pertinebat ad hypochondriacam affectionem, quam alias flatuosam appellavimus: quod etiam ex signis cognovimus; cum mastitia adiuncta esset. Ceterum cum de huius curatione prius dixerimus: hic nihil addendum: nisi quod materiam melancholicam flatulentam digerere debeamus cum oxymelite & decoct. ceterach. scolopend. rad. cappar. thamaris. & anisi, etiam menthae, melissophylli, chamaem. thymi, & similibus. Quidam hic laudant pro purgatione hieram Russi, cum exiguo mastichis. Deinde etiam in tumore melancholico solum commendant, per spongias, ex aceto, cumino & ammonio, potiusque fomentis vtuntur quam vnguentis, ne cera meatus obstruat; ideo irinum & rutaceum oleum quidam & nardinum cum castoreo ventriculo admovent.

OBSERVATIO XLII.

De ructu ventriculi cum aliis symptomatibus.

Cum inflatur aut distenditur stomachus, vapores malos & indigestos, Galeno ita tradente, per os eructat, & acidum internum aut graecolentem ructum emittit, quibus emissis aliquando granis dolor statim conspuitur. Quod vxori cuiusdam calcarij Delphis euenit. Haec equidem non solum circa lumbos & renem dextrum vehementer dolebat gravida duorum mensium, verum etiam dolor ille totum ventriculum & os eius occupabat, & tanta vehementia stomachum & diaphragma comprimebat, ut praerangustia vix anhelitum trahere posset, & spiritum de pectore educere. Existimabat autem se pleuritide laborare: cuius causa me vocabat, ut certo sciret, quo morbo laboraret, & simul a dolore subleuari posset. Cum autem haec me praesente plurimos ructus emitteret, quibus nonnihil videbatur subleuari, mox tamen dolore redeunt: ideo cum potione sequentem ebibisset, ac multos ructus cum ventositates per superna, flatulque & ventris

Pet. Forest. Tom. 2.

crepitus demississet, atque locum dolentem linimento infra scripto unxissemus, paulo calido deinde admoto, miraculi instar omnia symptomata dicta cessarunt: non obstante, quod metus esset de abortu, ob nimium dolorem & angustiam: 2℥. sem. anisi fenic. anethi ana 3 i. ss. glycyrrh. ras. 3 ss. ruar. passul. enuct. 3 ss. maluae, ob dolorem renem, m. ss. bulliant in aqua communi q. s. & huius express. accipe 3 ii. addendo syr. ex infus. ros. commu. syr. de cicbor. Nicolai an. 3 ss. misce: 2℥. olei liliacei, anethini, ping. gal. ana 3 ss. misce, pannis calidis admotis, praeter omnium opinionem absque purgatione aut aliis remediis, tantum ructibus & ventositatibus emissis, cum nocte sequenti sudasset, & deinde bene dormivisset, sanitati restituta fuit.

SCHOLIA.

Solus homo inter animantia, ut tradit Aristoteles, flatum ructumque emittit; quod ex stomachi humiditate contingit: ventres enim aliorum animalium aridiores sunt. Verum, ut Plinius refert inter morum exempla, Pomponius consularis, poeta, nunquam ructavit. Id vitium ex crassioribus fumidisque vaporibus vi quadam erumpit, ab imo (ut aiunt) stomacho: at enormiter quadam gloria potioribus per ora euolvitur. Censura igitur dignos quidam putarunt, qui ex crapula eructant. At ructus cum plurimum fiat ex indigestione stomachi, aut ex frigore, aut vento: mulieribus saepissime vulvae vitio, saepe cum ventus includitur, nec effari per se potest, quae ructus commouent, damus: qualia sunt anisum, origanum, cyminum & similia. Verum si multa subest pituita prius perpuranda esset, alioquin in continuatos verteretur ructus. Sed hic non opus fuit purgatione, cum tantum ventositates hanc mulierem torquerent. Verum, & antea dictum est, exiguo suo calore inflatur stomachus: copiosiore in ructus prorumpit, cibique pariter instantibus, ut de inflatione ventriculi diximus. Sunt & alia, quae effectiue excitant ructum: sicut raphanus, & synapis: quaedam materialiter in ventum & fumidum vaporem convertuntur: ut oorum lutea, si friguntur, ac ipsum lac: omniaque cruda magis quam cocta instant: & stomachi caliditas lac arescere facit. At de ructu acido atque fumoso, & quibus signis, si adsit materia frigida, pituitosa vel melancholica, distinguantur, iam antea dictum est. In materia melancholica adest grauitas, licetque subinde dolet & intumescit; & venter cum cibi indigestione, acidoque ructu. A bile ex oris amaritudine sitique; graecolentesque ructus in pestilentia sunt, ex corrupto quoque cibo, potu peccati, ut ex lepore marino, aut interioribus visceribus aut abscessibus, aut infantibus ex tinea. Aetuginis dirus sapor, compunctionibus, ardoribusque indicatur. Censori ructus, quicquid non mutatum referunt post horas septem, imbecillitatem concoctionis reddunt. Acidus sapor perdurans hydropem minatur. A vento nullum sapor indicium facit: vel si ex frigore aut frigidis nationibus. Omnium primo, quod ad curationem attinet causis primitiuis, & antecedentibus stomachi discutunt. Si ex crasso succo, ut antea dictum, oxymelite leuatur: deinde hiera; postea & diatrionpiperon, ex aqua vel vino; in ructu quoque vaporoso & fumido absinthij & hiera piera.

Ee Reliqua

Reliqua ad ructus dissoluendos vide apud *Arculanum* & *caput proprium Valesii* lib. 4. c. 1. de *eruella* tione: ubi ad longum causae, signa, prognosis & curatio explicantur. Non tamen semper acidus ructus ex causa frigida oritur: saepe etiam ex calida, ut apud *Trallianum* videre licet. Et vide apud eundem quomodo tales curentur.

OBSERVATIO XLIII.

De muliere cholera morbo correpta.

Cholera morbus est acutissimus, sine febre fecunda, quae vel uno die, vel altero, vel certe paucis diebus hominem rapit: substantia corporis effusa, partim assiduis vomitionibus, partim iisdem deiectionibus: nisi medicum peritum ac sagacem inuenerit. Sic mulier quaedam Alemariana, uxor cuiusdam fabri ferrarii, prope sancti Spiritus facellum commorantis, mense Iulio, aestate vigente anno 1548. cholera morbo corripitur: cumque & vomitionibus & deiectionibus multa aquosa liquida corrupta & euomeret, & simul deiceret, cum tanto impetu, ut humoribus multis spiricibusque vacuatis vires conciderent: unde subito sudore frigido ac tremore cordis, in syncope lapsa est: adeo ut altantes illam pro deplorata habentes, curationem sacerdotibus reliquissent, eumque munita esset extrema inunctione, tandem de remediis cogitarunt, atque me ad agram duxerunt; mox per me odoriferis naribus adhibitis, atque digitorum frictionibus factis, ad se paululum rediit. Sed, quia adhuc valde nauseabunda apparebat, vomitum illico noluius constringere, ob materiae venenositatem. Quare adhibito cyatho uno decoctionis hordei communis, paucis zaccaro adiecto, pro medicamento absterfio & lotio. A quo cum rursus semel vomisset, & secessum habuisset, mox hanc syrupum propinaui: ℞. syr. cotoni. ʒ ij. syr. de ribes ʒ j. syr. de cicor. Nicol. cum rhubar. syr. menthaei an. ʒ ss. misce. Cepit autem circiter cochlearia duo: Postea solum syr. de ribes, menthaeum & cotoneorum dedimus, & zaccarum ros. perlatum. Postremo capiebat aliquando pro roboratione & maiori contradictione, diacotoneum sine speciebus. Ventre ac stomacho inuncto oleo masticino, & cotoneorum, symptomata cessarunt: ita, ut illis tantum remediis, promortua habita, sanitati fuerit restituta; cui & exiguum panis biscocti in vino rubro styptico macerati, paucis cinnamomo asperso dedimus, aliquando & succum granatorum expressum: & sana euasit.

SCHOLIA.

Rhases, & qui eum sequuntur, statim post syncope, de cholera morbo agunt: eo quod saepe syncope tales afficiantur, ob nimiam euacuationem, & ob ventriculi consensum: & alij vero de hoc malo, cum plerumque ventris perturbationem, & simul fluxum habeat, scribunt, cum de affectibus intestinorum agunt: verum cum etiam ad ventriculum referatur, de eo quoque malo in hoc libro tractandum esse aestimamus. Multi hic de nomine contendunt, & a causa nomen accepisse putant, a Gnidii medicis: quamvis non ex propria sententia, ut *Galen.* fatetur 2. method. medend. eum *cholera* id est, bilem causam esse arbitrati sunt, uti & *Cornelius Celsus*

lib. 4. c. 1. sentire videtur; cum tamen non solum a bile, sed cibi prauitate & corruptione humorum fieri soleat. *Trallianus* potius a materia, quae cum per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni, fieri putat: Intestina vero cholodas, veteres appellabant, ut etiam *Homerus* testatur his verbis, *ἰσχυρὸν χολῶδες*, quod est, *Fusa erant humi intestina*. Cum totus igitur ventriculus ab aliquo, quod morsu ponderete contristeret, vexatur, idque statim eicere cupiat, superno infernoque ore ad excernendum utens, affectus quidam hic gignitur, qui a Graecis *χολή*, 3. de caus. symptomat. a Latinis similiter cholera dicitur: quamvis Barbari hunc affectum cholericam passionem vocant. Est haec affectio nihil aliud, iuxta eundem *Trallianum*, quam immoderata perturbatione, quae per aluum & vomitum, propter stomachi submersionem, ac eiusdem offensionem prouenit. *Paulus* describit quoque cap. 39. lib. 3. eam esse immodicam ventriculi perturbationem, supra infraque erumpentem. Et quamquam *Celsus* haesitet, num intestina vel stomachus laedantur, cum utrisque commune vitium esse posse putat: iuxta tamen *Gal.* loco citato, secundum totum hic ventriculus afficitur, ut etiam docet *Alimarus*. Et ita quoque symptoma est in genere noxae facultatum naturalium, & proprie expultricis deprauatae: quae proprie cholera dicitur. Nam quandoque citra eiusdem facultatis noxam fit, licet perpetuo aliquem praeter naturam affectum consequatur, veluti supra de vomitu dictum est; quamquam eam non proprie cholera nominant, ut si fiat propter ciborum qualitatem, *Alex. Trall.* *aug.* *Hippocrates* 4. de rat. vi. in morb. acutis & *Galen.* in commento, duplicis cholerae meminerunt, & aridae & humidae. In utraque perturbatio est ventriculi immodica infra supraque. Differunt causa & symptomata: arida enim fit ex spiritu flatuoso acri, qui siue egeratur, siue retineatur, lancinat, & mordicat partes ventris nervosas, venter inflatur, strepitus fit, dolor in lateribus, & lumbis, alius nihil deicit, sed adstringitur. Eiusdem curationem vide loco citato apud *Hippoc.* Alia est humida, quae gignitur ab alimentis eorumque prauitate, vel a medicamentis, & plerumque a vitiosorum humorum copia, vel a bile admodum corrupta, aut a pituita salia corrupta: de qua nunc agimus. At Neoterici quidam distinguunt species secundum humores, qui deiciuntur ac vomitu expelluntur: & sic quaedam est aquosa, ex phlegmatis genere: altera biliosa, ut cholerae praesinae, & ruginosae & similium; vel melancholica corrupta, aduersionem participans diuersarum naturarum & colorum. Alij aliter distinguunt: vel quod per se incipiat, aut alios morbos subsequatur, modo critica, vincente natura; modo symptomatice. Alia rursus in corpore debilis ventriculi, vel alius virtutibus debilibus: alia in corpore forti: quaedam acuta, habens accidentia grauissima, medico metum incutientia. Alia vero non ita acuta. Quae quidem differentiae pertinent ab ipsis symptomatibus: quemadmodum & alia a tempore, quod ea ipsa sit in principio, in augmento sui motus, vel in statu, aut declinatione. Penes materiam, vel quod sit in ventriculo, vel in partibus vicinis aggregata, vel transfluxa: modo nocens quantitate, aut multitudine, aut indigestione, alteratione, putrefactione, mordicatione, cum praesentia ciborum aerium, mordicantium aut aliterius humoris: vel ex defluxu a toto vel a membro

membro particulari ad ventriculum & intestina. Atque haec ipsa modo a causa primitiua sola, modo juncta cum materia circa stomachum. Sed haec ipsa ex causis tam exemplis subsequentibus manifestiora euadent.

OBSERVATIO XLIV.

De cholera ex medicamento assumpto.

Cum excitetur cholera (teste *Paulo* & *Tralliano*) non ex vna causa duntaxat, sed etiam ex multis: ideo causae illae prius perscrutandae, antequam curationem instituamus. Et quamvis fiat ex magna alimentorum prauitate, ut ab illis praecipue, quae succum crudum, flatuosum vel acrem procreant, quaeque egre concoquuntur ac tarde permeant, ut intestina suilla, sanguine infarta, capis, pipere, pinguedine, quibus nihil difficilius coquitur: qualia etiam sunt suilla caro, bubula, caprina, animalium ventres, & caseus, & quaecunque facile putrescentem succum, vel humiditatem acrimoniae coniunctam habent. Verum praeter alimenta & vitiosos humores, ut latius in scholio subsequente dicemus, etiam medicamenta hunc affectum excitant, quae sua natura vomitum eicunt, & perturbationem tam per superna quam inferna concitant, vel excrementa ad ventriculum trahunt, ut veratrum. Sic mulierem noui, quae cum diu circa praecordia male habuisset, empiricus eius cognatus ʒ ij. rad. ellebori albi in saliolas incis. acceperat, & vino per noctes infuderat tres. Vinum expressum cum mulier bibisset, in vomitum enormem atque cholera incidit, ac animi defectum, & anhelitus praefocationem. Ad quam accitus, poculo inspecto, ex quo potionem sumperat, inueni radices ellebori albi in vino infusas. Statim adhibeo decoctum hordei communis in aqua pura, adiecta paucis zaccaro, idque tepide, ut melius euomeret: & pro veneni absterfione, mox propinabam ʒ ij. solum neuph. albi puluerisatorum (hoc enim proprium eius est remedium, teste *Guainerio*) cum ceruisia, propter calorem; cum venenum, seu veratrum, cum vino sumpsisset. Quamquam *Guainerius* dat cum vino, uti & theriacam seu gentianam cum vino. Mox roborato ventriculo exterius cum stypticis emplastris, & rob. de ribes per os, tum syr. cotoneorum exhibito, postquam satis euomisset & ventrem deiecisset, haec tandem curata fuit.

SCHOLIA.

Medicamenta acria subinde cholera morbum procreant. Sic *Galenus* comm. aph. 1. lib. 5. dicit ex elleboro albo instar cholerae perturbationem fieri, & vomitum, & tandem, propter ipsam euacuationem, supra modum ipsis purgatis conuulsionem aduenire: sicuti & cholerae patientibus, contractiones frequenter adueniunt, & saepius ac maxime eorum, qui sunt in furis musculorum. Et tunc conuulsio fit per compatiendi ad os ventriculi societatem. Sub veratro, nempe albo, reliqua pharmaca violenta subintelligenda sunt, quae ex euphorbia, colocynthide, scammonio, ex esula seu lathyride consistunt: ex quibus non tantum cholera seu perturbatione ventris, sed & conuulsio tandem euenit, si huic malo non statim occurratur. Ideo recte dixit *Rondeletius*. *Ret. Forest.* Tom. 2.

Excitant hunc effectum medicamenta, quae sua natura eicunt vomitum, aut ad ventriculum trahunt excrementa, ut veratrum, colocynthis, scammonem. Varias igitur causas ipsius cholerae sunt, ut dicere coeperamus. Ideo recte dicebat *Alexander Trallianus*, lib. 7. cap. 16. de cholera. *Ar non solum de vna sit causa, sed etiam multis: nempe ob cibum copiosum assumptum, & quia concoqui non poterit, corruptum item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum usum, si eis bibant, aut in eis diu natauerint. Corruptuntur alimenta seu cibi facile, si acres fuerint: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, praesertim stomachum offendentium, qualitatem; qualis est pepon, & pingues dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam suam aut infra ad excernendum irritantis; necnon ob nonnulla frigida applicata, ut epithemata quaedam, aut frigidarum aquarum us*

existentia, quæ ad causam etiam per essentiam pertinent. Per communiter vero à toto vel membris particularibus, ut hepate, splene, cerebro, aliisque materias malas ad ventriculum seu intestina transmittentibus.

OBSERVATIO XLV.

De cholera ex cibo diverso & corrupto assumpto, orta.

Inuenis quidam biliosus, vigente ætate, cum in una mensa diuersis cibis usus esset, cepis, atque pisonibus, & raphanis, atque pinguibus dulcibusque edulis, incidit in cholera. Ad quem accitus cum prius cibum corruptum cuomeret, & simul per inferiora deiceret, cum ventriculi maxima angustia & grauedine; atque intellexisset ex eius sermonibus, quæ in prandio sumpisset, & quod largiore satis potu usus esset, atque iam malum adhuc in principio esset, nolimus statim vomitum & alui fluxum cohibere. Nam si quis in principio, aut coaceruatim ea, quæ afferuntur cohibere aggreditur, is maioris mali facile auctor est, teste Aetio cap. 12. lib. 9. Inutilia enim cum sint (ut ipse inquit) euacuatione opus habent. Ideo auctores, si hoc malum ex corruptis in ventriculo cibis, siue propter copiam, siue prauam qualitatem, eueniat; aqua tepida exhibita ægrum vomere iubent. Nos autem docuimus aqua decoct. hordei non excorticati, paucis zacc. admixto. Quo satis vomebat, & aluum deiciebat. Alexander Trallianus multa vitur, quæ aluum & vomitum sine noxa irritat, eodem auctore. Cum autem euomisset, astantes plurimum adhuc metuebant ægro. Attamen in hoc morbo prudentis medici est, terrentia statim non reformidare; quando nulli morbo minori momento succurritur: ac protinus æger, ubi ista ceperunt, aqua tepida vel multa vomere cogendus est. Nisi enim quid impedimenti fuerit, celerrime rursus ad naturalem statum reuertuntur: potissimum si corruptio ob copiam ciborum fuerit oborta: quanquam & humiliorum affectum proprie cholera non esse velint. Hic tamen etiam postea per vomitum & aluum quadam mucosa, pituitosa, nidorosa, inter quæ incocta quadam & semicruda videbantur, euomit: ita, ut hic affectus ad cholera referri possit. Tunc enim mihi venit in mentem similis fere casus apud Amatum Cent. 2. curat. 3. de Casp. de Robertis, genere nobili, qui cum vigente ætate in cœna radiculis (quibus delectabatur) resereretur, in cholera lapsus est: qui de ventriculi grauedine, ac in eo erosionibus perceptis quæ conquerebatur. Cui & aquam tepidam bibendam dedit: quæ etiam multa mucosa, pituitosa, nidorosa & semicruda euomit. Repetita vero eadem tepida aqua, nihil præter aquam ipsam euomit, aut deorsum egressus. Quare tunc ventriculum roborans serato quodam ventriculo admoit, & intus minam cydoniorum cum speciebus sumens, & panem biscotum in vino generoso & astrictionis particeps irroratum dabit: à viribus abstinentes & rebus duris concoctis, dissilibus. Et ita nostrum quoque ægrum curauimus. Vomitu & secessu postea desinente, à somno paulatim cibo refecimus: & ut cruditer averteret imperauimus: tollimusque panem cum vino malipunicum commode dedimus: & ventriculum extius roborauimus, pullosque gallinaceos camacore sen omphacio, piscesque saxatiles cum exiguo & suauis aromate præbimus: & mox sanus factus est.

SCHOLIA.

Cum igitur ex variis causis cholera exoritur, diligenter signa perscrutari oportet, tam ea, quæ hunc affectum præfagiunt atque demonstrant, quam quæ causas ipsas distinguunt, & quæ mera prognostica sunt. Nam iis cognitis de curatione cogitandum, quæ ad vnamquamque huiusmodi causam accommodetur. Præfagientia signa habentur ex vitæ instituto præcedente, tum vitæ ratione, quæ corruptionem ciborum, & humorum nimiam repletionem inferre solent, per motum quoque inordinatum post cibum assumptum: & ex assumptione corruptibilium rerum: de quibus in causis abunde dictum est: potissimum si naturalis stomachi debilitas adiuncta fuerit, vel innata, vel accidentalis, ob causas dissoluentes diminuentemque virtutem. Sic coitus superfluous ventriculum debilitat, quemadmodum & febres morbiue diuturni: quibus si accedat nauseatua satietas (ut vocant) cum accidentibus prædictis, immediate futuram cholera prædicere poterimus, si adfuerit punctio doloris circa ventriculum & intestina. Ita & ætate atque Autumno cum mali humores generantur; eo quod fructus crudiores comeduntur, si supradicta adfuerint, cholera præfagientis. At signa demonstratiua & præsentis indicia, sunt (teste Aetio lib. 9. cap. 12.) vomitus biliosus, & nidorosis, & acidus, ad plures horas continue perseverans; & venter inferne eadem excernit, sequiturque sitis ex suctione, impeditur pulsus, musculorumque manuum ac pedum, maxime vero surarum, contractio & tensio: & (ut refert Celsus) non solum bilis supra infraque erumpit, sed primum aquæ similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquam nigra vel varia. Ex his quasi tempora eiusdem cognoscimus ex Arculano. Incidit enim primo cum lenitate, deinde statim augetur, cum dolore, & punctione in ventriculo & in intestinis: & quæ sunt minus maligna primo expelluntur, ut cibi corrupti: deinde humores aquosi & biliosi & citrini, subflauis, tandem & virides (ut in nobilissima domicella Hentera, filia Domini Præsidis Hollandiæ, conspeximus, quam etiam curauimus) postremo nigri. Et in processu perueniunt ad spasmodum seu convulsionem & singultum: & postremo ad casum pulsus, sudorem frigidum, syncopen & mortem: & hoc usque ad quartum vel septimum diem. Est enim ægritudo peracuta: cuius terminus ad salutem aut mortem à quarto ad septimum diem. At symptomata illa mala, ut est extremorum frigus, & circa faciem frigidi sudores, & facies terribilis, & pulsus ad prauitatem & inæqualitatem tendentes: & quæ ad hæc succedit syncope, aliquando vero & convulsionem: illa quidem ob vacationem & oris ventris laborem: hæc vero vel similiter ex ore ventris, cui cerebrum & nervosæ partes consentiunt (& erit convulsio per consensum) vel ex siccitate, quæ pessima esset & lethalis. Sed hic notandum (ut Tacch. doctiss. quoque admonet) quod hic casus non fit, nisi ex calido & bilioso succo, cum corruptione aliqua, id est, mala qualitate acquisita. Vult tamen Rhases, ut fortis animo simus, & remediis instemus, neque desperemus statim de salute. Attamen prædictione te à culpa servabis immunem: ut exemplum sequens te docebit. Conuelluntur enim aut succi mordacitate, aut expultrice

SCHOLIA.

expultrice concitata, vel resoluta retentrice. Verum antequam ad signa prognostica veniamus, prius omnes causæ distinguendæ. At facile omnes interstingui poterunt: nempe ob alimentorum assumptorum copiam, aut eorundem (ac etiam potionum) prauam qualitatem, quæ omnia ex laborantis, seu astantium loquela percipies; veluti etiam si præcesserit usus frigidarum aquarum, aut frigidorum medicamentorum ab extra adhibitorum. Verum ubi ex copia bilis, seu aliorum pravorum succorum redundantia, cholera fuerit excitata, ex propriis eorundem humorum signis, ac sæpius iam dictis, eos discernes. Sicuti igitur biliosam cholera significabant initio, ea quæ de siti, dolore, punctione, vigilis & bilis vomitu diximus; ita pituitæ vitæ præsentiam, in ventre pondus, frigus, & sensum gravitatis, indicabunt: uti & phlegmatica falsa ex salsedine, sicuti bilis ex amaritudine, ut iam frequenter dictum est, percipietur.

OBSERVATIO XLVI.

De cholera lethali ex bilis copia.

Pvella iuvenula, biliosa, sitibunda, quamvis certis intervallis natura sese vomitu ac secessu bilioso exoneraret, tamen ob impetum humoris biliosi erumpentis, salubri humore simul cum bilioso foras expulso, male subinde habebat. Humiliorum homines à Græcis χολεραϊκή ή χολεραϊστής dicuntur, Plinio vero biliosi. Ceterum hæc puella, cum ætas esset, & victu calidioris usa esset, & alui & capis, bilem adeo copiose nunc infra, nunc supra deiciens, & rosionem & caliditatem circa ventriculum percipiens, cum præcordiorum dolore intensissimo, extreme decubuit. Ad quam prius tertio die accitus, cum ea vidissem, quæ per aluum & vomitum efferebantur, omnia biliosa esse, agramque vehementer sitire, & linguam scabram habere, non sine febre ardente, cholera ex bile prauissimam esse intellexi, viribus iam omnino collapsis: cumque tribus istis præcedentibus diebus ac noctibus bilem porraceam euomisset, illam in periculo esse pronuntiaui; & cum medicamenta parum proficerent, atque nunc etiam citra manusque contraheret, sitis accendebatur magis, & anima deficiebat: adhibui ea, quæ animam refocillarent. Sed omnibus illis signis malis concurrentibus, mortem prædixi; Nec mirum, cum tales subito moriantur, verum non prius, quam nates acuantur, & tempora extenuentur, & oculi caui fiant, faciesque decorem amittat, & extrema frigore & sudore corripiantur. Quæ cum animaduverterem, & simul ex toto corpore subito ad stomachum & intestina humores confluere, leues quidem superna petentes, & graves ac corruptos ad intestina, cum continuo impetu defluentes, viresque prostermentes; cumque iam sine somno esset, & anima frequenter deficeret, & facies quadam formidine percussa cerneretur, & nates acutæ essent, & extrema sudore & frigore corripentur, & singultus inquietaret, pulsu modo ablato, modo redeunte, mortem de proximo futuram prædiximus, materia virulenta ad intima præcordia confugiente: ita ut in quarto die hæc obierit.

Pet. Foyest. Tom. 2.

Reste dixit Alexander Trallianus lib. 7. c. 16. cholera acutissimum affectum esse, syncopen insensum, immodicamque virium resolutionem inducentem, prognostica. atque id omnibus in confesso esse. Idcirco accuratè inter nos, & celerrime curari, merito postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociva est: in hoc autem affectu etiam exigua, ac lenis curandi mora, baud simplicem offensam, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ pluribus dicitur, conciliat. Hæc Trallianus. Non mirum igitur, quod in hac puella, cum ad tertium usque diem, ne de remediis quidem cogitasset, subito ita vires concliderint, ut talem faciem incurrerit, ab Hippocr. descriptam, qualis tabidis contingit, ac paucis diebus, ut quarto die, viribus exhaustis interierit. Idque Celsus confirmavit: quippe cum hic affectus toto genere periculosus sit. Vbi enim signa prædicta adfuerint, ut subita extenuatio, præsertim faciei, & frigus & pulsus mutatio, & syncope ac convulsionem in debili corpore; magis lethalia habentur; si etiam in fine dolor perseveret, & punctio, cum virtutis debilitate, arguunt corporis consumptionem. Attamen non semper desperandum est, iuxta eundem Celsum, cum idem dicat, Neque tamen ulli morbo minori momento succurratur: modo (ut nos quoque addamus) tempore medicamenta apta adhibeantur. Cholericæ vero istæ affectiones magis in ætate fiunt; & febres intermittentes, & quibus errores accidunt, & quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt, ut 7. de morb. vulg. Hippoc. scriptum reliquit. Autumno etiam frequenter contingit, ob esum fructuum, ut diximus; raro vero in hyeme. At si ex procacitæ causa, id est, quæ recentè impressa sit, ut ciborum ratione eueniat; quomodoconque erratum sit, facilius affectus videtur, quam si ex totius malo. Quæ vero magnitudinem affectus monstrant, & morem, hæc magis aperient, præsertim ad vires comparando. Cum enim affectus toto genere periculosus sit; gravius periculum euadit, ubi ea comparuerint. Sunt autem, quæ superflua motione symptomata, ut extenuatio subita, tum alia supradicta. Vtina quandoque copia. Pueros & adolescentes voraces, plurimum infestat: viris cum euenit periculosior est, si lacertosi præsertim fuerint. Assuetis id malum minus periculosum est, ex quo aquam euomunt. Qui eam frequenter incurrunt, facilius eam tolerant, materia non existente tam copiosa aut maligna: qui vero raro, difficulter sanantur, ex causis contrariis; & ideo infantes citius curantur. Et quamquam hæc puella alias hoc malo bis aut ter affecta, facilius curabatur; attamen nunc existente materia maligna cum febre satis ardente, antea stomacho imbecilli existente, & nunc viribus deiectis, quarto obiit. Quæ vero originem habuerit ex cibi corruptela, aut alia causa primitiua, modo non sit causa venenosa, & quæ ex materia pituitosa & aquosa sit (cum hæc facilius corrigantur) etiam si accidentia in principio terrorem incutiant, minus periculosa habetur. Ex opposito, mala est, quæ in corpore forti, non cōsueti aut hyeme fiat, & ex multiplici corruptione, non tantum in ventriculo, sed in vasis totius & membris in processu virtute deficientis cum cæteris malis symptomatis iam dictis. At, ubi restringitur cholera, sepe declinat materia subito ad vias urinæ, & accidit urinæ ardor; & malum

Ec iij (vi)

(ut diximus) subito leuatur. Est hæc passio cholericæ dicta ut plurimum salubris, si debite tractetur, sed non apud tardos, & negligentes (ut Arculanus recte dicebat) neque apud imperitos: celeritate enim indiget. Nam mora, ut in hac puella, se ipsam negligente, mortem intulit. Quod facile in principio curetur, infra scripta exempla docebunt.

OBSERVATIO XLVII.

De cholera cum sanissimis symptomatis & recte curata.

Maria Gerardi, vxor illius Magistri Remi Astrij, Mathematici insignis ac Philosophi Alcmariani, mihi admodum familiaris, mense Septembri, anno 1551. in acutissimam choleram lapsa est, vna cum syncope vehementiore: pituitam prius multam & aquosam; deinde & bilem prasinam æruginosamque, simul euomebat & per inferna deiciebat. Statim accitus, & ad eam ingressus, frictions adhibui, & ligaturam brachiorum: mox à syncope releuata, hoc sequens medicamentum propinaui. *℞. decocti hordei non excorticati ℥ iij. syr. ex infus. ros. rub. magis apertorum ℥ j. misce*, quo facile vomuit, & secessum habuit: nolimus enim in principio ea, quæ efferebantur, cohibere: Quia imo, cum adhuc nauseabunda esset, hæc tepide propinauimus: & euomit. Nam sola aqua tepida cum syr. acet. simplicis, satis officium suum in tali casu præstitit. Interea etiam dedi hunc syrupum. *℞. aquæ decocti hordei mund. ℥ iij. syr. de ribes, syrup. cydoniorum, an. ℥ ss. syr. ex infus. ros. ℥ ss. misce* syrup. iste vltimus non erat paratus ex rosæ pallidis seu provincialibus dictis, qui magis laxat, sed ex ros. rubeis parum apertis per infusionem, cum & aliquo modo detergat, & lauet ventriculum & intestina. Materia itaque maiori ex parte vacuata (quod in horis 24. plerumque fit) leuiter huiusmodi cohibitionem incipere licebit. Ideo imperaui huic nostræ ægrotanti, ut tempore satis ebiberet aquam coctam cum syrup. de acetos. citri, ex cotoneis, & syrup. ex ros. siccis, æquis inter se portionibus cum aqua cocta mistis. Et ut frequenter vteretur ad maiorem roborationem ventriculi & constrictionem, iubebam ex condito sequenti, vel eius æmulo. *℞. conserva ros. antiq. conserva acetosa, ros. de ribes, ana ℥ ss. diacydonij sine speciebus ℥ vj. semin. acetosæ, semin. citri puluerisator, an. ℥ j. manus Christi cum perlis ℥ ij. specier. trionfant. ℥ ij. cum syrup. conf. myrobal. emblicarum & syrup. menthaceo, fiat conditum mediocriter molle: de quo sumebat instar dimidiæ castanæ, per horam ante pastum, mane & vespere; etiam extrinsecus hoc vnguento ventriculo roborato, ac temperate calide inuncto, mane & vespere ante pastum. *℞. olei myrti, cotoneorum, an. ℥ ss. olei mastichini ℥ ij. corall. rub. ros. rub. hypocyssid. acacia, ana ℥ j. santali citrini ℥ ss. cereæ exiguum, fiat vnguentum.* Et quia prius facile in syncope inciderebat, frustum manus Christi subinde dedimus, superforbendo cochlear vnum succi granatorum acidorum. Cæterum cum leui frictione, ut dictum est, cessaret syncope, reliquam curationem cum supradictis perfecimus: alioqui si accidentia terrentia non cessassent, dedissem vinum tenue, odoratum, cum aqua frigida fractum. Sic anno 1588. Iunenis quidam in febre continua biliosa cum supra modum bilem euomeret, & infra deiceret, & in syncope incidisset, cum su-*

dore frigidus, parum vini Rhenani dedimus cum aqua fractum: quibus syncope cessauit, & ad se rediit, cum astantes illum morituri existimarent, cum nocte subito ad iuuenem vocatus essem. Cum itaque in muliere hac humorum excretio quicquisset, cibis probi succi utebamur, parum restringentibus; adiciendo ad ventriculi roborationem, columbaceum pullum perdicemque, & gallinaceos, cum acore, ut omphacio: vel pisces saxatiles cum aromate suauis. Et ita probe restituta fuit sanitati, cum vera cholera laborasset, sine febre.

S C H O L I A.

Pro morbi diuersis temporibus, proque causis & causarum diuersitate; hic varia curatione opus est. Et licet in communi, æger curandus sit conclaui obscuro & temperato, variisque odoribus grato, citro, malis cydoniis, aliisque similibus pomis: tamen in iis ægris oblectamenta querenda sunt; quandoquidem aliis panis odor fastidio est: ita & aliquos noni, qui odorem pomorum cydoniorum respuebant. In primis animi securitas, ac somnus omnino magnam curationis partem possident: quæ cantu sonoque queritur, secundum aliquos. Attamen ægri ita male habentes, strepitum illum sæpe ferre non possunt. Et non solum hic leuiter adstringentia, etiam in cibis ipsis permisceri debent, aut parum ante assumi; sed etiam post eos, cum simul ingruat vomitus, & alui fluxus, quamquam & ea moderata esse debent, nec à principio. Nam in principio (ut iam diximus ex Aetio) quæ effertur, cohibenda non sunt: nam inutilia (ut idem refert) euacuatione opus habent. Sic quidam huius mali tres status faciunt: Primus est, cum corrupti in ventre cibi molestiam inferunt, & notæ corruptionis adfunt, sed adhuc natura ad excernendum non impellitur: tunc enim leuiter irritare vim ventris oportet, priusquam per se irritata vehemens sponte eueniat: hinc enim nullo modo incommodum eueniet. Signa erunt huius status, cum nauseam patitur, sentit morsus & rugitus, & angorem circa ventrem. Sic, si cibos venenosæ qualitatibus sumpsit, vel purgantes cibos, vomitus tunc à mulla fiet, vel aqua hordei tepidis, idque donec venter bis vacuetur: à quibus fouendus est venter absinthio oleo vel mastichino calido, ut vomitu relaxatus roboretur. Si vomitum recuset, vnguentum conficiemus addita cera, corallis, mastiche, aloë, & similibus. Quod si æstuat & æstas sit, oleo cotoneorum (melinum appellatur) vtemur. Mox ubi quieuerit, cibum dabimus, assum magis: sed mollem, ex his quibus assuevit, eligendo. Sæpe vero & ventrem proritare itidem expediet. Hinc etiam alia commoda, quod causa ipsa, hoc est, humores mitigantur. Quod si corruptio status excitaueit, quod sæpe fieri solet, aliquid quod discutiat status propinabimus; & extrinsecus pulueres aromaticos vnguentis admiscemus. Holle-rius huius causa exhibet cochleare medium seminis cumini, aquæ incoctum. Cæterum si sponte natura coepit excernere vtrinque (ut est secundus status) considerabimus num talis corruptio totum inuaserit, an ventrem solum, & primas venas, quæ inter ventrem & jecur sunt. Nam si ad has partes solas attinet, sufficient ea, quæ diximus, vno excepto, quod calida aqua potabimus. Hic enim intentio non est vomitum proritandi, sed

de sabluendi excrementa iis, quæ infixæ & inhærentia proritant, & temperare ea faciunt, ne mordeant. Ita nos in iuvene priore dedimus: ut etiam in muliere, quæ medicamentum ex veratro sumpsisset, aquam decoctionis hordei communis cum zacch. Tertius status est, cum in toto corruptela viget: itaque quamuis à ventre incipiat: prosequetur expultricis impetus. Hic vero considerare oportet: quod motus hic symptomaticus est, non prorsus naturalis, ut sunt excretiones, quæ per naturam fiunt. Ut igitur illas semper finire oportet, quia modum non excedunt (est enim leuis proritatio) ita hic distinguere oportet. Quatenus enim praua sunt: & à natura excreta, sinenda sunt, quatenus modum excedunt, sistenda. Initio igitur eadem calida potione vtemur, in eandem intentiones, ut proritatio sedetur: ita enim moderatio vacuatio. Sed si malum ingrauescat, cogitandum de remedio est: priusquam symptomata adoriantur. Intentio igitur erit fluxionem sedare, quod duos scopos habet, ut & omnis affectus qui è fluxione fit: Primus alio humores auertere: secundus roborare partes, quæ recipiunt. Primum ab auersione incipimus, quam modis supra expositis iam sæpe faciemus, vincendi scilicet extremos artus: nam & frictions per manus adhibita quietæ & mites. Præterea extremorum deligaturæ eisdem conducunt: & si quidem aluius vrget, plures brachiis & iuncturis, quibus illa cum manibus committuntur, cum frictions, tum vincula iniicienda sunt. Sin autem vomitus magis vrgeat: tum femora, tum talos constringere, paululum ipsa dissoluendo, rursus deligare oportet (ut patet quoque ex Tralliano) quo materiam semper in contrarium reuellamus. Nam & eo dolore natura ab opere expellendi auertitur, & ad eam partem humorum copia atrahitur: etiam cucurbitulas admoendo. Mox & roborantibus vtendum extrinsecus. Hic tamen naturam causarum animaduertere oportet: nam si æstuat venter, & sicut multum: & biliosa sunt, quæ euomit æger, applicare oportet & actu & potestate frigida: cauendo tamen excessum frigoris. Exempli gratia, succum intybi, vel oxalidis, vel porinacæ, vel semper vini: vel coryledonis, ex hordei farinæ: sic ex granatis totis expressum succum, vel panis bis succis immersus, vel ex linteis sæpe renouatus cum incauerit, vel coronea mala cum pyra, vino austero, vel acetico macta, & tusa in linteis extensa apposta, vel rubi & rosarum & vitis germina & rosæ ipsæ contusa & emplastrum forma applicentur. Quod si non adeo magnus calor appareat, cum hac materia aliquod aromaticum admiscebimus, ut inter herbas mentham siccam, silybrium, mastichem, cyperi radicem tussam, rosas siccas. Sic & panis assus aceto infusus, & mentha rosæ & cenanthe conspersus. Vbi vero signa caloris & æstus non adfunt, ut quod materia frigidior corrupta sit, calidiora in eandem intentionem afferre oportebit, quale est Gal. emplastrum, 1. ad Glauco. ex cotoneis palmulis vino coctis, aloë, mastiche, croco & farina hordei. Possumus & superiorum aliquo vtentes, ut cotoneis ex vino aromat. ros. puluerem inspergere: hæc extrinsecus: quorum copiam inuenies apud Alexand. Trallianum & Rondeletium & alios. Intro vero sumantur in eundem vsum ea, quæ à ratione cibi aliena sunt, sed grata, ut scilicet quantum fieri potest, retineantur. Si igitur æstuat, lactucam & intybum, cum aceto mandenda dabimus, aut limones, aut citri carnes, aut cotonea. Sic & Trallianus ob copiam bilis, causam efficientem obseruans, per contraria semper curandum esse dicit: per ea quæ

refrigerant & humectant, tum cibos, potus, & epithemata, quæ eiusdem sunt facultatis. Proinde pristinæ cremor refrigeratus his est idoneus: item lactuca eodem modo refrigerata, paulo acceti adiecto. Nos quoque thyrsis lactucæ conditis commode vtimur, similiter & is commendat intybum & panem ex aqua sumptum. Inter testacea conferunt, pectines & buccinalota sæpius: astacum bis coctum, & pisces duriores. Ex fructibus, qui non admodum maturi sunt, & adstrictionem mediocrem habent, præsertim mala, pyra, mala punica & vua pensilis. Ex bellariis hic conducit vua passæ & castanæ. Poterimus & panem ex acerba vua succo, vel punicorum dare, & aquam frigidam: sed id parum, quæ non vniuersa, sicut Trallianum: sed paulatim & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Sic & corna; mespila gustent, & ex cerasis austera, quæ motella dicuntur: conferunt & grati odores astringentes naribus obiecti. In censu vero medicamentorum astringentium, erit acacia, hypocyssis, in vino dissolutus, & terra Lemnia & bolus armenus; muna quoque simplex dicta, & syr. è myrto. Quod si affectus his non sedatur, & timor est synopes, somnum inducere expediet: eo enim sedatur prorsus fluxiones hæc, idque potius exterius oleis frontem & tempora inungendo. Vel dandum diacodion, hinc duplex commodum: nam sedatur proritatio expultricis vis, & humorum modus sistitur. At si nihil horum continere queat, cucurbitulam magnam ventri admoemus, & est maximum præsidium ad vomitum sistendum. Nam valde retrahendo eiusmodi cucurbitulæ vomitum prohibent. Præterea si diutius adhærent, etiam concoctionem iuuant: & ventrem ne amplius profluat, cohibent, eodem Alex. teste. Interea alio adhuc egerente (ut inquit Aetius) amyllum cum decoctione capitum papauerum, per clysterem infundatur: simul etenim cohibet & refrigerat, somnumque inducit, ut ipse refert. Nihil enim his præstantius est quam somnus & quies. Si vero iam symptomata eueniant, illis succurrere oportet quamprimum, ut antequam æger in syncope incidat, vinum exhibere, vel aquam carnis, in hunc vsum paratam, quod etiam ubi syncope accesserit, faciendum: præter alia remedia, quæ vniuersim ad synopas fieri diximus, excitantia. Si conuellitur ex inanitione, morandum non est: sed prædicto periculo extremæ partes aqua & olco dulci tepido fouendæ: similiter maxillarum musculi, per spongas. Post hæc si malo profligato vigilia vexant, moderatus somnus conciliandus: si inappetentia, ventrem roborantibus, & cibis gratis excitabimus. Ex his iam dictis constat, quomodo curatio in genere: ratione causarum & symptomatum, & temporum, sit varianda. Quæ particularibus exemplis supradictis, & iam adhuc dicendis multo clariora euadent.

OBSERVATIO XLVIII.

De duabus mulieribus cholera senissima laborantibus, & curatis.

Catharina Ioannis Harpadi Consulis Delphensis filia, nuper nupta, & circa tertium mensem prægnans anno 1558. 23. Iunij incidit in choleram grauissimam, ita ut abortus metueretur. Ad quam nocte accitus, illico dedi decoctum hordei communis, cum panco zaccharo: à quo rursus cum satis vomisset ac alium reddidisset, cumque extreme debilis esset: ut sæpius deinde

ex condito sequenti vteretur præcepimus. *℞. cor-
zium cicuti conditum ℥ ss. medulla citri condita ℥ ij. con-
ferue, summatim absinthij Romani: confer. ros. ana ℥
iiij. specier. diarod. abb. & arom. ros. sine musco, ana ℥
j. cum syrup. menthaceo & coroneorum, fiat conditum.*
Ventriculum inunximus oleis sequentibus, & cum
lana stomachum fouebamus cum iisdem oleis. *℞. olei
coroneor. ℥ ij. olei nardini, absinthij, ana ℥ ss. misce.*
Præterea ne abortus fieret, totum ventrem infe-
riorem inungi iussimus cum vnguento Comitissæ.
Et ne vapores maligni sursum repere: cum pau-
lo melius habere visa est, capiebat à cibo grana
septem vel plura seminis cotiandri præparati, sim-
plici tunica zaccaro incrustati. Altero die, cum
redirem, cholera cum sedata esset, conquieba-
tur de calore circa renes, quibus inunctis cum vn-
guento infrigidante. Gal. cumque astantes illam
pro deplorata haberent, non solum à cholera cu-
rata fuit, verum & ab abortu præseruata. Vti
etiam Petronella, vxor Salsoti Bokeli, cereui-
sarij Delphensis, quæ tamen non erat gravida.
Hæc enim anno 1560. 19. Martij die, cum in cho-
leram noctu vehementiorem incidisset, cum tor-
minibus ventris; doloreque intolerabili, & maxi-
mo cruciatu & angustia: ita ut suræ ac crurum
musculi valde conuellerentur, frigidumque ex-
sudaret, ita ut me ex lecto tunc vocauerit, cum
animaduertem simul flatu adesse, statim exhi-
bui cmin i parum puluerisati cum ceruilla: dum
in officina decoctionis dedi ℥ iiij. addendo pro ma-
iori diuersione syr. ex infus. ros. ℥ j. mellis ros. co-
lati ℥ ss. misce. & deinde totum ventrem inunxi-
mus cum oleo anethino, & chamæmelino simul
mixtis, ob dolorem, quibus præfidiis statim mi-
raculi instar fuit curata: ut alijs remedijs uti opus
non fuerit.

SCHOLIA.

Hic morbo medemur, ut paulo ante diximus, si
syncope aut aliud symptoma tale non impe-
diat, ablata causa. Quoniam primum vnquam-
que causam abscondere oportet, postea ad intem-
periem venire. Sed quomodo sit auferenda cau-
sa, & per quam regionem, docet Hippocrates:
Quo natura arripit, &c. In hoc affectu cum fiat excre-
tio per vomitum & secessum, ante omnia erit pro-
spiciendum, an æger vomat facile vel difficile:
num sine conuulsione & syncope: nam ipsi pri-
mum esset occurrendum, ut grauioribus & magis
vrgentibus. Et quamuis prima mulier facile vo-
mebat: nolimus vomitum nec secessum irritare:
sed contenti fuimus abluione cum decocto hor-
dei & zaccaro. Et ideo materia illa absterfa ven-
triculum roborauimus, & ad constrictionem le-
uem deuenimus, ne fieret abortus. In altera ve-
ro muliere, quamuis erant statim in principio ac-
cidentia mala: nempe conuulsio, nolimus sta-
tim constringere: & ideo abstergentibus vsi fu-
mus, cum facile vomeret, & secessus satis habe-
ret, syrup. ex infus. ros. dedimus cum melle ros.
in hordei decocto: & quia aderat flatus, dedi-
mus etiam cuminum: & cessante fluxu ac vom-
itu etiam cessauit conuulsio: alioqui etiam ad con-
uulsionem præfidiis adhibuissimus. Quod si vo-
mitus fuisset in his difficilis, parum adiuuissimus
cum leuorib. ut mulla. Sed si bilis in ventriculo
fuisset, vel alimenta adfuissent in bilis natura cor-
rupta (quod per miorosus rictus intellexissimus) ab-
stinuissimus à melle rosato vel calidioribus, &
ab iis: quæ bilem augent & intemperiem. Aqua

tepida contenti fuissimus, non tamen in parua
quantitate (sic enim verius in bilem) sed copiosa:
tum ne bile fecat (ut ait Hippocr.) tum ut ventricu-
li partes omnes abluat & citius reiciatur. Æger
autem sinendus est vomere, donec vitiosus hu-
mor totus, aut maiori ex parte reiectus fuerit:
nec antea medicamentis adstringentibus est vten-
dum: quoniam materia, quæ agitata est, & qua-
si sursum elata: retineri non potest, nec etiam de-
bet, ne humoris corrupti vacuatio impediatur.
Siue igitur corruptio ob copiam ciborum fuerit
oborta, siue alimenta fuerint corrupta, siue ha-
mores corrupti, conuenit aliquando in principio
iuuare excretionem, tam per vomitum, quam
aliquando per sedem, leuioribus tamen purgan-
tibus medicamentis, prout diuersus humor requi-
rat. Ita viribus integris recte faciunt, qui modice
detergentia exhibent, ut quicquid reliquum est
humoris, euacuetur: ut in materia calida dant
aquam hordei cum paucis zaccaro: in frigida,
cum paucis cinnamomo. Si adhuc humor superfit,
in calido capium myrob. citr. ℥ ij. fiat decoctio in
aqua hordei, & in ℥ iiij. colaturæ sacchari parum
dissolunt: in frigida, pul. de hier. vel arom. sed
ab iis abstinerem, ad vomitum magis conferunt,
quam ad cholera morbum: qui fere totum hu-
morem, & plusquam sat est, euacuat: nam hæc
excretio quamuis vilis sit: si modum non exce-
serit, periculo non vacat, cum prostratis viribus
mortem afferre possit. Vbi igitur vitiosus humor
in principio adiuuatur leuiter, totus, vel ex parte
fit reiectus: tunc ventriculus est corroborandus:
ne attritus à partibus vicinis excrementis, ut à
liene, iecore, ac intestinis, ea quæ præter na-
turam est vacuatio, continetur. Ideo ventricu-
lus potius ad motum quam sumptis est roborandus:
quoniam admota melius corroborant & sistant,
citra ventriculi nausæam, vel subuersionem. Quæ
vero sumuntur, siue medicamenta, siue alimen-
ta fuerint, reiciuntur propter agitationem. Pro-
pterea æger quiescat: & interim, quod ad motum
est, non erit otiosum. Somnus, si fieri potest, con-
ciliandus, ut qui & concoctionem maxime iu-
uat, & excretionem retineat. Admota perpetuo
debent esse adstringentia: sed calida in frigida,
& frigida in causa calida. Quæ vero admouentur,
vel sunt emplastrum, vel sacculi, vel foci oleorum,
vel decocta herbarum, vel succi earundem, &
fruct. & pulu. Formulas vide apud auctores, &
præcipue apud Rondeletium, tam in causa calida
quam frigida, & apud Hollerium.

OBSERVATIO XLIX.

De cholera cum syncope & conuulsione.

Choleram cum syncope & conuulsione, om-
nium seuissimam esse diximus: quæ cum
Ioann. Boethum, cereuisarium, in foro frumen-
tario Delphis habitantem inuasisset, adeo grauis
fuit, ut ex continuo vomitu ac secessu in synco-
pen incidere, deinde in conuulsionem manuum,
pedum, & præcipue surarum, & propere ad
in omnium musculorum contractionem, & non
solum musculi pectoris (ut vidimus) motu con-
uulsio afficiebantur: sed & gutturis, dorsi, tum
ventris contrahebantur, ut simile in praxi nun-
quam viderim, cum tanto dolore & animi defe-
ctione, ut hominem illico moriturum dixisses.
Ad hunc 23. Martij die, anno 1563. in nocte vo-
catus, illico hoc medicamentum deterforium de-
di vino prius naribus obiecto, & factis frictioni-
bus

bus extemorum, ut à syncope releuaretur non-
nihil. *℞. decoct. hordei communis ℥ iiij. syrup. ex infus.
ros. rub. comm. ℥ j. misce.* Eoque assumpto euomuit
plurima biliosa, & secessus plerimos habuit. Cum
autem lipothymia non cessaret: imo syncope obo-
raretur, ad vinum confugebam, tenue, odora-
tum, cum aqua frigida fractum: quod paulatim
sorbendum dedimus, nempe cum molli panis sum-
ptum. Modo dedimus panem feruentem, vino pu-
nico infusum: quod cum vomitu reieceret, rur-
sum dedimus. Interea ob deliquia animi refecimus
eum tostæ carnis succo expresso, cum vino puni-
ci, malique cydonij. Præterea ad impetum ipsius
cholera, ac vomitum inhibendum, tum pro siti
enormi, ac syncope, ut continuo ex hac mixtura
lumeret, mandauimus. *℞. rob. de vibes ℥ j. rob. ce-
rasorum, syrup. coroneorum, ana ℥ ss. m. mus Christi cum
perlis ℥ vi. misce.* Ad contractiones vero continuas
in omnibus fere locis linimento infra scripto iussi
inungi. *℞. olei irini, vermium terrest. ana ℥ j. castorei
puluer. ℥ ij. misce.* & per totam noctem loca con-
uulsione affecta continuo eo linimento parum
calfacto inungebantur: ita ut maximo quasi mi-
raculo mox hæc omnia mala symptomata cessa-
rint. Postquam autem malum non nihil inclina-
set, nutriuimus illum lacte amygdalato, cum
aqua surfuris confecto, modico zaccaro per-
lato, ad mediocrem dulcedinem, adiecto. Dein-
de & cibis optimi succi cum quoque restauraui-
mus; nempe pullis gallinaceis, columbis, perdi-
ce, cum acore: pyra, tum mala cydonia, modo
cocta, modo allata præbimus. Postea, cum ex
toto quasi omnia accidentia prædicta cessassent,
post duos tresque dies adeo venter restrictus est,
ut nihil excrementorum deiceret: qua de causa,
ut omni mane cochlear vnum syrup. ex infus. ros.
lumeret præcepimus: ita ut postea semel in die
naturaliter excreuerit; calore & siti post morbum
relictis etiam cessantibus. Doluit tamen subinde
in ventre inferiore versus pubem, ut ægre lotium
redderet: at pube sæpius inuncta cum oleo cha-
mæmelino, idque calide, copiose deinde lotium
reddidit, & sanus factus est.

SCHOLIA.

Curationem plerique, ut dictum est antea, duo-
bus fere modis absoluunt; vel causam remo-
uendo, vel symptomatibus occurrendo. In remo-
uendo causam, rationem habent materię fluen-
tis, num ea digna sit euacuatione: eamque diuer-
tunt, in contrariam partem trahendo: hinc &
quidam balneo vtuntur, ut materia ad partes ex-
ternas trahatur: sed melius ligaturis tum vincu-
lis, ut iam dictum, tum frictionibus. Habent
etiam rationem materię fluxæ: ut moderate, quo
natura vergat, eam vacuent per vomitum aut se-
cessum: alioqui, si superfluat, & vires deliciat,
restringunt & roborant ventriculum, & vitæ in-
stitutum præscribunt. Sic alij causam remouent,
diuertunt, humores incrassant, viasque & ductus
constringunt: de quibus satis iam dictum est. De
quibus videas Gradum, Gainariam, Arculanum,
& alios qui Rhazem aut Anicemam sequuntur. Sym-
ptomatibus occurrunt, qualia hæc fere sunt, *sitis,
syncope, singultus, conuulsio, vigilie.* Sitis restingi-
mus aqua hordei, cum succo granatorum, vel iule-
bo rosæ. Succo granato & syrupo eiusdem, tum
illis quæ ad sitim valere scripsimus in libro nostro
de febribus. Syncope curamus eo modo, quo
antea de syncope diximus lib. 17. & quorū exem-
pla etiam posuimus lib. 7. de feb. sympt. & ita syn-

copi intendimus, asperione aquæ frigida in fa-
ciem, vino subtili odoifero, non tamen multum
vinoso, aquæ permixto: paulatim absorpto, iure
carnis, & similibus: interea si extrema frigescent,
pannis calidis fouemus. Et viribus deiectis consu-
limus vino austero prius naribus admoto, vel as-
sumpto succo carniū, vino granatorum admix-
to, prælo expresso, buccella panis vino imbuta:
naribus admota, vel deglutita, modo possit. Sin-
gultui proprie ex inanitione, subuenitur frigidis,
stomachum roborantibus vacuationem inhiben-
tibus, vino & miua cotoneorum, exterius empla-
stris ex cotoneo, vel fotu ex aqua chalybeata, in
qua rosæ & santali & similia incocta fuerint, ci-
bisque facile digestiuis, frigidis & roborantibus.
Reliqua de singultu cap. proprio petenda. Con-
tractioni manuum, pedum, & suræ, iuxta Pauli-
lum, oleum calefactum musculis panno imponen-
dum, vel cerota liquida addito castoreo. Si ex
inanitione, oleo tepido dulci & aqua, partes fo-
uendæ extremæ, & musculi maxillarum, per spon-
gias, si contrahantur: alij hyeme inungunt oleo
nardino, liliaceo: æstate, violaceo & ros. Qui-
dam ex inanitione partes fouent lacte tepido cum
pannis admoto: at nos commode in muliere vsi
sumus oleo irino; & vermium terrestrium. Vigi-
liis occurrunt soporiferis, ut diacodio; & alijs
de quibus vide auctores.

OBSERVATIO L.

De cholera mutata in celiacum murbum, seu celiacam affectionem.

Prætor Rheniburchius, Delphis decubuerat
in foro, in Mechliniæ hospitio, ex cholera sa-
uissima; ad desperationem fere: à qua licet nostra
industria euaserit, postea tamen, hyeme existen-
te, cum intemperiem frigidam ventriculi habe-
ret: vnde pituita multa congesta, præcedente
cruditate, & in ventriculi cauitate coaceruata:
quæ in dies intemperiem magis fouebat, in ce-
liacam tandem affectionem incidit. Ad quem ac-
cedens anno 1559. die 2. Ian. huic optimam victus
rationem proposui obseruandam, qualem nobis
describit Trallianus: ex Philumeni medici anti-
quissimi decreto, cum & celiacæ ita curentur:
nempe cibis non nimium aluum reprimentibus:
sed qui adstringentes facile concoqui, & in to-
tum corpus distribui possunt: qualis est panis be-
ne elaboratus, probe coctus: vinoque astringenti
instinctus: nec non lenticulæ, & oryza sorbitio-
nes: pisces vero dura carne præditi, & ex aui-
bus quæ non sunt pingues, præter palustres. Ita & pa-
nis cum malis cotoneis & myrtis coctus: exhibi-
tus. Vitella quoque ouorum assa, & acero instin-
cta, & lac scissile propinatum, carnes leporinæ,
aut ferinæ, ac alia, quæ in fluidis affectibus pro-
sunt. Quod ad medicamenta attinet, cum liqui-
da incocta excerneret, modo pituitosa, modo bi-
liosa, & quasi fluida & cruenta, sine acrimonia
tamen: licet huic ventriculus frigidus esset, hepatis
tamen illi calidum erat: quod & venæ apparen-
tes indicabant, & constitutio ipsa parum maci-
lenta. Prima vice ut ventriculus ab eiusmodi hu-
moribus liquidis lauaretur, hanc potionem sum-
psit. *℞. decoct. hordei non excocti ℥ iiij. syr. ex ros.
siccis & coroneorum (ad maiorem repletionem & roba-
rationem) an. ℥ ss. misce, deum unica vice.* Deinde su-
mebat ad placitum ex hoc condito. *℞. confer. ros.
anethi ℥ j. miua coroneorum ℥ ss. corticum citri conditi
& medulla citri condita (ob sitim quam experiebat) an. ℥ ij.*

ana 3 ij. myrobal. empelit. conditor. & citrinor. an. 3 j. b. specier. diarr. abb. 3 b. specier. avom. ros. sine musco. 3 b. cum syr. cotoneorum: fiat conditum. Interea semper ante cibum sumebat 3 b. diacydonij sine speciebus. & sub noctem amygd. cum aqua oryza confectum, ut melius dormiret, & minus liquida excerneret. Interea & ad maiorem restrictionem & stomachi roborationem, utebatur etiam sequenti mixtura. ʒ. conf. ros. antique 3 j. trochisc. de spodio cum semin. aceros. 3 ij. trochisc. de carabe 3 j. rob. de ribes, syr. de agrestia, syr. menthacei, m. 3 b. misce. Verum antequam hæc sumeret, cum circa ventrem non nihil doleret, & tormina experiretur, hoc enema iniecit. ʒ. decoct. bordei comm. correfacti ʒ. j. olei ros. amphacini, sacchar. rub. ana 3 j. vitellum vici: fiat clyster. vix tepide iniiciebatur, ac clystere iniecto materia in melius commutata est. Tunc utebatur mixtura inungi curauimus. ʒ. olei mastichini, cydonior. myrtini, ana 3 b. pul. ros. rub. mentha sicca, macis ana 3 b. cera modicum: fiat linimentum. Atque hæc valde profuere. Nam hic morbus curatione statim adhibita, teste Alexandro Tralliano, facile tollitur: postea difficilior: ubi enim inuenerat, tarde remouetur. Similem fere casum habes apud Amatum Lulianum de celiaco morbo & ʒ. ʒ. ʒ. & atrophiam cent. 3. curat. 78. in quo loco plurima remedia reperies: quamquam æger ille longiore tempore hoc malo laborauerit. At noster æger statim adhibitis remediis citius conualluit, spatio undecim dierum. Verum curato utcumque celiaco morbo ac fluxu dolorem & caliditatem circa renes passus est. Sed facile hoc symptoma repressum cerato infrigidante Galeni libris imposito. Verum non diu post pustula quoque oborta illi sunt circa palatum & linguam: quæ breui tam hoc collutorio cessauit. ʒ. decoct. bordei comm. aquæ plantag. ʒ. j. semin. cydonior. 3 j. ebulliant leuiter, & coquantur colatura addendo diamor. 3 j. b. mellis ros. colat. 3 b. misce. Sed cum tempus hybernium esset, cum frequenter cogere tur alium deponere, ex frigore & ventositate dolorem cum torminibus circa hypochondrium sinistrum expertus est: qui tamen mox ablatus inunctione olei de cappar. anethini, chamamel. simul mixtis. Sed à celiaco morbo breui curatus, post aliquot dies idem tussim incurabat: syrup. pectoral. tum eclegmata, ne incideret rursus in morbum celiacum, præscribere non fuimus ausi: sed lacte amygd. vtentes, cum aquam farfaræ & zacch. parato: ut continuo masticaret glycyrrhizam viridem recentem, à cortice exteriori repurgatam iussimus. Quibus remediis etiam à tussi liberatus est: & quamquam is diceret se habere contra tussim infallibile remedium, nempe pomum excauatum, melle rosaceo repletum, & parte superiori prius abscissa, & eadem cooperta, supra prunas assum, & sub noctem deuoratum, quo seipsum frequenter à tussi curauerat, nunc tamen eo non vtendum suadimus: ne rursus affectionem celiacam incurreret: & satis amygdalatum sub nocte sumptum ad rem fecit, tam tussi quam celiaco malo conueniens.

S C H O L I A.

COELIACA affectio, licet vna cum lienteria, diarrhæa, dysenteria, ad immoderatas alij fluxiones pertineat: tamen cum etiam ad ventriculi affectiones, secundum quosdam referatur, de ea hic dicendum esse putauimus. Quamuis hæc ipsa à lienteria differat: tamen cum eadem sape

confunditur, & quidam sub vno capite de iisdem tractant: cum iisdem fere remediis curentur. Græcis vero κατάρκω, à Latinis celiaca seu ventralis affectio dicitur, ab ea quæ afficitur parte celiaci, nomen assumens, ex Aetij mente cap. 37. lib. 9. Velox quidem est exitus eorum: quæ per os assumuntur: verum non omnino crudorum & incoctorum. Nam in ea affectione solum leuia & humecta excrementa egeruntur, ventre pro imbecillitate ea digerere nequeunte, vt ipse inquit: quapropter ne concoquantur omnino, nec digeruntur alimenta: sed humentia, imperfecteque cocta redduntur: neque ita celeriter ea, quæ assumpta sunt: in celiacis, egeruntur: quemadmodum in lientericis. Dicitur itaque morbus hic celiacus, & ʒ. ʒ. ʒ. κατάρκω nomine, ventrem siue stomachum significante, in quo potissimum sit: non tamen melaret à κατάρκω apud Hippocratem quandoque ventriculum, quandoque vero alium significare: vnde etiam Amatus testatur, non tam ventriculi passionem, quam gracilium intestinorum esse, & D. Fernelius doctissimus inter symptomata intestinalium, non autem ventriculi solum enumerat, cum dicat: Ex imperfecta chyli malaque distributione fieri, quam mesenterij lienis aut iecoris obstructio, vel trabeculis facultatis imbecillitas, vel alimentorum maximeque fructuum fugacitas, & potus immoderata copia peperit: hæc enim distribui tota nequit, sed maxima ex parte in abdomine subsistit. Ab his causis multa congeritur illuvies, quæ sensim in tenuioribus intestinis aucta, vel in ventriculo, vel in mesenterio, vel circum viscera tempore corrumpitur. Quumque sua copia grauis esse cœperit: vel sponte infra interdumque supra prorumpit, vel à natura lacessita propellitur: nonnunquam leuissimum clysteris, medicamentive irritamento exit. Et quamquam hic, vt & in lienteria, amborum, nempe ventriculi tum intestinorum, sit affectus, vt etiam docuit Donatus, ex Galen. 6. de loc. affect. & aphor. 12. 4. lib. & ambo sint symptomata in genere noxæ functionum naturalium, recenteris videlicet: in celiaca tamen diminuta (in qua cibos non complectitur vsque ad consummatam concoctionem) in lienteria vero abolita est. Qua ratione etiam differunt & inter se communicant. Iam etiam, vt 6. de loc. affect. pater: lienteria seu leuitas intestinorum subito euenire non potest: propterea celiaca præcedere eam solet, vbi ventriculus frigidior fuerit: leuia autem & humecta excrementa egeruntur, ventre præ imbecillitate ea digerere nequeunte, & non cibi crudi, & incocti inferne prodeunt in celiacam affectionem, vt Aetio visum est. Sequitur autem celiacos assidua egestio, aliquando fetida, cum animi deliquij sensu, cibumque auersantur: ac decolores & vehementer graciles fiunt, vt etiam Paulus testatur. Languida cum sit, & imbecilla ventriculi facultas in celiacis nec concoquantur, nec digeruntur alimenta, sed cruda, humentia, imperfecteque redduntur, alio continentur fluida: quamquam quæ assumpta sunt (vt paulo antea diximus) non ita celeriter, veluti in intestinorum lenitate egerantur. Fernelius hæc addit. Pulsus frequens & celer existit, tanquam febris affigeret, & deiectionis leuissimæ animi deflectiones obrepunt. Ante eruptionem abdomen distenditur, venterque prominet: bisque succedens spontanea perturbatio, quæ celiaca affectio est. Ita & Alexander Trallianus. Celiacus affectus ex ventris ipsius cruditate generatur, dum ipse de celiaci præ imbecillitate cibum concoquere, & corpori suppeditare nequit. Quare liquida & non bene concocta, variis coloris: nec non cruenta saccæ, veluti ex vase destillante per aluum excerpantur. Nihil igitur mirum est, quod sanguis

sanguis non probe concoctus in ventrem recidat, recenrice facultate amissa aut vitata: vnde longo tempore frequens ventris resolutio, cum assidua decoctione perdurat: corpus exenatum vi illis consumptum: cruditas, visioque, & tormina ventrem affligunt, & cibi fastidium committunt. Hactenus Alexand. Sed hic sciendum, Cornelium Celsum longe aliter hunc morbum scripsisse, quam nos hactenus fecerimus: cuius & meminisse Alexander Benedictus Veronenfis lib. 20. cap. 7. de celiaco morbo, inquit Celsus lib. 4. cap. 12. morbum hunc pylori, id est, tanitoris proprium esse ait, in quo venter induratur, & torminibus premitur, aluique adeo nihil reddit, vt ne spiritus quidem infra, sed nec supra erumpere possit. Cuius etiam meminisse Benuenius, 106. in libello suo de abditis morborum causis, cum Paulum patrem suum clystere ex solo lacte in ventrem iniecto, ac multis subinde strigmentis depositis, ab hoc malo curauerit. Sed hic lector admonendus est, locum illum apud Amatum sub finem scholij, curat. 7. centur. 3. mendosum esse, cum dicat patrem Benuenij obiisse, quum tamen idem Benuenius patrem suum ab illo morbo referat à se curatum esse. Cæterum non loquimur de illo celiaco morbo: sed de eo, qui ad ventriculum pertinet, & subinde ad vtrumque nempe ventriculum & intestina, in quo humida & incocta egeruntur. Quæ affectio aliquando cito curatur, & non diu durat. Nam, vt scribit Fernel. aliquando vacuato humore superfluo, profluuium hoc sponte conquefcit: interdum postero aut tertio die. Attamen, secundum alios, non statim per se desinit: imo diutius durat, & vix remediis cedit; & propterea si diutius duret ac protrahatur malum, ad magnam omnino desperationem progreditur, ægris ad conuenientem dietam pigrescentibus. Et si affectus autumnio incipiens ad hyemem vsque se extendat, difficilior omnino curatur, ex Aetij sententia, præcitato loco. Cum vero inseparabilia symptomata sunt celeris exitus ciborum (qui ad diminuatam concoctionem consequitur, propter iniustum completendi tempus) deiectionis humiditas & digestio in corpus diminuta, vt constat ex Galeno lib. de diff. symptomatum: si eadem celiaca prorogabitur, necessario atrophiam consequetur, propter diminuatam in corpus alimentorum digestionem; quod exemplo sequenti ostendimus. Ideo, vt ex Tralliano prius diximus, morbus hic curatione initio adhibita, facile tollitur, postea difficilior. Vbi autem inueterauerit, tarde remouetur.

OBSERVATIO LI.

De celiaca affectione cum Atrophia.

Vir sexagenarius, cum in hyeme paulo diutius celiaca affectione detineretur, macilentior factus, in consilium cum me vocasset, quibus modis curari posset, animaduerti eundem etiam atrophiam affectum, ob diminuatam in corpus alimentorum digestionem. Hic autem liquida subalbida, male cocta, humentia, sed non fetida, longo tempore deiecerat, vnde & celiacam affectionem esse cognouimus, ex intemperie frigida ventriculi totum corpus album erat, quasi cachexia affectum, cum atrophiam ita vt non nutretur. Huic autem, cum etiam pituitam in stomacho coaceruasset: consului, vt prius cochlearia duo oxymelitis acciperet, ad deterfionem: cumque nausea-

bundus esset: cito assumpto leuiter euomuit, alioqui dedissem decoctum raphani cum oxymelite. Mox ad pituitam magis digerendam & præparandam imperavi, vt decoctum absinthij & menthæ sumeret, cum syr. ex absinthio, mentha, melle ros. Postea ad leuem purgationem dedi potionem sequentem. ʒ. myrobal. chubul. 3 ij. stor. ros. rub. p. j. absinthij Rem. manip. j. bulliant in aqua comm. & facta express. in 3 ij. dissolue syr. ex infus. ros. pallid. ʒ. j. agariici trochisc. 3 b. fiat potio. Interea dum hæc operabantur, exterius iussimus ventriculum oleis rescillari, nardino videlicet, mastichino, absinthino & menthæ, succida lana exceptis. Mox & scutum apponi iussimus, ex sola mastiche, aliquot guttis olei absynthini adiectis, pistillo calido supra alutam ad scuti formam redacta. Post diem vnum aut alterum similiter imperavi, vt 3 j. theriacæ optimæ acciperet diacydon. cum speciebus. præcipue ante cibum, & videretur cibis boni succi, pullis columbinis domesticis, ficculis, phasianis, turturæ & cuniculis paruis, & contumem acciperet, & succum ex carnibus prædictis, adiecto aliquo puluisculo ex cinnamomo, caryophyllis, & exiguo croco: & vt etiam in fine Martio pane & vino zaccharato vteretur. Et vinum concessimus rubrum: etiam cynaram cum suo iure, & in fine vt vteretur iis, quæ leuiter vti nam cernerent. Quibus remediis & hic tandem bene se habuit.

S C H O L I A.

COELIACA affectio & lienteria, fere iisdem remediis curantur, quamuis scorsim Trallianus de celiacorum curatione, ex Philumeno scripserit. Is in potu dat radicis quinque folij decoctum, & rubi radicis similiter: nec non salicis arboris: hæc in calida intemperie magis conferunt, vt & syr. myrt. de ribes, ex succo cicchorij, cotoneorum, oryzaech. cum decocto acetoſe, sed & leuis purgatio ex myrob. citrinis, thamarindis, vel syr. ex infus. ros. pallidar. cum thabarb. Idque in principio, quando vires non sunt deiectionis. Deinde astringentia adhibenda, vt semen plantag. Valet egregie, iuxta Aetium & Paulum gallinarum ventriculus desiccatus ac tritus, & potui inspersus, nec non apij, feniculi, anisi decoctum, & eodem tempore, quæ vti nam ciunt: sed eorum quantitas minor esse debet, nec eorum vsus largus commendatur: sed & vomitus si in ventriculo humores collecti, modo ad vomitum proni sint: alioqui minus proritandus. Deinde topica astringentia adhibenda, & cerata, & saccelli, vt de vomitu bilioso diximus. Si simplex sit intemperies sine humore, prædicta conueniunt, excepta purgatione. Si ex frigida intemperie, curationem præcedente obseruatione iam diximus. Cum autem eodem medicationis ductu vtendum sit in leuitate intestinorum ac in lienteria, quod ad celiacos & dysentericos (vt Aetius refert) propterea quæ auctores scribunt, de vnius curatione, etiam alterius subintelligenda erunt. Quamobrem complura remedia ponemus de curatione lientericæ, cum de alui profluuiis quoque agemus. Hæc de celiaco affectu, qui etiam ad stomachum pertinebat, dicta satis esse puto. Si plura & veterum remedia desideres, illa ipsa tum reliqua videas apud Trallianum, lib. 8. cap. 8. de celiacis, quæ ex Philumeno excerptis. Et ita stomachi ac ventriculi malis absolutis, huic libro finem imponentes, ad iecoris mala tranſeamus.

Finis Libri decimi octauo.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber decimus nonus.

DE HEPATIS MALIS AC AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De calido imbecilloque Hepate.

Vir quidam, qui ex iecore calido & imbecillo laborabat, cum pauper esset, ad nosocomium Delphense deferabatur, ad quem acciti sumus. Huic cibi nullum desiderium aderat, sicut infestabatur: urinam fuluam longo tempore (ut narrabat) minxerat, & biliosa subinde euomerat: fereque cum pulsum attingerem febriebar. Vnde tandem iecore contabescere, humores eidem colliquebantur: mox & ipsius visceris carnes, bilemque crassam, grauiter olentem: valideque coloratam, per aluum deiciebat, & febris tunc adaucta fuit. Quæ, inquam, omnia ad calidi distemperamenti notas referuntur, & ad habitudinem iecoris corruptam, eiusque magnam imbecillitatem, morbo iam magis confirmato. Nam quoque simile quid lotura recentis carnis deiciebat, vnde & tabe conficiebatur. Venit mihi tunc in mentem Pauli dictum: Si iecur, inquit, contabescit, vniuersum tabe conficitur corpus: febris exasuat, cibi & adio elanguescit: bilem euomit. Si cum stomacho in columi humida ac liquidavimenta sunt: ægre decoquente iecinore vires eius infirmas esse diiudicari necesse est. Si vero lotura recentis carnis simile est, quod effunditur, commutaricem vim ad sanguinis generandi munus inuadit esse haud dubium est. Cum itaque huic hepar calidum esset, ideo calida vitanda proposuimus: qualia sunt loca æstiosa, ignis, multaue vestimenta, & vestes pellibus sublatæ. Sed illa vltima minus imperauimus, cum ad ditiores pertineant. Concessi refrigerantia, ut ex herbis oxalida, lactucam, portulacam, intybum, ex fructibus: cerasa non dulcia. A prunis abstinuimus, cum aluum satis fluidam haberet. Animi perturbationes, iram, furorem, moerorem, excreta interdiximus, vigilias, edulia actu calida, viscosa, crassæ materiae (quæ maxime nocent, cum illi optime iecori consulant qui poros aperiant) qua etiam de causa, lactaria, meliaria & aromata omnia damnauimus. Et inter obsonia bubulam, carnemque hircinam, & ouillam, agnina, arietinam, & inter pisces quicquid sine squama est, quales sunt anguilla, muraena, accongi: oua etiam dura tosta & omnia pingua, vinumque dulce & mustum: famem quoque cum ea corpus inflammer: & inter cibaria cucumeres: & aquosa omnia & putredini obnoxia. Iecinora inter cibos laudauimus: ut sunt pulli gallinacei, auiculæ, & perdiees, atagenes phasianosque commendauimus: sed quia pauper erat, contenti fuimus cuniculis & similibus, atque al audis, & turture. Et quia ex calida intemperie hic affectus hepaticus erat: aerem quoque elegimus ad frigidum vergentem: & somnum moderatum atque nocturnum, & quietem imperauimus. Et cum in vniuersum cibi medicoriter refri-

gerantes & minime obstruentes, teste Paulo, sint eligendi: quique probe distribuuntur, & robore temperiemque inducunt, & vim abstergerendi viscerum, aperiendique efficaciam habent: aliqui hic commendant ptisanam & eius cremorem, seridem & cichorium, modo crudum, modo coctum cum coriandro assumptum: etiam succus ipsius epotus, calidis & frigidis iecinoris vitis opitulatur. Interea multa iura & pingua detestanda. Saxatiles pisces concessimus, & cotonea, & malorum punicorum grana ante cibum, cum pane, & pyra astringentia, & vuas passas, ex Galen. A vino abstinuimus, ob febrem: tamen dilutum aliquando & ελκυσσός, ex Paulo (si adsit magna stomachi imbecillitas) datur. Sed quia hic erat pauper, ceruissiam chalybeatam, ob fluxum dedimus, modo etiam ob febrem aquam hordei, cum succo punicorum: aliquando & eam, in qua cichorium aut seris incocta erant: adiectis coriandri seminibus preparatis. Potiones vero, quod ad medicamenta attinet, viles duximus refrigerantes, detergentes, leuiter aperientes, & astringentes, ut decoctum seridis: cum syr. de end. ex ros. siccis, adiectis santalis & diatriosan. & pro leui expurgatione rhabarb. modo in infus. modo in substantia, cum decocto end. scariolæ, cichor. & syr. de portul. de limonibus acetos. citri, de granatis, oxyzacch. etiam acetosam, lactucam, portulacam in iure carniū decoximus. Cum autem male hepar inuixisset, ex Empirici consilio, oleo laurino, & aliis calidis remediis, cumque etiam dolorem aliquem in regione hepatis sentiret, eo relicto statim nos inuiximus cum vnguen. santalino, & epithema imposuimus, vel huius amulum, ex aqua plantag. solatri, acetosæ, endiu. cum aceto & santalis. Postea cum & fluxus adesset, constringentibus vsi sumus, ut ros. siccis, eiusque syrup. & de portul. valet etiam syrup. de agresta cum supradictis aperientibus & refrigerantibus. Hepar quoque inuiximus vng. ros. & santalino simul mixtis. Quibus hic postea bene habere cepit. Verum, pro dolor: magistris nosocomij non admittentibus amplius vltiorem curationem, cum viderent magnos sumptus, & quod non statim perfecte curaretur, ab omnibus remediis cessatum est: ita ut postea hepate contabescere hic æger quoque contabuerit. Et tandem fere per annum aut plures menses in nosocomio manens, sine remediis, mortuus est. Neque mirum cum huius affectionis curatio haud quaquam despicienda sit: quoniam nonnulli, propter curandi infirmitatem (ut Gal. inquit 4. de art. perierunt. Nam & hic in principio perperam ab Empiricis fuit tractatus. Quomodo autem in causa fuisse medicum, ut ægri morerentur: ibidem declarauit Gal. Hic autem ex calida intemperie, iecinoris imbecillitas fiebat, quæ rite curari debet: nam temporis spatio colliquationes ex ea fiunt, primum humorum: deinde etiam carnis ipsius hepatis: quin imo totum corpus absumitur, ut ex Gal. & Paulo

liquet.

liquet. Iecore enim, quod membrorum naturalium regimen possidet, cuncta animalia viuunt. Propterea de eius affectibus sollicitus admodum medicus esse debet: Sanitas enim magna ex parte (ut Hippocr. docet) ex iecoris bona valetudine constat. Quod si negligitur, facile periclitatur homo. Atque ita hic æger, cum prius in manus empiricorum incidisset, postea curari non potuit.

SCHOLIA.

Quod iecur sit principale membrum, quodque eius sit officium, satis abunde diximus in præfatione huius libri, & in libr. nostris de incerto vniuersum iudicio: cum hoc viscus vniuerso corpori (ut sanguificationis organum) alimentum præbeat. Ideo multis vitiis excruciatum, simplicis aut compositæ primum habitudinis distemperamento: vel naturali simplici, vel pariter composito. Hinc intemperies tum simplex, tum ex humorum vitio, substantiæ corruptela, obstructio, scirrhus, inflammatio, abscessus, vlcus. Hepatici vero seu iecinorosi, non vteribus, qui hepatis inflammatione laborant, dicuntur: sed cum citra manifestum aliquem illius affectum imbecillitas sola acciderit ex intemperie. Hos enim proprie iecinorosos seu hepaticos medici nominare consueverunt: quando videlicet citra aliquod manifestum in viscere malum, in propriis actionibus debilitatur, ut liquet ex Gal. 5. de loc. affect. & 8. de compos. medic. secundum locos, & 3. de caus. symptom. quem & sectati sunt Paul. lib. 3. cap. 46. & Aetius lib. 10. cap. 1. & Alexand. lib. 8. cap. 3. Iecur hic laesum est, ut ex lotura carniū cruentarum liquet apud eosdem auctores locis iam dictis. Estque symptomata in genere noxæ functionum naturalium, alteratricis scilicet: ac magis speciatim sanguificæ ipsius iecinoris, quæ non ablata est, sed diminuta ac imbecilla. Atque eius imbecillitatis causa quævis intemperies esse poterit, vel calida, cuius signa iam ex parte diximus in obseru. præcedente: vel frigida, de qua obseruatione sequenti dicemus. Cæterum quod ad calidam intemperiem attinet, ea ipsa sit ex cibis & potionibus calidis, & eorum conditis: & postea augetur ex præsentia biliosi humoris irrigantis carnem & venarum tunicas. Signa habentur calidæ intemperiei ex obs. prædicta, etiam ex colore totius corporis valde citrino, & bili attestante: nam & oculorum alba quandoque pallefcunt: estque urina pallida, flaua, & mordax, si ieiunant, & ictericorum similis, bile tincta. Habitus illorum gracilis est: sitis adeo stomachi consensus: & corporis tactus calidus. Et si plurimum excesserint colliquationes iam dictæ biliosæ, crassæ, fortidæ, genitæ ex sanguinis adustione, tum in iecinore contenti, tum in mesenterio, ut 5. de loc. affect. 9. mox caro colliquatur ex multo calore. Adest cruenta egestio, & colliquationes, ut in febr. pestilentibus & inappetentia febris, & fumorum vitiosorum vomitus, (8. de comp. med. sec. loc. & 5. de loc. aff.) vel æruginosus, & similes deiectiones: lingua scabra, corpus siccum, & gracile, iecore colliquescente: & incruenta sanies, contabescere. Et temporis spatio ex ipsa substantia tandem particulae longe fortidissimæ decernuntur, teste Alexand. c. 3. lib. 8. Sed & ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu, reliqua innotescent: nam temperamento calidi sunt, & tenues habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi. Prognostica etiam diximus in fine obseru. licet periculum ex affectus magnitudine iudicari.

Petr. Forest. Tom. 2.

tur. Magnitudo vero affectus cognoscitur, primo ex magnitudine symptomatum: secundo ex diuturnitate, tertio ex eo, quod remediis rite adhibitis non cedit. Transiit autem in hydropem, aut in febrem tabidam, quando cum calore viscus etiam siccius euadit. Curatio vero calidæ intemperiei facile constat ex obseruat. dicta, cui adiungere posset exemplum puellæ Lucensis curatæ à lachino. In ea primum erat intemperies calida; cuius ratione hepatica dicebatur. Erat extenuatio, qua in tabem tendere videbatur. Aderat & siccitas solidorum, quæ incrementum corporis tardabat. Cui tamen succuri non poterat; attamen prohibere eius augmentum opus erat, vnde minus incrementum corporis impediretur: erat enim in media adolescentia. Necesse itaque erat, ut in complicito affectu, ad id, quod causa erat, maxime spectaret: nam sine eius sanatione, neque alterum sanari poterat, id erat intemperies calida & sicca: in cuius sanatione, ex longitudine affectus verisimile erat acruata esse, excrementa biliosa, & id omnia testabantur. Ideo cepit primum vacuationem moliri medicamento, quod minime excalfaceret: cuiusmodi fuit aqua Villica, quam septies propinavit, ea ratione, qua docuit aquas propinari solere. A purgatione ad alterationem transiit, succis herbæ cichorij vtens, ex Gal. 8. comp. med. secund. locos; quos succos cum modico zacchar. per 10. dies illi dedit, quousque caloris signa remittebantur. Optima victus ratione utebatur, refrigerante, oxalide, lactuca, portulaca, intybo, & ex fructibus, prunis, cerasis: euitando salsa, dulcia & pingua. Exterius etiam cataplasma imposuit, ex farina hordei, & succis supradictis: vel epithemate eiusdem generis vsus est, ac illinitione ex cerato santalino dicto, aut cerato simplici Gal. Demum ad extenuationem curandam, accessit ad lactis potionem, cuius vsum antea docuimus. Atque his adeo profecit, ut non modo carne repletetur, sed colorem supra, quam credi potest, mutaret ad melius. Reliquum curationis vide apud Gal. Paul. Aët. & Alexand. locis citatis. Nunc exemplum frigidæ intemperiei proferamus.

OBSERVATIO II.

De frigida hepatis intemperie, cum eiusdem imbecillitate.

Vir quidam post longam & largam sanguinis fluxionem è natibus, totum habitum refrigeratum habebat: vnde & iecur multum pituita contraxerat; corpus tactu frigidum & subitumidum erat: facies etiam ei albida euaserat, & intumescens. Et cum pauper esset, aquæ frigida potu intemptiuo vsus fuerat, tum cibis frigidioribus: quæ omnia temperiem frigidam indicabant, & eam auxerant: urinæ tenues & albæ procedebat. Cruda quoque per aluum deiciebat, post longam excrementorum retentionem: verum non valde olida, at debito liquidiora. Sed non adeo ac prior erant assidua excretiones, neque ita multæ: durabat, tamen hic affectus diutius: Deinde per aliquot dies venter maiori copia profluebat. In fine minus graueolentia excrenebat, speciem putrefacti sanguinis non colliquati habentia: & quod excrenebat, veluti sanguis niger apparebat; quæuis tamen diligenter consideranti non niger erat sanguis, neque grumus, sed velut limus quidam sanguinis crassi, prope ad atram bilem accedens. Id vero, quod ad ipsū iecur prius ferebatur, pituita

Ff totum

rosam & crudum ac semicoctum efficiebat. Neque facies ita in eo collabebatur, quamvis febris subinde languida apparebat; temperamento ipsius corporis ad frigidius inclinante; victu nimium frigidiora precedente, ac vita otiosa. Hæc cum animaduertentem, ut in aere calido tum cubili sublimi versaretur consului, & omni victus genere calidiusculo cibisque cocto facilibus & boni nutrimenti yteretur. Paulus & Alexander panem cum vino assum sumere laudant; & idem Alexander ex oleribus brassicam, bis terne coctam, cum iure gallinarum, sternorum, aut turdorum; & auculas ipsas paruas, & anserum ventriculos; in quarum carnium iure serpillum, saturcia, hyslopum, fœniculum, lampiscus, oreoselinum & similia incocta sint, laudat. Possunt & iura cinnamomo & caryophyllis condiri. Interea assas carnes comedendas proposuimus, si dictas fastidiret. Verum cum & hic pauper esset, simplicem victum eumque calfacientem instituiimus, & medicamento sum: ita ut apio, nasturtio, mentha, salvia, semine apij, petroselinij, & similibus in cibis vteretur, mandauimus: & zinzibere, croco, galanga maiore, & inter herbas etiam melissa & absinthio, & multa brassica cum cymino, & quæ calida sunt & tenuium partium. Quæ obstruunt frigidam sunt. Vix enim reperies insignem frigiditatem hepatis, sine aliqua obstructione. Ob id quæ tenuinum sunt partium, conueniunt, quia aperiunt, & ab obstructionibus liberant. Ideo & cicoris rubei ac atrij ius dedi, etiam passulas, quæ efficaciter iecur iuuant: idque in prima & secunda mensa. Quidam & hic cochleas in cibo cum aromatibus, & vinum generosum dant, sed optimum est tenue ac parum dilutum. Sed quia hic pauper erat, ceruissiam absinthiten concessi. Et quia hæc intemperies etiam pituitam admixtam habebat, ex causa frigida, ideo dedi decoctum sequens, loco iulebi. ℞. decoctionis absinthij, agrimonie, centaury minoris, cassiæ, end. lbj. syrup. de eupatorio, absinthij, ana 3 lb. syrup. de end. oxymellis compos. an. 3 lb. misce pro quatuor dosibus. Deinde dedi hanc purgationem. ℞. folior. fenæ 3 lb. agarici seminis. albi 3 lb. zinzib. albi 3 lb. sem. anisi, fœniculi, an. 3 lb. infunde per noctem in decoct. absinthij, marrubij, centaury, capill. vener. schœnanthi 3 lb. & facta express. huius accipe 3 lb. addendo syrup. de eupatorio. 3 lb. misce, fiat potio pro iij. dosibus. Verum postea cum excrementa satis aquosa redderet, abstiniuius a purgantibus: sed de obstruentibus utebamur, & quæ materiam per vrinas deducerent; hoc vel simili modo. ℞. rad. fœniculi, perselinij, asparagi, ana 3 lb. capill. vener. polytrichi, marrubij, absinthij, centaury, ana m. j. schœnanthi, rad. cyperi, ana 3 lb. sem. anisi, apij, cymini, ana 3 lb. fiat decoct. in aqua communij & vino tenui. In fine post colaturam adde syrup. de byzantiis 3 lb. fiat potio pro iij. dosibus. Postea ad maiorem roborationem adieci mus ros. rub. & spicam & absinthium, & exhibuimus dialaccam, diacurcumam, diamysum, aromaticum ros. rosat. nouell. & condita in hunc modum vel similem descripta. ℞. confert. flor. rosmarin. 3 lb. confert. anisibij viridisque, ana 3 lb. corticum citri conditi 3 lb. iecoris lupi exsiccati 3 lb. specier. diarod. abb. diarod. ana 3 lb. trochisc. de absinthio 3 lb. vuer. passul. confert. an. 3 lb. sem. anisi, apij, cymini, ana 3 lb. cum syrup. de eupat. fiat mixtura seu conditum. Exterius vti sumus hoc vel simili fotu. ℞. folior. agrim. marrubij, absinthij, ana m. j. florum chamem. p. j. spicæ nardi, schœnanthi, ana 3 lb. rosmarin. m. j. cum vino & aqua coctis paribus aequalibus, fiat fotus hypochondrii dextri. Deinde inungatur hoc vnguent. ℞. olei nardini, absinthij, mastichini, an. 3 lb. olei ros. 3 lb. spicæ

nardi Celtice, caryophyll. schœnanthi, an. 3 lb. succi eupatorii 3 lb. aceti & cera parum: fiat vnguent. vel loco aceti adde parum vini cum inunctio fit. Atque his remediis optime se habuit.

S C H O L I A.

Frigida hæc intemperies fit plerumque usu rerum frigidarum, ut intempestiua aquæ frigida potione (ut huius viro conigit) aut nimio rerum frigidarum usu, intus vel extra: post longam & largam sanguinis fluxionem, tam per vterum, quam per hæmorrhoides, quemadmodum & huic pauperi euenit, sanguine supra modum & naribus effluxo. Ita & cuidam consuli Geertrudebergensi, dum hæc transcriberem, accidit: qui non solum in iecoris imbecillitatem ex frigida causa incidit, verum etiam in totius corporis malum habitum & cachexiam. Quæ quidem sanguinis fluxio totum habitum refrigerat & potissimum iecur. Signa vero intemperiei frigida hepatis iam ex parte diximus. Obser. iam dicta, quæ calidæ contraria sunt. Pendent autem omnia ex mala concoctione sanguinis, ut tactus corporis frigidus, & corporis albedo totius, & ædemata, & pituitosa febris, & tumida sæpe facies, præsertim oculi & cuncta, vnde tenues, albæ: excrementa per aluum cruda, valde liquida, aquosa, & non olida ventrisque profusum certis temporibus. Et huius frigida intemperiei curatio non minoris facienda est, quam calida: nam tractu temporis corruptio etiam in viscere sanguine, febris superuenire solet; quæ tamen ab imperitis medicis vsque adeo negligitur, ut laborantem interdum nequaquam febricitare putent: quinimo si vltro ea intemperies frigida augetur, permittitur ab aqua intercutem, quemadmodum Galen. docuit 5. de loc. affect. Et quouis modo antiqua debilitas hepatis, difficillime emendatur temporeque aut in malum corporis habitus, vnde debilitas totius corporis fit, aut in hydropem vertitur, potissimum si à frigida intemperie ortum habeat. Frequenter quoque contingit in hac iecoris imbecillitate (ut longa experientia vidimus) sanguinem vltro & naribus profundi: aliquando id fit per vterum, interdum vero per hæmorrhoides, nonnunquam etiam per vrinarios meatus, ut aliquando quoque spectauimus. Ideo & hepatici ex frigida causa diligenter etiam curandi sunt. Curatur autem hæc intemperies frigida, iisdem fere remediis, secundum aliquos, quibus ventriculus ipse imbecillus ex intemperie frigida: quin & breui persistere non potest, quin habeat adiunctam humiditatem. Sæpius vero & humores obstruentes adsunt, geniti ob vitiatam concoctionem: vnde remediis obstructioni dicatis egebit. Transiit autem hæc in hydropem, ut diximus: quomobrem vbi corpus expurgaueris per agarici potionem, hieram, diaphœnicum, victus rationem ad calidum inclinantem institues, & siccantem, si multa humiditas iam sit iuncta: cibos exhibebis actu & potestate calidos, & potiones, tum naturæ, tum conditura. Mox & medicamenta propinabis magna, ex his quæ sæpius diximus, theriacem mane ad 3 lb. & dialaccam & diacurcumam. Extrinsecus vero adhibebis vnguentum ex nardino oleo & speciebus diamosci. Demum aromata omnia, quomodecunque corpori applicata, hanc sanant intemperiem: præcipue vero, quæ & astrictione participant, ut macer, nux muscata, caryophyllum. Expediit & his ob excrementorum copiam continue offerri, quæ vrinas mouent (de quibus dictum est

est in obseru. precedente) atque in exercitatione, regionis mutatione, negotiosa vita, curam omnem reliquam constituere. Probatum maxime cyphæos compositio, ab Andromacho descripta. Reliqua vide apud Galen. Paulum & Actium & Donatum. Præter olea, cerata, vnguenta, extrinsecus admota, valent & intra, confectiones aromaticæ, ut arom. ros. diagal. caryoph. cum confertis, ad modum opiata: superbibendo parum vini diluti aqua absinthij, vel marrubij, vel betonica. Hæc intemperiem castigare poterunt, & imbecillitatem, quæ ab intemperie frigida fit. Eadem etiam humidam intemperiem castigant. Hæc autem his notis cognoscitur. Sitim nullam adfert, lingue adest humiditas, vultus totumque corpus non ita collabitur, sed tumidum atque pituitosum apparet, tum excrementa, deiectionesque aquosiores. Hic tamen augenda est dosis resiccantium, ut si antispodij aliquid opiata addatur, ex spongia bedegaris, vel cornuæ, vel in intestinis gallina & lupi, vel ex corall. aut ebore. Victusque ratio magis exsiccans hic esse debet: tum ea danda, quæ ad hydropem (in quam facile mutatur) valent. Si sicca sit intemperies (licet rarius eueniat) recrementa sicciora erunt, corpusque siccior & tenuius: sitis aderit, & deiectiones alui pauca & crassiores apparebunt. Hæc autem difficile curatur: nam difficile est rem siccam humectare; tum quia quæ agunt, debilia sunt; & quæ patiuntur, multum resistunt: partes quoque exsiccatae concidunt densioresque redduntur: & medicamenta non possunt penetrare, ob imbecillitatem facultatum naturalium, & maxime concoctionis in substantia membrorum solidorum: ideo & in marasmo, vitium irremediabile, incurunt. Ne igitur radices agat, cibis humectantibus curabitur, lacte butyro, vitellis curam, vino, succo carniū, piscinæ, lacte, amygd. balneis & inunctionibus. Atque tales regendi, ut de hæctica, marasmo & tabe diximus. Ad quæ loca lectorem relegamus. Cæterum simplex intemperies diu sola non consistit, quin breui post tempore humoris vitium accersat: sic calida bilem, & frigida pituitum. Ideo & horum humorum respectus habendus, ut iam sæpe ostensum est.

OBSERVATIO III.

De hepatico seu iecinoroso, ab empirico quodam pro pleuritico perperam indicato.

Ioannes Petri, cognomento Rex, qui Alcmæriz in Aggeris via prope pontem habitabat, cum duobus fere mensibus ex hepatis calida satis intemperie cum obstructione quadam tum inflammatione, attamen non vehementi, tendente ad apostema cum dolore eiusdem ac imbecillitate, laborasset, ad eum prius vocatus sum sub finem mensis Iun. anno 1553. in lecto decumbentem, & antea à quodam empirico pro pleuritico habitum, & longo tempore male curatum, sanguine quidem demisso, at aliis perperam medicamentis adhibitis. Ad eum ingressus, reperi eundem ad extremam debilitatem deuenisse, ac ab astantibus amicis tunc pro deplorato habitum: qui me tunc prius accerseri, tum vxor, iusserunt. Ad quem diligenter respiciens, inueni hominem ex continuo dolore vigilisque adeo debilitatum, viribusque consumptum, ut ossa tantum restare viderentur. Aderat enim dolor in hypochondrio dextro, qui aliquando ad diaphragma, aliquando ad ventriculum extendebatur.

Pet. Forest. Tom. 2.

Et quantum ex signis presentibus colligere potui, hominem non pleuriticum, sed iecinorolum iudicavi, non sine inflammatione, vna cum obstructione & hepatis caliditate & imbecillitate ad apostema quasi tendente. Aderant enim vigiliae; & successit ventriculi debilitas, postea etiam aliqualis lienis durities; totumque corpus macilentum euadebat: hoc est, quod paulo antea ex Aggimeta diximus. Si iecur contabescit, vniuersum tabe conficitur corpus: febri exstincta æger, cibus &adio languescit: quæ inquam omnia huic aderant, quamvis febris lenta erat, quasi hæctica consumens totum corpus. Pro variis accidentibus varia conscripsimus. Pro vigiliis tempora hoc linimento inungi iussimus: ℞. vnguent. popul. olei mandrag. papau. an. 3 lb. opij thebaici 3 lb. croci 3 lb. cera q. s. fiat linimentum. Interim pro hepatis obstructione, inflammatione, & pro vigiliis, bis in die ex sequenti decocto bibebat. ℞. cichorij cum rad. dentis leonis, cum rad. acetosæ, end. fumariæ, lactuca nouellæ, viol. ana m. j. agrimonie, capill. ven. anethi viridis, ana m. j. sem. quat. frig. maior. ana 3 lb. sem. anethi, portulacæ, ana 3 lb. glycyrr. ras. 3 lb. fiat decoctio in aqua communij. pro libi b. colaturæ adde syr. de cichor. Nicolai cum rhab. syr. de end. ana 3 lb. syr. viol. papau. borag. an. 3 lb. arom. cum 3 lb. spec. diarod. abb. & q. trochisc. de rhabar. fiat clarior. in aqua pro inleeb. Et cum cyathum vnum bibisset, capiebat 3 lb. specier. triosant. & diarod. abb. confecti cum aqua end. adiecto rhab. ut artis est in tabulis. Pro dolore utebatur hoc fotu, tam in regione hepatis quam diaphragmatis & ventris. ℞. folior. melissæ. (quia circa hepar & loca dicta erat quædam durities & tensio) m. j. folior. viol. man. b. flor. ros. rub. florum anethi seu summitatum eius, summitatum absinthij, florum meliloti, chamemil. ana p. j. fiat decoct. in aqua communij. pro libi b. in fine addendo acetum optimi & vini Rhebenis, an. 3 lb. specier. triosant. 3 lb. misce, pro fotu. Mox inungebatur vnguent. sequente: ℞. vnguent. alabastr. olei ros. coton. an. 3 lb. misce. Post fotum & inunctionem dolor sedatus est, potissimum in diaphragmate & ventriculo, & in hypochondrio dextro: ita ut postea melius dormire potuerit. Postea ad maiorem hepatis & ventriculi roborationem, ex condito sequenti utebatur. ℞. confert. capill. vener. 3 lb. succi iurij seu seridis 3 lb. confert. nenupharis (ad maiorem alterationem & refrigerationem hepatis) confert. bugloss. ana 3 lb. confert. ros. cichorij, an. 3 lb. corticum citri conditi 3 lb. rhabar. ros. perlari 3 lb. spec. diarod. abb. triosant. an. 3 lb. cum syrup. de succo cichor. & ros. fiat conditum. Postea etiam eodem vsus est, adiecta confert. viol. 3 lb. & specier. aromat. ros. 3 lb. cum syrup. mentha. Et ventriculus inungebatur oleo mastic. cotoneor. & myrtico. Dedimus prius 3 lb. rhab. in substantia: nam alia purgatione vti nolimus, cum hic satis per se aluum fluentem (ut hepatici solent) haberet, & sæpe biliosa male olentia deiceret. Post aliquod tempus manifeste sentire potuimus duritiem quandam in hepate, inflammatione pedum non diu subsequente: ideo & de apostemate & scirrho metuserat. Sed loco dolente inuncto, haud exiguum leuamen subsequutum est, ut plurimum adhuc de eius salute sperauerimus. Linimentum tale erat. ℞. emplastrum de meliloti 3 lb. olei cotoneor. amygdal. amar. ana 3 lb. vnguenti sam. albi (ob intemperiem calidam hepatis & imbecillitatem) 3 lb. gummi ammoniaci in aceto solui 3 lb. misce. fiat linimentum. Vtebatur & his tabulis, cum maximo commodo. ℞. hepatis lupi incisi & contriti 3 lb. specier. diarod. abb. specier. diar. frigida. an. 3 lb. pul. rhab. optimi, am. 3 lb. in aceto dissolui ana 3 lb. dissoluatur hæc in

decoct. cuscute capill. vener. cum aqua fœniculi, bu-
gloss. scabiose, lupul. adiciendo racch. q. s. fiat confe-
ctio in rotulis, ponderantibus 3 iij. miraculose contulit,
etiam in iisdem aquis hepate lupi bullito & ex-
presso. Veteres dabant 3 j. hepatis lupi in pulvere,
cum vino dulci, sine febre; alioqui cum succo feridis,
vel cum aqua calida: nos commodè cum aquis di-
etis propinauimus. Nam & Galenus iecur lupi-
num medicamento ex eupatorio indidit, vt II. de
med. simpl. quamquam & eo solo vitur 8. & 6. de
comp. medic. secundum locos. Sua proprietate efficax
est medicamentum, ex Asclepiade. At cum hoc
electuario, tum linimento, aliquo tempore vtere-
tur, dolor omnis in hypochondrio dextro cessa-
uit, & durities simul enauit. Quamuis paulo post
conquestus est de lienis duritie & obstructione:
quæ tamen symptomata sola inunctione olei de
capparibus mox cessarunt. Sed in conualescentia
pedes cum inflati manerent, decocto sequenti ad-
huc utebatur: R. agrimonie, ceterach. scolopend. ana
m. j. decoqueb. in aqua & vino Rhenensi, & colatura ex-
pressa raccharo dulcorata, utebatur bis atque ter die,
maximo suo commodo. Similiter & condito se-
quenti, omni mane ad castaneæ magnitudinem:
R. conferv. flor. rorismarini 3 iij. conservæ buglossæ 3 b.
rad. saxifrag. conditæ 3 b. corticum avantium. condit. &
cervi ana 3 ii. b. trochisc. de cappar. 3 b. specier. dialac-
cæ 3 iij. specier. diarod. alb. 3 i. b. cum syr. de cichor.
& oxymel. simplic. q. s. fiat conditum. Pedes inflatos
fomentari imperauimus, qui œdematosi videban-
tur, cum aqua marina. Qua ablutione, lotione ac
fotu subsiderunt: ita vt ad pristinam valetudi-
nem peruenerit. Interim pro colophone totius
curationis etiam his tabulis utebamur: R. specier.
diarod. alb. trochisc. de capparibus an. 3 b. specier. dia-
laccæ 3 b. dissolutis in aqua agrimonie, cichorij & su-
marie ac fœniculi, adiecto racch. q. s. fiat confectio in ta-
bul. dos. 3 iij. quibus vtens, quotidie secessum ha-
buit. Et iecore imbecillo restaurato cepit in dies
magis magisque conualescere, etiam carne ac-
crescente: ita, vt dictis remediis, post diuturnas
afflictiones, pro deplorato habitus, magna cum
nostra industria, laude Diuina & Dei ope, cum mul-
torum admiratione sanatus fuisse.

SCHOLIA.

7 Cvm hunc agrum præ manibus habētem, vē-
nit mihi in mentem historia illa Siculi me-
dici decumbentis, qui se ipsum iecinorosum,
tum alij medici perperam pleuriticum iudica-
bant, apud Galen. lib. 5. de loc. affect. cap. 7. cum
Galen. vna cum Glacone post alium medicum
ad illum ingressus, inflammationē iecoris labora-
re, eundem iudicabat. Similis quoque historia
etiam narratur à Benuenio, de abditis caus.
morborum. cap. 75. de Antonio Brunellesco, à
priori medico iudicato pleuritico, cum malum in
iecinore esset, cum inflammatione, ab eodem Be-
nuenio recte curato. In quo vehemens dolor à la-
tere dextro in iugulum humerumque transmittē-
retur: & bilem quoque euomebat æger, quem &
singultus pene strangulabat. Verum cum huius-
modi vitij notæ eadem fere sint, quæ & lateris
abscessum indicant, medicus cui primum cura
demandata fuerat, eum curabat vt pleuriticum
(vt nosse empiricus;) Sed cum iecoris vitio labora-
ret, aliter eundem curauit Benuenius, quemad-
modum & nos hunc agrum restituiimus. Opor-
tet igitur medicum non solum morbum cognos-
cere, sed & locum etiam in quo sit, diligentius
perscrutari, vt huic commoda medicamenta ap-

Medicus ie-
cinorosus à
se ipso tum
aliis perpe-
ram pleuri-
ticens iudi-
catus.

ponantur, & vt tales non vt pleuritici, sed ieci-
norosi recte curentur, adhibitis iis quæ ad hepa-
ticos vel etiam inflammationem iecoris (si adsit)
conueniant, in quibus etiam canones auctorum
obseruandi, de quibus doctè & egregie scripsit
Arculanus. Caterum quia frequēs affectus etiam
huius visceris est obstructio, ob multas caus. vt
postea dicemus, ideo huius exemplum vnum
nunc adferemus.

OBSERVATIO IV.

De obstructione hepatis, ex flatibus crassis.

SCRIBIT Galenus lib. 5. De locis affectis, non so-
lum à crassis humoribus iecinoris obstructio-
nem fieri, verum etiam halituoso quoque spiritu
ibi conclusio, cui non pateat exitus. Quod & Aer.
confirmat lib. 10. cap. 2. cum dicat, iecinoris op-
pilationes fieri à flatibus nebulosis & concoctis
difficilibus. Et sic secundum Galen. & Aetium
dignoscitur hæc obstructio, cum vaporosi & crassi
status multitudo coaceruat, quæ exitum non
habet: quoniam non grauitatis solum, sed etiam
distensionis sensum sentiunt laborantes. Sic istis
diebus vir in platea Flandrica habitans, insignem
dolorem vna cum tensione patiebatur in hypo-
chondrio dextro, cum tempore ventoso iter fe-
cisset, & flatulentis cibis vsus esset. Cum nulla fe-
bris adesset, huic dedi decoctum florum chamæ-
millæ, seminis anisi & fœnic. cum viro tenui: &
ne materia coaceruaretur, exhibui 3 b. diaphanici,
cum 3 iij. decoct. cicorum rub. Externus inunxi lo-
cum dolentem cum oleo nardino, amygd. amar. &
chamamelino: & dedi diacuminum. Utebatur victu
extenuante & carminante. Etiam fotu ex flori-
bus chamæmillæ meliloti, summitatum anethi,
cumini & anisi, & absinthij, cum recens esset af-
fectio ad tollendam obstructionem vtens, facile
curabatur. Hoc est quod Hollerius dicebat: Op-
pilatur hepar à crassis flatibus sed facile discu-
tiuntur: non ita facile à crassis viscidisque humo-
ribus, vt postea suo loco dicemus.

SCHOLIA.

INTER alios instrumentales affectus, quibus cre-
bro iecur laborare contingit, potissimum est, quæ
qui à Græcis *μυεζή*, à Latinis Obturatio, oppila-
tio seu obstructio dicitur. Est autem ea, latio seu
amissio prædictarum iecinoris cauitatum, ex in-
farctu alicuius substantiæ; humoris scilicet seu fla-
tuosi spiritus, vt ex Galen. 5. de loc. affectis & aliis
multis locis colligitur: idque in extremis vaso-
rum partibus, non autem in propria eius substan-
tia (vt Arabes quidam senserunt) quæ *μυεζή* dicitur,
quod ipsum ad longum Donatus ostendit.
Atque hic affectus, morbus existit non in intem-
perie, sed instrumentalis est morbus, in via seu ca-
uitate. Obstructio autem admodum familiaris
est iecori, nullumque viscus hoc æque vitio tenta-
tur, eo quod vena è portis per iecoris substantiam
in ramos tenuissimos dissipata obliteretur: &
quod huc alij rami non minus tenues è caua vena
conueniant, per quos omne debet alimentum tra-
duci & exportari. Et ita secundum alios obstru-
ctio fit in venis capillaribus hepatis, per caua &
gibba disseminatis à vena porta, vel caua, ob ea-
rum angustiam & flatum, vel etiam crassi & len-
ti humoris copiam, vt pituita in frigore tem-
peramento. Biliosis etiam temperaturis parua
victus ratione vtentibus, sæpe crudus humor

in

in ventriculo & primis venis colligitur, qui ca-
lore attractus ipsius hepatis obstructionem pa-
rit. Causæ sunt frequentissimæ: victus ratio ex
crassis & viscidis, exercitium à cibo, crassiora ali-
menta in prima mensa assumpta, succedentibus
calidis & tenuium partium. Nam ex his crudus
humor intra venas rapitur, sicuti plerumque fit à
medicamentorum aperientium vsu, ventriculo
crudis humoribus repleto. Et sic humor crassus,
lentus aut multus, qui interdum è cerebro pro-
cumbit in ventriculum, & deinde præterfluit,
sensim in tenues iecoris venas cum alimento pe-
netrat, easque obstruit. Fere tamen ex alimentis
crassis, viscosis multisque fit obstructio, quum
aut balneis, aut motu vehementiore mox à cibo
in tenues venas vel rapiuntur, vel impelluntur:
nonnunquam & bilis flaua in iecore præter natu-
ram diutius coereita, nec tempestiue expurgata,
mire crassescit, grauesque & admodum pericu-
losas iecoris obstructions inducit, vt quæ inter-
dum etiam in cysti lapidescat, vt aliquando post
incisionem mortuorum deprehendimus. Dux ta-
men præcipue causæ referuntur ex Galeno, Aetio
& Tralliano, crassi & viscosi humores, vel spiritus
halituosi in venis hepatis conclusi: & huius vlti-
mi exemplum iam diximus, & quibus notis di-
gnoscatur, scilicet non solum grauitate, sed etiam
tensione. Nam grauitas & distensio, cum obtuso
dolore, dextro insident hypochondrio, quod tum
præcipue manifestum est, cum quis mox à cibo
excitationem subit. Ea tamen sine tumore, &
sine febre est. Talia etiam possent apparere ex
humoribus crassis. Græci enim, (Galenum inquam,
Paulum, Aetium, ac Alexan.) de obstructione tra-
ctantes, quæ per se sola citra alium complicatum
morbum iecur exerceat (de qua nunc loquimur)
duarum tantum prædictæ obstructionis causa-
rum meminerunt, spiritus videlicet flatuosi ac
crassorum viscosorumque humorum. Hæc cum
multiplex non fuerit etiam sine febre excitari
consequitur. At reliquæ, quæ mox à principio cum
febre inuadunt, à calidiorum humorum multi-
tudo ac putredine orta, non difficile cognos-
cuntur ex dolore vehementiore, tum febre: nec
illum requirunt curationis modum, quam reli-
quæ, nisi quod non adeo calidiora attenuantia
exigunt. Quæ de re non ex propria obstructionis
natura febris consequitur: sed cum ea multiplex
fuerit, propterea bene dicebat Aetius, eam quan-
doque sine febre esse, quandoque cum febre. In
recenti namque ac exigua, & non multa existente
iecinoris obstructione, febris non excitatur: in
diuturna vero ac multa, non mirum, si ea con-
sequatur, magnitudinis tamen & diuturnitatis
ratione. Quin imo idem Galen. 8. meth. med. di-
cebat, obstructionis magnitudinem discerni ex
tensione, maior, ex minore, minor fiat. Verum
cum oppilatio omnis inueterata, non tantum in
hepate, sed in omni membro, putrefactionem
operatur, ac febrem accendit vt Aer. inquit: breui
etenim tempore putrefactio consequitur ad ob-
structionem ex vitiosis humoribus, in frigidis
intemperaturis, propterea obstructions celerri-
me curare oportet. In calidis vero non cito, sed
temporis progressu accedit, (vt liquet ex Gal. 8. de
comp. medic. secund. locos.) & consequenter ad pu-
tredinem febris. Si ex vitiosis humoribus contin-
gant, eodem Gal. auctore, nec minus & aqua
intercus consequi poterit: viscosi enim frigidis
ac crassis humoribus diu in iecinoris vas con-
stentibus, ex iis vasa ipsa primo infrigidantur, &

Causæ.

Signa ex
halitibus spi-
rituosis.

Ex crassis
& viscidis
humoribus.

Prognostica.

Ret. Forest. Tom. 2.

denum iecinoris propria substantia, ad cuius in-
frigidationem perpetuo sequitur aqua intercus,
vt constat 5. de loc. affect. Quod vero totius etiam
corporis extenuatio, ex eius diuturnitate neces-
sario consequatur, propter alimenti penuriam,
cuilibet patere poterit, nec alia indiget ratione
seu auctoritate. Et sic quoque obstructio ex calo-
re hepatis, sæpe icteri causa existit, ac febris len-
ta & inflammationis, atrophie etiam in pituito-
sis, cachexia & hydropis, vt dictum est, & colici
doloris, vt Arculanus & Gordonius testantur. Sol-
uitur aliquando in concana parte, existente ven-
tris fluxu: & est aliquando aluus liquida, & sub-
inde sanguinolenta, si caua pars laborat. Ita, si
gibbosa, adest anhelitus difficultas, vrina vix red-
ditur, aquosa est, tument dextra præcordia, & ie-
core tumido supprimuntur: aluus nihil reddit,
aut tantum aridum: & si vrina crassa redditur,
soluitur aliquando malum. At curatio generale
quippiam habet, partim ex natura causæ proxi-
mæ, id est, humoris obstruentis, quem etiam li-
cet morbum nominare partim etiam ex causa re-
motiore, id est, abundantia humorum in corpore.
Obstructio autem tolli nequit, nisi eius prima
causa tollatur: imo si quis ad obstructions tol-
lendas accedat, non vacuata copia humoris in ve-
nis, potius augebit obstructionem, II. meth. 10. &
8. Quod erit apertum, si consideremus, quid exi-
gat prima ratione obstructio. Est autem eius in-
dicatio apertio, quæ fit per ea, quæ contrario mo-
do humores afficiunt, si lenti sunt, inciduntur, si
crassi, extenuentur, & vna euacuetur, quod præter
naturam continetur in vasis. Sed quæ hoc effi-
ciunt, vt plurimum sunt potestate calida, & fun-
dientia sanguinem: quare metus est ne augeant
obstructions, siquidem copia humoris addit in
venis. Itaque præceptum est, ante medicamenta,
quæ obstructione liberant, abundantiam minue-
re, idque vel vena secta, si sanguis abundet, vel
humoribus ad calidum vergentibus, ac copia
sua quoque molestantibus, potissimum vbi eadem
obstructio adhuc fiat, ex interna cubiti vena, vt
II. meth. med. etiam in inueterata, si febrem accen-
dat Paulo teste, etiā si sanguis melancholicus vel
crassus causam dederit modo vires ferant, alioqui
si humores alij & crassi in causa sint, purgatio ad-
hibenda. Quomodo autem purgatio sit facienda,
id figura seu formatio, tum etiam situs eiusdem
visceris, indicabit, per quæ scilicet loca eam fa-
cere oporteat. Nam quæ in simis iecoris sunt ex-
crementa, ad intestinum: quæ vero in gibbis, per
vrinaseuacuabimus, Galen. auctore lib. de const.
art. med. quamquam etiam eadem iecinoris giba,
si multo vitioso succo sint repleta, per deiectiones
& pharmaca deiectoria (*καθαρτικά* Græci vo-
cant) expurgari debeant: si vero mediocri succo
repleta sint, per vrinarios meatus, ex Gal. 7. meth.
med. Aliqui hic, si pituita abundat, per vomitum
vel aluum educunt. Vitiosis succis mediocriter
concoctis ac eductis, ad detergendas obstructions
accedemus, vt 8. & II. meth. In calidis infuso
rhab. vtetur, cum decocto myrbi, si crassi sint humo-
res, adiciemus pro purgatione infusum agarici, vel
vtetur pilul. ex agar. & rhab. vel ag. greg. si valde
crassi sint humores. Deinde vtetur aperientibus,
quæ ad intemperiem frigidam valere scribunt
auctores, si ex succo frigidus fiat: si autem calidi
ad sint succi, vtetur iis, quæ ad calidam intempe-
riem valent, vti & exempla infra scripta doce-
bunt.

Ff iij OBSER-

OBSERVATIO V.

De hepatis obstructione, ex pituita crassa.

P Vella pituitosa, cui facies discolorata erat, ac membra fere omnia pallore squallebant, genae tumescebant, & labia quasi emortua tum pallida spectabantur, ac pedes tumentes habebat, vrina clara, alba mingebatur: grauitas quoque cum distensio cum obtuso dolore dextro infidebat hypochondrio, & potissimum perceptibilis mox à cibo si sese moueret aut exerceret, quæ omnia certissimum signum, in iecore obstructionem esse, ostentabant. Hanc vero suspicionem augebant causæ præcedentes: nam victu crasso & humido longo tempore vsa fuerat: nulla tamen febri corripiebatur, neque adhuc in hypochondrio dextro tumorem experiebatur. Spiritum impedita trahebat, præsertim si scalas ascenderet, vel alta peteret. Pedes cum vesperi magis tumerent, signum hoc erat quod partes distantes priuatæ erant alimento convenienti, cuius quoque causa facies pallescebat. Pulsus huic mollior erat, ac languidior: nulla sitis aderat, & os salua maderat, quæ inquam omnia ex pituita glutinosa obstructionem arguebant. Curationem vero à viâ ratione, nempe extenuantibus, institui, usque aerem frigidior, paludosum vitaret, ventosum, & austrinum siccumque eligeret, & cibos calidiores attenuantes gustaret, asparagum capparem, fenumculum, carnes pullorum, gallinarum, turtorum, merularum, perdicum, ac aliarum auium paruum montanarum, assatarum, vel coctarum cum hyssopo, orefoleno, satyria, pulegio, apio, sanpsocho & similibus. Inhibuimus cuncta cibaria glutinosa & crasse materiæ, veluti carnem bubulam, vaccinam, agninam, hircinam, & inter pisces molliores: pestiferam etenim materiam præstant, ut muræna, anguilla, conghi. Perniciosissima habentur, lac, caseus pedes quadrupedum, & viscera, damna materia existimantur, præterea oryza, far, & omnia dulcioria & lactaria, & lac quod crassius est eò nocentius, à quo serum exiguum excernitur: nam quod plurimum casei continet, hepaticis, calculosis & lumborum vitiis nocet: sic & palmarum pinguium natura oppilat, si ex toto non maturæ sint, ita & siliago cum lacte in pulsem parata eadem vitia producit. Imperauimus quoque vt sereno cælo ac calidior habitat, corpusque exercitatione aliquantisper vegetaret ante cibum: nam exercitium conturbans à cibo sumptio, noxium admodum est: eaque ratione quies tunc imperanda. Iussimus interea, vt ante cibum vigilaret: nimio enim somno torpescunt sensus, & ideo somnus sit nocte non turbatus, paululumque sublimis caput, connexæque corporis partes componantur tempore somni. Panem optime fermentatum laudauimus, qui si sale, cymino, feniculo, aniso, vel similibus subactus esset, magis commendatur. Vtiliter quidam & addi voluit pro plebe, lupinorum farinam aut erui. Inter ea cibum offerri voluimus, qui facile concoqui posset, in parua quantitate, & vt vnice caueret, ne plus quam vires tolerarent alimenti sumeret, & ne antequam hesternus cibis concoctus esset, alium gustaret, aut horam consuetam prauertiret. Concessimus & vinum tenue, cum & huic mensis deficerent, aut minus fluere. Propterea etiam huic consuluimus, cum vires adhuc fortes essent, vt paulum sanguinis ex saphæna mitteretur: & egregie profuit. Licet enim sanguinis

missio aliquando approbetur in obstructione hepatis, pro ventilatione in pituitosis ex basilica vena, tamen in hæmorrhoidibus & mensibus suppressis prodest venas cruris potius incidere, vt apud auctores videre licet. Quæ venæ sectione cum menses fluere, interea ea eligimus, quæ materiam inciderent, aperirent & detergerent, & simul ad euacuationem facerent: quale est sequens decoctum. *℞. rad. fenic. petros. asparagi, apij graminis, ana ʒj. organi, rorismarini, artemisia, (vt magis fluere menses) chamæd. ana m. j. centaur. rei, cassia, agrimonia, chamapit. lupalli salictarij, fumaria, ana m. ss. sem. feniculi, dauci, pastinacæ an. ʒj. vuar. passul. ab arill. repurg. ʒj. glycy. rase ʒiij. folior. sene ʒj. agavici seminis ʒi ss. rhab. selecti (valde enim hepatis prodest) ʒj. schœnanthi, cyperi, calami aromati. ʒm. albi, ana ʒ ss. coquantur in aqua communi pro lbj. colaturæ addendo syr. de byzantiis, oxymell. simpl. de duabus rad. syr. de artemisia, de eupat. de quinque rad. an. ʒ ss. mis. pro iij. aut iij. dosibus. Deinde dedi pilulas de hiera, & aromaticas, ex ʒj. septem ante cibum. Postea & has pilulas prius assumptis syr. aliquibus incidentibus, vt oxymell. diureticis. *℞. agar. trochi. ʒiij. rhab. optimi ʒj. diagran. j. vel ij. cum oxymell. fiant pilule v. vel vij. Mox dedi decoctum radic. silicis, cum oxymelle, radix enim hæc, sicut & semen securidacæ, ab antiquis plurimum probatur: nam & Gal. succum eiusdem radicis in compos. solebat ponere. Sed & conditum sequens præscriptum: *℞. confer. capill. vener. flor. betonica, an. ʒ ss. trochisc. de eupat. de rhab. ana ʒ ss. specier. diarod. abb. trionfant. ana ʒj. syr. de byzantiis, de eupatorio q. s. fiat conditum, de quo ad magnitudinem nucis auellana, superbibendo vinum dilutum cum aqua cassia & artemisia. Hypochondrium dextrum hoc vel simili vng. inunximus: *℞. olei nardini, amygd. amar. ana ʒi ss. succi apij ʒ ss. coquantur ad succi consumptionem, addendo specie nardi & Celicæ, schœnanthi, asari an. ʒj. sem. apij, petros. ana ʒ ss. cyperi, ros. ana ʒ ss. cera q. s. fiat vnguentum. Quibus remediis hæc puella melius habuit.****

SCHOLIA.

Q Vi venas habent strictiores, vt frigidi temperie, plus obnoxij sunt obstructionibus tam ob venarum angustiam, quam ob copiam pituitæ lentæ & crassæ. Sunt enim illa duo, causæ obstructionum potissimæ; nempe meatuum angustia, & humorum crassities, vel lentor, vel sanguinis copia. Quibus modis cognoscatur, iam dictum est, & quomodo etiam curetur, nempe optima victus ratione, eaque attenuante & vsu medicamentorum incidentium, & febrilium materiam crassam, concoquentium, & demum purgantium: deinde vtendo medicamentis tollentibus obstructionem; liberatis obstructionibus, intemperiem emedando, & viscera roborando. Sunt qui hic laudant vsu caparum ex oxymell. vel aceto, vt Rondeletius facit: iuscula in quibus rad. apij vel petros. aut feniculi incoctæ sint, ex syr. oxymell. vel aliquod diureticum: deinde laudant purgationem ex ʒ ss. diaphæn. cum aqua apij vel graminis, deinde inter aperientia trochisc. de eupat. diarod. dialac. de rhab. de absinth. de curcuma probantur: longiore tempore his vtendum. Quædam tamen ex his nimis calida & ingrata, & actia: quorum vsu mulier nobilis apud Rondelet. in vlcus renum incidit ex vsu compositionis de vino, excerptæ de Praxi de Taranta. Igitur eiusmodi calida frequenter non danda. Obstruatio hæc à nativitate ob viarum paruitatem, curam

curam non admittit, quamvis bono regimine præseruari possit: à multis morbis, qui hunc affectum subsequi solent.

OBSERVATIO VI.

De hepatis obstructione, ex causa calida, cum hepatis caliditate.

V Ir quidam Delphis dolorem hypochondrij dextri sentiebat, vna cum ventris stipticitate: vrina subtilis & rubram habebat, & plurimum stiebat, & pruritus ei in toto corpore aderat; vtunque macilentus erat, & citrini coloris, cum pulsu veloci, & febre, licet exigua. Quem cum inuiserem, intellexi, illi à calida causa obstructionem in iecore adesse: ideo venam basilicam in brachio dextro secari iussi, sanguine moderate extracto. Mox hunc syrup. propinaui: *℞. syr. acetosi simplicis ʒiij. aquæ decoct. endiuie, cichorij, hepaticæ, lactuca, capill. vener. polytrichi, dentis leonis ʒi ss. fiat syrup. pro iij. dosibus. Postea eundem hoc modo feliciter purgaui: *℞. rhabar. selecti ʒi ss. infunde per noctem in aqua end. cichorij, fumariæ q. s. adde expressioni electuar. de succo ros. ʒiij. syrup. ex infus. ros. ʒj. misce, & quinq. egregie aluum deposuit. Deinde dedi trionf. vel diarrhod. abb. in tabul. modo vnum, modo alterum: & inuncta regione hepatis cum vnguento santalino, optima victus ratione adhibita, breuiter & hic fuit restitutus.**

SCHOLIA.

S i sit obstructio ex calida causa, vel succi crassi ad calidum tendant, conuenit syr. ex succo cichorij aut endiuie, quam scariolam vocant, oxyzacchi, acetosi simplex, & ex rad. cum aceto vel è fumaria. Purgatio commoda ex infus. rhab. cassia vel mamma, cum aqua cichorij vel inibi. Deinde passilli ex diarod. abb. trionfant. vel succus fumariæ desiccatus, & in passillo, redactus: hic autem dolorem omnem soluit, etiam si febricitent. Reliqua vide apud Aëtium, Paulum, & neotericos: qui addunt, accidentibus esse occurrendum, siue atrophia subsequatur, siue febris, siue cachexia vel hydrops; idque ex propriis suis locis. De quibus & Arculanum & Gateneriam & reliquos consulo.

OBSERVATIO VII.

De hepatis inflammatione.

E Licet, præter in oppido Schaga decumbens, erapula satis deditus, inflammatione iecoris correptus est. Huic autem febris continua aderat, & dolor valde grauis in hypochondrio dextro, cum tussicula quadam inani. Cum enim hepar multo sanguine abundet, atque illo nutriatur, multasque & magnas venas habeat, per quas magnum sanguinis fluxum vel potius refluxum ad se patitur; ob id hoc viscus aptum est ad suscipiendas eiusmodi inflammationes: & magis in hoc corpore, vino ac poculis dedito. Præterea cum inflammatio hepatis tumorem, dolorem, febreque necessario secum adferat, ex eo & respirandi difficultas oriebatur, tussicula inanis, vt dictum est, tum dolor ad clauiculam ascendebat; ita vt is pleuritidem falso esse putaret. Quod autem eiusmodi dolorem sentiunt ad iugulum usque, id ob membrana costas succingentis tensionem fieri volunt, quæ tenditur ob septi trans-

uersi tensionem; & septum transversum tenditur ob pondus hepatis deorsum trahens. Sed hoc non nisi in magna phlegmone fieri volunt. At huic febris satis acuta aderat; & lingua arida rubensque, qualis in principio hic cernitur; postea autem nigrescebat (vt fieri affolet) & aspera fiebat. Habebat vero sitim inexhaustam, nauisam, & cibi fastidium, & singultum; quæ, inquam, omnia inflammationem hepatis indicabant, lotium quoque rubrum spectabatur. Ad hunc igitur accitus mense Iunio, anno 1548. venam basilicam illico tundere feci, ad vncias octo, vel paulo plus, sanguine effluente, cum eodem die secessum habuisset. Sed sequenti die cum non satis aluus responderet, lenitium sequens vt exhiberetur, mandavi: *Recipe cassia recens extracta ʒj. rhab. pulu. ʒj. fiat bolus: ex quo quatuor sedes vtunque biliosas habuit; ita vt ex hac leui purgatione & sanguinis detractione febris mitior euaserit, dolore parum diminuto, sed adhuc vtunque permanente. Inunximus regionem hepatis vnguento santalino, & pannum lincum eodem vnguento inunctum apposui, sine calfactione. Inter ea & hoc decocto vtiebatur. Recipe endiuia, cichorij cum toto, dentis leonis cum toto, acetosa, viol. lactuca nouella, an. m. j. fumaria, agrimonia, capill. vener. boragin. bugloss. an. man. ss. chamapitios, chamæd. (cum esset etiam quadam obstructio, tum cholera paulo crassior, quam leui purg. per aluum excreuerat) ana m. ss. rad. graninis, petros. an. ʒ ss. sem. 4. friged. maior, & minor, an. ʒj. sem. anisi ʒ ss. thamarind. ʒj. prun. damasc. num. xij. vna. pass. ab arill. repurg. ʒj. liquir. ras. ʒij. bordei mund. p. j. fiat decoct. in aqua communi pro lbj. colaturæ addendo syr. de cichor. Nicoli cum rhab. ʒi ss. syr. viol. de limonibus, de endiu. ex infus. ros. commun. an. ʒ ss. misce. Quo iulebo, seu apozemate, cum vsu esset, febris valde diminuta est, & quotidie aluum deponerebat. Morbo autem magis inclinante, pro dolore vsus est sequenti epithemate, bis aut ter in die, atque ita dolor omnis euauit, neque ad apostema deuenit, de quo metuebat, sed sanus, cum nostra laude, ab astantibus pro deplorato habitus, euasit: *℞. endiuie viridis, cichorij, an. m. j. flor. chamæmille, meliloi flor. ros. rub. an. an. ss. summitatum absinthij p. j. coquantur in aqua communi pro lbj. in fine addendo aquæ absinthij, end. an. ʒj. acet. optimi ʒij. specier. trionfant. ʒi ss. Iterum ebulliant, & fiat epithema pro hepatis regione. Eo peracto inungatur linimento infrascripto. *℞. olei amygd. amar. chamæmil. an. ʒ ss. olei ros. vngu. santalini, an. ʒij. misce. Quod ad victum attinet, tenuissimum ptisanæ, lactucam, tum poma cocta administrando. Ptisana à Galeno maxime laudatur in cibo 13. meth. med. Abstinentium à dulcibus, quibus tum iecur tum lien intumescunt. Postea in fine ptisanam in galinaceorum pullorum iure concessimus, intybo & cichorio incoctis. Auctores enim hic à valde refrigerantibus ac astrigentibus abstinent: de quibus consule Alexand. Trall. & Galenum, tum alios auctores.***

SCHOLIA.

H aud raro iecur inflammatione laborat, ob sanguinis fluxum & refluxum, vt diximus, quæ haud aliter in ipso quam in cæteris nostri corporis partibus gigni consuevit, nec etiam ab alia causa. Nam communis omnium phlegmonarum generatio (teste Galeno 10. 13. 14. meth. med. & in lib. de tum. præter naturam, & de inæquali ff iij. inem-

coxit, ac præbuit. Atqui nostris temporibus mitiora ac tutiora medicamenta comperiuntur, quibus uti poterimus; ut manna, cassia fistula, syr. ex plur. infus. ros. purpurearum tum persicorum, ac etiam rhab. Hic vero cum aluum siccam haberet, etiam in gibbo existente inflammatione, ventrem omnium primo emollire oportebat, cum iam principium transisset; & ideo etiam iuxta Auic. præstat hic ante omnia, ut venter compenter teneatur laxus; qui sic dicit: *Caueas dimittendo naturam restrictam, in hoc enim est nocivum maximum, & in ipso est horror: & non dimittas eam resolutam superflue, & cadat virtus, & gliscat natura: imo superest tibi, ut soluas strictam cum qualitate, & conservas solutam cum equalitate.* Bonum est ergo, licet inflammatio seu apostema sit in gibbo, ut venter teneatur laxus, cum suppositoriis aut clysteribus lenibus, aut cum diaprino, scilicet simplici, cassia fistula vel diacatholico. Cum igitur aluus hic adstricta esset, libenter hunc clysterem vel similem inieci. *Re. malv. bisulm. folior. viol. an. m. j. cucum. cucurb. an. m. j. prun. sebesten. nu. xx. quar. sem. frig. maior. an. 3 iij. sem. anis 3 ij. flor. chamemill. viol. an. pug. j. fiat decoctio in lb j. in qua dissolvat mel. viol. & acch. cassia an. 3 j. olei viol. 3 iij. misce, clyster hic mollis est, leuiter detergens, & refrigerans, sensimque aliquid excrementorum euacuat: quem tertio quoque die Rondeletius, si aluus durior est, injici iubet. Et quamquam præcipue conveniat, si inflammatio sit in caua aut splene; valet tamen etiam si sit in parte gibbosa, ubi venter strictus est: Verum cum clysterem non admitteret hic æger, dedi hanc potionem. *Re. syr. ex infus. ros. pallid. cum rhab. 3 j. cassia fistula recens trita, diacath. an. 3 ij. aqua cichorii 3 iij. misce: fiat potio: qua satis aluum depouit, & materiam biliosam excrevit. Altero die, quamquam venæ sectio in principio neglecta fuerat; tamen, considerando sanguinis abundantiam, & vires adhuc constare, sanguinem detrahere mihi utile visum fuit; licet omnes auctores & inter eos Auicenna, venæ sectionem hic tantum in principio commendent. Et quamvis principium iam transactum erat, ita ut aliquis timere posset de sanatione, ut ita dicam cum Auicenna: tamen venæ sectio etiam convenit egregie in dolore intenso, si sanguis abundet, & vires adhuc constent, eodem Auicenna auctore. Memini ex scriptis M. Ioan. Tyengij, quod ille in muliere 40. annorum, cum tribus mensibus apostemate hepatis laborasset, commode venam basilicam in dextro brachio misit; quamquam & illa tussi sicca laboraret: tamen aliquid sputi sanguinolenti (licet in gibba hepatis inflammatio & apostema esset) vna cum tussi emittebat; quemadmodum & filius illius Berosi doctoris magnifici, ann. 12. natus, apud Amatum, qui etiam in gibba parte hepatis inflammationem patiebatur, vna cum tussi & sanguinis secreta: cui licet in principio ad vncias 5. vena cubiti secta fuisset, tamen postea cum in iccinore doleret, cum inflammatione gibbæ partis, post clysterem iniectum, denuo sanguinem ex vena, quæ inter digitum annularem & minimum reperitur, vncias quinque sanguinis cum maxima utilitate detrahere mandavit: cuius totam vide historiam, quomodo is puer curatus fuerit, cent. 4. cur. 1. Postquam igitur venam in hoc nostro ægro fecari fecissem, exhibui decoctum sequens, ad modum iuleb. *Re. end. cichorii, lactuca, acetosa, ana man. j. rad. cichorii, feniculi, ana 3 lb. semin. 4. frig. maior. ana 3 j. cassia 3 iij. spica nardi, schenamb. an. 3 j. coquantur in aqua compunti pro lb j. colatur. adde oxyrac-***

chara simplicis 3 iij. misce pro 4. dosibus. Postea addidi magis aperientia & diuretica: ut syr. de hyzanthis, acetos. compositum, & aliquando hunc syrupum: *Re. aqua endiu. absinthij, feniculi, ana 3 j. syr. de end. de hyzanthis, oxyracchar. ana 3 lb. misce, fiat syr.* Oportet autem in declinatione (ut latius in scholio dicemus) etiam diuretica hic adhibere, ut syr. de end. compos. capill. vener. & de hyzanthis, cum decoct. semin. 4. frigid. maior. cum radic. graminis, apij, & petros. ac similibus. Interea purgavi etiam illum, ante diuretica, cum infus. rhabarb. adiecta schenantho. Et quia principium pertransierat, quo ad topica, licet ab initio magis repellentia profuissent, ut innectio olei ros. lentiscini aut melini; nos potius nunc oleo ros. adieci-mus primum oleum amygd. amar. & absinthij, deinde etiam cotoneorum & masticinum, aceto albo parum immixto: etiam hoc epithemate, vel simili vntes. *Re. res. rub. cichorii, end. an. p. j. flor. chamem. meliloti, absinthij, anethi, ana p. lb. bulliant in aqua pluviiali: demum adde succi cichorii 3 ij. aceti albi 3 ij. misce: fiat epithema.* Postea & hoc foci seu epithemate, aut limili, vsi sumus. *Re. florum chamemill. meliloti, ana man. j. extremitatum absinthij, florum ros. agrimonie seu eupatorij, centaurij minoris, ana m. lb. fenugrec. sem. lini, spica, schenamb. ana 3 ij. fiat decoctio in aqua pluviiali, pro lb ij. adjiciendo aceti optimi 3 ij. pro foci.* Facta fomentatione, cum pannis calidis locus exsiccatus his oleis inungebatur. *Re. olei chamemill. 3 j. olei amygdalar. dulc. & absinthij, ana 3 ij. misce, & innunctione peracta apponabatur ceratum, ex duabus partibus emplastri, de meliloto, & vna parte cerati seu vngu. fantalini.* Atque hoc modo accidentia postea ceperunt diminui, & anhelitus facilitari; & dolor minuebatur, somno ac appetitu redeuntibus, ac febre cessante. Interea tamen post purgationem, ad hepatis roborationem, & caloris alterationem, subinde sumebat rotulam vnam specier. diarod. abbat. in tabulis. Et ita liberatus fuit ab inflammatione, per modum resolutionis, absque suppuratione.

S C H O L I A.

Quoniam de signis iam egimus, restant adhuc signa prognostica: quæ & acutorum affectuum hic generalia sunt: vnicum enim salus est, vnicum robur, ut 10. meth. med. habetur. Hinc noster hic æger, cum adhuc virib. valeret, ab hoc morbo, licet primo ingressu difficilis videbatur, sanatus est. Ideo viribus imbecilli, vi senes & graciles & biliosi, aut peribunt, aut in tabem transibunt, ut nos sæpe vidimus in multis; ut constat. 3. epid. 2. 5. & 1. præsertim si ex erysipelate laborant, ut 5. de loc. 6. constat. At sciendum, quod signa quoque erysipelatis sunt maioris & minoris ratione differentia; non modo enim acuta febris inde eveniet, sed prorsus ardens; & sitis, & reliqua de lingua, quæ æstum insequuntur, longe graviora, unde & erysipelas periculum magis quam inflammatione dæcernitur; ut in libris nostris de febribus ostendimus. Pessimum quoque hic, ut & in inflammatione, signum est, extrema refrigerari, cum medium corpus vritur, & cum pedes subinde nudant, cum sint frigidi. Sunt & aliæ quadam notæ quæ generationem in acutis ponuntur, 1. prog. Vomitus vero niger, pessimus, ut & porraceus: magnam enim adustionem significant. Morti vero proximis intumescit venter; rupto abscessu: & sudant sudore frigido circa collum, & faciem; & linguuntur animo, ut Bellamarto apud Iacchinum contigit. Gene-

Generatim vero morbus periculosus; & sitim, & colicos dolores, & nauscam movet. Alij gibbi vomitum magis exitialem putant, ex loci nobilitate ac ætione dignitate, quoniam vis concoquendi ac dissolvendi dispensandique in ea parte à natura sita est: nam & principalibus menbris annectitur: unde eorum communicatione cauo præfertur. Sed iccoris duritia omnibus affectibus deterior habetur, si malum præsertim vetus est. Quicumque fuerit abscessus, qui in vomitum transit, fere nunquam sanatur. In quavis quoque iccinoris inflammatione, si crudo etiam num morbo, & viribus infirmis, alui oritur profluvium, malum. In mica etiam corporis liquatio, præcipue si vel raucitas, vel multa simul tussis accedunt. Mortiferum est spumantem sanguinem excreari, vel sputum statim subputridum, vel syncere biliosum esse. Sanguis tamen vomitione redditus salutem interdum denunciat: id semel vidimus in muliere annos paulo plus quam 40. nata: quæ etiam per inferius sanguinem excrevit, & fuit nostra industria curata. Ita & purulenta deiectio quibusdam salutem attulit. Verum si huic morbo ventris fluxus supervenerit, nisi fuerit iudicialis, lethalis est. Si iccoris abscessus ad lienem transiitum fecerit, non improbat, quod è diverso perniciosis est; nam vomica iccoris nunquam ferme sanatur. Ita & singultus, sequens (ut paulo ante admonimus) apostema hepatis, ut plurimum mortem prænuntiat. Et apostema hepatis si prolongetur, perducit ad hydropem, ut multis exemplis conspeximus. Ita si inueterato apostemate sequatur ventris solutio, lethale quoque malum est. Neque aliquis euadit ab apostemate duro & confirmato: multoque minus si carcinoma adfuerit. Nam velocius interficit, quemadmodum & exitura notabilis propinqua magis desperationi existit, quam spæ. Quamquam alia apostemata hepatis, ut plurimum sanantur, si recte regantur, potissimum si neque in principio curationis error committatur. Quæ vero apostemata sunt dura, melancholica, diuturna, indurata, desperata habentur: quamquam secundum aliquos, ab initio curari possunt. Omne enim apostema hepatis, quod non curatur ab initio, causa hydropis existit. Ita omne apostema generat oppilationem: oppilatio indigestionem: indigestio aquositate: aquositas hydropem, teste Cordone: quemadmodum & citatur à Crado. Vbi maxime coniuncta est debilitas expulsiua hepatis, & in eo, quod ad sanem conuertitur, dicente Auicenna, non speres salutem, cum hepar sit fons virtutum naturalium; ad quarum perditionem sequitur mors. Post apostemata dura & ad sanem conuerfa, difficiliter curantur biliosa, ob facilitatem accidentium: deinde pituitosa, postea sanguinea: licet pituitosa habeant remissiora accidentia, quam sanguinea: sunt tamen deteriora, ob diuturnitatem & materiam inobedientiam. Sed hæc postea exemplis clariora evadent. Nunc quædam addamus quæ ad generalem curationem inflammationis hepatis pertineant. Exquisitissimo omnium primo victu hic opus est; æque ac si ventriculus sic laboret (Galeno teste) quoniam munus eius visceris toti animali est commune, acciditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, ubi non probe concoctum alimentum sit, siue non in sanguinem rite fuerit conuersum, ut ab eodem Gal. 13. meth. med. decretum est: qui alimentum ibidem tenue & non mortuæ elegit; & abstinet ob angustiam venarum in iccinore, ab astringentibus, quæ constipant: & glut-

enim excitat periculosum; & sitim, & colicos dolores, & nauscam movet. Alij gibbi vomitum magis exitialem putant, ex loci nobilitate ac ætione dignitate, quoniam vis concoquendi ac dissolvendi dispensandique in ea parte à natura sita est: nam & principalibus menbris annectitur: unde eorum communicatione cauo præfertur. Sed iccoris duritia omnibus affectibus deterior habetur, si malum præsertim vetus est. Quicumque fuerit abscessus, qui in vomitum transit, fere nunquam sanatur. In quavis quoque iccinoris inflammatione, si crudo etiam num morbo, & viribus infirmis, alui oritur profluvium, malum. In mica etiam corporis liquatio, præcipue si vel raucitas, vel multa simul tussis accedunt. Mortiferum est spumantem sanguinem excreari, vel sputum statim subputridum, vel syncere biliosum esse. Sanguis tamen vomitione redditus salutem interdum denunciat: id semel vidimus in muliere annos paulo plus quam 40. nata: quæ etiam per inferius sanguinem excrevit, & fuit nostra industria curata. Ita & purulenta deiectio quibusdam salutem attulit. Verum si huic morbo ventris fluxus supervenerit, nisi fuerit iudicialis, lethalis est. Si iccoris abscessus ad lienem transiitum fecerit, non improbat, quod è diverso perniciosis est; nam vomica iccoris nunquam ferme sanatur. Ita & singultus, sequens (ut paulo ante admonimus) apostema hepatis, ut plurimum mortem prænuntiat. Et apostema hepatis si prolongetur, perducit ad hydropem, ut multis exemplis conspeximus. Ita si inueterato apostemate sequatur ventris solutio, lethale quoque malum est. Neque aliquis euadit ab apostemate duro & confirmato: multoque minus si carcinoma adfuerit. Nam velocius interficit, quemadmodum & exitura notabilis propinqua magis desperationi existit, quam spæ. Quamquam alia apostemata hepatis, ut plurimum sanantur, si recte regantur, potissimum si neque in principio curationis error committatur. Quæ vero apostemata sunt dura, melancholica, diuturna, indurata, desperata habentur: quamquam secundum aliquos, ab initio curari possunt. Omne enim apostema hepatis, quod non curatur ab initio, causa hydropis existit. Ita omne apostema generat oppilationem: oppilatio indigestionem: indigestio aquositate: aquositas hydropem, teste Cordone: quemadmodum & citatur à Crado. Vbi maxime coniuncta est debilitas expulsiua hepatis, & in eo, quod ad sanem conuertitur, dicente Auicenna, non speres salutem, cum hepar sit fons virtutum naturalium; ad quarum perditionem sequitur mors. Post apostemata dura & ad sanem conuerfa, difficiliter curantur biliosa, ob facilitatem accidentium: deinde pituitosa, postea sanguinea: licet pituitosa habeant remissiora accidentia, quam sanguinea: sunt tamen deteriora, ob diuturnitatem & materiam inobedientiam. Sed hæc postea exemplis clariora evadent. Nunc quædam addamus quæ ad generalem curationem inflammationis hepatis pertineant. Exquisitissimo omnium primo victu hic opus est; æque ac si ventriculus sic laboret (Galeno teste) quoniam munus eius visceris toti animali est commune, acciditque omnibus animalis partibus maximum incommodum, ubi non probe concoctum alimentum sit, siue non in sanguinem rite fuerit conuersum, ut ab eodem Gal. 13. meth. med. decretum est: qui alimentum ibidem tenue & non mortuæ elegit; & abstinet ob angustiam venarum in iccinore, ab astringentibus, quæ constipant: & glut-

apostematis
hepatis &
venarum
mesaraicarum.

apostematē venarum mesaraicarum, quamvis in signis plurimum conveniant, scilicet febre, gravitate, dolore & similibus. Est tamen apostema venarum mesaraicarum cum minore febre, minori gravitate: & ipsum sequitur fluxus chylosus ut plurimum, & magis extenuatio quam cachexia aut hydrops, quæ hepatis apostema sequuntur, neque tactui subjacet, uti hepatis apostema. Alia quoque distinctio est penes materiam ipsam; nam est vel sanguineum apostema, vel biliosum, erodensque vel pituitosum aut melancholicum, vel ventosum, modo per viam paulatinā congestionis, modo per viam defluxus. *Vide Gradum & Arculanum ac alios.* Quibus & hæc divisio accedere potest, modo magnum, modo parvum, modo mediocre. Et quod ad distinctiones temporum attinet, aliud est in principio, aliud in augmento, statu aut declinatione; aliud recens, aliud diuturnum; benignum, malignum, corrodens, corrumpens. Quibus additur & differentia terminationis, ut per viam urinae, sudoris, fluxus sanguinis narium, cum sensibili expulsiōe: idque in gibbo frequenter; in cavo per fluxum ventris, vomituum. Vel resoluitur, vel maturatur, & abscedit, & in pus vertitur: vel in scirrhum aut duritiem transit; aut corrumpitur: qualia quoque de aliis inflammationibus & apostematibus dicta sunt prius, cum de ventriculo ageremus. In apostemate calido vel abscessu, oculi sanguine vel flava bile suffusi, lingua rubra, & crescente morbo nigra, facies decolor, & alius vario colore turbata: animus deficit, singultus & frigus in membris exterioribus: urina purpurea, subrubra, spissa, cum liuore, æger valde sitit, *iuxta Hippoc.* & in calido abscessu aut duro, dolor ad iugulum ascendit, & annexas scapulis costas; præcordia contrahit: æger supinus, aut in dextro latere tantum, quiescit: in sinistro magis dolet: febris importuna ac sitis; urina lucida, modo crassa. In frigido gravitas sub hypochondriis dextris, arida tussis, non sine febre ac siti, sed leniore, faciei pallore. At in phlegmatico, color plumbeus corporis, facies ac genæ inflatæ, pulsus mollior; febricula levis, sine siti, urina crassa, alba; cibi tedium, nausea: quibus si vitæ ratio & alia consentiant, certius est iudicium. Si à melancholia, maior durities, pondus à cibo; urina, tenuis diluta; pulsus tenuis, nullum ciborum desiderium color fuscus totius corporis. Ex bile si fiat, ea, quæ de erysipelate diximus, huc transferenda: inflammatio ingens est, tabe membra conficiuntur; vigiliae, excedens sitis, ardor; lingua arida citrina, febris continua, & de tertio die magis exasperans, pulsus durior. Ex sanguine, dolor minor, quam in bilioso, linguae color rubeus, postea denigrescens: urina conturbata, rubra, superius liuescens: venæ extuberant; pulsus plenus, magnus, velox, frequens; potiusque vndosus quam ferrinus: maior tumor, minor gravitas, dolor magis extendens, quam pungens; febris conclusa, continua. Ventosum dignoscitur ex dolore extensivo absque graedine, cum pauca aut nulla febre. Signa vero temporum apostematis hepatis, uti indurationis, resolutionis, permutationis, & maturationis, habentur ex iis, quæ de pleuritide à nobis tum aliis auctoribus dicta sunt. In principio accidētia sunt remissa. Postea intenduntur: deinde remittuntur cum resoluitur. Et si dolor non diminuitur ex remediis aptis, tunc ad sanem convertuntur, & magna ex parte lethale habetur, ut de vlcere hepatis dicimus. Hoc satis est hic admonuisse, si increfcit phlegmone ac sentitur suppurare, dolor increfcit,

6
Calidi apostematis & abscessus signa.

Frigidi.

Phlegmatici.

Melancholici.

Biliosi.

7
Sanguinei.

Ventosi.

Signa temporum apostematis hepatis, uti indurationis, resolutionis, permutationis, & maturationis, habentur ex iis, quæ de pleuritide à nobis tum aliis auctoribus dicta sunt. In principio accidētia sunt remissa. Postea intenduntur: deinde remittuntur cum resoluitur. Et si dolor non diminuitur ex remediis aptis, tunc ad sanem convertuntur, & magna ex parte lethale habetur, ut de vlcere hepatis dicimus. Hoc satis est hic admonuisse, si increfcit phlegmone ac sentitur suppurare, dolor increfcit,

hypochondria magis prætenduntur, frigore enormiter corripitur æger: cui in sinistro lato recumbere gravissimum est, aperto pure, per vesicam subito putris materia prorumpit, vel membrana disrupa in concavum ventris labitur, ut de vlcere latius dicendum. Si induretur, gravitas sine febre manet, & extenuatur corpus, & urina minuitur. De prognosticis signis dictum est prius: præfagientia habentur ex corporibus habentibus venas strictas, qualia sunt corpora pingua, parata incurere obstructions, intemperaturas, dolores, & hepatis apostemata: & quicunque vtuntur cibariis crassis, viscidis, potu vini potentis, & à cibo inordinato motu, huic malo obnoxij sunt. Ex quibus iam dictis etiam facile causæ omnes patent apostematum hepatis per essentiam; vt sunt, mala intemperies calida, humores ad se attrahens; frigida, debilitans coctionem & vim expulsiuam; oppilatio, retinens & figens humores in hepate; dolores, materiam trahentes ad locum. Vel sit per consensum, vesica fellea obstructa, & felle ad hepar regurgitante: vel humore melancholico ex splene ad hepar transeunte, vel ab aliis membris ex vtero mentibus restrictis; ita & sit à naribus, vel ventriculo, chylo non bene præparato, ut sanguis ex eo fieret: aut ab hæmorrhoidibus restrictis. Sed præter hæc alia etiam sunt causæ externæ, vt percussio, casus super hepar, ventosa corpore pleno hepate, vt sæpe contingit, à medicis imperitiis admota in hepatis dolore, quæ attrahit materiam apostema inferentem, etiam in plethoricis ad sanguinis è naribus fluentis, restrictionem: fieri etiā potest ex calidis emplastris vel epithematibus, hepatis corpore pleno impositis, vel quoque ex nimis frigidis vnguentis atque fotibus, confractione materiam impingentibus. Suntque & hæc causæ primitivæ, vt torsio, percussio, obuiatio, & strictio fortis ac continua zona. Vel sunt internæ, vt oppilationes, inhibita materia euentatio, vel cõpositio aut paruitas hepatis. Ad internas etiam pertinent antecedentes, multus sanguis calidus, bilis, vltusque calidiorum ciborum, intemperies calida cum febre, bilisque retentio in vesica fellea, ut alia multa: cibi styptici, viscoli, frigidi, exercitium à cibo, venus, prohibitio euacuationum consuetarum: ita & causæ ventositatis & debilitatis patent ex iis, quæ de ventriculo diximus. Coniunctæ causæ apud Arabes sunt ipsi humores: de quibus omnibus consule Valesc. & alios præcticos, Arculanum & Gradum; qui & varias curandi intentiones ponunt, ex quæ iis alijs septem, vt *Galenaria*: nempe, vitæ institutum, quodque augmentum apostematis inhibeat, *dinersionem, repercussionem, digestionem, euacuationem, resolutionem, remotionem mala intemperiei.* Alij in tres partes tantum curationem partiuntur: in eam, quæ causam antecedentem respiciat ac tollat; deinde in eam, quæ coniunctam respiciat: demumque in illam, quæ virique communis sit. *De quibus vide Arculan.* Primam absolvit euacuando per venæ sectionem, & per euacuationem ventris, in bilioso, pituitoso, melancholico: quamvis alijs præponunt syrupos digerentes, deinde purgant, prout humores in causa fuerint; etiam postea urinam cient, pro ratione materiam; vt apud eosdē videre poteris: diuertunt frictionibus, ligaturis, cucurbitulis. Quod ad secundam intentionem attinet, vtuntur repercussivis in principio: de quibus etiam canones addūt, vt *Valesc.* quæque facit: vt apud eundem, tum *Arcul.* legere poteris. In augmento, vsque ad medium statum, iisdem repercussivis addunt resolutionem: & in fine resolutionem, modo apostema

8
Signa per sanguinem.

9
Externæ.

Primitivæ.

Internæ.

Antecedentes.

Coniunctæ.

10
Coniunctæ.

Curatio.

11

resolui possit; alioqui, si maturetur, cam iuvant, vt *Arculan.* facit. Tertia intentionem, vtrique communem, perficiunt curatione accidentium, & regimine sex rerum non naturalium, aliter tamen procedente in apostemate sanguineo, aliter in bilioso aut pituitoso, aut melancholico. Sed ne hic longiores simus, eosdem auctores consulito, tam de iis, quæ intus, quam extra adhibeantur, pro ratione humoris abundantis, & inflammationem aut apostemata inferentis.

OBSERVATIO X.

De hepatis apostemate in abscessum commutato, mox in vltus malignum, deinde in eschimenon ac gangrenam, ac tandem in mortem.

Famulus ceruicis cuiusdam, Delphis misere ultra annum lecto incubuerat, in ædibus, quibus tria candelabra pro insigni erant, vir annos triginta sex natus. Hic per integrum annum dolore hypochondrii dextri conficiebatur, atque in autumno febrem habuit non observantem typum, lentam tamen, qualis in corruptela substantiæ jecoris fieri assolet. Duravit deinde hæc febris, typum non retinens aut observans, per totam hyemem sequentem, quæ neque hominem in vere reliquit, & perduravit deinde ad æstatem vsque. Fuerat autem hic vsus plurimis & diuersis medicis, uti in morbis chronicis hic maxime fieri solet: ideoque ei plurima, eaque varia, à multis & variis descripta fuere. Cum autem per annum, quasi tabe consumptus foret, maximos dolores perpeffus, ac tunc faciem ictericis similem haberet, qualis contingere fere solet omnibus jecinorosis; tandem collegam meum Cornelium Eri-cium, alioqui medicum doctissimum, accersivit. sed non diu: coq; repudiato, cum opem non sentiret, variorum medicorum empiricorum opera vsus est; ita vt tandem ad extremam atrophiam deueniret. Cumque ita per annum tabidus miseram vitam traxisset, sub æstatem anni 1561. cum forte fortuna ad alium agrum inuisendum, qui in iisdē ædibus, in quibus & hic famulus decumbebat, accitus essem, me quoque consuluit. Sed homine inspecto admirari cepi, cum in vita virum magis consumptum macilentiorumque nunquam vidissem, cui tantum pellis rugosa vna cum ossibus restabat, vniuersa carne consumpta, non aliter quam pictores *Diuum Hieronymum* macilentum & exanguem depingunt. Iecore enim ita contabescente totum corpus tabe absumptum conspiciabatur. Deinde huic quidem viro non solum facies erat citrina, sed vniuersum corpus flauum euascerat, etiam albedine oculorum in citrinum colorum plane conuersa, quod & jecinorosis & ictericis euenire solet. Aderat & huic tussis sicca, admodum molesta, hominem omnino conficiens. Hypochondrium deinde dextrum apparebat durum & valde subumidum, & omnibus conspicuum, musculus abdominis plane extenuatus & consumptus. Urina vero tenuis erat, sed supra modum tincta ac ignea, vt vinum rubrum ac diaphanum videretur. Sed & oris siccitas eum molestabat, præsentē febre hectica, ac pulsu vix apparente, & magis sub noctem intensa. Id quidem recte docuit *Gal. lib. 1. aph. 12. in commento*, suppuratos tali febre laborare; cum sic scribat: Et morbo quidem laterali & phrenitidi magna ex parte per tertium diem accessiones sunt: suppurationibus autem, quæ ventri eueniunt, aut hepatis & tabi, quotidie & magis ad noctem: qui vero ex

Pet. Foresti. Tom. 2.

liene laborant, & omnino ex atra bile, per quartum. Cæterum huic ægro modo alius adstricta erat, modo admodum liquida, & plurima biliosa liquationis instar egerebat: postea iterum fuit arida & sicca admodum aluo. Præterea aderat & cibi fastidium; sitisque inexhausta; ita vt aquam frigidam ac gelidam magna in copia præter consilium medicorum hauerit. Ad hunc, postquam ultra annum laborasset, ingressus, cum ab initio huic sanguinis detractione esset prætermissa, idque male in hepatis inflammatione, & apostemate; nunc id nullo modo licuit, in homine iam tabe & hectica febre consumpto, ipsoque humido radicali etiam absumpto. Ego vero apostema in hepate confirmatum atque incurabile pronuntiaui: & non diu post, meam opinionem confirmavit, cadauer sectum post mortem. Nam tumor admodum durus paucis diebus è regione hepatis ita in immensum excreuit, vt omnibus appareret: non sine dolore: quod signum erat abscessus futuri: nam si simplex scirrhus fuisset, minus doluisset. Quare prædicto prognostico eum pro deplorato habuimus, cum apostema hepatis confirmatum non curetur. At postea cum idem tumor laxior fieri inciperet, febre magis crescente, suppurationem expectauimus: ideo per chirurgum, qui tunc etiam aderat, ea apponi iussimus, quæ suppurationem iuuarent: nempe hoc cataplasma: *℞. rad. alibæ mundatæ 3 ij. farinæ hordei 3 j. farinæ sarnæ sem. lint. pinguedinis anseris, porci, an. 3 b. cyperi, schœnamb. pul. an. 3 iij. ammon. in aceto dissoluti 3 j. olei lilior. mastichin. an. 3 j. fiat cataplasma.* Postea cum apostema maturum apparebat, & materia satis deducta erat ad sanem, remittebantur quidem prædicta accidentia, gravitas tamen maior remanebat, cum materia in vno loco magis congregata videretur, & tactu lenitas & mollior sentiretur, duritie, quæ prius sentiebatur, in totum ablata. Statim autem cognouimus ex dolore redeunte, ruptionem appropinquare, punctione & febre rursus crescente, & gravitate maiore. Cum tamen per se non rumperetur abscessus, vt chirurgus ruptionem iuuaret imperauimus, & vt emplastris supra scriptis, tum aliis maturatiuis, quibus ad tempus vsus erat, immisceret simum columbinum, fermentum, cæpas & narcissi radicem & similia; vtque æger sese supralatus velociter moueret. Aliqui auctores, vt *Gradus*, vt facilius rumpatur, clysterem injiciunt (vt *Gradus* iubet) satis attractiuum: & frictiones adhibent versus partem anteriorem: quamquam illi (vt *Serapio* iubet) melius & tutius per viam urinae, cum iis, quæ urinam ciunt, materiam deducunt. Quod etiam commodius, est hoc in loco, vt nos fecimus, cum apostema in gibbo magis videretur: in cavo tamen secessus magis viles: de cuius partis abscessu etiam dubitabam, totumque hepar infectum esse; ideo per alium etiam materiam deduximus. Verum cum eiusmodi ingens apostema non rumperetur, chirurgum præsentem incitauimus; vt ad incisionem procederet; sed in corpore debili & exhausto id tentare noluit, vel non audebat: existimabat enim, quod tandem per medicamenta apposita rumperetur. Verum cum illud non succederet, & escharam quasi induxisset, denuo me in consilium adhibuit. Ego autem cum ex signis præsentibus animaduertirem, quod pus totam cauitatem ventris occuparet, potissimum è regione hepatis, ubi tumor ingens laxior apparebat (nam mox pus & fluctuatio quadam exaudiebatur) vltus iam factum in hepate, malignum, putridum & corro-

Gg ij suauit

suum iudicabam; quod hominem subito è vita tolleretur; nisi vltio (ut veteres medici facere solebant) vel incisio aut apertio statim fieret scalpello vel phlebotomo aliquo: quæ licet etiam in homine deplorato & viribus exhausto periculosa haberetur; tamen tentandum fore, ne æger statim ex putredine puris intus coacti exspiraret. Ideo & secundus chirurgus aduocatur, qui incisionem statim agendam censuit; quod & mihi vtile videbatur: præhabito tamen prognostico, quod cura coacta & periculosa foret; tamen tentanda, ne vlcus in peius procederet: interim si fieret, atque æger animo delinqueret, atque sic vitam finiret, id in manu nostra non esse; cum vires exhaustæ essent: interea potius anceps, quam nullum remedium adhibendum. Cæterum ægro ipso, tum amicis astantibus consentientibus, chirurgus dextre suo officio functus est; prima vice post adhibitam incisionem, sanie virulenta & sanguinolenta absque pure exeunte. At cum vulnere impositum esset linamentum, quod secunda visitatione amoueatur, materia viscosa, purulenta, fetida, copiosa emanauit, cum tanto fetore, ut totam domum eo impleret, ita ut vix quisquam nostrum in cubiculo apud ægrum persisteret posset. Cum vero materia viscosa foret, ut eo minus exire posset, denuo coactus est incisionem ampliorem facere, quod etiam dexterrime peregit, neque interiora lasit: exiit tunc materia admodum fetida, & purulenta, amurcæ similis; unde coniecimus omnia interiora corrupta, & hepar similiter, & ægrum non euasurum amicis prædiximus. Illud enim proculdubio mortem prænuntiabat, iuxta aph. 47. lib. 7. in hunc modum diuino illo Hippocrat. inter medicos facile principe, prædicente. Quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit & album, euadunt, in tunica enim hoc pus continetur: si vero qualis amurca fluat, pereunt. Similem vero casum aliquando & ipse habui, cui & typhodes febris aderat, qui etiam ex eodem abscessu mortuus est, amurca post incisionem etiam effluente; cuius historiam habes lib. 2. observationum nostrarum, obs. 37. de febre typhode. Verum in nostro hoc ægro, de quo nunc agimus, tertio statim die ab incisione caro exterius facta est liuida, ac in gangrænam mortificata. Solet autem gangræna fieri ob magnitudinem inflammationis, quæ vitæ, sensus & motus partis extinctio ac mortificatio est; quæ tamen nondum integra est, sed iam futura. Quum vero aliqua pars ita languens, vita & sensu carere cœperit, tum σπῆλαιος (ut de sphacelismo ipsius cerebri alias diximus) Græcis, Latinis Syderatio is morbus dicitur, ut Galeno visum est, in libello de tumoribus præter naturam. Qui distinguere videtur, quod syderatio sit solidorum corporum corruptio, ita ut ossibus quoque insit (ut & hic in ossibus costarum, corpore iam demortuo ac inciso apparuit, ut mox ostendimus) gangræna, etiam corporum solidorum, sed ossa non corripies. Cæterum non solum caro externa circa labia incisionis liuida & mortua erat, sed & interior: quod cognouimus ex ingenti putredine, & fetore, qui ex loco inciso exhalabat, dum vulnus reficeretur, non aliter quam ex homine cadaueroso & demortuo. Præterea dum chirurgus paulatim pus propelleret, & ad exteriora labia vulneris deduceret, tanta cauitas apparebat promptuarij instar, ut & intema tandem etiam corrupta spectarentur. Interea nos per interiora exhibuimus ea, quæ vlcus detergerent, & mundificarent: quamquam nihil proficeremus, ægro in dies debiliore euadente, ut

tandem nihil per os sumere potuerit. Et ut paucis rem absoluamus, septimo die ab incisione peracta hic mortuus est. Eoque demortuo, cadauer, amicis id consentientibus, à chirurgo incisum, probis viris tum me presentibus: Est in tota ventris capacitate reperta maxima copia puris valde fetens, ut præsentis in cubiculo, in quo incisio fiebat, perdurare vix potuerint. Occupabat aliquando pus tam partem sinistram quam dextram sub toto abdomine, vsque ad imum ventrem; & repertum est omentum à pure virulento confusum: peritonæum quoque disruptum & putidum conspiciabatur: similiter & intestina nigredine & plumbeo colore infecta spectabantur. Hepar autem durum videbatur, ingentis magnitudinis; albicans autem circa stomachum, sed in gibba sui parte, prope costas spurias, nigrum, exustum ac plumbeum in esthiomenon transmutatum: erat enim hepar circa illam partem, potius esthiomenatum (ut ita dicam) quam vlceratam; & in parte gibbosa paululum descedente à costis, gangræna infectum. Et vix pus in hepate conspiciabatur, potius vero in concauitate ventris, quod ab hepate disrupta membrana eo fluxerat. Præcipua autem hepatis corruptio erat in parte dextra, versus costas spurias, & circa musculos inter costales, qui etiam similiter nigredinem contraxerant. Costæ quoque spurie tanquam igne combustæ ex esthiomeno, nigritiem & exsiccationem contraxerant, ita ut carbonis instar nigræ adustæ frangerentur. Vlceratio vero ad musculos abdominis processerat, magis in parte dextra, qui musculi similiter tandem nigredine & gangræna infecti erant. In parte vero hepatis esthiomenata, potius virus & sanies spectabantur, quam verum pus. Mirum fuit, quod hic tam diu vixerit. Post eius obitum 11. Iulij, anno 1561. facta apertione cadaueris, hæc spectauimus. Cæterum, ut tunc nobis quoque referebatur, antequam in illam tabidam & siccam dispositionem tum dolorem dextri hypochondrij incidisset, multis etiam antea annis fuerat valetudinarius. Verisimile est hunc prius inflammatione hepatis laborasse, demum duritiem subsequutam; postea apostemata: deinde abscessum, tum vlcus, ita ut ex gibba eius parte esthiomenata tum gangrænata, sanies ad partes circumstantes fluxerit, & partes adiacentes, ut costas ipsas esthiomeno infecerit. Et quia ingens fuit abscessus, etiam in parte concaua, facta disruptione pus etiam defluxit in capacitatem ventris, intestina, tum omentum ipsum ac peritonæum inficiens. Diaphragma tamen nullo modo laesum spectabatur: quare & mente constitit per totum morbi decursum, nisi paucis horis antequam moreretur, cum falso imaginaretur se ceruissiam coquere: solent enim morituri, ut longa obseruatione animaduertimus, plerumque ea imaginari, atque tacere, & illas actiones obire, quas in vita maxime exerceverunt. Ita hic cereuissarij famulus, omnia quæ in hoc opere, nempe coquendi ceruissiam, obire solent, agebat, aliosque famulos iubebat, & vrgebat, ut munia sua quoque præstarent. Morituri enim, quæ ad actionem propriam spectant, plerique peragunt, præcipue morte appropinquante: quemadmodum etiam contigit cuidam sartori Alemariano, nobis familiari (de quo egimus in libris nostris de Obseru. febrium) qui moribundus tanquam acu vestes fueret, artem suam sartoriam, gestibus, mox exspirans, exprimebat.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

14 Solet aliquando inflammationem, si in principio negligatur, vel perperam curetur, abscessus incurabilis hepatis subsequi: & hunc etiam vlcus magna ex parte lethale: cum & apostema hepatis confirmatum ad suppurationem vergat. Primum igitur sanguis vertitur in putridam saniem, deinde sanies caloris beneficio in pus abit; atque ea ipsa puris collectio abscessus dicitur: erumpente deinde pure vlcus manet cauum ac ffordidum, si statim non repurgetur. Hac mutationis serie multa vitia ex vno eodemque fonte dimanant: quæ ut variis sunt nominibus insignita, ita & varias curandi leges habent. Inflammationis seu apostematis notas iam diximus. Abscessus vero (qui & vomica dici potest) & putrida sanies in pus conuertitur: dolores & febres, teste Hippocrat. tum cætera symptomata inualescunt; rigores sæpe nullo ordine, ut diximus, nullaque ratione inuadunt: quos sequitur caloris exacerbatio. Confecto iam pure, omnia quidem remittuntur, ipseque ardor deferscitur: vires tamen relinquantur multo imbecilliores, pulsusque frequens, parvus ac languidus, crebraque animi defectio. Quum rupto abscessu puris illuies prorumpit, eius tetro vapore cor obruitur, qui sæpe graui orta animi defectio ægrum de medio tollit: ex hoc enim vix quisquam seruari potest. At quum exiguus est abscessus, si vires satis consentent, pus nonnunquam vomitione prorumpit, aut per aluum, ut per vrinas profunditur. Sed & interdum fissa vel exesa jecoris substantia (ut nunc bis vidimus) id excidit in abdominis cauitatem. Huius quoque rei narrat Gradus historiam, cui fides vix adhibenda, ita scribens: Si dolor non minuitur ex aliqua re, tunc apostemata hepatis conuertuntur ad saniem (hic saniem intelligit pus) & fiet tunc prognosticon: quod eiusmodi apostemata sit mortale: quia facta sanie & vlcere in apostemate hepatis, non est regularis curatio. Tamen vidi ego (inquit) in vno scholari Alemario, post vlcus hepatis & educationem multæ quantitatæ carnositatis hepatis: de qua fecimus experientiam multoties, quia conuersione facta de eadem substantia in aqua calida cum virgula agitando remanebat vera carnositas hepatis, tum venis dispersis per eam. Et tamen in processu liberatus est, & eius color in melius mutatus, ita, ut curatus fuerit præter spem meam, & socij alterius medici. Sed tales educationes sunt monstræ in natura, quæ aliquoties sunt in hominibus, ut dicit Auerbohæ, ut alias retuli in simili casu. Hæc Gradus supra Rhaf. cap. proprio de dolore hepatis. Verum vlcus ex abscessu contractum, quoniam alimento continenter alluitur, perpetuo colluue multa fordescit, neque vnquam potest sanescere, ut & sic dicebat Fernellius vir ille doctissimus. Ideo quoque plurimum dubito de illa Gradi historia, quamquam fide dignus suo tempore professor & insignis practicus, se id vidisse commemorat. Iecoris tamen solida substantia, spermatica cum sit, non magis quam pulmonis reparari potest. Vidimus nos in nosocomio Delphensi vulneratum militem, qui ultra annum cum dimidio ibidem decubuerat, longo tempore superuixisse, at post mortem corpore inciso totam substantiam pulmonis prius per vulnus fuisse excretam, ut sine pulmone iam spectaretur, flabello cordis in totum ablato, cuius etiam mentionem fecimus lib. 2. observationum nostrarum de febr. scholio obs. 37. de febr. Typhode, sub finem. Vbi igitur vlcus hepatis est, tunc vitiosa est sanguinis con-

fectio; corpus non alitur, sed ferè tabescit; putrida, saniosa, & interdum eruenta est alui deiectio, ac sæpe quasi ex cadauere facta colliquatio. Vrina quoque sanie perfusa, aut si ea in abdominis spatium penetrat, hydrops omnium grauissimus oritur, qui & inguinum pubisque grauitate & manifesto tumore se prodit; si quidem vires tam diu persistant, quod vix certe vnquam vlla obsecutio notauit. Ideo etiam huic nostro ægro hydrops non est subsequutus, quanquam etiam pus in spatium abdominis fluxerat: sed potius atrophia totius corporis est concomitata. Ideoque ob esthiomenum vlcus tam putridum partis gibbosæ, tum totius hepatis substantiæ, jecur (ut ego puto) nec vllum sanguinem bonum nec nutritioni vtilem, generare potuit; multoque minus potuit ipsum distribuere in venas: unde enormis illa macies totius corporis; quum nunquam in vita (ut paulo ante diximus) macilentiorum conspexerim. Cæterum quibus modis suppuratio iuuanda, & demum quomodo maturum apostema sit rumpendum, id satis declaratum est: sed rupta vomica, puris subsequitur repurgatio, & ipsius vlcus curatio. Si vomitu, vel per aluum reiciatur, aqua mellis calide danda, si ad vesicam & renes tendat, aqua mellis cum emulsionem lactis seminum comm. frigidorum, ubi adfuerit caliditas & exasperatio, propinanda. Sin calor remissior fuerit, radices asparagi, apij, in aqua mellis coctæ adiungendæ, valet & aqua hordei non excortic. cum sem. mal. & zacch. & aqua lactis caprini, cum zaccharo, consolidamus cum thure, mastiche, bolo armen. & similibus, cum aqua mellis, zacchar. aut endiu. plantag. & similibus. Quibus videas tam veteres, quam iuniores.

OBSERVATIO XI.

De hepatis substantia tota purulenta & corrupta post mortem inuenta.

Famula quædam, Barbara dicta, Delphis apud Petronellum Brasseriam habitans, cum longo tempore non sine febre decubisset, per me tandem vtcumque restituta fuit sanitati, ita ut aliquot mensibus foras prodiret. Verum postea facta recidua, rursus aliquot mensibus decubuit; neque tunc vlla medicamenta adhibuit, nisi cum iam macie exhausta iaceret, cum febre lenta, siccique continua, & fluxu colliquante. Atque cum tunc ad illam accitus essem, tumor circa stomachum apparuit rotundus, ita ut ibidem apostema esse videretur: atque instante iam quasi morte, & remediis aptis adhibitis, etiam extra appositis, nihil iuuantibus, & cum ex tactu pus sentiretur, constabat intus latere abscessum iam maturum. Chirurgus accitus incisionem in moribunda tentare non fuit ausus. At die vno atque altero subsequente, famula obiit die 4. Ianuar. anno 1592. & facta post mortem incisione inuentus est lobus hepatis supra stomachum ascendisse, totius hepatis membrana illæsa, quæ hepar continebat: sed ea incisa, tota substantia hepatis corrupta & purulenta, vomica instar, vndique effluxit in capacitatem ventris cum tanto putore, ut quis diu apud cadauer iam sectum permanere non posset. Quæ quidem hepatis vomica causam mortis præbuit.

Gg iij

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Cum hic lobus hepatis supra stomachum affecisset, & tumorem exterius rotundum effecisset, medicus aliquis, quantumvis doctus, ex loco affecto iudicasset ex rotunditate supra ventriculum existente, apostema in ipso ventriculo extitisse, nullo apparente tumore in hypochondrio dextro. Attamen hepate toto suppurato, propter magnitudinem abscessus, lobus ventriculum comprehensens ed ascenderat, quamvis non in ventriculo, sed in hepate abscessus repertus est, ut sectio post mortem indicauit. Ideo diligenter hæc consideranda, ne in simili casu quis fallatur, non obstante quod inflammatio seu apostema hepatis eodem fere modo curatur, ut ventriculi: nam vnumquodque apostema eorundem, tum abscessus, propria quædam remedia sibi que familiaria habent: de quibus satis nunc dictum est. Et facile quoque distinguitur iis notis, de quibus superius diximus: ita & inflammatio, seu apostema ventriculi. De quibus egimus lib. 18. de ventriculi affect.

OBSERVATIO XII.

De hepatis insigni dolore, ex materia crassa, ventosa, intra membranam hepatis & eius substantiam collecta, ut metus quoque de apostemate est.

Erardus Nannius Alemarianus, ceruissarum baiulus (nam cum tenuis fortuna esset, victus querendi gratia dolia ceruissaria deportabat, aliqui de nobili stemmate Zuslenorum oriundus) mense Augusto, anno 1546. in insignem hepatis dolorem ex materia flatulenta lapsus est; ita, ut de apostemate metus foret; quamquam se pleuritide existimabat affectum. Ad quem ingressus, statim ob insignem dolorem sanguinem ex vena basilica in cubito dextro detrudere iussi, sanguine circiter uncias octo educto, cum aluum per se satis mollem haberet. Die vero sequenti, cum dolor ex integro non cesserat, ventosas cum scarificatione natibus admoui, ad diuersionem. Deinde cum semel hoc epithemate locum dolentem fouisset, miraculi instar omnis dolor euauit, qui ex inflammatione erat: ita, ut non opus fuerit purgatione. Et præter spem statim conualuit. Forus seu epithema tale erat. ℞. flor. melil. flor. ros. rub. folior. absinthij, viol. ana m. j. sem. anisi fenug. lini, ana z iij. cocta in aqua communi (quia pauper erat) ex his parabatur forus, loco dolente etiam inuncto. ℞. olei ros. olei amygd. amar. olei de spica, absinthij, ana z iij. misce. Interea tamen hoc decocto vtens, sanus factus est. ℞. sumariæ, agrimonie, cassiæ, cichorij cum toto, borag. bugloss. scabiose, feniculi cum toto, ana m. j. rad. liquir. z b. flor. chamæmill. p. j. sem. feniculi z iij. cicerum rub. z j. inubar. sebesten. ana num. v. hordei mund. p. j. fiat decoctio in aqua communi, pro lib. i b. dulcoretur sacch. bis in die ex eo sumebat. At alteri mulieri dolenti ex hepate, cum apostemate frigido, re, præcedentibus vniuersalibus remediis, quarto die sacculus hic admotus, prius coctus in vino & expressus, illico dolorem sedauit. ℞. absinth. chamæd. an. m. ij. flor. chamæm. man. iij. flor. ros. m. j. schenanthi m. b. sem. lini, anisi, carui, an. z iij. santali albi & rubri, an. z i b. fiat sacculus. Nocte rursus dolore ascendente, eidem lateri iterum appositus sacculus; & idem dolor sedatus est: at cum haberet maiorem dolorem anhelitus quam prius, & expueret materiam crudam, locus inunctus est

dialthæa, & pro oppilatione hepatis descriptum, quod sequitur. ℞. pul. arioni. z i b. dialthææ z j. pul. diacapp. z b. sacch. ad duplum pondus, fiat tragea, de qua sumens quotidie, & bis in die inungens cum dialthæa, septimo die fuit curata, cum sudore magno, & quasi continuo.

SCHOLIA.

Tunicam tantum velantem jecur, præcipue dolere quidam autumant: cum oppilatione tumet membrum, spiritu intus incluso, aut abscessu duro, cum obcalluerit, aut phlegmone, ex lapsu ex alto, vel incussu hepar dolet, ut prius diximus. At extensius dolor, ut hic, a ventositate fit, vel vapore, vel humore multum flatuoso. Inflatum a. jecur ex cibis, qui in secunda digestionis flatum parant, ventositate in hepate retenta, vel ex crassis humoribus genita. Et dolor fortis est; vel ab apostemate, tunc adest febris: vel si fiat a ventositate, tunc sine febre est: nam febris si accedat, ventositatem sæpe resoluit. Ventositati proprium est, augeri & minui, mutari & interpolari: nec adest grauitas, sed potius tensio, & in gibbo extenditur ad pectus & dorsum: in cauo ad ventrem & intestina: & mutabilis est dolor, nec color corporis aut faciei, ut in apostemate mutatur. Hic autem in victus genere quicquid frigidum, ventosum est, damnatur: paludes ob eam causam vitandæ ac niuosa loca. Quæcunque ad inflationes ventriculi conferunt, hic transponenda. Valent diacyminum, diagalanga, pilulo aromaticæ dictæ. Milium ex fotu iuuat. Si vna cum ventositate adsint vapores, vel humores crassi, materia minoranda, digerenda, eradicanda, diuertenda clysteribus & aliis generibus diuersorum: vitæ aperiendæ, ut ventositates exeant, & resoluendæ simul hepar roborando: & accidentia corrigenda, & vitæ regimen imperandum. De quibus vide Arculanum, qui huius doloris ventosi curationem proprio capite persecutus est.

OBSERVATIO XIII.

De scirrhus hepatis.

Vit quidam Delphensis tumorem scirrhus diuturnum patiebatur in gibba parte hepatis, qui & tactu deprehendebatur, cum gracile & adipis expers esset abdomen; idque facilius erecto, vel in dextrum latus inclinato agro, quam decumbente supino: tum quippe non nisi pressu animaduerti poterat. Situ quoque & figura jecoris circumscribatur: cui etiam agro facilis decubitus dexter, sinister vero grauis erat, cum moles quædam velut suffocans in ventriculum & præcordia inuaderet. Hic autem tumor ex contumaci & inueterata obstructione paulatim originem ceperat. Ab ea quidem Fernellius semper fieri vult, raro, vel potius nunquam, ex inflammatione originem trahere, quod in viscere natura calido & humido omnis inflammatio in perniciosum abscessum desinat. Fit tamen aliquando ab inflammatione, ut alij volunt, imo sæpius, ut doctissimus quoque Iacchius recenset: quemadmodum & nos præter hunc virum in alijs, & in nosocomio Delphensi præcipue, obseruauimus: vidimus quoque mulierem ex hydrope mortuam, post mortem a me incisam totum hepar scirrhi modo induratum habuisse: de qua obseruatione sequenti agemus. Recte quidem &

& auctores post inflammationem hepatis de scirrhus agunt: quamquam etiam & ab initio statim gigni posse, absque præcedente phlegmone, contendunt, vel paulatim collecto in viscere excremento crasso dum nutritur, vel à liene ed transmissio: quod sane vtrumque fieri videmus quotidie: sed & Galen. in lib. de morbi temporibus ait sensim & latenter incipere. Post multum tempus sentiri, uti & in agro contigit. Ideo hic scirrhus, ut Fernellius ostendebat, à simplici tumore distat: quod non nisi longo dierum numero, simplex vero tumor etiam breui procreetur. Humorem dicit auctorem esse obstructionis, qui primum tenues iecoris venas implens & infarciens, aut usque in omuem visceris substantiam redundat, & eam perinde atque venas obstruit: quod si rursus multo plenior cumuletur, iecur in amplam molem distendit: tumque viscus turgidum ac tumens apparet. Tempore humor siccefcit, & vi caloris parte dissipata: reliquis totus obdurefcit: cuius permistione iecoris substantia labefactatur: versusque tandem scirrhus emergit. Secundum eundem, modo fit ab humore pituitoso, ut huic nostro agro, modo à bilioso. Illum causæ antecesserunt, quæ crassum pituitosumque succum coaceruant, hunc vero, quæ biliosum; in illo dominantis pituitæ, refrigeratiue iecoris, in hoc bilis exsuperantis, concalfactiue iecoris, signa illucunt: hic vero ictero succedit, & lentam febrem comitem habet: ille nequaquam: hic vnus in eum hydropem præcipitat: qui ascites appellatur: ille citra vllum incommodi genus diu persistit, aut duntaxat cachexiam leucophlegmatiam, ve infert. Cum igitur hic scirrhus ab humore pituitoso, & refrigerato hepate, originem haberet (nam & hic victu crasso pituitoso vsus erat, & subinde aquam biberat, cum pauper esset) ut hunc recte curarem, victum talem institui: quo in obstructionibus liberandis vtitur. Ideo cibos faciles concoctu adhibuimus, & qui incisoriæ vim & repurgantem complecterentur, crassa, viscosa edulia, & omnia dulcia, hepatis nocentissima vitauimus. Materiam crassam pituitosam minoraui: hoc medicamento. ℞. syrup. ex infus. ros. cum agar. z j b. diaphœnici z iij. aque feniculi, cassiæ an. z j. aque cichorij z b. misce. Detur in diluculo: ter, quaterve excreuit aluum. Deinde ad humoris crassi & visceri præparationem, sequenti decocto vel huic simili vsi sumus. ℞. rad. graminis, petros. asparagi, feniculi, macerat. in aceto. an. z j. rad. althææ z b. marrubij, ceterach. cassiæ, capill. vener. agrimonie, scolopend. an. m. j. sem. anisi, fenic. an. z j b. folior. sene z vij. agarici femin. albi leuis z j. xinzib. albi d i. ruar. passul. z j. ficum ping. num. v. fiat decoct. in aqua communi pro lib. j b. colaturæ adde syrup. de byzantiis. acetosi compos. de eupator. an. z j. misce. deinde purgaui hoc pharmaco sequenti. ℞. agarici femin. albi leuis z j. rhabarb. select. z b. xinzib. albi d b. schenanthi, spica, an. gran. v. infunde per noctem, facta prius leui ebull. in z v. decoct. supra scriptæ, mane fortis, expressioni adde diaphœnici z b. syrup. de eupator. z j. misce. Detur in diluculo: quo aluum optime excreuit. Interea inunximus hepar oleis amygd. dulc. lilior. chamæmill. & masticino simul mixtis. Sed quia non febricitauit: sanguinem non detraxi, ut Amatus fecit in Marci librij Veneti sororio, qui scirrhum iecoris habebat: vna cum febre. Vide totam eius historiam cent. 3. curat. 48. Post purgationem & olea dicta, hoc linimento regionem hepatis inunximus. ℞. emplastrum de melilior. de mucill. cerati nostri de ammoniaco, an. z b. vnguenti samol. z iij. pul. ros. absinthij. ana

z j b. olei absinthij z j b. fiat linimentum; aceto immixto ad ignem. Catapotia etiam confecimus ex ammoniaco, puluer. hieræ pictæ; vel quæ hoc modo fiunt. ℞. agarici z j. myrris, stirac. an. z b. spica celica, schenanthi, cinnamomi an. d b. excipiantur terebinthina: & fiant pilule v. ex z b. vel z j. dentur mane in exitulesti. Rursus dabam decocta magis incidentia & vrinam cientia: adiect. rad. irid. bisulmæ & semin. alkekengi, etiam passul. & dactilis. Alij deinde dant pilulas de sagapeno, vel fœtidas. Dedi autem pilulam vnam ex ammoniaco: & postea fotus conuenientes, in hunc vel similem modum. ℞. rad. alth. z iij. rad. irid. sambuci an. z j. stor. cham. meliloti, sambuci, ana p. j. q. asinthij, man. j. spica vrinæque, & azari, ana z iij. fiat decoct. in aqua intestinorum, pauco adiecto vino, quia pauper erat. Deinde redibam ad vñctiones, cataplasmata, ex ammoniaco, bdellio, & alijs conuenientibus. Quibus remediis hic bene habuit: quamvis ex hoc tumore scirrhus in totum sanus non euaserit. Cum & Galen. ad Glauco. c. 5. se scirrhum diuturnum nunquam sanasse, nec alium vidisse qui id potuerit: quæ de causa nonnulli consulunt, ut ad balneas eant, quibus vniuersa Italia ornatur. Vidi tamen Elideum Paduanum, medicum Bononensem, præceptoræ meum, medicum nosocomij Vitæ dicti, curasse scirrhum hepatis, nunc temporis à Baptista medico haud vulgari tanquam incurabilem iudicatum, exhibendo intermissis diebus modo rhabarb. potionem, modo pilulas de ammoniaco: interea etiam faciendo vñctiones, & cataplasmata loco affecto apponendo, ex ammoniaco, bdellio, & similibus, & exhibens hepar lupinum. Quibus remediis ille æger sanatus fuit. Post vniuersalia, tali electuario ad oppilationem hepatis commodè utebatur. ℞. rhab. selecti z j b. hepatis lupi præpar. diarod. abb. an. z j. cum oxym. q. s. fiat electuarium. At vnice his profunt ea, quæ partim aluum subducunt, partim vrinam mouent. Quibus egregie facit confectio ex amygd. & cnico: de qua Galen. 5. de sanitate tuenda meminit. Oportet autem cnicum contundere, & sic componere. Iacchius medicus doctissimus, scribit se feliciter vsum extrinsecus mollientibus, & intrinsecus portione salis aquæ, habet enim vim extergentem & extenuatam plurimam. Itaque alteri scopo satisfacit curâdis cirrhi, nempe vacuationi. Vfus etiam sum, inquit, portione ammoniaci, hoc modo: ammoniacum cum rutæ dimidio in pilulas confirmatum propinabam pondere drachmæ vnius vel scrupulorum quatuor. Habet enim vim emolliendi, & leuiter extergendi & exsiccandi. Iuuat vero & trochisc. de rhab. vsus & alia medicamenta aperientia egregie, & vrinam cientia, de quibus dictum est, cum de obstructione ageremus. Vide eundem cap. de obstruct. hepatis. Ad vrinam priuatim, inquit, sum vsus portione dictamini & asari. Extrinsecus adhibebimus ea medicamenta, quæ ad ventriculi scirrhus valent: qualia sunt illa, quæ ex bdellio, ammoniaco parantur ex meliloro & cefypo. Hæc enim in cerati formam redacta apponuntur; habent vtramque intentionem, molliendi nimirum & siccandi: quod quamvis ferius faciant; quam quæ solum siccant & acris sunt, id tamen tutius faciunt: ideo præzeligenda.

SCHOLIA.

Hæc duo viscera: iecur & lien, sunt oppor- tunissima ad scirrhum, ut Gal. docet 13. method. c. 15. & 16. in quo Attalum Thessalum me-

dicum Sorani discipulum reprehendit, quum Theagenem Cynicum interficeret, cum solis relaxantibus topicis vteretur. Quod minime faciendum est semper. In hepate quidem, cum limoso sanguine nutriatur, in splene, quod humorem recipiat crassum, & in renibus, quia sanguine spisso nutriuntur. Alibi tamen dicit Galen. splenem subtiliori sanguine nutiri solet. Vide Amatium, qui hoc dubium soluit *scholio centur. 3. curat. 48.* Duplex quoque scirrhi est differentia, *vi 2. de arte curat. ad Glaucon.* quarum una exquisitus dicitur scirrhus, tumor sensu priuatus, durusque, altera, non exquisitus. Qui omnino non insensibilis est, *vi patet etiam 14. method. medend.* Estque hic affectus morbus in quantitate, secundo intemperies, quoniam frigidus affectus: & tertio, in soluta continuitate. Quantum ad partem laesam, hepar hic affectum est, quod ex tumore duro quidem existente, cum exiguo aut nullo dolore, & interdum sensu priuato cognoscitur: quandoque non omnino insensibili. Duplex eius generatio, vel ab initio ex influxu humoris; sed rarius, vel quod frequentius, si sensim acervatur in venis: vel facta per mutationem ex erysipellate aut phlegmone, ob multam & intempertiam refrigerationem, quod frequentius cernit ait Galen. *2. ad Glaucon. cap. 5. nempe ex humore crasso, frigido, pituitoso, vel atrabiliario, aut ex his simul mixtis, ut liquet 4. Method.* Si ex nigra bile, color totius corporis ad nigrum declinabit, si ex crassa lentaque pituita, ad albidum, vel plumbi colorem. Scirrhi vero exquisiti, in iecinore sine sensu persistentes: omnino insanabiles sunt, ut in ceteris partibus, teste Gal. *14. Method. & 2. de arte cur. ad Glaucon.* quamquam neque is qui difficulter sentitur facile curationem admittat, eodem auctore: quamvis ab initio sapientius ipsum curauerit: sed ad plures dies extentum, neque ipse sanare potuit: neque alium vidit qui posset. Nam omnibus iis, qui ita affecti sunt, ex necessitate subsequitur aqua intercus. Pereunt autem quam plurimi in tempore longo: quidam etiam breui, qui ventris profluvio laborant. Curatio perficitur vicissim, teste Gal. *2. ad Glaucon.* nunc humidis mollientibus: nunc siccantibus. Si nimium calfaciamus & exsiccemus, indissolubiles, & ideo insanabiles, & similes lapidibus reddimus: si nimium molliamus vel humectemus, hepar dissoluemus: ideo emollientibus adiungenda, quae digerendi vim habeant, & parum contrahant, ne vis hepatis labatur. Vide de his, & Gal. & Aetium, corpore prius euacuato & humoribus crassis, vel atrabiliariis, tum iis vtemur quae per vrinam deducunt materiam, de quibus vide Rondeletium. Exterius iis vtemur quae constant ex absinthij coma, mastiche, nardino, ac lentiscino vng. adiaciendo thymiana, & bdellium, medullam anseris, & alia topica tam apud Galen. quam Aetium & Paulum descripta. Vide & formulas ad hunc effectum aptas cap. proprio apud Rondeletium & Altmarium.

OBSERVATIO XIV.

De hepatis scirrhi in hydropem lethalem mutato.

Mulier Alcmariæ grauida, etiam hydropem laborans: paucis diebus tumore scirrholoso hepatis praecedente ad me venit consultandi causa: cum diu hoc malo laborasset: quare curationem irritam fore iudicabam: quamvis ad solamen quaedam remedia paratu facilia, sed frustra praescriberem, quae tamen cum parandi tempus adesset,

felicititer peperit prolem: At decimo quarto die à partu obiit. Ventre autem matris post partum non detumescere: licet à partu utcumque purgetur: tamen illam morituram praediximus: & ita 14. die à partu è vita migravit. Mortuae autem corpus incidendum curauimus, eo quod obstetrix certo affirmabat secundum adhuc partum, ob ventris molem, in vtero harere, cum ego eandem ex scirrho hepatis, quem hydrops subsequutus esset, mortem incurrisse pronuntiabam: quod & incisione mox indicaret. Incisione itaque peracta, praesente obstetrice, cum aliis nonnullis, integra cupa, qua mulieres pannum lauant, aquae citrinae è ventre fluxit, plus quam viginti heminas effluxisse coniectabam. Omētum vero erat plane absumptum, & glandulae mesenterij induratae: hepar vero non solum in scirrhum mutatum: sed in lapideam quasi duritiem conuersum: nam sparsim in ipsa substantia hepatis fabae instar lapilli concreuerant. Vterus bene se habebat: unde diuino quodam miraculo, & Dei providentia, factus in vtero ad maturitatem iusto tempore parienti est seruatus: neque secundus partus inuentus, ut obstetrix existimabat, adeo anatomiae ignara: ut tentandi causa vesicam pro vtero eidem ostenderemus, ut vterum, quamuis loquax satis, à vesica distinguere non potuerit: quae haecenus diu artem obstetricandi: pro dolor, exercuerat, & in ea etiam consenuerat.

SCHOLIA.

Icitur autem, vel vnam aliquam eius partem indurari frequentius accidit: imo aliquando lapillis durioribus quasi concrecere cernitur. Meminit e. Dodonaeus, medicus doctissimus, se nonnullorum, qui ab ictero in ascitem delapsi erant, iecinora vidisse adeo dura & lapillis vndique plena, ut nouacula perferendi non potuerint. Simile narrat & Andreas Vesalius, in epistola de China ad Ioachimum Roelants de quodam Belloarmato Senensi, cuius icterus profusus candicans, superficiei constabat non leui: sed admodum inaequali, & lenibus tuberculis exasperata, anterior vero eius pars & vniuersa sinistra, ad modum lapidis indurata. Refert quoque Antonius Beniuenius, quod in muliere nobili, quae ex dolore circa iecinoris partes diu afflicta erat, & tandem mortua, post corporis incisionem inuenti fuerint in iecinoris membrana parte decliuore congesti lapilli: figura & colore diuersi: alij enim rotundi, alij angulares, quadrati alij, prout positura & casus effecerat: maculis etiam rubeis, caeruleis albisque distincti. Hi sua grauitate, ex tunica sacculum longitudine palmi, latitudine vero duorum digitorum effecerant. Hanc autem nos mortis causam (inquit) arbitrati, disputare de obscuris vanum & inutile iudicauimus. At in vesica fellicis, ut alias diximus, & etiam cap. 94. ab eodem Beniuenio, dictum est: subinde lapides reperiri contingit, verum laxiorem reddi membranam iecinoris, atque in ea calculos dependere, ex rarissimis est. Sed quod in hac nostra muliere inuenimus glandulas mesenterij induratas & pancreas similiter, id quoque adeo rarum non est. Scribit enim Rondeletius cap. 35. de hepatis scirrhi sub finem. Id annotatione dignum est, quod ex frequenti corporum dissectione obseruauimus, omnes hydropicos, vel scirrholos, glandulas mesenterij induratas habere, & pancreas similiter. Quare non erit inutile (ut idem admonet) totum ventrem oleis tingere, vel vnguentis, totumque ventrem fouere.

OBSER-

OBSERVATIO XV.

De ictero.

IACOBY quidam Alcmarianus, annum 27. agens, crapulae deditus utcumque, alioqui biliosus, anno 1548. sub finem mensis Februarii, nulla praecedente febre: neque alio morbo, totus palluit, & auriginosus factus est. Quod simplici ictero hic laboraret, qui ex obstructione meatuum ad bilis cystim pertinentium fiebat, facile percepimus: nam repente hominem adoriebatur, sine febre, ac sine magna corporis ac virium iactura, cum & deiectiones huic albidae essent: eo quod bilis illa in intestina cohiberetur: unde & vrinae admodum crassae, atque adeo rubicundae, ut prope nigrescerent, inerat & dextro hypochondrio grauitatis sensus: sine conspicuo tumore. Haec cum animaduertenterem, è vena basilica secta in manu dextra (cum in brachio non esset consuetum, nec facile admitteret) moderato extracto sanguine, non tamen multo, cum sanguis frænum bilis existat, mandavi, ut diebus sequentibus bis in die ex hoc decocto sumeret. *℞. corticum radic. cicborij, feniculi, petroselin. ana 3 j. rad. brusci, asparagi, ana 3 ss. cassiae, agrimoniae, marrubij, an. m. ij. betonicae, mellissae ana man. j. sem. anisi, carui, feniculi, aneos ana 3 j. semm. quatuor frig. maior. an. 3 ss. cicerum rub. 3 ss. schœnaanthi 3 ss. coquantur in lb i ss. colatura, adde syr. de byzantijs 3 j ss. mellis ros. colati, (erat enim obstructio ex humoribus viscosis crassis, cum cholera vitellina crassa admixta) syr. de cicbor. cum rhab. an. 3 j. misce, & fiat apozema.* Cæterum cum icterus fiat ex obstructione, ob vesicæ fellicis oppilationem: ideoque in eo duo potissimum requirantur remedia, ut venæ sectio & purgatio vehementior: post præparationem & humorum extenuationem, sequentem purgationem exhibuimus. *℞. rhubarb. selett. 3 j. spicae, schœnaanthi, an. gran. iij. infunde per horas 12. in aqua lupuli, feniculi an. 3 ij. fortiter exprimantur. Adde electuarij de succo ros. 3 iij ss. diaphram. lenium 3 j ss. agerici trochiscari in puluerem redacti 3 ss. syr. de cicbor. Nicolij 3 ss. misce. Fiat potio: quae exhibita fuit in aurora, & habuit sex sedes, cum magno leuamine. Verum cum adhuc doleret ex grauitate in hypochondrio dextro, versus stomachum: fotu sequenti adhibito dolor euauit. *℞. flor. chamemill. meliori summorum absinthij, maluae, cum toto an. m. j. sem. anisi, fenugr. sem. lini an. 3 iij. coquantur in aqua communi: & fiat solus.* Sedato dolore, & per purgationem egregie aluo soluta, ablata causa, mox ab ictero liber euasit. Vide Amatium de Perotij à Monte Sancto filio, annos 10. nato, qui tres vncias syr. ros. solutiui tantum sumpsit, cum aqua cicborij: & ab icteritia liberatus fuit.*

SCHOLIA.

Si excrementa in hepate non rite, vel omnino non separentur, symptomata quaedam inducunt: ita ut per totum corpus cum sanguine diffuso bilis flaua, non omnino, vel non rite, segregetur ac purgetur: qui quidem affectus, proprie icterus dicitur: licet etiam varia sortiatur nomina. Dicitur a. *ictipos* à Græcis, teste Galeno, lib. de diff. feb. & 3. de causis, quem affectum Latini quandoque icterum, quandoque Auriginosum nominant, à colore auri, quem bilis per totum corpus diffusa representat. Verum cur Græci af-

fectum hunc *ictipos* nuncupent, *Aet. declarat cap. 17. lib. 10.* Est enim *ictipos*, inquit ille, à similitudine ad animalculum, quod *ictis*, id est, viuerra appellatur. Est autem viuerra animalculum illud quo cuniculos excludunt venatores, vulgo *een/ret* dicitur; quod licet corruptum sit, aliquo modo ad Latinum nomen Viueræ accedit. Alij volunt illud animalculum esse mustellam syluestrem, quæ auricolores oculos habet. Celsus autem hunc affectum etiam Arquatium vocat, ab arcu cœlesti, eo quod eius colorem imitetur: ita & ab auro Auriginem quoque vocant. Idem quoque interdum & morbum Regium appellat, ut liquet c. 24. lib. 3. Hinc cecinit Serenus:

Regius est vero signatus nomine morbus:
Molliter hic quoniam celsa curatur in aula.

Hoc idem Celsus testatur, eumque regium vocari morbum, quia lasciuus, cantu, delitiis, mulla, vita soluta, curis, in aula curetur. Vulgus medicorum icteritiam nuncupat. Alij & icterum dictum volunt ab aue Galbulo dicta latine: quod aureo sit colore hæc auis. Insequitur vero accedens semper causam præter naturam proximam, hoc est, fusionem bilis per cutis exiguos poros: quæ cum incipit, apparet maxime in illis partibus corporis, quæ sunt vehementer albæ, ut oculi, mox in vniuerso detegitur. Huiusmodi rursus fusionis causa interna aliqua prior est, seu proprie causa sit effundens, seu velut occasio. Quæ autem sint eiusmodi effusionis causæ, ex Gal. habetur 5. de loc. affect. 7. cum breuiter, tam ex Gal. 3. de causis symptomat. & 5. de loc. affect. & ex Aetio & Paulo. constet ex triplici causa provenire: vel vitio particulari, quæ excrementum ipsum expurgat, vel vitio ipsiusmet excrementi, & ideo in morbo regio non perpetuo idem locus affectus est, neque icterus semper afficitur, ut à Gal. demonstratur 5. de loc. affect. nam modo icterus afficitur, modo vesica bilis, modo vniuersum corpus. Ita in hoc nostro agro potius vesica bilis afficiebatur: quod cognouimus ex istis signis, quia citra febrilem morbum regius hominem occuparat, cum dextra præcordiorum partis grauitate, & excrementis albis excurrentibus, & vrinis biliosissimis, & assatim excretis: quæ omnia vesicæ bilis vitio talem morbum regium fieri indicabant. Verum & illud bifariam fieri potest, vel ob eius imbecillitatem, propterea quod biliosum humorem, sicuti consuevit, in se ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit: vel etiam contingit eandem nimis repleti, ut propter repletionis multitudinem idem excrementum expelli ad intestina nequeat, excretice simul facultate existente imbecilla. Poterit & secundo morbus regius fieri vitio viarum ex ipsa vesica ortarum, utpote cum ipsæ obstructæ fuerint viæ, per quas ex iecinore ad ipsam vesicam biliosum excrementum trahitur, vel ex per quas ab eadem vesica ad intestina propellitur: quippe omnibus prædictis modis non expurgatur à bile sanguis, & in totum corpus diffunditur, ac morbus arquatius efficitur. Ex viarum vitio fit, cum propter earum obstructionem fieri contingit. Ex imbecillitate vero separatricis facultatis, si eadem vesica bilis in attrahendo, seu excrendo prædictum succum, propter aliquam intemperiem fuerit debilis. Namque fellis folliculum, cum inter naturalia instrumenta connumeretur, vnicum habet, veluti reliqua, imbecillitatis principium, à partis intemperie ortum, ut eodem 5. de loc. affect. in fine. Gal. visum est. Atquæ

Atqui interstinguens, si ob meatuum ipsius obstru-
ctionem fiat morbus regius, ut in hoc nostro agro
evenit: namque una cum albis excrementis: gra-
uitatis cuiusdam sanus dextrum hypochondrium
urgetur, citra febrim. At si propter eius imbecil-
litatem fiat, talia excrementa circa gravitatem
deiciuntur. Vtriusque tamen statim urinae bilio-
sissimæ affatim excreantur, ut inquit Paulus. Et
ita hic post venæ sectionem humores vias illas
obstruentes, eduliis, potionibus, ac pharmacis at-
tenuavimus, & obturationes deopplavimus, ex
præcepto Gal. 5. de loc. affect. & præcipue pur-
gavimus, iuxta Aetium, auctoritate Ruffi, non
in principio: sed prius materia attenuata, & va-
sis referatis, alioqui medici, qui bilem expur-
gant antequam sit extenuata, nec vasis referatis,
maximi mali auctores sunt. Quæ autem attenuent
& vias aperiant: & ictericis utilia sint, de iis
vide Aetium & Paulum. Cæterum, si ab hepate,
vel à toto malum oriatur, id exemplis infra scri-
ptis patebit: cum & eorumdem affectuum diver-
sa etiam curatio iuxta causas varias sit instituenda:
ut exemplo nunc de ictero, ex calore iecoris
una cum febre orto docebimus: & postea de iis,
qui ex alia causa oriuntur, sumus acturi.

OBSERVATIO XVI.

De ictero ex calore hepatis, ac eiusdem visceris, levi in-
flammatione una cum febre duplici tertiana.

Cum in Zuytlandiam, pagum ultra Mosam
situm, ita dictum, ad quandam mulierem ac-
citus essem, anno 1568. cui febricitanti una die
per Empiricum perperam sanguinis detractio
tum purgatio adhibita fuerant: plusquam vige-
sies hæc ipsa alium deposuit: ita ut viribus pro-
stratis animam agere videretur: quæ tamen à me
curata fuit. Verum in iisdem adibus laborabat
eiusdem maritus non diu post duplici tertiana,
corpore etiam flavo tincto colore: ad quem prius
decimo die huius mali accitus fui, qui primum
octavo die venam sibi secari fecerat, & suomet
consilio seipsum foliis senæ purgaverat: cumque
semper petus haberet, decimo die me prius voca-
vit. Aderat tunc dolor quidem in hypochondrio
dextro: sed vix effatu dignus: quamvis in eodem
loco sentiebatur calor intensus. Antequam in fe-
brem incidere, etiam quandam gravitatem in
eodem loco senserat: & ex parte etiam pallidus
aut flavus evaserat, quamquam nunc multo ma-
gis: ita ut prius obstructione hepatis laboraverit:
nam ex ea etiam solet morbus regius originem
ducere: & nunc sine febre permanent ægri (ut
Galen. testatur lib. 9. de compos. med.) nec non & gra-
vitas quædam in eadem dextra parte præcordio-
rum adest: præsertim inter vehementer res-
pirandum, & ea signa adsunt, quæ de obstru-
ctione hepatis prius scripta sunt: quamvis non
solum ex obstructione iecoris: sed & scirrhus eius-
dem morbus regius fieri potest: signis scirrhi tunc
præcedentibus, vel præsentibus. Obstructio ita-
que hepatis, facile etiam calor accessit, bile per
loca consuetanone expurgata: nam ex sola calida
intemperie eiusdem visceris: cum multa copia
bilis progignatur: quæ multitudine expurgari ne-
quit, eadem per totum corpus diffusa, propter
eiusdem excrementi copiam, icterus excitatur,
ut à fellis folliculo vix recipi possit: tunc plerum-
que absque febre in dextro hypochondrio feruor
circa iecoris locum percipitur: alui excrementa
bile perfusa videntur, urinae crassæ, crocæ, pro-

funduntur, segnities, spirandique difficultas con-
currit, tum potissimum perceptibilis cum moue-
tur: nam si icteritia ex copia bilis fiat, ab intem-
perie calida iecoris facta, meatusque ad follicu-
lum fellis pertinentes aperti sunt: alui excremen-
ta tunc biliosa erunt, eo quod portio bilis pro-
fundatur in alvum, & tunc vix febricitat æger.
Sed non diu post successit febris duplex tertiana,
satis valida, ita ut & iecoris inflammatio post
obstructionem & caliditatem hepatis subsequita
fuerit: cum & ipse regius morbus interdum ex
inflammatione iecoris oriatur: propter quam
sanguis omnino à bile expurgari nequit: imo una
cum sanguine bilis per totum corpus defertur, &
hinc morbus regius generatur, propterea quod
& eiusdem bilis copia ob eandem causam in e-
dem viscere gignitur, & consipatio quædam fit,
seu angustia locorum, per quos ipsa bilis ex ve-
nis transfertur ad canales vesicæ bilem recipien-
tes: ut Galenus inquit comment. aphor. lib. 6. lib. 4.
Cuius quidem morbi regij indicia sunt: præ-
cordiorum dextra parte dolor, biliosa deiectiones,
& febris, ut inquit Paulus. Namque ij om-
nino febricitant, Galeno teste 9. de compos. medic.
secundum locos. Similiter & hic flava bile vehemen-
ter colorata videbuntur. Quæ quidem signa cum
nunc in hoc agro adessent, & iam per decem dies
febricitasset, & sanguinem octavo prius die emi-
ssisset, ab ulteriori sectione venæ abstinendum
duximus: quamvis & hic etiam in parte dextra
capitis nonnihil doleret, quod ex inflammatione
& calore hepatis bile sursum allata (licet toto cor-
pore flavo existente, non per modum crisis, ut aliquando
etiam fieri solet, ut suo loco dicemus) fiebat. Unde cum
intemperie calida adesset & febris, etiam intem-
periem illam sanare instituvimus victu & medica-
mentis: quæ causam huius mali, tum inflamma-
tionem, tum intemperiem calidam, tum febrem
respicere. Et quia bilis abundantia aderat, tam
ex intemperie & causis dictis: quam ex febre du-
plici tertiana (quæ omnia bilem abundare con-
testabantur) ideo non solum bilis erat purganda:
sed & ipsa intemperies alteranda. Quare ad ex-
tinguendum calorem, tum febrem ipsam, hoc
iuleb. præscripsimus. ℞. Symp. de endivia, de limoni-
bus, de cichorea cum rhubar. ana ʒj. aquæ end. acetosæ,
fumariæ, ana ʒij. fiat iuleb. pro tribus dosibus.
Deinde ita cum purgavi. ℞. electuar. de succo ros.
ʒij. electuar. lenitiv. diaphœnici ana ʒj. rhubar. se-
lectiss. ʒ. ʒ. spica grana quinque Symp. de cich. cum
rhab. ʒ. ʒ. aquæ cichorij ʒij. fiat haustus: quo mul-
ta biliosa deiecit, etiam choleram vitellinam.
Deinde & diarod. abb. in tabulis exhibuimus, &
hepar inunximus vinum ros. & sancti dino simul mix-
tis. Et quia non dormiebat, ob febrem, & circa
partem dextram capitis dolebat, ea parte tempo-
ra inunximus, etiam frontem sub noctem, cum
vin. populeo, cui parum olei nymphaeæ & pap. immixtum
esset. Postea 14. die egregie sudavit, & à febre li-
beratus est, & icteritia eundem reliquit.

SCHOLIA.

ICteri causas nunc ex parte indicavimus: sed
qua arte coniecturi sumus quæ causa affligat:
nunc exemplo ostendimus de iecore: nam si le-
vis suspicio huius mali adsit in iecore, à quo ob-
structio, inflammatio, vel scirrhus eveniat: cau-
sam ipsius facile inveniemus. Si adsit obstructio,
albicans canum instar excrementa, urina est fla-
va, viscosusque præcedens aptus fuit gignendis ob-
structionibus. Anger & notitia struenda corporis

ris: quoniam scimus angustas habere venas, &
facile his capi solere. Si vero obstructio absit,
considerabimus num causa aliqua bilem abunda-
re fecerit: nempe iecoris intemperies, vel aliæ
externæ. Sic enim causa nota erit: bilis abun-
dantia, si acutus & biliosus morbus præcessit, cau-
sa patet, scilicet natura excernens: si enim ex co-
pia bilis fiat, ab intemperie iecoris facta, mea-
tusque ad folliculum fellis pertinentes aperti sunt
alui excrementa tunc quidem biliosa erunt, eo
quod portio bilis profundatur in alvum, & vix
febricitat æger. Quod si nullum horum addit, con-
cludimus debilitatem fellis vesicæ esse. Num ve-
ro peccet vesica attractione, vel pulsione, conii-
ciatur hoc modo: quoniam si pulsione peccat, diu
detinetur, & crerulea evadit: ut id etiam Iac-
chinus sæpe vidit in vesica fellis lapillos eius co-
loris, quod & nos ipsi sæpe vidimus: exurit enim
tempore retenta. Num vero pulso repletionem ni-
mia impediatur, vel debilitate, inde ostenditur,
quod quæ à repletionem est, multa simul deicitur,
& malum statim cessat: at ubi debilitas est, diu
durat, & forte non cessat: sicut & ubi attractio
debilitatur. Sic quoque, ut doctè annotavit Fer-
nelius, cystis fellis occupant obstructio, calcu-
lus, repletio, inanitio. Obstructio autem eius est
ductus, quo bilis è iecore prolicitur, aut eius quo
è cysti in intestina eructatur. In utraque alius
durius est, pigriorque: faeces albicant, urina fla-
va, crassaque adeo sunt, ut sæpe nigrescant: bi-
lis cum sanguine in summum corpus effusa ictero
cutem deturpat. In priore tamen cystis proflus
exhausta est: in posteriori illa bilis copia disten-
ditur, variisque exsuperantia symptomatis pre-
mitur. Calculus in cysti fellis plerumque concre-
cit niger, sed tamen levis, & qui aqua immerfus
innatat, neque ita ut ille qui à renibus aut vesica
evellitur, subsidet in imo. Origo illi est à flava
bile, quæ proprio conceptaculo diutius coarctata
nec tempestive vacuata, nec novæ bilis influxu
revocata, mirum in modum obdurefcit. Id autem
in primis accidit, cum uterque cystis ductus ob-
struitur. Huius quidem neque manifestæ sunt ne-
tæ, neque gravia symptomata, quibus certo ac
facile detegi potest. At suspectus iis esse debet,
quibus gravis & diuturnus fuit icterus. Decepi-
tus quidam senex, in iram mire propensus, post
decessum sine felle ac sine cysti inuentus: in cu-
ius sede calculus ingens concreverat. Quin etiam
post diuturnum icterum oborto alui profluvio,
huius naturæ innumeros calculos instar pili aut
hordei in plerisque exturbati (inquit Fernel.) de-
prehendimus. Nos quoque vesicam felleam in
corpore inciso post mortem; lapillis plurimis vi-
rescentibus subflavis, & nigris, ad flavedinem &
viriditatem tendentibus, repletam conspeximus.
Sic non desunt alij qui testati sunt, in folliculo
fellis inter resectiones calculum innatum fuisse
eiusdem cum felle coloris, quod in boue frequen-
tissimum fuisse asserunt, ut Bened. Ius medicus Vero-
nensis testatur. Ita & Ioannes Langius epistola 57.
lib. 2. inquit. Nec tantum in renibus & vesica:
sed in fellis folliculo bilis quoque, hepatis adu-
sione, in lapidem concrevit: in quo, dissecto
Frederici Ducis Saxonie, Cæsaris Romani Ele-
ctoris corpore, tres iuxta molis lapides reperti tra-
duntur. Neoburgi ad Danubium cum virgo Ve-
stalis continuis sub hypochondrio dextro tormi-
nibus affligeretur, & medici nec causam tam diu-
turni doloris reddere, nec opem ferre possent,
defunctæ corpus Illustrissimus Princeps Otten-
richus Comes Palatinus dissectare iussit: In quo

cætera viscera præter hepar illa fuisse: de quo
folliculus fellis pondere lapidis inclusi pendulus,
in substratum intestinum procubuerat, quod mi-
rum in offenso fellis viro, motu attriuerat. In
muliere Diamantes vocata (ut refert Beniventus)
vixit, in tunica fellis, atrii coloris, & magnitu-
dine castaneæ aridæ inuentus est: & alij in pan-
niculo, quo contegitur hepar: unde etiam veluti
in folliculo penduli sacculum effecerant. Solent
autem isti aliquando luteo colore pallere, nausea
& cibi fastidio laborare: & diutina aduersa va-
letudine frui. Bilis porro in propria cysti non-
nunquam tantopere exsuperat: ut hanc ingen-
tem distendat magnitudinem, ac tunc sane in-
festa est gravitatis pondere, pressu ac suffocatio-
ne, ractu, ardore, siti, iracundia, & si quando
forte computrescat, febribus intermittentibus.
Hinc igitur gravissima mala prodeunt, nec certe
leviora, cum affatim ea prorumpit. Cystis enim
quum proflus exinanivit, omnemque bilem suam
foras eructat, aut biliosus vomitiones, aut cho-
leram morbum, aut diarrhoeam, aut dysenteriam,
aut alia his finitima symptomata concitat. Non
pauci è viuis erepti sunt: in quibus non alia inte-
ritus causa comparuit, quam quod folliculus bile
omnino esset exhaustus. Sed icterus qui ex obstru-
ctione meatuum ad bilis cystim pertinentium fit,
repente (ut diximus) hominem adurit, sine fe-
bre, & magna corporis aut virium iactura. At ob
iecoris inflammationem, totum quoque corpus
biliosis excrementis perfunditur, propter magnam
sanguinis incendium, urinae & alui excrementa
flava bile colorata sunt, febris cõcurrit vehemens
varia faciei color mutatur, sitiunt ægri, & in ie-
coris regione sensum gravitatis percipiunt:
quemadmodum evenit Macthildæ Adriani, Del-
phis in duplici Cruce habitanti, acutissima feb.
ictero cum inflammatione iecoris ad necem vs-
que laboranti, satis vetula, ad quam post tres se-
ptimanas prius ingressus eam, Deo iuvante, cum
magna laude curavi. Fit etiam icterus per crisi-
in indicationibus febrium biliosarum, ut exem-
plis ostendimus in lib. nostris de febribus, etiam
fit ex venenata qualitate sanguinem corrumpen-
te: sed de his postea suo loco, nunc aliud exem-
plum proferamus.

OBSERVATIO XVII.

De muliere ileo malo correpta, & in icterum incidente;
& curata.

Potest aliquando icteritia fieri per communi-
tatem ab intestinis, dum ipsa intestina sunt op-
pilata, ut in colico dolore & ileo, in quo casu bi-
lis in intestinis retenta ascendit ad stomachum per
resolutiones intestinorum, & fit ardor in ventri-
culo, & corruptio digestionis, vertigo, & simi-
lia: uti nuper evenit mulierij ex ilei dolore in icte-
rum incidenti: quæ cum ingenti dolore torque-
retur, & simul ictero affecta esset, clystere inie-
cto statim melius habuit. Deinde adhibitis reme-
diis deopplantibus & ventositatem carminanti-
bus quæ etiam ad icterum facerent, admodum
breui per nos fuit curata.

SCHOLIA.

ARculanus medicus insignis, cum varias cau-
sas icteritiae recenseret, tandem adiungit
icteritiam fieri per communitatem ab intestinis,
quando obstruitur extremitas meatus cystis fel-
lis

OBSERVATIO XVIII.

De febre acuta, post septimum diem cum icteritia cessante.

lis ad ieiunum intestinum, propter phlegmata, quæ sunt in ipsis intestinis obturantia orificium dicti meatus: vel dum ipsa intestina sunt oppilata, ut in colico dolore, & ileo. Et licet secundum eundem, in duplici meatu possit fieri oppilatio, ex qua icterus oriatur: nempe in illo, per quem folliculus fellis attrahit bilem ad hepar, aut in illo per quem expellit ad fundum stomachi vel ad intestina: tamen cholera etiam crassa, replens intestina, potest esse causa: cur cholera existens in cysti non veniat ad intestina, quamvis meatus sit apertus: & in hoc casu aliquando cholera retenta in intestinis, ascendit ad stomachum, & fit ardor & nausea in stomacho, & symptomata iam prædicta, & in his casibus non habens descensum per intestina, reuertitur ad hepar: & postea spargitur cum sanguine per totum corpus, & est causa icteritiae. Hoc autem fit valde raro: & non nisi sopita expulsiva, vel destructa, & sopito aut destructo intestinum sensu, vel etiam destructa operatione villorum latitudinalium ipsorum intestinum, quod aliquando accidit propter nimiam ipsorum extensionem: unde colica est causa icteritiae, & antecedit eam, & aliquando icteritia antecedit colicam: quando propter oppilationem, aut aliam causam cholera retenta non venit ad intestina, ad stimulum expulsivam, & laudandum intestina. Et pendunt ambæ, scilicet icteritia & colica, ob eadem causam communi, ut puta ab oppilatione pori fellis, venientis ad intestina. Habetis & alia plurima apud eundem Arculanum de causis & signis icteritiae: quem perlegere poteritis. Est tamen dubitatio de eo: quod dicimus, icteritiam fieri cum doloribus circa ventrem: quod etiam fatetur Auicenna cum dicit colicam cum ea iungi. Et nos sæpe vidimus in praxi ad colicum dolorem succedere icteritiam & subsequi colicam ad icteritiam. E ratio dicitur id fieri posse: quoniam causa obstruens potest etiam dolores ventrosos facere, si in aliam partem transmutatur. At Hipp. 5. aph. vi. aph. ait: Qui icterico morbo tenentur, non valde flatuosi sunt. Exponit Gal. quoniam bilis materia non est generationi flatuum apta. Gignuntur ergo solum flatus à calore debili. At aliter aphorismus exponit Iacchinus, & magis ad veritatem, quæ observatur experientia: quod verum est ex parte materiae biliosa status non fieri: sed non ex parte pituitosa, quæ obstruit. Si ergo icteritia solum sit sine alio affectu obstructionis, tunc flatus non fient; si cum obstructione, tum solum: cum est à crassis & viscidis & frigidis humoribus, quod sæpe contingit. Dubitatur secundo, pro curiosis verborum Gal. Nam si vis expultrix alienorum, vesicæ tribuitur: ergo & sensus quo percipiat, quod quantitate, vel qualitate est onerosum: ergo & nervis participat. At contrarium huius dicitur 3. de facult. c. 2. quod nullis nervis participat. Falsum vero hoc est, & contrarium his quæ 5. de usu par. 9. dicuntur. Vetus interpretis prorsus affectus legit: sed causam non reddit, cur dicatur. Unde manifestum est, quod nervis participat. Sic ergo legitur litera: nec tamen id similiter se habet in vesica iecinoris, hoc est, non sentimus ipsam gravari quanto, vel quali bilis. Unde manifestum, quod exiguis admodum nervis participat, i. quod habet exiguum sensum: ergo exiguos nervos, quod etiam de visu partium fatetur Galenus.

Mulier quædam Alcmariana, vidua, sapius icteritia obnoxia fuerat. Hæc cum acute febricitaret, & tertianam continuam haberet, post septimum diem tota palluit, & icterica evasit: & à febre, bile per crisin ad partes exteriores elata, liberata est. Quæ deinde cum nullâ sentiret gravitatem, tensionem aut dolorem, in hypochondrio dextro, manumque huic loco admovens, cum perciperem neque tumorem, neque duritiem aliquam subsistere, atque viderem alui excrementa esse naturalia, incolore iecur: iudicavi bilem effusam per totum corpus, cutemque colore aureo defordatam per modum crisis: ideo & à febre per illam expulsionem liberatâ fuisse. Quæ etiam mox sudore euocato per cutem, paucis remediis ab ictero convaluit.

SCHOLIA.

Recte scribunt medici, icterum quoque per crisin posse fieri: quod quidem vitium febrientis agro, repente ac cumulatum superueniens, febrem si finierit crisin testatur: materia ex alto foras prorumpente, prorupte nimirum ad cutem bilioso humore, ratione bonæ indicationis, ut ex Paulo & Galeno liquet: qui morbus regius, & excrementi vitio quoque generationem habet: eo si quidem crassiore existente potius quam multo: nam si tenuis eadem fuisset bilis, utique & in eadem crisi foras propulsata fuisset. Id quoque confirmabunt alui excrementa, & vrina, quoniam utraque secundum naturam se habebunt, & ob eam causam nullum visceris affectum declarabunt. Fit itaque ex infusione bilis, quæ per indicationem fit in febribus, ut etiam aliquibus exemplis ostendimus in libro nostro de febribus, de quibus Hipp. meminit 4. aphor. 62. & 64. Malum, inquit, est ante diem 7. icterum evenire in febribus: at die 7. & his, qui deinceps bonum est. Subiungit, nisi dextrum illum obdurnerit, hoc est, nisi morbus eveniat occasione affectuum, qui omnes communi ratione morbum regium faciunt, eo quod obstruunt, ut Galen. ait, meatus fellis: sunt autem hi, ut diximus, vel illi meatus, quibus ex iecinore ipsa vesica attrahit bilem, vel quibus ex vesica truditur bilis ad intestina. Per duritiem ergo Hippocrates intellexit omnem affectum tumoris, seu phlegmone sit, seu scirrhus. Sæpe autem icterus fit ob aliquem affectum iecinoris: obstructionem nempe, inflammationem, vel scirrhum, ut scribit Galenus, quorum affectuum, cum nullus adfuerit, alteram causam adesse constat, naturam videlicet, morbos curantem; nempe quæ ex crisi fit. Significat ergo hæc sententia Hippocr. tunc laudari debere regium morbum, cum sola naturæ pulsione fit: & hæc est crisis, quam dicit etiam non semper laudabilem esse, sed solum à die septima, Cuius causam Galen. scribit. Quoniam, inquit, ante septimam diem non potest bilis efferri per viam crisis in cutem: itaque necessario accidet ob aliquem iecinoris affectum, inquit Galenus, qui tres sunt: obstructio, inflammatio, scirrhus. Hæc quoque ad signa prognostica pertinent: nam symptomata in qualitate mutata, in signis non est. 12. Method. Nihil ergo lethale significat, nec curam exigunt, nisi ob fecditatem, à qua provenit. Curam exigunt: ut inflammatio venosi generis, ut

ve scirrhus, ut obstructio, ut vesicæ infirmitas. Interea tamen, si pulsione naturæ fiat, distinguunt Hippoc. & Gal. signo iam dicto, quod ante septimam non laudatur: sed post septimam, non necessarium, quia tunc etiam ex affectu iecinoris potest provenire, qui etiam ultra septimam persistere posset, & mox bilis operationem operari. Intellegitur hic bona crisis, tempestive & legitime facta: alias crisis erat symptomatice dicta, quæ ante septimam evenire potest, quale erit malum, vel quia malam crisin significabit ante coctionem, vel malum iecinoris, aut vesicæ bilis affectum. Anteceptum tamen huius terminus videtur, cum & ante septimum salutaris aliquando fuerit, ut nos ex Hippoc. de Epidem. ostendimus, lib. 3. de febr. Scholio Observat. 10. Sic etiam apud Hollerium cap. 37. de morbo regio, anno 1545. quidam sexto factus ictericus, commota aluo biliosa deiecit, vrinis nigris & multo felle tinctis: febris expers iam ambulabat, quasi omnino liberatus, 14. recidiva, 17. obiit. Aliis duobus idem accidit. Quidam admodum robustus, ante septimum ictericus factus, ægerzime, & cum recidiva, evasit. Anno 1549. mense Aprilis & Maio (quo fere tempore Lutetia febre tertiana exoritur) multis aureæ vrinae, & morbus regius primis diebus. Cuidam nobili ita affecto detrahitur sanguis ter ad octo fere vascula iteratis vicibus. Sanguis totus & spuma & consistentia flavus. Vifus est convaluisse 17. recidiva, alui profluviu, bilis crassa & meracior, singultus Iecus, 21. obiit. Laboraverat aliquando lue venerea. Multo quoque in Epidemiis ante septimam evasisse legimus: In Coacis salutare esse icterum 7. 9. 11. 14. Si induretur, ambiguum. Galenus de rat. vict. in morb. acutis, in biliosa febre ante septimum ictero cum rigore vel horrore solui voluit: si vero absque rigore, & non capiti, lethale. Vbi criticum icterum, sine tumore, aut inflammatione hepatis, & excretionem consequentem, horrores vel rigores nomine intellexisse videtur. Plura de his vide apud Altimarium, cap. proprio de ictero: & Amatium supra historiam illam, centur. 3. civat. 40. in quibus locis ad longum hæc res tractatur. Quod ad reliqua signa prognostica attinet, etiam & hæc adiungere possemus: Morbo regio laborantibus (secundum Hippocr. aphor. 42. lib. 6.) si fiat hepar durum, malum: nam & icteritia, quæ à lapide, & quæ à scirrhus, incurabilis: quidam ferunt & carnem & verrucam in meatibus increvisse: Sed & Celsus, auctoritate Dioclis, testatur, quod si morbus regius post febrem oria- tur, ex toto proderit, si post hunc febris, occidet. Icteritia si fuerit diuturna, periculum hydropis minatur, potissimum si vrina etiam diu fuerit aquosa: tunc equidem obstructio magna à visceris frigidityte provenit. At malum quoque est, prostratum appetitum esse & ægrum vigiliis molestari, delirioque affici, sermonemque cum labore formare. Hamorrhoides vero in hoc morbo fluere bonum. Periculis quoque obnoxius est homo, si icteritia confirmata labore, & non curetur, neque materia expellatur: subito enim tandem cor aliaue aliqua nobilis pars opprimetur. Vrina innatans, quid simile orobi grano, malum, & vrina alba, parum tincta, vide de his Arculan. & Auicenn. sed crocea & tincta magis, salutem denuntiat. Turgidus venter in regio morbo malus, & valde tumescens lethalis magna ex parte, & secundum Gradum infectio crocea per transennam commissuræ capitis anterioris, lethalis, hepate inflammato. Icteritia etiam sine febre, iuxta Valesc. in senibus pinguibus, raro aut

Per. Forest. Tom. 2.

numquam curatur, ut ipse sæpe expertus, materia crassa viscosa existente. Citrina magna ex parte velocius curatur nigra, & citius generatur ac terminator. Citrina frequentis crisis sunt signa & aggritudinum hepatis, nigra splenis, sed de nigra latius suo loco, quibus si hæmorrhoides fluxerint, præcipue in nigra bonum. Sed & splene nigra magis diuturna quam quæ à iecore: licet & hæc à iecore quandoque fieri posset: de quibus vide Arculanum, & etiam de viridi, cum triplicem icteritiam faciat: quoniam lien nunquam progignat icterum flavum. Quantum vero ad curationis rationem spectat, si icterici fiant ratione bonæ indicationis (de quibus nunc agemus) facile hi curantur (Galenus teste 9. de compositione medicamentorum secundum locos, & Actio cap. 10. lib. 10.) ex aquarum potabilium balneis, ac olei disculteriori affricione, & omnibus cutem rarefacientibus, quale est anethinum oleum & chamæmelinum, irinum & amaracinum. Similiter, (ut inquit Actius) rosmarinus herba, oleo incocta, ipsum plurimum disculorium facit. Cum his præterea vitæ adhibendus est humidior, qui humorum crassitudinem moderate attenuare possit, ut eodem Galenorum est 5. de loc. affect. & Actio præclaro loco. Quoniam idem Galen. eodem loco præcepit taliter laborantibus, ut aqua, suapte natura calida, & cui discutiendi vis esset, vterentur: ex his namque quidam bonam valetudinem consequutus fuit, ut ipse inquit. Interea crisis cholerae ad cutem non est impedienda, sed potius adiuvanda affectu rerum citrarum (ut Arculanus inbet) & induendo vestes citrinas, & cum educatione per poros cutis, cum frictione, balneo, & sudorem euocantibus.

OBSERVATIO XIX.

De ictero absque febre, sola purgatione & nodulo in ceruicis dependente & expresso & ceruicis ebibita curato.

Nobilis matrona Kerckwerua, non febricitans, & bene valens, toto corpore croceo facta 17. Sept. die, anno 1587. consilij causa me adiit, cum subito ictero correpta esset, & excrementa alba & duriora essent. His duobus remediis miraculi instar statim convaluit: 26. syr. ex infus. res. pallidar. cum folijs senæ 3 i s. diacab. 3 ij. aqua agrimonie 3 ij. misce. detur in diluculo. Aluum egregie deposuit. Mox quotidie ceruicis bibens, expresso nodulo infrascripto, in ceruicis dependente, convaluit: 26. marrubij exsiccati m. j. rhab. optimi incisi 3 iij. schenambij incisi gran. v. croci orientalis gran. iij. spec. diacabod. abb. 3 j. fiat nodulus filo astrictus. Ita Margareta Teylingia, cognata nostra, ex solo decocto foliorum buxi in sero lactis, sine aliis remediis ab ictero curata fuit.

SCHOLIA.

Scribit Dios. succum marrubij è folijs confusus expressum, & sole coactum, cum vino & melle illitum, oculorum claritatem adiuuare, naribus regium morbum expurgare. Memini anno 1559. mulierem nobilem vetulam de Auizact, in Hagha-Comitis ex ictero laborantem, ex oppilatione cystis fellis, admodum diuturno, multis remediis adhibitis & purgationibus, & attenuantibus, & decoctis, per medicos doctissimos, non potuisse curari: cui continuum usum syrupi & succo folio marrubij confecti, cum zaccaro, admodum commendassim: quo cum die vltima esset, ab omni

H h flauedine

ffaciedine icteri, qua per duos annos & ultra afflicta esset, curata fuit: ita, ut illum syr. pro curando ictero semper in summo honore habuerim. Sic quoque exsiccata herba in nodulo egregie profuit. Laudatur & apud Aëtium cremor absinthij, & succi cichorij cyathi bini aut terni per se aut cum vino poti, & verbenacæ rectæ aut oxalydis decocti. Sanguinem hic non detrahimus; mulier enim pituitosa erat, & catarrhis sapissime obnoxia. Sed hic videndum, ob auctorum verba admodum varia, num venæ sectione in hoc malo sit utendum? In lib. de purgationibus vi, sic scribit Gal. Si, inquit, morbo regio laborantibus sanguinem miseris, extremam in perniciem ages. Hoc etiam argumento utitur in lib. de atra bile, ad monstrandum medicamentum proprium humorem trahere. Alias, inquit, idem esset ac venam secare. Cur ergo nullus in his venam secare est ausus? Contra hanc sententiam est communis schola. Nam Aëtius, Duo maxima, inquit, sunt remedia, venæ sectio & purgatio. Sed venæ sectio, si sanguis abundet, adhibetur. Sic etiam Auic. Respondetur, Ictericia secundum se sanguinem mitti non possit, id est, si nulla eius causa addit, sed solus affectus mutati coloris, & causa quæ est morbus, scilicet bilis fusio. Hic enim bilis redundantia est: ergo purgatione opus est: hac iuueris; venæ sectione nihil iuueris. Contra vacuantur omnes humores, & 8. melib. secant venam in vitiosi succi abundantia. Respondeo, hæc est sequestrata a sanguine: secundo hæc fixa est, non mobilis per venæ sectionem: quare vacuabis sanguinem depuratum. At ubi addit causa antecedens, à qua continens fouetur, tunc distinguendum est. Nam si ex copia eius in venis, corpus cacochymum erit. Stultum ergo fuerit venam secare, quod ad eam copiam attinet. Si vero copia hæc habet adhuc causam, ut intemperiem, non secabis; at si sit à phlegmone, eius gratia. Si vero copia sit, quia non expurgatur, tunc distingueas, quod non expurgatur ob imbecillitatem; quare tunc sanguinem frustra mittes: aut non expurgatur obstructione, quæ si à crassitie & lentis, & sanguis abundet; secato venam: si à scirrhus, vel lapidibus non secabis. Viso in quibus sanguis mittendus, nunc reliquam curationem explorare oportet. Hæc vero primo vertitur ad causam, ut Auic. recte inquit: postea ad iam factum morbum. Si ergo causa fuit naturæ impetus (ut fuit in obs. 17. precedente) in crisi, nihil nobis erit negotij circa causam, sed solum circa affectum derelictum: quæ erit generalis cura. Si vero ex bilis abundantia, vel ex intemperie, purgare bile corpus oportet, & intemperiem sanare. Purgatio ex diaphran. sol. de succo rosarum. Intemperiem sanare supra docuimus, victu & medicamentis. Si sit ex calida intemperie, sine materia, tantum alterabimus, ut recte apud Arculanum & Gradum inuenies; alioqui si vna adsit materia, digeremus, euacuabimus, & malam intemperiem remouebimus. Formulas medicamentorum videas apud eundem. Si ex immodico calore partium solidarum fiat, utemur cibis humidis, auctore Paulo, & medioriter refrigerantibus pitiana scilicet, in tybo, feri, cichorio, piscibusque, & vino tenui aquoso, frictione, exercitio moderato, balneis, ex aqua potabili tepida. Sed prius distinguere oportet, num ex vniuerso corpore bilis procreata sit; tunc enim neque dolor aderit, neque grauitas circa ilia, nec febris. Idque tamen bifariam esse potest, vel propter solidarum partium calorem immodicum, vel ratione alimenti, quod ipsis distribuitur. Ex utraque tamen causa propter excrementi multitudinem icterus oritur, quoniam

cum expurgari nequit, vna cum sanguine per totum corpus defertur. Vna a. ab altera causa distinguetur, interrogatione facta eorum, quæ præcesserunt. Nam si multo tempore calidioribus cibis ac potibus usus fuerit æger, ciborum vitio tribuenda erit occasio. Vbi vero hæc non præcesserint, ex calida vniuersi corporis intemperie morbum regium excitari, audacter censeto. Eadem ratione, si ex alimento partibus distributo fiet. Fieri a. etiam potest ex veneno, vel aliqua causa externa, citra febrem, sanguine in bilem exagitato, propter corruptionem aliquam peregrinam, ortam ex noxij medicamenti portione, aut venenatarum bestiarum morfu, Aëtio & Paulorestibus, quod & exemplo probat Gal. 5. de loc. aff. cuiusdam imperialis serui, qui viperarum venationi deputatus erat: cum à vipera morsus erat, huic vniuersi corporis color fuit mutatus, adeo ut porri colorem referret: ex quibus causis si fiat, interrogatione astantium & ægri facile cognoscitur. Si igitur ex veneno sit, propria curatio veneni exigitur. Gal. Theriacen propinquit. Morfu venenosorum intendatur, trahendo venenum exterius, ut culo gallinæ viuientis, & aliis, & emplastris, ut Arcul. iubet. Et partes tueantur frigidi & styptici, aqua ros. aceto & succis infrigidantibus. propriis, debita adhibita strictione, & denur bezoartica propria: & caliditas ac sicciitas superflua, impressa per venena remoueantur. Si intus venenum sit assumptum, adhibeatur vomitus, & secessus, & detur proprium remedium, si cognoscatur, frangaturque eorum acuitas propriis præditiis; & membra nobilia tueantur, & extingatur membrorum & humorum superflua caliditas. Idem iudicium esto de aliis causis primitiis; & remoueantur causæ corporeæ, tum febres, si adfuerint. Si causa obstructio sit, ea remouenda: quare à venæ sectione humores parabimus, ut scribitur in lib. de vi purgantium, & 1. de natura humana. Hoc a. fit amouendo qualitatem, quæ obstruunt, lentorem scilicet & crassitiam; quod fit dissecantibus, & extenuantibus. Signum a. egregium, quod soluta obstructio sit, est facies tingi, vrinam vero reddi melioris coloris: quod aliquando fieri sensim videbitis; confertim aliquando, ut in hac nostra Kerckweruina euenit, in matrona de Auizet valde sensim. Quæ a. sint deobstruentia, supra abunde diximus: acida, acria, amara, quibus utemur in cibis & potionibus, quoad possumus; interim & acribus, uti clysmatis: post ea conducent ea, quæ crassam bilem & pituitam purgant: in quibus diaphanicon maius esse censetur, & elect. de succo ros. pilulæ aur. cum turbit. & aggregatiuz. in fine & rhab. infusio. Rusticis Iacchinus succum cyclaminis radice propinat ad 3 ij. cum vino albo, post horas duas in stupham ducit, quæ & cutis tincturam per sudores purgat; qui etiam crocei visuntur in strigili. Si vero ex imbecillitate vesicæ fellæ sit causa, primum corpus purgabimus, sæpe enim, ubi non adeo crassa est, sola purgatione & meatuum aperture tollitur. Mox victus ratione conuenienti, & potione, quæ intemperiem sanat, curabimus: similiter & extrinsecus admotis. Cum n. icterici sit annexa vesica fellæ, vix fieri potest ut imbecilla fiat, quin icterus vna patiatur: quare cura eius erit cura icterici. Post hæc ad iam factum malum descendemus, hoc est, bilem ipsam per summam cutem fusam vacuabimus. Id vero fit omnib. quæ ipsam in vaporem soluunt, extenuando, & aperiendo poros, per quos debet expurgari. Optime itaque hic conducunt, quæ cutem rarefaciunt & sudorem cient, ut balnea dulcis aquæ, & frictiones, ex chamamelo.

chamamelo, & eius potio (ante balneum) ex vino vel aqua mulla. Vide balneum conueniens apud Rondeletium, & errhina purgantia bilem, si in oculis & facie perseueret affectus. Aëtius anagalidid succo vititur, nos etiam betæ, vel cyclamini, aut melanthio cum aceto. Acetum vero acerrimum, si naribus attrahat æger in folio desidens, contineatque etiam pressis naribus paulisper, mirifice conducit, Paulo auctore. Addam adhuc exemplum de ictero ex obstructione jecinoris.

OBSERVATIO XX.

De ictero cum obstructione jecinoris.

Barthilda Verlania, mulier me hercle proba, vxor Bartholomæi Teylingij, sororij mei, anno 1551. mense Aprili, in ictere dolebat, sine febre, potissimum in hypochondrio dextro, qui dolor totum diaphragma occupabat, & ad ventriculum usque perueniebat: ideo ad vomitum proclius erat: sed nulla aut pauca euomebat: aluus retinebatur, albedine oculorum bile suffusa: & deinde tota crocea euasit. Lotium tanquam croco in eo infuso spectabatur. Dolor etiam ventriculum cum ructibus & ventositatibus infestabat. Ex signis supradictis, cum ad tactum doleret, imo sine tactu, in hypochondrio dextro, dolore satis vehementi, cum grauitate, obstructionem in hepate esse cognoui; ex qua etiam icteritia orta est. Et quia aluus strictior erat, & ructus in ventriculo aderant: illico clysterem iniiciendum proponebam, sed illa abhorrente, ex glande satis acuta (ex hiera, melle, sale, & diaphran.) subdita, difficulter, & tantum semel, aluum deposuit. Cum morosa esset, & omnia medicamenta respueret, post aluum solutum glande, licet libentius potionem purgatoriam dedissem, ad subleuandum tamen dolorem, hoc totu coacti fuimus uti, cum & vna cum obstructione status admixti videbantur: 2℥. flor. chamem. meliloti, summatum anethi an. m. j. sem. anethi 3 ij. sem. feniculi 3 ij. sem. anisi, fenug. an. 3 ij. coquantur in aqua communi, pro fotu, & bibebat hanc potionem: 2℥. flor. anethi, chamem. scabios. an. m. j. sem. anethi 3 i. sem. feniculi, anisi an. 3 j. coquantur in ceruicia communi. Ructus emittebat quidem ea potione; sed dolor non mitigabatur: quamuis & locus dolens oleo chamem. anethino simul mixtis inungeretur. Quo neque dolor cessabat, nisi fotu postea. Et tunc admixti medicamenta, & primo præscripti hunc bolum: 2℥. cass. recens trachea, diacathol. an. 3 ℥. pul. cinnamomi electi 3 ℥. pul. avom. ros. sine musco. 3 ij. pul. sem. dauci 3 ij. fiat bolus, quibus aluum deposuit. Hypochondria oblinebat sequenti vngu. 2℥. dialthæ 3 j. olei lilior. absinthij an. 3 ij. misce, & bibebat decocti artemisiæ 3 iij. cymini parum pul. incosti ad ructus emittendos & ventositates. Verum dolor nondum ex toto mitigatus est; sed magis increbuit: ideo vti sumus vesica fomentis impleta, & adhibita loco affecto, & faculo ex iisdem rebus imposito, & emplastris ex rad. althææ flor. meliloti, chamem. absinth. decoctis adiectis, mucag. lini, fenug. & oleo lilior. suprainditiis, omnibus istis nihil iuuantibus. Quare purgationem quoque adhibuimus: 2℥. diacathol. 3 ℥. elect. de succo ros. hiera picæ simplicis diaphran. an. 3 j. trochisc. de rhab. 3 i. 3 ℥. agar. trochisc. 3 ℥. aque feniculi, bugloss. absinthij an. 3 j. misce: sumpsit in aurora; & copiose eduxit pituitam. Et tribus magnis ventosis sub stomacho & hypochondrio dextro apposis, dolor incantamenti instar sedabatur. Remanente adhuc grauitate in hypochondrio dextro, sed leui; &

dolore iterum, sed non tam graui, subinde redeunte; ad obstructionem tollendam & icterum, hoc decocto vtetur: 2℥. marrubij viridis, cichorij cum toto, dentis leonis cum toto, agrimonie, feniculi, cassia, hyssopi, capill. ven. fumar. an. m. j. absinthij vtriusque borag. an. p. j. quinque rad. aperitiu. an. 3 ℥. rad. liquor. 3 iij. sem. feniculi 3 ij. sem. 4. frig. maior. an. 3 ℥. vuar. pass. ab arill. repurg. p. j. fiat decoct. in aqua communi, pro 1℔ ij. addendo syr. de quinque rad. 3 i. 3 ℥. syr. acetosi compos. syr. de cieborea cum rhab. an. 3 j. misce. in eodem decocto hic globulus pendebat, filo adstricto, quem exprimebat dum potionem mane hora vj. & meridie hora quarta biberet: 2℥. rhab. selecti 3 i. 3 ℥. agarici trochisc. 3 ℥. spice scbenanbi an. 3 v. croci orient. 3 m. alb. an. 3 iij. crassius contusa in nodulo ligentur. Et deinde iterum accepit superiorem purgationem in aurora: quæ cum iterum copiose eduxisset pituitam & bilem vitellinam, ab omni dolore liberata est: & corpore exterius magis bile perfuso recte habuit. Interea post medicamenti operationem sumpsit ius pulli ad reicias abstergendas, & excreuit denuo biliosa. Pro roboratione jecoris sumebat ex tabulis diarrhod. abb. & tandem ab obstructione hepatis, tum ictero, Dei ope, sanata est; cum astantes ob insignem dolorem, quo prius detinebatur, illam pro deplorata habuissent.

SCHOLIA.

Videbatur hic obstructio esse in concaua hepatis parte, cum ictero; cum ad vomitum proclius esset, licet non vomeret, tamen dolor ad ventriculum ascendebat, neque febricitabat, ut filius illius Berosij doctoris apud Amatam centur. 4. curat. 83. annos natus quinque, cui & jecur dolebat, & in eius oculorum albo ictericia percipiebatur; cuius lotium eius coloris erat, ac si multum croci in aqua infusum esset, non nisi ad nigredinem vergens; & stercus album conspiciebatur: cum quibus ventriculus infestus erat, & ad vomitum proclius; ita ut puer ea, quæ comederat, sæpe euomeret: si ea tamen retinebat, in putidos ructus, caliditatem extraneam arguentes, incurrebat. Cum quibus omnibus puer hic aliquantulum febricitabat, quæ omnia icterici concauas partes obstructas esse declarabant. Ideo pro victu pitisanam cum sem. melonis paratam dedit, aut amyg. cremorem, jusculum pulli; & pro potu hordei decoctum. Et hunc syr. exhibuit stomacho ieiuno: 2℥. syr. de end. lupul. ana 3 ℥. aq. end. cichor. lupul. an. 3 j. misce, & icterici hoc emplastrum apposuit: 2℥. far. bord. ros. rub. an. p. i. 3 ℥. absinthij lupinorum chamem. an. p. j. scbenanbi 3 ij. croci 3 j. olei ros. chamem. an. 3 i. 3 ℥. cum decoct. chamem. & ros. fiat emplastrum, quo breui optime valuit; adeo ut sexto die epoto pharmaco ex rhab. cum manna, sanitatem integram obtinuerit, stomacho quoque inuncto linimento infrascripto: 2℥. olei coron. 3 j. ros. 3 ℥. cera parum, ad ignem sui inguentum. At nostra ægra validiora requirebat remedia, cum simul pituita cum bile vitellina eam magis affligeret sine febre.

OBSERVATIO XXI.

De ictero ex oppilatione meatus cystis seu pori fellæ, tendentis ad intestina, unde ingens colicus dolor sequitur, cum fecum induratione.

Mulier Alcmariana, quæ in platea Diuæ Annæ habitabat, annos viginti septem nata, cum Hb ij peperit.

SCHOLIA.

AB utroque viscere etiam attum posse euenire icterum, diximus. Et quia hæc matrona quartana laborauerat, tam ex liene, vel potius vitio totius euenisse potuit hic icterus, quam etiam vitio hepatis, cum & in hypochondrio dextro magis doleret. Cum autem morbus regius ater ex intemperie jecoris aliquando euenire possit, sine liene affecto, tunc corporis minus atro colore tingitur: nam si à solo liene, totius corporis admodum niger erit color. Verum hic & lien afficiebatur, ob quartanam præcedentem. At ubi utrisque simul visceribus laborantibus contingit, hanc icteritiam nonnulli viridem appellare solent, cum ad viriditatem color inclinet subinde, iuxta Auicem, tum Arculanum, qui eundem sequitur: & vocatur icteritia viridis, ex participatione icteritiæ citrinæ & nigre: ut etiam istis diebus vidimus in puella, quæ tanto pallore conspiciebatur, ut viridis appareret. Verum ubi icteritia nigra vna cum citrina iungitur: & ab utroque viscere tum bile flaua ac atra fit, si adlit repletio totius, vel secundum hepar, vel secundum lienem, vena secunda erit utriusque cubiti interna, vel in manu, ut alij volunt, modo de vna, modo de alia, alternis diebus; & pro ratione redundantia alterius bilis, ac magnitudine affectus alterius visceris, maior ex vno quam ex altero cubito quantitas sanguinis exhauiatur: quamquam semper eadem vena sectio moderata esse debet. Sed in hac matrona, quia diu laborauerat quartana, cui in principio vena secta fuerat, venam nunc non secumus, neque huic puellæ laboranti viridi ictero, in cubito aut manu venam secumus, sed potius in talo, cum menses restricti essent, cui etiam dedimus à venæ sectione infusum rhab. cum decocto senæ. Deinde, ex mente Hollerij, cum eiusmodi virginibus talis scdus color oboriatur, dabimus purgationem, ex hieæ picæ & i. b. cum aqua alkekengi, cassiæ, end. & oxy-meliræ, vel hieam picam cum rhab. & agar. trochise. Vide eundem. Verum sicuti hic victus ratio communis esse debet utrique visceri conduens: ita & purgatio utrumque succum aspiciens dari debet, eisdem succis prius præparatis sive de succo fumar. cicborij, oxym. cum aqua borag. lupul. end. & cassiæ. Deinde purgandum cum infuso rhabarb. senæ, epith. vel diacath. & diasenæ. A purgatione utriusque visceri consulendum, magis autem aut minus vni, vel alteri, prout vnus visceris affectus, vel alter magis vrgebit: nunquam tamen altero neglecto. Quod etiam de emplastris, linimentis, vnguentis, fotibus, intelligendum est, tam roborantibus intus vel extra admotis, utrique visceri conuenientibus, simul mixtis, modo vni, modo alteri magis conuenientibus. Absoluto itaque ictero, nunc progrediamur ad alia symptomata, nempe cachexiam & hydropem, licet utrique visceri quandoque cõmunia, sed præcipue hepatis, cum sine hepate affecto non contingant; quamuis ab aliis membris etiam incipere possint, sed non absque hepatis consensu, cum hepar sanguificationis organum (ut iam sape dictum est) existat.

OBSERVATIO XXIV.

De cachexia.

Vir quidam Alcmarianus, annos quadraginta excedens, in autumno post febrem erra-

ticam crura habebat valde inflata: quæ quidem inflatio à pedibus incipiebat & tibiis: mox & femora, deinde & totum quasi corpus, tum faciem ipsam, & palpebras ac labia & gingiuas, occupauit, quæ omnia ad albedinem declinabant: ita ut totius corporis moles augetetur, & simul ad colorem album declinaret: & tandem testes quoque inflarentur. Hunc vero præ manibus habebat empiricus: qui cum curare eum non posset, tandem aliqui ex amicis me ad ægrum deduxerunt. Cum vero animaduertenter huius corpus non aliter inflatum esse quam pastam fermentatam (quemadmodum Serapio medicus ille antiquus dicebat) in qua digiti impressi manebant; hunc cachexia correptum esse intellexi. Cui, cum natus esset, & non diues, iussi ut continua portione absinthij in ceruisia communi decocti vteretur, egregie enim prodest: & ut hæc simplicia, nempe hyssopum, saluam, absinthium, inuam arbuticam, agrimoniam, cassutam, marubium, ceterach, & rad. ebulli, iueos in vino decoqueret, & ut alium purgaret cum i. b. diaphoretici: mox dialacca, diacorumma, & rheriaca vteretur, sed & hoc decocto prius præscripto. *℞. cort. rad. apij, iueos, ebulli an. 3 j. rad. bryonia 3 ij. rad. innale 3 ij. b. hyssop. capill. ven. cuscute, agrimonie, absinthij vtriusque an. m. j. follic. senæ 3 i. b. agarici sem. albi & leuis, rad. esula an. 3 b. zinz. albi, cumamomi selesi, schenanthi an. 3 b. rhabar. selesi 3 j. spica 3 v. prun. damasc. (quia durioris alui) nu. xv. vuar. pass. ab avill. repurg. 3 j. liquor. asæ 3 b. sem. anisi 3 iij. sem. carthami 3 i. b. sem. cenisæ 3 ij. fiat omnium decoct. in sero lactis, pro libi b. col. zacch. dulcoratur. Ex quo modo semel, modo bis in die sumens cyathum vnum, quotidie quinquies alium deponeret. Et mox cum theriacam, & alia iam dicta sumpsisset, præter spem conualuit.*

SCHOLIA.

Cum vniversus corporis habitus, quasi in aquositate diffunditur, affectus quidam oritur à Græcis καχεξία, à Latinis malus corporis habitus dictus; principium hydropicarum passionum, teste Pauloc. 47. lib. 3. existens. Vniuersa corporis miscella laxior fiet ac emollescit, ut Aët. refert c. 19. lib. 10. Vnde non vna duntaxat pars, sed totius corporis habitus oblaesus, nempe illæ partes, quæ oculis primæ subiiciuntur, & musculi, & quæ ossa ambiunt, & cutis. Corpora inflantur, quæ prementi digito cedunt, tumens facies, genæ, pedum manuumque digiti. Cuius rei causam in quæstionibus Arist. percontatus est, dicens fieri ex naturalis caloris imbecillitate aut alimento impuro, quod facile corrumpatur: vnde à membris abominabile rejicitur, neque ob eam causam vnitur: sed tanquam virosum respuitur, & ad inferiora repellitur. Addunt alij & humoris gravitate id effici, aut quod motib. pedes magis defatigentur, & à caloris fonte remotiores sint. Faciem namque & genas, quod rarioris materię sint, ob id facilius inflari; & humoris glutinosi materiam non facile ab exiguo calore consumi. Scrotum interdum & inguina tumunt, ut huic viro: vrina vix demittitur, ac sudor ferme nullus apparet; venter deinde inflatur, & vlcera, si quæ innascuntur vix coalescunt; lente & grauius ambulant. Vniuersum etenim corpus (ut refert Aetius) virore albicans redditur, ac inualidum; ita ut crura interdum vacillent: & in principio quidem concoctiones impediuntur, manente etiam appetitu; postea vero & fastidium accedit; & respiratio ipsi sit rara ac debilis.

lis, quæ motibus & actionibus condensatur: alius etiam inæqualia recrementa excernit. Aliqui, ut Donatus hunc affectum præter naturam propter intemperantiam frigidam & humidam, ad morbum referunt; vel ad symptoma, respectu coloris totius habitus. Et ita secundum alios est morbus frigidus materialis ac humidus, ex iecoris infirma digestionem, sanguinem aquosum generante, qui membris legitime agglutinari non potest: vnde membra præter naturam intumescunt, ac præmolliia efficiuntur. Quæ quidem totius corporis immodica refrigeratio ac molliities, ex nulla alia re, quam ex sanguificationis defectu provenire poterit: quæ ubi immodice amplius augeatur, generandi hydropis causa erit, ut dicemus de hydropem. Et propterea Paulus principium aquæ inter eum appellauit hanc affectionem: & Arabum princeps Auicem. dispositionem antecedentem hydropis: quo fit, ut neque generari idem malus corporis habitus possit, nisi & iecur ipsum siue primario, siue per consensum fuerit affectum, ac imbecillum redditum, propter frigidam eius temperaturam: ob quam sanguinem optimum generare nequit, ac pro nutrimento vniuerso corpori eum suppeditare: sed ipsum frigidior, serosior, & (ut ita dixerim) magis pituitosum generat ac distribuit. Et propterea (ut inquit Aetius) ut plurimum hæc affectio ex longo morbo congregatur, aut ex viscere, quoniam in seipsum indurato consequitur: maxime hepate & splene: neque raro in dysenteria diuturna, & affectionibus colicis contingit, item ob consuetam aliquam cohibitam excretionem. Sæpe numero euenit ex immodica sanguinis profusione, in viris præsertim per hæmorrhoides, aut in mulierib. per menstruas purgationes: quemadmodum & aqua intercus generari consuevit. Et (ut in vniuersum dicam) quæcunque causæ iecur ipsum, ac vniuersum habitum infrigidare valent, siue internæ, siue externæ fuerint, huiusmodi affectionem generare poterunt: quas dignoscere haud difficile erit, tum ex te ipso, tum etiam ex laborantium seu astantium loquela. Quæ inquam, omnia exemplis clariora euadent.

OBSERVATIO XXV.

De cachexia ex mensibus retentis: & de altera, ex nimia mensium profusione.

ANno 1546. mense Aprili, cum ex Gallia in patriam rediissem, Cornelia Ioannis, cognata mea, ac filia auunculi mei, cum cachexia aliquandiu laborasset, & de hydropem metus esset, & cum toto corpore pallida esset, ac molliem contraxisset, ob menses retentos, vix respirare potens inter ambulandum: cum me in consilium adhibuisset, hunc syrupum omnium primo exhibui: *℞. oxym. squillitici 3 i. b. aquæ meliss. 3 iij. misce, capiebat vnica vice.* Deinde eandem purgaui hoc modo: *℞. diacatholici 3 j. benedict. laxa 3 ij. cum 3 iij. decoct. absinth. maricaria, artemisia, fumarie, summitatum lupul. end. cicborij, addendo mellis ros. colai 3 j. misce, fiat potio, qua quinquies alium deponuit.* Mox vena saphena dicta in talo aperta, mediocriter sanguine effluente: & ebibito decocto artemis. flor. chamem. sabim. in vino Rhenensi, adiecto zacch. & pauco cimanomo, ad modum clareti, mensibus apertis: & sumendo dialaccam & diacurcumam in tabulis, curata fuit: etiam cachexia in totum euanescente: adeo ut non diu post viro nupserit, ac mater deinde multarum prolium effe-

cta fuerit. At vxor magistri Theodorici, prope templum nouum Delphis habitans, contraria causa in cachexiam, mox & in hydropem leucophlegmatiam incidit, cum per tres fere annos insigni mensium profusio fere continuo laborasset, quamquam per nos subinde restringerentur bonis præfidiis ac diuersis: sæpius tamen proluxit illa redeunte, ad extremam debilitatem deuenit, & hepate valde refrigerato & debilitato cachexiam incurrit, tandemque & hydropem, ita ut postremo pro deplorata haberetur, pedibus supra modum intumescens etiam facie valde inflata, ut postea neque incedere posset. Variis per me adhibitis remediis attenuantibus & vrinam cientibus, & ad hydropem facientibus, etiam post vniuersalia remedia, & quæ aquam dicerent & ad renes diuerterent materiam aquosam, subinde exhibui dialaccam & diacurcumam: quo factum est tandem, ut multam materiam, aquosam per lotium continuo effuderit. Ad pedes supra modum tumidos & magna mole inflatos, ac cedematofos, ut hoc balneo vteretur madaui: *℞. folior. sambuci, sampruci, sem. maiorana, flor. chamem. m. m. flor. rosmarini, vna cum floribus, saluie, foliorum lauri an. q. s. cumini parum contusi, salis communis an. p. iij. fiat omnium decoctio in aqua & aceto acerrimo.* Mane balneo sic parato, in cupa mediocris magnitudinis vimen intertextum instar cancellorum supra vas vel cupam ponebatur: & pedes nudi supra eandem cupam vel vimen intertextum positi. Et vestibus vndique circumcinctis, fumum hoc modo ex vase euaporante recipiebatur: & sic potis apertis sudor prouocabatur. Et postea in eadem aqua pedes balneabantur. Quod quidem omni mane, stomacho ieiuno pluribus diebus fiebat. Deinde postea, cum pedes, crura & femora detumescerent, in eodem balneo immisiss & demum exsiccatis fasciis circumducebantur: quod cum continuaretur per aliquot dies, crura cedematosa miraculi instar detumuerunt: & paulatim non solum à cachexia, sed & leucophlegmatia, remediis ad hydropem aptis, & hæc probe curata fuit, & nunc etiam recte valet, quæ ab omnibus pro deplorata habebatur. Viuit & hoc tempore, anno 1594.

SCHOLIA.

Qui autem ex nimia profusione mensium cachexiam incurrunt, facile in hydropem incidunt, ut in hac vltima muliere (quamquam encephalica) contingit. Si n. cachexia à stomacho & intestinis ortum habere videatur, tympanitem imminere demonstrat: si à felle, & à liene aut renib. ascitem portendit: si à venis demum ac aliis membris inique nutrientib. corpore tumorib. inæquali, hypofarcam denuntiat affectus initium. Capuntur quoque hac affectione maxime senes (teste Aetio) qui etiam maxime liberantur: imo & pueri, qui facile pereunt, propter vitalis firmitatis debilitatem, & quod succi facile ob raritatem cutis in eis transpirant. At qui in vigore sunt, raro in hoc malum incidunt, & facile se extricant. Cum myrach & venter inflatur, in ascitem terminari volunt quidam; & ubi testicul. inflantur: alioqui ubi totum corpus in molem accrescit, in hypofarcam. Ideo non negligenda erit huius affectus curatio, ut dicebat Aetius: nam si diutius protelabitur, in aquam intercutem transiit. Quidam aiunt, quod facile curetur malus corporis habitus, nisi pendeat à causa incorrigibili, ut à pulmonis apostemate, aut aqua retenta in eo.

Hh iij. vel

vel ab hepatis aut ventriculi apostemate, & similibus, quibus & nos addere possemus, nisi & ab alio visceris scirrhus confirmato originem traxerit. Curatio cachexiae eadem est cum hydropis curatione, ut Valescus adfirmat: quare & agrum retinet in summa abstinentia. Ita si confugit comedere in prandio vncias sex panis, tres tantum exhibet: & si consuevit bibere quatuor metretas vini, duas tantum propinat: iubetque agrum a mensa cum fame & siti surgere. Sed hic causa spectanda, num vires prolapsae ex profusione: tunc agrum aliquando ob imbecillitatem nutrire debemus: cum cibis tamen etiam nonnihil attenuantibus. In genere, aer eligendus ad calidum & siccum vergens: in frigido n. & humecto caelo habitandū non est. Eadem de causa frigida humidatque tempestates obesse creduntur, somnus moderatus sit ac nocturnus, longus a. atque diuturnus omnino vitetur. Moderatis deambulationibus, gestationibus, vociferationibus & frictionibus siccis per linteolo ex lino crudo utendum. Post quae & exercitia moderata conducunt, eodem Aëtio teste. Meror quoque & otium vitanda sunt: neque a cibo statim ambulandum, nisi lente ac suauiter. Venus damnatur. Iuuat exinanito corpore subiraesci interdum. Marinae praeterea natationes iuuant, nitrosae sulphuratae ac aluminosae, ut Aegineta alique scripserunt. Conuenit & thermarum usus: sed caueant a balneis egressi statim frigidam suspectam haurire. Nec non arena littorū maris praecipue tenuis, & solibus candens, in medicina est siccandis corporibus. coopertis cachecticorum, hydropicorum, aut rheumatismos sentientium. Sed velare caput a solibus necesse est: egressi pariter ab arena, frigidam non bibant, neque cum cibum capiunt. Alius humecta sit, natura vel arte, cum clysteribus glandibus. Damnantur cibi potusque difficilis concoctionis, qui oppilant, quique prauis sunt alimentis. Cibi igitur eis offerantur simplices, & qui facile concoqui possunt, optimamque sanguinem gignere. Inter obsonia perdes, auiculae: inter quas alaudae, lusciniae & similes iis laudantur: sicuti tutures, phasiani, columbae syluestres, & palumbes pulli, quibus cinnamomum, caryophyllum apte inserimus, aut crocum: exiguo addito masticis. Inter hortensia, pro plebe, porrum, sinapi, allium prodest commandacatum: & quicquid summatis attenuat, aperit & deglutinat, ex causa frigida: in iis omnibus temperamentum querendum est. Inter tragemata id vtile esse praedicant. *℞. pistaciorum 3 lb. passul. anisi ana 3 lb. maceis 3 lb. cinnamomi 3 lb. zaccb. lb. ss.* Vinum autem conuenit eis album, tenue, & odoratum, ut liquet ex Aëtio. Aquae potus omnino vitandus erit. In vniuersum, victus sit tenuis & siccus, ut inquit Paulus. Verum diata vniuersa viris. reparandis sit apta: per quam (ut refert Aëtius) spes est, eos qui hoc malo sunt impliciti, ad restitutionem in integrum peruenturos. Quod ad reliqua praesidia *℞. ene scitio*: attinet, varia perhibenda prout causa sit varia. Si consuetae excretionis sint retentae, ex iis si oritur affectio, sunt prouocandae & irritandae, iuxta Aëtium: qui venam incidit in cubito, si nihil sit quod id fieri prohibeat: paulatim, partitis vicibus, per triduum sanguinem detrahendo, eod. Aëtio & Paulo testibus. Nos potius in nostra prima muliere in talo venam secumimus, cum affectus ex mensibus astrictis originem haberet. At si venae incitio impediatur, aut vitioforum copia laborant agrotantes, ipsos purgare oportet (*relieta vena sectione, quae eisdem noxia est*) non semel dupla-

xat, sed saepius ac paulatim, ubi usus postulat, prius preparatis & attenuatis humoribus per decocta & syr. conuenientes: cum syr. byzantino, cum aqua agrimoniae & feris, si causa adsit feruens, alioqui syr. de eupat. cum aqua apij & petros. deinde si materia sit causa, cum hiera picra, cum rhab. myrob. agarico, prout materia exigit. Non desunt qui & hic vomitum laudant, ex syr. *Medicamentum* acetoso infuso cum raphano. Sed vehementiora cathartica vitanda ne stomachum laedant. Demum aperientibus, & vrinam cientibus, & nonnunquam vehementibus clysteribus, opus est. Valde hic commendant (ut Paulus) absinthij decoctum. Si a causa calida vitium oriatur, calida frigidis permiscenda, cum iis, quae aperiant & iecoris vires confortant: non eam causam species diarrhoeae cum nouitia rosacea ac dialacca, pro communi humoris coniectura, temperabis: & cum zacch. tragemata conficies, cum eupatorij aqua, feris erraticae portione, mane & vespere dabis. Ex frigida causa diaspermon, cum dialacca mane & sero, cum apij aqua & eupatorij. Eadem aliquando huius cura est, quae imbecilli hepatis, eademque cum affectu, quem praecedat, & quem sequitur: ut si cachexia sequatur scirrhum, & vergat in hydropem, tunc victus satis sit exsiccans & attenuans. Exsiccandum quippe ob humiditatem incipientem, aut ferum, quod est factum ab intemperie & imbecillitate hepatis: attenuans a. ut semper huius affectus causa oppugnetur, ne scilicet materia crassa scirrhum faciens gignatur. Eadem est ratio medicamentorum. Sed tum habitus vertitur in aquam, magis digerentibus, quam humidis emollientibus, magisque farinis siccis, quam fotibus & oleis, vel decoctionibus, utemur. Si cachexia fuerit ab immodica sanguinis euacuatione, corpus reficiendum humidis: partes refrigeratae calfaciendae, & habitus corporis siccandiuis. Cuius exemplum postea adhuc vnum adiungemus. Quod si fiat ex sanguinis retentione, hamorrhoidas aperimus, corpus leuiter laxamus: ad quas omnes causas his pilulis cum magna experientia utitur Rondeletius: *℞. pul. dialac. vel diarrh. 3 lb. rhab. 3 lb. diarrh. abb. diagal. an. 3 lb. cum syr. de absinth. fiat pilula parua, capiat quarto quoque die pilul. 4. mane.* Quod si affectus hic sit cum intemperie calida, aut fluxu immodico, fiat, ut sequitur, pro febre sic: *℞. trochisc. de rhab. 3 lb. rhab. 3 lb. agar. 3 lb. pul. diarrh. 3 lb. cum syr. capill. ven. fiat pilula; capiat sex bis in hebdomada mane: superbibendo aquae end. cich. ana 3 lb.* Si febricitant, magis conueniunt syr. quam pilulae. Sed qui tam diu vsi sunt syrups, his minus molestae. Syr. conuenientes sunt de bizantiis, de eupat. capill. ven. end. compos. vel de cich. cum rhab. vel end. addendo rhab. idem praestabit. Si cum fluxu immodico sit affectus, pilulae sic fiant: *℞. myrob. citrin. cheb. ind. ana 3 lb. conficiuntur cum succo ros. rhab. electi 3 lb. diarrh. ab. & ricens. an. 3 lb. cum syr. capill. ven. fiat pilula. capiat duas mane in exitu lecti.* Post harum usum fere in omni causa conuenit opiata sequens: *℞. ciner. pellis ventriculi & intestinorum gallinae an. 3 lb. cineris cancrorum marinorum, lotorum ante & post visionem 3 lb. conseru. stor. cichor. capill. ven. an. 3 lb. pul. avom. ros. diagal. an. 3 lb. cum syr. capill. ven. fiat opiata* (quando intemperies calida seu febris adest, diarrhoea. & pul. trionf. loco aliorum ponatur) *capiat singulis matutinis.* Quod si aqua euacuata sit, superbibat parum vini diluti aqua graminis & asparagi. Si adsit caliditas, aqua cichor. & end. Si refrigeratio, aqua absinth. & menthae. Si fluxus, aqua capill. ven. & absinthij.

Linimentum

Linimenta supra hypochondria, sunt, quae ex roborantibus iecur conficiuntur. *℞. olei de absinth. nardini an. 3 lb. olei cydon. 3 lb. spica viris que an. 3 lb. cyperi, samali rub. & albi an. 3 lb. coralli rub. vss. 3 lb. cere q. s. fiat ung.* Utatur optima victus ratione, exercitio, nisi fluxus immodicus sit. Tunc enim frictiones sunt in contrariam partem.

OBSERVATIO XXVI.

De cachexia ex immodico fluxu sanguinis narium.

Pater quidam seu cœnobiarcha, Thomas dictus, apud Alcmarianos, cui frequenter sanguis e naribus fluxerat, hepate refrigerato in cachexiam incidit: cui facies tum crura inflata videbantur, cum vrina cruda & hepatis obstructione. Hæc infra scripta commode administrata fuerunt: quibus etiam praesidiis curatus fuit: *℞. capill. ven. marubij, agrimon. cassut. scolopend. absinth. viris que, menth. rub. an. m. j. sem. anisi 3 lb. coquantur in aqua communi & vino Rhenensi ad 16 lb. dulcorata zacch. & avom. cum 3 lb. cinnamomi; & fiat ad modum clareti.* Bis in die eo utebatur. Postea & huius decocto hæc adiuncta sunt: *℞. rad. apij, petros. foeniculi, cichorij an. 3 lb. follicul. senae 3 lb. epithemi, polypod. an. 3 lb. in quo decocto hic nodulus immergatur & exprimat, dum ex eo sumeret: ℞. rhab. selecti 3 lb. spica 3 lb. fiat nodulus.* Ex eo decocto cum bis sumeret in die, alius moderate soluebatur, facie in dies detumescente, & oppilatione hepatis paulatim cessante, & digestionis vigorata: Interea sumebat quotidie ex tabularum ros. paul. eo diarrh. a die octo, superbibebat aquam absinthij. Pedes modo fouebat & lauabat aqua marina, modo etiam hoc fotu. *℞. florum meliori, chamamill. folior. lauri, matricariae, artemisij, caulium rub. hederæ terrestres, fursuris, salis communis an. m. j. fiat decoctio in aqua communi.* Atque ita paulatim cessauit pedum & crurum inflatio: & paucis diebus sanitate recuperauit.

SCHOLIA.

Cum hic ex sanguinis e naribus profluuium malus corporis habitus ortus esset, vinum album tenue concessi: cum & hic victus viribus reparandis aptus sit. Sed & hoc hic neminisse oportet, quod perpetuo hepatis succurrendum erit, a quacunque causa oriatur: ipsumque semper roborare oportet, cum sanguificationis instrumentum sit ac sanguinis officina. Vberius a. sequenti c. de aqua inter cutem idonea medicamenta pro ratione mali habitus, reperies: propterea plura exempla (quamuis varia etiam in pregnantibus habuimus, tum aliis ex mola veri in cachexiam incidentibus, quas curauimus) non addemus: cum & supradicta hic satis esse possint pro tyronibus, ideo ad hydro-picos progrediamur.

OBSERVATIO XXVII.

De Hydrop.

Colonus quidam, dum in Gallia praxin exercere, hydropem diu laborans, cum nihil opis a medicis aliis sentiret, me consilij causa accessit. Cui imperavi, cum non febricitaret, ut continuo allium comederet, quo factum est, ut multum aquositas per vrinam profuderit, atque ex insperato eo remedio sanus euasit. Sed & alia mulier hydropica, cui venter & crura in maximam

molem excreuerant, cum deplotata haberetur, ex alterius vetulae consilio capiebat allij capita viridia, & contundebat, succumque per pannum cum iure veruecis aut pulli vel caponis (si alius ad manum non esset) colabat, & potabat. Et breui venter tum crura detumuerunt. Et praeter opinionem curata est: non solum illa, sed alij plurimi. Hinc & hædos, cuniculos, capreolos, lepores elixos, cum allij, porri, & caparum decocto, more rusticorum, Gordionius in hydropem curando commendat. Noui & alios hoc solutio subinde exhibito, multum aquae per interualla per alium reddidisse, & sanos factos esse: *℞. folior. senae 3 lb. seminis anisi 3 lb. foliorum mezerion 3 lb. rad. iros viridis parum conusse 3 lb. soldanellae 3 lb. infunde per noctem in 3 lb. seri lactis, facta prius ebull. mane huius fortis expressionis accipe 3 lb. mellis ros. colati, syr. de eupatorio an. 3 lb. misc. pro ij. dosibus.* Memini mulierculam etiam ab Heydio collega meo hoc modo curatam: *℞. folior. senae Alexand. 3 lb. iros viridis parum conusse 3 lb. mezerionis 3 lb. soldanellae 3 lb. infunde per noctem in 3 lb. decocti. communis: facta prius ebull. mane forti express. adde 3 lb. mellis ros. fiat potio pro ij. dosibus.* Ego etiam cum video vrinam supra modum esse tinctam, loco mezerionis pono 3 lb. rhab. oprimi, addendo spica 3 lb. fiat infusio in sero lactis, quo sepe cum magna felicitate usus sum in nosocomio Delphensi. Elideus praceptor meus hoc modo utebatur, *℞. rhab. electi puluer. 3 lb. pul. soldanellae 3 lb. dabat vnica vice, cum decocto aut aqua conuenienti.* Cum autem rusticus ille ex allij usu curatus esset, venit mihi in mentem alterius rustici apud Beniuenum, cui consultum erat, ut nihil biberet, eoque per annum ad eum reuerfo, ac dicente se nihil per annum bibisse, atque sic curatum, iussit ut paulatim vino aduiceret, sed mero potius quam lymphato, & eo ipso austero ac tenuissimo. Qui cum discederet, & curiosa potione usus, ad pristinumque reuersus statum, quam mecum familiaritatem primum contraxit, eam (inquit Beniuenus) adhuc in hanc usque diem officiosissime seruat & colit. Idem quid mirabile narrat de puero ab omni medicorum consilio destituto, qui cum aquam quantum potuit hausisset, soluta umbilici vnitate, tanto impetu aqua fluere cepit, ut supra ventrem cubitos tres ascenderet. Quo sane vitam finisset, nisi circumassistentes opposita manu aquam fluere non permisissent. Hinc medico accersito, & aqua paulatim educta, ac curioso victu, & ceteris, quae ad rem facerent iniunctis, breui tempore in pristinum redactus est sanitatem.

SCHOLIA.

Quoniam non raro gignitur affectus a sanguificationis facultate vitata, ex Galeni sententia: vario modo Graeci hunc affectum vocant, modo *ὀδυσμον*, interim *ὀδυσμα*, saepius vero *ὀδυσμα*, nuncupantes: Latini autem aquam intercutem, seu hydropicum morbum, ut liquet apud Celsum, c. 21. lib. 3. A symptomate nomen sumit: siquidem aquosus humor hanc passionem necessario comitatur, Celso Aureliano teste cap. 21. lib. 3. ac Plinio 2. lib. c. 12. Hic semper iecur afficitur, ut 5. de loc. 6. sine primario, siue per consensum afficiatur: ut etiam 2. Prog. decretum est: & ab Alex. c. 1. lib. 9. & a Pauloc. 48. lib. 3. confirmatum. Verum cum non vnus sit hydropis modus, ideo primum ne primario, distinctio habenda est, eaque ex Gal. 4. de victu: siue per comam in qua omnes conueniunt; quarum vna Aesculapio dicitur, quasi vtricularis a Graecis *αἰκμή* sic dicta

Quos sine
differentia
et sic
appellare.

dicta est, quod *ascites*, hoc est vtrius modo in peritonæo humor continetur. Altera *Tympanitas* vel *Tympanites*; *τυμπανίτις* quidem à Tympano sic appellata, quoniam in tali affectione imus venter percussus talem sonum edit, qualem tympanum, Galeno teste, comment. aph. 11. 4. lib. quo loco Hippoc. *ἔμπρον δ' ὄρωπα* nuncupavit. Tertia species *ἀναστόρεα*, aut *ὑποστόρεα*, aut *καταστόρεα*, aut *νευροσπασμωγία*, aut *σπασμωγία*, aut *σπασμωγία* appellatur. Et tertia differentia sic appellata est, quoniam per carnem, vel sub carne, vel iuxta carnem: seu secundum carnem, vel supra carnem, seu infra carnem humor continetur: aut propter ipsam *νευροσπασμωγία* nominant, ut quæ pituita liquida conflet, ut sui quidem ratione semper alba, sed quæ propter mixtionem quorundam aliorum humorum verum mutet colorem, ut liquet apud Galen. comment. aphor. 29. 7. lib. Quæ nomina à similitudine dicuntur externorum. In priori quasi vter aqua plenus cernitur: in secundo genere venter tympani instar inflatur: in tertio genere speciem carnosæ molis totius referunt: ut cum quis ventricosus, & toto corpore crassus euadit. Proprie vero hydrops, iuxta Iacchinum, dicitur ascites, ceteræ vero species per huius similitudinem. De Tympania 4. aph. 11. quod ex similitudine. Ibi de tribus speciebus litigant moderni, ut saluent Hippoc. qui duas species ponit. Non est ille locus Hipp. & à Galeno, ut insufficiens, reprehenditur. O miserum laborem! Et ita quidam duas species hydropis, hoc est, aquosi humoris collectionis, esse volunt (ut Dodonæus supra cap. 13. de Rustico apud Beniuenum per amantem nihil bibente) hypofarcam & ascitem: cum in tympanite scilicet flatus colligantur. Communi vero modo tres species iam dictæ hydropis ponuntur. Cuius rationem etiam vide apud Donatum ab Altomari. Communis autem omnium (ut inquit Celsus) causa est humoris nimia abundantia: ob quam ne vlcerata quidem in his ægris facile sanescunt, ut patet etiam apud Hipp. & Gal. aph. 8. 6. lib. Et communis generatio cuiusvis aquæ intercitem est, ubi sanguificationis officium intercidit, nempe refrigerato iecinore, & ex consequenti venis omnibus, ex 5. de loc. affect. cap. 7. & 2. progn. In hypofarca per naturalis caloris debilitatem & impotentiam, pituitosior, hoc est, crudior ac frigidior sanguis gignitur, qui per venas in corpus distribuitur, ipsum tumidum reddit, & albedo pituitæque emortuo colore pallens apparere efficit. In ascite vero intra peritonæum præcipue humor colligitur venterque distenditur: ibi enim visum sanguificandi adest, id est, diminuta concoctio vel vitata. Diminuta quidem, ubi aqua, vel pituitosus sanguinis generatur: & sunt duæ species iam dictæ. Deprauata vero, ubi in flatus vertitur, & sic in alienam qualitatem. Hypofarca fluticum laborasse verisimile est apud Beniuenum, ut etiam Dodonæus existimat, & crudis frigidisque humoribus per potus abstinentiam à natura concoctis, & in sanguinem conuersis, tum & vitam eum sustinuisse, tum & sanitatem recepisse. Puer autem potuit ascite laborasse, non tamen ex refrigeratione, sed ex calida nimium & sicca iecinoris intemperie, (ut idem Dodonæus putat) qua tam grauiter quandoque iecur afficitur, ut probum sanguinem non conficiat velut in hydropem, quæ acutos morbos subsequitur, teste Gal. lib. 4. de loc. aff. c. 1. Aduersus huiusmodi hydropem aquæ potio remedio esse potuit, iecinore videlicet refrigerato & humectato, si modo recens nata fuerit: Nam

Communis
causa gene-
rationis om-
nium vtrum
differentia-
rum.

8

diuturnæ hydropes incurabiles habentur, diuturnitate mali iecinore aut liene corrupto ac vitato. Succedit autem non raro acutis morbis ascites, & frequenter etiam ictero. Contingit autem non raro in hoc ascite, diffusis per vniuersum biliosis humoribus, calorem subinde tantum excitari, ut, quacunque corporis parte scalpta cure, leuiterque vulnerata, mox calidus, niger, & quasi adustus sanguis effluat. Cæteri hydropis per aquæ potionem curatæ exstat & exemplum lib. 2. epist. Ioan. Langij epist. 12. Vxor, inquit, barbitonensis in Nouo foro, Palatinorum in Noricis oppido, plus sibi ipsi quam marito ac medicis morigera, cuius venter hydropem in immensum turgebat: hæc aquam de fonte scaturiente magnopere sitiebat. Progressa itaque marito inscio extra urbem ad fontem, in quo cum aquæ scaturigine simul arena ebulliebat: de qua, quantum manu caua apprehendere potuerat, ter aut quater deuorauit. Domum lata reuersa, rem omnem nobis recensuit: & intra biduum per fluxum ventris plurimum pituitæ excreuit, apertis quoque sua sponte in ano maricis: vnde confestim sanguis niger effluebat: ab hydropem conualuit. At noster Colonus, qui allium comedeat, non solum per vrinam reddebat aquosam materiam, sed etiam per aluum, hoc est, quod Dioscor. scribit lib. 2. cap. 145. de allio. Aluum, inquit, turbat, vrinas detrahit, & hydropicis vtile est.

OBSERVATIO XXVIII.

De hydropico paupere.

PAUPER quidam cum continuo aquam frigidam biberet, iecur affatim refrigerari cepit: & hydropem tandem incurrit. Nam multa frigida intemperanter hausta membra refrigerant, subito à balneo, aut venere, vel lassitudine: vnde iecoris substantiam subito affectu laidunt. Huic autem, cum pauper esset, tale attenuans decoctum præscripsi, quod simul stomachum ex aqua longo potu refrigeratum calfaceret atque roboraret: & simul aquam educeret, ac hepar refrigeratum corrigeret: *℞. rad. ierosol. petros. apij, brusci, emulæ campanæ an. ʒj. hyssopi, centaurij, absinthij, fol. sambuci, satureiæ, ceterach. cassiæ ana. m. j. medianorum corticum sambuci, gratioli, betonicæ an. m. ʒ. rad. rubæ tinctorum, calami arom. incisæ ana ʒij. sem. feniculi, dauci ana ʒij. sem. caribani, contusi ʒ ʒ. folio. sene Alexand. ʒi ʒ. polypod. quercini ʒ ʒ. storac geniste m. ʒ. sem. umperi ʒj. soldanellæ m. ʒ. vinar. passul. ʒj. glycyrr. rasa ʒiij. zinzib. cinnamomi ana ʒj. coquantur in aqua communi, pro ʒ ʒ. colatura adde syr. de byzantiis, de eupatorio, de calamintha ana ʒj. misce, fiat apozema. Quibus satis aluum reddebat, ita ut venter eo detumesceret. Deinde purgavi eum, modo cum ʒ ʒ. diacarthami solutis in tabulis vel paulo plus cum ʒiij. decocti præscripsi. Cui & has pilulas dedi: *℞. pilul. de mezereio ʒij. pilul. aggregat. de rhab. ana ʒ ʒ. cum succo rad. ierosol. fiant pilule vij.* Deinde capiebat diacurcum, & dialacca, cum diacinnamomo in tabulis. Ventrem inuinximus hoc vnguento: *℞. vng. Aprippe ʒij. succi ebulli vel sambuci ʒj. bulliant ad succi consumptionem: fiat linimentum.* Quibus paulatim detumuit venter, & cum non diu laborasset, ab hydropem sanatus est.*

SCHOLIA.

Quævis specierum aquæ inter cutem, iecinoris refrigerationem consequitur, ut antea diximus.

Aqua in
ser cutem
causa

diximus. Etenim citra eiusdem refrigerationem, impossibile est aliquid in hydropem incidere, Gale. & Actio resiliens. Id autem iecori accidit per se aut per consensum. Immutatur ex refrigeratione splenis, intestinorum, ventriculi, mesenterij, septi transversi, renum: nam & ipsum iecur scirrhotum afficitur: vel ipsum spleni indurato seu refrigerato coarctatur: aut ieiuno, seu reliquis intestinis iuxta ipsum, aut mesenterio aut pulmone, aut renibus seu septo transverso simili ratione primario affectis: nam & renes propter eorum obstructionem, alias quoque ob eorundem imbecillitatem, serosam sanguinis substantiam non secernunt. Sic etiam ex nonnullis causis aliis iecur ipsum refrigerantibus, aqua intercus oriri poterit: utpote ex immodica hæmorrhoidum profusione, aut ex eisdem diuturno tempore suppressis: similiter ex menstruæ purgationis omnimoda cessatione aut immodica vacuatione: aut ex immodico muliebri profluio, ut liquet ex Gal. 2. de nat. fac. & 5. de locis affectis. Si enim calor natiuus strangulatur, ob spirituum vna cum sanguine iacturam factam, pariter ex intempestiua ac immodica aquæ frigida potione (ut huic nostro agro evenit) iecur affatim refrigerari potest, ac statim aqua inter cutem induci: quanquam sic affecti (ut Gal. eodem 5. de locis affectis asserit) ob refrigeratum os ventriculi, vehementi ciborum desiderio teneantur, secus quam cæteri hydropici. Id magis fit, si aquam frigidam quis ingurgitet post æstum aut exercitationem. Multi autem & à podagra & à coxendicium dolore vexati, aquam inter cutem incurrerunt; frequentissime etiam eos, qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemque ab arquo infestatos, hydrops corripit. Item quosdam eorum, qui non nisi recta ceruice spirant, aut cæliaca affectione laborant, ac dysenteria, in aquam inter cutem deduci nouimus (ut inquit Aetius) Hæc enim mala si diutius persistant, spiritus deinde naturalis, insitusque calor nimium dissipantur. Sæpe etiam febribus longis superuenit, ut refert Paulus, nam his qui longis febribus consumuntur, etiam insitus calor atque spiritus nimium dissoluntur, sanguificationisque officina intercidit. Sic & omnia illa, quæ sanguificationis virtutem infringere possunt, efficiunt ne jecur chylum in sanguinem transmutare possit: atque ita hydropem efficere possunt. Interdum & hydrops morbos acutos sequitur, ex Hipp. sententia, 2. progn. cum ex eis sanguificationis opus intercidit, adeo ut jecur cibum in sanguinem transmutare nequeat. Ascites tamen non tantum ex partium nimia refrigeratione, ut anasarca, ortum habet: sed frequenter quoque fit ob solutionem continuitatis alicuius visceris, aut vasculi quo humores contineri solent. Eaque ratione causæ omnes, quæ jecur vehementer excitant, ut ardentes febres, potentium vinorum immodicus usus, alimenta quoque multum calentia, hydropem sæpe excitant: eo quod viscera, & frequenter quidē jecur, ex occurso siccitatis nimia quasi exarescant atque rumpantur, nec non dehiscant, ut in terra ex nimia siccitate fieri solet: vnde humores in abdomen facile per fissuram illabuntur in ascite, quasi exsudando atque destillando. Ex tumore duro jecoris, lienis, aut alterius partis quoque fit frequenter: contingit enim viscera sic quocumque frequenter findi, propter nimiam eorum siccitatem atque humoris inopiam: vnde tempore etiam ipsa membrana ambiens frangitur: sicque sensim serosa excrementa in abdominis ca-

pacitatem decidunt. Vidē plura de his apud Fernelium, qui eos hallucinare putat, qui per angustos cæcosque poros serosum humorem transferri in capacitatem abdominis putant: sed is potius per fissuram fieri vult. Iacchinus tamen aliter sentit: Cum enim sanguis, inquit, exiguum mutationem suscipit, maiore sui parte in aquosam substantiam vertitur, ac circa primas venas & cauum manens, utpote tenuis & serosus, refudat in peritonæum. Quod a. maneat, causa est, quoniam à membris & ab vterioribus venis non trahitur: quod vero non trahitur, causa est vitium eius. Remanent etiam eo sanguine plenæ venæ mesenterij omnes, quibus erat aliqua vis sanguifica: vnde ab iis defluit toris vice aliquid in cavitatem. Vaporis quoque humidæ copia, ubi in peritonæum tunica incidit, densatur atque in ipsum defluit. Talis est ascitis generatio. Fatemur tamen & aliquando in ipsius abdominis substantia aliquid aggregari, inter musculos scilicet & cutem. Necessario enim contactu aquæ humescunt. Hæc Iacchinus. Amatus vero sentit contra Arabes, ut asserit ipsum longiore sermone videre licet, centur. 1. curat. 30. quod ascites aquosus hydrops sit inter peritonæum & omentum, id est, inter siphac & zirbum, ut incisione sapius probatur: & non inter mirac & siphac: non autem abdomine, sed peritonæo distenso, aqua effluit, quæ inter illud & omentum vel intestina continetur. Si plura de causis hydropis scire desideres, lege interpretem Holerij. Causa igitur ascitis est, multa refrigeratio visceris, & consequenter venarum omnium. Ideo vero aliquando primario iecur patitur, aliquando secundario. Voco a. secundarium, cum ab alio alterius membri affectu habet originem. Ita in nostro hoc agro, iecur non primario, sed secundario patiebatur: nam immediate ex causa procacitartica frigidum euaserat: nempe ex plurimo aquæ potu: ita & ex opiatorum usu, vel aliis frigidis, fieri potest: sic & ex his, quæ per accidens refrigerant, ut sanguinis profluio (ut etiam Galen. 9. meth. cap. 10. & 5. de loc. aff. 6. ostendit) siue è naribus fluat, siue ex vtero, siue ex hæmorrhoidibus. Ad omnes enim hos affectus hydrops ascites plerumque succedit. Vna enim cum sanguine calor deficit. Fit etiam ex propriis frigidis morbis, scirrhotis, obstructione, & ex multitudine assumpti cibi, calorem innatum extinguentis. Sed per consensum aliarum partium, vel secundario affectu fit, cum scilicet partes illæ refrigeratæ vna jecur afficiunt, ut paulo ante recensuimus, 2. progn. 1. ut quia venis vel arteriis multis & magnis communicant: ut lien, cum intumescit: & vterus si scirrhotum patitur vel molam, ut nos sæpe vidimus: nam etiam aliquando aquosa illa materia non solum in ventrem, sed etiam in vterum profunditur: ut patet de illa muliere apud Fernelium, cui instante menstrua purgatione humor sub abdomine congestus, per vterum sponte ita profundebatur, ut omnis moles abdominis biduo subsideret: alius dein humor sensim proximo mense succrescere incipiebat, qui stat quoque tempore totus efflueret. Vel alia ratione aqua vel frigidis humoribus repletur aut contracta, aut si venter, aut septum, aut intestina afficiantur, ut paulo ante quoque recensuimus. Iam quocumque sit à vicinitate, ut à renibus, vel pulmone. A pulmone non raro. Iacchinus vidit in his fieri, qui asthma laborabant: ut & nos alias vidimus: vnde & refrigeratas eas partes pituita habent. Tandem omnes in senectâ in hydropem migrant, hæc de causa. A renibus vero non solum fit communis

causa

tantia noxæ per se, sed ex accidenti, si aquositate non purgent; unde multa remanet in venis; fitque sanguis aquosus, & excolatur serum. Illud in aluum, sæpe vero & multa horum iunguntur. Fitque ascites, ut Fernellius etiam refert, ex jecoris aut lienis vulnere exiguo, quod non alte penetravit (hoc enim repente hominem interimit) sed summam duntaxat extimamque faciem attingit. Oritur & ex vlcere, quod fere ab illorum suppurante phlegmone atque vacuata relinquitur. Tympanias vero si syncerus sit, videtur à ventre, & intestinis oriri. Sic enim testatur Hippoc. 4. aph. 11. Si dolores diu circa umbilicum & lumbos torqueant, qui neque medicamento cedant, id est, quibus tamen diligens curatio sit adhibita, transit in tympaniam. Significatur enim, inquit Gal. habitu contraicta intemperies; unde & imbecillitas partium, quæ ad ventrem attinet. Sic & 3. de symptomat. causis 1. Si, inquit, cruditates in ventre sunt, ob facultatis imbecillitatem, ad morbum, qui tympanias dicitur, deveniet.

Tympanias
seu tympanias
unde
generetur.

9

10

Hypofarca
generatio.

Vult ergo affectum ventri ascribi. Quomodo ergo vniuersaliter dictum est in omni hydrope jecur affici, & sanguificationis vitio provenire? Respondet Iacchinus: Proprie sanguinandi vitia sunt alia duæ species. Non enim in venis hi flatus vertuntur, sed quia semper adest etiam admixtus humor aquosus; ideo dicitur necessario jecur & sanguificatio lædi. Contra 4. de puls. dignotione 30. Et aliquando tympania & ascitis syncera, in qua non cavatur digitis cutis. Respondet idem Iacchinus: Sincerum dicitur, quando notæ admissionis evidentes non sunt. Sic medicus synceros tumores dicere solet. Quod si ab initio læsio à ventre incipit, tandem & in jecur perveniret, per coctum partium: & quia chylus male coctus, male etiam jecur afficiet, & malam coctionem in eo sortietur. Huius ergo præcipua materia flatus est (ut Fernellius sentit) ex imbecilli concoctione & cruditate genitus: qui cum multus in ventriculo aut intestinis, velut in colico dolore, coercetur, nec exitum naturalem reperit: impetum sibi inveniens, per cæcos tenuisque ductus inter abdominis membranas magnis cruciatibus sese infert: ac demum vario impulsus, in ipsum abdominis spatium penetrat aut deuoluitur. Rarus certe hic hydrops, iuxta eundem Fernellium, sicque syncerus flatus sub abdomine citra humoris permissionem nunquam est animaduersus. Hypofarca vero fit, cum crudus & semicoctus sanguis plurimus in corpus distribuitur; ita ut copia crudorum venæ omnes abundant; & vniuersum corpus mole augetur: atque adeo habitus vitiat, ut dignosci nequeat. Hic rursus jecur patitur, sed non adeo frustrata est concoctio, sed quia vna affecta sunt venæ, ideo vltiores venæ non possunt hanc cruditatem emendare: quare nec membra si attrahant in poros, assimilabunt: unde remanet alimentum distributum & dispersum in omnes cavitates: hinc tumor: Hæc 3. de symptom. caus. 1. Hanc à phlegmatica cachexia sciungit sola magnitudo, ut recte Fernellius ait, quod tumidiorem habeat corporis vitiatam molem. Vna & eadem tamen vtriusque causa, immodica nimirum jecoris atque venarum refrigeratio, quæ aut primaria est, aut ex cordis, lienis, ventriculi, mesenterij, aliarumque partium concoctioni feruientium vitio contraicta: & insiti caloris ac spiritus nimia dissipatio, ut in principio satis dictum est. Ex causis evidentibus, quæque viscera refrigerant, nativumque calorem obtundunt, est aquæ frigida & vitiosa immodicus potus, lactu-

carum fructuumque esus intempestivus & sanguinis à naribus, vtero, aut hæmorrhoidæ profluvium, vel consuetarum excretionum suppressio. Quæ omnia exemplis infra dicendis illustriora evadent. Et ita plus quam satis de causa dictum est. Quibus adiungere poteris ea, quæ Arculanus & neoterici de causis addunt.

OBSERVATIO XXIX.

De hydrope, in duobus prius quartana laborantibus, vno curato, altero succumbente.

Annua quartanam iuuenis cum expertus esset, & magnum lienem contraxisset, in hydropem tandem incidit: ad quem accitus, variis remediis vsus sum, in primis hoc decocto: ℞. rad. filicis, ebuli, ieros an. ʒ j. rad. persos. fœniculi, apij, cappar. thamar. ana ʒ ss. (quidam & his addit rad. cyclaminis ʒ ss. cum egregie faciat ad lienem induratum) sumat. cicbor. summat. lupulor. cassia. agrimonie, folior. sambuci (egregie aquam ducit, ut sæpe experti sumus) capill. ven. thym. ceterach. ana m. j. epithymi m. i ss. medianorum corticum sambuci m. ss. soldanellæ ʒ iij. sem. caribani contriti ʒ ss. folior. senæ Alexand. ʒ i ss. polypod. querc. ʒ ss. flor. borag. geniste an. p. j. sem. anisi, fœniculi, carui, agni casti, ana ʒ i ss. passul. enucl. ʒ j. fiat omnium decoct. in aqua communis pro ʒ j. colat. adde syr. de hyz. an. de cupat. syrup. acerosi compos. ana ʒ j. clarificetur cum ʒ iij. cinnamom. selecti: & fiat apozema ad modum clareti, pro quatuor dosibus matutinis. Die vno atque altero intermisso purgavi eundem in hunc vel similem modum: ℞. confectioris hamech, ʒ iij. diaphanici, diacarb. ana ʒ j. diacarb. intabul. ʒ i ss. aque agrim. ʒ iij. syr. de eupatorio ʒ ss. misce, fiat haustus. Detur in diluculo. Interea sæpe capiat diacurcum aut dialacca in tabulis. Lieni apposui prius emplastrum de meliloto, deinde hoc vel simili fotu utebamur: ℞. rad. althææ (ob duritiem) ʒ j. rad. arari, cyclaminis ana ʒ ss. rad. filicis, thamar. cappar. an. ʒ iij. centaurij minor. ceterach. absinth. mercurialis menthastr. ana m. j. flor. chamamill. meliloti ana p. j. sem. ruta, carui an. ʒ j. sem. scæmgy. lini an. ʒ ss. coquantur in vino & aceto q. s. & cum spongia fomentetur lienis locus: & inungatur cum oleo de capparibus, medul. vituli, adiecto ammoniaco dissoluto in aceto. Postea venit mihi in mentem similis fere casus apud Amatium, curat. 30. cent. 1. descriptus de hydrope aquosa, in vxore illius de Landenara: quæ cum viribus constaret, & recte se ad oblata adhuc haberet (ut noster æger) dedit ad expulsionem succi ieros ʒ iij. mellis ros. colati ʒ j. ieiunio stomacho; cum quo aquam illam quotidie parum emittebat. Postea vero octo interpositis diebus, catapotia ex nitro Alexand. cum trochisc. albandal. mixta propinavit: nempe pilul. de nitro Alexand. ʒ iij. trochisc. albandal. ʒ j. fiebat pilul. v. Cum quibus multum illius egerebat aquæ. Quibus sæpe interiecto temporis spatium inter vnam & alteram propinationem vsus fuit. Nam sensim & paulatim vacuandus humor iste est: qui vero vna vice tantum humorem istum deponere tentant, per purgantia medicamenta, multa mala agrotanti adferunt: quia eius vires deiciunt, & jecur & interiora refrigerant. Per vices igitur & nos medicamentis purgantibus utebamur, modo decocto dicto adiecto subinde rad. sambuci, gummosi ʒ iij. xinx. pro suo correctorio ʒ iij. modo etiam succo illo ieros. Interea roboramus vtrumque viscus, & jecur & lienem, modo diacurc. modo dialacca; adiectis trochiscis de capparibus. Et postea

postea inunximus quoque lienem cum hoc vel simili vnguento: ℞. vng. Agrippæ, arthanitæ maioris ana ʒ j. ammoniaci, opoponacis in aceto dissolutorum ana ʒ ss. olei cucum. asini ʒ ss. fiat vnguentum molle: quo tamen in tumore splenis ab exordio mali nequaquam utendum est: sed ubi iam materia mali vna cum viscere emollita fuerit. Ideo prius hoc vel simili utebamur: ℞. vng. arthanitæ maioris ʒ i ss. gummi ammoniaci in aceto dissoluti ʒ ss. olei cappar. lilior. alb. q. s. fiat vnguentum. Sic & Amatus in illa muliere interpellatim purgantibus medicamentis utebatur; nonnunquam lenioribus, aliquando vero vim inferentibus. Singulis tamen hebdomadis aluum etiam faciebat. Et quod mirum in modum profecit, hoc conditum fuit, quod habet rad. ieros per tyrocesum tractatæ ʒ ss. xinx. ʒ ss. mellis q. s. ad spissitudinem misce. quo sæpe utebatur: & optime absque anxietate & dolore aquositatem illam deponebat. Non minus adiumenti attulit mel. ros. confectum ex floribus persicæ arboris, quod sua natura hanc deponit aquam: & id Auicenn. lenelabin de persis, in cura phlegmaticæ, & aliis locis appellabat. Iis enim huc vsque citatis medicamentis, & nonnullis jecori appositis, sex mensium spatium hæc signati fuit restituta. Exterius tamen alius vnguento splenetico dicto linebatur: quo nos loco illius vnguenti, quod ex cyclamino siue arthanita inscribitur, utimur, quod multum in ascite valet, ut ex Mesue comprehenditur: quo & nos commodè in nostro ægro etiam ventrem oblinuimus; adiecto quoque vng. Agrippæ. At mulier illa apud Amatium, ut deinde recenset, interdum medicamenta purgantia non sumebat, diacurcum cum vino ebibebat, nonnunquam vero dialaccam: quibus & noster subinde vtens tandem conualuit. Laudantur & hic pilulæ de sagapeno, serapino, & soldanella, brassica marina dicta, & decoctum rad. sambuci & ebuli: quibus & nos utebamur, adiecta rad. turbit in exigua quantitate. Guilielmus Placentinus, sua ætate medicus doctus, testatur se paucis iis ad sanitatem reduxisse Azum quandam Parmensem, hydrope affectum, quæ habent turbit ʒ j. xinx. ʒ ss. zaccari, an. ʒ iij. scammonæ electæ pondere duorum granorum hordei, cum vino misce. fiat conditum. Hoc autem in hebdomada illi semel deuorandum dabat, stomacho ieiuno: quo & quater & quinquies egerebat. Sed omni die ante cenam diacurcum, quantitate nucis, cum optimo vino generoso illi bibendum dabat, quibus curatus ad sanitatem redactus fuit. Regimen porro mulieri apud Amatium (ut & nostro iuueni, qui non diu hydrope laborauerat: ideo etiam melius curatus) in vniuersum ad siccitatem declinabat: erat vero victus ratio, caro auicularum in dumetis viuentium; non minus vituli & gallinaceorum verueisve. A potu vero nostris monitis abstinuit, nec alio in tempore quicquam in potu sumebat, nisi prandij & cenæ hora, & tunc quidem parum vini albi, potentis & generosi, polyphori dicti. Sed & nostro iuueni concessi ceruissiam absinthitem subinde. Ab oleribus vero in totum abstinuit; veluti fugacibus fructibus, quos horarios medici appellamus. Amygdalas tamen & sole siccatas vvas, præcipue Corinthiacas, lubentissime concedebamus: & assa edulia, minime vero aqua cocta. Cæterum Hippoc. in lib. de internis affectionibus, similem huic prædicto morbum, à vitio splenis euentientem, describit: ut apud ipsum est legere folio Frobeniano 271. At alius iuuenis annorum 25. vel circiter, cum aliquandiu quartana laborasset, ac præter nostrum consilium medicamentum, nescio

Ret. Forest. Tom. 2.

quod calidissimum, alterius medici consilio, quod inhibuisset, bibisset, in ipsa accessione subito hydrope correptus est, ac variis deinde medicamentis vtens, etiam Paracelsicorum ei sanitatem pollicentium curari non potuit: & circiter duos annos fere hydrope laborans, tandem extinctus est.

SCHOLIA.

Facile autem liquet ex iis, quæ diximus, quemlibet aquæ inter cutem differentiam seu speciem, morbum esse in quantitate seu magnitudine. Namque ex genere præter naturam tumorum existunt, ut constat lib. de tum. præter naturam, circa aqua inter cutem. id quod confirmavit idem Galen. de ascite lib. 14. method. medend. Nec obstat, quod idem Galen. libris de differentiis symptomat. inter ea symptomata, quæ incidunt in sanguinis generatione frustrata hydropis vitia connumeraverit. Nam vel symptoma vniuersaliter dictum voluit intelligere; vel per vitia aquæ intercutis, eius causam immediatam intellexit, quæ quidem symptoma est incidens in sanguinis generatione (ut ipse inquit) non peracta, vel non rite peracta. Sed quod ad signa attinet, cum causas iam satis enucleauerimus: scire oportet, alia esse signa præsentia, alia communia hydropem demonstrantia, alia causarum, tum causas ipsas & species distinguuntia: alia vero mera prognostica. Inter hydropem præsentia futuram, est ipsa cachexia; quæ & sæpe hydropis initium existit. Et præsentia, quædam ex his sunt magis remota, ex progressu causarum procatarticarum seu primum, quæ vel hepar debilitant, obstruunt, indurant, vel abscessum inducunt tam in hepate, quam lienem, aut aliis membris particularibus iam dictis. Tales causæ continuatæ hydropem inferunt, ut & iteritia diuturna, cibique crassi obstruentes. Alia sunt magis proxima, ut si color corporis permutetur ad albedinem, citrinitatem; faciesque ac palpebræ inflentur, tum pedes ac testiculi, & inflatio abdominis appareat. At aquæ inter cutem signa communia sunt, spirandi difficultas, stridens tumor, grauitas, & vitiatu color, ex virore albi causans: cibi fastidium, pedum tumefactio, propter distantiam à corde; sitisque vehementior, propter humores salios & putrefactos. Plurimi quoque ex hydropicis aliquando febriunt, Aëtio teste. Quærit Arculanus, cur manus non tument in hydrope sicut pedes? Respondendum, Manus cordi propinquiores, & facilius motus sunt quam pedes: vapores humidiores (cum fere inflatio pedum commune sit accedens omnibus speciebus) sua gravitate deorsum mouentur ac pelluntur: unde pedes magis inflantur. Si pendeat à causa calida, adest sitis, maior inflammatio, citrinitas, vel rubedo; oris amaritudo, vomitus citrinus, aut viridis: vrina tincta, pauca (ut fere est in omnibus speciebus) viridis aut subnigra; febris adest pulsusque velocior; & causæ præcedentes calidæ, egregie ad dignotionem faciunt, ut & hepatis tum totius calida temperies. A frigida causa omnia contraria: facies discolorata, color lividus, febris abest, vel est exigua: sitis minor, pulsus tardior, nisi magna spiritualium membrorum compressio id inhibeat. Si hepar per se afficiatur, adest tussis, tumor pedum: venter nihil vel parum egerit, adestque angustia, & ventris tumor: & ad primario affe-

A calida.
A frigida.

Ab hepate
primario af-

continui,

Ab aliis
membris
particularibus.

Signa
speciei
distinguentia.

continui, ex causis prægressis, casu, percussione, offensione in regione hepatis, vlcere, abscessu, & similibus. Si per consensum è toto, vt si febris adsit vel præcesserint, ardentis quidem, sit liquefactio in excrementis. Si ab euacuatione notabili mensum, hamorrhoid. sanguinis profluuiò è naribus, ex agri sermonibus & astantium patebit, & ex causis prægressis, vel à colica affectione, vel dysenteria. Si ab aliis membris particularibus, omnia dignoscere & haud ægre interlinguere licebit ex prædictarum partium affectionum ac prædictorum affectionum dignotione, per enarrata in propriis locis ac capitibus signa. Vt si ab iliis, lumbis, stomacho, intestinis, ex ventris fluxibilitate, siue stomachus fuerit latus seu mesenterium. In stomacho sit fluxus cibalis: vel lientericus in intestinis, præcipue si adsit epipilatio in mesaraicis, chylosus, & aliquando sanguinolentus. Ex parte etiam doloris ventris, stomachi, vel intestinum, qui non remouetur cum fluxu, A renibus, ex lumborum dolore, grauitate, frigid. calid. aquositate, regurgitante ad intestina: ex abscessibus vel vlceribus eiusdem. Ita & si sit à splene, ex propriis signis & calore fuscis, ex proprio capite de obstruct. & scirrho lienis. Ita si causa primitiue prægressa, vt ex potu frigido, tum aliis, ab assistentibus & agro dignoscet. Quantum ad signa species distinguunt, facile quoque percipiuntur. Nam quæ affectus demonstrant, satis ad sensum patent. Tympania enim percussa sonum edunt: gracilia remanent extrema, nec tument, & iacenti corpus distentum manet, etiam resupino. At in ascite fluctuationem aquæ ager sentit: & hoc ipsum intuitu percipimus, quoniam tumorem in latus iacentis perpetuo sequi videmus: adde, quod recto stanti, ad ima ventris plurima moles sit & tensio, aquæ descensu: at iacenti venter sentitur mollior, & tument breui crura. In hypofarca moles vniuersa transmutatur: ac propriam formam amittunt, albescent totæ. Sed dum vniuersusque speciei exempla plura adferemus, hæc omnia lucidiora euadent: & antequam signa mere prognostica explicemus, aliud hic exemplum prius adferemus.

OBSERVATIO XXX.

De hydropè à muliere empirica & mendica excitato, qui postea curari non potuit.

Quidam extra urbem in Castro habitans, cum tertiana febre intermittente laboraret, neque remediis opportunis vti vellet, cum tam facile pellatur, & non diu daret, muliercula mendica cum præforibus stipem peteret, nescio quibus herbis sanitatem eidem pollicebatur: qui cum annuisset, nescio quibus herbis, iisque permixtis, tam frigidis quam calidis (maxime vero vtrique) concisis & decoctis, potionem ex iisdem paratam obtruxit, & intra diem subito venter inflatus est, febre quidem illum relinquente, sed in atrocius malum incidente; ita vt ascitem incurreret. Collectio autem huius humoris aquosi plurima existit inter membranam peritonæum appellatam & intestina, vt vere vtrius modo membrana ipsa repleta esse videatur. Spatium etenim, quod inter peritonæum & partes ei subiacentes est, aquoso humore impletur, Gal. teste 5. de loc. affect. aliquando vero, ubi peius habent agri, vsque ad femora tumor producit, vt Aetius asserit, quod huic postea etiam euenit. Quod ascites esset, his notis deprehendi: primum quod multum vrine in illo ge-

nerabatur & reddebatur; sed paulo post suppressum est, & in venis remanebat, & grauitatem & pondus faciebat. Cum vero corpus moueretur, sentiebatur aqua fluens veluti per canalem. Si enim abdomen implellemus, aut ipsemet corpus in alterutrum latus prouolueret, fluctuantis humoris sonus obaudiebatur: fluctuationes enim si excitentur in ascite, sit ex humore, qui veluti in vtre quodam contentus circumuoluitur. Vrina admodum pauca erat, eaque fere crassa & rubicunda, cum præsertim morbo initium jecur dedisset, vt hic factum videbatur, febre subito consopita, & hepate refrigerato tandem atque læso. Erat autem huic aluus tumida, eleuata, vt rumpi videretur: quantum manu percutebam, aqua, vt in vtre collecta, sonabat: vt merito morbi, iste ascites ab eo id est, vtre, denominationem duxerit. Verum licet hic morbus etiam febricitantibus contingere possit, id potius hic à medicamento perperam administrato euenit, iecore tandem & ipso oblatro, sanguificationis officio intercedente. Ad hunc, cum Alemaria hoc tempore habitarem, saepe euocatus sum, & cum medicamentis aptis vti nollet, venter ad summam molem excreuit: vt postea necessitate coactus, ea admiserit hydragoga medicamenta, quibus venter detumesceret. Verum rursus ab iis in totum abstinendo, luna potissimum accrescente mirum in modum malum accreuit per plures menses. Sed inter reliqua pharmaca nullum magis iuuabat, quam sequens medicamentum, quod vna cum altero medico Harlemensi apud eundem agentes præscripsimus. ℞. succi iueos ʒ ss. aquæ casei ʒ ij. mellis crudi ʒ ij. (aliquando ʒ i ss.) fiat horum leuis ebullitio, & coletur; cui colaturæ adde, & in ea dissolue spicæ nardi ʒ ss. cinnamomi ʒ j. diagridij ʒ iij. misce, detur in aurora. Ex eo semper habebat ad minus octo sedes valde aquosas. Verum postea hic plane omnia repedia contempsit, vir sui cerebri; ita vt lecto oianino decumbere per multos menses coactus fuerit, vt in eius naribus ac eruribus vlcera suborta fuerint, quæ in hydropicis difficulter curantur, à quibus magna copia aquæ effluebat per lectum, etiam solaria transeundo. Tandem, postquam per octo menses lecto misere decubisset, & miseram vitam absque medicamentis traxisset, vltimum diem obiit.

SCHOLIA.

Inferiora tum pedes huic inflabantur, at superiora arefiebant, vt in ascite fieri assoler, cum & femora tum pedes insentent, & aliquando in scrotum descendat humor: in fine tamen aliquando contingit, morte instante, manus quoque inflari, quod pessimum signum esse volunt, debilitatem cordi communicatam esse; vnde cor non potest defendere manus ab inflatione. Sed quod ad signa prognostica attinet, causarum prius distinctio ponenda est, & præcipue obseruanda, cum ex iis grauitas morbi coniiciatur. Hinc communis opinio habetur. Quam & Donatus sequitur, quod tympanites periculosus sit, minus eo ascites: scilicet quæque aliquando curabilis sit, per ea quæ cuius adhibetur humoris detrahentia ac resiccantia pharmaca, vt Aetius inquit, Iacchinus aliter sentire videtur, cum ita scribit: Soluenda autem nobis (inquit) quæstio est quam iuniores mouent, quæ habent affectionum sit deterior. Alij enim, vt Auerb. 3. Colligit. tympaniam dicunt: ratio, quia non est hæc sine calore, nec potest sine calore flatus discuti: vnde duplex incommensuratio in cura sequitur, & augmentum scilicet flammæ.

Medici
Brachatos
habent.

6

Verum
ascites
fiat
à causa
calida.

flatuunt, & augmentum dyscrasie calida. Videre quantum proficiat ars sine experientia. Nec enim distinguit veram rationationem à falsa. Miror Brachatos hos medicos primum non esse experientie innixos ad problema soluendum, mox rationibus certasse: sed nimis addicti erant scriptoribus, ita vt nihil ab artis operibus vtilitatis assumerent. Ego vero (inquit Iacchinus) à iuuenta perpetuo euentus omnes ægrorum obseruavi: vidi quæ ceteris paribus de etate & robore, hydropas, qui anasarca dicuntur, facilius curari: quod si contendere ratione oporteat, quia causa minus est rebellis: nam proxime hi ad sanguificationem accedunt, nec vires adeo imbecillitas habent. At in ceteris membra alimento destituuntur, & omnia imbecilliora. Adde quod sepius hic casu euenit ex mala vultu ratione, vt crapula, cum dimisso exercitio, aere humido, & crassis cibis: & sic videmus pueris aliquando contingere. At hæc facilius sanatur, vt Veritas & Galenus testantur. Alij curatu faciliorem dicunt: significatur enim robur nature, cum ad omnes partes diffunditur id, quod noxium est. Quod si tympaniam compares asciti, facilius curam hæc recipit. Ratio distat, quoniam à minori defectu sit, a. aph. 11. quia humida substantia sine calore aliquo in flatus non vertitur: quare vires minus imbecilla facta sunt. Sed & alia est causa, quoniam, vt diximus, malum à vtre ortum habet: & sic non est tanta lesio principis partis. Aetius tympaniam periculosiorem facit, sed nullam causam affert, nisi quod incisio adhibetur iuuans. Ad Auerb. vero rationem dico, veram fuisse, si ex intemperie calida fieret. At non sequitur, Ex maiori calido sit: ergo simpliciter ex calido. Sed in Veritate, si deprauitate morbi recte iudicare debeamus, à fortitudine causa inchoandum. Siat ergo, Tympaniam à scirrho ventris factam vel mesenterij, multo deteriorem esse ascite à frigore jecoris facta, ob causam naturalem, & fixationem. Ideo qui comparat cetera omnia, comparare debet paria, de causa, de etate, & aliis, quæ possunt vim morbi & periculum augere. Altera quæstio est: quoniam possumus ascitem à causa frig. hepatis semper fieri, ex Gal. ideo querendum venit, num & à causa calida, vt posuit Auienna, quem sectantur iuniores omnes, ponentes hydropem à causa calida. Similis sententia fuit Auerb. 3. Coll. Sed & verisimile est, hos videri multos calidis morbis laborantes, qui hydropici forent; vt cum intemperie jecur labore nimium calida, vel phlegmone. Et quidem nos vidimus hydropicos, quibus aderant signa caloris in jecinore. Confirmatur hoc, quia sæpe iussu flauo calore apparent, & vrina colorata valde colore rubro, vel flauo. Quare stabit cum calida jecoris intemperie hydrops. Quod si ratione contra hos contendere velis, quoniam generatio aquæ vel flatus est à calore diminuto, & ita necessario ex frigidityte, respectu naturalis temperiei, respondunt, in cr. iussu extraneum calorem & morbosum; imminutum vero naturalem cuius vultu est concoquere: & ita refrigeratum jecur esse calido innato; sed calidum calore extraneo. Quod vero hoc sit, patet, quoniam ad acutas febres sequitur; non alia ratione, quam quia extinguitur calor concoquens. Hæc quæstio necessaria est; quoniam posse oportet, num opus sit semper procedere cum calfacientibus in hydropè: an aliquando sit refrigerandum. Profecto ego non video quomodo possit à calida intemperie gigni aqua. Scimus enim quod omnis immoderata intemperies deicit opus & facultatem 3. de sympt. caus. 1. & ita omnis vitia colligionem: Sed diuersimode, vt Galenus ibi ait. Nam frigida frigidos semper affectus parit: calida calidos: quod est affare & in bilem vertere, & scicare, quamuis ergo calor natiuus sit debilis, ager tamen jecur calore quem habet in cibis: & hic est calor acris, & mordax & exurens. Ergo plurima bilis gignetur dum ea viget intemperies: sed cessante ea, & resincto calore præter naturam, cum etiam imminutus sit calor qui secum dunt naturam, erit jecur frigidum: & ita frigiditas eius ad calidos morbos potest succedere per resolutionem. Ad

Pet. Forest. Tom. 2.

ea vero experientia quæ adducebantur, dico primo, non esse inconueniens de hydropè tympanite, quod fiat ex calido circa viscera vehementiore: dum in vtre, vt intestinis copia adsit pituita: quod aliquando euenire potest, ubi homo calidi jecoris vsus fuerit victu apto pituita generanda. Scimus enim quod ratione materia sit à vegeto calido flatus, 14. method. cap. de priapismo. Reliquis vero morbis calidis succedet quidem ascites aliquando, sed non comitabitur. Potest etiam contingere, vt in calido jecinore scirrhos eueniat; vt lienis vitio, vel exussione alimentis & sanguinis, vnde refrigerentur mesaraice venæ, & si me jecoris, & obseruantur venæ illæ: vnde alimentum crudum & aquosum permaneat, & exsudet in vtre. Sed semper à frigido fiet, vt patet. Quod vero additur de vrina nihil est: ipsi enim exiguum mingunt; & vrina diu detinetur, vnde rufescit. Gal. tamen 2. Prognost. 2. hydropem ponit factum ex inflammatione lactium & ieiuni. Sed vult fieri tympaniam quia crudum alimentum detinetur per intestina, & à calore loci in flatus vertitur: & manet in vtre, ob excreticis imbecillitatem. Sed & de ea, quæ ex iecoris inflammatione fit, cap. 3. loquitur. Fieri vero ait, quoniam alimentum, & potio detinetur in lactibus: indeque resudat. Quod vero in iecur permeat, torretur: vnde biliosum fit, ex inflammatione. Quod vero insuper addunt, à sicca intemperie & humida fieri, falsum est. Nam ex his non vitiatur concoctio, id est, alteratio alimentis, nisi ubi iunguntur frigido vel calido: quod ego supra ex Galeno monstravi: sed alias noxas inferent. Hactenus Iacchinus. Non desunt tamen præter illos, qui Auiennam sequuntur, iuniores, vt Rondeletius, alique viri doctiores, qui hydropem à causa calida fieri volunt. Et sic etiam in vtramque partem disputari quoque possit, quæ nam species sit deterior. Memini enim, cum Louanij in scholis de hac fieret disputatio, quod ego contra Licentiatum, qui gradum Licentiæ accepturus erat, sustinerem hypofarcam omnium specierum pessimam esse, cum plura membra in eo læderentur; quam positionem tunc contra præsidem Leonardum Hieremias doctissimus defendebat, cumque acutus esset in disputando, ita vt Leonardus paulo calidior in disputando euadens, diceret, Ego Galenum legi antequam esses natus; cui libridens Hieremias, vt erat facetus, inquebat, Plura quidem legisti, sed pauca animaduertisti: Ceterum aliter disputatur in scholis, aliter in praxi re ipsa demonstratur. At omissa hac altercatione, demum ad Prognostica reuertamur. Omnes autem inuenerati hydropes, & qui habitum corrumpunt, sunt periculosi; vt etiam Aetius asserit. Iam quoque experientia edocti sumus, aliquas causas esse prorsus insolubiles, vt scirrhum, si in viscere eo sit; si vero in liene, ægre solubilem. Alij à tumore duro jecoris vel etiam lienis, insanabile malum esse volunt: sed & quando iam aquam intercutem facit, prorsus insolubile, siue in liene, siue in vtre, siue in lactibus sit; diu enim durasse & confirmatum esse oportet. Sæpe vero hoc malum, vt nunc diximus, per se incipit; sæpe alteri vetusto morbo, maximeque quartana, superuenit. Inter initia tamen non difficillima curatio est, vt exemplo vnius obs. 28. præceden. ostendimus. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur, Celsi auctore, faciliusque in seruis (si nondum radices egerit) quam in liberis tollitur: quia cū desideret famem, sitim, & mille alia tædia, longamque patientiam, promptius his succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare nō possunt, ad salutem perducuntur, vt idem refert Cornel. Difficile vero soluitur habitualis frigida intemperies: attamen non est impossibilis. Facillime

li ij curantur,

curantur, qui ex obstructione, vel ex victus ratione oriuntur: ut ex cibi multitudine: post hos illi, qui à suppressis menstribus. Curam etiam recipiunt illi qui ex profluvio sanguinis: sed quia raro fit sine scirrhis, ideo rari euadunt. Omnis item aqua inter cutem, si ex acuto morbo existit, mala est, ut liquet ap. Hippocrat. 2. Prognost. non enim sedat febrem, sed dolorem admodum infert, ac mortem, ut ipse inquit. Huic quoque affectioni non minus sceminae, quam viri sunt obnoxij: pueri vero ut plurimum ab hydrope farcite apprehenduntur, quæ quandoque curabilis fit. Sed quæret hic aliquis, quod ad ætatem attinet, quinam melius euadant: an iuvenes, quorum natura morbus est adversus: an senes, quibus est assinis? At experientia monstrat pueros aliquos euadere; seniorum vero nullum. An eodem proposito genere causæ morbificæ, magis periclitantur pueri, quam senes? quia magnitudinem causæ demonstrat. Hæc enim est causa 2. aph. 34. Sed licet senes de vita non periclitentur, rarius tamen morbo liberantur, ob vires defectas: quoniam branchi in valde senibus non maturantur. Non admodum formidabilis est aqua illa, quæ nullo antecedente morbo cepit; deinde quæ longo: omnium periculosissima, ut iam diximus, quæ ex acuto nascitur; & quæ à scirrho confirmato, non curatur; sic etiam vix à rescato nimis hepate: ab hydatidibus maxime. Phthisici quoque magna ex parte, eo quod icteri malum communicetur, hydroperi incurunt: eluvies enim saniosa atque virulenta viam inueniens, in iccoris substantiam diffusa aliquando obhæret, eiusque substantiam corrumpit. Quod vero aqua inter cutem laborantibus vlcera in corpore facta difficulter sanentur, idem Hipp. scriptum reliquit aphor. 8. lib. 6. & aph. 14. eiusdem: quod sit propter nimiam humoris abundantiam: Hydrope correpto (inquit) si aqua è venis in ventrem defluxerit, soluitur morbus: quemadmodum malum esse, si eisdem tussis superuenerit, decretum est ab eo aph. 35. 6. vel quod desperati, ut liquet aph. 47. 7. Signum tamen pessimum est, ubi vacuata vel sponte, vel arte materia, à fluxu ventris, si non sequatur alleviatio hydropticis, malum. Et iuxta eundem: vrina bicolor in hydrope lethali; sicut cum est rufa inferius: & linens superius: aut rubra superius, & nigra inferius. Ita egestio hydropticorum tanquam sanguis coagulatus, mortem propinquam decernit: ita & anhelitus restrictio, cum solutione ventris, & vlcere oris, gingivarum, & totius corporis: uti euenit Domino de Schagen paulo ante eius mortem. Ita & religiosa mortis proximæ vlcera multa in corpore apparere. Ita in ascite seu hypofarca carbunculi quasi pestiferi superuenientes aut anthraces, mortem vicinam prænuntiant. Omnis hydrops sequens peripneumoniam, lethalis.

OBSERVATIO XXXII.

De quibusdam ab hydrope curatis.

PVer 12. annorum, ex hydrope decubens Bononiæ in nosocomio Vitæ dicto, à præceptore meo Elideo ita curatus fuit: ℞. pul. soldanellæ 3 ij. aquæ cuscute agrimonie ana 3 j. quod illi exhibuit: & quamvis parua dosis profuit in puero. Deinde ℞. syr. byzantini, de quinque rad. ana 3 ℔. aquar. cuscute, eupatoriij, cicchor. ana 3 vj. misce. Deinde iterum moderate purgatus est, cum rhabarb. & soldanella, cum aqua agrimon. Rursus syr. præparatus vsus. Mox soldanellam puer denuo cepit:

OBSERVATIO XXXI.

De Leucophlegmatia, cum alui profluvio vehementi curata.

Scribit Hippocrates, si quis Leucophlegmatia detineatur, & fortis ventris fluxio superue-

rit, à morbo liberatur: ut patet aph. 29. lib. 7. Namque (ut Galenus inquit) ex forti, seu diuturno alui profluvio, soluitur alba pituita superabundantia. Hoc modo noui Alemarianam mulierem, ad quam curandam accitus fui, hydrope aquosa seu Leucophlegmata laborantem: quæ, cum in alui profluvium vehemens incidisset, mox ab hydrope & totius corporis mole inflata, miraculi instar, omnibus admirantibus, liberata est.

SCHOLIA.

AVicenna contrarium de hydrope in generali dixisse videtur, quod fluxus ventris in hydrope sit lethalis. Sed hoc ita distinguunt: in ascite lethalem esse, in qua virtus fere debilis est. Et sic Auicennam intelligendum esse volunt. Alioquin in hypofarca, cum virtutis constantia & robore, aliisque bonis signis, etiam si à natura fluxus factus fuerit regulariter, & non symptomatice, vilis est. Hinc & Rhases 7. Continentis, tum Auicenna ipse, potius laudant in ascite siccitatem quam ventris lenitatem. Attamen in hydrope anhelandi difficultas perniciem minatur: ut & si cito pariter alius superuenerit, qua nec venter obiter resideat. Hydropticis aliquando navigatio profuit: Nam Ioanni Blancke negotiatori Parisiensis, apud Hollerium, in Angliam profecto, hyeme tumor cum miraculo quodam subsedit: euauitque morbus, nec rediit. An quod integro, aut non ita lesa viscere aqua parum calore nativo excitato, parum aëre marino resoluta fuerit? Cuidam per sudores sponte exsiccatos, & quasi distillantem aquam, curatio: Alteri mors, cum multo alui profluvio tumor subsedisset, redeunte morbo. Cuidam ad viuum resectis vnguibus pedum, & frictionibus paulatim humor illuc defluxit: & conualuit. Oribasius tussim signum esse mortis pronuntiavit, ad aphor. 35. lib. 6. Verum hoc distinctione quoque eget. Si videlicet id fiat adancto morbo, & aqua ratione, qua tam pulmonum arterias asperas occupet, unde tussis: nam si alimide, non ita male. Sic quoque, iuxta Gordonium, à fluxu ventris, si non sequatur alleviatio hydropticis, malum. Et iuxta eundem: vrina bicolor in hydrope lethali; sicut cum est rufa inferius: & linens superius: aut rubra superius, & nigra inferius. Ita egestio hydropticorum tanquam sanguis coagulatus, mortem propinquam decernit: ita & anhelitus restrictio, cum solutione ventris, & vlcere oris, gingivarum, & totius corporis: uti euenit Domino de Schagen paulo ante eius mortem. Ita & religiosa mortis proximæ vlcera multa in corpore apparere. Ita in ascite seu hypofarca carbunculi quasi pestiferi superuenientes aut anthraces, mortem vicinam prænuntiant. Omnis hydrops sequens peripneumoniam, lethalis.

SCHOLIA.

CUm autem ex prædictis constet omnem hydroptis curationem difficilem esse, & plurimo artis auxilio opus habere: tamen iuxta Aëtium, inter initia non ita difficilis habetur: Celsus quoque an. 1. Curationis vero prima & principalissima pars ratio victus existit, non solum in aqua inter cutem, verum etiam in omnibus affectionibus, & potissimum periculosis, Alexand. restie. Et Pet. Forest. 1. tom. 2.

ceptit: & conualuit. Alter Mediolani decumbens, curatus est hoc modo: ℞. cass. rec. trach. 3 j. trochisc. de viol. sine scammon. 3 ij. pul. soldanellæ 3 j. misce, quæ r. accib. fiat bolus: ℞. rad. peros. feniculi, dauci ana 3 ℔. sem. fenic. anisi, dauci ana 3 ℔. cassia lignea, cinnam. electi ana 3 j. centaur. minor. pulegij, calamentib. ana m. ℔. rad. cucum. sylu. 3 ℔. in vini albi q. s. macerata per noctem & ita expressæ addatur rad. azari 3 ℔. granor. iuniperi 3 ℔. bulliant simul omnia ad consumptionem medietatis. Deinde fiat horum omnium colatura: cui adde syr. de byzant. de quinque rad. ana 3 ℔. exhibebatur omni die 3 vj. vel 3 ij. Continuatum septem diebus; sed in homine fortiori. Prius tamen potest addi rad. cucum. 3 ij. Deinde si necesse sit, dosis augenda. Potest & macerari in aceto. Vide Dios. Deinde capiebatur soldanellæ 3 ij. cum aqua vel succo conuenienti. Intermedio tempore sumebat 3 j. diacurc. ante cenam & prandium. Sed & hoc pulvere utebatur in cibis exsiccantibus: ℞. pul. seminis anisi fenic. ana 3 ℔. pul. ireos, sulphuris vini & extincti multos in aqua agrimonie ana 3 ℔. Abstinebat à potu quantum posset. Quibus curabatur. Vbi non succederet, fortius exhibebatur: addendo supradictæ decoct. soldanellæ 3 ij. saquinæ m. ℔. cantharidum 3 j. ℞. syr. byzant. de eupatorio ana 3 j. aque agrim. cassia, absinthij, feniculi ana 3 j. misce. ℞. trochisc. de eupat. de rhab. ana 3 ij. cum syr. de mentha, siant pil. detur vna, & superbibat ex syr. Si non cedat morbus, ætate ferente reiteretur decoctum & purgans conueniens: & intermedio tempore detur diacurc. Et post tres dies huius pul. 3 ij. ℞. centaurij minor. 3 ij. sem. feniculi, anisi, carui ana 3 j. misce. Si videbitur necessarium, decocto adde secundum, imo etiam tertium, granum cantharidum. Et si fiat corrosio ex dictis, iniiciatur talis clyster: ℞. lactis recentis 3 vj. axungie hircine 3 j. axungie porcine olei communis & dulcis ana 3 ij. cerussa 3 ij. sang. diac. 3 ℔. aqua consolidide maio. 3 ij. misce fiat clyster. Hoc modo iam præscripto vinum curatum scribitur, iisdem sæpe repetitis. Cum cautione tamen cantharides imponantur: nam in eodem nosocomio Bononiæ vidi in muliere plus obfuisse, quamvis in paupere & fortiore etiam hæc proficere: ℞. cass. rec. extractæ 3 j. trochisc. de viol. sine scammon. soldanellæ ana 3 ij. pul. liquir. 3 j. fiat bolus cum r. acc. ℞. rad. feniculi, dauci, petros. ana 3 ℔. sem. fenic. anisi, dauci, ana 3 ℔. pulegij, calamentib. sabine ana m. j. rad. azari 3 ij. granor. iuniperi 3 ij. cantharid. 3 ij. fiat decoct. in vino secundum artem, capiebat omni mane 3 vj. Deinde istis pilulis: ℞. pilul. mastice, aggregat. ana 3 j. elaterij optimi 3 ℔. cum syr. de eupat. siant pilule 5. quiescebat deinde per quatuor, quinque, aut sex dies; quibus utebatur pul. sem. anisi in cibo, aliisque supra repetitis. Et his æger sanitati restitutus fuit. At ego potius cantharidibus minime vtor; propterea quod ab iis viderim corrosiones; quamquam non dubitem in valde robustis prodelle. Hæc quidem vehementissima non nisi cum cautione, in robustis, & cognita natura, per vices adhibenda.

ideo in omni hydrope imprimis studendum, iuxta omnes auctores, roborare virtutem hepatis digestiuam, ac ipsius ventriculi; vitando cibos nocentes. Et ideo in omni hydrope omnes virtutes ac membra principalia, præcipue hepar ventriculum, roborabimus cibis rebusque odoriferis, moderate stypticis: & mandabimus ut moderate cibis euchymis & levis digestionis vtantur, mixtis aromatibus roborantibus, idque semel in die. Quæ omnes hydrope laborantes egregie iuvant. Sed hoc meminisse oportet, si quis hydrope simul & febre corripiatur, quod tunc post dimissionem febris, vel tempore minoris afflictionis cibi exhibendi erunt; & aque tunc etiam remedia commoda administranda. Eaque de re communem omnibus speciebus aquæ inter cutem victus rationem instituemus: & quasi vniuersalem prius aggrediemur: deinceps cuiusque particularem curationem. Ideo loci salubritas imprimis querenda est: montana loca, marina (sic quidam hydropticus inflatus ventre, manibus pedibusque & facie, à medicis desitimus, & tanquam desperatus, adis litus marinum, & nauicula per aliquot miliaria ascendit in altum maris: & provocato vomitu post vomitum exercitio viens; sanitati restitutus est) quidam aprica ac sicca regio inhabitanda. Propterea acriter eligatur ad calidum & siccum vergens: moderata autem sit, & probe temperata ipsa domus, secundum anni tempus, ut inquit Aëtius. Lectus non valde mollis sit, iis præsertim, qui anafarca laborant. Substernantur etiam arundinum folia, & herbar. resiccantes; velut est vitex, pulegium, calamintha & similia: tegumenta etiam ipsa, quibus teguntur, apparentur duriora: mirum est enim quantum huiusmodi per somnum resiccant; ut constat iam quosdam frumenti acervis obuolutos & absconditos, à somno surrexisse firmos ac testificatos, ut liquet ex eodem Aëtio. Somnus eisdem competit moderatus aut paulo breuior consuetos: namque vigilia moderata non minus conferunt: digerunt etenim, ut liquet ex Galeno 12. meth. med. Motus insuper, si quid aliud (ut Trallianus refert) hydropticis conducit; præcipue qui sit per mare, equum & lecticam. Iis autem, qui viribus constant, etiam ambulatio est vtilissima. Pariter frictiones hydropticis adhiberi debent: namque exteriores corporis meatus rarefaciunt, humores extenuant, ac discutunt, eodem Alexand. teste. Celsus quoque multum inambulandum, currendumque aliquando esse, præcipit; quamquam idem inter initia quietem, sitim ac inediam pro affectus curatione probauerit. Addidit etiam, quod superiores maxime partes sic perficienda sunt, ut spiritum ipsum contineat: euocandus est sudor, non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis: maxime viles naturales & sicæ sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrteis, ut ipse refert: modo autem vulgo sudatorium Trituli forte (ut Donatus putat) Sudatorium appellatur. Ac clibano uti volunt: non eo tamen modo, quo Gydone quædam è plebe muliercula cachecticum filium seu hydropticum temerario ausu dempto pane (ut scribit Benedictus Veronensis medicus doctissimus lib. 15. cap. 25. de curatione in communi, & de sicis sudationibus) subiectaque tabula in furnum coniecerat, inuitum acreclamantem, vicinis ad eam medelam opem ferentibus: nam in caput puerum intulerant: qui vaporem ocluso spiritu protinus suffocatus est. Remedium conferre indicio matri fuit, quod protinus cõticuit. Stabat ante furnum lata, sudoris desiderio: paulo post puerum percunctari cepit, nunquid calor prodesset videretur? Cum ille nihil responderet, suadentibus vicinis,

vicinis, ut puerum quiescere pateretur, ad dicatorem rediit; paulo post cum puerum extraxisset, exanimatum vidit, furni remedium, suamque & vicinarum temeritatem execrando. At nos tuto has siccas sudationes excitamus in lectulo humili, elibani modo lateritiis lapidibus modice accensis & vino albo extinctis, pannisque inuolutis, ne forte lintea succenderentur, atque ita ordine ab humeris ad pedum plantas eos lapides circumponimus, leuiter candentes, exserto ac immuni à vapore capite: tecto tamen sindone: tum sudores ter aut quater, interdum miro modo euocamus. Pares sudationes idem Veronensis viles tradit, in specu, in Mylo insula, saepe salutes: ubi vapor tantum queritur, sicuti super Baias inueniri tradit Celsus: *ut paulo superius diximus.* Iuxta Aponi fontes, ac in pluribus Italiae locis, & in Bolognensi agro ac Statiliensi, pares sudationes faciles constitui possunt, rapti in corpora vapore, quoniam balnea, & humores omnes dannauere. Verum neque sudor euocandus, aut corpus valde exercitandum, nisi prius corpore per-purgato. Cibus autem debet esse ex media materia, sed tamen generis durius (ut refert Celsus) tamen concoctu facilis & sufficienter coactus. Alexander laudat panem furnarium probe fermentatum, qui semina flatibus discutiendis apta contineat, *ut arisi, aut cumini, aut feniculi, cuius etiam copia vitari debet.* Et si optimus elibantes: qui saltem annuum, & feniculum habeat admixtum, *intra Aetium.* Ex auiibus conueniunt perdices, turtures, phasianus, turdi, merula, sturni, & reliqui minui passeruli, qui pingues non sunt & inuicem & non improbantur gallinae, ac gallinae pulli, quamquam ferae, anes mansueti praeponi debeant; ut testatur idem Trallianus. Et quadrupedum item carnibus moderate comedant: & eas potius, quae non sunt pingues, praecipue ferinae, ut cervinae, aprinae & capreae ac lepores: quarum ius cum extenuante cibo paretur, apio videlicet, petros. daucus, pulegio: caualide, eringio, pastinaca porro capitato, ac aliis: praesertim hominibus ruralibus & nautis. Has easdem maxime assas, si gratiae sunt, assumere ipsos alienum non est. Verum tam assatis, quam elixatis semper aromatica quaedam redolentia adicias praesertim cinnamomum, aut caryophyllos. Ex piscibus gustari poterunt cancri, locustae & erinacei recentes. A leguminibus abstineant in totum. Inter bellaria concedenda sunt palmulae, nuges amygdalae, vuae pensiles, vuae passae, mala punica, pyra cocta, ac carice: omnia tamen moderate, neque omnia quotidie. In vniuersum tamen maximam ciborum partem in cœna accipiant. Quandoque etiam assatas cochleas; atque oua insuper assata gustare poterunt, ut Aet. visum est. Pro potu ut vinum tenue, praesertim vetus, itemque illud quod vrinam ciet. Aqua in vniuersum vitanda est. Verum quoniam incommodus est eis plurimos potus tantum praebendum erit, quantum ad infringendam aliquo modo sitim sufficit. Namque potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat: optimaque est, quae vrinam moueat, ut Cels. placeat. Si tamen sitis intensa insiet, parum quid delibandum dabimus; solatij tamen gratia. Inedia quidem in hydrope facilius fertur: sitis vero difficillima est, nec sustineri potest: propterea Medrodozum ferunt, Epicurei discipulum, cum hoc morbo tentaretur, neque æquo animo ferret intolerabilem sitim, ubi diu abstinuisset, bibere solitum, ac deinde euomere, namque si redditur quicquid receptum est, multum tædio demit alioquin morbum auget: ideoque in quolibet tentandum non

est id remedij genus. Ideo vinum auferendum, quædam dandum praecipiunt, cum cibo præparato quam tenuissimum, nec ultra quam ut vitam sustineat: & ut talis sit potus, quæ vrinam tantum moueat. Dulcia vero vina, & vinum mulsum, vitanda sunt: namque ex his sitis non sedatur. Epotum tamen acceptum optima eisdem medela est, ut liquet ex de simpl. med. facult. Quod si velint fa- & citis vinis uti, id sit absinthites, praecipue quod spicam nardi copiosorum recipit: vel apiatum: alii autem abstineant, ex Alex. Trall. testim. & ut summam dicam (cum Gal. 4. de rat. vi. in morb. acur.) quam nimium habere & quam plurimum laborare prædictis confert: nempe talis viuendi modus calefacit & exsiccatur. Hæc quoad communem victus rationem attinet, dicta sunt satis. Quantum vero ad medicamentorum rationem pertinet, communis etiam omnium curatio ab euacuatione incipienda est. Pauli & Alex. testibus. Ideo sciendum, quod omni hydrope conferant res euacuantes, incidentes, exsiccantes: tam interius adhibita quam exterius adinota. Et quamquam vniuersalis methodus sit in omni hydrope, ut materia, quæ morbum faciat, euacuetur, ut aquositas: tamen in ascite, perisplenia, quæ hepati minime inimica sunt, est procedendum: ideo cathartica vehementiora damnantur, præterquam in hypofarça quæ vehementiores sustinet portiones, modo vires adsint & ætas ferat. In tympanite vero magis per digerentia. Ita in hypofarça purganda est materia pituitosa: & ea danda, quæ aperiant & vrinam prouocent: idque magis in ascite & hypofarça. Sic & hepatis intemperies corrigenda, ac roborandum semper hepar, siue per consensum, siue per se fiat. Sic & resolutio ventositatum & humiditatum: & meatuum internorum & externorum apertio (materia prius præparata, & per euacuationem expulsa) saltem cum frictione ad solem vel ignem cum stuphis siccis, vel aliter, ut superius dictis est, omnibus speciebus hydropis curabilibus vident inuamentum præstare. Sed hoc quoque sciendum, quod quævis medicamenta quæ aquosos humores expellunt, atque diuretica sunt, si in pulvere sumantur, subtilissime vicia cum aquis vel decoctionibus propriis administranda erunt, ut facilius penetrent. Præterea & hoc obseruandum, ne tædio afficiantur multis remediis, quod medicamenta sapienter mutanda, & varia forma administranda, ne natura assuescat vni præsidio: ne medicamentum fiat vici cibum, non autem vici medicina. Et sic quoque medicamenta laxantia, roborantia, siue aperientia, quamuis sint diuersarum specierum, non sunt continuo adhibenda: sed vtile erit modo vnum, modo alium administrare: subinde vero & ex toto quiescere, ut natura cibo ac potu refocilletur, à multis remediis subinde lassata. Et ita quoque inter duo solutiva ventris, præstat aliquid deopillans aut aperiens medicamentum præbere, ut meatus aperiantur, & hydragoga commodius operentur. At vnice studendum, ut abstineamus à venenatis potionibus, ut enphorbio, colico gnidio, quantum possibile; & nunquam ad mezeceon, laurocolam, nisi cum cautione accedendum; cum mezeceon apud Persas vocetur rapiens viciam, & ab aliis faciens viduas: ideo, nisi coacti, non vitemur. Vide de hac re historiam apud Gradum de Francisco Sforia, duce Mediolanensi, qui tamen erat robustus hydrope laborans, & bene tolerans medicamenta vehementia: sed eius vici ita fuit debilitatus cum ea accepisset, ut inuenerit, se nunquam talem medicinam accepit. Ideo ut paulo antea diximus, alia vehementia cathartica non laudarem, nisi in hypofarça, & in fortioribus ac robustis: cum & hæc

valde

valde calida ventrem acius perturbent; & iecori inimica sint: quod si danda sint, ea quidem correctæ exhiberi debent: sed tutius ab iis abstinemus. Et ideo si fortiora sint propinanda, semper roborantia aliqua addemus, quæ jecur & ventriculum roborent, & propterea statim à portionibus laxantibus roborationi hepatis incumbendum, ut vis eius & conseruetur & roboretur. Obseruabimus quoque, ut causam ipsam, quæ hydroperem efficiat, auferamus: quamvis si ab hepate eiusque apostemate, abscessum scirrho, opilatione hydroperis originem traxerit, talis affectus primo tollendus erit ex propriis locis, ac diligenter hepatis prouidendum erit. Quod si per consensum hic affectus fiat, causa omnium primo occurrendum erit, siue ex liene fuerit, siue ex aliis partibus nam causarum quoque ratio habenda. Deinde ad id quod genitum est, erit deueniendum. Sed quia aqua collecta morbum facit & auget, ea tanquam causa primum auferenda est; ac ne augeatur, victus exsiccans, ut nunc diximus, institueudus. Sed & diff. 2. tio remedium à varietate causa sumenda: nam alia conueniunt in frigida alia in calida, ut apud Rondeletium videre licet, tum alios auctores. Curationem itaque Græci, ut Paulus & Alexander, ab euacuatione incipiunt: quamquam ascites & tympanites purgans medicamentum duntaxat, quod aquam educat, requirant: anasarca vero interdum venæ sectionem, ut ipsi referunt. Quin imo hic solus hydroperis, cum incipit, (Galen. lib. 4. de rat. vi. in morb.) interdum sanguinis detractione indiget, cum scilicet ex retentione, vel hamorrhoidis vel muliebrium, vel ex quapiam, quæ ita phletorica sit causa inceperit. Tympaniam vero & ascitem (ut ipse inquit) nullus per sanguinis missionem sanare est ausus. At in deiectione ventris & hoc quoque obseruandum: materiam prius præparandam, & meatus aperiendos: mox alius emollienda; imo in singulis hydropicis alius seruanda lenis est, si non natura, saltem aut clysteribus lenientibus aut glandibus. Quæ vero per alium infunduntur, cæteris hydropis speciebus traduntur, præterquam anasarçæ: præsertim cum cathartica aut vomitionis minus iuuat. Quidam vomitum ante cibum & post in omni hydroperis specie, morbi initio laudare: præsertim in ascite: sed ab imbecilliori inchoandum iubent. Verum ubi vires non sunt, id remedium genus relinquunt, nam proterit plurimum vires. Cienti vrinæ iuuat etiam in ascite, si admoueantur: etiam in hypofarça, per potum, cum in ambitu corporis aqua existat. At illa, quæ sudorem prouocant, non multum profunt in ascite, quia pauca aqua est ambitu corporis, in anasarça valde prodest. In tympanite, inquit Paul. cathartica quæ corpora colligunt, vitanda sunt, & quæ vrinam vehementer ciunt: nam ea melius mouetur cibis quam medicamentis. Verum si res cogit, ex iis aliquid, quod id præstat, cibo aut potui admiscendum est; qualis est iris, nardus, crocum, cinnamomum, & alia quæ Celsus ex præclaris auctoribus adferi: qualia & Paulus fere commemorat. Hactenus communiter de omni specie dictum sit, postea ad curationes speciales transibimus: exemplo hoc prius adhuc interposito.

OBSERVATIO XXXIII.

De duabus mulieribus hydropicis casu curatis, vmbilico perrupto & aqua effluente: quæ postea tamen ex recidua viciam siniebant.

Mulier quædam in Thessalia insula, (non autem Græcia, sed nostra Dacia) hydrope ad

desperationem laborabat, ventre ita prominente, ut disrumpi videretur. Cum autem hæc vici esset multis remediis, præcipue empiricorum consilio (qui ad eiusmodi insulas consueverunt) nec quicquam opis aut iuuaminis sentiret, tandem pro deplorata habita est. Sed paucis deinde diebus, per rupto vmbilico, ex ingenti mole aquæ, suo pondere ventrem prementis, magno impetu aqua purissima effluxit prius postea & paulatim usque ad congios fere 12. aut plures, ut ipsa nobis narravit. Atque sic, absque opera medicorum, vmbilico denuo ocluso, præter spem multorum conualuit. At tunc nihil remedium jecori adhibuit, ne denuo reciduum pateretur; & post plures annos, cum praua victus ratione vteretur, iterum venter in molem excrecere cepit: neque eadem fortuna, ut antea, curata est: imo remediis tunc nihil iuuantibus, ab hydrope infelix tunc obiit. Idem contigit mulieri Delphensi, ita ut quasi facta abscessu in vmbilico, aqua effluere per vmbilicum eo referato ceperit, sed non ita pura nec alba, ut in præcedente, sed admodum rubra, postea etiam instar carnis lotura. Ideo me, tum Cornel. Heydium collegam meum, tum duos chirurgos, vocari ad se iussit: adhibitisque optimis remediis, ab hydrope cum euassisse videretur, postea tamen cum stillatim rursus aqua rubra efflueret, ut in matulam vitream reciperetur vmbilico appositam, tunc remediis chirurgorum tantum vtens, tandem & hæc (licet à nobis satis curata) postea (ut à chirurgis nobis relatum fuit) obiit anno 1561.

S C H O L I A.

Accidit interdum casu & fortuna sanari nonnullos, quos medicina curare non potest: ut huic priori mulieri euenit; quamquam multos annos facta recidua, & iterum in hydroperem prolapsa, eodem malo obierit. Altera quamuis fuerit quasi curata, cum tamen ex vrina etiam videbatur viscera putrefacta, postea etiam obiit. Puer tamen, de quo prius dictum est, apud Benueonium, curatus fuit. Et sic ut idem refert, mulierem Benueonii, quæ dum aqua inter cutem adeo laboraret, ut cap. 10. de nulla de salute eius superesset spes, nescio quo spiritus im- abditis causis pulsa, de eminente quodam loco ad terram deuoluitur, & sic morbo liberata. Vero ad lapidem eliso dissectoque, ita prius omnis effusus est humor, ut quæ puerum ostendebat gestare videbatur, enixam crederes. Sed nec multo post, aut tempore aut labore idoneis ad hanc rem adhibitis præsidij penitus sanata est mulier. Recte dixit Argenterius ille doctissimus medicus (ut alias quoque diximus) tria esse, per quæ officia medica sunt, per naturam, medicum, fortunam seu casum. Sed quæ casu fiunt, non subiiciuntur præceptis, ut de his, qui ex vmbilico ex se rupto ab hydrope liberantur: quamuis simile quid his accidit, quod asciticis, quibus dissecto abdomine aqua emittitur, de quo Paulus Agineta lib. 6. c. 1. Huius exempla postea adferemus, nunc ad anasarcam seu ad viciam, & eius curationem accedamus: deinceps & aliarum specierum particularem curationem proponamus.

OBSERVATIO XXXIV.

De virgine ex mensibus suppressis in anasarcam incidentem: & de alia quæ postea ad empiricos prolapsa obiit.

Virgo quædam satis annosa, 40. annos nata, cui mensis longo tempore restricti fuere, tandem cachexiam incurtebat: mox vniuersa caro

li iij huic,

*Yonicus.
Dne extrin-
secus admo-
nenda.*

24

15

16

17

dem auctore vomitus aliquando prodest. Etiam extrinsecus adhibemus ea remedia, quæ vim immodicam exsiccandi habent, eodem Aetio teste. Quapropter, præter sales theriacales, ad insensibilem transpirationem veteres sudores prouocant; non solum exercitiis sub sole, & loco aprico factis (cum cautione tum conuenienti, ut ieiunio, & velato capite, ne repleatur attractione calidi,) sed & arena- rum vsu, imo in puluere volutationibus. Aliquando enim arena probe à sole ignita, aut pellibus similiter à sole seruata, agrum occulebant: capite tantum velato, & facie cum spongia assidue extensa, eodem Aetio auctore. Sepeliebant itaque robustos viros in littore maris, cum sol maxime ferueret, vsque ad tolerantiam: postea in lectulo reclinabant: Fluuiatiles etenim ac marinæ arenæ communem vim possident omnium lapidum: siquidem exsiccant carnem tumentem ab aqua inter cutem: ægroto videlicet in eis excalefactis decumbente, ex Gal. auct. 9. de simpl. med. facili. Nos in domum adferre possumus arenam, & calefactam inspergere. Aliqui in tritici acervis (ut ante dictum est) sub sole calefactis ægros reclinant. Post hæc aqua marina, aut aluminosa, aut sulphurea lauentur ægri; etenim aliquibus, qui ad eiusmodi lauacra affluerunt, ex ipsa aqua, tum ad deterrendum morbum, tum ad habitum valentiorum reddendum, suffecerunt. In hunc vsu & sulphureis aquis uti: & sulphureo prodest: cuiusmodi apud Italos in Patuino agro & Volaterrano reperitur. Prodest & ex marina aqua lotio, quæ nobis ex Oceano vicino est: vel aliter fassa, qua nos sæpe commodissime vsi sumus. Lege Paulum libr. primo, capite quinquagesimo secundo, Galeno 1. simpl. septim. qui potum & lotionem in his aquis laudat. Quidam iis infelicitate vsi sunt, quod sine delectu omnes etiam insanabiles curare volebant; ut & alij ligni decoctum tentarunt: idque inutiliter, quoniam sine delectu: Optime etiam conuenit & hiscataplasmatum admotio: eorum præsertim, quæ resiccare simul & visceribus firmitatem addere possunt: quemadmodum stercus bubulum resiccatum, non inepte cum posca, aut aceto multo imponitur, infarsa sulphuris quarta parte: similiter & cochlear crudæ, trita & imposita: agglutinantur etenim, neque discedunt, priusquam vniversus humor discedat, iuxta Aetium, & de his vide Galen. 10. de simpl. medic. Alij cataplasmata apponunt. De quibus vide apud Rondeler. & alios auctores, & Aetium. Sed corporum ratio habenda; in pueris, tum aliis, qui mollem carnem habent, magis reprimentia conferunt, ex malicorio, vbi culinario, malo cotoneo, myrti baccis & viis pampinis, per se, vel mixta cum aliis medicamentis resiccantibus. Verum, vbi prædictis affectio non cesserit, efficacius auxilium adhibendum, quod chirurgia præstat: fixatas, inquam, circa internum talum infligere oportet, in loco quatuor digitorum spatium supra talum eminente: ea profunditate, qua quis in venæ sectione vtatur: ita, ut per aliquot dies, per eandem humor frequens feratur: quemadmodum Celfo & Aetio visum est. Neque periculum vllum hic verendum est, vel in hydropis ascitæ pertusione: non enim coaceruatim humores illi euacuantur: & si quis velit excretionem plurimam facere eam cohibere, nihil vetuerit in talibus ipas fixatas linimentis obstruere, ligamentisque constringere: atque vbi rursus prodire quid velimus, laxatis ligamentis, & ablatis linimentis, gestatoque ac moto agro excretionem irritabimus, ut idem inquit Aetius. Postremo itaque medicamentis vel chirurgia vlcera infligenda sunt: quæ cum non

sanescant nisi sanato toto, fit vt multum aquosificatis emittant. Fiant supra talum (ut iam diximus) parte interna, per digitos quatuor. Quidam & supra cubiti iuncturas, & supra hypochondria & femora infligunt: atque in hunc vsu nonnulli flammulæ illius, quæ & clematis dicitur acerrimæ herbæ germinibus vtuntur. Sed hæc omnia postea exemplis lucidiora fient.

OBSERVATIO XXXV.

*De muliere, ex abundante & longo mensium profusio-
ne in anasarcam prolapsa, & curata.*

Mulier apud Delphenses, cum longo tempore mensium profusio laborasset, in anasarcam valde difficilem prolapsa est. Omnibus modis hic studium adhibuimus, vt materiam aquosam ad renes, per ea, quæ vrinas mouent, deduceremus: atque nequaquam valde aperientibus, ne menses magis mouerentur. Hoc iulebo igitur primum vsi sumus: ℞. syr. de absinth. 3 iij. aque absinthij (quia aperit & adstringit) aque graminis, beton. ana 3 iij. cinnam. selecti, spicæ nardi ana 3 b. (aperit & stringit) depuretur, ac ori iucundus reddatur: & fiat iuleb. pro iij. dosib. Modo etiam hoc decoctio vel eius amulo vsi sumus: ℞. rad. asparagi, graminis, feniculi, petroselin. ana 3 j. agrimon. cuscute, solior. sambuci, capill. Ven. polytrichi, ceterach. ana m. j. iunci odorati, nardi, ar. ana 3 iij. sem. viciis 3 b. cic. rub. 3 j. fiat decoctio in aqua communi, & vino Rhenano part. equal. pro 3 b. addendo syr. de quinque rad. de byzantiis ana 3 j. b. avon. cum 3 iij. cinnamomi, & fiat apozema insit clareti. Postea etiam addendo rad. ebulli. Purgauimus cum 3 j. b. syr. ex infus. rosar. pall. addendo 3 j. b. rhab. puluer. dissoluendo cum 3 iij. decoct. suprascripti. Exhibui quoque 3 j. iheriacæ, cum vino generoso, pro sudore euocando: aliquando & diacurcuma, & post decoctæ aperientia & vrinam rursus cientia. Ita eandem purgavi pilul. de ag. arico de rhabarb. ana 3 b. cum aqua absinthij: sicut pilul. vij. Dedi quoque vinum abstinethites. Venam nullo modo huic secari iussi, cum debilis esset. Nam licet mensium profusiuum, quod diu durauerat, cessasset, cum & in hydropem hanc incidere: postea cum iis, quæ & vrinam prouocarent, & aquam educerent, curationem absolui. Quale hoc est: ℞. sem. hyperici 3 j. detur cum vino: quod etiam ab Aetio probatur. Capiebat etiam confer. absinth. adiectis speciebus diarrhod. abb. Ad roborationem hepatis regione inuncta hoc vel simili vnguento: ℞. olei nardini, absinthij, amygd. amar. ana 3 b. spicæ viridisque schœnanthi, asari, ana 3 j. cyperi, samali, rubr. ana 3 b. sem. apij 3 b. vnguenti samali 3 j. cere medicum: fiat vnguentum. Crura cum valde inflata essent, lauare mandauimus cum aqua marina, in qua decoctæ erant sambucus, ebulus, lauri ac iuniperi baccæ: modo fomento & balano descripto sub finem Observat. 24. huius libri. Quibus paulatim crura detumescere cœperunt. Et supradictis decoctionibus, tum purgationibus, aliisque roborationibus aliquando repetitis, sanitatem & hæc consequuta est.

SCHOLIA.

Dictum est prius, quod in hac, sicuti in aliis speciebus, causa ipsa auferenda sit. Et ideo si ex mensibus retentis sit hypofarca, facilius curatur, quod si ab iisdem aut hæmorrhoidibus nimium fluentibus contingat. Et ideo causæ obviandum, per se ipsum contrarium: & eadem auferenda, antequam ad coniunctam accedamus. Ita,

*Diligentem
medicinis
requirit
curatio
hypo-
farce ex
nimio
mensium
aut hæmor-
roidum
fluxu.*

ut priore exemplo ostendimus, si menses retenti, aut hæmorrhoides restrictæ in causa fuerint, sanguine ex talo, si vires serant dimittimus, mensesque tum hæmorrhoides euocamus: hæmorrhoides, quidem panno aspero fricando, aut sicum folio, vel cœpis: menses facilius medicamentis, quæ vna mensibus euocandis ac hypofarcæ satisfaciunt. Verum, si hypofarca ortum habeat ex nimio mensium profusio, aut ab hæmorrhoidibus nimium sanguinem fundentibus (ex hac enim causa hoc pathe-
ma subinde contingit, ut de causis dictum est) in hoc malo curando medicum solertem esse oportet. Nimio enim aut mensium, aut hæmorrhoidum fluxu spiritus dissoluuntur, imbecillumque redditur hepar: quare & hæc passio, quæ indenascitur, ac causa esse frigida dicitur. Et sic, quæ sistendis mensibus, aut hæmorrhoidibus conueniunt, hypofarcæ obfunt: & rursus, quæ hypofarcæ conferunt sanguinis fluxum promouent, augment, & huic nocent. Videndum igitur, vtro ex affectu plus periculi impendat. Vtemur tamen aperientibus, propter hydropem; mediocriter vero aut parum aperienti vi præditis, ob sanguinis fluxum. Interea si fluxus mensiuorum valde irriteretur, vtemur remediis topicis constringentibus, ex capite proprio desumptis. Ita etiam hæmorrhoides magis ex aperientibus & aquam educentibus fluant, hoc vel simili modo reprimemus: ℞. olei myrtini 3 j. olei cydon. mastichini ana 3 b. misce, inungantur hæmorrhoides mane & vespere. Aut sic: ℞. balasti, ofidia, gallorum, rbois obsonior. baccar. myrti ana 3 j. hypocyf. oxycanthæ ana 3 b. coquantur in vitio rubro & pauco aceto ad tertias: deinde chalybs multis vicibus in eo decoctis ardens exinguntur: fumus autem per anum recipiatur. Alia ex propriis locis postea dicemus. Caterum quod ad hypofarcam attinet curandam, materia aquosa per aluum purganda est, & etiam per vrinam cientia, ut iam satis ostensum est. Quantum ad medicamenta topica attinet, quæ exterius adhibentur, resiccantia, de quibus paulo ante diximus, quæ membrum tumentibus exterius admoventur, etiam discedenti vim habentia, qualia sunt sambucus, ebulus, vrtica, & elleborus albus, in aqua lixiuij modo decoctæ laudantur, expressa emplastri modo imposita; vel decoctæ si sæpe iis abluantur. Imo folia sambuci per se in tegula candente aspersa vino, imposita & alligata valent. Prodest & lixiuium ex cerri ac vitis cinere, in quo lauri aut iuniperi baccæ efferbuerint, addito nitro. Cataplasmata quoque ab Aetio commendantur, ex fermento & sale aut pane, cum puluere hyssopi, aut fabacea farina, aqua marina, & melle coctæ; pari absinthij modo adiecto, quale & hoc est: ℞. caric. & fermenti ana 3 j. farinæ hordeaceæ, subar. loliaceæ, fenugr. & seminis lini ana m. b. rad. & foliorum ebulli, sambuci, absinthij ana m. i. b. hyssopi & origani ana 3 iij. sulphuris 3 v. misceantur, & cum posca aut oxymel. fiat cataplasma. Vide plures & varias formulas apud alios. Sed mirabilis est historia vetulæ mulieris ab hydropem curatæ, quam Cornelius ille Roterodamus medicus, qui ante me Romæ agebat apud Giffibertum Horstium, hospitalis Mariæ consolationis medicum, præceptorem nostrum, mihi communi-
cavit: nempe, quod vetula quedam hydropicæ, ab aliis medicis destituta, ab altera vetula edocta, capiebat ranas rubras & feras, easque vivas in ollam nouam coniciebat, superinfuso oleo oliuarum, illisque sic decoctis, eo oleo ventrem inungebat, deducendo manus versus inferiora, & stomacho incipiens versus inguina, idque calide: & secundo die tumor descendit ad inferiora, ita vt mirum in modum intumescerent pedes. Sed cum proficeretur intum-

tionem, tertio die penitus delinuit tumor, cum nulla sensibili euacuatione. Laudat Gradus capitre proprio, si in balneis arte paratis imponatur rana vine & mirabiliter ad se attrahere aquosicatem, & refert rustici historiam, qui suo tempore, cum pestis grassaretur, anno 1450. ranas viventes scissas, & non scissas, venenosis apostematibus applicabat; & illico rana moriebantur, & apostemata foras educerantur. Et ita extratto veneno omnes liberabantur, quod audiui, inquit Gradus, à fide dignis, verum esse. Et ita non est mirum, si aquosicatem ad se attrahant, idque etiam in ascite. Sed topica non administranda, nisi præcellerint vniuersales purgationes. Ita ego frequētissime vtor, inprimis diacarthamo solutio in tabulis. Quo ipso memini me vsu fuisse in Cornelia, vidua Friderici Ottonis, quæ in foro Delphico habitabat, cuius adibus Meclimia pro insigni erat; vetula, cui pedes ac crura vlcerata erant, quibus medebatur chirurgus: quæ, cum facilis solutionis esset, singulis septimanis si 3 ij. tantum acciperet, plusquam sexies multa aquosa per aluum reddebat. Aliis dare soleo 3 b. vel 3 vj. pro vice, qui robustiores sunt. Sic matrona quedam nobilis hypofarca affecta, his remediis curata est: ℞. absinthij, agrimonie, ceri-
taurij, nasturtij hyemalis & aquarici ana m. j. sem. anisi, feniculi, cumini, ana 3 ij. rad. feniculi, petroselin. melle an. 3 vj. baccarum lauri 3 b. sem. geniste 3 j. soldanelle m. b. coquantur in duobus poculis vini Rhenensis, ad consumptionem terriæ partis, saccharo dulcoratur vel melle. ℞. succi ieros cochlear vnum, detur cum cyathis vno decoct. suprascriptæ. Vespere eiusdem diei, cum succum ieros sumpisset, capiebat 3 ij. confect. mithridatica. Aliquando sumebat 3 b. vel paulo plus diacarthami solutum in tabulis. Quibus & hæc conualuit. Sed si febris adeat (quod variis contingit in hypofarca, sed magis in ascite) aliter procedendum est ratione febris; vt Observatio sequens mon-
strabit.

OBSERVATIO XXXVI.

De anasarca, cui in principio febris admixta erat.

FRanciscanus monachus, cui nomen Iohannes erat, de Sancta Trudone, annos 30. natus, Alcmariæ anno 1557. ex chronico morbo prius, & fluxu ventris, quasi in hecticam febrem incidit, cum putredine nam & sumpto cibo incallescerebat. Cui & difficultas spirandi aderat, similiter & tussis. Tandem morbi diuturnitate, quæ hyeme præcedente durauerat, ad cachexiam deuenit, & ad hydropem hypofarcam, & lienis aliqualem duritiem: ita vt primo pedes intumescerent, ac edematum modo molliores ac laxiores fierent, & postea facies ac totum corpus tumidum euaderet. Ad hunc accitus sub finem Aprilis, anno 1557. cum tussis ac febris illum adhuc vrgerent, eclegma etiā ad hecticam aliquo modo conueniens, omnium primo præscripti: ℞. syr. iunibini 3 i. b. syr. viol. (ob hecticam, ad maiorem humectationem, licet minus anasarca conueniret) 3 b. specier. diarrag. frig. in tabul. sacchar. penid. ana 3 j. misce pro eclegmate. Hoc sæpius reiterato, tussis (quod mirum videbatur) fere in totum cessauit. Interea cum febris ad secundam fere speciem hecticæ progressa esset, cum putredine tamen, ideo pure refrigerantibus & humectantibus non opus erat, sed simul deopplantiis, quæ & putredini resisterent. Et quia iam fluxus ventris, qui

*Historia
vetulæ
ab hy-
dropem
cuius
tumor
descendit
ad inferiora,
ita vt mirum
in modum
intumescerent
pedes.*

sexdecimo, primo libro (de eadem aqua inter cutem cum febre complicata verba faciens) scriptum reliquit. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum unicuique aptum prescripseris, tunc ad ea accedito, inquit idem Alexander, quæ ipsos purgare possunt; non confestim & vna vice, sed paulatim. Ex frigida quidem intemperie aqua inter cutem affectos calefacientibus, imo neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare; sed per vices, & à mediocribus primum inchoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea, quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum collquant, quam abundantem humorem euacuant. Ita vero etiam, si refrigerantibus uti oportebit, à mediocribus incipiens, particulatim naturæ adicere conatur. Atque hoc pacto ad magis refrigerantia accediro. Postquam igitur ipsos purgaueris, ut conuenit, etiam ad balnea & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores, satius est naturali balneo committere: graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aqua lauacro, vntione, mutuatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita namque accidet, ut congruo vtentes victu, ad pristinam rursus temperiem reuertantur; ut etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem, in posterum generare queat. Alioqui si hypofarca, ut plerumque fit, sit sine febre & caliditate aut intemperie calida, tunc victu & aere exsiccante vtendum, ut prius docuimus. Refert Niculus Florentinus, de quodam comedente tantum alaudas (Caténaria h. e. vix credente) petroselinum impletas, cum pane biscocto, & modico vini subtilis, & velperi cum pane puro infuso in vino, & puluere sequenti asperso, ab hydropo curato. Pulvis talis erat: Recipe cinnamomi electi 3 ss. Caryophyllorum, galangæ, macis, anisi, amomi, lacæ ablutæ seu lotæ ana 3 ss. misce. Nocte vero sine potu degebat. Et sic curatus fuit. Quod ad medicamenta attinet, duas rursus intentiones habet; vnam ad materiam coniunctam, alteram ad hepatis malam dispositionem, nē noua materia aggregetur. Prima quidem absolutur medicamentis solutius, materia prius digesta, nempe melle rosaceo oxymelite simplici syrupo de duabus radicibus cum aqua hyssopi, cuscute, absinthii, feniculi, per quinque dies. Mox materiam euacuabimus, ut iam dictum est, sed iis, quæ hepati non noceant, cum & hepar in hypofarca debile sit, vitando colocynthidem & helleborum: iisque etiam per interualla adhibitis, quæ hepar roborent; minime contenti vnica euacuatione, cum materia rebellis sit. Primo dant hieram simplicem ad 3 vj. per se, vltque ad 3 j. vel 3 ss. cum 3 j. agarici trochiscati vel cum pilulis de rhabarbaro, de quarto in quartum diem, quibus N. colano se multos curasse fateatur, ex mente Guilhelmi, vel electuario diaphanico, aut Indo. Vide reliqua apud Gaténariam. Malam intemperiem amouemus cum 3 ij. diacurcum cum aqua absinthii, eupatorii & cuscute cum hepate lupi, & rhabarbaro. In calida vtitur syrupo de byzantiis, de cichorii confecto, diarbodo abbat. vel si timeamus caliditatem, trochiscis de rhabarbaro adiungimus diarbodum abbat. ut Gradus fecit in principe Sfortia, qui ab hac agnitudine curatus fuit. Causa

enim ipsa semper auferenda: ut si à frigiditate hepatis naturali fiat, reducenda ad temperamentum, calidis electuariis & vino generoso. Si ab obstructione, hepar aperiendum, ut capite de obstructione eiusdem. Si ab apostemate, curetur apostema, ut dictum est: Ita & de oppilatione plenæ, & scirrhi; si inde oriatur, curandum, ut postea capite proprio dicemus. Ita quoque, ut prius dictum est, si ex potu aquæ frigida, vel eiusdem balneo fiat, vtatur cibis calidis actu & potentia, vino vterî aromatico, aliisque calidis iam dictis. Si ex fluxu ventris, recurratur ad caput De debilitate hepatis, ob laxitatem suæ substantiæ, & ad caput De fluxu hepatico. Nunc ad propriam curationem ascitis veniamus.

OBSERVATIO XXXVII.

De Ascite.

Ascite quidam laborabat istis diebus, cuius venter tumidus erat, & adeo eleuatus, ut rumpi videretur: quem cum manu percuterem, aqua ut in vtre collecta sonabat. Sed cum virtute satis constaret, & recte ad oblata adhuc se haberet, neque febrem pateretur, & ex frigida causa ortum haberet, calidiorem victus rationem huic, & egregie exsiccantem, prescripsi; & humorem serosum statim euacuare decreui, cum ab euacuatione initium curationis institueretur; venæ sectione omissa. Quamobrem omnium primo hunc syrupum propinaui: Recipe syrupum de quinque radicibus de eupatorio capillorum veneni ana 3 ij. aquæ decocti absinthii, agrimonie, florum sambuci 3 ij. vel aquæ eandem rhabarbarum, si habean- tur, ana 3 iij. misce, depuretur adiecto cinnamomo se- lecto 3 ij. suauiore sapore & odore reddatur, sumatur quatuor diebus in diluculo. Deinde 2℥. diacarthami 3 iij. diaphenici, catholici ana 3 ij. syrup. de eupatorio 3 j. cum decocto sambuci, absinthii 3 iij. fiat potio, sumenda in diluculo. Deinde consului, ut hoc vel simile apozema caperet. Recipe radices ireos, ebuli, apii, petrosæ, feniculi, assuragi, brusci ana 3 j. agrimonie filipendule, pentaphylli, capillorum veneni, pimpinelle vireæ, vulgo beuennella dictæ, ceterachæ cassiæ, absinthii ana manip. j. azari, cassiæ lignæ ana 3 ij. pulueris cicad. 3 iij ss. (has Fontanonus maxime laudat) seminis apii, feniculi, dauci, petroseli ana 3 i ss. seminis geniste 3 j. cicervi rubrorum manip. ss. florum sambuci & geniste ana pugil. j. soldanella manip. ss. polyodii quercini, medullæ carthami, vel seminis eius contusi ana 3 ij. rhabarbari selecti 3 i ss. spica schœnanthi ana 3 ss. coquantur in duabus parti- bus aquæ communis, & vna parte vini Rhenensis, pro 3 i ss. colatu: addendo syrupum de eupatorio, de radi- cibus ana 3 ij. aromatum cum 3 ij ss. cinnamomi; & vtatur quatuor diebus mane. Purgauit hunc cum pilulis sequentibus: 2℥. pilularum de agarico 3 ij ss. pilularum de mezereio 3 ss. cum aqua agrimonie fiant pilul. v. dentur in diluculo. Postridie vero: Recipe theriacæ veteris specierum diacurcum, ana 3 ss. conseruæ capillorum veneni 3 i ss. Deinde omni mane sumebat 3 ij. vel iij. diacurcum in tabulis. Postea interpositis diebus, etiam illud, quod sequitur: Recipe succi ireos 3 j. mellis rosarum colati 3 j. cinnamo- mi 3 j. bulliam; & de sumatur cum 3 ij. aqua florum sambuci, vel sambuci decocti; detur vnica vice, modo

modo tantum sumendo drachmam dimidiam succi ireos. Postea ventrem inuinximus vnguento Agrippæ, maritato, & dialibæ simul mixtis: im- posito etiam emplastro ex stercore bubulo, cum oleo irino & vnguento Agrippæ. Crura vero tumida lauari iussimus lixiuio ex cinere vitis, in quo folia ebuli & sambuci decocta erant. Vomitus non pro- uocauimus: qui licet in principio aliquando conueniat, tamen quia malum aliquando pro- gressum, eo minus vti licet. Sed eius loco pilu- lis superscriptis ut vteretur vtile duximus: sub- inde & his, vel similibus: Recipe pilularum de rha- barbaro scrupuli duo, aggregati scrupulus vnus cum dimidio, elaterij grana tria, cum succo radicum ireos, fiant pilule octo. His quoque tabulis: Recipe specierum diarbod. dialacæ, rosarum nouellarum, trochiscati de rhabarbaro, ana drachma dimidia, rha- chari albißimi, in aqua eupatorii & cichorii dissoluti, fiat electuarium in tabulis, dosi drachmæ duæ, vel tres. Hoc cataplasma quoque, vel simile, ut ventri apponeretur proposuimus: Recipe foliorum sambuci manipuli duo, florum chamæmille manipulus vnus cum dimidio, radicem ebuli vncia vna cum di- midio, radicem bryoniæ, ireos ana vncia vna, baccha- rum lauri drachmæ sex, seminis anisi, cumini ana v- ncia vna, coquantur in aqua & vino quantum sufficiat ad molliendinē, addendo rebus tustis, sennæ lupinorum vncias duas, sulphuris vnciam vnam, stercoris vac- cini vel caprini drachmas septem, vnguenti Agrippæ vnciam dimidiam, mellis quantum satis fiat cataplasma. Atque his vel similibus sæpius cum summa salu- te plurimorum agrotum vti sumus; quibus & sanitatem consequuti sunt, si statim in principio ea recte adhiberentur.

SCHOLIA.

Ascitis affectum licet periculosum diximus, curatio huius tamen tentanda, nam non pauci ex ea euasere, multi vero tamen succu- buere. Quod ad propriam eius curationem at- tinet, si ex frigiditate sola iecinoris consistat, ut ex frigida, vel frigidi medicamenti vtu nimio, vel ex aliqua parte affecta, cui iecur consen- tiat, tunc cura tentanda est: atque inprimis ad materiam proximam respicere debemus, mox ad causas remotas, id est, affectus, quibus vel primario, vel secundario afficitur. Quod ad materiam attinet, intentiones curatiuæ eadem sunt, scilicet vacuatio. Sed alteratio hic exspe- ctanda non est. Nam serosus ille humor mate- ria sanguinis esse nequit: ideo ut toto genere præter naturam vacuandus. Sed vacuandi modo non iudem: nec enim hic sanguis mitti debet: sed inter vacuationes maxime conuenit purga- tio, ob purgandi excrementi vicinitatem. Vri- natia etiam conueniunt, quod facile aliquid aquosi humoris per renes traducitur, cum ta- men in eos, tum in cauiam venam refudat. Præ- terea faciunt ad distributionem in iecur, ex qua impedita dicebamus, maxima ea parte colligi in ventre aquas. Sudores minus conueniunt: quoniam non est in extimam corporis superfi- ciem humor distributus. Sat ergo erit, exerci- tiis moderatis vti, ad excitandum calorem: & reliqua victus ratio omnis similis sit hypofarcæ. Balnea quoque & potiones sulphureæ minus his conueniunt: tum quia his vires imbecillæ re- Pet. Forest. Tom. 2.

soluuntur maxime, tum quia sudoribus non multum iuuantur. Iuuantur igitur purgatione, vrinis, cataplasmatibus, incisione. Ac primum de purgatione agendum. Hæc autem per po- tiones fit, aut medicamentis, quæ ad venterem applicantur, aut clysmatis. Cum autem hu- multiplicia sint, ea afferam, quæ hodie in vtu sunt, & experta. Materia vero eorum, quæ aquosos humores ducunt, hæc est: Inprimis squamma æris, vel ær vstum, quo Iacchius se pri- mum, quod sciat, nostra ætate vsum refert: cum tamen Baesdorpheus antea eo vtu sit in Im- peratore Carolo Quinto hydropico, cum alij medici desperarent; qui se vnum remedium habere profitebatur Carolo Imperatori, sed eo se potius malle vti in rustico, quam in Imperatore. Cui Impe- rator respondit (ut nos à fide dignis accepi- mus.) Cogita te rusticum præ manibus habere, modo Imperatorem ita curaueris. Atque eo vtens illum ipsum sanauit. Rhazes quoque eo vtu est, ut refert Gradus. Addit Iacchius, Virumque optime debet coneri, atque in catapota conformari ex melle. Dosis à drachma vna, ad drachmam vnam cum di- midio. Admisce caryophyllum vel cinnamomum. Aliud vtitatum remedium est, cortex radicis sambuci in succum redactus. Dosis est ad vncias duas, & tantum- dem vini odorati. Benedictus Veronenis radicis sambuci, corticis succum ad quatuor drachmas quos- dam dedisse scribit. Alij radicis ebuli succum acce- tabuli mensura quotidie nouem diebus dede- runt, decrefcente luna; atque ita sanarunt hy- dropicos: vel vnciam vnam; egregie enim aquam trahit. Vti etiam facit cortex medius sambuci. Niculus vna vice dat vncias sex, decoct. sambuci, corticis mediani, idem dat ex succo sam- buci à drachmis duabus ad quatuor, & succi ebuli à quatuor drachmis, ad vnciam vnam. Quidam suc- cum ex sambuci cortice medio cum oxymelite propinarunt. Sed si rursus versus (ut quidam autumant) è ligno abradunt, vomitiones concit- tari; si deorsum versus, per inferna deduci tra- dunt. Aliud est iridis succus, ex radice expressi- datur cum zaccharo, quod faucibus asperita- tem facit: dosin idem Iacchius circiter vncias duas, vel tres esse vult. Vncia vna sæpe satis fuit in robustis, ut Observatione sequenti consilabit. Alij vnciam dimidiam dant, sed putum, nullam fere vim habet si decoquatur. Purus esse debet, abiecto sedimento: ex zaccharo vel syrupo vio- lato, aut ouo fortibili delicatius sumitur; & præ- stantissimum illud remedium habetur. Aliud vtitatum est soldanella siue soldanella, brassicam marinam dicunt: frequens est in Zelandia, & eopiose ad nos fertur: nos frequenter in de- coctis manipulum vnum, vel manipulum di- midium ponimus. Hanc male quidam putant esse eam herbam, inquit Iacchius, quæ appella- latur Cachile ab Arabibus: illa enim alia ad ma- rina brassica, & similis vñæ: & inuenitur ætate in nostro littore: qua in hunc vsum ho- die aliqui vtuntur. Soldanellæ succus vel po- tus, vel etiam folia siccatæ, & in puluerem re- ducta, dantur. Scio quosdam, inquit Iacchi- nus, & aqua exstillata vlos: ego vero non sum vñs. Hollerius tamen refert libro primo, capite trigesimo septimo de hydropo. Aqua exstillata è pur- pureis floribus ireos data, drachmæ sex, vel vncia vna quantitate, cum scrupulo vno, electa riasanta, & granis octo, cinnamomi, efficacissime aquam hydro- K k ij picorum

Historia Nicol.

4 Ascitis curatio propria.

Purgatio.

5 Vrinam cientia.

Sudores cur minus conueniant in ascite.

picorum ducit. Dosis succi soldanell. secundum Iacchinum, sunt uncia quatuor, ad sex, pulueris drachmae duae cum exiguo vino vel mulla. Donatus huius soldanellae vium non facile admittit, cum mirifice ventriculo aduersetur: & ipse pluries experientia vidit noxiam inferre, potius quam auxilium aliquod hydro-picis praestare, imo quosdam citius petiisse observavit. Sed quia hic frequens, nos tamen commode hac herba uti sumus. Praeceptor meus Benedictus Faustinus, in hunc modum dabat: Recipe absinthij fici, eupatorii fici, soldanellae fice ana drachmae duae, spica scrupuli duo, fiat pulvis, detur drachma una mane, cum aqua radices sambuci. Elideus praceptor meus, etiam Bononiae dabat, modo cum rhubarbaro, modo per se, cum aqua agrimoniae. Magna cum experientia in nosocomio vitae utebatur soldanella cum rhubarbaro, & passulis, & mulieres citius, quam viri curabantur: crede propter symbolum, quia frigidiore sunt, & calidiora medicamenta melius ferre possunt. Aliud est, Laureola solia siccata in umbra, & mox aceto asfusa, per diem unum vel duos, & rursus siccata, & in pulverem redacta; ac conformitatis melle, vel succo cotoneorum pilulis, duae sumantur ad ciceris magnitudinem. Aliud esula radix est, cuius cortex siccatus vertitur: & vimur scrupulo uno ipsius, addendo mastichen & rhubarbarum, cum succo rosarum: fac pilulas pro una dosi. Alia vero, quorum scriptores meminere, hodie (inquit Iacchinus) in usu non sunt: & profecto, si his, quae diximus, non satis vacuatur, inanis erit cura. At cucurbita agrestis in frequenti usu fuit & Graecis, & Arabibus: quo sic utendum: Recipe corticis, radices cucumeris agrestis scrupulus unus, infusatum insperge mulla. Si ne molestia (ut Hollerius quoque refert) pituitam ducit, nec stomachum laedit. Abominabilis licet sit urinae potus, tamen maxime probatur medicis. Tolerabilior, si ex puero impube destilletur cum melle, & aliis diureticis. Quod ad clysteres attinet, etiam acres adhibendi, nisi venter sua sponte humefcat. Tunc enim exsiccare ipsum magis convenit, ut inquit Paulus. Clysteres fiant ex decocto mercurialis, polyp. florum chamemilla, ebuli foliorum, & radicum, & caricis. Cuius Recipe librae viuis, adde mellis despumati uncias duas olei anethini, rutae, ana, unciam unam hiera picrae drachmas septem, benedicti. laxat. unciam dimidiam, salis communis drachmas duas. vel Recipe mercurialis leta, parietariae, ana manipulus unus, brassicae marinae, vel thymel. vel chamemilla manipulus dimidius, senae orientalis unciae duae, florum hyperic. genist. ana pugilus unus, anisi, apij, petros. ana drachmae duae, cartami uncia una, fiat decoctio, & in libra dimidia colaturae dissolue benedictae drachmam unam. Alij competunt ex radicibus ireos, cucumeris sylvestris, ex cyclamine, vel succo, cum urina hominis, vel cum sero caprarum: & sine oleo iniiciunt, ut Rondeletius facit. De urinatiis diximus. Aliqui dant posium, vel sampuchum in vino decoctum, vel iunci odorati, nardi, asari ex vino, vermes terrestres, ut Aetius, vel erinaceum terrestrem excoriatum, eiusque carnis in sole exsiccat drachmam unam ex vino tritam praebent. Paulus exhibet cochlear unum stercoris bubuli assi, ex vino potum quotidie, sive auxilium, quibus

adiice ea, quae de anasarcha diximus. Vt Solutius mur quoque solutius exterius, si aeger debilis sit, aut valde laedatur: sic & si puer sit, & medicamenta recuset. Haec facile est componere ex materia vehementer ducentium aquas. Sed elaterium, & cyclamini radices, & lathyris, inter haec primas partes tenent, cum grano Cnidio, & vnguentum de arthanita maius: quale hoc est: Recipe succi thymelae, cucumeris agrestis, & brassicae marinae ana uncia duae, succi aristolochiae uncia una, spica nardi, senae ana drachmae tres: excipiantur farina orobi vel lupinorum, & applicentur supra umbilici regionem. Verum quoque necant, etiam urinas mouent. Alij eadem supra vesicam, ex oleo rutaceo, & urinae pueri, ac succo pedis columbini parant. Ea enim, quae urinas mouent, aliquid faciunt: ideo his utendum est, sed non vehementer instandum, ut in hypofarica, ob diuersas causas. Vnde & Rondeletius, Mouent, inquit, urinas. Quare illud decet fieri, cum supradicta remedia urinam prouocantia dabuntur. Rhases tamen minus probat illa laxantia emplastra, cum maiorem inflammationem inducant in membris, quam medicinae debite correctae, & in debita dosi administratae. Verum ubi febris adest, & sit materia frigida, iis uti possemus, ut docti faciunt. Postea ad cataplasmata, quae emplastra vocant, descendimus: ac primum ex cochleis constat, antiquum sane. Oportet prius per aliquot dies humore excrementitio repurgatas sumere, & cum testis contundere, & lenigare: postea inspergere florem assij lapidis, calamitici fici, & rute siccae aliquod: linere donec sponte decident, idque toti ventri adhibendum. Eligantur marinae cochleae: fin minus, quae in montibus pascuntur genista herba. Aliud ex stercoribus, caprino, bubulo, columbino: siccetur prius modice, neque admodum retusa sint: postea componatur emplastrum cum sapa, addendo sulphur unum, cyminum, lauri folia. Alij addunt spicam nardi, schananthi, vel asari, vel valer. exiguum. Vltimo vero ad chirurgiam, si praedictis non curentur, deueniunt, vel ad cauteria, vel incisiones: de quibus postea. Nunc aliud exemplum ascitis adferamus.

OBSERVATIO XXXVIII.

De ascitico male tractato ab empiricis, qui postea aptius remediis curari non potuit.

Petrus Candidus dictus, calcearius, ex hydrope ascite cum diu decubisset, vir crassus & obesus, magnus, ut si quis alius, & robustus, Delphis variis usus est remediis empiricorum: cui tandem ab empirico famulo (cui Egberto nomen erat) qui illi sanitatem pollicebatur, exhibita fuere colocynthis & praecipitatum, ita ut in dies ad maiorem desperationem suae salutis deueniret, hepate ab eiusmodi medicamentis sine correctoriis, iisve quae viscera roborare debeant, plurimum oblaeso, in dies peius habere cepit: ita ut malum in hepate confirmatum fuerit. Vnde postea organo sanguificationis magis affecto, supra modum aquosa materia audacta, venter non solum in molem excreuit, ut in homine crasso & corpulento distrumpi videretur; sed ut etiam

etiam ad crura descenderit, & tandem in scrotum quoque aqua prolapsa, in herniam aquosam incidit, adeo ingentem, ut talem vix in vita viderim. Eo autem tempore, utebatur opera Cornelij medici illius senioris Delphensis. Verum cum indies burfa testium ita excreceret, & malum augetur, & medicus dictus illum pro deplorato reliquisset, qui eundem ad aliquot tempus tractasset, facta est consultatio, & accitus est Cornelius Ericus collegae meus, ac Hugo Nicuenius medicus Haghanus, atque me in tertium medicum amicum adoptarunt. Proposita autem fuit incisio ipsius scroti seu burfae testium, ut aqua hoc modo euacuaretur, inter reliqua multae ac variae rationes adductae sunt, ut & illud quod Iohannes Langius scribit lib. secundo epistoliarum, epistola 32. Praesens illud ex salis (inquit) subsidio, Hippocratis & Leonidis, ac Archigenis in hydropo remedium, animo memorie recondere: qui supra interrum citius edemate turgentis malleolum, quatuor digitorum spatium, scalpello, paulo quam in vena sectione altius, & in orbem cucurbitulae adaptato, ex vulnuscule sale conficatis, ne sanguis vel ipsa concreverent, inde iungi scaturigine aqua guttatum emanante, totam hydropis aquam inter cutem in alio sub peritoneo vel in testiculorum ofcheo reconditam, sensim educere. Idque verum esse, mea experientia comperi. Idem & Aetius Sermon. 10. cap. 30. & de sale lib. 6. de phlebotomia reiteranda. Alij autem in ascite, ubi aqua copiose colligitur in peritoneo, punctura utuntur, per quam aqua euacuatur, quae per aliam regionem perfectae non potest euacuari. Nec adeo periculosa est ventris apertio (ut censet Rondeletius) modo recte fiat. Nam videmus eos quibus vulnecratum est venter, euadere: visi vulnus penetret gracillia intestina. Praeterea vtilem constat esse ex euentu. Quibus enim casu per umbilicum aqua erumpit, hi sunt curati, ut alias & nos quoque ante exemplis docuimus. Quod si quis obiciat, hoc remedio tentato multos inuerrisse: huic respondebimus, id contigisse, vel quia facultas hepatis in illis erat emortua, vel postea sanguinem bonum gignere non potuerit: aut quia remanserit scirrhus hepatis, aut lienis; vel quia natus erat morbus ex pulmonis vlcere (phibitici propinodum omnes in hydropem incidunt) vel quia in thorace fuerat etiam collecta aqua, quae vacuata non est; quod ex tussi deprehendi potest. Hos desperatos esse dicit Hippocrates: sed sic intelligendum est, nisi veraeque pars pectoris aperiantur. In deploratis, qui ad extremam virium imbecillitatem deueniunt, qui scirrhum in hepate confirmatum, aut lienem, aut vlcus in pulmonibus habent, ac denique in senio confectis, non debemus hoc remedium experiri. Dum venter pungitur, non est spectandum ex qua parte, dextrae, an sinistra, malum coeperit, ut quidam religiosus observant. Nam nihil refert, utram partem faeces; cum ex utraque possit commodè vacuari aqua. Verum hic cum maxima pars aquae in scrotum vel burfam testium confluxerat, potius in ea incisio faciendae erat, ut docet Arulanus capite proprio de hydropo. Verum cum vires in hoc agro debiles essent, ac malum iam confirmatum foret, tandem conclusum est, ut non heret incisio, sed potius euacuatio humoris aquosi per convenientia medicamentata, ut succum ireos, & similia, preparatorii & attenuantibus remediis etiam praecedentibus, & euacuatione peracta, decretum est, ut ad loca medicamenta perueniremus. Sed, quod pene omiseram, tres dies antequam fieri consultatio, prius vocatus fueram, cum Guilhelmo de Dalen

chirurgo lithotomo: ac euacuatione vi ex decocto attenuantium, adiectis folijs senae, & agario, pro scroti inflatione fomenta adhibuimus ex decocto florum chamemill. meliloti, absinthij, rosmarini, anethi, flor. ros. corticum quercus, & similibus, & euaporatione ex praedictis sub sella facta, paulo melius habere visus est, antequam alij medici acciti essent. Idem affligebatur insigni dolore in ano, ex haemorrhoidibus & apostemate: pro quo symptomate mitigando, & dolorem sedando, una cum chirurgo haec infra scripta adhibuimus: 24. olei amygd. dul. pinguedinis gallinae, butyri recentis an. 3 lb. misce. quo loco dolens inungebatur. Mox & hoc fotu utebamur. 25. caput veruecinum integrum, una cum ossibus & cerebello, flor. chamemill. meliloti, folior. rassi barbat. foliorum malus, viol. ana man. j. radic. albae 3 lb. seminis malus, albae an. 3 lb. seminis fenugr. lini an. 3 lb. coquantur omnia in aqua communi q. s. ad perfectam molliitudinem; colatura fortiter expressa, calide locus dolens fouebatur; & haemorrhoides apertae sunt; & apostema quod erat in ano, ruptum est, multo pure excurrente, adeo ut dolor ibidem omnis cessauerit; intus etiam assumpto ad detersionem hordei communis decocto cum melle. Repurgato deinde apostemate bene habuit. Scrotum tamen inflatum permansit. Vnde alij medici praedicti vocati, postposita incisione, ob causas dictas, in homine quinquagenario, iam diu hydropico existente, Hugone medico tunc discedente, infra scripta una cum Cornelio Erico, collega meo, anno 1562. 22. Nouembris praescripta sunt; 26. florum chamemill. meliloti an. man. ij lb. summitatum absinthij communis, florum rosmarini, summitatum anethi an. manip. j. flor. ros. p. j. radic. albae 3 lb. (ob duritiem quae aderat) sem. albae 3 lb. coquantur omnia in vino Pictauiensi, ad molliitudinem, & expresso humore, leniter omnia haec conuoluantur, cui addantur, stercoris bubuli manip. ij. corticum quercus, subtiliter contus. & cribro exceptorum man. j. farin. j. farugiaci, seminis lini an. m. i lb. farina fab. m. i lb. palu. cumini preparati & cribati m. j. omnia misceantur, paulo liquore decocti adiecto, & oleo anethino, ad cataplasmatum consistantiam, profuit egregie. Interim 23. Nouembris, infra scriptum apozema fieri mandauimus: 27. quinque rad. aperitiuarum an. 3 lb. cereach. capill. vener. agrimoniae, cuscute an. man. lb. seminis genistae 3 lb. seminis feniculi, anisi an. 3 lb. sem. petrosel. carui, amios an. 3 lb. corticum rad. thamarisc. glycyrrh. an. 3 lb. vinar. passul. enucleat. 3 lb. fol. senae 3 lb. agari opium leuis & semini 3 lb. zinzib. 3 lb. soldanellae 3 lb. fiat omnium decoctio in aqua communi, & vino Rhenensi q. s. sicut infusa per noctem. mane huius fortiss. expresse accipe 3 ix. arom. cum pul. specier. diarrhod. abb. specier. diarrhod. dialacca, an. 3 lb. addendo syr. de eupatorio 3 lb. syr. de byzantijs 3 lb. fiat apozema pro 3. diebus. Quibus optime aluus soluebatur, cum detumefactione ventris & testiculorum. Utebatur autem victu extenuante, exsiccante, & abstinebat a potu, tantummodo parum vini Rhenensis sumebat, cum satis diues esset, licet calcearius. Postea capiebat 3 lb. vel ij. ex hac confectioe: 28. specier. diarrhod. abb. (nam urina tinctora erat, & vix videbatur liber a febre) 3 lb. diacroc. 3 lb. dialac. 3 lb. dissol. in aqua feniculi, adiecto racch. optimo q. s. fiat confectio in tabulis secundum artem. 26. Nouemb. haec praescripta sunt: Recipe radic. quinq. aperit. rad. ireos an. 3 lb. capill. vener. cereach. agrimoniae, hyssopi, cuscute an. man. lb. seminis anisi fenic. an. 3 lb. seminis genistae 3 lb. vinar. passul. enucleat. 3 lb. foliorum senae 3 lb. agar. leuis & opt. 3 lb. soldanellae 3 lb. folior. mezeronis 3 lb. zinzib. 3 lb. schananthi 3 lb. fiat omnium decoctio. K k iij in vino

in vino Rhenensi, & aquae petrosel. fœniculi part. aqua-
libus, & coquantur in balneo maris, & sicut infusa supra
herbas per noctem, pro tñ. j. fortis. expressi. adde syrup. de
eupar. 3 ij. syrup. de byzantiis, sine aceto (quia parum
tullebat) 3 j. misce, capiat omni die modo semel modo
bis: & egregie operabatur. 28. Nouembr. cum cy-
atho vno decoct. suprascriptæ fumebat succi ireos
3 b. pul. soldanella 3 j. in diluculo: & habuit sex se-
des admodum aquosas; ventre tum testibus de-
tumescentibus: Facta tamen pro bursa testium
enapuratione, ex floribus chamamill. melilori, corti-
cum querc. adiectis aliis iam supradictis, & emplastro
seu cataplasmate precedente admo 29. Nouembr. hac
sola inunctione contenti fuimus; & hernia illa
aquosa, bis exhibitio succi ireos egregie curata est
absque incisione: 2. olei anethini, chamamel. meli-
lori an. 3 b. misce. postea ad ascitem curandam &
aquam depellendam, 2. die Decembris hæc præ-
scripta sunt: 2. rad. quinque aperit. an. 3 b. rad.
ireos 3 ij. ceterach. capill. vener. hyssopi an. m. j. semin.
genista, anisi, fœniculi an. 3 j. semin. petrosel. 3 b. cort.
rad. thamaris. 3 j. glycyrrh. 3 ij. passul. enucleat. 3 j.
folior. senæ 3 b. agarici semin. soldanella an. 3 j. zinzib.
3 j. schœnanthi, spica an. 3 b. fiat decoct. in aqua fœ-
niculi, petrosel. & vini Rhenens. qu. suf. sicut per noctem
infusa; cuius expressionis accipe 3 ix. addendo syr.
de eupar. de byzantiis an. 3 j. arom. cum specier. diar-
rhod. abb. diacur. dialacca an. 3 j. misce. detur, ut di-
ctum est, omni mane. Postea 2. succi ireos 3 vj. pul.
soldanella 3 j. detur cum cyatho vno decoct. su-
prascriptæ; deiecit meram aquam citrinam de-
cies. Egregie venter detumuit, cum maxima al-
leuiatione. 4. die Decembr. cum aliquantulum
tussiret; hæc præscripta sunt: 2. syr. capill. vener.
3 ij. specier. diapieni 3 ij. b. specier. diareos Salomonis
3 j. b. zaccb. pend. 3 b. misce. pro linctu, sumat cum
baculo liquiritiæ ad libitum. 8. Decembr. sequens
sumpsit: 2. succi ireos 3 vj. pul. soldanella 3 j. b. da-
batur cum decocto vltimo præscripto, optime ad mira-
culum eduxit aquam. Interim diebus sequenti-
bus, pro roboratione viscerum vtebatur sequenti
elect. in tabulis. 2. specier. diarrhod. abb. 3 ij. spec.
diacurcum, dialacca, diareos simpl. an. 3 j. dissolut.
in aqua agrimonie, adiecto zaccb. albiss. q. suf. fiat ele-
ctuar. in tabul. Cœpit in dies venter detumes-
cere, tum crura ipsa; ac paulatim melius habe-
bat 16. die Decembr. rursus ex hoc decocto fume-
bat. 2. rad. quinque aperitiuar. rad. ireos an. 3 b. ca-
pill. Vener. polytrichi, ceterach, agrimonie an. m. b.
sem. anisi 3 j. b. folior. senæ 3 vj. soldanella 3 ij. vuar.
passul. enucleat. 3 j. liquir. rasa 3 b. coquantur in aqua
communi, pro 3 ix. fortis expressioni adde syrup. de eupar.
de byzantiis an. 3 j. misce. Sed tunc crux excoria-
tum est, & maxima copia aquæ quotidie efflue-
bat. Pecia lini cum vng. albo superinducta ap-
ponebatur, ob excoriationem. Eo decocto ab-
sumpto, iterum 3 vj. succi ireos. pul. soldanella 3 b.
cum decoct. cepit: deinde iterum elect. in tabulis;
& pedes detumuerunt; & quasi curatus videbatur.
Verum cum homo esset admodum crassus, mere
rusticus, & insignis ceruissiarum potior, iterum
largius ceruissiam bibens, à qua diu abstinerat,
cum iam aliquot diebus curationem vltiorem
intermisisset, iterum venter mirum in modum
inflari cepit; & crura denuo in maximam mo-
lem excreuerunt: adeo ut iterum 16. Ianuarij nos
vocauerit, anno 1563. Cum vero adhuc robustus
videretur, vna cum Ericio hanc potiunculam ex-
hibuimus. 2. soldanella 3 j. b. mezereonis 3 b. sem.
anisi, carni, dauci, fœniculi an. 3 j. b. bulliant in vino Rhe-
nensi sicut per noctem infusa, mane huius fortis cola-
tura accipe 3 ij. b. adde succi ireos 3 vj. misce. Ex-

hibita fuit mane potio in diluculo: ex qua semel
vomitus habuit. Sed postea per diem & noctem
sequentem copiosissime hæc ipsa aquam eduxit:
ita ut venter omnino detumuerit, tum crura
subsiderent. Hoc tamen medicamentum forte
est, quo non utendum nisi in robustis, quorum
naturam cognitam habemus: Nam & hic vit
quadratus & robustus, bene tulit, & optime pro-
fuit. Huic rursus & confectiones elect. in tabulis
exhibita, ad viscerum roborationem: & denuo
bene habere cepit: & tunc rursus à medicamen-
tis abstinuit. Deinde cum videret iterum crura in-
flari, denuo sequutus est muliercularum consilia,
quæ pedibus applicarunt & cruribus bolum ar-
menum, cum aliis reperculsiuis: vnde tam pessi-
me habuit, iterum facta recidua, multo peiore
precedente; adeo ut crura tandem in tantam mo-
lem excreuerint, ut ad cum uterque rursus acci-
tus, in vita maiora nunquam spectauerimus, in
homine licet magnæ staturæ & valde crasso. Imo
ex nimia mole cute suppurata, sub poplite vlee-
ra valde putrida cum putrefactione subsequuta
sunt: quæ nullo modo postea curari potuerunt.
Et post tres septimanas magis rursus intumescen-
te ventre, cum cruribus, subsequuta est febris,
licet lenta & leuis. Ita ut præhabito prognostico
17. die Februar. eiusdem anni è vita discesserit.

SCHOLIA.

Reciduiam ipsa radice, diximus in lib. Obser-
uatum de febribus, multo peiorem esse; &
hic præcipue: nam postquam muliercule illa re-
perculsiua femoribus applicuissent, ea ipsa statim
cum tanto dolore intumuerunt, ut nullo modo
sedari possent. Mox subsequenti suppuratione
sub poplite, deinde & febre, ventre semper ma-
gis crescente, tum cruribus, hic asciticus pa-
rum in fine curationis obferuans victus rationem,
& vita decessit. Semper enim ascitis grauis & sus-
pectus morbus est: & hic periculosior factus,
primo ab empiricis, postea in fine etiam à mu-
lierculis. Nulla præsidia, licet videbantur homi-
nem iam antea restituisse, postea viribus deiectis
vilo modo iunare potuerunt. Quibus modis cu-
retur ascitis, iam satis dictum est: semper habita
intentione ad causam coniunctam, nempe hy-
dropem; & ad remota, nempe malam dispo-
sitionem ipsius hepatis. Nam frustra, ut dixi-
mus, hydropem curamus, nisi malam intempe-
riem hepatis remoueamus; alioqui cito redit
aquositas. Multa sunt, quæ hic commendantur
à medicis: vi hepatis lupi, trochisc. de vhab. de quibus
vide Nicolum, Gateneriam, Arculanum, & alios
auctores, qui maxime Auicennam & Arabes se-
quuntur. Quomodo autem curetur à Græcis, iam
satis quoque dictum est.

OBSERVATIO XXXIX.

De ascite, ex hæmorrhoidibus constitutis & lienis
opilatione orta.

Nobilis matrona, Barbara Zuzia, vxor Ioan-
nis Heuteri, mense Octobri, anno 1578.
post hæmorrhoides longo tempore restrictas, quæ
consuetæ erant fluere, incidit in opilationem
lienis: & ex ea tandem in hydropem ascitem.
Venter huic tum pedes tumebant. Post multa ad-
hibita remedia, ad eandem sæpe accitus sum in
Hagham-Comitis, ubi tunc habitabat, & post
pacificationem è Traiecto eo venerat: capiebat
subinde

subinde pil. 7. ex aloë lota cum aqua saluæ, ad
hæmorrhoides aperiendas, præcedentibus deco-
ctis aperiitiuis. Et ad aquam educendam capiebat
pilulas exiguas ex mezereco, descriptionis Do-
nati (de quibus latius in scholio agemus) ab Altomari
cap. proprio de hydrope, quas idè pro ascite expertas
habet. Dat autem ipse 3 j. vel 3 ij. pro vice qua-
libet: sed quia hæc matrona debilis erat, capie-
bat tantum tres pilulas; & egregie aquam sol-
uebant. Gualtherus pharmacopœus Traiectensis,
ut nobis tunc referebatur, simili morbo labora-
bat, nempe hydrope ex hæmorrhoidum obstru-
ctione, quæ prius illi naturaliter fluere solebant:
verum hic singulis septimanis capiebat pilulas
ex aloë lota, deinde etiam istas pilulas ex mezereco,
descript. eiusdem Donati. Quibus solis remediis
fuit ab hydrope curatus; & hæmorrhoides denuo
eidem fluere cœperunt, mox ventre detumescente.
Nostra vero matrona, postquam bis accepit
tres pilulas dictas ex mezereco, hæmorrhoides
fluere cœperunt; post magnam liquidorum hu-
morum aquosorum euacuationem. Post decocta
aperitiua & pilulas sumptas, his nodulis in vino
suspensis & expressis capiebat vinum, nempe
cyathum vnum bis in die 2. ralse parilla 3 ij. ligni
sancti 3 j. canavisci recentis m. j. ceterach, chamad. an.
p. j. cort. rad. cappar. 3 ij. cinnamomi contracti. 3 b.
fiat res globuli seu puppa: 2. ligni sancti 3 ij. rad.
fœnic. brusci, asparagi, ononid. an. 3 j. chamad. saluæ
an. p. j. rad. asclepiæ seu hirsutidinaria 3 j. granor. in-
niperi, baccarum lauri an. 3 j. b. rad. caryoph. illata,
polypodij quercini an. 3 b. come absmb. m. b. fiat ma-
gnus globulus seu puppa: quæ coniiciatur in quartam
partem cupæ ceruissiaræ: qua ceruissia utebatur
pro quotidiano potu, tam pro lienis obstruccio-
ne, quam hydrope. Huic matronæ prius bene per
pilulas dictas repurgatæ post aliquos fotus con-
uenientes pro cruribus inflatis, sequens etiam
cataplasma cruribus supra modum inflatis, op-
posuimus: 2. rad. ebuli recentis m. vj. rad. bryonie
3 j. corticum exteriorum sambuci m. iij. folior. cucu-
meris asinini man. ij. calium rub. man. vj. folior.
maluar. man. ij. folior. altheæ m. iij. fursaris macri
man. v. florum chamom. man. iij. flor. melilori man. ij.
absmby exsiccati man. iij. decoquantur in aqua commu-
ni q. suffic. pistentur, addendo vnguenti Agrippæ 3 ij.
farinae bordei 3 b. fiat cataplasma, ut aris est. Hoc
cataplasmate crura inuoluebamus vsque ad ge-
nu: quo multa aqua effluxit, absque corrosione.
Est egregium, & pro arcano retinendum. Hæc
præscripta sunt in principio Decembris: 6. vero
die & hæc tabulæ præscriptæ: 2. specier. dialacca,
diacurcuma ana 3 b. specier. ros. spec. diacinnamomi
ana 3 j. dissolutis in aqua agrimonie q. s. zaccbari albiss.
3 ij. fiat confectio in tab. Lien applicabatur em-
plastrum de meliloto: & venter inungebatur vn-
guent. Agrippæ. Quibus bene se habere cepit.
Cæterum in principio Ian. anno 1579. cœpit pe-
ius habere, curatione paululum intermissa. Tunc
eam accessit quidam chirurgus Haghanus, qui
pollicebatur eidem sanitatem: at vir eius Ioan-
nes Heuterus prudens, ei auscultare noluit.
Præter alia remedia, quæ intus exhiberet, etiam
proposuit vesicatoria ponenda esse sub poplite,
in parte domestica, de quibus latius in scholio,
idque in vtroque crure, cum crura rursus valde
intumescent. Cuius causa ego denuo accitus,
in ea re illi assensui, modo non essent cauteria po-
tentialia, & cutem vsque ad carnem adurentia;
ea enim solent in cruribus cedematosis vlcera dif-
ficilia inferre, & subinde gangrænam, ut expe-
rientia in multis vidimus. Ideo vesicatoria leuia

concessi, quæ adhibuit, & vesica illata incisa
fuit: ex qua multum aquæ effluxit; eaque dein-
de per se consolidata est. Cæterum post aliquot dies
pustule per se in cruribus obortæ, insignem prur-
itum induxerunt; & me incisco, absque etiam
consilio chirurgi, caules rubros appolluere: vn-
de pustulis perruptis, & vesiculis effractis in am-
bibus cruribus subsequuta est magna corrosio, &
tandem vlceratio: & effluit continuo aqua, ut
vires paulatim deficerent. Ad 14. Ianuar. rursus
ad eam vocatus sum: maritus denuo voluit exhi-
bere pilul. de mezereco; sed in huius, ob viresni-
mum debiles. Interea propter vlcerationem, ne
accederet gangræna, imperauimus crura lauare
cum vino, in quo decocta erant folia vngulæ ca-
ballinæ, aliquid masticis, myrrhæ, thuris, & li-
thargyrii, etiam folio vngulæ caballinæ (quod
siccatum aderat, & recens tunc non inuenieba-
tur (loco vlcerato imposito, ne fluxio omnino im-
pediretur, neque nimium fluere. Vlceræ deinde
paulatim ceperunt melius habere, & dolor miti-
gabatur: quanquam illa semper in peius, quo ad
vires (licet venter aliquo modo detumesceret subinde)
vergebat; ita ut eam tandem morituram prædi-
xerimus. Cæterum vinum illius decoctionis, effi-
ciebat, ne fieret gangræna in cruribus. Crura ve-
ro eo decocto & lauabantur & inuoluebantur,
super vnum locum apposito folio vngulæ caballi-
næ, ne fluxio in totum restringeretur. Interea hoc
apozemate vtēs, videbatur quasi curata: 2. rad.
ireos viridis 3 j. rad. fœniculi petros. an. 3 b. agrimonie,
cassuthæ, ceterach, cheresolii, soldanella an. man. j. flor.
trium cord. ana p. j. semin. anisi, fœnic. carui an. 3 j. b. sc.
cartami contriti 3 b. medianori corticum sambuci m. j. fo-
lior. senæ 3 j. turpeti optimi 3 ij. vhab. selecti, agarici
albi semin. leuis an. 3 j. spica, schœnanthi, zinz. albi
an 3 b. vuar. passul. 3 j. liquir. ras. 3 ij. polypod.
querc. 3 ij. fiat omnium decoctio in tribus partibus vini
Rhenensis, & vna parte aquæ petros. ad 3 ix. clarifica-
tur arom. cum 3 iij. cinnamomi selecti & addendo syrup.
de eupar. 3 iij. fiat apozema, pro iij. dosibus mutatis.
Ex prima dosi habuit 7. secessus: ex secunda, post
tres dies assumpta, habuit enormes secessus, cum
magna angustia, ut putarent illam morituram.
At post secessus, continuo per plures dies reddi-
dit lotium; & venter ad miraculum detumuit, &
pedes; & præter spem multorum videbatur cura-
ta, & liberata ab hydrope. Vetus anno eodem
1579. in Septembri iterum venter intumescere
cepit. Post præparationem materiæ, & assumptis
bis tertæ pilulis de mezereco confluctis, 13. Se-
ptembr. iterum hoc apozema præscriptum est:
2. rad. ireos viridis 3 vj. cort. rad. fœniculi, petrosel.
ana 3 b. agrimonie, cassuthæ, ceterach, cheresolii ana
man. j. soldanella m. b. flor. trium cord. tot. medianor.
sambuci an. p. j. semin. anisi, fœniculi, carui an. 3 iij.
b. semin. cartami 3 ij. b. folior. senæ, absque stipitibus
3 vj. b. turpeti optimi 3 iij. b. vhab. selecti agar. alb.
an. 3 b. spica, schœnanthi, zinzib. albi, ana 3 b. vuar.
passul. enuel. 3 j. liquir. rasa, polypod. querc. an. 3 ij.
fiat omnium decoctio in iij. part. vini Rhenani, & vna
part. aquæ petrosel. circiter 3 viij. insulsus per noctem. &
mane fortissime expressis adde syrup. de eupar. 3 ij. cla-
rificetur, & arom. cum 3 ij. cinnamomi selecti pro 2.
dosibus mutatis. Vtebatur deinde dialacca, & dia-
curcuma in tabulis. 26. Septembris etiam purga-
ta est cum diacarthami solutiui 3 b. aliquando 3 vj.
in tabulis etiam hæc tragea præscripta est: 2. se-
minis anisi, fœniculi, cumini ana 3 iij. b. specier. dia-
calamemba 3 j. specier. diacurcuma, dialacca an. 3 b.
j. trochisc. de cappar. 3 b. cinnamomi selecti 3 j. bacca-
rum lauri m. v. puluer. subtilissime, & adiecto zaccb.
K k iij

Nov.

8 albiss. ad pondus omnium, sua tragea: dosi sit ʒij. Rursus 14. Nou. huic matrona nobili venter ex hydropo valde intumuit; & rursus accepit tres pilulas ex mezereo, descript. Donati & intermissis aliquot diebus hæc præscripsimus: ʒl. species diacarthami ʒij. racch. albiss. ʒb. fiat confectio in tabulis, dos. ʒ. b. singulis septimanis: & ex vna dosi quinque vel sex aquosos secessus semper habebat, aliquando & nouem secessus, sine torminibus. Has tabulas valde laudabat. Interea quotidie accipiebat mane cyathum vnum parum huius vini sequentis: & hora quarta pomeridiana alterum: ʒl. cineris rous finicis genista cochlearia duo infunde in pinta vna vini albi Rhenani optimi ʒss. hanc infusa calide supra cineres calidos per noctem: mane per manicam Hippocratis coletur, idque sepius; & fiat claretum. Et rursus exhibita ʒ. b. diacarthami in tabulis, habuit quatuordecim sedes aquosas liquidas piritosas, & non male inde habebat. Postea, cum videretur aliquo modo melius habere, curationem non prosequeretur, numero remedium tadio affecta. Sed 19. Febr. anno 1580. denuo ad eam accitus sum. Et cepit tunc peius habere, ventre magis intumescere, & aqua ad diaphragma ascendente, & pulmonem comprimente; vnde etiam difficultate anhelitus corripiebatur, tussis tamen non accedente. Et quia tunc satis secessum habebat, abstinuimus ab usu diacarthami. Bibebat tunc vinum Rhenanum bis in die, in quo decoctæ erant radices eringij, ebulli, ireos, asparagi, adiecta exiguâ quantitate cicerum rubrorum, & summitatum genistæ iam prius pullulantis. Et mense Martio procedebamus cum iisdem remediis, aliquando & supradictis. 19. Aprilis & hoc linimentum præscriptum, pro ventre: ʒl. succi ireos, succi rad. ebulli, & radices sambuci, succi hyoscyami an. ʒ. j. vnguenti Agrippæ ʒ. iij. bulliant simul ad consistentiam vnguenti mollioris. Rursus præparata materia cum decocto rad. ebulli, aspar. vt prius, 25. Aprilis ita eandem purgauimus: ʒl. rad. ebulli, vel eius loco, si desit, radice sambuci, asparagi, ireos, an. ʒ. iij. agrimon. cuscute, ceterach. an. m. b. soldanell. ʒ. j. flor. cord. p. j. sem. anisi, carui, an. ʒ. i. b. vuar. passul. enucl. ʒ. b. liquor. ras. ʒ. ij. coquantur in aqua communi & vino Rheueni, & m. ʒ. v. huius decoct. infunde per noctem, facta prius leui ebull. folior. senæ absque stipiribus ʒ. b. turbitib. gummosi ʒ. i. b. rhab. optimi ʒ. j. zinzib. squinantibi, spica cinnamomi an. ʒ. b. mane fortiss. express. adde diacarthami in tabul. ʒ. ij. syr. de eupat. ʒ. j. misce, fiat haustus brevis, detur mane in diluculo. Euomuit hanc potionem, quamquam adhuc ter plurima aquosa deposuerit. Rursus utebatur tabulis roborantibus suprascriptis. Interea dum aliquando redirem, & cum remediis vix vteretur, ac tadio præsidiorum afficeretur, & semper in peius postea procederet, vt vix ambulare posset, Heuterus eius maritus nobis ostendit literas ab Antuerpia transmissas, de muliere hydropica ab omnibus medicis derelicta, hoc modo ab hydropo curata: m. j. mediani corticis sambuci abradi, modo in poculo vno ceruissæ, modo in vino tantum infundebat, absque decoctione. Quo quidem vino continuo utebatur. Adhibito quoque vesicatorio, ad rotunditatem palmæ manus, ex fermento, cum 2. cantharid. in parte syluestri cruris. Quibus duobus tantum præsidii hæc ipsa mulier Antuerpiana curata erat, præter omnium spem. Hæc tamen nullo modo hanc iuuabant. Et à priore potione iam dicta, materia ex lumbis supra pubem prolapsa, non poterat bene redde-re lotium. Sed cum puluerem oculorum cancri sumplisset, cum exiguâ vino, ad cochlear vnum,

cepit mieri. Postea, cum secundo sumeret portionem prædictam, cepit plurimum mingere ita vt sexies copiosissime minxerit: & deinde ter quotidie aluum deponebat, limosa putida excrenens, sed in minori copia, quasi cum tenasmo. Sed paulo post melius excreuit, semel globulo excrementitio exeunte calculi instar durioris. Ceterum postea mense Martio, cum amplius medicamentis vti nollet, venter semper in maiorem molem excreuit: & quamquam nulla spes superesset, imo ante duos annos prognosticon feceramus apud maritum & amicos, eam ab hoc hydropo ascite morituram; attamen variis remediis, hydropica existens, cum vsa esset, vltra duos annos & tres menses vitam produxit: partibus superioribus, nempe brachij, ita exsiccatis & macilentis, vt corpus cadauerosum & præcipue facies, ante mortem cerneretur, ventre supra modum prominente, vt rumpi videretur, & femoribus ac cruribus valde crassiss & inflatis: & quamquam aqua quotidie ex cruribus efflueret, nihil tamen iuuaminis inde habuit; ita vt tandem 7. die Iunij anno 1580. è vita decesserit. Maritus quoque postea, anno 1582. in autumno eodem malo correptus, vitam misere vsque ad annum 1583. ætatis suæ 57. protrahens, licet aptis adhibitis remediis vtens, tandem interiit in autumno, cum per integrum annum hydropo laborasset.

S C H O L I A.

Pillulæ ex mezereo, etiam descriptionis Metuæ, licet serosum excrementum valenter purgant, seu aquas, & ob id hydropem iuuant; tamen illæ quibus nos sæpe feliciter vti sumus, aliter componuntur, iuxta Donatum ab Altero; quantum experientiam sæpius & ipse habuit, (vt refert. cap. de hydropo) quæ & citra noxam pluribus singulis septem vel decem diebus exhiberi poterunt: mirabiliter etenim serosos purgant humores, citra aliquod nocuum notatu dignum. Conficiuntur autem hoc modo: ʒl. foliorum plantæ, quam prius & communiter seplasiarj mezereon appellant, & proprie eius, quam nuncupat Dioscorides chamæleam ʒ. ij. vel iij. infundantur per viginti quatuor horas in sufficienti quantitate acetii vini albi, in quo prius mala cydonia fuerint decocta: demum in umbra exsiccantur; & iterum parato decocto ex pomis dulcibus & acetosis, in eodem aceto vini albi prædicta folia infundantur; & eisdem adijce hieræ picæ simplicis tantumdem: & cum succo radices inidis fiant pastilli, & seruentur: quorum dosi est ʒ. j. vel ʒ. ij. pro qualibet vice: interim vero ʒ. b. agarici trochiscati, aut rhab. vigorati, & tantumde trochiscorum ex myrobalechibus adijcere poteris eisdem namque catapotis, Deum testor (inquit idem Donatus) me nonnullos hac specie (nempe ascite) aquæ inter cutem laborantes, sæpius per intervalla eis exhibitis, perfecte curasse. Nec etiam parum conferunt pro curatione aliarum aquæ inter cutem specierum, vbi eadem purgatione indigeant: quemadmodum hoc in anno 1557. obseruauimus, in Illustissimo Petro Antonio Sanseuerino, Pignoni Principe; qui cum ascite simul atque anasarca laboraret, adeo vt fere à cunctis pro deplorato haberetur, vbi ter aut quater dicta catapotia per intervalla deuorauit, liber euasit: testes sunt nonnulli cum medici, tum magnates, qui ipsum aqua inter cutem laborantem, ac demum absolutum, & liberatum inspexerunt: quamquam non exigua etiam huic operi tulerit sudatorium. Trituli

14 Trituli hodie vocatum, cuius supra meminimus. Ceterum quia hic ab hæmorrhoidibus restrictis & liene obstructo hydrops inceperat, hæmorrhoides primo aperuimus cum pilulis ex aloë: deinde pilulis de mezereo cum vsa bis esset, aperta fuerunt hæmorrhoides: alioqui vsus fuisset illo remedio, quo frater Domini de Sprang in Hagha-Comitis vsus fuit, cum hæmorrhoides restrictas haberet: detergebat enim anum cum foliis ficuum: & aperiebantur. Hoc remedium describitur à Leonello cap. proprio: Medicamen, inquit, rumpens hæmorrhoidas: Accipe folia ficu, tempore quo habentur; & fricentur primo illa folia supra linguâ, quousque exeat lac: & postquam sic fuerint præparata, tunc cum eis fricentur hæmorrhoides, scilicet loca hæmorrhoidum: rumpuntur enim cum facilitate. Plura apud eundem egregia habes de curatione hæmorrhoidum. Sed de his suo loco. Verum cum hic hydrops quoque originem haberet à vitio lienis, propterea etiam quedam peculiaria eligebamur lienis conferentia, tam in decoctis, quam in purgationibus: & etiam in iis, quæ extrinsecus admovebantur: ita tamaricis decoctum in vino probatur, sic & ceterach. rad. capp. & scolopendrium adiecimus, vt agnum castum, tū alia, & radic. ebulli, cum sola radix ebulli ac cort. sambuci ex vino decocta tam lienem quam hydropi conueniant. Extrinsecus modo emplastrum de meliloto, modo amoniacum dissolutum in aceto, cum puluere ceterach & aliis lienem respicientibus, lienem imposuimus. Et quia hæc matrona melancholica erat, eo quod diu extra patriam ob bellum Traiecti agebat, etiam multis amissis bonis, diu laborauerat lienis duritie; quæ magis confirmata, subsequente ascite minus curari potuit. Quod & marito eius diu melancholico, ob eandem causam etiam euenit, qui simili hydropo interiit.

OBSERVATIO XL.

De ascite ab iſtero originem habente.

14 Da, vxor illius Petri Cornelij ceruissarij, in cuius cupis tres Glandes quæteruum pro insigni erant, mulier quidem crassa & obesa, anno 1580. sub finem Februarii, cum in dolorem dorsi versus hypochondrium dextrum incidisset, & ventositatem esse putaret; quæ magis magisque intendebatur: decoctum florum chamæmillæ in ceruissâ sumpsit. Sed eo dolore minime cessante multa biliosa euomuit. Tercio die tota crocea euasit, vt ex obstructione hepatis tum vesicæ fellis, dolor ille originem haberet, excrementis tum albis tum durioribus existentibus. Cum vero & hæc aluum difficulter solubilem semper haberet, quod alias in illa experti eramus, ischiade aliquando laborante, vt suo loco distulsi sumus; cumque dolor hic non solum dorsum, sed & ventrem totum nec non & hypochondrium dextrum occuparet; statim apozema sequens præscripsimus, ad eam acciti 29. Februar. ʒl. folior. maluæ man. ij. parietaria, absinthij communis an. man. b. flor. chamæmill. flor. cord. an. p. j. sem. anisi, feniculi, carui ana ʒ. j. b. prun. damasc. ma. ix. vuar. passul. enucl. ʒ. j. liqu. ras. ʒ. ij. folior. senæ ʒ. vij. agarici leuiss. semin. rhabarb. selecti ana ʒ. j. schœnanthi, zinz. albi ana ʒ. b. polypod. quec. ʒ. b. sem. canui ʒ. j. fiat decoct. in aqua communi: & huius fortis expressionis accipe ʒ. iij. syr. ex succo ros. solut. & ex infus. ana ʒ. b. misce, fiat haustus. Altera dosi maneat in infus. Euomuit, & vix retinuit. Et cum non solueret, glande acuta iniecta squibalas tantum eie-

cit. Et cum clysterem non admitteret ʒ. 3. Martij hoc sequens præscriptum est: ʒl. rad. cichor. dentis leonis an. ʒ. b. capill. vener. polytrichi, fumaria, folior. viol. an. m. j. (aderat enim & calor in hepate, cum obstructione) marrubij m. b. flor. cordial. p. j. sem. anisi, forn. dauci an. ʒ. j. sem. carthami ʒ. ij. b. sem. melon. ʒ. b. prun. damasc. num. ix. vuar. passul. enucl. ʒ. b. folior. senæ, absque stipiribus ʒ. j. polypodij quec. ʒ. b. rhab. selecti ʒ. j. b. squinantibi ʒ. b. fiat omnium decoct. in aqua communi, huius fortis express. accipe ʒ. iij. pro ʒ. viij. addendo syr. de succo rosar. de absinth. (vt potio minus dulcis esset: nam ipsa metuebat vteri suffocationem, in quam leui ex causa vel dulcedine incidebat) ʒ. b. fiat haustus brevis: altera dosi maneat in infus. Rursus euomuit; & à meridie tantum vnam sedem habuit, albam, duram, & non liquidam, dolore semper augescente. Ob quam causam & venam aperuissim: sed quia menses fluebant satis copiose, absque tamen alleviatione, à venæ sectione abstinui: & licet ex glande nihil excreuerit, tamen icteritia in lotio apparere cepit, eratque lotium crassum, citrinum. Cum & alteram dosin etiam euomeret, sexto Martij die hanc purgationem accepit: ʒl. elect. de succo ros. ʒ. vj. vix per horam retinuit, & multa biliosa cum angustia euomuit. Et glande nihil quam squibalam vnam deposuit: & cum dolor sub noctem magis intenderetur, tandem clyisma sequens admisit: ʒl. rad. althææ mund. ʒ. j. mercurial. betæ, maluæ viol. flor. chamæmill. meliloti an. m. j. marrubij m. b. prun. damasc. num. xij. vuar. passul. enucl. ʒ. j. semin. anisi, feniculi, carui an. ʒ. i. b. sem. lini ʒ. ij. coquantur in aqua communi, pro ʒ. i. colaturæ adde cassiæ pro clysteribus ʒ. j. benedictæ laxat. ʒ. b. diacathol. ʒ. ij. olei chamem. amygd. dulc. avethi an. ʒ. j. vitellum vitus oui, salis gemmæ ʒ. j. salis communis ʒ. b. misce, fiat clyster. non beate recepit: & vix totum intrauit; & non habuit inde secessum. Altero mane, ægre tamen, rursus admisit clysterem: & imposuimus benedictæ laxat. cass. an. ʒ. j. diacatholici ʒ. b. ex quo habuit sedem satis magnam, sed non liquidam, at albam & duram. Et menses adhuc copiose fluebant 7. Martij hæc præscripta fuere: ʒl. rad. fenic. petrosel. cichorij, dentis leonis ana ʒ. b. marrubij, capill. vener. polytr. agrimon. cuscute, dentis leonis ana m. j. flor. cord. p. j. semin. anisi, feniculi, ana ʒ. i. b. sem. end. ʒ. j. prun. damasc. num. xij. vuar. pass. ab arill. repurg. ʒ. j. liquor. rase ʒ. ij. folior. senæ absque stip. ʒ. i. b. polypod. quec. ʒ. b. rhab. selecti ʒ. ij. schœnanthi ʒ. b. bulliant in aqua communi, pro ʒ. ix. & fortiss. express. adde syr. de byzantiis, syr. ex succo ros. solut. an. ʒ. i. b. misce, fiat apozema pro iij. dosibus matutinis. Cum vnâ sumpsisset, denuo euomuit; quamquam ex illa habuerit vnum secessum: & postea multa & plurima biliosa per vrinam excreuit. Menses debito ordine fluentes, postea substiterunt. Verum, quia dolor in hypochondrio dextro permanebat circa stomachum, hoc fotu vsi sumus: ʒl. rad. althææ ʒ. i. b. fol. maluæ, viol. flor. chamæmill. meliloti ana m. j. flor. ros. rub. p. j. summation absinthij p. j. sem. maluæ ʒ. i. b. coquantur in aqua communi, pro ʒ. i. b. expressioni adde acetii ros. ʒ. ij. aquæ ros. ʒ. b. species diar. rhod. abb. ʒ. i. b. fiat fotus cum spongia. Cum parum iuuaret, & menses nunc non fluere, venam jecorariam in brachio dextro incidere fecimus, sanguine moderate extracto: & sensit leuamen. At postea adhuc dolore circa præcordia harente, alteram dosin decoct. vltimo præscriptæ exhibuimus: sed vix per horam retinuit. Ideo glande acuta imposita secessum habuit; & die subsequente per se excrementa deiecit, licet adhuc alba, & minus liquida. 14. Martij his tabulis utebatur, pro

pro dolore & ventositatibus circa praeordia haerentibus: *℞. specier. diacumini, diacurcumae ana ℥ j. specier. diarrhod. abb. trionfant. dialaccae ana ℥ ss. dissoluis in aqua floy. chamemill. adiect. r. acch. albiss. q. sufficit confectio in tabul.* Tertiam dosin decoct. cum sumpsisset, bene excreuit, & dolor cessauit, cum semper plurima crassa & valde citrina mingeret. Interea hoc globulo in ceruicia, qua quotidie utebatur pro potu, pendente expressoque vtens conualuit: *℞. marrubij exsiccati m. ss. rhab. seletti ℥ ss. croci orientalis ℥ vij. schœnambi ℥ ij. flos globulus seu puppa.* Verum cum hæc conualuisset, ad colorem citrinum per totum corpus permanentem depulsandum, varia muliercularum consilia huic mulieri propolita erant: vti lac cum semine cannabidis, croci paululo adiecto: verum illud vulgare remedium mihi non ardebat, cum Diosc. referat lib. 3. cap. 141. quod semen huius in cibo largius sumptum genituram extinguat, & ex Gal. 1. de aliment. facult. concoctu difficile sit, ac stomacho & capiti noceat, & prauis sit succi. Ideo, iuxta Matthiolum, comment. in 3. Diosc. lib. cap. 188. grauiter errant mulieres Italicae, cum pueris comitiali morbo laborantibus cannabis feminis decoctum exhibeant; quo tantum abest, vt morbum curent, vt etiam augendi occasione prebeant. Secundum erat aliud vulgare remedium radix vrticæ decocta in ceruicia, qua & plurimi sanati dicebantur: licet Matth. in lib. 4. Diosc. cap. 89. & Gal. 6. de simpl. tantum folia & semina in vfu esse scribunt. Tertium empiricum erat radix chelidoniae, etiam in ceruicia decocta: quæ magis mihi placebat, ex Diosc. lib. 2. cap. 176. cum dicat, quod radix chelidoniae maioris, cum aniso & vino albo pota, regio morbo medetur. & Gal. 7. simpl. ea vitur ad morbum regum jecoris, in vino albo cum aniso Brabantina quædam mulier, & longo tempora icterica, cum decocto rad. chelidoniae maioris, ad aliquod tempus vfa fuisset, aliis tamen medicamentis prægressis, & à me descriptis, ab ictero egregie euasit. Verum hæc altera ægra, de qua nunc loquimur, iterum 28. Mart. circa praeordia angustiam quandam sentiebat: quæ his pilulis exhibitis cessauit. *℞. pilul. aggreg. ℥ ij. pilul. de rhab. ℥ j. diag. gran. ij. fiant pilulae vij. egregie excreuit, cum aluuiatione: & recte habuit.* Verum hæc eadem mulier, cum curata esset, & iterum foras prodiret, denuo incidit in febrem, & tunc biliosa euomuit, & biliosa excreuit per se: & cum peregre esset profecta, incidit in maximam debilitatem. Quare ad eam accitatus 17. Aprilis, cum omnia medicamenta repperet, ex hac mixtura capiebat *℞. conseru. folior. acetosæ ℥ ss. manus Christi cum perlis ℥ vj. conser. borag. ℥ i ss. syr. de limonibus ℥ j. misce.* & febris eam reliquit. Sed non diu post iterum icterus illam inuasit, cum hepatis obstructione. Hoc infuso adhibito deuo conualuit. *℞. marrubij m. j. bulliat in aqua cichorij ℥ v. & in hac decoct. infunde folior. senæ Alex. ℥ iij. sem. anisi ℥ j. rhubarb. seletti ℥ j. schœnambi ℥ ss. facta vnica ebull. mane fortiss. expressi. adde syr. ex succo ros. solui. ℥ j. misce,* habuit quinque secessus, quia tunc erat debilis, & denuo recte conualuit. Sed post vnum aut alterum mensem rursus ictero affecta, ex iecoris obstructione, postea mense Septembri ex illo ictero præcedente in hydropem ascitem periculossimam incidit, adeo, vt pro deplorata haberetur. Atque hoc malo ultra octo menses detenta, mirabiliter tamen per me ab hydropem ascite, cum ventrem in maiorem molem excrecentem haberet, tum crura adeo inflata, præter opinionem curata fuit, iisdem remediis, quibus in Heutera vfi sumus, in decoctis

semper adiecto marrubio, eo quod hoc malum ab ictero & obstructione originem traxerat. Sed huic vesicatoria vtrique cruri in parte syluestri apponere iussimus, sub genu: quæ postea vlcerabantur; & effluxit perpetuo paulatim aqua, vt inde curata fuerit, cum maximo nostro honore, & omnium hominum admiratione, quamquam vlcera illa ita indurata tandem etiam ægre quidem curata fuerint.

SCHOLIA.

Recte prius diximus, cum de ictero ageremus, in signis prognosticis, quod ictericia diuturna plerumque hydropem minatur, quæ difficillime curatur, cum adit obstructio hepatis simul, verum hepate nondum in scirrhum permutato. Hic hydrops (ascites inquam) quamuis periculossimus, & curatu difficillimus, tamen magna nostra industria fuit curatus. Præstium seu marrubium bene oleps in hac curatione magnam prærogatiuam habet: quo etiam in decoctis ad hydropem facientibus semper vfi sumus. Vbi enim ab ictero contingat, vel simul icterus cum hydropem coniungatur, Niculus Florentinus valde commendauit succum brassiæ depuratum, cum vino albo, & r. acchavo vel melle, exhibet autem stomacho icuinofacibus prius ab intestinis eductis. Illud idem Gerardus de Solo super. 9. Almaraz. in pauperibus hydropicis dat, sed speciatim valet, quando hydrops coniungitur cum ictericia, vel eam sequitur. Refert idem Niculus, duas se curasse mulieres hydropicas, à causa frigida cum tussi, quarum ventres in maximam molem excreuerant, tum crura ac coxæ, exhibendo eis omni mane ℥ iij. aquæ prassij, & eiusdem aquæ ℥ ij. ante cenam per horas duas, purgando easdem de quarto in quartum diem cum succo ieros, quæ ita sanatae sunt.

OBSERVATIO XLI.

De muliere ascite laborante, cui pedes seu crura ac femora fuerunt scarificata.

Post vniuersalia remedia in hydropicis, crura oedematosa aliquando à veteribus scarificari solebāt. At in Anna, muliere, hospita Delphensi, cum ascite laboraret, & multa illi remedia, per nos, tum alios administrata fuissent, medicus quidam cum in hospitio per vnum aut alterum diem detinebatur, iussit in hunc modum crura tum femora hinc inde verberari & flagellari cum ramusculo vitridi aquifolij aculeati (nostri vulgari lingua appellant bulli.) nam ita cute vndique mane in diluculo flagellata, vulnerata seu scarificata, aqua è cruribus, & femoribus stillatim emanabat, & demum crura ita scarificata aqua tepida abluebantur: deinde folia plantaginis aquatica applicabantur, fasciis lineis circumductis. Flagellabantur autem ita mane, & post meridiem hora quarta, ad 4. dies: ita vt crura tum femora detumescerent mirum in modum, tum venter ipse. Interim bis in die bibebat vinum Piciatense confectum cum cinere stirpium fabarum ac genistæ, quod per saccum clarificatorium, instar claretii sapius transfundebatur, quo remedio aliqui dicebantur curati. Quamuis hæc mulier annosa, malo in hepate confirmato, etiam dudum facto per me prognostico, quod non curaretur, licet primo videbantur remedia iuuare, attamen malo ingrauescente postea cum multis mensibus decubisset, tandem obiit.

SCHOLIA.

SCHOLIA.

Inter topica contra hydropem remedia, quæ minime sunt administranda ante vniuersalem curationem & euacuationem, præter emplastra superius dicta, balnea, thermas, euaporationes, etiam sacculos è macris furfuribus, milio, panico, sale, sulphure, calidos & ita appositos, tum sacculos ex arena & sabulo vel cineribus calefactis, sapius appressos, præter cataplasmata alia, de quibus superius diximus; & de quibus auctores perlegere poteritis, nonnulli & sinapisimis (vt Hollerius) ex stercorebus animalium confectis utebantur & perseverante malo ad phœnigmos ex radice scrophulariæ, ranunculorum, & similia emplastri modo imposita, vel ad vesicatoria perueniebant, & vesicas configebant, & vlcera aperta conseruebant, superimposito folio brassicæ, vincto butyro vel oleo, permittentes aquam effluere ad sexaginta dies. Alij scarificatione utebantur, vt Schol. Obser. 33. huius libri diximus. Aliqui & cauteria ventri inducebant in ambitu umbilici, & quibus partibus tumor erat. Nam & scarificationes quoque conueniunt: sed si nihil proficerent his remediis, ad extremum præsidium, nempe Paracentesin, accedebant: de qua vnum exemplum, temerarie tamen adhibita, adferemus.

OBSERVATIO XLII.

De paracentesi perperam in ascitico quodam adhibita.

Ioannes Bokelli, vir 40. annorum, cum ebrius & vino satis oppletus ex mensa saltasset, vena magna aliqua ei rupta fuit; vnde in vomitum sanguinis enormem prorumpibat, & copiosissimum sanguinem tam infra quam supra deiecit, ad quem tunc accitus sum. Et licet tunc temporis, præter spem multorum, cum ad desperationem venisset, à me curatus fuerit: postea tamen inordinate viuens, in hydropem ascitem incidit: multisque adhibitis remediis vexatus est à quodam Paracelsista, qui eundem tunc curabat, & sanitatem ei promittebat. Verum postea, eo malum progressum est, vt Paracelsista relicto, alium medicum & chirurgum ac me vocarint. Medicus autem & chirurgus proponebant paracentesin, & ægrotum & assistentes eo perduxerunt, vt illum hoc modo ab hydropem perfecte sanatum iri crederent: idque magnis promissis iactabant, cuius causa consulti facta est. Ego vero tunc certas rationes in medium adduxi: nempe quod vires iam dudum ex nimia sanguinis profusione prostratae essent, & quod inde hepate refrigerato, originem traxerat hydrops, in homine nigro, & extreme macilento, etiam ante hydropem, & nunc tanto magis, cum sese nullo modo erigere posset, in lecto decumbens, difficultate anhelitus laborans, & quod ideo in syncopen facile incidere: & ob hæc nullo modo paracentesin in hoc ægro conuenire. Hac quidem mea opinione explicata, à curatione excludor, eo quod veritatem protuleram: nam post duos menses, cum eandem paracentesin peregissent, postquam ex profusione larga sanguinis in hydropem incidisset, atque ea ultra semiannum nunc laborasset, aqua subito effluente, altero die (quod etiam cumdam in auro dixeram, postquam audieram paracentesin peractam, quod 24. horas non superveneret) cum ignominia illorum æger extinctus est, anno 1579. mense Ianuario.

SCHOLIA.

De paracentesi magna olim controuersia, aliis medicis eam omnino reprobantibus, aliis approbantibus. Vtriusque sectæ argumenta colligit Aurelianus. 3. Chronicon. cap. de hydropem. Illos enim deterebat, quod fere moriuntur omnes, qui puncti fuerint. Hi vero remedium temperabant, neque in omnibus utebantur, atque ita seruabant aliquos. Tempestiua autem est punctio, priusquam in cachexiam morbus abierit, firmis viribus, corpore iuuenili, si atra bilis hydropem non induxerit, si validus stomachus, si æger non febricit: aut si febricit, remissionis tempore. Ideo diligenter cauent, ne purgentur intestina, cum facultas hepatis est emortua, scirrhus aut splenis tumore, aut cum vlcere pulmonis, aut infirmis viribus, aut ætate senili æger laboret. Hæc omnia prouidenda sunt, priusquam de paracentesi decernas. Alioqui temeraria via, etiam si hæc adfuerint. Quæ cum hinc adessent, nempe in homine extreme macilento, atrabilario, cum ex macie niger esset, tanquam ossa tantum restarent, etiam antequam in sanguinis profusione incidere, & facultas hepatis emortua esset, & vires ad extremum deiecerat, ideo temerarie facta fuit in illo paracentesis. Eratistratus apud Celsum cap. 21. lib. 3. reprobatur sectionem hydropicorum, quia semel effusa aqua, & affecto hepate, postea regeneratur. Si tamen priusquam putreat materia, & vires concidant, grauiusque affectum hepar & partes alia fuerint, adhibeatur, optime nutritio prius ægro, & confirmato, nihil peccatur. Sed extremum remedium est, & non nisi urgente necessitate usurpandum, & cum magna medici prudentia. Ideo dempris iis, de quibus paulo ante diximus, minus est periculi, cum natura sæpe molliatur viam aquæ per umbilicum, vt ante ostensum est: & quibus vulneratus est venter, nisi vulnus ad gracilia intestina penetret, omnes euadunt. Præmonendi tamen semper sunt amici ægrotum, quanto cum periculo remedium tentetur. Tentarique debet, modo illa non adfuerint, de quibus diximus, vbi aliis remediis nihil profectum est. Longa tamen cautior est scarificatio cutis totius ventris, secundum aliquos, ad aponeuroes musculorum, paruis scissuris, quibus per ventrem serum refudet. Galenus, Paulus, Albucasis, Mesue in ascite pungunt, ad latera umbilici, qua parte illa vacua & inania sunt, & propemodum ex carnes musculi. Alij quidem dextra parte, si lien, sinistra, si hepar in vitio est: alij vero ex eadem parte, qua viscus est, à quo malum primum ortum est. Rondelet. vt paulo ante meminimus, ex vtraque parte commodè posse fieri, & aquam vacuari putat. Si vero intestina in causa sunt (vt quidam sentiunt) pungunt quatuor digitis sub umbilico, sed paululum reducto phlebotomo in latus. Hippoc. intercutaneos pueros incidit, in libro de locis in homine. Aurelianus consensu veterum, in intercute magis, quam ascite paracentesin probauit. In aqua inter cutem Asclepiades quatuor digitis supratatum, tibiam compungit, interiori parte, ea profunditate, qua vena inciditur. Qui locus compunctus si parum aquæ reddit, femora, scrotum, pudenda, si quidem intumuerint, loca etiam supramanum & articulos, incidenda sunt, ex Leonide & Hippocrate. Formulam vero punctiōis ex lib. 6. Panli & aliis collige. Hippoc. non solum paracentesin, seu sectionem, sed vstionem etiam probat: puto, vel pulmone affecto, vt in suppurationis, vel

vt paretur via scalpello: quemadmodum enim docet Hollerius, Hippoc. id præstare in eo libro, cuius initium est, *ἡ δὲ πάλαιος ὁρμηλὴν*: Vbi suppuratos, de qua parte pus se prodit, in dorso & pectore vrit aut secat, alioqui enutritos prius lacte. In hydropicis vero venas in seroto crassissimas secat; paulo post in seroto, femoribus, ac tibis frequentia vlcuscula scalpello incutit. Deinde de qua parte magis fluctuat aqua, aut tertiam costam ab ultima ad os, ex quo terebra caua *πύλην ὑδρωπικῆς* perforat, donec exeat aliquid aquæ: ex qua linamentum indit è lino crudo, spongiamque mollem alligat, ne excidat linamentum. Quotidie semel aliquid expurgat, ad dies 12. Decimotertio die reliqua aqua emittitur: via relinquatur, vt quod supernascitur effluat, venter cibis reficatur. Si femur & serotum intumuerint, vlcusculis audacter configito. Sæpe hepate maximo, & prius lacte nutrito ægro, non metallo, sed alia materia, inurit, octo inde crustis factis. Nonnulli id faciendum censent buxus fassis, feruenti oleo tinctis. Libro de locis in homine. Tenuissimis ferramentis circa umbilicum vrit, ac tantum aquæ quotidie trahit, quantum vires ferant. Hoc semper obseruato, vtendum aut secundum prius, quam pituita corumpatur, aut viscera grauius lædantur, & vires concidant: deinde vacationem paulatim, id est, 12. diebus, vt prius faciendam. Galenus paracentesin in hydropicis laudat: vltionem, in suppuratis: duplicemque affert rationem, cur periculosa sit vniuersa vacuatio in hydropicis: extirpationem, scilicet caloris natui, simul cum humore effluente spiritu: & pondus visceris, quod cum non amplius sustentatur ab aqua, septum & reliqua thoracis viscera trahit deorsum. Plura sunt apud Albucasin, Aurelianum, Paulum, lib. 6. cap. 44. Recentiores totius progrediuntur. Viam parant cauterio potentiali, deinde actuali. Hinc scalpello perforant, & cannula caua, commodiore, quam linum crudum Hippocratis, sensim educunt aquam. Aculeato scalpello vtuntur, vt minor fiat perforatio, locumque eligunt, vbi aqua deorsum in inum ventrem tendit, relicto hepate & hypochondriis; in medio musculorum aliorum epigastrii. Partem materiæ medicamentis purgans, topicis discutunt, siccate victu absumunt, vires diligenter fouent. Minus metuunt à peritonæo perforato, quam à membrana succingente costas. Diligenter etiam cauent (vt paulo ante diximus) ne pungantur intestina.

OBSERVATIO XLIII.

De tympanite.

Ruficus quidam Alcmariam accessit, tympanite laborans, vt à me curaretur: cui venter supra modum intumuerat, vt concussus tympani sonum redderet: reliquæ vero corporis partes macilentiores erant. Ideo huic omnia flatulenta inhibuimus, & vt exercitio vteretur quantum posset, & vesicam sitimque sustineret: mirifice enim hæc profunt, cum curatio præcipua consistit in roborandis partibus, coquentibus, & in offerendo ea, quibus minime flatus expectantur. Ideo primum talem victum eidem instituius, panem & obsonia minime flatulenta: & concoctionem faciunt, cuiusmodi sunt anisum, cuminum, ligusticum, imperatoria semen. Potus illi erat tantus, vt non fluctuaret, omnino parcus,

quamuis non extreme, vt in aliis. Verum hæc species similiter purgantia medicamenta, & quæ vniuersum corpus emaciant; atque etiam, quæ vrinam ciunt, exigit. Similiter & quæ extenuare & digerere spiritus flatuosos possunt, tum extrinsecus tum intrinsecus adhibere oportet. Etenim verendum non est, in hac aqua inter cutem differentia, simul cum flatuoso spiritu serofos quosdam humores ac tenues redundare, qui in flatuosum ærem à diminuto calore transmutantur: quinimo vanum est ac intellectu carens, sine vilo humore superfluo laborantem hydropicum vocare, Celio Aureliano teste. Hinc quoque celebriores auctores eisdem purgantibus medicamentis pro eius curatione vtuntur, quæ pro ascitis curatione præcipiuntur, eisdemque redundantem humorem præparantibus, atque etiam vrinam ciuntibus: perpetuo tamen prædictis adiiciendo ea, quæ flatum dissipant, vt semen fœniculi, anisi, cumini & ammi: similiter & prædictis antidotis diacuminum, aut dianisum commisceatur. Cum autem hic circa ventriculum & umbilicum dolores tanquam colici hærent, cum hoc vitium ex ventriculo fere originem primam habeat, ideo materiam illam crudam prius purgavi cum pilulis aromaticis, & de hiera ex 3 j. pilul. de hiera, quæ materiam minorabant. Deinde hunc syrupum præscripsi. *℞. syr. de end. compos. de quinque rad. de eupator. syr. acetos. compos. an. 3 i b. aquæ apij. end. cicborij. an. 3 iij. depuretur & avamar. cum specter. diarrhod. abb. cinnamomi electi. an. 3 j. pul. diacuminum 3 b. fiat inlebe. ad modum claretis, pro quatuor diebus. Deinde 2℞. pilul. de hiera simpl. vrb. selecti. de agar. an. 3 j. cum aqua a rimon. fiat pilule viij. sumantur circa noctis dimidium. Postea hoc decoctum sumebat. 2℞. mentha sicca, hyssopi, betonica, absinthij, folior. sambuci, an. m. j. cicborij, end. agrimonie, an. m. b. flor. chamæm. anthos an. p. j. sem. anisi, carthami, an. 3 b. sem. apij, petros. an. 3 j. semin. dauci, sem. 4. frig. maior. an. 3 b. folior. sena orientalis 3 i b. agarici albi, sem. vrb. selecti, an. 3 i b. spica, schœnambis, zinz. an. 3 j. vuar. passul. ab arill. repurg. 3 j. fiat omnium decoct. in duabus parvis aqua & vna parte vini, pro 3 ix. colatura adde syr. de byzantiis, de eupatorio, syr. ex insul. ros. an. 3 j. misce. fiat apozema pro tribus dosibus matutinis. Deinde detur elect. in tabulis, modo diacuminum, modo diacurcumum, & capiat sæpe ex hoc puluere ante pastum. 2℞. sem. anisi, fœniculi, carui, cumini in aceto maceratorum, an. 3 j. fiat pul. sumat ex eo 3 ij. per horam ante prandium, & post eandem duabus horis. Postea etiam has pilulas ei exhibuit. 2℞. pil. mezereonis, descr. Mesu. 3 ij. roch. agar. 3 j. cum syr. de byzantiis, fiat pilul. v. capiat post mediam noctem, libenter ei dedissem clysterem, modo admisisset, (nam in hoc malo maxime commendantur clysteres) in hunc vel similem modum paratum: 2℞. folior. sambuci, mercurialis, ruta, origani, pulegij, calamintæ, fursus, an. m. j. flor. chamæmil. p. j. soldanellæ, folior. malua an. m. b. sem. anisi, fœniculi, carui, dauci an. 3 ij. coquantur in aqua communi, pro 3 b. colatura adde olei rutæ 3 iij. benedictæ laxat. 3 j. electuarij de baccis lauri 3 b. vitellum vnius ouis, salis communis 3 iij. xacch. rubr. 3 i b. misce, fiat clyster. Quemadmodum enim eiusmodi clysteres, ita & glandes egregie auxiliantur, si ex foliis rutæ, cumino, ac caricis exiguoque sale figurentur. Vel 2℞. mellis despumati q. s. sem. anisi, fœniculi, cumini, an. 3 j. agarici, salis gemmæ pul. hiera an. 3 iij. misceantur, & fiant balani. Reliquos clysteres tum balanos inuenies, quando loquimur de colicis doloribus, qui & hic valde laudantur. Cum autem cum succo iteos, tum aliis, adicæto semper aliquo puluere diacymini,*

diacymini, satis purgatus esset, etiam iis, de quibus paulo ante de ascite diximus, extrinsecus quoque adhibuimus vnguenta emplastra cataplasmata, in hunc vel similem modum parata, & quia circa ventriculum dolebat subinde, apposuius ceratum stomachicum Galeni: & hypochondria inuinximus, tum ventrem, hoc vng. 2℞. olei rutæ, aserbini, vng. Agrippe, an. 3 j. b. succi rutæ absinthij, succi sambuci an. 3 b. vini optimi 3 j. coquantur leuiter in duplici vase, ad consumptionem succorum, adde seminis apij, petros. cumini. an. 3 b. ceræ exiguum fiat vnguentum, & tempore inunctionis adde parum vini maluatici, vel, si desit, vini albi. Venter apponebatur emplastrum de baccis lauri, primo cingulo constricto, vel fascia. Postea & hoc emplastrum, aut ei simile. 2℞. stercoreis vaccæ 3 b. pulueris cymini, & rutæ, an. 3 j. cum vrinæ pueri incorporantur. In processu iubebam, vt adderentur salis vel nitri, vel sulphuris, 3 b. His autem tum aliis remediis sæpe repetitis, tandem hic rusticus melius cœpit habere. Sed cum non progredere in curatione, iterum venter intumuit: & domum rediens, tandem mortuus est, vt & alius rusticus Scotelianus, etiam tympanite laborans, qui nationis gratia ad nos venerat: sed cum non diu maneret apud nos, remediis aptis non subleuabatur, curationemque relinquens idem & tympania mortuus est.

SCHOLIA.

Plus flatuum in tympanite, & minus aquæ subest, vt de signis huius mali diximus: non tamen est sine aqua, ideo iisdem fere remediis vtuntur auctores, quæ ad ascitem valere tradunt, adiunctis semper iis, quæ flatum discutunt. Oportet igitur laxare, & aperire mediocriter, & discutere, tam sumptis, quam admotis, præsertim in causa frigida. Nam in causa calida, minus calidis vtendum. Et sic, si sine febre adueniat, vel ex exigua, & sola consistat, aliam curam exigit: nempe vt flatum etiam discutiamus, & bonam concoctionem procuremus ventris & intestinorum, cum iis quæ partes roborent, & bene concoquantur, & flatus minime gignant. Robur quoque ventri addimus, ex his, quæ supra sunt posita, vnguentis, ceratis, emplastris: quibus & hypochondria comprehendere vtile erit. Quidam hic pilulas aromaticas & scbelianæ in principio commendat, vt Rondelinius, syrupos magistrales, tum opiata, qualia apud illi inuenies. Qui Arabum decreta sequuntur, vitant ea, quæ ventositatem generant: atq; iis vtuntur, quæ eandem resoluunt: vitæque institutum ad calidum & siccum vergendum docent, mox intentionem curandi ad materiam cōiunctam conuertunt, eam resoluendo: postea ad causam remotam oculos habent, remouendo malam dispositionem hepatis, & aliorum membrorum coniunctam causam abolerant solutius, non tantum iis, quæ expellunt ventositates, verum etiam, quæ euacuant aquositatem. Incipiunt, iuxta Auicennæ præceptum à leuioribus, vt hiera in causa calida, cum aqua apij fœniculi, cicborij, & similibus: & in frigida, cum decocto carminante ex aniso, cymino, & passissimum cum clysteribus carminantibus tam dictis, ex hiera, polypod. oleo rutæ, sale & similibus. Ioannes Arculanus singulare remedium asserit, si in clysteribus adiciantur elect. de baccis lauri 3 iij. Ad resolutionem vero cōpetunt, diacalamintæ, diacuminum dianisum, diagal. & elect. de baccis lauri, & alia, de quibus egimus de dolore ventriculi ex ventositate. Exterius vero apponunt sacculos, qui flatum discutiant, iuxta Rhases, Pet. Forest. Tom. 2.

ex milio, panico, sulphure, sale, cinere calido, vt etiam Nicotus facit. Alij malunt lixiuum, vel decoctum ex vino albo, flor. chamæmil. origani, calamintæ, & aliis resoluentibus, cum spongia aut vesica impleta vel panno, per modum foris ventri apponere. Nonnulli emplastrum de baccis, quod habetur paratum, toti ventri imponunt, vel illud, quod ad Aristarchum refertur à Mesue. Interea etiam aliorum membrorum ratio habenda est, nempe à quo membro præcipue originem trahat, vel num per consensum afficiatur, siue fuerit hepar, lien, vel ventriculus: solet enim tympanites generari modo ex aqua frigida, modo ex vino multa aqua infrato, vel ex aliis instantibus quæ comeduntur, ex quib. incoctio stomachi sequitur, aut iecinoris: sed stomachi (vt quidam sentiunt) peculiare malum est, sicut ascitis secundæ digestionis, & hypofarca tertiæ vitium est: Ex ea enim digestionem vapor ac ventus ab inualido calido excitatur stomachi, aut intestinorum, in quibus generatur. Ex capite item, ac aliis membris defluit materia, quæ in fumum facile conuertitur ab infirma caliditate iecoris. Incoctus à stomacho succus, ab imbecillitate iecoris, in summum seu ad caput facile ascendit, & iterum defluit. Euenit interdum in acutis febribus, ex innaturali feruore, cum antequam digeratur à naturali calore, naturali opere inuentum verti necesse sit. Iam etiam tympanites, vt plurimum inflato lienem euenit: quoniam membrum rarum est, fungosum, humoris incocti receptaculum. In ventre eodem modo continetur, vt in ascite humor, nec sine aqua is spiritus inuenitur: sub peritonæo enim fumus ille partim in aqua cogitur: partim sub forma fumi remanet derelictus. Caterum robur ventri addimus, ex his, quæ supra sunt posita de ventriculi imbecillitate, & de eiusdem ventositate. Hepar roboramus cum diarrhod. abb. & diacurcumum, quæ ad lienem faciunt dicemus lib. sequenti. De vitiiis lienis. Quod si ab vtero radix sit inflationis vt sæpe fit, remedia præcipue ipsis fiant, quæ speciatim de vteri inflatione dicturi sumus. In summa, pessis vtetur, ex gallia muscata, ladano compositis & ribetto: Vtemur & sessionibus earundem virium, & foru. Si ex febre fiat, vel ea ipsa adsit, modo febris, modo hydropis rationem habere oportet, vt scholia Obs. 35. huius libri abunde ex Nicetio Tralliano & aliorum docuimus. Sed & illud de hydropis curatione obseruandum, quod sæpe misti sunt affectus, ac miscere curadi rationes oportet, vt aliquando omnium notæ mistæ apparent: perpetuo tamen alicuius ex his notæ apparent. Ideo Rhases in primis curationem ponit ascitis, quæ cū affectu calido iungitur: atque exigua quidem adfert remedia, hæc ob causam, vt arbitror, quod eandem omnino difficilem vel plane desperatam iudicat. Remedia tamen vehementia adfert, vt pilul. de rhubar. nimis fortes ob thymelææ folia & fructum. Si vero talia signa non sunt, dat pilulas de mezereo dictas, & emplastro vtitur ad ventrem: & ea propinat, quæ vrinam mouent. Postremo tympaniam curat victus ratione, & electuaria & emplastra adhibet, & clysteres. Quidam in tympanite vehementia cathartica vitanda esse volunt, quibus venter augetur: aqua tamen, quæ vna cum flatu permixta est, iunt, per aluum educendam volunt: qui spiritus inde generatur. Et laudant pilulas sagapenas, quæ valde aperiunt, & ad ventositates faciunt, & menses promouent. Quod ad extrinseca remedia attinet, alij sacculos toti ventri apponunt: qualis hic est. 2℞. milij, salis, & fursus, ana m. j. sem. anisi, apij, fœniculi.

esse poterit, euidens saltus non solum sentiebatur, sed etiam oculis spectabatur, ut etiam in lecto iacenti tegumenta eleuantur: & id magis in imo ventre cum murmure quodam ac rugitu audiebatur, equidem nil aliud erat, quam spiritus flatuosus, qui sursum ascendebat, ac cor premebat. Ego molam ventosam in vtero esse suspicabar, & vna tympanitem adesse, cum totus venter intumesceret tympani modo, non sine tamen materia aliqua aquosa, vel potius flatulenta, cum putredine instar molæ, quæ vterum primo occupauerat, mox totum ventrem & tandem hepatis quoque lationem inferebat. Nam hoc tempore, cum eandem accessissem, vndecim menses præterierant, quod menstrua consueta euacuationes non fluxerant neque aperta fuerant. Tunc denuo per me accersita obstetrice, iussi ut os vteri tangeret, atque tentaret num durum esset: ea autem respondebat, nec durum esse; & quoque affirmabat se dubitare, quod grauida non foret, quamquam illud prius affirmauerat. Cum venter vndique in tantam molem excreuisset, ut maiorem in vita nunquam viderim, & multo maiorem, quam in præcedente, in vrbe inter plebeias mulierculas varia de hac muliere opinio subsecuta est: vna referente, quod monstrum pareret: alia vero, quod arbor in ventre excreveret. Deliræ mulierculæ, ut solent, eiusmodi somnabant. Cæterum, quamquam venter durus erat, si tamen fortiter tractaretur, non solum ex tactu validiore manus, venter tremebat, sed & omnia viscera ita mouebantur, ut non solum venter aliquando videretur attolli, sed operimenta ipsius lecti (ut paulo ante diximus) imo & lectus ipse, in quo decumbebat: & erat talis in saltus corpore, ex spiritu flatuoso (ut opinabar) irruente, tam enormi, ut simile quid in vita non spectauerim. Verum, ut paucis rem ipsam absoluam, cum hæc omnia à mala ventosa fieri iudicarem: vel à ventositate instar tympaniæ, ita ut in sicca hydropis speciem confirmatam incideret: tandem medicamenta opportune adhibita meam opinionem postea confirmarunt, ita ut ab iisdem præsidiiis pristinam sanitatem, omnibus admirantibus, recuperauerit. Præscripsi multa carminantia in decoctis, quibus quotidie utebatur: toto corpore prius euacuato. Præcipue & hoc sequens. *℞. sem. anisi, feniculi, carui, ammi, cumini, ana ʒ ij. sem. anethi ʒ i β. bulliant in aqua artemisia: cuius colature accipe ʒ viij. addendo syrup. de artemis. ʒ ij. misce pro duabus dosibus.* Continuo quoque pro potu quotidiano utebatur ceruisia communi, in qua flores chamæmilla decocti erant: quæ ceruisia adeo profuit, ut admirari satis non potuerimus. Eam quoque per intervalla etiam prius, antequam supra dicta sumeret, purgaui cum decocto simili carminante & purgante; adiectis foliis senæ, subinde cum diapbœnico. Ventrem autem primo inungi mandauimus oleo chamæmelino, & anelino: postea & circa pubem etiam oleis & vnguentis calidioribus, postquam à purgatione paulatim & febris

illa inordinata cessasset. Postremo ad vteri apertionem dedimus puluerem dominarum, scilicet ʒ j. cum ʒ ij. aquæ artemisia, & ʒ j. syrupi, artemisia. Illis remediis sæpe iteratis, menses aperti sunt, & fluxere. Deinde tabulis infra scriptis cum perpetuo fere vteretur, miraculi instar venter paulatim detumuit, multasque ventositates per ructus plurimos superius emisit, etiam inferius per ventrem: etiam bombis, quod dictum mirum videtur, ex vtero emissis, qui vna cum murmure ac strepitu erumpebant. Et cum menses aperti fuerunt, multa putrida, & ex parte corrupta excreuit: etiam quadam aquosa; idque longo tempore. Tabulæ vero confectæ, tales erant. *℞. species, diacymini, diacurcumæ, species, avana. ros. an. ʒ j. cum aqua melisse, adiecto saccharo optimo q. s. fiat confectio in tabulis secundum artem.* Quibus cum vteretur per duos menses, & aliis remediis supradictis sæpe repetitis; præter opinionem omnium magna cum nostra laude euasit; & adhuc sana viuit, etiam hoc tempore cum plusquam viginti quatuor anni præterlapsi sunt, cum hæc denuo recoligerem, nempe anno 1592. mense Iunio.

SCHOLIA.

Sive fuerit mala ventosa matricis, sive tympanites, ut ventositatem ab vtero ob menses restrictos originem habens, eandem curationem requirebant: nempe præter vniuersalem curationem, carminantia, quæ etiam conueniunt in colico ventoso per interius & exterius administrata: in potu enim conferunt calida subtiliantia: & postea etiam emplastra, quæ simul emolliunt, & menses educunt. Quod si in principio fuisset accitus, cum menses detinebantur, aperuissem venam in talo, nempe saphenam. Sed potius aliis remediis usus sum, quæ ad mensum retentionem faciebant: cum & balnea hic conferant, ab umbilico infra, in qua decoct. malua, althææ, sanuigræci, ruiæ, sauinæ, iuniperi, menthæstri, nasturtij, & ante introitum balnei, per duas horas, exhibeatur ʒ j. trochisc. de myrrha, nobis satis fuit pul. dominarum, cum vino albo veteri etiam exhibitis, postquam cum dedissemus cum aqua artemisia, & syrup. artemisia. Et licet mola carnea difficultior sit curationis, quam ventosa, veruntamen inflatio si perduret; curam non recipit, cum sæpe remaneat per totam vitam, & si malitia illius ad vltimum progrediatur, hydropem, nempe timorofum tympanitem inducit: ut hic euenit: tamen fuit optime curata, etiam à tympanite, nondum tamen confirmata, ut aliæ tympanitæ, de quibus paulo ante diximus. Et ita absoluius omnes species & differentias aquæ inter cutem: & quibus modis vnaquæque species curetur: quod & exemplis nonnullis ostendimus. Atque ita affectibus iecoris absolutis, hunc librum finiamus, & ad Lienis vitia, morbos, & affectus transeamus.

Finis Libri decimi noni.

OBSERVATIONVM ET
CVRATIONVM MEDICINALIVM

Liber vigesimus.

DE LIENIS MORBIS, VITIIS AC AFFECTIBVS.

OBSERVATIO I.

De quodam splenetico seu lienoso.



Ir admodum niger, hirsutus, melancholicus, subtristis, à quarantena lienem durum habebat grauitatemque in parte sinistra quædam percipiebat: sitis eidem vehementior aderat, ac oris siccitas: cui accessit anhelitus difficultas: postea circumscriptus tumor in hypochondrio sinistro apparuit, & valde durus, ex humore melancholico; mox & pedum inflatio, atque etiam pudendum circumspiciebatur, colorque plumbeus: cui & decubitus in sinistram latum, grauis quoque dolor ad iugulum sinistram vsque tendebat: noctuque sudor grauis apparebat; & anima fœtebat, ac pudenda turgebat: sanguis huic etiam, ut in scurbuttis, ex gingiuis erumpebat, ut etiam gingiue dentesque magis corrumperentur in sinistra parte: & venæ ad lienem nigricabant, cum cute squallidiores, vlceraque maligna in tibiis, & potissimum in sinistra tibia nascebantur, & cicatrices nigre in cruribus fiebant, (Imo aliquos tales nquimus, in quibus ob eandem causam pediculi in corpore fœtebant.) Hunc autem lienosum, vel spleneticum iudicauimus: nam horum aliqua vel omnia spleneticos ostendunt. Post bolum exhibitum, ex casia & catholico an. ʒ β. pul. cereuath & cinamomi electi, an. ʒ j. zacch. asperso: altero die venam saluatellam in manu sinistra secari iussi, mediocriter nigro educto sanguine. A sanguinis de tractione hoc decoctum vel simile præscriptum: *℞. rad. petros. cichor. fenic. apij, macera. in aceto, an. ʒ β. corr. rad. cappari abiamavici, ana ʒ j. ceterach. capill. ren. ana m. j. cochlear. m. β. flor. rorism. hyper. geniste, ana p. j. sem. agni casti, end. scariol. portul. acetose, sem. frig. maior. ana ʒ β. rad. salicis, fraxini, geniste, an. ʒ ij.* Hæc enim omnia iam dicta peculiariter conueniunt lien: præter ea quæ de oppilatione hepatis conscripsimus: & in liene abstinendum ab iis, quæ nimium calefaciant, nisi frigidis temperentur: ideo sem. frig. incidentibus addenda (poly-podij querc. ʒ j. fiat decoct. in aqua com. pro lb β. colat. addendo syr. acetos. simpl. capill. ren. de duabus & quinque rad. de fumo terra, de scolopend. an. ʒ β. misce pro apozemate. Deinde eundem purgaui sæpius cum decocto epythymi, foliis senæ, adiecta confectioe hamæch. Frequens usus huic erat capparium, asparagorum, & caulium cinaræ, & cathami marini muiæ condit. & capparium ex sem. geniste. Quidam & hic commendat lienem bonis crematum in vase testaceo ad ʒ j. cum oxymelite exhibitum; aut potionibus inspersum. Post purgationem commode exhibui decoctum bekabunga & cochleariæ, cum syrup. sceleribico nostro, ex succo eorundem herbarum cum zacchar. parato (cuius usum nos primo inuenimus) in sevolactis: ex cuius continuo usu melius habere cepit: liene quoque inuncto hoc linimento. *℞. olei de capparibus*

Pet. Forest. Tom. 2.

ʒ j. medullæ vituli, pinguedinis anatis, ammoniaci in aceto dissoluti, ana ʒ ij. aceti exiguum, ceræ q. s. fiat vnguentum. Deinde imposito emplastro de meliloto, & emplastro de ammoniaco simul permixtis, recte habuit: & vlcerata remediis intus sumptis, sæpeque iteratis, facile lani consolidata.

SCHOLIA.

Lienis naturam, & eius usum, in præfatione huius libri exposuimus, & in libro nostro de vniuersali incerto iudicio. Est enim atræ bilis sedes & melancholici humori, repurgatorium. Vbi autem lien inefficax efficitur, & lutosum à se sanguinem nequit expellere: tunc turgit supra mox: unde lienici vel splenetici dicuntur: vel si lienis, attrahere non possit, cachexia subsequitur: facile enim lien quoque inflatur, incluso vento, aut solum atro sanguine crasso intus costipato, unde obstru-ctio: facile quoque obstruitur & induratur, subinde & inflamatur, sed rarius, & in abscessum permuat. Doloribus quoque afficitur, modo ex calida causa, ut phlegmone, quod rarius est: modo ex flatibus, quod frequentius: status autem hi aliquando soli sunt, aliquando vero adiunctum habent superfluum humorem frigidum, id est, qui vinci à calore non possit. Sine dolore vero, vel exiguo: scirrholis tumoribusprehenditur. Etiam nuda intemperie affligitur, ut Aetius docuit, lib. 10. cap. 7. ex Philagrino: Potissimum vero frigidam & humidam sustinet. In frigida, omnis cibus & potus efficaciter refrigerans splenem lædit; constitutio aëris frigida tum alia præcedunt, & aqua frigida admota, vel lotiones frigida frigidam arguunt splenis intemperiem. Frigiditatem quoque ostendunt, cibi tedium, intestinorum murmura, quæ in ructus acetosos commouentur, eamque intemperiem omnia calida confolantur. Si intemperies calida, solatio eis sunt omnia refrigerantia: sitis adest, lingua arida, flauus corporis color: adest inflammatio in parte sinistra: ita concitata dolent. In sicca, omnia arida nocent, vel deuorata, & aquæ marinæ præcedentes, aluminosæ & sulphurentes & pharmaca exsiccantia. In humida splen increfcit, ut ad ventrem pertingat ac hepar. Calida citra tumorem simplicissimis pharmacis, ac fomentis & irrigationibus corrigitur, ex rosacco, melino, & ceratis refrigerantibus, frigida calidis, ut vng. nardino, cyprino, decocto pulegij, scordij, &c. tum aliis medicamentis apud Aetium positis. In humida adhibet salis florem. Reliqua vide apud eundem cap. 7. & 8. ser. 10. & apud Benedictum Veronensem lib. 17. de lienis affect. cap. 2. vsque ad cap. 8. in quibus non solum explicatur intemperies nuda, sed & cum materia, & quibus modis curentur: & præcipue lib. 8. cap. 10. apud Alexand. Trallianum: in quo cap. expresse de omnibus affectibus lienis agit. Cæterum, cum exemplum cuiusdam à vitio lienis curati adferat compendiose Beniuenius cap. 105. à nostro iam

Ll iij dicto

dicto parum differens, his adiungere nobis visum est: Lienis (inquit) vitio afficiuntur quam plurimi: horum sinistra pars tumens ac durior prementi venitur. Quod si diu perseverat (nam interdum perpetuum id malum est) tumescunt crura; & si vlcera præterea innascentur, vix sanescunt; Multos nos tali vitio affectos curauimus: inter quos vnum: quem cum septennio hoc morbo vexatus, frustra multa consilia, ac pene infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem cappar, qui tali ægritudine aptissimus cibus est, loaque vi aquæ, in qua faber ferrarius sæpe candens ferrum extinguit, annua potione liberauimus: tanta scilicet in eiusmodi aqua contra hoc vitium inest vis atque virtus. Vnde & compertum est, animalia, quæ apud fabros educantur, per exiguum habere lienem. Cæterum cum & illi lienici dicantur, in quibus vires ipsius lienis quædam aut omnes vitientur: inde & lienicus, quis fieri dicitur: sicut stomachici & hepatici dicebantur communis nuncupatione: proprie tamen quidam eos sic appellans, ex Galeno, quibus durus lien est.

OBSERVATIO II.

De lienis obstructione, cum tumore eiusdem.

Melancholicus humor si non expurgatur, facile crassescit, ac obstructionem venarum, & articularum gignit: tunc quidem sola grauitas hypochondrij sinistri, interdum & lienis dolor ægrum exercet. Verum excedens, non tantum venas, sed & lienem vniuersum implet atque distendit: dissipataque tenui illius portione, crassior subsidet, & lien totus obstruitur: & quia lien substantia rarus atque laxus, leui occasione distendi potest, quumque sanguinis feci excipiendæ destinatione sit, hanc omnemque impuritatem admittit: hac imbutus tumet, multo quidem, quam jecur frequentius: ac plerumque sine scirrho. Quod quidem euenit nobili matronæ, cui Hester nomen erat vxori Guilelmi Sonneveldij, cognati nostri, quæ cum obstructione lienis, tum leui tumore, non admodum duto laboraret consultandi causa, anno 1546. me accessit. Cui consului, ut imprimis ærem leuitem quæreret, & temperatum, curasque omnes ex animo expelleret, deambulationes ante cibum admitteret, somnumque in dextrum latus temperatum: verum ut vici-vet ventum septentrionalem austrinumque crassum & pluuiofum frigidumque, maiorem & continuatam mæsticiam, somnum quo supra sinistrum latus: talis enim tumidum reddit lienem. Suasi quoque, ut à cibariis abstineret, qui ex legumine, milio, panico, & tritico impuro constant: hæc enim clamantur: quemadmodum & oryza, pastilia quæcumque farinacea, placentia, lens, cicer, faba, ac cicercula pisumque. Inter obsonia, bubula vetus caro, ceruina, suilla, ac hircina, vetusque lepus, anseres, anates, columbi palumbique vetusti, rursusque veteres, & lac omne fere, casusque vetus, salus, & ex iis condimenta, omniaque dura ac butyro fritta, piscesque palustres & molliis caris, sine squamis, duraque carnis, lienicis nocent: sicuti clibano vel craticula inassata, fructusque stiptici, acerbis ac pomici. Castanea-rum usus, & ydomorumque offendit. Musta inflant lienem, & quæcumque crassa sunt, ac dulcia turbulentaque, & si quod nimium austerum sit: ita & aqua potius nocet: maxime vero à balneo & labore, magisque gelida vel niue iniecta, omniaque n: lilia, dulciaria ac raccharea, vel in condimentis. Concessi auculas montanas, pullosque gallinaceos, phasianos, perdices, passerulos, & alaudas, cibosque concoctos faciles, attenuantes succumque tenuem generantes: talia enim obstructiones eximunt, ac deter-gunt. Tum acida ipsa conueniunt, uti & vinum non valde

vetus, ac capparæ præcipue. Quod ad medicamenta attinet, hæc infrascripta administrata sunt. *℞. end. cicchor. cum rad. ceterach. capill. ven. cassia. scolo-pendria vulgaris, seu linguae ceruina, an. m. j. summitatum lupul. m. ss. corticum rad. cappar. thamaris. an. ʒ. ss. sem. agni casti ʒ. ij. sem. anisi. carui. an. ʒ. j. follicul. senæ ʒ. i. ss. epithymi ʒ. iij. vuar. passul. ab arill. repurg. ʒ. j. fiat om-nium decoctio in aqua comm. pro ʒ. i. ss. adiectione ʒ. iij. aceti in decoctione, coletur, colat. adde oxymellis simpli-cis, syr. de quinque rad. & de scilopend. an. ʒ. j. misce. Deinde secta est vena lienaris, in manu sinistra: quod egregie profuit. Postea denuo purgata est cum decoct. senæ, ceterach. & epith. & similiter etiam cum confectioe hanech, adiectione syr. de epithymo, & ceratum ex ʒ. i. ss. simpl. de meliloti, adiectione pul. rad. thamar. capp. ʒ. j. gummi ammoniaci dissoluti in aceto ʒ. iij. & olei de capp. valde exiguum, ad modum ce-rati leni impositum est, & pilulæ tres ex ammo-niaco aceto dissoluto adhibita: & statim post pi-lulas deglutendo oxymel. squillitici ʒ. i. ss. Hoc solo vidi præceptorem meum Elidæum Bononiæ in nosocomio vitæ curasse quendam spleneticum, tribus annis eo malo detentum, iussu quoque, ut riuetur vino decoct. rad. filicis: quo & idem præcep-tor meus uti solebat. Idem dedit Amatus cenur. 6. cur. 39. ad splenis duritiem post vniuersalia remedia, ad 20. dies, minuit enim lienem: uti & sotos aceti accerimi, in quo lapis pyrites, marcastia dictus, candens & ignitus extinctus fuit: quod acetum spongia vel filtro exceptum, ad Galeni mentem optimum est remedium. Prius tamen, cum hæc mulier esset pituitosa & alba, inunxit lienem iis, quæ tumorem laxiorem reprimunt, nempe oleo rutaceo, & de capparibus, & nardi-no: verum postea, cum durior lien videretur, vte-bar supradictis, insequendo vestigia præceptoris nostri: ut *℞. ammoniaci in aceto scyllino dissoluti ʒ. j. fiat pilula iij. superforbendo oxym. simpl. ʒ. i. ss. postea ʒ. ij. & ʒ. ij. ss. oxym. scyllini superforbendo. Vtebatur in nosocomio etiam hoc vnguento & cerato. *℞. succi bryoniae, succi cyclamnis, an. lb. j. dialthurae, am-moniaci in aceto dissoluti, olei de capp. olei amygd. dulc. an. lb. ss. omnia in duplici vase bulliant, & adde ceræ q. s. fiat vnguent. subinde addebat præceptor meus & hæc sequentia: *℞. pingued. anseris, mucil. alb. an. ʒ. j. pul. thamaris, ceterach. rad. capp. rad. filicis, an. ʒ. j. resine colophonie ʒ. ij. ceræ, resine pint. an. q. s. fiat cerat. Commendabat puluerem thamaris in furno exsiccatum cum cinnamonio, in cibis, & in potu dabat puluerem radicis filicis. Quibus & hæc nostra matrona vtens egregie se habuit, tum continuo capparum esu cum aceto. Noui vetulam quandam, (cum vixisset annis splenetica fuisset) tumore lienis durissimo la-borantem, solo continuo esu capparum conualuisse.****

SCHOLIA.

Sæpe autem vena, quam iecinore ad lienem ducit, magna ex parte obstruitur: vel illa, quæ ad os stomachi fertur, exilior, ex crasso humore vel crasso vento, vel sanguine ipso crasso diutius ibidem, vel in splene, retento: ex retractoribus, aut expultrice infirma: cum enim eo san-guine alatur, & in membri substantiam conuertat-ur, quandoque ita intus inspissatur, ut in miram crescat magnitudinem. Causæ huius oppilationis multiplices, viarum angustia, humoris crassities, aut la-titudo, vel eius exuberantia. Fit & ex prægressis causis, nempe costaneis, fungis, palmis, ficis, melle, muslo, piscibus, aqua palustri, legumine, crassica, pastilibus firinacis, exercitationibus à cibo, balneis que mensibus aut hæmorrhoidibus suppressis, ex sanguine melancholico, bile

7 *Signa com-munia.* bile notha, & pituita crassa. Signa communia habentur ex sanguine vitioso per vniuersum corpus distributo, ex colore nigro, vlceribus immedicabilibus, grauitate hy-pochondrij sinistri duritie, timore, spiritus difficultate, mæsticia melancholica, turbulentis insomnijs, dolore late-ris sinistri. Lienis enim, iuxta Æginetam, os graue olet, gingiua putrescunt, neque in cruribus vlcera perferantur, ut prius dictum est. At attractricem offendit, si iecoris vena ad lienem fuerit constipa-ta, si vero superior vena ad os stomachi, expultri-cem lædit. Si enim vis digerendi lædatur, in om-nibus partibus oppilatio contingit: ex ea enim compositæ febres, hepatici morbi: nam eo pari-ter affecto hydrops haud dubie oritur. Aliquando adest oppilatio sine febre, & sine tumore: tunc totius corporis grauitas, ac magis in sinistro per-cipitur latere, non sine aliquo dolore. Hic aderat etiam læuis tumor. Ita quoque si oppilatio orta sit ex febribus vel si diuturna fuerit, sub sinistris præcordiis apparet durior: tument pedes, ac cu-tis exulceratur, ac post cibum interduntur præ-cordia, sequitur anhelitus difficultas ac tussicula. Ex lienis vero magnitudine corpus macie conficitur: quod in collo euidentius apparet: ex ea jec-inoris habitus corrumpitur, & digestiua præser-tim virtus, oppilata vena ad iecur: corporis totius hilaritas & splendor vitriatur, & alia symptomata praua sequuntur. Quæ vero ad os stomachi perti-net si obstruat, nullum adest cibi desiderium, vomunt atram bilem, acetosam, summa tellure ebullientem ac spumantem, aceti accerimi modo. Vrina sæpe sani similis emittitur, qui si aliquando fatigetur, obscuram reddit. Quod si ex alijs hu-moribus, ut bile, vniuersum corpus calet, etiam si abest febris, oculi & vrinae per bilem coloratae aderunt, sitis, cibi fastidium, & vigilæ: & frigida appetunt. Si à pituita, color albus: non situnt, nisi falsa pituita fuerit: cibi fastidiunt, & pocula magis amant: alioqui vrina crassior & turbidior emittitur, rufusque cum multa salua aquosa, fa-cies decolor, aluus humida, sæpe & membra de-fatigata à cibo. A sanguine, inter appetentiam ciborum & fastidiorum medio modo se habent: reliquis magis languent: venæ sanguine plenæ sunt, & vrina subfulua: etsi non parem visceris tumorem habent. Sed hic magis contingit ex succo melancholico: ita ut fusco colore visantur: quibus subinde aluus sicca existit: tenuis aliquan-do vrina conspiciatur: sed cum humor ille ad jecur retrogreditur, tum vrina crassior emittitur: sordidior: lien extenditur, grauiam membra sen-tiuntur, atro colore suffusa: & acida eructant, & si ex innaturali melancholia, à cibo maior graui-tas, incoctæ ructationes, ventrisque torhones, excrementa spumosa cum cæpitu multo erum-punt, tum alia antedicta ad sunt. Si attractrix ma-le habet, coloris decor amittitur, album oculi languide fulget. At si facies rubore aliquo suffusa decolor facta fuerit, cum cibi tædio, ac in liene calor sentiatur: & si vrina spissior ac rutila red-datur, caliditatis notæ sunt. Contra ex frigiditate facies oculique obfuscantur, & plumbea facies cernitur: parum appetunt, lien ipse frigidior sen-titur: vrina, quæ in summo clara est, in imo tur-bulenta subsidit. De augurijs lienicorum. Lienic-us si dolet (ut ait Hipp.) adhuc spes est: nam à par-te ægra non sentitur dolor, sed à sana, ut scribit Auerrhoes. Lienicis, si superuenerit dysenteria, in bonum cedere indicant Hipp. si iudicialiter eue-nisse constat: tum enim paulatim lien refidet at-que sponte discedit, alioquin hydrops sequitur perniciosus, nimio frigore corpus occupante;

plurimum enim refert an dysentericus ille fluor melancholicus fuerit. Clamat idem auctor, perni-ciosorem fieri, si diarrhoeam diuturnā dysenteria longa sequuta fuerit: & hydrops subinde interce-dat, aut lienteria; tum lechiferum haberi: si splene-ticis quoque profluuium accesserit sanguinis ac sine dolore albescentes vesicas extulerint: cum cibi tædio, secundo die interitum augurari. Inte-rea, si ex splenis oppilatione febres fiunt, pessima symptomata generantur ex ea, nisi subito cure-tur: cum enim jecur pariter afficiat, hydrops haud dubio oboritur. At catarro obnoxij raro splenetici fiunt: nam materia aquosa fluida duritiem non efficit: sit enim durior splen ex materia crassa & melancholica: & quo durior, eo periculosior: cum & inueterata durities, ut postea docebitur, insanabi-lis habeatur. Quod ad curationem attinet, & vi-c-tus rationem, satis constat ex obseruatione præ-cedente, quæ vitanda, & quæ conueniant. Quod ad reliqua medicamenta attinet: quæ jecinori sub-ueniunt, eadem ferme lienem medentur: verum ve- hementiora conueniunt, ac asperiora. Sicuti enim membrum sine metu manu comprehendimus, ita remedia tanquam seruii membro & abiecto im-ponimus: sine villaque æstimatione omnium ex-perimentis expositus est lien: iecur vero medica-mentorum vires reformidat acutas, sicuti aceti acrimoniam: spleni vero conducit oxyporis ad- ditum. Cauendū est, ne ab alijs remedijs obuij jecinori- bus maiora in iura non parua fiat: Licet tamen lien initio facile sanatur: verum si negligitur, ita ut obstruat, aut indurecat, curationem difficilem facit. Opus igitur est (teste Galeno) attenuantibus, nec tamen ni-mium exalfacientibus, ne crassior intus humor fiat, ac inextirpabilis: nam styptica admixta iu-uant, qualis est capparæ radix, & asplenion. Tale absinthium jecori existit: eadem cum oxymelite sumpta, tumorem lienis discutunt: miro modo valet & acetum, in quo decocta sunt. Bibitur ea-dem quoque ex vino cocta: & imponitur quoque: ita & absinthium: portulacæ sem. ʒ. ij. ex aceto sum-pta, & plantag. acetum scyllinum, & capparæ radix in vino pota. Recte itaque dixit Rondelet. quod tot & tales morbi sunt in splene, quot & quales in hepate: & interperatæ, inflammationes, tumores duri, obstructio- nes, & morborum similium symptomata, ut ieteri, hydro-pes. Quare cum fiant simili modo, etiam simili me-thodo, & fere eadem materia medica curantur. Magnam si- in hoc tantum differunt, quod morbi splenis valen-tiora medicamenta desiderant, incidentia, non ob substan-tiam partis (est enim tenuis & rara) sed ob mæsticiam terrenam & crassam, quam in se continet. In ape-riendo minus vitimur adstringentibus quia pars mu-nus est principalis, & minus sui conseruatio- nem indicat: quod de remedijs internis velim in- telligas. Nam quum ad splenis affectus fortissima remedia instuantur, ad jecur etiam perueniunt, idque lædunt nimis fortiter aperiendo, vel dis-soluendo. Differunt & in hoc, quod melancholia in splenis affectibus præcipue expurgatur, bilis in hepatis, in vtriusque vero obstructione, pituita, quoniam magna ex parte facit obstructiones sua crassitie. Quare ea-dem medicamenta curabunt intemperiem hepa-tis & lienis. Inflammatione laborantibus his partibus, in sanguinis missione differunt indica-tiones, ob situm partis: atque in topicorum ad-motione. Nam in hepate admoventur in dex-tra parte circa posteriore, si in gibba sit affectus: ad interiora vero, si in caua: in sinistra & infra-nothas costas applicantur splenetica. In curatio-ne obstructionum & ieteri sola medicamento-rum vehementia differunt. Quare & fortissima

L i iij ad

14 ab obstructions & scirrhus lienis præscripta, erunt splenetica. Item quæ cappare & acetum recipiunt, quæque minus adstringunt, spleni magis sunt accommodata. Quare superfluum esset, ea hic repetere. Id tantum annotare hic oportet, limaturam chalybis, incrementum lienem minuire, ut & aquam fabrorum (de qua prius diximus) & semen portulacæ, cum ob eius facilem relaxationem intumescent. Quæ enim constringunt cogendo: substantiam raram minuunt. Aliud etiam notandum est, quod in tumoribus & doloribus splenis, status discutienda, ut agnus castus, seseli, apij, & petros. semina, succus rutæ, multum iuuant. Colon intestinum spleni alligatur & incumbit, quod in statibus distentum, & agros & medicos saepe fallit. Sed hæc nota discernuntur, quod splenetico dolor gravis sit: colicus vero distendens, acutus & mobilis: spleneticus in parte vna fixus est, in colico totus remittit à statibus distentus: in splenis vero affectibus, sola pars sinistra. Sed hæc omnia exemplis particularibus multo clariora euadent, rursus assumpto exemplo, De obstructione lienis.

OBSERVATIO III.

De obstructione lienis.

1 Isteis diebus quidam cum dolore fixum in loco lienis, nempe parte sinistra, haberet: & valde melancholicus esset, atque grauitatem in liene sentiret, cibique melancholicis vsus esset, & mæstitia melancholica, somniisque turbulentis vexaretur, homo niger & hirsutus: facile obstructionem in liene esse cognouimus. Cum plenitudo totius corporis adesset, viresque permitterent: & trigessimum annum ageret, tempore autumni, quo melancholia magis viget: huic post ventris solutionem ex cassia, nempe 3 j. in bolo, adiecto 3 j. trochisc. de capparis: altero die venam iecorariam vel potius splenicam, in cubito sinistro secari iussimus, lata venæ diductione, ut sanguis crassior efflueret. Quemadmodum etiam in altero in manu sinistra ex saluatella fecimus, cum in cubito minus appareret. Deinde per triduum hoc decoctum sumebat. ʒ. rad. cappar. 3 j. quinque rad. commun. aperit. in aceto maceratum, an. 3 j. summum cum rad. summat. lupul. capill. ven. polytrich. an. m. j. vinar. passul. ab arill. repurgat. 3 j. sem. portulac. 3 i. sem. viticis, feniculi, anisi, filicis, apij, an. 3 ij. sem. 4. frig. maior. an. 3 j. flor. geniste p. j. strom cord. man. b. follicul. senæ 3 i. b. polytr. querc. 3 vj. coquantur in aqua chalybeata (lienem enim duritiem dirimit) q. s. scilicet pro 3 ix. colatura adde syr. de scolopend. de duabus rad. an. 3 i. b. misce, pro iij. dosibus matutinis. Postea purgatus est, in hunc modum. ʒ. catholici 3 vj. confect. hamech. 3 iij. syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ, & syr. de scolopend. an. 3 j. b. aquæ fumar. 3 iij. misce. Altero die mane sumebat theriacæ veteris 3 ij. confer. bugloss. 3 ij. dabatur sex horis ante cibum. Deinde rursus assumpto decocto supra scripto, purgationem sumpsit ex pilulis infra scriptis. ʒ. pilul. induratum 3 j. cum aqua bugloss. sicut pilul. vij. sumenda circa noctis dimidium. Interea adhibuimus præsidia corroborantia lienem, eiusque obstructions tollentia; tam intus quam extra, ut puluerem diacapp. cum vino: & has vel similes tabulas: ʒ. pul. specier. diarrhod. abb. 3 ij. diacappar. 3 j. sem. portul. sem. viticis, pul. rad. filicis, an. 3 j. racch. q. s. dissoluti in decocto summatum tamaricis: fiat confectio in rotul. portulacæ 3 ij. vna sumatur tribus horis ante cibum. Mox & hunc totum lienem adhibui. ʒ. flor.

chamæmel, meliloti, strom geniste, an. p. j. summatum anethi m. b. ceterach. rutæ an. m. j. seminis viticis 3 j. coquantur in aqua vino albo & aceto æquis portionibus, pro 3 i. b. atque in hoc decocto madefacta spongia & expressa, regio lienis bisternæ mane & vespere ante pastum fouebatur: atque demum exsiccata, hoc vnguento inungebatur. ʒ. olei de cappar. lilior. an. 3 j. b. olei rutæ, amygd. dulcium & amar. an. 3 ij. bdellij ammoniaci dissoluti in aceto, an. 3 ij. seminis agni casti puluer. ceterach, seminis portul. puluerisat. an. 3 j. croci 3 j. b. aceti & cere exiguum, fiat vnguentum. quo inungebatur regio lienis calide, mane & vespere, mox à totu: hoc cerato ad linguæ bouis figuram etiam imposito. ʒ. emplastr. de meliloti, diachyl. ireati an. 3 i. b. cortic. cappar. ceterach, ficci & puluerisati, an. 3 ij. seminis viticis, rad. tamaricis, an. 3 j. cum oleo lilior. q. s. lingatur ceratum. Quibus hic optime se habuit: ut & iuuenis in parte Orich. tali, his & similibus curatus est.

SCHOLIA.

1 IN obstructione lienis circumscribendum, num obstructio sit à crassis & frigidis humoribus, sine tumore; tunc à venæ sectione abstinendum: & materia dirigenda cum decoct. chamæd. ceterach, agri-mon. cuscute, hyssopi, calaminth. rad. irid. cappar. thamarisc. betonica, agni casti, dulcoretur cum zacchar. & acetum adiciatur vel oxymel & purgetur cum hiera Russi, vel decoct. senæ & polypod. adiecto agarico. Si materia sit calida, & adit plenitudo, venæ secanda erit, ex saluatella, ut quidam iubent, iuxta Rhaf. etiam ex præcepto Galeni, vel interna sinistri brachij: de qua re latius agemus de phlegmone lienis. Conuenit & syrup. acetos. cum aqua cichorij, scolopend. end. Et alius soluenda cum miscul. rhab. & cathol. & tunc videndum; num adsit febris, cuius ratio quoque habenda. Hic valet & oxyzac. cum decoct. end. scariola scolopend. fumar. ceterach. & similibus, & alius soluenda cum cathol. & thamarind. ac rhabar. vel sero caprino, in quo epithymus maduerit. Vbi vero tumor laxus adest, fortioribus discutientibus & aperientibus, cum adstringentibus calidioribus opus erit: etiam exterius. Sed in duriore tumore magis erit emolliendum; ut possit de scirrhus dicemus. Vide plura de externis remediis, tum euaporationibus lienis obstructa conuenientibus, & potionibus ad lienem oppilatum valentibus, lib. 17. cap. 12. apud Alexandrum Benedictum Veronensem.

OBSERVATIO IV.

De splenis inflatione acensione.

1 PEdissequa cuiusdam matronæ nobilis, dolor rem ex ventositate lienis patiebatur, post esum leguminum, castanearum & ficuum. Cum enim inflatio, iuxta Trallianum, ex spiritu generetur, quemadmodum & aliis corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum, aut castanearum esu, aut ficuum, vel malorum, vel mellis dulcis, vel vini usu. Hæc enim omnia non modo lienem inflant spiritu, sed etiam colum, mesenterium, ventrem & stomachum statibus distendunt. Facile autem deprehendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam causam morbus referri debet. Quod si lien statibus distendatur, & in amplum tumorem attollatur, & æger interrogatus, id se citra poudus

2 dus & loci ipsius grauitatem sustinere, dixerit: tunc ex cibis frigidis malum accidere cognosces. Quod huic pedissequæ contingeat, cum tumor loci imposita manu ad tactum cederet, & distensionem loci inferret, ac cum manu premerem, intus ventus murmuraret. Cum autem ex leui causa id malum excitetur, facile etiam vincitur. Et ideo dedi huic decoctum florum chamæmillæ, cum pulvere diacymini, cum vino generoso: & fotum exterius adhibui lienem, in hunc & similem modum. ʒ. florum chamæmil. meliloti, summatum anethi, sampsuchi, rutæ, an. m. j. rad. iridis, cyperi, an. 3 j. b. baccar. lauri num. vij. sem. apij, petros. cymini, an. 3 ij. sem. fenugr. 3 j. coquantur in vino Rhenano, aqua & aceto, an. paribus æqualibus, ad 3 ij. & siebat fotus cum spongia. Deinde inungebat vng. sequenti: ʒ. olei liliorum, rutæ, amygd. dulc. an. 3 j. b. olei de cappar. 3 ij. cere exiguum: fiat vnguentum molle. Nam & altera mulier sola hac inunctione sanata est, sumendo per horas duas 3 ij. huius pulueris, cum vino. ʒ. diacymini 3 j. b. trochisc. de cappar. 3 ij. misce, & vix per tertiam inunctionem fuit curata. Leuem hæc duritiem, & oppilationem quandam splenis sentiebat: sed non aderat materia. Alioqui illam purgassem. Pharmacopœo cuidam post quartanam curatam remansit in liene tumor, cum inflatione in latere sinistro, ab hypochondrio ad umbilicum vsque; ita ut se hydropicum putaret: cui hic sacculus impositus est. ʒ. florum chamæmillæ, meliloti, an. m. ij. rutæ sicca, absinthij, an. m. ij. folior. lauri m. j. sem. lini 3 j. anisi, cymini, an. 3 ij. fiat sacculus calefactus in vino Gallico, & expressus calide, in quantum sustinere poterat, admotus. Post aliquot dies tumor recessit ex ventre, nonnihil sub hypochondrio manens: qui tamen de loco ad locum mouebatur. Ideo sumpsit continuo ex electuario sequenti: diaprasij 3 j. diacymini 3 j. quo maximam ventositatem emisit: & inflatio recessit, ac appetitus rediit: difficultate anhelitus etiam cessante: hoc tamen sacculo etiam imposito. ʒ. rutæ sicca m. ij. folior. lauri, calaminthe, flor. chamæmil. an. m. ij. cymini 3 j. fiat sacculus, quem cum ter quaterve apposuisset, ab inflatione omnino curatus fuit.

SCHOLIA.

4 S Piritu sæpe lien intenditur, sicut stomachus ac jecur: quæ equidem inflatio (ut dicebat Aërius ser. 10. cap. 9. de inflatione splenis) aut in ventre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. At ubi lien (teste Tralliano) ex toto statibus repletur, fluctuationes, ubi paulo liberaliorem potum assumpserit, experitur. Græci fluctuationes clydonas appellant, quando ut in vtre aqua, ita in ventre copiosior potio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acidus ructus frequenter prouenit, & post cibos singultus. Quod si nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, pungaturque citra aliquam grauitatem, flatuosos spiritus esse putato. Ventosa igitur status generatio, eodem Aërio teste, ex frigidityte membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum ventrem, tum splenem eoncalefacere oportet (præsertim his, quibus vtrumque membrum est affectum) atque id tum his, quæ forinsecus imponuntur, tum cibis ac pharmacis, quæ intra corpus deuorantur, perficiendum est. Ventri itaque auxiliabimur, siquidem per consensum sit affectus, diospoliticam confectioem exhibendo, atque etiam alias, quæ huic similes existunt. Diospoliticum etiam dat Trallianus.

Piper enim & cuminum calefaciunt: ruta status discutit, & partem affectam iuuat, humoresque pituitosos imminuit: nitrum ventrem subducit: mel similiter purgat calefacitque & humores extenuat. Pari modo etiam medicamenta faciunt: diacalaminthes, & diatrionpipereon, eodem autore. Nos commodè vsi sumus & diaprasio, quod & splenetorum angustias paragorizat, & omnium intrancorum vitii prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Panis vero ac edulia vinumque, quod in potu sumunt, ex petroselinio, aniso, cuminove similibusque conspergenda sunt, iuxta Aërium. Iam quoque melanthium, apij semen, anisum, & petroselinum trita, panis apud pistores inspergi debent. Tralliano quoque autore: Eadem, inquit & ille, ex vino pota lienis inflationem tollunt. Itaque liene inflato, prædictis potionibus, & epithemate diaspermatum, ex Aërio & Tralliano, exterius vtendum: modo non adit durities lienis, alioqui hæc nimium desiccarent, & maiorem duritiem excitarent. Potui vero dare eis viticisemen torrefactum, petros. melanthium, anisum, sison expedit, & si statibus plenus sit lien, dantur illa ex aceto aut oxymelite, aut posca. Plura videas apud Trallianum, & Benedictum Veronensem lib. 17. c. 20. de lienis inflatione, qui & cucurbitularum vsum in lienis affectibus commendat. Vehementius enim impacta plurimum iuuant, cum ex alio spiritum extrahant, sed non nisi præcedentibus remediis vniuersalibus, si & humores obstruentes adfuerint.

OBSERVATIO V.

De phlegmone lienis.

1 Vt ille, qui astu quodam, tum febre continua, corripiebatur, simul grauitatem cum dolore & distensione hypochondrij sinistri sentiebat; ita ut hic lien proculdubio afficeretur phlegmone, sanguine ad ipsum conflente calido, & satis crasso. Ad hunc cum intrasset accitus, talem victum præscripsimus, qualem sæpius in aliis inflammationibus valere scripsimus. In principio vinum inhibendo; postea in fine aquosum concedendo: in primis diebus solo pitane cremore ægrum nutriendo, & etiam panata. Statimque iussimus, & sanguis ut venæ iecorariae cubiti sinistri detraheretur. Et mox à venæ sectione locum dolentem inunximus oleo rosaceo, & chamæmelino, pauco addito aceto. Oportet enim statim à venæ sectione aliquod reprimens apponere, sed neque adeo frigidum, neque valde astringens: humor enim densatur & stipatur facile. Ideo ea incoqui debent, cum his quæ incidunt & extenuant humoris crassitiem: cuiusmodi est acetum; quo etiam calido vult Rhafes foueri. Sed si vinum austerum vetus, oleo dulci admiscueris, optimum erit fomentum: vel hoc quod rosaceo & aceto constabit; quo nos sæpe feliciter vsi sumus. Verum cum post venæ sectionem etiam ea medicamenta conueniant, quæ aluo educenda idonea sunt, lenia tamen eligenda, ex eiusdem Alexandri testimonio, præsertim per initia. Lien etenim per initia purgari potest. Tamen processu temporis validiores purgationes exhiberi possunt, ut ipse refert. Hæc namque via dumtaxat lienis superflua vacuari debent, non per renes, sed superne deiectionum adhibendum, à situ societateque sumpta indicatione: quemadmodum à Gal. 13. method. scriptum inuenitur, quamuis venter etiam per clysteres assidue elui debeat; & maxime

maxime si venæ incidendæ mēdela relinquantur, ex *Aetij* sententiā, & præcipue in morbi initio, vel incremento, ut inquit *Alexander Trallianus*. Verum antequam purgans medicamentum exhibeatur, etiam humor præparari debet ad expulsiōem, cum oxymelite, syrup. è succo fumarie seu borag. cum decocto melisse, lupul. & similibus. Nos vero tali vi sumus. *℞*. rad. cicchorij, dentis leonis macerat. in aceto, an. *℥* j. fumarie, summitatum lupul. borag. buglos. viol. bordei mundati, an. m. j. uuar. passul. enucleat. *℥* ss. fiat decoct. in aqua communi, pro *℥* ix. colatura adde oxycacch. simplicis, oxymel. simplicis syrup. ex succo fumarie, an. *℥* j. misce, fiat apozema pro tribus dosibus. Deinde illum purgavi, in *℥* iij. eiusdem decoct. dissolvens diacatholici, elutrii lenissimi, an. *℥* ss. syrup. ros. solut. *℥* j. misce, fiat potio. detur in aurora. Cum autem alium optime deposuisset, post inunctionem iam dictam, hoc etiam cataplasma vel simile imposuimus. *℞*. farina bordei *℥* iij. flor. ros. rub. *℥* j. chamemeli, absinthij, melilori, an. *℥* ss. cum oleo ros. ni maiori quantitate: adiecta exigua portione olei nardini: fiat cataplasma. Verum si caliditas magis intendatur, addemus succum portulacæ, & folia salicis. Postea vero, ubi feruor magis conquiescisset, ad medicamenta plus resolutentia transibam. Oportet autem in mali incremento relaxantia siue dissoluentia augere, ut latius scholio sequenti agemus. Ideo inunximus oleis sequentibus. *℞*. olei ros. chamemilli, lilior. an. *℥* ss. misce. Vbi enim feruor quiescerit, parum ad medicamenta, quæ resoluunt, est transendum; cauendo semper ne induretur, dissoluentibus. Præterea studendum est, ut robur eius seruetur. Nam ex imbecillitate, si non attrahat, vel non pellat, cacochymum reditur corpus totum, non secus atque in vesica felica, vel renibus: ideo mixtura astringentium eget; sed non atque (ut paulo ante diximus) ac ietur. Interea intus utebamur decocto scolopendrij, corticis salicis, fraxini, viticis, folior. & sem. & rad. myricæ, cum oxymelle etiam non parum acido, vel borag. amulis. Et utebamur in cibis inybis colitis ex aceto, & lactucis, obsevem, maxime in principio, cum amplius esset refrigerandum. Postea febre inclinante, decoctis iam dictis utebamur: etiam fort. ex sumagrac. sem. lini in posca colitis: additis rad. cappar. folijs malue, & ceterach ac viticis semine. Quibus prædidiis dolor cessauit, & inflammatio resoluta fuit à fotu absque scirrho. A fotu quoque postea inunximus oleo amygd. amar. cui masticis & cera parum adiunctum esset. vel oxymelite: & ad roborationem intus sumendo diarrhod. abbat. Quibus remediis sanus factus est.

SCHOLIA.

4. Quamuis variis (teste *Alexand. c. 12. lib. 8.*) quam alia viscera lien inflammatione conficitur; interim tamen & ipsum inflammari contingit: ut liquet apud *Galen. 6. de loc. affect. c. 13. meth. medend.* & alijs plerisque locis. Et quamquam præcipue fiat ex sang. crasso melancholico, potest etiam ex alijs humoribus fieri, ut ad longum docet idem *Alexander Trallianus*, nempe sola sanguinis copia in lienem conflata: & tunc dolor cum tumore & tensione vget vehementer, cum multa grauitate: inter in obsequio membri tunc excitatur: unde scirrhum & inflammationem plerumque contrahit: interdum etiam sine dolore angescit, durusque efficitur, quod tactu subinde cognoscere possumus. Quippe tangentibus facile apparet: item cum ex mollitie in largiorem molem deductus fuerit: attolliturque adeo, ut super musculos, qui extrin-

secus incumbunt, excrescat. Ego enim sapius vidi, (inquit *Alexander*) non solum ventrem & stomachum, sed etiam dextram præcordiorum partem, & pubis peritæmem, lienis tumore occupari. Hippocrates memoria prodidit, sanguinis in liene abundantia ventrem indurescere: corpus humoribus vigiliisque extenuari, & faciem emacrescere. Nam & liene ipso carnes colliquecunt, & magna sitis vget. In primis enim lienis tumor apparet humidior: dum scilicet humor adhuc fluit: ubi vero collectione facta indurauerit, necesse est, ut iugulum non sentiat alimentum, & vena in musculis foras prodeat, color melancholicus aut pallidus fiat, & aqua subter cutem subsequatur. Vbi biliosus fluxus in lienem decurrit, totum corpus calidum esse, & sine febre, videtur: oculi inethi sunt: vrina coloratior, acresque, aut flaua, more inflatur, aut rubra existunt: agri subundi, frigidam bilere appetunt: animo sunt abiecto: cito furunt: os habent amarum, cibum fastidium, vigilijs torquentur & ventris turbatione: linguam habent flauam, atque alia id genus similia, quæ bilem resantur, sustinent. Si humor melancholicus adsit, paulatim in his color melancholicus fieri videtur: præsertim facta iam inflammatione, cutis & vena nigrior efficitur. In toto corpore bilis atra abundat, gingivæ nigrae apparent, sitis vget, & agri si frigidam potionem assumpserint, magis cibum appetunt. At si humor pituitosus in liene collectus inflammationem pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur, oculorum, linguæ, & cutis corporis: agri non sitiunt, sed cibos appetunt: si pituita non salsa fuerit in liene. Hoc ergo scire licet, quod ex pituita quotidie febricitant, ex bile, tertio die: ex melancholia quarto. Quod ad curationem inflammationis lienis attinet, primum (ut *Curatio* idem docet) vniuersusque humoris signa considerari oportet: atque sic tandem curatio adhiberi debet. Recidivæ, ut videtur, non magna solitudine timenda est. Nec pluribus verbis opus est. Nam ubi semel curata fuerit, non facile reuertitur: varius enim (ut paulo ante diximus) lien inflammatione conflatur. Hoc autem observandum est, ut pro humoris natura, ex hoc generata est, conueniens, non autem contraria, adhibeatur curatio. Nam enim cibi potusque aliqui morbo occasionem dederunt, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia inmemoscere oportet: similiter atque si agri fuerint, ac exercitio ac labore se fatigaverint, an balneis frequenter, aut nunquam visi sint: & an ex accidente, an à parentibus hunc affectum sustineant. His diligenter examinatis, si inflammationem exercet, primum sanguis deirahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. De quibus videas eundem *Alexandrum Trallianum lib. 8. cap. 12. de lienis affectibus*. & *Aëtium lib. 10. cap. 10. de splenis inflammatione*. Sed hæc omnia exemplis particularibus multo illustriora apparebunt.

OBSERVATIO VI.

De inflammatione lienis, ex sanguine crasso melancholico.

4. Rarissime ex sanguine optimo, ac medio: crem crassitudinem habente, ipsam inflammationem in liene oriri contingit: sed sæpius ex sanguine crassiore excitatur, sæculento, limoso, ac crasso: unde & inflammationes facile duriores fiunt, ob humorum crassitatem: hinc & dolor sinistri hypochondrij, ac etiam feruor, distensio & tumor, & multa grauitas vehementer vrgens, statim apparent; & tumor ob duritiem facile tangendo deprehenditur, ex *Galen* sententiā, præsertim processu temporis, ut ab hinc aliquot annis in viro quodam decumbente animaduertimus. Sed hic statim, eo quod erat ex humore crasso,

crasso, & in alio quodam viro, ad quem acciti sumus, etiam leuis durities apparuit. Has notas itaque considerantes hoc modo curationem instituiamus: similem viam instituendo, quem in cæteris inflammationibus nunc vtilem diximus: etiam cremore ptisanæ tum alijs vtens, ut in priore ægro fecimus. Venamque statim ex saluarella manus sinistræ incidere feci, cum magis apparet. Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis præsentissimum est remedium (testante *Tralliano*) maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est: si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluuium. Hæc enim sola in ista causa dilationem suadent. Sin autem ætas, aut vires non prohibeant, venam brachij sinistri interiorē secabis: si ea non appareat, media ferienda est: sine illa quidem in conspectum proveniat, humeraria credenda est: si nec ipsa quoque conspiciatur, ea, quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Rhazes etiam ex saluarella sinistræ manus sanguinem demit. Quod vero huius venæ in extrema manu existens, sectio conferat pro lienis inflammati curatione, confirmavit *Paulus*. Id quod forte innuere voluit *Galenus in lib. de curatione per venæ sectionem*. Quamquam quidam negatiue literam legant: nam *13. method.* secat venam cubiti sinistri. Et si vero ex saluarella, inquit *Trallianus*, minus sanguinis euacuetur tamen quantalacumque inde tentata inaniatio præcipuum lienis ad sanitatem adiumentum est.

3. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubeus sit, & purus aut liuidus. Nam si liuidus est, aut æquo rubentior, copiosior auferri: si purus ac syncerus, paucior debet. Verum sic extrahendus, ne vitalis facultas deficiat. Ideo præstat aliquando non semel quantum cōueniat extraxisse: sed in duos dies id partiri satius est, ut *Galenus* refert. Deinde alium altero die leuiter expurgauimus cum decocto sene & epithymi: addendo cassia recens tracha *℥* ss. & diaprum ac elect. lenissimi, an. *℥* ij. misce. Mox & hunc syrupum propinauimus. *℞*. syr. de sumorera: viol. de erythymo, an. *℥* j. aque buglo. lupul. cicchor. an. *℥* ij. deir. duabus vicibus. Postea purgavi hoc modo. *℞*. diacathol. *℥* vj. diasena *℥* ij. diaprum. solut. *℥* j. cum aqua decoct. borag. buglosse, fumarie, scolopend. *℥* iij. fiat potus: addendo *℥* ss. oxymellis simplicis. Interea statim à purgatione priorī, ad extrinsecā medicamenta peruenimus, quæ citra euidentem calorem extenuarent: admixtis quibusdam adstringentibus, in *Pauli doctrinam*: nam ea mixta qualitatis esse debent, non solum in generatione phlegmonis, sed etiam cum nec esset amplius quicquam: quamquam si quis in principio repellentibus tantum vtatur, non peccet, *Galenus* auctore *13. method. med.* Communis tamen indicatio (ut idem inquit) omnibus his partibus, quarum munus eiusmodi est, ut toti corpori sit ex usu, est, ut medicamenta exigant, quæ mixta facultatis sint. Et propterea nec lienem tantum relaxantibus curare oportet, cum hic quoque ex iccinore quicquid limosi & melancholici est, expurget; propterea scilicet, quod ex eo humore nutritur. Quinimo semper eius robori consulendum est, adiciendo relaxantibus astringentia medicamenta, eodem *Galen* & *Alexand. testibus*. Primo itaque hunc fotum, vel similem, adhibui statim ab initio. *℞*. vini austeri veteris *℥* j. olei dulcis, olei ros. coroneorum, olei chamemeli. an. *℥* ss. aceti optimi *℥* j. lana succida excepto medi-

camento (ut *Aët.* suadet) vel lienis linteis sapius sinistrum hypochondrium fovebamus: etiam hoc linimento (vel eius æmulo) inungendo post fotum. *℞*. olei anethini, rosaci, coroneor. an. *℥* ss. paucis vino ac cera adiecta: fiat unguentum. Imposito hoc vel simili quoque cataplasmate, ex *Aëtio* ex hordeacea & loliacea farina, cum posca, & mellis ac olei omnino paucissima mensura, in quibus absinthium ac pulegium incocta essent. Postea, cum paulo durior splen fieret, hoc vel simile cataplasma imposui, ex farina seneræ ac lini, bordei, ana. *℥* j. caricarum, aceto acerrimo maceratum, num. v. adipis aseris, & buryr. recens, an. *℥* ss. olei chamemilli, coroneor. lilior. an. q. s. fiat cataplasma. exiguu oxymelite adiecto. Quibus dolor cessauit: & curatus fuit: ut neque in scirrhum transmutaretur, neque ad suppurationem veniret, quod tamen rariius contingit.

SCHOLIA.

5. Verum, quod iam fere omissum est, cum hic laboraret lienis inflammatione, & quarto die sanguis quidem è sinistra nare erumperet, magnam attulit utilitatem. Nam quibuscumque *ætiæ* eruptio sanguinis accidit, summum id commodum laborantibus affert: quemadmodum Hippocrates memoriæ prodidit: quibus vero contra euenit, nihil inuat, aut etiam interdum noceat, quod vires citra morbi leuamen deficiat atque exsoluat, ut *lib. de curand. ration. per venæ sectionem*, à *Galen* scriptum est. Hæc enim ad prognostica, gnostica signa pertinent, uti & hoc: Licet rarius quam cætera viscera lien inflammatione remetur, tamen si in eo excitetur, magna cum diligentia curanda erit: alias non solum prava consequentur symptomata, verum etiam temporis processu perniciem causabit: potissimum si eadem in scyrrum veritatur. Ideo cauendum, ut non nisi corpore euacuato calidioribus vtamus: alioqui scirrhi auctores, iuxta *Aëtium*, erimus. Quod si ad permutationem in suppurationem repat, quod tamen raro contingit, licet aliquando periculum adferat, adiuuare tamen eam oportet, ne plura corpora putrescant: per cataplasmata videlicet, quæ pus producant, de quibus hepatis abscessu manifeste est prædictum. Hepar enim frequentissime abscessum præfert ac exulceratur: lien rarius. Hoc tamen semel in monacha *Alcmariana* vidimus, quæ abscessum in liene passa, pus per lotium excreuit, & à me curata fuit: cuius historiam posuimus *lib. 4. de feb. pag. 245*. Cæterum ea, quæ de hepate diximus, ad splenis curationem hic transumes. Euenit quoque interdum, ut iecoris abscessus in splenicum conuertatur: quod in bonum cedit: materia enim ex nobiliori membro ad ignobilius conuertitur. At si è contrario contigerit, perniciosissimum est. Apostema quod totum lienem complet, malum est: è sanguine minus periculosum: durum deterius: vel si membri summam partem compleuerit. Sicuti ex nare sinistra sanguinis profluuium, ita & profluuium ventris, bonum pronuntiat, si in die iudiciali euerit, ac signa digestionis materiæ antecesserint. At ventris fluxus brevis, ex alijs pariter humoribus bonum augurium præstat. Vrina vero faci similis, viscosa, dubium prælagium denunciat. Neoterici vero, & qui *Auicennam* sequuntur, apostemata lienis penes materiam distinguunt, vel ex sanguine, vel ex alijs humoribus: quamuis plerumque dura & melancholica existant: rara mollia, pituitosa & biliosa: sed

7. Apostemata splenis distinctio.

Causa,

ex sanguine crasso facile ad duritiem permittuntur; secundum figuram modo rotunda, lata, longa, penes situm. Et ita causa huius apostematis alia primitiva, ut regimen indebitum rerum non naturalium, aer crassus, vinum crassum, & quævis melancholicum succum procreantia; casus, percussio supra latus sinistrum, labor superfluus in æstate, quo sanguis adurit, cibique crassi. Causæ antecedentes sunt humores ipsi: atque horum signa ex Tralliano adduximus. Si plura de notis distinctis huius desideres, perlege cap. 16. lib. 17. apud Alex. Bened. Veronensem. Vide & Arculanum. Hoc præmonito quod quinque modis, iuxta Arculanum, terminetur: aut enim resoluitur insensibiliter, aut euacuatur sensibilibiter, per vomitum, vrinam, aut secessum: aut induratur, & sic perpetuo manens, aut permittitur ad hepar, aut ad alia membra nobilia vel ignobilia, sicut ad cutem: & fit apostema difficilis suppurationis, & subinde icteritia nigra. Aut maturatur ac suppuratur & rumpitur. Signa suppurationis & collectionis constant ex iis quæ de pleuritide & abscessu hepatis diximus. Dum pus sit, sunt dolores & rigores: & suppuratione perfecta dolores desinunt. Sic etiam phlegmone præcedente si dolor ac feror quiescant, & durior fiat tumor scirrhum expectamus. De quo paulo post dicemus. Quomodo autem apostema splenis seu inflammatio curetur, nunc ex parte diximus. Neoterici & Arculanus, vestigia Auicennæ insequentes, omnium primo rationem habent causæ antecedentis, vtentes & diuertione & euacuatione: secundo vero causæ coniunctæ, in principio vtentes repercussivis, sed non adeo puris, ne fiat durities: in augmento vtuntur repercussivis, mixtis resolutivis: in statu & declinatione, resolutivis modo ad viam resolutionis tendat: sin ad maturationem, quod raro contingit (vi diximus) iuuanda erit: alioqui si ad scirrhum & duritiem, tunc curabitur, vt scirrhus, cuius postea exempla adferemus. His adiciunt & accidentium correctionem. Diuertendi autem & euacuandi intentio perficitur in principio cum venæ sectione. De qua iam dictum est, nempe ex basilica sinistra vel saluatella: alioqui secundum quosdam, ex saphena, si ex mensibus restrictis vel hæmorrhoidibus restrictis euenerit. At si alius non respondeat, prius præmittunt clysterem, aut leniens medicamentum. A clystere statim venæ sectio peragenda. A leniente per os exhibitio, in alterum diem venæ sectio proroganda: quæ magis conuenit in apostematibus calidis, quam frigidis, in quibus hæc ipsa suspecta est. Alioqui etiam in iis, qui non sustinent venæ sectionem, eucubitulis cum scarificatione natiuis impositis, vel sanguifugis venis hæmorrhoidalibus admotis vtuntur. Alium autem, quod ad purgationem attinet, de qua etiam prius dictum est, molliter solumus epithymi decocto, adiecta cassia vel manna, in materia calida: in frigida agarico, adiecto electuario lenitio, in melancholia, dialene & diacatholico. Et si detergentibus opus est, in iis cauemus ab illis, quæ vehementer vrinam ciunt. Nec à deiectione largior potus dandus, ne ad icteris gibbum materia trahatur: tum enim sitire conuenit, aut saltem parcius bibere. Iam aliter quoque syrup. fieri posset, in materia calida ex succo, sumaria, seridis, tenerissima filio, salicis, tamaricis, fraxini, interitis corticis, & scolopendrij, sem. portulacæ, corticis tementorum, cucurbitæ aride, cum zaccb. addito aceti momento. In frigido apostemate, salicis eiusdem, & tamaricis

tenerissima, fraxini, scolopendrij, marubij, rad. capparis, fanic. apij, bugloss. cichorij, seridis sumaria, sem. anis. chamæd. adiecto zaccb. & aceto. fac syrup. acetosum. Plura de potionibus & purgationibus vniciue humori destinatis, vide apud Trallianum & inter neotericos Arculanum. Quod ad topica attinet remedia, Aetius vtitur fotu ex oleo dulci, & vino austero in principio, & si maior sit caliditas, oleo ros. aut omphacino. Alij in materia calida filtro fouent in decocto immerso, & expresso in decocto hordei, salicis, cum aceto, vel oleo ros. solo, & tertia parte aceti. Vel inungunt cum oleo ros. & chamæmel. In augmento addunt folia tamaricis, & semen agni casti. Si magna sit inflammatio, addunt succum portulacæ vel plantaginis, vel vtuntur emplastro ex farina hordei, ros. absinthio, meliloto, scolopendr. In statu addunt schœnambulum, cyperum, ceterach. flores geniste, & ficus, cum aceto insus. In declinatione oleum de cappar. ping. vituli, ammoniaci, medull. & ping. crates, & similia. De quibus latius vides & Aetium & Paulum, ac Alexandrum Trallianum, & Alexan. Benedictum cap. 18. lib. 17. quæ ipse ex iisdem auctoribus: tum Arculano, mutuatus est. Alioqui auctores, vbi prædicta non sufficiunt ad phlegmicos & vltiones confugiunt. Si ad maturationem tendat, vtendum diachylo: licet maturantia varianda pro diuersitate materiæ, vt in calida, maluanifcus, farina, sem. lini, fenugrac. ficus pingues, oleum sesaminum: in frigida, rad. ireos, in melancholia, magis emollientia, & non multum calida, vt mucag. sem. lini, fenugr. alibæ. Vt rumpatur, adde radic. narcissi. cape. Post ruptionem vlcus curandum, vt reliqua vlcera, & detergendum: & postea consolidandum. Si ad duritiem & scirrhum tendat, magis humectandum & mollicandum. Sed de scirrhu latius dicemus. Accidentibus vero succurrunt, nempe dolori, per anodyna, ynctionibus fomentis, facculis, emplastris, velicis, & similibus: & nunquam, nisi coacti, ad stupefacientia perueniunt: vt ostendimus exemplo sequenti, tum Scholio, ad maiorem enucleationem doloris ipsius splenis.

OBSERVATIO VII.

De lienis dolore.

Vir quidam quadragenarius, qui à quartana dolorem splenis incurerat, hoc vnguento sequenti optime habuit: quo vtcbatur, corpore prius repurgato ac euacuato, decocto senæ & epithymo, & aliis conuenientibus. ℞. olei rutæ, olei lilior. de cappar. an. 3 b. succi fraxini, axungie porcine, an. 3 iij. pulueris ceterach. 3 j. cera parum: fiat vnguentum fluxibile. Illud etiam, quod ex genista fit, commode adhibetur ad splenis dolorem: etiam ad eiusdem duritiem. Quod ita fit. ℞. florum geniste lb j. butyri Maialis, axungie porcine, an. lb j. reuantur simul, & sicut in sole: addendo cera parum: fiat vnguentum.

SCHOLIA.

Dolor splenis, qui tristis sensatio existit, per membranam eiusdem plerumque, & non per carnem spongiosam, contingit. Interea hic dolor quintuplex esse potest: pungens, perforans, extendens, grauius & pulsans. Pulsans magis continet in inflammatione, ob multitudinem & magnitudinem arteriarum, quæ sunt in ipso: & magis ad arterias pertinent hi dolores. Pungens, ad membranam. Grauius, ad

ad substantiam eiusdem, ex materia aliqua. Extendens, ad vapores flatulentos, & ventositatem. Perforans, seu mordicans, ad ulcerationem. Quidam & hunc dolorem distinguunt, in lenem, obusum, paruum, vehementem, non diu durantem, diuturnum & acre dissolubilem, ex se incipientem, aut alios morbos consequentem, in corpore sano, forti, robusto per naturam, aut debili. Vel distinguunt penes materiam, in immateriam, vel materiam, idque cum apostemate, vel sine, modo cum febre, modo sine ipsa. Sed ille dolor potest esse à nuda intemperie, aut à solutione continui, aut vtraque simul, vt in apostemate, vel ab obstructione, inflatione, tumore. Cæterum inflatio ingentes dolores efficit: & qui ex obstructione fit dolor, minime contemnendus est, cum facile ad apostema transeat, vel tumorem inducat. Tumor hic potest esse non apostematofus siue humoralis, siue ventosus: & non est quidem immediata causa doloris, sed solum mediante mala intemperie, aut solutione continui, sequente extensione. Similiter eius oppilatio doloris causa esse potest. Mala autem intemperies, existens causa doloris, aut est calida, frigida, sicca, sine materia, aut cum materia, ex quocumque humore, magis tamen ex materia melancholica & sanguinea, rarius ex pituitosa & biliosa. Rursus huius malæ intemperiei aliquæ causæ primitivæ, aut plures ex sex rebus non naturalibus aut extraneis: aliqua corporea, & sequentes dominium humoris, qui est in ipso, aut eius oppilationem, aut vapores flatulentos. Et quandoque fit aut fouetur per communitatem, aut à toto, sicut in febribus, hydropse, lepra, & similibus, aut à membris particularibus, vt hepate, vtero, & aliis. Ad intemperiem etiam pertinet debilitas splenis: nam & hæc à duabus causis in genere provenire potest, aut à mala intemperie, aut à mala compositione, seu à laxitate suæ substantiæ: quamuis & debilitas fiat ob solutionem continui, sed cum medici hoc relinquunt chirurgis, pauca de eo admovent. Debilitatur quoque ex apostemate, vlcere; præcipue vero à calida & sicca intemperie, minus ab humida, nisi oppilando & extendendo. Et sic debilitates virtutum cum sequantur malitiam complexionis, seu intemperiem, & intemperies causa doloris existit; ideo & debilitates sub hoc capite dolorum splenis concludunt illi auctores, qui supra Rhafem scripserunt. De causis externis manifestum est, quod & victus ac occurfus multum calidi aut frigidi, inducant intemperiem, & quæcumque multiplicent vapores crassos, & inhibent resolutionem: ita aer crassus vaporibus mixtus dolorem splenis infert; & somnus prolixior, & animi acidentia subtristia, & quicquid humorem melancholicum crassum generat, vt legumina, faba, lentis, caro bubula, tum alia, quæ de melancholia diximus, hæc splenem afficiunt. Quod autem apostemata dolorem inferant, satis liquet ex supradictis; quamquam hæc differant à tumore & duritie per solutionem continui, quæ est in apostemate; & non in duritie, & tumore non apostematofus. Hæc ipsa distinguuntur penes materiam, & penes figuram. De quibus satis dictum est, à quibus fiant, & quibus signis cognoscantur, & quomodo curentur, in duobus Scholiis præcedentibus. Dolor itaque, qui in apostemate contingit, modo causa ablata & apostemate curaro, modo anodynus tollitur. Sed quod ad signa doloris attinet; quedam præfagiunt dolorem futurum, vt omnes causæ potentes inducere intemperiem ipsius splenis, siue primitivæ

fuerint, siue antecedentes aut corporeæ, vt de aere calefaciente vel in frigidante lienem; quæque oppilationem & ventositatem in splene inducunt, vt potus aque gelide, cibaria melancholica, pedum infrigidatio; ita de aliis causis, quæque solutionem continui vel apostemata præcedant. Ita percussioni præcedenti in loco lienis, subsequetur dolor. Ita in autumno magis expectamus spleniticas agitudines; & post quartanam & febres diuturnas. Signa demonstratiua per se manifestata sunt, quia adest dolor in sinistro latere, & tristes sunt, ob vapores melancholicos à materia resolutos, & cordi vel cerebro communicatos. Color quoque is mutatur, modo ad citrinū, viridem, pallidum, vel atrum colorem, iuxta diuersitatem causæ efficientis dolorem. Signa etiā causarum, scilicet ex nuda intemperie, satis liquet ex Scholio Observ. 1. huius libri. Sic frigida patet ex cibo & potu frigido assumpto, aqua frigida, ostrea, fructibus pomaceis copiosis, cibisq; crudis: calida magis in febribus, sanguine accenso in æstate, & in homine plus iusto calefacto. De quibus vide plura apud Alexand. Trallianum, & curationem etiam scholio iam citato. Ex intemperie cum humore, qualis humor abundat, in scholio obser. 2. huius libri diximus, & scholio obser. 5. cum de phlegmone ageremus. Ita vt & obstructionis & phlegmonis signa satis dicta sint; & vtriusque mali, tum obstructionis, vt obser. 2. & 3. videre licet: & de phlegmone seu apostemate egimus in quibus Obser. 5. & 6. in scholiis iisdem. Sed hoc obiter addum, quod oppilationem ab apostemate hoc modo dissimulamus: quoniam in illa medius omnes obstruuntur, nec lien violenter distenditur, & plerumque sine magno dolore & febre: in hoc vero, materia in vnum congregatur locum, qui violenter & acriter distenditur, ita vt continens materia solvatur vel scindatur. Reliqua vero signa oppilationis & apostematis, superius dicta sunt: quamuis & hoc in memoriam reuocandum, quod oppilatur via, per quam splen recipit melancholiam; tunc splen non erit tumidus, tumore ab humore proveniente simo potius extenuatus. Quædo vero oppilatur via, per quam mittitur melancholia ad os stomachi, splen tumidus est, cum melancholiam recipiat, & non expellat; neque fames more solito excitatur. Præter iam dicta, vt constat 2. ad Glauc. fit dolor & extensio ex flatibus; & est morbus frequentissimus. Facile enim, Doloris di- vt prius dictum est, obser. 4. & scholio eiusdem huius distinctio ex libri, à crassa materia turbida, vapor turbidus & inflatione, flatu excitantur. Rhafes de hoc affectu egit, cum ait: Si splenensus fuerit, & cum tangitur, sentitur rugitus, id est, sonus flatuosi spiritus collecti circa sinistram hypochondrium. Hoc modo distinguit Arculanus ab apostemate, primo, quod in inflatione non sit gravitas: secundo, quod incessus & exercitium in apostemate, splenem dolore magis afficiant, in ventositate & contra dolorem sedent & ventositatem resoluunt. Tertio, in inflatione adest rugitus, qui non adest in apostemate, & rugitus, per quem ager alleviatur. Quarto, in inflatione non adest febris, quæ apostema comitatur. Curationem inflationis, loco citato diximus: Quam & Rhafes curat, primo dieta, quæ ad calidum & siccum & extenuans tendat: cibos dat minime flatulentos, tenues, concoctu faciles, olera omnia abiecta, legumina, potum aquæ, vel vini austeri. Propinat trochiscos de capparibus. Extrinsecus apponit emplastrum ventositatem dissolvens. Plura vide apud Arculanum, & quæ prius ad inflationem valere diximus. Sed his & illud addendum, quod dolor splenis quocumque modo fiat, differt à dolore musculorum, per rationem exterrum: si enim muscoli dolent, etiam leniter si tanguntur.

M m gantur,

Signa præfagiencia dolorum.

Pet. Forest. Tom. 2.

Distin-
ctio
musculorum
splenis
olenti-
um & co-
lici doloris.

9

gantur, illico dolorem percipit ager. Sed in splene, dolor statim à cibo sumpto communicatur, & color saepe mutatur; quod in musculis externis non fit: quamvis difficiliter cognoscatur in musculis profundioribus, quam in iis, qui in superficie positi sunt: hæc tamen supradicta non aderunt. Unde Bertrutius, medicos iuniores admonet, dicens: Cane ne inflationem musculorum ventris, vel intestini coli, transeuntis super lienem, indices oppilationem splenis, seu apostema. Distingue ergo per colorem corporis prædictum, & per profunditatem loci, & vrinam albam, subtilem, radiosam, vel rubram confusam, quoniam ista non apparent in doloribus intestini vel musculorum. Certius quoque signum sumitur à ventris stipticitate, quæ sequitur & antecedit tales dolores, & à satietate nauseativa. Quare per resolutionem excafactoriis, ut plurimum, solvuntur, vel cum ventris fluxu, aut alui solutione: quod non statim contingit in apostemate vel oppilatione splenis. Dolor immaterialis, ex nuda intemperie, non ita gravitatem habet admixtam, ut materialis. Sed quibus vna quæque intemperies, siue nuda, siue cum materia, internoscatur, satis ex locis iam supra citatis cognoscetur. Restat, ut signa tantum debilitatis virtutis lienis breviter explicemus: & hæc plerumque tria existunt. Primum est corruptio coloris corporis, & conversio eiusdem ad meredinem, quæ omnium primo præcipue apparet in oculorum albuginibus: quod eundem contingit liene ad se non attrahente melancholiam ab hepate, neque in eo purificante sanguinis massam, cum hoc sit eius proprium officium. Hinc si attractiva virtus debilis est, materia melancholica in toto abundat, & sic iterum nigra, de qua prius dictum est. Secundum signum commune est, prostratio appetitus, & paucitas melancholia acetosa, quæ transmuti debet à splene ad os ventriculi, ut appetitum incitaret. Tertium est ablatio vel diminutio hemorrhoidum, quæ oriuntur à splene ad venas coarctatas. At si debilitas potissimum attrahitua sequatur calidam intemperiem, vel ab ea orta fuerit, signa aderunt caliditatis, quæ sentitur in hypochondrio sinistro: & citrinitas seu rufedo quadam cum nigredine, in cute corporis & albuginibus oculorum apparet: nigredo enim illa inclinat ad rufedinem, cum quadam claritate: & destructio appetitus adest, cum vrina spissa & colorata, seu rubea crassa. Si ab intemperie frigida, color lividus erit, nigredini permixtus, nigredine inclinante ad quandam obscuritatem circa alba oculorum, & lividitatem. Et frigiditas in latere sinistro sentitur; neque adeo destruitur appetitus, ut in causa calida. Vrina modo clara, modo turbida mingitur, sape & glauca, inferius turbida, & clara superius. Quod si cueniat ob raritatem substantiæ splenis, tunc cum signis communibus prædictis apparet privatio signorum calidorum & frigidorum; & quod splen facile læditur ex quacunque causa, postquam peruenit ad membranam involuentem: nam eius substantia caret sensu, eo quod sit membrum carnosum, & non nervosum. Quod si virtus nimium attrahat, tunc fit extenuatio in toto, & splen increscit, ut dictum est: sequitur sape caliditatem vel apostema calidum. Si defectus sit in expulsiua, tunc privatur appetitu cibi, & promptitudine descensus materiæ melancholicæ ad intestina, si nimium expellat. Si autem sit defectus in debilitate ipsius in expellendo, tunc etiam destruitur appetitus, retenta materia melancholica in liene. Signum debilitatis retentivæ virtutis, est evacuatio atræ bilis per fluxum vel vomitum, secundum declinationem

10

Dolor materialis, quomodo ab immateriali distinguatur.

Signa debilitatis virtutis lienis.

11

Signa privatio astractionis debilitatis.

Signa substantiæ raræ.

12

Si nimium attrahat, signa.

Defectus expulsiæ. Signa debilitatis retentivæ virtutis.

humoris & eius quantitatem; licet fieri possit hoc accidens ex vigore virtutis expulsiæ: sed tunc fit evacuatio cum alleviatione, & plurius quantitatis pro vice, & periodice. Signa prognostica, quod ad dolorem attinet, huc transferenda, quæ de prognosticis obstructionum prius diximus: illud addendo: Si obstructio lienis remaneat, vel indurata sit post febrem quartanam, vel etiam febrem erraticam, recidivam minatur, nisi medicus, egerie in sua arte versatus superveniens splenem rectificet. Oppilationi medendum statim, alioqui hepatis infrigidationem infert: hæc infrigidatio denuo indigestionem, indigestio autem hydropem periculosa creat. Antiqua vix aut nunquam recipit curationem, ita nec apostema scirrhosum. Oppilatio splenis vel hepatis, dum pungit & sentitur, recens est: dum vero non sentitur, antiqua & confirmata est, & non curatur, quod tamen potius de scirrho dicendum. Prognostica apostematis iam diximus. Sed quod ad dolorem attinet, catarrhis obnoxij raro tumore splenis, & per consequens dolore, afficiuntur: & spleniticus, si cum duritie dolorem sentiat, melius curatur quam si non sentiret. Hæmorrhoides fluentes, dolorem splenis sedant, quibus adiungere posses ea, quæ de lienis apostemate retulimus. Quod ad prognostica debilitatis lienis attinet, sciendum, quod debilitas splenis indicat oppilationem hepatis, dum sanguinem non mundificat, & oppilatio digestionem prohibet, dum calorem morificat naturalem, & humorum discursum per sua loca retardat: digestio vero prohibita aquositate multiplicat & venosum, & sic tandem hydropem ascitem, vel febrem chronicam perniciosam inducit, cum omnimoda appetitus deiectione & virtutis nutritivæ defensione. Quod ad curationem tam oppilationis, quam inflationis & lienis apostematis, satis superque dictum est, & quibus modis intemperies lienis curetur, & propterea si debilitas splenis contingat ex intemperie calidi, prius parati ac alterati educendi cum rhab. & similibus, etiam in principio, si adit totius repletio, cum venæ sectione, & intemperies nuda tam intus quam extra alteranda, ut satis dictum est, & si adsint humores calidi, post venæ sectionem & purgationem, externa remedia applicanda, qualia ad inflationem valere scripsimus. Ita quoque si à causa frigida nuda intemperies, vel cum humore orta fuerit, ut in præcedentibus dictum est, procedendum erit. Simplex enim cum calidis tam intus quam extra alterabitur: materialis non apostemans, sed oppilans, digeratur oxymelite simpli. syr. de duabus radicibus, & aquis apij, scolopend. absinthij, & purgetur cum agarico. Remotio intemperiei completur diamoscho, dialacca, diacume, diacapp. & soribus calidis, ut superius dictum est. At curatio debilitatis splenis ob raritatem substantiæ, neque requirit sectionem venæ, neque pharmacum solutivum: sed satis fuerit topica calida stiptica abhibuisse, non valde excedentia, qualia de hepatis debilitate recensuimus, uti est oleum mastichinum, cyperus, mastix, spica, nux cupressi, absinthium, calamimba, corr. cappar. ex quibus fiant fots, dentur elect. roborantia, ut diacydon. cum speciebus, nutriatur ager carnibus assis, conditis cum vino granat. berberis, succo acetoso, vino stiptico, capparibus conditis, & bibat vinum rubrum vel album vetus, & tenuerit utatur diacapparibus. Valet dialacca ad omnem hepatis & splenis oppilationem, modo febris absit. Ad debilitatem splenis conducit aqua ferrata, elect. de scoræ ferri, & de limatura chalybis, reliqua vide apud Arculanum. Quomodo dolor curetur ab oppilatione

Signa prognostica.

Prognostica debilitatis.

Curatio debilitatis.

13

16

Curatio do-
loris.

17
Curatio.

tionem splenis vel inflationem, prius diximus, tum etiam de dolore obtingente in apostemate: nam apostemate curato, & oppilationibus, tum ventositatibus remotis, facile dolores dicti curantur. Interea cum triplex sit cura doloris, vna remotionem causæ, secunda per anodynâ, tertia, sed coacta, per stupefactionem; prima curatio manifestata est: ablata enim causa cessat effectus. Sed lienis dolor ex calida causa, salicis foliis tritis, addito sale, sedatur protinus, ex frigida, iride, vel ceterach, cum aceto impositus. Si dolor sit ex lapsu vel ictu, vulnere, vena secta ad chirurgiam cõfugiendum, de qua nunc non est noster sermo: sed fortasse, si Deus me superstitem fecerit, de iis agemus. Quod si dolor non sedetur per remotionem causæ, tunc ad secundam intentionem curandi deveniendum, scilicet per anodynâ, videntes floribus chamæmillæ, meliloti, anethi, sem. lini, fænug. alba, pavlovæ, quibus propria addenda, ut ceterach, cappares, tamarix, & similia, ex iis conficiendo fots, sacculos, vntiones, emplastra, & similia. Quibus si adhuc non sedetur dolor, tunc opus erit tertia intentione, ut perueniamus, ad stupefactionem: attamen cum causæ à minimis incipiendo, sumptis & admotis, mixtis tamen cum his, quæ spleni propria remedia existunt, ne materia intus retineatur, & scirrhus cueniat. Quod si diversis affectus fiat, ut si splen frigida, venter vero calida affectione laboret, ex meatu biliario fluxu bilem excipiente, bilemque reiectione, tunc difficilis erit curatio, teste Aetio lib. 10. cap. 14. splene caloris fots expetente, ventre ac vniuerso corpore refrigeratione indigente, idque eodem tempore. Tales in tristitia, cura, ira, vehementibus motibus, inedia à malo cibo auocemus, & bilem citra molestiam euacuemus, os ventris robaremus, ne quid influat. Dabimus panem cum oliuis albis, aut colymbadibus dictis, citra vllum potum. Verum ut splen illæsus permaneat, conuenit, plurimum cibos boni succi & actu calidos præbere, postea frigidos, & os ventris corroborantes, & stomacho gratos, ut mala punica: & oleo rosaceo melino stomachum inungemus, spleni epithemata calida iam sapius dicta, & apud ipsam descripta, apponentes. Quod si etiam tussis infestat, & acris destillatio (eodem teste c. 15.) spleniticis difficilis est curatio; si ex crassis humoribus, eadem. Sed si acris vrgeat destillatio, densanda cum theriaca recenti. Reliqua vide apud eundem. Trallianus vitur diacodio, & spleni applicat epithema externans, & pastillo crocode dicto, ex aceto & oleo rosaceo diluto incipit fouet.

OBSERVATIO VIII.

De scirrho lienis.

Lienem autem opportunissimum esse ad scirrhum, veluti & iecur (quamquam lien, propterea quod ravior sit substantia, crebrius scirrhosis vitis affligatur, propter nutritivum, quo vitis speciem) à Galeno decretum est, lib. 13. meth. meden. Nutritur autem (ut ante dictum est) crasso sanguine, qui veluti limus purioris existit. Scirrhus autem duplicem originem habet: vel enim per se incipit, vel medicorum imperitia paratur, id quod crebrius accidere consuevit, ubi vehementer inflammationes & erysipelata attingunt, & nimium refrigerant, vel topicis calidis vtuntur, tenui humore resoluto, ut paulo ante recensuimus, duro

Pet. Forest. Tem. 2.

relicto. Sed vir quidam Alematianus, melancholicus, cum crasso victu usus esset, & gelidam aquam bibisset, durus tumor paulatim obortus illi est in hypochondrio sinistro, adeo etiam durus, ut cum tactu facile deprehendere potuerimus, cum ad me curandi causa accessisset. Ante duos menses prius aliquem dolorem senserat, cum quadam gravitate, ut narrabat, sed nunc malum auctum: & sine dolore scirrhii initium esse iudicavi. Cum enim durities lienis accideret, ut tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies appareat, copia substantiæ: scirrhum lienis excitat. Nam eadem cum tumor apparet cum duritia, humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus (ut antea demonstratum est) aut virique simul mixti: unde licet præter modum augetur, & à naturali recedit magnitudine. Sed humorem & flatum his indicibus ex Tralliano cognoscimus: Si flatus est (ut dictum est prius) tactui resistit pertinaciter, & lien punctationem tensionemque experitur: sin autem gravitas cum pondere in latere ipso percipitur, ex prædictis signis flatus cum humore mixtos in liene esse scias, idque per initia. Nam postea, morbo inueterato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrhus generatur: quemadmodum in hoc agro evenit. Non tamen adeo inueteratus erat, ut vna cum tumore & duritie sub ministro hypochondrio, os fœteret, gingivæ exederentur, & vlcera in cruribus cicatricem non reciperent, qualia inueteratis scirrhis (& spleniticis appellatis) iuxta Paulum & Celsum obuenire solent. Attamen hunc scirrhosum esse tumorem, facile intelleximus. Vbi enim cum renitentia, tumore ac duritie, gravitas cum pondere in sinistro hypochondrio percipitur, ex humore lento & crasso (ut hic erat) lienis indurato infixo, tumorem durum ortum iudicabimus, quem proprie scirrhum, seu scirrhosum tumorem appellamus. Ideo necessarium erat, ut huic statim remedium adhiberemus, cum hic tumor, ex consentiente nimirum iecinore, potissimum, ubi diutius fuerit, aquam inter cutem generare posset, ut liquet apud Galenum 5. & 6. de locis affect. Quapropter antequam fieret exquisitus, in curatione laborandum erat: nam exquisitus omnino incurabilis, ut idem Galen. scriptum reliquit 3. de art. curativa ad Glaucon. Pro eius curatione huic talem vitam præscripsimus, qualem de scirrho hepatis diximus: nam eadem victus ratio, maioris minorisque dumtaxat ratione differens, (ut idem Galenus testatur 13. meth. medendi) conuenit. Caparis itaque esum continuum, cum oxymelite, commendauimus, tanquam vtrique visceri vitalem: quamvis nec pari modo, nec similiter habeat oxymel. Nam & ipsa copiosior, & ex minus diluto oxymelite, lien est utilior. Atque hæc differentia est, quæ ex maioris minorisve ratione accepta, ut idem Galenus inquit. Inhibuimus tamen dulcia omnia: nam his tum iecur, tum lien intumescere consuevit. Similiter & vitiosos, maxime vero glutinosos cibos vitandos esse consuluimus, & quod ij tantum exhiberentur, qui concoctu faciles essent, ac bonum & tenuem succum generarent, & ut simul cum iis offerrentur ea, quæ extenuarent, obstructiones tollerent, ac detergerent: acida quoque commendabam, quæ maxime, Celfo auctore, conueniunt. Iubebam, quoque, ut potius vino veteri (modo sumptis ferre posset) aqua permixto vteretur, in qua ferrum sape ignitum sit exstinctum, ut laudat Aetius, quam ut ceruissam crassam biberet, nisi tali aliquando vti vellet, in qua absinthium, aut

Mm ij folia

folia thamariscis infusa, aut cocta leuiter essent. Et quia febris aberat, cum vitiū hoc quies augeat, exercitium & laborem moderatum concedebam, unctiones, frictions, & sudores, iuxta Celsum. Plurimum namque fiducia in exercitiis ponendum: quibus ante cibum uti conuenit, corpore superfluitatibus non abundante: ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes, & cursus. Et noui sane aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati, ut idem Aetius testatur. Sed cum hic splenicus ad me, ut curaretur venisset, in memoriam reuocaui historiam illam Tralliani de liene indurato, quæ ita habet: Nonisti, inquit, curatum à me fuisse militem: qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis iustam habebat, quem duobus tribusve diebus medicamentis per os datis purgabam: & deinde diligenter ei curam in singulis conuenientibus remediis effereendis adhibebam. Pisanæ cremorem quod die in cibo porrigebam, oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex anibus autem gallinas, perdices, ac alia concoctū facilia, boni succi, & probe macerata. Prohibebam ei quæcumque viscosos & crassos humores generant: similes & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & hœdinas: nem autem, quæ in aquis palustribus degunt, emesque pisces palustres, & pelagios: præsertim, qui duras & crassas, non albas carnes obtrinent: ad hæc polypos, mulos, setias, ophos, ostrea, conchas, bullos, placentas ex melle, & chidro, & quæcumque inflant, draque & crassa, vel quæ cruda sunt. Vinum improbantur crassum, nigrum, adstringens: dandum autem est, quale Hippocrates, præcipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat. Hoc igitur modo cibis est administrandus. Porri vero dabam vinum, in quo caparis radicem, scolopendrium & myrica radicem corticem decoxeram: initio quidem singulas herbas simpliciter adhibebam, deinde ex posca aut oxymelite, aut solo aceto coctas: interdum etiam in puluerem redactas, cum supradictis liquoribus, citra coctionem, per intervalla dabam, idque non plus quam duobus vel ternis diebus. Quin & oxymel purum per totam hyemem propinabam: nonnumquam supradictas stirpes decoctas, temperatasque cum aqua calida, ante & post cibum, die & nocte, quæcumque volebat ager, potui offerre. Vere primum inuenie, cum ager multum se recollectisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medicaminum efficaces præstari debere, quæ lienem euacuaré possent: qui cum magis imminueretur fortiora medicamina adhibebam. Ac mox inter initia veris, sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post viginti quinque dies, hoc medicamento quod sequitur utebar. Spice nardi, cappar. rad. corticum myrica, folior. asplenij herba, squamæ ferri. an. ʒ xvij. myrobalani ʒ x. ammoniaci suffimini ʒ xvij. polytrichi ʒ vj. stachad. ʒ iij. scolopend. ʒ iij. pastillo. Singulos drachmam pendentes, ex oxymelite fingebam, ac vinum oxymelite dilutum potui dabam. Postea vero, cum liene probe esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam, ac otiosos humores validioribus nempe hiera, diacolocynth. ʒ iij. euacuabam. Inchoante tam æstate, non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita ut à prædictis medicamentis nullo die discederem. Vbi sanitati propemodum esset restitutus, cyclaminis rad. ʒ j. ex mulla deinceps semel, aut bis post singulas potiones offerebam. Nam ex vitiosis humores ex liene per sudores expurgat: calidis extrinsecus operimentis medicamine dato inuandis gratia admotis. Deinde sepe lienem potione quidem ex scolopendrio & cappare, & epithematibus quibusdam etiam malactis, tum aliis, apud eundem longiore sermone descriptis, ut videre poteris corroborabam: quibus hominem eundem sanitati restituit. Verum quod ad nostrum ægrum attinet, eadem

victus ratione usus est: venæ sectione omissa, cum non multo sanguine abundaret, & humores magis crassus lienis impactus esset. Quare medicamenta aperientia, extenuantia, incidentia & abstergentia, tam intus quam extra adhibuimus, & quæ simul exterius emollirent. Et sic pro minoratio primo exhibui ʒ j. castia in bolo cum ʒ j. pul. ceterach. zaccharo exiguo conspersam. Deinde ante purgationem corpus ita præparauimus. ʒ. syr. de scolopend. acetos. simplicis, syr. de succo fumarie. ana ʒ i. ʒ. syr. de epithymo, oxymelitis scyllitici (quia hic durities scirrhus aliquandiu durauerat) m. ʒ. aque bulgiss. scolopend. capill. ven. an. ʒ iij. ʒ. adiectis ʒ ij. cinnamo select. saporis gratia. Per triduum in dilueto sumantur. Postea eundem ita purgauimus. ʒ. diacatholici ʒ vj. corsect. hamech. ʒ iij. syr. capill. ven. ʒ. cum decoct. communi, addendo polyod. quere. follicul. sena. an. ʒ. ʒ. florum tamaricis. p. j. fiat potio, summat in aurora. Splenem deinde inunximus vnguento sequenti. ʒ. dialibæ ʒ j. olei rutæ, de capparis. an. ʒ ij. & altero die à potione purgatorio elect. solidum præscripti, vel huic similes. ʒ. specier. diarrhod. abb. pulueris diacappari. an. ʒ ij. pulueris ros. nonelle ʒ j. zacch. dissoluti in aqua bulg. scolopend. q. s. fiat elect. solidum: de his cum mane ʒ iij. trib. bonis ante cibum. Rursus & hoc decocto utebatur. ʒ. rad. cappari. tamaricis filicis. an. ʒ. ʒ. ceterach. capill. ven. agrimon. filipendula. chamæd. an. m. j. sem. perulacæ, agni casti end. an. ʒ i. flor. gemistæ p. j. fol. sen. epithymi, polyod. an. ʒ. ʒ. vuar. passul. emuleat. ʒ j. glycyrr. rad. ʒ iij. sem. caribani comisi ʒ. ʒ. fiat decoct. in aqua communi, potio ʒ j. col. addendo syr. de epithymo, de scolopendrio, oxymel. simpl. an. ʒ j. ʒ. misce. Deinde hoc vnguento, ut huius æmulo, inungebatur. ʒ. olei amygd. dul. amar. lilæci, vini, de cappari. an. ʒ j. ʒ. succi centaurij minoris ʒ. corticum cappari. myrica. an. ʒ ij. adipis asferini, gallinacci. an. ʒ iij. ammoniaci in aceto dissoluti ʒ. ʒ. ceræ q. s. fiat vng. Interea eundem purgavi hoc modo. ʒ. decoct. suprascriptæ ʒ iij. adde corsect. hamech. ʒ. ʒ. diacathol. ʒ iij. syr. de pomis, oxymel. simplicis, an. ʒ. ʒ. misce. Fiebat & hic fons. ʒ. rad. & folior. alibæ. an. m. ij. centaurij minoris, ceterach. an. m. j. corticum rad. cappari. rad. tamaricis an. ʒ. ʒ. bulliant in aceti & olei paribus equalibus, & cum spongiis fiat fons: quibus saepius admotis, vnguento suprascripto inungatur, mox & sequenti. ʒ. asyri, axungia gallina, olei amygd. dul. an. ʒ j. olei chamæmelini, de cappari. an. ʒ. ʒ. misce. mane & vesperi ante pastum inungatur. Postea imperaui, ut hoc arcano præceptoris mei Benedicti Fauentini vteretur ad 15. dies, quo omnis splenis durities dissoluitur. ʒ. rad. filicis ʒ. ʒ. rad. cuscute ʒ ij. misce, & bulliant in ʒ vij. vini albi potius usque ad consumptionem tertie partis vini: deinde coletur, & colatura patienti detur modo dicto. Interea colophonem huic curationi imponens, ut hoc vnguento regio lienis inungeretur mandauimus, quo & alij curati sunt, & magni pretij apud me habetur. ʒ. olei cappari ʒ j. olei lilior. amygd. dul. chamæmelini, butyri recentis. an. ʒ. ʒ. succi bryoniæ, cyclaminis an. ʒ. ʒ. ebulliant olea ad consumptionem succorum, addendo ammoniaci in aceto dissoluti ʒ ij. ʒ. pingued. gallinæ crurum vituli asyri humida an. ʒ. ʒ. pul. corticum rad. tamaricis cappari. ceterach. rad. filicis. an. ʒ j. pul. sem. agni casti gemistæ. an. ʒ j. ceræ parum, fiat vng.

SCHOLIA.

Hic quidæ affectus levis initio apparet, adeo ut ne medicum quidem rogat: sæpe & multis annis perdurat. Noui nobilem quandam matronam, quæ ultra 30. annos duritie lienis laborauerat,

horauerat, & tamē in solitis operationibus non ladebatur, quod notadignum. Vidi tamē sæpius, licet multis annis perduret, tandem ex eo affectu ad febres longas deuenisse, quæ in tabem aut hydropem transibant, & ad eos morbos nonnullos deduxisse, quos memorauimus ex cacochymia melancholica euenisse. Lien itaque facile in scirrhus incidit, siue quod quis ipsum infirmum habeat, quales sæpe experimur, qui crebro doloribus ea parte capiuntur, & leui de causa & errore in victu, ipsis intumescit; siue quæ plurimum melancholicum humorem quis gignit, & quæ crassum, vnde obstructio in eo gignitur primum, mox tumor in vniuersa carne; idque vel quia natura eius corporis talis est, vel quia ex febribus est genitus hic affectus: hinc & quartanarij sæpe lienem durum incurrunt, vel ex victus ratione tum in cibo & potu, tum in exercitiis. Equidem vena nigra & crassa id faciunt: nec non & aquæ palustres lutosæ. Vnde Iacchinos in sua patria plurimum hunc morbum inueniri dicebat, & circa maritima fere loca. Quod & nos obseruauimus in nostra Bataua, plures hoc malo tentari, ob crassum victum & ceruissam crassam, sæculentam, & præcipue apud nostros nautas, qui pane nautico (bischoitum vocant) longo tempore nutriendum quid re dolente vtuntur, & larido rancido, vnde & Scurbutto malo dicto ac lienis duritie afficiuntur, nimium morbo veteribus incognito, ut postea de eo dicemus. Nostros enim plerique crasso victu & melancholico vtuntur. Fit & aliquando ex crisi, natura sequestrante in magnis morbis materiam in liene. Cur sæpe sunt hi tales citrimo colore. An quia expurgatio hepatis debilis est, debilitato viscere per consensum? Causas etenim communes habet cum hepatis scirrhus, & generationis geminos modos, vt diximus, vel ex se per paulatinam collectionem, vel medicorum imperitia, ex inflammationibus male curatis; vel nimium refrigeratis: & eadem prognostica habet cum scirrhus iecinoris: & ideo quæ de eo dicta sunt huc referenda. Sed quod ad curationem attinet, id quoque sciendum ex Galen. quod vnus scopus generalis sit vacuatio, attamen si quis violenter insillit vacuando, proficisci quidem primum egregie, sed relinquetur contumax affectus, qui sanari non poterit. Quamobrem necesse est, vt iungamus ea, quæ calefaciunt modice & humectant, cum his quæ dissolunt. Quoniam vero crassi etiam lapides incidentibus diffringi solent, optimum erit & ad dissoluendum durum tumorem illis uti. Inter hæc vero maxime acetum conducit, & ea quæ acida sunt, vel tenuium partium, & calida modo non adeo calore participant, vt nimium siccant. Medicamenta itaque ex suprascripta methodo ad scirrhum lienis multa nobis comparare possumus, tum ebibita, tum extra applicata. Verum prius hic videndum, num vacuatio per venæ sectionem conueniat. Aëtius vero commodum hoc esse asserit, si prædicti laborantes multo sanguine abundant: & tunc in interna sinistri cubiti vena secetur: quamuis multam sanguinis copiam auferri minime velit. Multos id cum Iacchino facere videmus, etiam in saluatella, si hæc minus appareat, & Galenus non videtur prohibere: qui in lib. de venæ sectione. Nescio inquit, cur multi lienosis sanguinem mittere miserrim. Lienosos vero appellare, eos, solet, qui scirrhus laborant. Sed ego cum Iacchino credo raro conuenire: sed potius purgatione egent, præsertim si iam cacochymia sunt. Secus est inter initia, ubi crassus & melancholicus san-

Pet. Forest. Tom. 2.

guis abundat: tunc enim vena secta est opus, vt in lib. de venæ sect. Ratio est, quod in scirrhus est de materia appropriata, non educes, & vires debilitabis: nam iam influxus cessauit. Quod ad medicamenta attinet, cum plura esse possint, ea adferemus, quæ nunc magis in usu sunt. Cum itaque primum tumorem dissoluere debeamus: hoc non faciemus, nisi eum prius præparauerimus aceto mulso, syr. ex succo fumarie, seu acetoso simplici, & melle rosaceo. Nam acetum & acetum multum huic visceri commoda sunt, vt pote secare, & attenuare crassos humores citra calefactionem potentia, vt inquit Galen. 9. de compos. medic. secund. locos. Vel incipiemus à potionibus: ac primum ex simplici oxymelle, cum scolopendrij veri seu ceterach. & betonice decocto, idque per dies 3. vel 4. Postea purgatione aliqua leni vtetur, vt infusione senæ, epithymi, & polyodij in sero decocto: si virisque ʒ iij. Alij purgans medicamentum propinant, pro ratione redundantis succi: nam pituita redundante, illa exhibent, quæ eandem expurgant: si vero melancholicus succus redundet, quæ & ipsum expurgant, præbent. Deinde potiones quasdam, ac topica medicamenta, quæ induratum splenem curant. Debent autem esse potiones fortissimæ: vt & illa quæ de foris medicamenta applicantur. Nam eas siue molestia splen tolerat, vt 2. de art. curat. ad Glauc. à Gal. de cretum est. E quorum numero primas partes sibi vendicant cortices rad. capparis, & scolopendrium, & myrica rad. atque germina, omnibus huiusmodi in aceto vel oxymelite coctis. Dabimus & triaxinis potionem, tum montanæ, tum palustris, quam scordion dicunt, myricæ folia addendo, atque hæc ex acido oxymelite per plures dies. Dissecant hæc & extergunt, & siccant citra vehementem calorem. Attenuantibus itaque opus habet induratum lien pharmanis, citra manifestam caliditatem: cuius gratia valde amara medicamenta ipsi offerimus, ac quadam ipsis ex austeris miscemus, vt eodem 9. de compos. medic. secundum locos scriptum est. Pro potu denique ieiuno dari debet abstinium incoctum, ac post cibum aqua à ferrario fabro, in qua candens fetrum subinde extinctum sit. Hæc enim vel præcipue lienem coercent. Quod animaduertum est (vt antea diximus) in his animalibus, quæ apud hos fabros educata exiguis lienes habent, vt liquet ex Celso. Hæc aqua, in qua ignitum ferrum sæpe sit extinctum, febricitantibus sola, non febricitantibus vero cum vino, auctoritate Archigenis, à Galen. 9. de compos. medic. secundum locos. commendatur. Conuenientissimum etenim spleni in scirrhum indurato remedium existit ferrum, aqua aut vino, aut posca extinctum. Et ipsa enim aqua, aut vinum aut posca in principio exhibitæ, iucunda & vtilissima existit, & per plures ex ordine dies datur. Aëtio teste. Datur autem per se aqua, cyathis tribus, febri vero carentibus, cum vini vel aceti cyatho vno, vt inquit Paulus. Interim vero extrinsecus humectantibus humorem fundemus: quibus & incidentia admiscebimus, his enim maxime ad dissolutionem humor paratur. Fiat ergo fons ex oleo simplici, tenuium partium, & aceto, quibus & vini aliquid tenuis potes adiungere: & est facile parabile. Post hæc purgabimus rursus fortiori medicamento, quale est ex helleboro nigro paratum, additis aniso & cinnamomo, qualem potionem alias Iacchinos docuit: quæ & multis diebus sumi poterit, modo vires ægri facerent, & leuari ægrum videris. Vbi satis morâ traxerit æger, interim victus ra-

M m iij. tione

tione utemur in cibo & potu, & exercitatione, ut dictum est, atque ex diarrhoea, aliquid dabitur: & lienem ex vnguento amygd. amar. inunges, dum à potionibus quiescit. Mox valentius siccantibus utemur acidis admixtis, sed per intervalla etiam humectantibus. In potionibus itaque oxymel, scilicet cum scolopendrij decocto, aut foliorum capparis recentium. Quæ vero extra admouentur, si quidem mollitus tumor manibus sentiat (hoc enim quotidie temere expedit) erunt siccantia, extergentia atque incidentia, ut fons ex aceto, in quo fervent capparis radix vel folia, ruta semen, cuminum, myrica cum fenugreco, & alibea radice. A fons vero inunges oleo ex capparis appellato. Quod si interim imminui valde videbitur, sed durior fieri, expedit ad emollientia calida & humida verti: quorum exemplum est ægypti ceratum ex compositis, & emplastrum de meliloto, & mucilago fenugreci, alibea, ficum, adiectis medullis ossium & adipibus. Hæc igitur iteranda sapius, quousque metam attingas: & semper de recidiva timeto. Facile enim recidunt, ob visceris ex longo morbo infirmitatem. Sed si his nihil proficiat, & iam malum inueterauerit, extrema remedia tentanda sunt. At primum portiones hæc: arida capparis folia, cum oxymelite: chalybis, quod stonoma appellant, potio: cui intentioni etiam satisfacit ex auro, similiter & squammæ ferri potio, de qua Aëtius. Nos autem lima attrita vitur, vel elect. de limatura ferri, quo præceptor meus Benedictus Faustinus utebatur. Vnde eius Empirica. Exercitia: quoque inungemus: interim fouendo oleo & aceto, & victu boni succi utendo. Post hæc his, quæ extra, utemur, ac primum cyclamine, cum sulfo adipe subactio: habet enim vim maxime extergentem, incidentem, sicut & scilla: ex qua similiter emplastrum vel vnguentum confici potest. Aliud efficacius, ex stercore caprino, & xungia subacta. Oportet enim interpositis diebus, & humido aliquo vti. Postremum omnium est ex calce viva, cum nasturtij semine, & fenugreco, coctis in mulla, simul subacta atque imposita. Sunt qui cucurbitulas adhibent, & scarificantes, sale inspergentes vlcuscula, alij cauteria affigunt. Sed qui superioribus non sanantur, his non sanabuntur. Historia cuiusdam est, qui per annum duravit, & iam fere tabidus credebatur, qui sanatus est. Qui vero prorsus sanari nequeunt, hos in vita seruari oportet: si vere & autumno purgentur, & congrua victus ratio vtantur. Tentantur aliqui aquas sponte natas: alij ligni potum: illi præseruari ab ulteriori lapsu, non curati: hi in peius ruerunt, credo siccatione nimia.

OBSERVATIO IX.

De quartana duritiem lienis habente: & de altero, qui post quartanam duritiem lienis incidit.

Vir quidam quadraginta annos natus, cum à quartana liberari non posset, eo quod lienem durum haberet, ad eum nos in consilium adhibiti sumus, & tunc nobis in mentem venit illud dictum Amati in schol. centur. 1. curat. 8. de curacione quartane, quod quartana curari non possit, nisi splen trinus duratus fuerit. Proinde spleni, si durior euaserit, & in scirrhum permittetur, & visceribus summopere prouidendum est, vngendo, illinendo: atque emplastrando, his quæ mollire ac laxare leniter possunt: qualia sunt buryum, ægyptus, lina succida, oleum amygdalinum, chamamelinum, se-

men lini, fenugrecum, alibea, malua, adops, medulla ossium, cera, carica, & quæ tota substantia splenem inuante probata sunt, ut ceterach, tamariscus, cortex capparis. Potentiora sunt, quæ post apparentem coctionem tuto adhiberi possunt, ammoniacum acetato liquatum, quod leniter decoqui debet, ne effervescat: bdellium molle & pingue, styrax, galbanum, propolis, semen apij, radix iridis, cuminum, ruta, anethum, flos genista: glans vnguentaria, quam myrabolanium Græci vocant, medicamentum præ ceteris palmam in inuando lienis obtinens. Ex quibus possunt confici fomenta, cataplasmata, vnguenta, cerata, linimenta, & si quæ sunt alia, viscera laxantia & emollientia. Sed in principio lenibus & primo ordine citatis, statim vero coctione, quod est in morbi vigore, id est, statu, tunc potentioribus utimur: acetum semper addentes, quod in omni topico medicamento adiungi debet, quia lienem acetum maxime conducit, ut testatur Galen. lib. 9. de compos. medic. secundum locos, & lib. 11. & 14. meth. med. 5. de simpl. Acetum tamen quartanariis per os dari non debet, ut longa oratione demonstrat idem Amatus contra Arabes. Post purgationem itaque ex sena, thymo, epithymo, polypodio, & funaria, & lupinulis, adiectis diaseis vel diacatholico, interea optimo victu attenuante vitur, iniectis herbis, ut scolopendrio, ceterach dicta, aut tamarisco: quamuis linguam ceruinam, dictam phyllitum, à confortio harum herbarum etiam idem Amatus eliminandam putat, ut pote quam contrarias vires habere, ipse credit. Nos vero hoc fons vti sumus. ℞. rad. alibea. ℥. iij. malua. m. ij. foliorum chamamelii, melilati, ceterach. an. p. j. corticem capparis, tamarisci, ana ℥. ss. sem. lini, fenugreci. an. ℥. iij. coquantur in aqua communis & aceto, pro ℥. j. ℥. pro fons, cum spongiis vel filiro. Deinde inungatur hoc linimento. ℞. emplastrum de meliloto, de mucilago. ana ℥. ss. olei de capparis. ℥. j. olei amygdal. amar. ℥. ij. æsspi humida, adipis: allinacei, an. ℥. iij. pulueris ceterach. ℥. j. ammoniaci dissoluti in aceto ℥. ij. aceti parum, & cera exiguum: fiat linimentum. Mox apposuius emplastrum de meliloto, de mucilago, adiecto exiguo puluere filicis, & rad. capparis. & olei de capparis. parum, cum pauca cera, fiat ceratum spleni applicandum. Cum iam lien detumesceret, & minueretur, decoctis sæpe repetitis ex cardo benedicto, ceterach, rad. capparis, & thamarisci, centaurea, borag. bugloss. summitat. lupuli, & funaria, & repetita purgatione, febris quartana miscere cepit: & cum iam ver initer, duritie illa lienis paulatim cessante cum remediis supradictis, febris illum breui reliquit, & sanus effectus est, & à duritie lienis liberatus, melius deinde valuit: optima tamen victus ratione obseruata. Alius quoque, qui à quartana in dolorem lienis ac duritiem inciderat, cum iam non amplius quartana laboraret, iussi ut continuo cappares cum aceto comederet, & lienem oleo amygdal. dulc. lilior. de capparis. & ruta, inungeret, & ut hoc fons vteretur. ℞. rad. alibea mund. ℥. ij. rad. bryonia, thamarisci, capparis. an. ℥. ss. foliorum melilati, m. ij. foliorum chamamelii. p. j. foliorum ruta, ceterach. an. m. ss. sem. malua, lini. an. ℥. ij. coquantur in duabus partibus aquæ communis & una parte aceti acerrimi, pro ℥. j. & post fortum inungatur hoc vnguentum. ℞. emplastrum de mucilago. ℥. ss. empl. de meliloto ℥. ij. olei de capparis. ℥. ss. olei lilior. ℥. iij. misce. & hoc emplastro demum imposito. ℞. emplastrum de mucilago. ℥. j. emplastrum de meliloto ℥. vj. vnguentum. Agrippæ ℥. iij. pul. rad. capparis, thamarisci, an. ℥. j. ducatur supra alutam, ad formam linguæ bouis, & sindone rub. cooperiatur, insuatur, ut melius cohæreat. Interea & diacurcuma, & diacapparis. utebatur. Et durities lienis non solum

OBSERVATIO X.

De scirrho incurabili, cum variis symptomatibus.

lum cessauit, sed etiam mētus erat de hydrope, sanitatem pristinam recuperauit, neque in hydrope, ut alteri euenit (qui tamen à me quoque curatus fuit) lapsus est.

SCHOLIA.

Non solum his myrica seu tamarisci radices, verum etiam folia, citra molestiam dantur, eis qui corpora habent calidiora, præsertim scirrhus non inueterato, quibus etiam conducunt virgulta ipsius myricæ, & scolopendrium, & rumicis siluestris, maxime vero acuti semen, foliaque & radix: probe etiam facit anchusa, si rad. eius ℥. j. detur: polytrichon quoque & capni decoctum, ad tertias redactum & folia salicis, & cortex, maxime in principio, iuxta Aëtium. A lenioribus, semper incipiendum. Verum inueteratis scirrhis, & corporibus agrestioribus, atque eis, qui omnem corporis habitum habent frigidiorum, exhiberi possunt trifolium, gentiana radix, calamintum, pulegium, cyclaminis radix, scordium, trifolium bitumen olentis semen, hyperici coma, acori, alari & eringij rad. viticis semen torrefactum, centaurij minoris succus, etiam si sit exsiccat, & chaneptis, polium, sed non ante purgationem. Omniaque iam dicta medicamenta simplicia, in principio cum posca diluta coquantur, postea vero meraciore progressu autem temporis, etiam ipsa confusa & cribrata cum aceto, aut aceto multo, exhibetur, modo non laborent quartana, ut Amatus volebat. Et quoad Topica, eadem seruanda methodus, quam seruari præcepimus, cap. de scirrho recentioris, semper etenim emollientem, & diffusoriam medicamentorum facultatem præcellere oportet: quibus parum quiddam eorum, quæ attingendi vim habent, admiscendum est. Gal. auctore ac Aëtio. Nisi quod tutior erit vsus aceti in lienis scirrhu, etiam à principio, cum naturaliter rarus sit: nec est quod metuas, ne quis neruus eius vi lædatur: quemadmodum in tendonibus, ac nervosis musculi partibus. ut liquet 14. meth. med. In hunc vsus capparis cortex ex aceto contritus illitusque confert: is enim (inquit Aëtius) admixtis aliis medicamentis, vltra hoc, quod dissecat & expurgat, etiam splenem corroborat: multisque modis huic rei capparis aptus est. Nam & ipsum cum cibo assumere, & mirram eius cum aceto sorbere, commendum est: quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum suffuribus, aut ipsam capparem cum melle contritam imponere expedit, ut Celsus inquit: Quemadmodum etiam non pauci ammoniacum cum aceto, ad luti crassitudinem redactum, lienem imponentes eius scirrhu curarunt: inque solum ei curando sæpe satis fuit, ut liquet ex Galeno 14. meth. med. Necnon & salicis cortex consimiliter illitus, & centaurij succus, ac cinis fabrorum cum cruda polæta ex oxymelite illitus, aut etiam lupinorum farina, magnopere conferunt, ex Pauli auctoritate. Etiam emplastra, tum vnguenta superius dicta conferunt: adiectis adipe anserino & medulla ceruina, seu virulina, & in processu seuum tum hircinum, tum taurinum, ac etiam caprilum adici potest, & quantitas ammoniaci augeri, adiciendo bdellium & galbanum, prius in aceto dissoluta: & styrax & opopanax, cyclam. farina seminis lini, fenugreci, ac alibea, ex quibus varia medicamenta componi possunt, & prout affectus exigit, tum addere, tum adimere poterimus, ea quæ emolliunt, atque vngunt, discutunt, & robur addunt.

Adrianus Leoninus, Leydanus, vrbis Delphensis Pensionarius (ut vulgo dicitur) vir doctissimus, per integrum annum hæctica febre laborauerat, & scirrhu lienis afficiebatur, ut Obs. 9. de hæctica marasmode, lib. 4. Obs. nostrav. de febre abunde egimus. Sed nos reliqua illa, de febre hæctica, præmittentes, nunc tantum de iis tractare decreuimus, quæ ad duritiem & scirrhum lienis attinent. Henricus Vergerius, Medicus certe doctus, ut & Ericus collega meus, multa linimenta, vnguenta, partim emollientia, partim discutientia, ac emplastra pro scirrhu præscripserunt, uti hæc erant. ℞. mucilago. rad. alibea & seminis eius, ac seminis lini. an. ℥. ij. pingued. anatis, anseris, gallina. an. ℥. j. buryi recentis non saliti. ℥. ij. farina seminis lini m. j. ss. furis frumenti exalte comminuti & cribrati. an. m. j. corticem rad. capparis, thamarisci. an. ℥. ss. rad. cyclaminis ℥. vj. seminis agni casti. ℥. ss. ficum pinguium ℥. iij. oleor. irini. lilior. de capparis. amygd. amar. ana. q. s. fiat cataplasma secundum artem. Postea præscripserunt & hoc linimentum. ℞. ammoniaci dissoluti in aceto sambucino. ℥. j. ss. olei de capparis. amygd. amar. irini. an. ℥. iij. adipis ceruina, gallina, anseris. ana. ℥. ij. pinguedinis viruli. ℥. vj. cum aceto sambucino q. s. fiat linimentum. Deinde & illud quod sequitur, absque pinguedinibus. ℞. ammoniaci dissoluti in aceto sambucino. ℥. j. ss. olei de capparis. amygd. amar. irini. an. ℥. iij. cum aceti eiusdem q. s. fiat linimentum. Mox lienem fomentarunt lapide marcasita, cum aceto acerrimo in ollam coniecto, ebulliente, ut artis est. Deinde ad vntiones & cataplasmata redierunt, deinde ad fomentum, eo fere modo, quo habetur 2. ad Glauconem, cap. de scirrhu. Mense vero Maio ad eum accitus fui, cum antea per integrum annum & hæctica & scirrhu lienis laborasset, & varia ac diuersa remedia essent tentata, cui tunc solus aderat Henricus Vergerius, Medicus egregie doctus. Quæ ad hæcticam & alia accidentia præscripta sunt eodem tempore, lector inueniet Obs. 9. de hæctica marasmode, lib. 4. nostrarum Observationum. Quod ad scirrhum attinet, de quo nunc agimus, Galen. ad Glauconem cap. de scirrhu vult, ut insillamus primo emollientibus, deinde discutientibus & moderate emollientibus, atque hoc ipsum vicissim faciendum suadet, ut eorum vsus alternatus sit, non simul, quemadmodum ibidem narrat de puero Cercilij, quem à tumore scirrhufo in femore curauit: & tam diu emollientibus vtendum iubet, ut perfecte mollities quædam censeretur, ad ruborem carnis fere exterioris. Deinde discutientibus vitur. Nam si altero tantum medicamentorum scirrhu curare tentauerimus (ut idem dicebat) nequaquam sanabimus: Quæcumque enim nimis digerunt, ob calorem vehementer digerentem, scirrhum in topheam duritiem concretare faciunt: aqua vero nimis emolliunt, non possunt solam præstare, ut scirrhus decrescat. Alternatus igitur eorum vsus moderatus, confert. Sed nec, quæ emolliunt, continuo affectum curant. Opus enim est & digerentibus, non quidem vehementer, sed quæ emolliendo id commode præsent. Hæc tamen Galenus. At hic in liene licet primo emollientibus sit vtendum, tamen addenda (ut recte fecerunt medici doctissimi) quæ roborant (liene hoc requirentem magis quam semper) & discutiant: quia discutientia, non sine emollientibus in progressu magis augenda. Lienem autem scirrhufo, eodem Galeno teste 3. ad Glauconem M m iij nca

non solum adhibitis vehementibus medicamentis foris curare oportet; sed & validissimis potionibus: nam & hæc lien citra molestiam perfert, ut antea dictum est: ut est radix capparum, & cortex, & scolopendrij, & myricæ, tum radices, tum ramuli, in aceto vel aceto mulso incocta. Quibus etiam medici expertissimi in principio recte quidem hic sunt vti: sed cum viderent quod æger calore magis afficeretur, & hæctica augeretur, statim ab eiusmodi medicamentis intro assumptis probe abstinere. Cum vero in principio huic crura maculis variegata fuissent (ut in scurbuto fieri solet) ut medicus præfens nobis narrabat, procul dubio & nos hoc malum (vulgo scurbutum dictum) adesse existimauimus, & ob hoc medicos doctissimos tunc præfentes, commode cochleariæ decoctum præscripsisse. Hæctica tamen magis inualecente, coacti fuere talia decocta relinquere. Itaque cum scurbutus hic adfuisset, ex lienis duritie & obstructio illa diu perdurans, procul dubio conuersa est in scirrhum exquisitum, & qui iam ultra annum durauerat. Quare ego cum omnino incurabilem iudicauis; eoque magis cum hæctica adesset. Interea, quantum ad duritiem lienis pertinebat, consulebam, ut medicamentis solum externis, quibus antea vti fuissent, adhuc instarem, ne intus assumpta paulo calidiora & deobstruentia hæctica augerent. Ideo inter me & Henricum Vergerium medicum, qui tunc aderat, conclusum est, ut ceratum emolliens apponeremus, & deinde reuenterem ad emollientem inunctionem, & simul dissipantem & resoluentem. Huic ceratum meum de ammoniaco, quo ego vtor, impositum fuit. Cuius hæc est descriptio: *℞. ammoniaci dissolui in aceto 3j. dialthæe, emplastrum de meliloto ana 3j. furfuris frumenti optime cribrati 3j. pul. rad. bryoniæ siccatæ, pul. rad. ierosolimiticæ, ana 3j. pinguedinis anatis anseris, gallinæ ana 3ij. bdellij, galbani ana 3j. olei irini 3j. bulliant leniter in mucilaginis seminis lini, seminis æni ana q. f. & ut in formam debitam cerati coeant, adde cera 3ij. reserbinthine, & resina pini an. 3j. fiat ceratum secundum artem, plurimum emollit & resoluit duritiem scirrhum, ut hoc ipsum pro arcano habeam, ac in officina pro me semper paratum inueniatur. Quo primum vti sumus in Godofredo Iffrandi ceruicario Delphensi, ut suo loco aliquando dicturi sumus. Postea vna cum Henrico Vergerio hoc sequens etiam vnguentum præscripsimus: *℞. ammoniaci 3vj. bdellij mollioris & subalbi 3ij. pinguedinis anseris, gallinæ. Seni ana 3ij. interioris rad. cyclaminis, furfuris frumenti ana 3j. b. ceterach, agni casti, rad. cappar. thamaris ana 3ij. olei de cappar. irini, amygd. amar. ana 3ij. succi bryoniæ 3j. b. (eo quod deerat succus cyclaminis) dissolvantur gummi in aceto scyllino, & olea cum pinguedinibus bulliant, vna cum succo, ad consumptionem fere succi: & ab igne ablatis adde gummi, ne indurescant nimio calore: & tandem pulucre exaëtriti & cribrati commisceantur; addendo ceræ nouæq. suff. fiat vng. mediocriter spissitudinis. Deinde intermissis aliquibus diebus, lien fomentabatur cum aceto, cui lapis marcasita ignitus in olla aceto plena iniiciebatur; ollam bene cooperiendo: deinde cum spongia huic aceto immerfa fiebat fons. Ad hunc autem modum, teste Galen. 2. ad Glauc. de scirrhus, ministratur lapis pyrites vel molaris: igni candens, aceto acerrimo perfunditur; & super vaporem calidum, quem sursum emittit scirrhus pars, collocatur, subindeque versatur, ut tota vaporem melius excipere queat. Illud autem commode fieri potest in mem-**

bris exterioribus, ut femoribus ac cruribus; difficilius vero in liene: ideo foris vti sumus cum spongia aut filtro, ut præceptor meus Benedictus Fauentinus utebatur. A foris mox ad vnguenta, deinde ad cerata reuertebamur. Quibus remediis æger se futebatur alleviari, quamvis non curaretur; hæctica non solum inualecente, sed & fluxu ventris obrepente symptomatico & lethali. Sed paulo ante hoc tempus, doctissimus ille Henricus Vergerius medicus, in mensa sedens, cum cyathum vini bibisset, subito animi deliquio, aut subitanea suffocatione periit. Tunc itaque solus in curatione relictus, utebar foris sequenti ad lienem: *℞. rad. alibæ 3j. cort. rad. cappar. thamaris. ana 3j. b. cassiæ, ceterach, centaury minor. flor. cham. melil. an. m. b. sem. lini, fenug. an. 3ij. coquantur in aceto acerrimo, profutu. Postea rursus facta est consultatio medicorum, & Cornelij Ericij collegæ mei, & Hugonis Nieuenij, & Gerardi senioris medici Leydani: in qua consultatione, quæ acta sunt, lib. 4. obseru. 9. diximus: Hugone medico proponente vsum ligni sancti; ad quem prius ferè accedebat Cornelius Ericius: nos contra rationibus innixi probauimus, quod nimium exsiccaret lignum sanctum, & hæctica augeret, neque lienem ita proficeret; cum aliqui in scirrhus lienis (ut doct. Iacchus receperat) huius vsum ministrantes pessime agros tractarint, ob nimiam exsiccationem. Ideo hoc relictum est remedium. Et quia fluxus cum hæctica lethalis erat: tamen ut huic ægro vitam paululum protraheremus, contra fluxum dedimus conseruam rosæ & semina portulacæ, quod & lienis duritiei prodest. Et licet fluxus aliquo modo is sedaretur, attamen hæctica postea augecente, & fluxu in fine magis incalescente, consumptus hic periit: cum ante mortem vere cadaverosus haberi potuerat.*

SCHOLIA.

Scirrhus confirmatus quam difficile curetur, hoc vno exemplo constat: licet in principio, si nondum sit exquisitus, curationem facile suscipiat. Sic anno 1568. mense Octobri, Iodocum Weruium, præfectum Brielensem, & virumobilem, curamus statim, cum sentiret in liene obstructionem & inflationem quandam, cum magna duritie, non sine dolore, sumpto prius lenitio & apozemate aperiente: quibus cum parum auxilij primum sentiret, & in liene doleret, & nullum appetitum haberet, ob succum melancholicum in liene retentum, neque ad ventriculum transmissum: vnde paucis diebus macilentus euadens, me ad se vocauit. Ad quem accitus cum lienis duritiem persentiret, cum inflatione & obstructione, intra octo dies in principio, quod alieni mirum videbatur, his præfidiis sanus factus est, sumens omni mane duo cochlearia argentea, ex syr. acetoso simplici & scolopendria, & oxyzacch. quia intemperies quædam videbatur admixta. Hoc decocto etiam assumpto: *℞. cort. rad. cicchor. dentis leonis, feniculi, apij, macerat. in aceto ana 3j. rad. thamaris, cappar. ana 3ij. fumariæ, ceterach, summitat. lupul. borag. bugloss. ana m. j. seminis æni casti, portulacæ ana 3j. b. coquantur in aqua communi, pro 3j. colaturæ adde oxymell. simpl. syr. acetosi simplici ana 3j. oxyzacch. simplici, syr. de byzantiis cum aceto ana 3j. b. misce. omni mane & vespere inungebat lienem oleo amygdal. dulc. & de capparibus. Deinde hoc modo fuit purgatus: *℞. rad. cicchorij, feniculi, asparag. macerat. in aceto ana 3j. b. cassiæ, ærimonia, ceterach, ana m. b. semin. portulac. agni casti ana**

ana 3j. foliorum sene 3vj. epithymi 3ij. cortic. rad. cappar. 3j. b. polypod. querc. 3j. b. rhubarb. selecti 3j. b. schenanthi 3j. b. semin. end. 3j. b. vuar. pass. ab artill. re-purg. 3j. b. coquantur in aqua communi pro 3vj. fortiss. express. adde syr. acetosi simplici 3ij. misce, pro duobus dosibus matutinis, ex vna quinquies aluum deposuit & cepit melius habere, ac conualescere, appetitu redeunte. Utebatur tamen continuo capparibus conditis cum aceto: & pro potu, vino Rhenano lymphato, cum aqua fetiata: & cepit lienem deumescere. Hoc condito quoque vti est: *℞. conserua borag. buglossæ ana 3vj. specierum diarrhod. abb. 3ij. specierum trionfantal. trochisc. de cappar. ana 3j. semin. portulacæ, agni casti pulueris ana 3j. b. puluer. ceterach. 3j. cum syr. acetosi simplici: fiat conditum. sumebat omni mane ad magnitudinem fabæ majusculæ. Si lien non fuisset extenuatus, pertenuissem ad fortiora, de quibus in præcedentibus diximus. Habes & apud Actium plures compositiones Veterum, & malagmata, quibus vti solebant, cap. 11. sermon. 10. de cura splenis in scirrhum indurati, ex Galeno, & aliis. Hæc de lienis duritie ac scirrhus dicta sufficiunt. Nunc ad scurbutum, morbum veteribus incognitum, transeamus: cum hoc malum etiam ad lienem pertineat.*

OBSERVATIO XI.

De scurbuto malo cognoscendo & curando; loco exempli aliorum morborum, ad Iordanum Forestum, & Adamum Forestum, qui sese medicinæ addixerunt.

Cautum fuit aliquando in Asclepiadarum familia, ne quis artem & inuentionem medendi, possessionem plane diuinam, à Deo solis ipsis concessam, cuiusque communem faceret, qui ab eodem non esset genere exortus. Id quod fuisse in causa videtur, ut peritos artis illius tunc interituros hoc est filios medicorum, Graeci semper vocant: ac si fieri villo modo non posset, videri quædam medicinam profiteretur, quam minime à genitori suis accepisset. Nec perperam quidem illi, meo iudicio, o inueneris generosi scitabant: quandoquidem vel optima quæque instituta (ut recte & Lacuna doctissimus dicebat) viderentur & dilabuntur, variisque sunt obnoxia adulteriis, dum citra dilectum viliam ab omnibus profanantur, multoque aptiores ad quamcunque artem capeffendam exercendamque fient, qui à parentibus suis, vna cum generationis primordiis contraxerint quandam veluti inclinationem, propensionemque in eam artem, cui postea indulerint, quam quibus natura & mens ob diuersam generaturam, ad contraria inclinatur. Recte igitur, Iordanus Forestus, & tu Adamus Forestus, tuos nobiles, ex familia antiquissima Forestorum procedentes, quasi iure hereditario in medicina vos addixistis, & mancipastis, non aliter quam præcessores vestri fecerunt, quos etiam imitandos propenimus, ut eam ipsam medicinam virtutibus & arte vestra exornetis. Inter Forestos omnium primo (quem tamen ipse non vidi, nec noui) Petrus quoque Forestus nomine medicinam magna cum laude apud Dordracenos longo tempore exercuit: ut insignia Forestorum & epitaphium sepulchro eius appositum ostendunt: quæ ego vidi, nunc belli atrocis iniuria ablata. Secundus vero medicus in nostra familia, quem & noui ac vidi, cum puer essem fuit Theodoricus de Foresto eiusdem nominis cum tuo patre, o Adamus, Reuerendissimi Domini Episcopi Villensis in Polonia physicus & chirurgus, cuius imaginem ex cuspide eius filius Iacobus Forestus à Regimontana urbe, post mortem per filiam suam vnicam ad me transferri curauit. Medicus, si quis alter, in-

signis: qui & longo tempore in Italia, deinde etiam apud Turcas Constantinopoli medicinam fecit: deinde apud Episcopum in Polonia physicus existit, ac ibidem mortuus est. Hunc semel cum puer essem, apud patrem & matrem ex Polonia reuersum, deinde rursus eo proficiscentem, vidi: eoque ad medicinam me adhortante, postea & huic arti præclarissima me totum mancipaui. At Iordanus Forestus, meus pater carissimus, non illiteratus, cuius tu nomen, Iordane, referis, tuus ac Adamus Foresti amicus, tres filios medicinæ destinatos, ut in ea laborarent curauit: quorum ego senior primus fui, & iertus in ordine medicus ex familia Forestorum: & postquam Louanij aliquot annis medicinam operam dedissem, in Italiam profectus, ut praxin addiscerem, medicinam titulum Bononiæ consequutus sum, anno 1543. die Iouis, penult. Nouembr. Deinde in Italia aliquot annis hæcens, in Galliam profectus medicinam feci: ac demum in patriam postea apud Delphenses honorario publico condecoratus, medicinam (nunc excedens annum, cum hæc ad vos scriberem 69.) 46. annis exercui. Quartus in ordine est Iacobus Forestus, meus frater, etiam vester patruus, qui Ferrariæ insignia Doctoratus adeptus in Italia, anno 1565. deinde in patriam reuersus, longo tempore & ibidem medicinam fecit. Quintus in ordine erat Ioannes Forestus, meus frater, & vester quoque patruus, qui etiam medicinam operam dedit; at post mortem patris minor uxori copulatus, eo non est progressus, ut medicinam faceret: tamen in theoria egregie profecerat. Hi omnes ex familia Forestorum, ut vestri ante ambulones, non alia de causa à me vobis proponuntur, quam ut eosdem imitari possitis. Quod ut recte fiat, & probe aliquando praxin exercere possitis, institui per compendium aliqua exempla hic adferre de scurbuto, nouo morbo curando, ut aliquando feci de eodem malo, tum de conuulsione fratri meo Iacobo Foresto, vestro patrio, cum Louanij operam medicinam daret. Sed is profectus deinde in Italiam, illud exemplar quod scripseram, cuiusdam Germano dedit, ac inuicem dedit. Scripseram illi, (si bene memini) nunc cum theoria instructus esset, quomodo praxin exerceret: eidem proponens omnia medici officia, scopos omnes, ex quibus indicationes curandi sumuntur. Verum quia hæc habetis in libro meo, meaque manu scripto, omnes Locos medicine Communes continente, non opus est eadem hic repetere: nam & de iisdem ad longum scripsimus in lib. 3. contra Vroscopos, cap. 3. quod ceria sit methodus signorum & causarum, tum morborum & symptomatum; & quod certi sint scopi, ex quibus denno indicationes curatiue sumuntur. Id ipsum vobis nunc vobis exemplis de scurbuto, nouo morbo, & vesteribus incognito ostendemus. Ex qua methodo, & alios morbos tum cognoscere, tum etiam curare licebit.

Nauta quidam Alcmarianus, anno 1555. annos 38. natus, multis mensibus Alcinariæ deplorare hominem variis symptomatibus affectus decubuit: homo melancholicus, viribus satis infirmis, hirsutus, nigroque colore, cum delecta hinc & per antiphrasin Antonius Albus dictus, rabad. procera statura, melancholicus, cui cholera adusta admixta erat, habitu gracili, in quo amplæ venæ & vtunque tumida apparebant: quamquam nunc nonnihil concidebant, ob morbi longi tudinem. Hic autem sub finem ætatis primo incidit in quartanam, quæ per totum autumnum, ac hyemem sequentem, ultra septem menses perdurauit: mox tumor lienis (eiusdem obstructione præcedente) subsequēbatur, qui ita induruit, ut diaphragma tum pulmonem compresserit; febre hæctica subsequente, tum sputi cruenti ac quasi purulenti excreatione superueniente, cum totius corporis consumptione. Aderat & anhelitus difficultas, ambulandi impotentia, scapula ingens dolor, gingiuarum sanguifluus tumor, genu finitri, tum totius cruris, vehemens durities scirrhus.

causae morborum, sum symptomatum, etiam indicantur per cuncta auxilia.

Medica.

18

Hectica cum putredine.

Sputum cruentum unde oritur, cum dolor scapulae.

39

Quaestio.

Solutio questionis praedictae.

Obstructio lienis unde.

Gingivae sanguifluus tumor.

20

Malum ipsum cruris unde oritur habet.

febris hectica primae speciei: secundo sputum cruentum, & quasi purulentum: tertio durities lienis, & eiusdem obstructio: quarto dolor scapulae ingens, ita, ut dormire aeger non possit: quinto gingivarum sanguifluus tumor: sexto genium durities scirrhus, & inflexibilitas, ut ambulare non possit; cum colore nigrescens, sed paucis maculis, quas crura affecta habebant. Hectica itaque, cum duplex eius causa existat, incipit nonnunquam per se, nullo morbo praecedente, communem causam cum ephemeris habens, ex ira, lassitudine, tristitia, ardore solis, aliisque causis procatarteticis: nonnunquam vero ab aliis febribus, maxime ab ardentibus; vel ex aliis longis affectionibus, ut phthisi, empyemate, diuturnis nobilium partium inflammationibus, ut hepatis, stomachi, lienis; etiam ex diarrhoea, lienteria, colo, renibus, viro, vesica, & similibus: unde totum corpus exsiccat, & praecipue cor ipsum. Non est igitur mirum, quod hic praecedente quartana tam longa, deinde scorbuto superueniente, & liene ita obstructo & indurato, hectica superuenit ad secundam speciem tendens, tamen cum putredine; nam exquisita hectica non erat. Iste itaque morbus intemperiem sequitur ex austione, & ex accidente totum corpus exsiccat. Sputum vero cruentum & quasi purulentum, propter defluxum catarrhi obortum esse puto; similiter etiam dolorem illi vehementem scapulae, qui usque ad os adiutorij tendebat: talia enim, non tantum ratione febris quartanae & longitudinis morbi, tum lienis affecti, quam catarrhi similiter evenire poterant. Ratio enim longitudinis morbi, membra nutritiva, praesertim hepar, lien, stomachus, debilitata fuerunt: unde concoctio minus perfecta, causa multarum superfluitatum exstitit: ex quibus tandem vapores multi cleuati, cerebrum petentes, catarrhum induxerunt, ac cerebrum multum humectarunt ac debilitarunt. Et sic facili de causa, materia illa catarrhalis fuit origo sputi cruenti ac purulenti, tum tussis: quae quidem partim fluens ad concavitatem pectoris, (materia etiam melancholica in liene retenta, sicut evaporata, & deinde ad partes inferiores fluente) eius sputi origo fuit; prima a capite defluens ad scapulam, dolorem auxit. Et licet hic aliquis dicere possit, quod melancholia ita fluxibilis esse non possit: huic respondemus, quod facile aduratur, etiam ex bile: unde ad gingivas pars subtilior tendit in hac passione scorbutica; & quae magis crassa, feculenta grauis exstitit, ad inferiora, tum crura descendit. Si itaque pars leuior gingivas petat, verisimile est, ad cerebrum ascendisse; & mox per nervos ad scapulam, multo minori negotio ad pectoris concavitatem. Quomodo sit facta obstructio in liene, & durities ex quartana praecedente tum crasso humore melancholico, iam dictum est. Durities tamen illa non fuit legitimus scirrhus; alioqui fuisset incurabilis. Gingivarum vero sanguifluus tumor, tum vlceratio, causam habuit ex acriore subilioreque sanguine melancholico, aut subtiliori materiae facalis melancholicae portione, quae vel a natura criticante, post febrem quartanam; vel a calore solum subblata, tenera loca humidaque facilius erodendo depascebat. Malum autem ipsum cruris vel genu, cum sit dispositio mala, & non vnus generis; causam habere dicimus coniunctam, ex crassa melancholia in genu imbibita, quae eius operationem impediuit: antecedentem vero redundantiam humoris in superioribus membris, ut

liene, venis mezaeicis, atque ad ignobiliora, nempe ad crus & genua natura transmissi. Magnitudo vero, tum durities, habet crurum intemperiem praesentem, ex humore ibi iam collecto, & causam tum intemperiem factam; hanc vero ex superiorum intemperie & humorum multitudine. Tum etiam habet causam illa durities scirrhusa ex humore glutinoso crasso, qui particulis induratis impactus est: qui tamen eo defluxit, & ibidem induratus difficulter solui potest. Quoniam itaque horum omnium affectionum genera, differentias, causas, tum signa, utrumque enucleauimus, nihil restat nisi ut quaramus (quod in principio maxime pollicemur) agendi rationem, & curandi; omnibus istis inuentis. Quum itaque omnis medendi ratio perficiatur certis quibusdam scopis, & his, quorum beneficio scopos illos assequimur; constat, quod ad scopos attinet, eos vniuersos proponendos esse, tanquam necessarios. Videndum enim imprimis, an agendum sit; deinde, quae & quot praestanda; tertio quid ex multis primo loco faciendum; & sic deinceps, percurrendo nouem illos scopos, de quibus alias diximus. Redundo itaque ad primum; hunc per indicationes hoc modo assequimur. Cum enim natura affectum, de quibus nunc agimus, maximam in curando diligentiam requirat, ita lienis obstructio & praesertim durities lienis, quae a quartana ceperunt, tum reliqua symptomata, & potissimum hectica, curatu difficilia sunt. Attamen non est plane desperandum, cum etiam scorbuticos extreme laborantes, & plurimos ab aliis deploratos habitos curauerim. Et quamquam sciam hecticam adiunctam cum putredine, eoque magis difficilem curatu; tamen quia nondum transit ad tertiam speciem, nec sputum perfecte purulentum est, unde ad phthisin nondum peruenit; spem aliquam coepi aegrum ab affectibus dictis posse sanari, modo praecceptis nostris auscultaret. Quod quidem fecit: & nos diligentes fuimus in cura, omnia indagantes: sic optime omnia: praeter mentem aliorum, successerunt. Igitur cum natura affectum, de quibus agimus, talis sit, ut nec lethales sint omnino & desperati, nec tamen adeo leues, ut solius naturae beneficio abigi valeant; indicant plane a medico aliquid agendum esse. Quid vero & quot praestanda, ex differentia & numero malorum indicatur. Quoniam vero omnia illa sunt praeter naturam, indicabunt primo sui ablationem. Sunt autem sex potissimum affectus, vel septem, qui peculiarem actionem propriaque remedia indicant. Tumor, inquam, lienis & durities, & eiusdem obstructio, febris hectica, sputum cruentum, & quasi purulentum, dolor scapulae, gingivarum sanguifluus tumor, & vlcus, genium tum totius cruris durities scirrhusa, & eiusdem inflexibilitas; & ultimo horum omnium causa. Quapropter ex numero affectionum generatim indicantur necessaria esse septem auxilia, quae septem malis succurrant. Ex quo patet, numerum indicantium numerum remedium ostendere. Nam tumor indicet, quae illum auferant: qui, quoniam durus est, mollientia ostendit necessaria: febris, quae refrigerent: sputum cruentum, id quod fuit, interceptum; quod vero fluxit, euacuandum. Quod purulentum est indicat detersionem, mundificationem, & tandem sui consolidationem, si quid exulceratum est. Dolor scapulae mitigationem indicat. Gingivarum vlcus, abstersionem, consolidationem & corroboracionem, ne amplius humo-

Scopi certi semper proponendi.

Scopi omnes primum considerandi, utrum hic morbus curabitur.

Conclusio aegrum curari posse.

Indicantur omnes generatim affectiones, quodammodo agendum, de quibus agimus, septem hic esse praeter naturam, quibus indicationes praestanda.

Numeri indicantium numerum remedium ostendit.

Distinctio omnium affectionum, si quid exulceratum est, detersionem, mundificationem, & tandem sui consolidationem.

causae morborum, sum symptomatum, etiam indicantur per cuncta auxilia.

24. Post indicantia, contraindicantia, inuestiganda.

25. A quibus victus ratio indicatur, nempe ab affectibus, in dictis praeter naturam, & praecipue indicatio a viribus, quae sui conservationem indicant.

46

Ex quatuor fontibus, quoniam quod ea continet, quae in corpus quomodoque assumuntur: aliud, quod ea comprehendit, quae extrinsecus adhibentur: tertium, ea habet, quae a nobis geruntur: vel partim a nobis, partim ab aliis: in postremo vero ponit ea, quae aliquid educunt a corpore, aut in eo retinent; & horum omnium species. Et appellat haec quatuor, ad mouenda, educenda, facienda, extrinsecus incidentia. Ad mouendum quidem nomine, ci-

tum fiat confluxus, desiderat. Durities cruris scirrhusa, tum emollientia tum discutientia indicat adhibenda. Causae quoque vniuersaeque mali, sua similiter indicant peculiaria auxilia. Sic multitudo humoris melancholici, quod euacuet; partium intemperies, quae noxiam materiam procreat, quod illam auferat: humoris acrimonia, ut in gingivis, quod eam obrundet; si, quae sit cruditas, quod concoquat: & ita de aliis. Ceterum cum hi morbi sint atque affectus sibi inuicem contrariantes; statim inuestiganda sunt contraindicantia: & quaecunque singulis repugnent ponenda. Primo enim morbus, qui maxime pertinet ad scorbuto, obstructio lienis est: atque hic morbus iam factus, suo contrario, nempe aptione, tollitur, quae per subtiliantia & abstergentia perficitur. Sed quoniam haec fere viribus calida sunt, hectica non conueniunt; quae frigida & humida indicat. Secundus morbus scorbuto, scilicet multitudo humoris melancholici, sui euacuationem indicat. Hectica contraindicat, id non tuto posse fieri; & propter consumptionem, restaurationem desiderat. Haec & eiusmodi consideranda sunt, antequam ad praedia veniamus: ut possimus non solum victus rationem, sed & ea, quae circa res non naturales versantur, recte praescribere. Ita hic largius dicitur, cum id morbi longitudo, tum hectica, indicant; sed per vices. Quae autem victus ratio attenuat & incidit, lienis obstructioni conuenit. Sed hectica refrigerantem & humectantem victum contraindicat. Haec, ut & remedia, moderanda sunt iuxta quod affectus indicant vel contraindicant. Vel quaedam omittenda, quaedam vero adhibenda, vel moderanda: quod in iudicio excellentis medici, & in artis operibus exercitati consistit. Propterea talem victum praescripsimus, qui etiam partim nutriet, partim incidet; pectus mundificaret, abstergeret, ad lienem aperiendum faceret; absque tamen caliditate, quae hecticae febris contraria erat. Vtebatur igitur aliquando hordeato, aliquando amygdalato, ex amygdalis dulcibus, quibus nonnullae amatae, propter aptionem, adiectae erant, etiam ex seminibus quatuor frigidis maioribus, quae absterguunt, aperiunt, & non calefaciunt, imo infrigidant ac humectant, & ad melancholiam adustionem faciunt. Vtebatur & pincis, filicis, quae aperiunt, abstergunt & nutriunt: pomis assatis, iusculo pulli, iusculo etiam aliquando pisorum, siue leguminibus; quae & vim aperiendi & abstergerendi habent, etiam haec immutando, aliqua praescribendo, iuxta indicationes affectionum praeter naturam: modo exhibendo ea, quae magis inciderent, modo, quae magis nutrent, humectarent, aut refrigerarent, semper indicante proposito quod magis vrgeret. Sunt enim statim ab initio ponenda vniuersa rerum genera, a quibus auxilia omnia emanant, siue res naturales, siue medicamenta, vel alimenta, ut libet appellare. Porro eorum genera apud Galenum quatuor esse constat, ut docuit libro primo, de sanitate tuenda circa finem. Vnum, inquam, quod ea continet, quae in corpus quomodoque assumuntur: aliud, quod ea comprehendit, quae extrinsecus adhibentur: tertium, ea habet, quae a nobis geruntur: vel partim a nobis, partim ab aliis: in postremo vero ponit ea, quae aliquid educunt a corpore, aut in eo retinent; & horum omnium species. Et appellat haec quatuor, ad mouenda, educenda, facienda, extrinsecus incidentia. Ad mouendum quidem nomine, ci-

bus, potio, & si quid medicamentorum intro sumitur, etiam aer attractus, intelligitur. Faciendum vero, frictio, ambulatio, exercitatio; denique omnis motus & exercitatio: huc etiam referuntur, somnus, vigilia, Venus. Foris vero incidentium primus est etiam aer nobis circumdatus, deinde quaecunque lauantium vngentiumve cuti propinquant. Educendum vero, quae ex corpore aut partibus educuntur. Ab his igitur quatuor fontibus exhaurietis omnia praedia: nec vnquam deerit, quod opulari possit, quantum admittit nostra haec facultas. Iam igitur in scorbuto videndum, nunquid tale reperiri possit, inter ea, quae impulsu agunt, vel nos ambiunt, vel admoventur; vel appenduntur aut circumligantur, inunguntur, balneantur, & similia, quae nos sub primo fonte ponamus, eorum, quae extrinsecus agunt: quod si quid sit, id in medium proferre oportet. Deinde pergemus ad secundum fontem, qui ad facienda pertinet: atque spectabimus nunquid aliqua actio corporis ambulatio, & cuiuscunque generis exercitatio, conueniat: & denique vitae conditionem, & animi corporisque omnes actiones expendemus, nunquid huic nostro morbo aliisque affectibus praeter naturam, qui adsunt, prodesse aut obesse possint. Tertius deinde succedet fons, qui continet alimenta & medicamenta, quae in corpus sumuntur, per quamcunque illius partem, & quocunque modo: nam quaedam immittuntur, alia deuorantur, alia manduntur, alia bibuntur, alia inspirantur, quaedam lambuntur, alia paulatim desillantur, alia suguntur, alia aliter forte in corpus sumuntur: quorum vim perspectam habere oportet: & ea capere, quae ad abigendos affectus praeter naturam, qui adsunt, faciant. Quartus demum sequitur fons, in quo continentur, quae aliquid a corpore euacuant sensibiliter, vel insensibiliter, aequaliter vel inaequaliter: idque vel ab vniuerso, vel a quibusdam duntaxat partibus, quod cum educitur, vtrum utile sit videndum; & quid quoque retineri debeat, quid vero educi. Quibus quidem fontibus exhaustis, protinus acquiescet animus, tanquam nullum remedium genus omiserit, quod nostra exhibeat medicina. Et in his victus, medicamentorum aeris, cibi, potus, somni, vigiliae, inaniitionis, repletionis, animi corporisque motus (ut aliorum omnium) mentio fit: sed multo sane felicius, & cum maiori compendio, ut memoriae inhareat, quam haecenus quidam tantum praetici scribunt, quid sit obseruandum in rebus non naturalibus. Nam etiam haec omnia iuxta indicantia vel contraindicantia, & quaedam in principio morbi, non tamen in fine, ut aliquando diximus, conueniunt: ut ambulatio cruri ita affecto non conuenit: postea tamen ad discutiendum aliquo modo conuenire potest, sed motus scorbuticos non conuenit, quum facile animo delinquant. Et ita de aliis omnibus erit ratiocinandum: quae potius ingenio & iudicio medici exercitati, quam calamo per scripturam comprehenduntur. Nam omnia illa in vnoquoque scopo, mente quidem tacite percurrere oportet: & siue victum, siue remedia aegri vestro proposito indicante. Sultus enim & indoctus videbitur esse medicus, si praesens apud aegrum, vel in consultatione, ubi alij medici periti etiam conuocati sunt, fortasse dicet opus esse adstringentibus, vel euacuantibus, vel sanguinis missione, vel calefacientibus, aut auertentibus, aut vino,

Nota.

Primus fons.

Secundus fons.

28. Tertius fons.

Quartus fons.

29. Ex illis quatuor fontibus omnia praedia deprehendenda.

Multa ingenio medici percipiuntur, quae calamo exarari non possunt.

30. Medici imo periti vniuersum indicantium contrarium dicantur ignorant.

Nn vel

vel aqua; aut alio denique praefidio item morbos singulos certo numero auxiliorum abigi: si tamen interim nihil proponat ille, aut colligat, ex his, quid sit quod suadeat illud esse faciendum, vel omnino relinquendum. Quod quidem sit eo, quod indicationum vis, & usus ignoretur: sine quibus nulla agendi ratio in medicina constare, nec aliquod medici officium, Galeno etiam auctore, exerceri potest. Igitur medicus, antequam ad consultationes veniat, praenouisse debet, quae & quot sint, quae indicet: quid praeterea vnumquodque indicet, quid singulis repugnet, quid vnumquodque admittat: ut quid indicet conseruationem, quid ablationem, praeseruationem, restaurationem, mitigationem; quid victum, quid remedium, quid alimentum, quid cibum, quid potum, alterantia, vacuantia; & quid in singulis generibus singula ostendant. Ut in vacuatione, quid sensibilem, quid insensibilem; quid sanguinis detractionem, vel purgationem, aut aliud denique, quo vacuet, insinuet. Postea vero, quid his repugnare valeat, tenendum est: ut alia, quae coindicant & admittunt. Ex horum enim consideratione (ut iam antea ostendimus) inuenimus an agendum; quid; quae materia, quali quantaque sit opus; quo item modo, quo ve ordine & tempore, & in quo corporis loco ea vi possumus. Nunc itaque exemplo scurbuti docuimus, qui sint affectus in eo praeter naturam, & quid generatim, tum causa eorumdem, indicent; quid etiam singulis repugnet; & quae remedia generatim praescribenda sunt, cum ad inferiores actiones descendendum est. Postquam affectus & causa inuenta sunt, quae sua indicant remedia, statim videndum cui prius succurrendum sit, cui secundo, cuique deinceps: quod ordo malorum ostendit: quid prius praecedere debeat, sine quo reliqua fieri nequeunt. Cum itaque obstructio indicet sui ablationem, per subtilitatem & abstergentiam, & cum illa calida sint, nec haec conueniant, neque corpori pleno tuto adhiberi possint, propterea multitudinem prius amoliri ceterum. Neque enim febris, nec obstructiones nec tumor; nec intemperies tolli possunt, nisi prius multitudo humoris auferatur. Haec autem cum sit morbus partim factus, partim fiens, duplicem habet indicationem, partim curatiuam, partim praeseruationem; Quod enim factum est curabitur per euacuationem; quod adhuc sit, per prohibitionem generationis talis humoris, & retentionis si quid forte iterum genitum fuerit. Prohibitio autem generationis fieri per intemperiei iccinoris & lienis curationem, & per causarum procatarricarum ablationem, ne talia fumantur, quae melancholiam augere aut fouere possent. Retentionem vero impediens per meatuum refectionem, & splenis postea confortationem. Ita prohibitio retentionis, duplicem praestabit usum; praeseruationem nimirum multitudinis, & curationem obstructionis. Reformatio namque retentionis est prohibitio: intemperies quoque, eius quod factum est per contraria ablationem indicabit: quod vero sit, per suae ablationem causae auferetur, nimirum humoris multitudinis; & deinde per roborationem viscerum. Et sic etiam ablatio humoris duplicem & ipsa praestabit usum; curationem sui, & obstructionis praeseruationem. Erunt itaque generatim quatuor intentiones curandi: apertio, euacuatio, alteratio, & confortatio. Inter quas secunda, quae est euacuatio, omnium primo (si uno & aliter velimus procedere) exsequenda est. Deinde apertio; quia magna ex par-

te obstructio causa est intemperiei. Deinde alteratione. Vltimo vero confortatio. Haec autem in scurbuti ordine iam dicto plerumque exsequenda. Quamquam hic in nostro agro, ob haec tamen admixtam, vna quasi vice alterandum sit, & aperiendum, cum eiusmodi, quae magnam caliditatem non habent, ut in processu curae patebit. Ex ipsius itaque Galeni, & aliorum medicorum excellentium doctrina concludimus, scurbuticos, quo ad methodum medendi, non prius exoptatam sanitatem nancisci, nisi quatuor illa praedicta praecesserint: nisi enim plenitudo sit amota, & obstructio remota, & intemperies ablata, atque lien roboratus, aeger nunquam curabitur. Quod si oporteret sanitatis successus, adeo euidenter edocuit, ut illis quatuor adhibitis infinitos fere scurbuticos curauerim, & ab omnibus praeter naturam affectibus liberauerim: qui tanquam vmbra postea sublata abiit, vel leui negotio, ut etiam gingivae tum crura maculosa persanarentur. Verum tamen subinde morbus ex morbo nascitur, & morbus sit morbi causa: eadem tursus nunc causa, nunc morbi, nunc symptomatis rationem obtinet. Itaque pro huius varietatis ratione, & curatiue indicationes variantur. Quae omnia ex praedictis notiora sunt, quam ut in praesentiarum altius repetere conueniat. Ad exemplum igitur curati accedam. Quoniam itaque demonstrauimus, a vacuatione curationem incipiendam esse, ita indicantem causam, quae sibi primum locum vindicat, de ea primum dicendum: quoniam vacuantium plura sunt genera & differentia; alia enim est vniuersalis, ut sanguinis missio, eique proxima purgatio; alia est particularis. Sed istis omisiss, constat aequali, ac sensibili vtendum esse vacuatione; & propterea adhibenda esse, quae id praestare possint. Igitur auspicandum erit a sanguinis missione. Hic forte aliquis dicet, hanc indicari a morbo, humore, aetate, viribus, regione, celi statu, corporis habitu, anni tempore, vitae conditione, & ab aliis huiusmodi infinitis: quum tamen ex Galeni doctrina, vnicum duntaxat sit quod indicat: reliqua vero omnia vel coindicant, quod est ostendere id quod indicat; vel impedire primo, quod est contraindicare; vel secundario, quod est correpuerare, dicantur. Propterea haec diligenter inquiramus, & distinguamus: ut sit loco exempli aliorum remedium. Imprimis sanguinis melancholici multitudine sanguinem demendum esse indicat: atque hic vnus scopus est qui indicat. Aetas vero, venae vtumque tumida, vitae conditio praecedens: (nam quartana praecedente sanguinem non miserat, at tamen consuetus subinde sanguinem mittere) anni tempus (nam in autumno etiam haec conuenit, quamuis melius in vere) niger color, sanguinem etiam abundare demonstrabant, in corpore macilentum, ubi venae etiam magis apparent, vrina crassa, rubra. Haec inquam missione sanguinis fiendam coindicabant. Haec tamen vero contraindicabant. Iam etiam vires imbecillae correpuerant. Si vires coindicassent, tunc referendae vires erant ad signa indicantium: iam vero ad signa contraindicantium. Corporis igitur habitus iam consumptus ob morbi longitudinem, etiam correpuerat. Cum igitur vires sint nondum plane prostratae, sed infirmae; non omnino prohibent, nec prorsus admittunt, sed tolerant: interim tamen quia haec non facile admittit, pro imbecillitatis quantitate, & aliis conditionibus repugnans quantitati vacuationis, modo, tempore, loco, qualitate. Magnas enim

vacu-

vacuationes, & confertim factas, & magnas incisiones venarum, per quas spiritiuola substantia exhalat, dissoluiturque robur, non ferunt infirmas vires: nec quo tempore admodum laborant, eo admittunt detractionem fieri: sed prius sui restaurationem postulant. Sic igitur contraindicantia ad rem ducenda sunt: ac in omni auxilio, singulisq; scopis spectandis, quid per se repugnet, quid per accidens, quid vero admittat vnumquodque. Habitus vero corporis, color, venarum tumor, aetas, anni tempus, ostendunt quomodo sint vires affectae docentq; sanguinem abundare, & illius qualitatem, & quo in loco redundet; & reliqua, quae postea scopos indicant: & propterea illa tanquam coindicantia, & correpuerantia commemorantur. Sanguis itaque multus multum euacuari postulat, indicante scilicet copia humoris, quantitatem sui praefidij. Verum licet hic abundet, parum educi debet; nec ita abundat, ut in principio, propter longitudinem morbi & quantam praecedentem: & propterea magis affatus est & crassus; ideo latam sectionem indicat: nam qualitatem remedij qualitas humoris indicat. Sed omnino lata sectio fieri non potest, ut diximus, ne spiritiuola substantia exhalet, viresque, quae iam debiles ex longo morbo sunt, dissoluantur. A vena autem extrahendus est sanguis, quoniam in venis abundat. Secunda autem interna sinistri cubiti, aut ea, quae est inter annularem & auricularem digitos sinistram manus; maxima ut a liene, fomite malorum, humor educatur. Hoc enim modo locus indicantium, locum indicabit remedium. Eo vero tempore sui vacuationem postulat sanguis, quo facile & commodum exire potest. Haec quamquam magis conueniant in principio; tamen si morbus progressus est, relinquere non oportet, modo vires tolerant. Et quamquam hic quaedam indicabant, quaedam contraindicabant sanguinis missione; quaedam vero coindicabant, quaedam correpuerant, ut iam satis ostensum est; hanc etiam ob causam ex saluarella seu vena lienari manus sinistram, quae est inter auricularem & annularem digitos, parum sanguinis admodum crassi & faculenti extraximus; sed in parua quantitate, ob vires debiliores, & morbi longitudinem, & ob haec cum putredine, quae tamen in principio erat. Profuit etiam ad sputum cruentum, ob diuersionem sanguinis. Sed hic aliquis rogabit, quare non in cubito nam Graeci fere semper in cubito miserunt sanguinem, & non in manu. Huic respondeamus, nos ab experientia eductos hanc venae apertionem in scurbuticis maxime prodesse: quamquam etiam in illis in cubito quoque misimus. Nam perinde puto, siue in cubito siue in manu fiat. Sic enim in filio illo praetoris Castricomicij, in cubito misimus; ac aequae contulit. Postea venimus ad reliqua remedia, nempe ad apertionem & alterationem, etiam leuem euacuationem; nam materia melancholica rebellis est, & per vices educi debet, deinde etiam ad confortationem, & supradictas intentiones; eodem modo indicantia & coindicantia, contraindicantia & correpuerantia perscrutando; ut de missione sanguinis; quae quidem missio sanguinis sit loco exempli aliorum: nam omnia repetere non opus est. Et cum post sanguinis euacuationem opus sit purgatione humoris melancholici, qui crassus est; prius aperientibus opus erit: & sic quo ad secundam & tertiam intentionem: quarum vna est apertio, primo executioni man-

Pet. Forest. Tom. 2.

danda; quoniam obstructio ex parte causa est intemperiei, deinde vero alteratio administrandae; vel utraque haec intentiones simul peragenda. Apertio autem in remediis primae intentionis magna ex parte etiam adimpletur, ut phlebotomia, quae iam praemissa est, haemorrhoidum apertione, si opus est, purgatione, potionibus praeparantibus, sanguinem denique mundificantibus. Si quae autem obstructionis adhuc reliquiae supersunt, vel scorsim, vel vna cum tertia intentione principali poterunt extirpari. Tertia enim intentio principalis, cum sit alteratio; alterabitur intemperies facta per contrariorum applicationem; fiens vero adhuc; partim in euacuandi aperientis intentionibus prohibebitur; partim etiam diata boni succi, & attenuante, quantum ad lienis intemperiem; humectante vero & refrigerante, quantum ad febrem, alterabitur. Et dum haec fiunt, etiam corroboratio opus erit; quae est quarta intentio, quae scilicet debilitatem membrorum ex intemperie propulsabit: & haec fere simul in alteratione perficitur, & post eam, secundum viscerum exigentiam exsequenda. Nam fieri non potest, quin stomachus & hepar in hoc casu maximam confortationem requirant: tum quod in ipso scurbuto debilitantur, tum quia fieri vix potuit, ut in praemissarum executione intentionum nihil labefactarentur. Istis itaque praemissis, iam ad particularem materiam remedium, ad singulas intentiones facientes, veniamus. Statim itaque a missione sanguinis decoctum infra scriptum bibendum mandauimus: ℞. cori-

Potio praeparatoria si militer aperient & alterantia

41

Remedia iuxta rationem affe-

42

Purgatio

N n i quand o

quando tamen est cum putredine, levis purgatio dari potest, idque per vices, ob debilitatem vicium: etiam ratione melancholice, quæ rebellis est, & vnica vice euacuari non debeat, maxime in corpore consumpto ob longitudinem morbi. Potioni itaque supradictæ adieciimus, foliorum coluccæ, id est senæ 3 j. polypodij quercini, epythimi ana 3 ij. misce. capiebat omni mane cyathum vnum. Deinde reiterata est decoctio absque sena, nonnunquam etiam in ceruicia communis: nam obseruatione hoc percepimus, melius ad scurbutos valere aliquando etiam si magis incallescet æger, ob hæticam, in aqua vngulæ caballinæ & communis incoquebantur. Pectus autem ob tussim & hæticam inunximus butyro recenti, oleo amygd. dulc. & oleo violaceo: etiam vnguento pectorali nostræ descriptionis, quod Alcmæia in officina paratum habebamus. Ad sputi facilitationem syrup. liquiritiæ, viol. cap. ven. simul mixtis videbatur, etiam tale eclegmate: 2℥. succi vngulæ caballinæ optime depurati 3 i℥. succi bekabunga depurati 3 ℥. syrup. capill. ven. 3 j. zacchari penidurum 3 i℥. Zaccharum cum succis post depurationem vnica vice bulliebat, vt in loch seu eclegma concreveret. Præscriptum etiam pululam Benedicte Faurentini præceptoris mei, quæ valet ad hæticam & præseruationem à phthisi: & pro sputo cruento, in principio decoctum portulacæ cum vngula caballina: deinde decoctum hordei mundati, & vngulæ caballinæ, & alia quedam, quæ in præctica Benedicte Faurentini habentur in sua empirica cap. de phthisi. Et tandem hætica desit, nec amplius tussiebat: & à sputo cruento & purulento curatus est, & calor febrilis maxime sedatus: & vrina, quæ erat valde passæa, subrubra, nigra, crassa, faculenta, incepit minus esse tinctæ; ita, vt febris iam euanesceret: tunc demum ad magis lienem aperiencia, & tumorem discutientia deuenimus; simul decocto superiori addites illa, quæ viscera & stomachum magis corroborarent, vt absinthium Romanum, & hoc modo: 2℥. corticum rad. cichorij, peros. ana 3 ℥. scolopend. cichorij, ceterach. bekabungæ cochleariæ, sumiternæ, agrimonie, absinth. Romani ana m. 6. flor. card. ana p. j. sem. anisi 3 j. sem. endiuie. agni casti, ana 3 ℥. vniuers. ass. enucleat. p. j. corticum rad. cappar. 3 ij. fiat decoctio in aqua communi, pro 1℔ i℥. colentur. adde syr. sceleribic. nostrum, syr. de fumoterra, de endiuia, de cichor. cum rhubarb. ana 3 ℥. misce. Syrupus sceleribicus noster conficitur ex succo bekabungæ & cochleariæ, cum zaccharo. Nullum præstantius empiricum in scurbuticis inueni. D. Sasbotus consiliarius regius Haghenfis cum scurbutica passione deplorare laboraret, & medici sui præfentes, D. Antonius Henricus Vergoir, & D. Hugo, medici Haghenfes, de eo desperarent; superuenit illis Doctor Nannius, medicus Amstelrodamenfis doctissimus, qui inuenit eundem laborare scurbuto; & breuicem, præter opinionem aliorum, restituit. Fuit tamen semper postea huic passioni obnoxius, & vndique querebat consultationes. Huic igitur, vt hoc syrupo nostro vteretur, bis aut ter in septimana, consulimus: & nostra ope in posterum præseruatus, ita, vt quotannis pro eo ac aliis amicis talem syrupum in officinis mihi parari iusserim. Tabulas etiam alterantes, aperientes & confortantes (cum ex decocto supradicto, cui sena incocta erant, usus fuisset noster nauis) similiter ei dedimus, ita præparatas: 2℥. specierum diatriod. abb. 3 ij. specierum vniuers. trochiscor. de cappar. ana 3 j. dissolutis in aqua agrimonie qu. f. adiecto zaccharo, fiat con-

fectio in tabulis, vt artis est. Cæterum istis præcedentibus, quamquam ipsius scurbuti valentiora symptomata non cessarent, permanente lienis duritie, & cruris scirrhusa dispositione, tum dolore ingenti in scapula. Autumno incrementum, ne ad hydropem vel cachexiam tenderet, ad dicta symptomata amouenda, præhabitis dictis intentionibus, accessimus; etiam ad particula remedia deueniendo, quæ ex quatuor fontibus iam supradictis hausimus. Durities enim illius lienis, tum obstructio, post febrem quartanam relictæ, præcipue auferenda erat, antequam ad cruris duritiem, tum nigritiem, curandam accederemus. Obstructione enim ablata, reliqua accidentia facilius (vt diximus) curabuntur, tamquam ab hoc trunco procedentia: nam illa rigiditas coxæ, tum color ad nigredinem declinans, cruris tum etiam totius corporis, non solum accidit propter attractricis, quæ est in liene, imbecillitatem: verum etiam quando meatus, per quam atræ bilis faculenta humor ex icore in lienem deriuatur, obstructus est, & lien in tumorem eleuatur, impurus ac vitiosus sanguis subinde in vniuersum distribuitur corpus, illud ipsum nigredine afficiens, ac non nunquam immedicabilia vlcera proferens. Sed quia ista materia fuit hic multum tenax & viscosa, potius rigiditatem cum nigredine, quæ vlcera in cruribus produxit: nam aliqui materia illa melancholica fuisset atris ac fuliginosa. Est itaque, vt diximus, hæc obstructio lienis, tum durities, causa reliquorum symptomatum, tum cruris, tum gingivarum sanguifluarum, tum doloris scapulae. Igitur illa prius amouenda præ cæteris extenuatoriis; & propter tumorem, attenuantibus & discutientibus: & propter duritiem, etiam mollientibus & discutientibus. Et sic præcessit sanguinis missio, deinde potiones dictæ, ex ceterach. cap. Ven. bekabungæ, cochleariæ, in principio pectoralibus (ob hæticam, tum sputum) permixtæ. Sed hætica iam ablata, paulatim ad pure lienem aperiencia deuenimus: ad rad. capparum, thamarisci, ad ceterach. bekabungam, nasturtium aquaticum, laurifolium, cochleariam, & similia: & purgauius subinde cum infus. senæ, aut cassia, etiam tandem cum cofectione hamech, secundum quod nobis videbatur vtile. Demum confortauimus cum electuariis, vt speciebus diacapparis, & similibus. Exterius vero lienem inunximus oleo cappar. mox linimentis, quibus vis emolliendi, attenuandi, discutienti, corroborandi aderat: 2℥. olei amygd. dul. olei de cappar. emplastri de meliloto ana 3 j. ammoniaci in aceto dissoluti 3 ij. pulu. corticum, rad. cappar. ceterach. ana 3 ij. pulu. scolopend. sicca. rad. filicis ana 3 ℥. cere q. s. fiat linimentum, vel vnguentum pro liene. Talibus & similibus procedendo per duos menses, obstructio & durities tandem ablata fuere. Si autem scirrhusa dispositionem lienis incurrisset, fortioribus usus fuisset, vt cerato nostro ammoniaci. Valet etiam ad miraculum, ad topicos minores, duos & scirrhusos, & maximum honorem ex eo sæpè habui, & lucrum. Nam cum cythepæ cuida in seroto, seu, vt barbari loquuntur, in bursa testium tanta durities esset, cum apostemate, vt nullo modo nec emolli, nec maturari posset, hoc tam prædicto cerato effeci. In scirrhus autem lienis, vt Galen. etiam docuit, lib. 2. ad Glau. cap. de scirrhus, vt inur primo solis emollientibus, deinde discutientibus: nam alternatus eorum usus prodest. Sed nostris prædictis remediis, durities tum obstructio cessarunt. Interim eodem tempore pro dolore scapulae, qui ad os adiutorij

tendebat, & ita vehemens erat, hoc symptomata, vt sui quoque mitigationem itatim vniuersalibus remediis præmissis indicaret, & ob defluxum humorum per nucham ad scapulam; nucham inunximus oleo chamæmillino & myrtino; scapulam vero oleo anethino & chamæmillino. Sed dolor ita increuit, vt multas noctes insomnes ageret. Inunximus postea nostro vnguento alabastrino; sed frustra: etiam vnguento dialthææ. Tandem applicuimus sacculum quadratum, intersutum ac repletum sale tosto milio, tosto fusture & floribus chamæmillæ: & eo sacculo calide admoto instar incantamenti dolor sedatus est. Iam adhuc duo pathemata scurbuti restabant, sanguifluus tumor gingivarum, cum vlcératione: & cruris durities scirrhusa. Affectus iste præter naturam non potuit curari, nisi sanguinis missione peracta, & purgatione, tum iis, quæ lienem aperirent, ac causam scurbuti prius, tum intemperiem amouerent. Illa cum iam præmissa forent, gingiuas ablui iussimus variis decoctionibus, ex plantag. consolida minore, rosis, cimisi rubi, bekabungæ & cochleariæ. Quibus colatis, tum mel. rosaceum, tum rob. diamoronis adiecta fuere. Etiam hoc puluere in pollinem redacto gingiuas post lotionem confricabat: alum. vsti, salis vsti, gallarum, exsiccatarum, cornu cerui vsti, saluæ exsiccatæ ana 3 j. in pollinem conterantur. Aliud quoque vsumus: 2℥. peruinæ, plantag. cornu ad. cinnam. rubi maricariæ, saluæ ana m. j. cortices arantij vniuers. bulliant in 1℔. 2. ceruicis veteris clauæ, & 1℔. vini Pist. vel rubei Gallici & styptici, ad dimidium fere in olla eneg. colatis adde mellis ros. 3 ij. eo os abluatur, ac gingiuæ confricentur: 2℥. alum. vsti, 3 ℥. salis vsti 3 ij. gallarum, cornu cerui vsti ana 3 j. maceris 3 ij. soliorum saluæ sicca. num. iij. in pollinem conterantur, eodem modo & pulueres cochleariæ & bekabungæ exsiccatarum valent. etiam si gingiuæ solo succo cochleariæ confricentur: vel cochleariæ & bekabungæ cocta cum lacte, & eius decocto gingiuæ sæpe abluantur. Noster vero patiens ex sola aqua destillata cochleariæ & bekabungæ, eaque abluens sæpe gingiuas, fuit curatus. Vltimum autem symptoma erat totius femoris sinistri, tum cruris, & præcipue genu, tum ad durities propemodum scirrhusa, ac in lapideam materiam conuersa. Eandem intentionem desiderabat qua scirrhus curatur: emollientibus primo, deinde discutientibus, & moderate emollientibus: vicissim ijs vtendo, vt Gal. lib. 2. ad Glau. narrat de puero Cercilij, quem à tumore scirrhuso curauerat: tamdiu vtens emollientibus, donec mollietates manifesta sentiantur, & caro exterius ruborem quandam extendat: mox ad nonnulla discutientia deuenit: demum ad emollientia, absque discutientibus, tandem ad maiora discutientia: vicissim tum his, tum illis vtendo: nam si altero tantum medicamentorum scirrhum curare tentauerimus, vt dicebat Gal. nequaquam sanabimus. Quæcunque enim nimis digereunt, ob calorem vehementem, digerentem, scirrhum in tophaceam duritiem concrefcere faciunt: quæ vero nimis emolliunt, non possunt sola præstare, vt scirrhus decrefcet. Alterius igitur eorum usus moderatus confert. Sed nec, quæ molliunt, continuo affectum curant. Opus enim est & digerentibus; non quidem vehementer, sed quæ molliendo commode id præstent. Cum itaque crux ob tumorem & duritiem ita inflexibile erat, vt non nisi scipionibus incedere posset, hunc affectum vltimum præter naturam, aliis præmissis vniuersalibus, hoc modo topicis & lo-

calibus medicamentis curauimus. Primo inunximus oleo liliaceo & amygd. dul. postea adieciimus parum olei chamæmillini: deinde oleo liliaceo; & propter dolorem, etiam ad discutendum, simul cum vnguento alabastrino, mox dialthææ, cum mucilaginis, axungie vitulinæ & felinæ, aliisque emollientibus. Postea fomentauimus totum crux cum decocto pedum vituli & intestinorum, spongia in eo immerfa fouentes. Postea iterum inunximus linimento composito ex oleo chamæmill. & emplastro de ceratæ meliloto. Tandem ad varia cataplasmata cerata, emplastra maxime emollientia deuenimus: idque longo tempore. Vt est ceratum de mucilaginis; quo ego vtor etiam in doloribus, & tumoribus daris inuiscatis, quales etiam in Gallico morbo laborantibus apparent tophacci: etiam nostrum ceratum de ammoniaco hic confert. Sed istis omnibus parum profecimus: quamquam illo tempore non vtebar cerato ammoniaco nostro, cum eius inuentionem nondum haberemus; sed hoc Delphis nostro Matre, & egregia obseruatione inuenimus. Cum autem crux æque rigidum maneret, per multos dies per os dedimus omni mane cochlear vnum, postea dosin augendo, ad quatuor cochlearia, aquæ cochleariæ distillatæ in arena. Et coxam tum femur inunximus oleo laurino. Et ne nimis incallescere, parum adieciimus olei rosacei completi. Deinde iterum ad emollientia deueni: mox ad discutientia. Et quotidie omni mane iussimus crux tum femur ac genu euaporari hoc decocto: 2℥. parietariæ, meliloti, florum chamæmillæ cum toto, absinthij communis, soliorum & summitatum alibæ, maluæ, vrlicæ vrentis ana m. ij. sem. fenugreci, lini ana 3 ℥. rad. alibæ 3 ij. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, & coquantur in aqua q. s. ac ponantur pes nudus super vasculum decoctionis distillatæ vndique panis tegatur, vaporumque ascendentem ex aqua decoctionis calida, per horam integram matutino tempore suscipiat; idque per plures dies continuando, vt totum crux sudore madescat & perfluat. Deinde oleum castorei, & deinde panis laueis fovebatur calidissime totum crux: idque continuando per plures dies. Illoque euaporatorio vtens, paulatim ad miraculum hic noster patiens à symptomate dicto conualuit; & potuit tandem crux moueri: ita vt illo medicamento diuino cessauerit, tum tumor, tum durities, vt relictis scipionibus optime ambulauerit. Attamen cum iam conualuisset, ac obambulare posset, pro confortatione iunctorum, tum neruorum; & ad reliquias duritiei emolliendas, tum discutendas, circa genu iussimus applicari ad tempus emplastrum de oxycera. Nigrities autem totius corporis, tum cruris, ex assumptione per os aquæ cochleariæ distillatæ in arena, eiusque solius usu quotidiano euacuit. Sed hoc etiam addendum, quod fere omiseram, in decocto euaporatorio postea etiam adiunximus cochleariam, bekabungam & nasturtium laurifolium, quod vulgares loco cochleariæ intelligunt. Et ita egregie hunc nautam, ab aliis pro deplorato habitum, tum alios multos à simili duritie scirrhusa cruris in scurbutica passione persanauimus. Ita & Cornelium Bulcopium, organistam Delphensem insignem, cui femora & crura ex scurbuto per totam hyemem indurata fuerant. Memini me quoque aliam mulierem à simili duritie scirrhusa ris quasi in crure curasse, quæ tamen parum tendebat ad cedema, ex scurbutica passione; missione sanguinis præcedente, tum purgatione, & decocto.

Nn iij cochlea.

Emplastrum.

cochlearia, bekabungæ, & similibus: & his infra-
scriptis duriciem postea curasse: primo totum
crus inungendo (quia nihil incalescebat) duabus
partibus vnguenti popul. & vna parte olei cha-
mamil. deinde hæc, quæ sequuntur cruri appli-
cabantur. *℞. florum chamæmillæ, meliloti, florum lupu-
lorum, florum anethi, foliorum ebulli anam. ij. artemisie
m. j. cumini, anisi ana z. b. pistentur, postquam cocta
fuerint in cerevisia communi ad molliitudinem extremam,
& adiecto butyro recenti, in formam cataplasmati coe-
ant: & cruri apponebatur. Tumor statim paula-
tim desit; hoc subsequenti emplastro adhuc ad-
moto: *℞. stercoreis bouinis lb. iij. farina fabarum m. j.
butyri recentis, olei rosæ, olei chamæmillæ ana q. s.
pro emplastro; quo totum crus inuoluitur, idque con-
tinuando per aliquot dies, sana euasit: quan-
quam hoc malum inueteratum non esset: nam à
quartana in scurbutum, & deinde in cruris du-
ritiem incidit. Sed præmissis vniuersalibus, ab
affectu cruris præter naturam breui prædictis
localibus remediis conualuit. Medicamenta ve-
ro ante topica adhibita, hæc erant: Primo à
venæ sectione, sanguine pauco demisso, ex
vena lienari in manu sinistra, in pituitosa ac
melancholica muliere, utcumque debili; hoc
apozemate hæc ipsa bis in die utebatur: *℞. cor-
rad. feniculi, apij, petroselin. glycyrrhizæ ana z. j. sum-
maria, scolopend. ebulli, nasturij aquatici, cochlearia, bek-
abungæ, cassiæ, chamæd. chamæpites ana m. i. b. florum
cordialium p. j. seruinis anisi z. ij. b. sem. quatuor frig-
mior. & minor. ana z. b. corrad. thamaris, cappar. de
ana z. i. b. polypodij querc. z. iij. trochis. de cappar. de
rhubarb. simul ligaturum in nodulo, ana z. ij. coquantur
in aqua communi, ad lb. ij. sicut deinde infusa per no-
ctem: mane expressioni adde syr. de scolopend. de fumo
terræ ana z. i. b. syr. de end. z. b. misce. Postea ad-
huc semel reiteratum fuit: & imposita, z. i. b.
folliculorum senæ. Eoque finito decocto, eandem
hoc modo purgauimus: *℞. confectiois hamech. z. iij.
diacathol. diaphoræ. ana z. i. b. cum z. iij. vel iij. de-
coctionis radicis filicis; fiat potus. Quo septies fa-
tis copiose aluum deposuit. Lienem vero bis in
die iungi iussimus cum oleo de capparibus.
Et quod ad crus attinebat, tandem ad topica
supradicta accessimus. Mulier hæc, vxor erat
illius Iacobi cognomento Magi, quæ ad viam
vulgo dictam Lutkeomeropiam Almaria decum-
bebat. Eodem modo & alius quidam, crus in-
duratum habens ex scurbuto: vt multis mensi-
bus inambulare non posset, hoc fomento tum li-
nimento subscripto, pristinum statum recupera-
uit: *℞. florum meliloti m. ij. florum chamæmillæ m. j.
maluæ cum toto, artemisie ana m. i. b. bekabungæ, co-
chlearia, sumi terræ, ana m. j. sem. fenugreci z. b. rad.
alibæ z. j. sem. ammeos, petroselin. ana z. j. coquantur
in aqua communi, pro fomento. Primo recipiebat
48 robustus. euaporationem: deinde calide lauabat crus: mox
lienem pannis intinctis calide crura inuoluebat.
Idque continuando per aliquot dies, demum to-
tum crus linimento sequenti inungebat: *℞. em-
plastrum de meliloti z. iij. olei amygd. dul. olei liliij. olei
chamæmil. ana z. b. misce. atque ille similiter con-
ualuit. Huic tamen, tum mulieri, præcessit quo-
que missio sanguinis. Hic tamen non febricitaba-
bat, nec admodum incalescebat, cum scurbuto
afficeretur. Ideo præcedentibus potionibus præ-
paratoriis, antequam cruribus remedia appone-
rentur vsus est, hoc modo: *℞. nasturij aquatici,
cochlearia, bekabungæ sumi terræ, scolopend. cassiæ,
chamæd. chamæpites, ebulli cum toto, apij cum toto ana m.
j. florum cordialium, p. rad. liquor. brisici, asparagi, pi-
stros. ana z. b. sem. anisi z. i. b. sem. quatuor frig. mu-*******

Alius nau-
ta à simili
symptomate
a nobis cu-
ratus, an-
48 robustus.
Fomentum
Linimentum.

57

Potio præ-
paratoria
similiter
apud natus.

ior. an. z. b. folior. senæ z. i. b. epithymi, polypod. querc.
cini an. z. b. bellidori nigri z. b. cicerum rub. z. ij. co-
quantur in sero lactis, pro lb. ij. dulcoretur sacch. potio. *Purgatio*
sumebat bis in die, quia fortis erat nauta & ro-
bustus. Deinde peracta venæ sectio in manu si-
nistra, post ij. dies, ex vena lienari. Deinde
cum hoc modo purgauimus: *℞. confectiois ha-
mech, cassiæ recentis extractæ an. z. b. feri lactis z. iij.
syr. sceleribici nostri. z. b. summo diluculo exhibi-
tum. Et excreuit plus octies. Huic gingiua non
erant admodum vicerata: & ideo solo decoct. co-
chlearia, bekabungæ & nasturtij latifolij cura-
bantur. Mox ea quæ diximus, cruri aded rigido
vt flecti non posset, applicuimus: hominemque
dictis remediis breui curauimus. Videtis quod
numerus malorum numerum remediorum ostendat.
Et quod non semper in omnibus iisdem re-
mediis vsi sumus.*

Habetis itaque exempla curatorum, in aliis etiam
morbis vobis imitanda; vt iam vestro Marte, modo di-
ligentes esse velitis, omnes scopos curandi assequi pos-
sit, tum instrumenta, quibus scopi inueniantur; eo
modo quo nos inuenimus scurbutum curari per medica-
tiones, vel etiam ratiocinationem, in his, quorum natu-
ram & vim certo percipere posuimus. Sic per indicatio-
nem in scurbutum inuenimus multitudinem humorum me-
lancholicorum prius esse amouendam, deinde obstructio-
nem tollendam; tum reliqua omnia per ordinem transi-
genda; affectu præter naturam, tum causa eorundem ita
indicante. Iam etiam quadam inuenimus (in quibus
indicio locum non habuit, nec vis ipsa aut natura certo
percipi potuit) per observationem seu experientiam: vt
cochleariam, bekabungam huic morbo vt quadam occul-
ta conferre: quæ etiam à plebeis habuimus, sed in
meliores formas redegitur, vt in syrpos: vel iis-
dem in decoctis aut etiam in fomentis exterius vsi su-
mus. Tercio etiam quadam inuenimus per analogi-
um, cum adhuc sub iudice lis sit, ad quem morbum
referri certo debeat: ita vt etiam medici præstantio-
res hæcenus de eius essentia dubitauerunt; præferunt
qui non adeo multos scurbuticos præ manibus habue-
runt, ac nos in nostra regione, ubi plurimi scurbutici
inueniuntur, ac melius reseruntur. Ideo etiam Ha-
ghenses medici, licet expertissimi, in Saboto de scur-
buto, ne cogitabant quidem, nisi postea, Namio
medico Amstelredamensi accedente: nam & Am-
stelredami inter nautas morbus magis notus est: sic
& nobis Almarianis. Ergo cum naturam affectus,
tum causam, non ita perfecte cognitas, habuerimus, si-
militudine affectus adueniit, hæc quæ lienii confere-
bant adhibuimus.

Habetis ad amissim, cognati carissimi, vt spero,
exemplum curandi, quod in omnibus aliis morbis
imitari possitis, vt in expertos medicos enadatis, no-
stra diligentia, qui hæc in compendium colligimus.
Valete. Prima scripta fuit epistola 1558. ad fratrem
meum Iacobum Forestum, nunc denno anno 1590. ad
vos rescripta.

Petrus Forestus; Reipubl. Delphenis
medicus, patruus vester.

SCHOLIA.

Iuuenes isti cum insignia Doctoratus in Aca-
demia Patavina cum honore consequuti es-
sent, anno 1594. mense Iunio, feliciter & in-
columis in patriam redierunt. Ita vt iam intra
centum annos sex medici ex familia nostra Fo-
restorum existerint.

Ceterum scurbutus morbus, fuit veteribus in-
cognitus: de quo Ronseus, vetus noster ami-
cus,

cus, cum quo Louanij quondam familiariter vi-
ximus, medicus si quis alius eruditissimus, no-
stra ætate libellum edidit insignem, de magnis
lienibus Hip. Pliniique stomacace. At stomaca-
ce & sceletyrbe, veterum, videtur esse scurbu-
tus. Scripserunt autem de stomacace & sceletyr-
be Plinius lib. 25. cap. 3. & Strabo lib. 16. sua Geo-
graphia. Græcorum tamen & Arabum regioni
ignotus hic morbus fuisse videtur, quia Pliniana
appellatione nusquam vitur. Sceletyrbe autem,
quæ depingitur ab auctore definitionum medi-
carum, diuersum omnino est malum ab affectu
bus crurum, qui in scurbuto visuntur. Apud A-
uicennam tamen, cent. 3. sen. 13. tractat. 2. cap. 5.
ubi disserit de signis apoltematum lieis, possumus
quasi inuenire congeriem symptomatum, quæ in
scurbuto visuntur. Et Agneta scirhi
notas ponit, & Alexander Trallianus, ubi
agit de phlegmone ex atra bile: quæamvis nec
icteritia nigra est; nec etiam voluulus hama-
tites, vt Iohannes Langius putabat, vt etiam lon-
go sermone docet idem Ronseus cap. 4. contra
Langium. Atque is vult, quod maxime accedat
ad illa, quæ Hippocrates de magnis lienibus
scripsit. Vulgares nostri scurbutum vocant, à
(Schorbuck) quæ dictio Danica est, sed à Saxoni-
bus etiam usurpata, nostra lingua vulgari (Schuer-
buck) appellata. Scribit Bliemburchius in epistola
ad Ecbrium scripta, de qua antea diximus, suo tem-
pore quodam Regnerio Snoy, multæ eruditionis
& exercitæ praxis medico, vocatum fuisse
Gingipedum, à gingiuis & pedibus corrupto san-
guine infectis; eoque sanguinem mundificantia
recte ad curandi rationem adhiberi. Non tamen
in hoc malo semper gingiua & pedes inficiuntur:
quin & brachia infici possunt; quod in No-
socomio Delpheni in quodam agro decubente
ex scurbuto, obseruauimus; cui brachia purpu-
rea, violacea, plumbea & variegata erant: quem-
admodum & in Cornelio Iohanne Bokello, cer-
uicario, & vrbis consule, anno 1565. mense A-
prili conspeximus. Adeo vt etiam gingibra-
chium, aut mixturam dici possit. Causæ & signa
ex præcedentibus observationibus satis innotef-
cunt: & etiam ex parte curatio, quibus modis
recta methodo perficiatur. Quamvis hæc ipsa
adhuc clariora euadent ex obseruatione sequen-
ti, ac scholio etiam subsequente; nonnullis simul
exemplis adiectis eorum, qui probe curati
fuerunt.

OBSERVATIO XII.

In qua agitur de quinque ægris à scurbuto curatis.

Prætor Castricomius, annorum triginta, vir
admodum crapulae deditus, sine vxore viuens,
Veneri valde addictus, & egregius potor cerui-
ciarius; victu vtens inordinato, ceruicis ad-
modum crassis faculentis, & diæta corrupta;
post quartanam in scurbutum incidit. Huius
enim mali causæ procacitæ sunt (vt diximus)
primo diæta crassa & corrupta, vt in nauibus no-
strorum Batavorum, seu Hollandorum & Fri-
siorum, fieri affolet. Hinc nauta ille, de quo agi-
mus obseruatione præcedente in scurbutum in-
ciderat. Vltus quoque aquarum corruptarum, in
aquarum dulcium penuria, hunc morbum creare
potest, præsertim in acre calido, quo citissime
aquæ corrumpi possunt. Ad hoc facit & caro
suilla, à coctura etiam subelida, caro venatica
putida, pisces crassioris substantiæ, panis bis-
Pet. Forest. Tom. 2.

coctus submucidos; allia, ceruicia mali succi;
quibus omnibus hic æger perpetuo fere vsus
erat. Huc accedebat secunda causa; aer am-
biens calidus, sanguinis subtiliores partes re-
soluens, & reliquam sanguinis massam crassio-
rem relinquens: Vigiliæ quoque, labores, curæ,
febres præcedentes: nam & quidam, teste Galeno
3. de loc. affect. cap. 6. per febriles morbos me-
lancholicum humorem contraxerunt. Non fuit
igitur mirum, quod hic prætor in hunc morbum
inciderit. Hæc enim vltima possunt generare hu-
morem melancholicum, causam videlicet proe-
gumenam huius morbi; etiam si praua victus ra-
tio non præcessisset: & id quidem hic tanto ma-
gis, quod omnes causæ concurrerent. A quarta-
na itaque cum in scurbutum incidisset, integris
tribus mensibus lecto ex scurbuto decubuit, an-
tequam me vocaret: vsus tamen fuerat opera il-
lius Ioannis Galli dicti, medici Harlemensis, sed
frustra. Qui simul & patrem huius, multo tem-
pore, vt per annum dimidium, in lecto decum-
bentem eodem malo, curare non potuit, cum su-
bito syncope oborta scurbuto obierit, vt filius
nobis postea narravit, patri quoque succedens
in cura pratoria, eodem morbo tanquam hæ-
reditario correptus, post Galli abitum nihil
sentiens commodi, varios deinde consuluit me-
dicos, verum potius empiricos, quam vere ra-
tionales: ex quorum numero quidam ex his,
conspicis cruribus maculosis, hominem Galli-
ca lue infectum dicebant, vt solet hoc genus nebu-
lonum, inscitia vel imperitia eo pertractum, vt
incognitos morbos Gallicum malum iudicent;
vel potius impostura, vt ægros eo melius num-
mismungant: qui omnes misere corpus huius
ægrî suis medicamentis truculentis, vel carni-
ficinis, ita macerant, vt ad restum deductus
videretur. Dederant autem empirici illi, & suc-
cum bryoniæ: bis carnifices. Quibus & accessit
tandem presbyter quidam Almarianus, egre-
gius ourosopus, quamquam homo infelissimus,
plebeis tamen, tanquam cæcis de coloribus ma-
le iudicantibus, gratus: qui & laxantia calidissi-
ma superaddidit: ex quibus postremo durities
haud exigua lienii superuenit, cum maxima vi-
rium imbecillitate. His denuo relictis, lorium
spectandum ad me deferri curavit; quod vineum
passumque erat, quale significare solet sangui-
neum humorem plerumque assari, vel in rubeam
aut atram bilem transmutari; lienis oppilatio-
nem, solutionem quartanæ, icteritiam, vt Attua-
rius de vrinis docuit. Ideo cum vrinæ nequaquam
siccandum sit, vt alias etiam tribus libris ostend-
imus, latorem cæpi interrogare de dolore hy-
pochondrij sinistri, de morbi longitudine, de
quartana, de anhelitus difficultate; & vt paucis
absoluam, per interrogationes per me factas in-
tellexi scurbutum morbum adesse: quo & diuersis
temporibus antea quoque (vt manus referebat) la-
borauerat. Instat itaque nuntius, vt medica-
menta præscriberem: quod difficulter annueba-
m, cum vtilius foret ægro prius inspecto id perfice-
re. Attamen vt illi obsecundarem (cautione ad-
hibita, vt si medicamenta non proficerent, neque
iuuarent, me ad ægrum potius deduceret) hoc de-
coctum sequens præscripsi: *℞. corrad. cochlearia, sumi
terra ana m. j. agrimonie, florum cord. ana p. j. sem. anisi
z. i. b. sem. end. agni casti ana z. b. vuar pass. ab avill.
mundat. p. j. corvici rad. cappar. z. iij. fiat omnium secun-
dum ordinem decoctio in aqua communi, ad lb. i. b. colatu-
re adde syr. de sumi terræ, de end. de cichor. cum rhab.*

Nn iij ana

ana 3 i b. misce. *℞. rhab. incisi 3 ij b. specier. diar-*
rhod. abb. 3 i b. trochif. de cap. grana xv. ligentur in
pupparia; & pendat in dicta decoctione, sumebat bis
in die. Postea rursus lotium misit, quod videba-
tur minus tinctum. Sed cum in eodem statu per-
maneret, nuntius me ad agrum deduxit: ad que
veni quarto die Maij, anno 1555. quem inveni
ad summam desperationem lecto decumbere:
nam si sese leuissimo motu erigeret, in syncopen
cadebat; ita ut saepe pro semimortuo reputaretur.
Illud enim signum scurbuti inualecentis est, ut
scilicet sequatur, ambulandi impotentia, anhe-
litus difficultas, potissimum dum se mouent aut
erigunt, ut in hoc agro erat: si enim aliquandiu
erecti sedere conantur, quasi deficiente spiritu
(ut diximus antea) semianimes deliquio afficiun-
tur: rursus decumbentes resciumtur. Aderant
huic & reliqua signa dicta in Obseruatione præ-
cedente, quæ scurbuti ingrauescentis signa esse
solent. Et ideo ego metuebam eidem, ne ex syn-
cope subito, ut pater eiusdem, vitam finiret.
Crura autem habebat attenuata, sed non macu-
losa, quæ antea maculosa fuerant, vident narra-
bat. Interim gingiuas sanguinolentas experie-
batur. Similiter & dolorem intensum in hypo-
chondrio sinistro sentiebat. Ob quem dolorem,
ex vena nigra sinistra brachii tantum 3 iij. san-
guinis detrahere iussit. Quo dolor cessauit: nam
plus mittere, ob virium imbecillitatem, ne syn-
copis obreperet, tutum non fuit. Illo quoque de-
cumbente sanguinem extrahere mandauit: nam
erectus sedens syncopen incurere solitus erat.
Cum dolor iam remissus erat, hoc decoctum se-
*quens præscripsi: *℞. rad. liquir. (aderat enim tuf-**
sis, cum sputo tenaci; pect. orisque angustia, ex
scurbuto, ob tumorem lienis comprimente dia-
phragma & pulmonem) cort. rad. feniculi an. 3 b.
cochlearia bekabungæ, scabiose, vngula caball. ana m. j.
scelop. hyssopi ana m. b. capill. ven. ceterach, florum
cord. an. p. j. vuar. pass. enucleat. 3 j. coquantur in sero
lactis ad 3 j. coletur & colatura dulcoretur rachebato
candi pro sapore. Bis sumebat cyathum in die, &
illico (quod mirum erat) sensit allevationem. Inter-
im gingiuas sanguifluas abluebat sæpissime
lacte decocto, cochleariæ & bekabungæ: quibus
fluor ille cessabat, & gingiux ulceratæ curatæ
fuerunt. Lienem induratum inuimus cum oleo
cappari. amyg. amar. & liliorum. Deinde 9.
Maij ad sanguinem melancholicum purifican-
dum, & faciem melancholicam purgandam, se-
*quenti decocto vsumus: *℞. cort. rad. feniculi,**
bugloss. liquir. rase an. 3 b. vngula caball. (pro tussi)
capill. ven. ceterach. scolopend. scabiose, bekabungæ, co-
chlearia, hyssopi, borag. summitatum buglossa (omnia
viridia erant, quia in maio eramus) an. m. b. cort.
rad. cappari. 3 ij. vuar. pass. enucl. 3 j. seminis anisi 3
ij. follicul. sene 3 vj. (quia debilis erat, & facilis
solutionis) epithymi, polypodij querc. an. 3 ij b. fiat
decoctio secundum ordinem in sero lactis, pro 3 j. col-
tura racheb. cand. dulcoretur. Eo decocto vtens mo-
do semel, modo bis in die, cum aluum subinde
deposuisset, hæc præter spem omnium à diutur-
no & deplorato morbo conualuit: gratia diuina
nobis adstante.

Secundus
casus.

Henricus quoque ille Ceruissarius Delphen-
 sis, qui in Nola habitabat, postquam trimestrem
 febrem prius tertianam, mox erraticam, deinde
 quotidianam habuisset, scurbuto correptus est,
 ita, ut omnes de eius salute desperarent. Impe-
 rauit, ut quotidie vteretur decocto bekabungæ,
 abstinere communis & Romani, & nasturtij
 aquatici & cochleariæ in ceruisia. Dentes & gin-

giuas confricabat aqua bekabungæ, & plantaginis
 cui aluminis vsti momentum incoctum erat, simul quoque
 cortices granat. & balaustror. adiectæ. Atque hoc pul-
 uere deinde inspersit: *℞. aluminis salis vsti, cornu*
cerui vsti, gallarum, maceris, foliorum saluæ, an. 3 b. in
pollinem conuertantur. Cum idem tussi afficeretur.
℞. diapiid. specier. diarag. frigid. an. 3 j. dissolu-
cum aqua bekabungæ, & vngula caball. adiecto racheb.
optimi q. s. fiat confectione in tabulis. vtatur ad libitum.
 Et hic, quia temperatura calidiore erat, perpetuo
 sumebat decoctum bekabungæ, cum syr. ex succo be-
 kabungæ: postea addito succo cochleariæ, in mini-
 ma quantitate. Et sic præter hominum opinio-
 nem conualuit.

Sebastianus quoque Isbrandus anno 1565. in
 foro frumentario, per plures menses ex scurbuto
 decumbebat. Huic crura erant variegata, valde
 dura. Accedebat & animi defectus, si se erigeret:
 neque se erigere poterat, quin in hypothyriam
 incideret. Gingiux parum corruptæ erant: lo-
 tium valde crudum. Cum autem ad desperatio-
 nem diu laborasset, neque chirurgorum opera
 curari posset, nos eundem restitimus, sapius
 hoc iulebo exhibito: (nam asperissima hyems erat, ut
 viridibus viti non possemus.) *℞. syr. sceletyrbico nostri*
3 iij. aquæ cochleariæ 3 iij. aquæ bekabungæ. 3 j. misce
pro duabus dosibus. Fuit saepe reiteratum, cum con-
tinuo sumeret. Crura pannis lienis intinctis in
infra scripto fomento moderate calido, & expres-
sis inuoluebantur: mox panno laneo fasciisque
*inuolutis circumducebantur: *℞. rad. alibæ 3 iij.**
(& quia magna durities aderat) foliorum malue m.
iiij. flor. chamæmill. m. j. flor. meliloti, folior. abstin.
communis ana m. j. bekabungæ m. iij. coquantur in f. q.
aquæ communis, pro 3 b. vj. addendo aquæ bekabungæ,
cochleariæ an. 3 ij. misce. Hanc curationem ita pro-
sequebamur ad sex septimanas. Verum cum circa
talum & pedium ex scurbuto duritiæ tophaceam
quasi incurreret, accepi flor. meliloti m. iij. flor.
maluæ m. ij. decoxi in ceruisia crassiuscula, & cum
panno in ea intincto pedem inuoluebam. Cum
autem durities prædictis emollita esset: denuo fo-
fomento consueto superius scripto, ad finem cu-
rationis utebatur. Sed huic post longam fomen-
tationem, cum cûis rarior euaderet, vesicæ
exortæ sunt, instar bullarum: deinde subsequuta
est levis corrosio epidemidis, seu cuticulæ exter-
næ: à quibus materia calida humida emanabat.
 Ideo imperavi ut chirurgus vnguentum de ceru-
 sa supra pannum lineum induceret, ac cruribus
 apponeret. Quibus hoc symptoma facile curatū
 est. Verum & in Aprili mense, cum herbæ iam
 è terra prodirent, relicto iulebo, ad finem cura-
 tionis decoquere mandauit nastur. latifolium, be-
 kabungam, cochleariam, in ceruisia communi,
 quam perpetuo bibebat: & instar miraculi cum
 fotu superiori curatus est. Interim gingiuas
 abluebat quotidie cum aqua cochleariæ, beka-
 bungæ, cui aluminis parum incoctum erat:
 deinde syr. sceletyrbico nostro adiecto, parum
 ebulliendo. Quibus gingiuas confricabat. Hic
 absque missione sanguinis, cum in principio
 in hyeme essemus, ac debilis esset, egregie cura-
 tus est.

Eodem modo, & eodem fere tempore, Eli-
 dius pellio Delphenis, vicinus noster, scurbu-
 to quoque correptus est. Hunc bis purgauimus:
 sed à missione sanguinis abstinuimus, eo quod
 corpus cacochymum esset. Purgatio constabat ex
 decocto sene, cochleariæ, bekabungæ, & similibus. Her-
 bas autem dictas in sacculo colutas, & decoctas,
 cruribus ex fotu admouimus. Cum & gingiuas
 male

male olentes putidas mucosafque haberet, ac
 sanguifluas, & flaccidas: sequenti linimento ut
 sape confricarentur, mandauimus: *℞. saluæ ex-*
ficcatæ & puluerisatæ 3 ij. aluminis 3 b. cum succo co-
chleariæ, bekabungæ, & melle q. s. fiat mixtura. Qui-
bus gingiux confricatz, sanguine emanante tan-
dem persanatz sunt. Ad finem autem curatio-
nis similiter utebatur decocto cochleariæ, beka-
bungæ, nasturtij aquatici & latifolij, in ceruisia
 communi. Quibus remediis & hic sanatus est.

Quartus.

Nicolaus Volckerus, pictor, triginta octo an-
 norum, aut circiter, qui apud templum antiquum
 Delphis habitabat, in femoris sinistri scirrthosam
 duritiem incidit: quæ in maximam molem excre-
 uit: ita ut per totum autumnum præcedentem,
 ac hyemem subsequentem inambulare non pos-
 set: verum perpetuo sedere ac decumbere co-
 actus fuit; neque adhuc medici consilio vsum erat.
 Tantum ad vigesimum Februarij diem, anno
 1566. lotium ad me (ut fieri male consuevit à vulga-
 ribus) misit: postea vero & me vocauit. Crure
 autem inspecto quod valde liuidum ac purpu-
 rascens erat, & in tophaceam duritiem quasi
 concretum, ingentis magnitudinis spectabatur:
 illico scurbutum esse suspicatus sum: loco quo-
 que nigriusculo existente, & valde rubro. Sunt
 enim signa scurbuti remotiora, & communia
 aliorum morborum, quæ etiam Obseruat. præcedente
 muni est, corporis totius grauitas; Secundum, spon-
 tanea lassitudo, quæ tamen hebetiores non sentiunt, nisi à
 consueto exercitio. Tertium, præcordiorum aliqualis an-
 gustia. Quartum, crurum debilitas. Quintum, gingi-
 varum puriginosa rubedo ac dolor. Sextum, faciei color
 ex pallido in fuscum vergens. Hæc ubi coniunctim
 inueniuntur, scurbutum adesse indicare licet.
 Hic vero præter illa supradicta signa remotiora,
 etiam hæc propinquiora & certiora signa ade-
 rant: de quibus etiam mentionem fecimus præ-
 cedente obseruatione. Primum signum aderat,
 oris graueolentia. Secundum, gingivarum laxus san-
 guifluus tumor: gingiux enim inspectæ subrimide parum
 erant, ad liuidum suppurascens: meamque de scur-
 buto opinionem confirmabant. Tertium, dentes vacillan-
 tes. Quartum, crurum macule plumbeæ, purpureæ, ni-
 gris violis obscuriores. Quintum, lentigines innumera-
 biles griseæ, sine pulla: aut solum circas, vel sola crura
 superuenientia symptomata. Verum huic durities li-
 uida suppurascens (ut diximus) totum fini-
 strum femur occupauerat, à genu vsque ad coxam,
 dextro illæso, neque indurato: & dolor similiter
 finistram hypochondriam, seu minime effatu di-
 gnus, affligebat. Id magis in sinistro crure, per
 consensum (ut opinor) lienis frequenter euenire
 animaduerti: quanquam in Domino Assendel-
 phio, etiam in pede dextro idem conspexi: cui
 & hypochondrium dextrum duriusculum erat,
 non sine scirrtho hepatis. Cuius & antea memini.
 Verum, quod mirabar, in hoc pictore, licet fini-
 strum femur non solum duritie, sed & colore li-
 uido suppurascens infectum foret, in bra-
 chio quoque dextro liuor exiguus paululū supra
 cubitum apparebat, sine duritie tamen ac dolo-
 re. Sed quanquam fere semper in scurbuticis (ut
 antea diximus) coxæ vel tibiæ nigro quodam liuo-
 re suffundantur: brachia vero rarissime, quod
 se tantum semel vidisse Balduinus, amicus nos-
 ter, qui de scurbuto scribit mihi narravit: mihi
 tamen hæc tenus non semel, sed iam ter hoc vidisse
 contigit. Primo in agro illo, qui in nosocomio
 Delpheni decumbebat, de quo scholio præce-
 dente diximus, cui non solum crura, sed & brachia

Signa scur-
buti vena-
ria, & co-
muni alio-
rum morbo-
rum.

Signa pro-
pinquiora
& certiora.

liuore multo inficiebantur, etiam in ventre tum
 pectore stigmata illa variegata liuida subpurpu-
 rascens conspeximus. Secundo hoc animadu-
 erti in Cornelio illo Bokello, Ceruissario Del-
 pheni, sexaginta fere annorum: ut etiam eodem
 scholio recensimus. Hunc autem Ericius noster
 præ manibus habebat: huic quoque brachia liui-
 da erant. Tertio vero in hoc pectore brachia va-
 riegate conspeximus: verum minus quam in duo-
 bus supradictis. Sextum signum proprium scur-
 buti, est passio magis ingrauescente ambulandi impo-
 tentia. Septimum, anhelus difficultas, potissimum
 dum se mouent, aut erigunt: & si aliquandiu erecti se-
 dere conantur, quasi deficiente spiritu semianimes, deli-
 quio afficiuntur. Octauum signum est, quod rursus
 decumbentes resciumtur, ac respirant libenter: imo de-
 cumbentes se sanos assunt. Sed quia fieri non potest, ut
 sine omni motu decumbant, fit interdum ut delinquentes
 animo languent. Nonum signum est, quod in his va-
 rietate deficit appetitus, & frequenter cibum appetunt.
 Decimum est, quod obseruatur hic aliquando motus ali-
 quis aggrauationis: in pluribus quarto quinquoque die;
 in aliquibus, tertio die: in paucioribus, singulis diebus,
 sine tamen omni febre; aliqui, simul februnt. Sed hic
 ager febre cavebat. Undecimum, præserunt aliquan-
 do febres, quæ quasi per crisin in scurbutum terminare
 fuerunt. Hinc saepe post quartanas, ut iam exemplis
 ostendimus, vnde etiam talis scurbutus natus, con-
 tagione serpit in totas familias, & in tota mona-
 steria: dehincque in lethalem dysenteriam com-
 mutatus, ut Blienburchius ille, aliique doctores
 obseruauerunt, & nos quoque saepe animaduertimus.
 Aliquoties deficiunt subito ac mortali
 deliquio animi: sicut & pater prætoris supradicti
 obiit. Duodecimum signum quibusdam aliis per
 totum morbi decursum est conscripta, ac ad egerendum
 difficilis: contra aliis moderate sunt, ut Sebastiano illi
 Isbrandus euenit: ita ut in eodem non fuerimus vsi aliqua
 purgatione. Quidam & continuo ventris fluxui ob-
 noxii sunt: ut quidam diarrhoea corripiantur le-
 thali: quemadmodum euenit filio Iacobi Hee-
 mans Alcmariano. Alij & licentia corripuntur,
 ac moriuntur: ut euenit mercatori Comen Ru-
 chio, etiam Alcmariano: de quo alias dicturi su-
 mus. Hunc autem endemium aliquando mor-
 bum esse vult Ronseus noster ex aere patrio, vel
 aquis: aliquando epidemium & pestilentem, ex
 humida cæli constitutione. Sic enim cum anno
 1556. pluuia imbresque grassarentur, flante au-
 stro ac fauonio, insequente anno plurimos sce-
 letyrbe ac stomacace inuasit: atque ita inuasit,
 ut multos in vitæ discrimen redegerit. Similiter
 & anno 1562. Decimum tertium signum est, quod
 interdum maculosa illa crura sic intumescent, ut elephan-
 tia sin. Arabum suspicari possis: rursus vero aliorum crura
 sic attenuantur, ut nuda cutis deturpata ossibus affixa
 videatur. Aliis in molem accrescunt, dura & scirrthosa
 enadum: ut in hoc pictore: aliis ædematosa, ut in mu-
 liere, de qua ante dictum est: aliis varicosa, ut non se-
 mel conspexi. Nec mirum: quia etiam aliis morbis con-
 traria aliquando superueniunt symptomata, ut in pleuri-
 tide aliisque vsuenerit videmus. Decimum quartum
 macula aliorum in migras, aut pullas squamas resoluuntur,
 ut morphea & Græcorum lepra assolet: aliorum ve-
 ro lenes, æquales splendentes permanent, cum quodam ve-
 stigio ad impressionem digiti. Decimum quintum:
 item morientibus quibusdam delitescent macula, qui-
 busdam à morte vberissima efflorescunt. Decimum sex-
 tum: Conspectum etiam aliquando, licet perraro, vari-
 cosa venarum plenitudo. Id vidimus nos in Arnolda mu-
 liere Delpheni: & in alia virgine ac famula. Sic & sub
 tota lingua minutissimæ etiam venæ varicibus
 simillimæ,
 N n v

simillimæ, & similes in inferiori labio varices vi-
fæ fuerūt. Quod in Henrico illo zythepfa, (de quo
paulo ante diximus) etiam conspeximus. Ceterū in
hoc pſtore cum totum finiftrū femur durū eſſet,
ac gingiue ſubtumidæ (ut diximus) quæ ex ob-
ſtructione lienis eueniebant, ad eam tollendam
imperauimus inter reliqua remedia, vbi beka-
bungam & cochleariam decoqueret in ſua cerui-
ſia, nec alio potu, quam eo vteretur, etiam tem-
pore prandij aut cœnæ. Et his remediis infra-
ſcriptis paucos dies ſanus euasit, & ſimiliter à
cruris ſymptomate, magno cum meo honore. 20.
itaque Februar. hoc die decoctum primo præ-
ſcripſi: *℞. ſumiterra capill. ven. ceterach. agrimonia.*
bekabungæ, cochlearia (habebat enim has duas vl-
timas herbas virides apothecarius) *ana m. j. ſca-*
bioſe m. b. flor. cord. p. j. liquir. raf. ʒ vj. cort. rad.
cappar. ʒ iij. ſem. anif. ſemcul. carui ana ʒ j. folior.
ſenæ ʒ j. rhab. ſelecti. myreb. indor. ana ʒ j. vna. paſſ.
enucl. ʒ j. bordei mundati p. j. ſchenanibi ʒ j. co-
quantur in aqua communi, pro t̃b j. maneant infuſa per
noctem, colaturæ adde ſyr. ſceletrybici noſtri ʒ ij. ſyr.
ex infuſ. raf. ac cich. Nicoli, cum rhab. ana ʒ b. miſce
pro vrbis doſibus matutinis. Hoc decocto quotidie
ter quaterue multa melancholica fœtida excerne-
bat. Deinde 21. Februar. ʒ. olei anygd. dul. ʒ j.
olei iini, pingued. gallina ana ʒ b. cerui noſtri de am-
moniaco ʒ b. miſce pro ſumimento ſemoris. Lienem in-
ungebat oleo de capparibus. Poſtea 24. Februar.
cum nulla medicamenta ſumeret, ex vena ſalua-
tella in manu ſiniſtra (nam ea, quæ in brachio erat,
minus apparebat) ad vncias quatuor aut quinque
ſanguinem detraximus valde nigrum. Plus detra-
here non erat tutum, eo quod paulo debilior
eſſet, & quia æſtate præcedente ter quaterue,
cum ophthalmia laboraret, ex præſcriptio Hu-
gonis Nicuenij medici Haghani, ſanguinem
demifſiſſet: deinde Delphos veniens in ſcurbu-
tum inciderat. Sed quia nunc faciem ſubtumi-
dam habebat, quaſi cachecticus, parum ſangui-
nis, licet nigrissimi ac viſcidi, ad lienis obſtru-
ctionem tollendam, vrina quoque rubra & nigra
exiſtente, detrahendo mandauimus. A cuius de-
tractione bene ſe habuit. Deinde altero die ſe-
quenti hanc ſequentem purgationem exhibui-
mus: ʒ. conſect. hamech. elect. leniini ana ʒ b. di-
ſſolui cum iij. decoct. bekabungæ, cochlearia: addendo
ſyrup. de epihymo ʒ b. miſce. fiat potio: qua multa
melancholica pituitola, pauca vero biliola, dein-
de plurima aquea excrementa depoſuit. 27. die
Februar. à purgatione hoc ſequenti ſotu pro fe-
more uſi ſumus: flor. chamamilla. meliloti ana m.
ij. folior. abſinthij communis, folior. maluæ cochlearia,
bekabungæ ana m. ij. folior. artemiſia m. j. rad. alibæ
ʒ ij. cymini ʒ ij. conſuaſſata coquantur in aqua commu-
nis q. ſ. & in ſine adde acet. vini Rhenani optimi ʒ iij.
miſce pro ſomento, ad t̃b. iij. ſummo diluculo & hora
quarta pomeridiana ſomentabatur: mox vnguento ſe-
quenti femur inungebatur: ʒ. vnguentum ſuperius
deſcriptum: cui adde emplaftri de meliloto, vnguenti A-
grippæ ana ʒ b. miſce. ſcia intincta in ſomento
ſupraſcripto, expreſſoque, totum femur bene
cingatur. Quo remedio egregie crux ſanatum
eſt. Interim & hoc decocto, quod ſequitur in
principio Martij uſus eſt: ʒ. ſumiterra capill. ven.
agrimonia, ſcolopendria, bekabungæ, cochlearia ana m. j.
ſem. ſemculi ʒ j. folior. ſenæ ʒ vj. agarici ſemin. rhab.
ſelecti. an. ʒ j. zinzib. alb. ſchenanibi an. ʒ j. vna.
paſſ. enucl. ʒ vj. liquir. raf. ʒ b. coquantur in aqua
communi, pro ʒ iij. ſlent infuſa per noctem, mane
fortiſſimæ expreſſioni adde ſyr. ſceletrybici noſtri
ʒ ij. miſce pro duobus doſibus matutinis. Bene excre-

uit: & valde profuit. Sed quia circa lumbos
nonnihil dolebat, eos vnctione ſequenti inungi
mandauimus: *ʒ. pinguedinis gallina, olei anygd.*
dulc. olei anethini, roſacei, mucilag. alibæ extrah.
cum aqua maluæ an. ʒ b. miſce pro linimento. Inter-
rim cum vitium gingiuarum exiguum eſſet, ſta-
tim à purgatione loco decocto bekabungæ &
cochlearia perſanatum eſt. Alioqui ad fortiora
deueniſſem: quale hoc eſt: ʒ. balauſt. aluminis de
pluma, ſciſſilis ditti, an. ʒ ij. myrba. goliſam, maſti-
chis an. ʒ b. fiat pul. pro gingiuis inſpergendis. In vl-
ceribus gingiuarum & ſanguifluo fluxu frequen-
ter eo uſi ſumus.

SCHOLIA.

DE cauſis ſcurbuti procatarcticiſ, in viraque
Obſervatione præcedente ſatis diximus: ſimili-
ter & de ſignis: & etiam de cauſis proegume-
nis, & coniunctis, quæ à procatarcticiſ gene-
rantur; potiſſimum Obſervatione octaua. Sed vt
hæc omnia in compendium contrahamus: Pri-
mus morbus aſſignatus fuit in eadem Obſerva-
tione, obſtructio lienis: huius cauſa proegumena
eſt, vel antecedens, primo hepar, copioſe generans
humorem melancholicum, vt retulimus: ſecundo, hu-
mor melancholicus, in meſarcticiſ præcordiſque redun-
dans. Cauſa continens eſt idem humor melan-
cholicus, lienem iam inſarctus, vel copia, vel
craftitie ſua obſtructionem ipli viſceri aſſerens.
Secundus morbus aſſignatus fuit, multitudo hu-
moris melancholici. Huius cauſa proegumena &
continens, primo hepar generans humorem melanco-
licum: ſecundo obſtructio lienis. Tertius morbus
aſſignatus fuit, intemperies inæqualis: quæ ſi fuerit
ſine febre, cauſam principem & continentem
habet frigidam & ſiccā: ſi vero cum febre, ca-
lidam ſeu aduſtionis participem, & ſiccā.
Quartus morbus aſſignatus fuit, gingiuarum vlcus:
huius cauſa proegumena & continens eſt arius
ſubtiliorque materia peccantis portio, quæ vel à natura
criticante, vt ſic dicam, vel à calore ſurſum ſu-
blata, loca tenera humidaque facilius corrodit.
Quintus morbus aſſignatus fuit crurum mala diſ-
poſitio: huius cauſa proegumena & continens eſt
humor melancholicus craſſus, magnitudinem augens &
motum impediens; vnde crura maculoſa ita intum-
meſcunt, vel elephantiaſin Arabum quiſpiam
eſſe opinetur: huiusmodi autem magnitudo au-
cta cauſam habet intemperiem crurum, ex hu-
more præſente factam, & ſentem inuicem, eo
prius confluxam: poſtea debilitatum membrum
facilius recipit, & ſua ponderoſitate eo depelli-
tur. Item antecedentem habet cauſam ex ſupe-
riorum intemperie, & humorum multitudine.
Magnitudo vero crurum dimiſuta, cauſam ha-
bet atrophiam, atrophiam autem, operationes
ablatis ſequitur. Summa ſummarum cauſa prin-
ceps ſeu proegumena, atque adeo fere coniuncta
ſcurbuticæ paſſionis, eſt humor melancholicus,
id eſt, multitudo ſeculenta bilis atri in hepate cum
ſanguine procreata; aut putidus ſanguis ex prima atque
puræ viſtus ratione procreatus. Quod ad ſigna atti-
net, ea iam diximus. Et quod ad indicationes
curatiuas, primus morbus tollitur aperiſione, quæ
per ſubſtantiā atque abſtergentiā perficitur. Secundus,
videlicet multitudo tollitur partim intentione
curatiua, videlicet euacuatione erus quod iam factum
eſt; partim præſeruatua eius quod fit: idque bi-
ſariam; primo prohibendo, ne talis humor am-
plius generetur, quod fit per curationem intem-
periei iecinoris, & per ablationem cauſarum proca-

Cauſa pro-
egumena &
continens.

Syrupus ſce-
letrybici.

Indicationes
curatiuæ.

procatarcticarum; ſecundo, prohibendo ne re-
tineatur, ſi quid forte iterum genitū ſit: quod fit
per meatuum reſeruationem, & per ſplenis con-
fortationem. Ita prohibitio retentionis dupli-
cem præſtabit uſum; nempe præſeruatium in
hoc ſecundo morbo, videlicet multitudine: cu-
ratiuum in primo morbo, videlicet obſtructione
lienis. Tertius morbus, videlicet intempe-
ries, tollitur partim intentione curatiua, vide-
licet correptione facta intemperiei per contraria, par-
tim intentione præſeruatua ſimilis adhuc intem-
periei: idque biſariam, primo per ablationem
ſuæ cauſæ nimirum humoris multitudinis, quod
fit partim euacuando, partim aperiendo, partim
diætā attenuante, & boni ſucci; ſecundo per ro-
borationem viſcerum. Ita ablatio humoris du-
plicem & ipſa uſum præſtabit; nempe curati-
uam in ſecundo morbo, videlicet multitudine;
& præſeruatua in tertio morbo. Sunt igitur
quatuor intentiones: aperiſio, euacuatio, alte-
ratio, confortatio. Euacuatio debetur primus
locus, quæ partim vniuerſalis, partim particu-
laris eſſe debet. Secundus locus cedit aperiſioni:
deinde repetetur aliquoties euacuatio. Tertio
loco ſuccedit alteratio, quæ etiam corroborati-
onem ex parte exſequitur. Nam corroboratio-
nis quoque eſt, debilitatem membrorum ex in-
temperie propallare. Priuatim tamen magis ex-
ſequitur viſcerum indigentiam, nempe lienis,
hepatis & ſtomachi. Quo modo hæc particula-
tim, tum aliæ indicationes perficiantur, ad lon-
gum diximus Obſeruat. 11. præcedente; & iam
quoque exemplis multis oſtendimus: vt non
opus ſit eadem hic reſcitare. Ideo qui de ſcurbu-
to morbo plura deſiderat, quam hic ſcripſimus,
Balduinum Ronſſeum, amicum noſtrum le-
gat. Verum quoniam hic frequenter mentionem
fecimus ſyrupi ſceletrybici noſtri, quem nos pri-
mum in uſum deduximus, is hoc modo paratur:
ʒ. ſucci cochlearia, bekabungæ ana t̃b iij. zacchar.
optimi t̃b ij. cum oui albumine depuretur, coquantur ſi-
mil; colat. & ſat ſyr. ſecundum artem. Non deſunt
nunc & alij quidam, qui ſyrupum faciunt ex
radice raphani. Quidam ſyrupum ex ſolo ſucco
bekabungæ parant: ſed mihi non ita placet,
cum & cepæ, quæ ab aliis bekabunga dicitur
aquea ſua, qua pollet, humiditate, excreſcen-
tia lienum potius materiam ſuppeditet. Ideo &
Ronſſeus, in libello ſuo perſtringit eos, qui ſo-
lius decocto bekabungæ, id eſt, cepæ, ſanita-
tem ſcurbuticis pollicentur: quo illa nihil alie-
nus eſſe dicit, vt pote cum aquea ſua humidita-
te, excreſcentiam lienum, ſi intro ſumatur, au-
gere ſoleat. Ad oris certe & gingiuarum ablu-
tionem admittit, cum particeps alicuius adſtri-
ctionis ſit; vnde & gingiuas firmiores quodam-
modo reddit, atque atram illam bilem ſua hu-
miditate reſtenat ac compeſcit. Cum cochlea-
riam intus aſſumptam, quæ vim habet deter-
gendi aperiendi, vt eius acrimonia declarat, uti-
liſſimam eſſe experior; ſi nempe bekabungæ
ſuccus cochlearia addatur, quæ ſua tunc adſtri-
ctione leui lienem roborat, & caliditatem co-
chlearia reſtenat. Hinc cum tanta utilitate hoc
noſtro ſceletrybico ſyrupo uſi ſumus, vt etiam
nunc à Brabantinis medicis, & Flandricis expec-
tatur: vt maximam copiam huius ſyrupi pro
amicis annuatim conſici iubeamus. Mitimus
etiam aliquando integras libras huius ſyrupi
ad Liuinum Sanderium, reipubl. Gandenſis me-
dicum, amicum noſtrum ſingularē: cum quo
vna in eiſdem ædibus Bononiæ in Italia diu ha-

bitauit. Eſt autem hæc herba apud nos valde
frequens. Conſicimus & ex ea conſeruam val-
de vtilem. Balduinus autem cochleariam Tele-
phium eſſe exiſtimat, quæ & Telephi opera
indigeant: vnde de ſcurbuto cap. vij. de vlcere
ſceletrybico agens, vult hanc cochleariam
Telephium Dioſcor. eſſe, Britannica, qua uti-
tur Plinius ad ſtomacacem & ſceletrybici, cum
nondum intumuerit, eius loco vtitur Ronſſeus
biſtorta, quæ Britannica facultatibus plane
reſpondet: nam & vim adſtringentem habet, &
ad oris & tonſillatum vlcera depaſcentia ac-
commodata eſt. Habemus autem & multa alia
remedia experta: quale hoc compositum medi-
camentum eſt: *ʒ. plantaginis, biſtortæ ana m. j. roſ.*
rubr. ʒ ij. aſiſoloch. rotunda ʒ i b. myrba ʒ j. indis
ʒ j. aluminis ʒ ij. coquantur in t̃b ij. vini rubr. ſtipici
ad dimidiū: in olla ænea exprime: colat: adde
mellis roſ. colati, diamomonis ana ʒ i b. miſce. Reliqua
vero apud Ronſſeum videas. Poſſem & hic in-
ſinitas hiftorias adferre eorum, qui à me curati
ſunt: ſed exempla iam ſupradicta ſufficiunt. At-
que ita pleroſque omnes, aut præcipuos ſaltem
morbos ac affectus lienis reſenſimus. Laborat
præterea lien interdum palpiſatione, & dolore
punctorio, quem multi ſentiunt poſt curſum; &
tunc de punctione in loco lienis conqueruntur. De palpiſa-
tione & pū-
ſione in
liene poſt
curſum.
Dolor autem iſtenon eſt punctorius, alioqui ad
membranam lienem ſuccingentem pertineret.
Sed eſt potius pulſans dolor, de quo dolore nos
in Schol. Obſeru. 7. De lienis dolore, ſtatim
in principio egimus. Et eiſmodi dolor pulſans
quando vehementior eſt, contingit in inflam-
matione, ob multitudinem & magnitudinem ar-
teriarum in ipſo liene exiſtentium. Atque hic do-
lor pulſatilis palpiſationis inſtar, pertinet ad
arterias. Ex curſu igitur facile inſatur lien, ob
arterias: & ſentitur quaſi palpiſatio vel pulſatio,
propter motum arteriarum in ipſo liene inſerta-
rum. At vbi paululum homo quieuerit à curſu,
facile ceſſat illa palpiſatio, ſeu pulſatio. Quare
nec medici de ea vllam mentionem faciunt, niſi
dolor ille continuo pulſans manſerit, vt in in-
flammatione lienis contingit. Sed cum talis af-
fectus non ſit eſtatu dignus, non putauit opera-
pretium, vt de eo obſervationem aliquam pecu-
liarem conſcriberem. Hanc etiam ob cauſam fal-
luntur vulgares, qui nugantur curſoribus ma-
gnatum & Principum lienes exciſos eſſe; & ob
id eos velocius currere poſſe. At recte dixit
Benedict. Veronenſ. medicus doctiſſimus, 2.
lib. 2. de partibus corporis humani cap. 12. de liene:
Curſoribus, vt traditur lien peculiare impedimentum,
propterea quandoque nonnullis laborantibus ſplen inui-
tur. Adimi poſſe homini ſine vira periculo, veriſimi-
le non eſt. Et bene Galen. noſter nullam humani
corporis partem ſine munere aut naturali vti-
litate, ſatis ſuperque egimus in princ. lib. 19. in
praſat. ad lect. Quamobrem & hoc viſcus non
minus quam reliqua alia cuſtodiendum eſt, ne
vllō modo afficiatur; atque etiam omni cura, vt
cætera membra, potiſſimum interna, ſanari
debet.

Sic itaque hunc librum de affectibus lienis
finire decreueramus, ad meſenterij vitia, cum
ſæua inteſtinorum tormenta tranſeundo. Ve-
rum nuper ad me doctiſſimus Henricus Bra-
Reipub. Campenſis medicus, epiſtolam ſcripſit
de morbo quodam incognito, proxime ad ſcur-
butum accedente, quoad membra, quæ exte-
rius læduntur, longe tamen aliter, quam in ſcur-
buto,

buto. Operæpretium igitur duxi, epistolam illam ad me scriptam hic inferere, antequam ulterius progrediamur, quæ ita habet.

EPISTOLA HENRICI A BRA,
Reipubl. Campenl. medici.

De morbo quodam nouo & incognito, Vespthalis, Geldris & Frisii quasi endemio; quem illi (die Baren) vocant, diuersis symptomatibus egros infestante.

CL. V. D. D. PETRO FORESTO
S. P.

Non dubito, Clarissime Foreste, quin ex postremis meis literis intellexeris, de reditu meo ad Campenses. Iam biennium est. Toto eo tempore nihil quicquam à te litterarum vidi. Sed ignosco tibi propter commune bonum; nam suspicor, te totum nunc esse edendis tuis observationibus & Curationibus Medicinalibus. Facit Deus, ut feliciter, quod præ manibus adhuc est absolutum. Mihi nuper carmen in libros tuos de pectoris & pulmonis affectibus: sed quia non est additum, puto serius allatum. Nunc ne omnino asymbolus ad te veniam in tibi, quod data occasione inferas Observationibus tuis, si placebit; sin minus, concipias. Legenti mihi nuper locum Galeni, qui est in libr. 6. locor. affector. cap. 3. Vbi agit de Dracunculis, in quodam Arabia loco in tibiis hominum natis, venit in mentem morbus nobis vicinisque Vespthalis & Geldris quasi endemius pluribus quoque familiis hereditarius, populari lingua (die Baren) dictus. Hic se prædit cum vagis doloribus, valde excruciantibus, in omnibus corporis membris, potissimum in dorso & lumbis, primumque vnam aliquam solet inuadere particulam deinde celeri motu & discursu vicinas quoque partes occupare. Si quidem videre est, ut in hac lue sopitis doloribus pedum illico scapulae afficiantur; illis tranquillis è vestigio manus eruantur; ac ita per omnes artus malum ipsum diffunditur. Unde etiam cum Epitheto (die loopende Baren) nominant. Plerumque tamen vnam aliquod membrum, quod per intervalla excruciat, obdure compertitur. Dolens speciem statuit ipsi egri excedentem corroden-temque qui Vermiculum, nuscenos & alias partes subito ac nonnunquam momento, variis simul locis permeantem depascentemque arguere videtur; ab inseparabili proprietate ipsius morbi Etymologiam deducentes: si quidem (Baren) patria lingua singulare quoddam lumbricorum genus denotat. Morbi huius due statuuntur differentiæ: quarum prima cum tumore circa articulationes copulatur; qui ubi diu persuerat, profert tandem plerumque maculas & liuras, scurbuti notis non valde dissimiles, quæ interdum suppurata in vlcus conuertantur malignum, in rimis circa pedes, ex quo Vermiculi instar ascanidum educi videntur. Interdum quoque tota materia vnam in partem aliquam decumbit: unde, corpore toto doloribus liberatur, abscessus excitatur, qui in fistulam malitiam definit. Altera differentia est absque tumore: sed tamen priore participat dolore. Hæc interdum peculiarem habet corporis maciem, & quasi marasmodem, cum aliquali articularum impotentia coniunctam. Virique commune est, quod dolores noctu magis exacerbantur. Febris autem lenta aut nulla comitatur. Alius in pluribus adstrictior. Urina non admodum discrepat ab urinis sanorum; nisi quod interdum Vermiculi, instar illorum, qui è putridis caseis prorepunt, in fundo matula innatare sicut & alii excrementis misceri, videntur; estque hoc illis certissimum iudicium huius morbi. Cibum alij semper bene appetunt, alij cum emmo respuunt. Hæc variant iuxta humoris peccantis & corporis affecti diuersitatem.

Causam morbi statuunt in omnium humorum ichoribus, non quidem vno in subiecto coniunctam, sed pro cuiusque temperamenti varietate. Quicquid sit id, quod hanc lue causare possit, certum est materiam esse tenuem & turgidam, non eam quidem simplicem, sed alicuius virulentia malignitatisque participem. Mixture morbo statuunt nervosum genus, per quod humor ille subtilis & malignus diffunditur. Idque his potissimum incidiis confirmant: tum quia in dorso ac lumbis propter substratam medullam valde luxuriat dolor, nam quod facultatis motricis actio leditur; denique quod à confirmantibus respicientibusque nervos iuvantur hac lue infecti. Ad curationem quoque latinet simul ac aliquem hac lue affici contingit, protinus ad certam quædam alexipharmacam seu Bezoartica medicamentum, nulla corporis vel humorum præmissa preparatione, sine ulla methodo vel ratione prescripta, pro regionum diuersitate, incolarum observatione & experientia, decurrunt. Inter alia commendant, tanquam presentissimum remedium, lumbricos terrestres maxime quorum collum annulis & cingulis cingitur, quos diuersimode cum superstitiosa etiam numeri observatione preparant. Alij talpam viuan in ollula comburunt, donec in cinerem conuertatur: de hoc pulvere exhibent cum ceruicia aut vino, diebus aliquot, crescente Luna; & itidem in eius defectu. Alij speciem totius curationis ponunt in exhibitione venenosi cuiusdam vermis, quem patria lingua (Meyvurm) vocant, Itali Cantarello nominant. Alij alia huiusmodi vehementia & virulentia remedia propinant, quibus curationem pollicentur: ut sunt oua pavonis; solanum somniferum, ossa sturionis dicti piscis. Noui qui extractis eule & hellebori videntur. Sunt qui ex salvia, ruta, betonica & aliis huiusmodi herbis nervos respicientibus potiones faciunt: quibus lumbricos terrestres vino prius ablutos, dein confusos, & per setaceum traiectionem admiscunt: aut etiam circa eorum admixtionem exhibent septimanas aliquot: semper operam dantes ut ab assumpta potione sudor prouocetur: quod cum primis in hoc morbo utile prædicant. Rectius faciunt, qui vacuato primum corpore; sequenti haustu vel apothemate laxatiuo potione inscriptam propinant. Haustus talis esto. ℞. pul. senæ solut. 3 ij. infunde horis 12. in aqua beton. 3 iij. à forti expressione, add. diacartham. 3 ss. vi. siat haustus. Apothema tale esto. ℞. rad. polypo. querc. 3 j. salvia, beton. ana m. j. scabios. ruta, abrotani ana p. j. sem. anis. citr. an. 3 ij. passul. munda. 3 ss. cog. in aqua lb ij. ad remanentiam medicamentis: admiscendo in fine colitionis folior. senæ Alexad. 3 x. stent in infusione per noctem, hinc liquor à forti expressione clarificetur: cumque eo per colum transtmittantur lumbrici vino abluti numero nouem: Zacchari quantum placet, ad conuersionem; ter in die sumat egrotus. Potionis forma talis esto. ℞. rad. succise 3 j. aristoloch. rot. 3 iij. salvia nobilis, beton. ana m. j. abrot. ruta, vinca peruinca, sabina ana p. j. cog. in aqua sumi. ad consumpt. medietatis: cum huius decoct. expressi 3 iij. pro vice traiciantur lumbrici terrestres, circuli in collo insigniti, vino prius abluti, & triti, num. v. deinde misce iheriacæ electæ 3 ss. pul. cinnam. 3 j. Zacchar. q. placet, exhibeatur mane calide, & corpus contegatur ad sudorem. Repetatur potio hæc diebus aliquot continuis. Cura huius morbi aliquando in septimanas plures extenditur. Quod si vnam aliquam in partem virus pro. umbat, & abscessum exciter: is ut aperiat, plantaginem cum sale in mortario confusam applicant, abscessu aperto, vnguentum ex radicibus cicute aquatica conficiunt, quas lino vel strappa malida involutas sub cineribus coquunt, & confusus cum melle miscent in formam vnguenti (putantque Vermes dulcedinem mellis Attici & cicute virulentia interficere) indeque applicant. Alij cataplasma ex radicibus sigilli salomonis, cum aqua vel ceruicia component: cui quandoque

que radicem filicis quercina miscent. Noui nobilem matronam, quæ inspergebat puluerem de talpa, combusta, ut supra.

Habes breui, doctissime domine Foreste, Luis tam virulentia descriptionem, partim ex Caspari Hoffmanni medici Brandeburgici, partim ex meis observationibus consarcinatam. An veteribus hic morbus cognitus fuerit, & quo nomine, ex te, pro ea, quæ es doctrina, & humanitate, data occasione scire desidero. Ego omnino nouum morbum existimo, nec quicquam cum Græcorum Draconis aut cum Barypalia ventositatis perambulante communicare: multo minus arthritidem ex tenui materia ortam dixerim. Bene vale, & ut clarissime & me, ut incepisti, amare perge. Ignosces quod prolixior fuerim. Si quid habebis ad me litterarum, Melchiori Vintages huius aliquando Reipublica Monetarij filio, nunc apud vos censisario ad intersignium Ciconie, committes. Iterum feliciter vale. Campis ex Museo nostro, die 20. Aprilis, stylo veteri, Anno 1594.

Tua dignitatis studiosissimus.

Henricus Bra, D. Reipubl. Campenlis Medicus.

Clarissimo Viro.

D. D. HENRICO A BRA.

S. P. D.

Litteras tuas, doctissime D. Doctor accepi, simul & historiam illam de morbo quodam incognito, de quo iudicium nostrum expectas. Vellem equidem voto tuo satisfacere, & quid certi de hoc malo in medium adferre, præsertim cum issemet dubitem, quantum ad signa attinet, quæ doctè à te explicantur, dracunculum esse. Scio equidem Galenum de dracunculo mentionem facere lib. 16. de loc. aff. cap. 3. qui in Arabia quodam loco (ut referunt) in tibiis hominum dracunculi vocati nascuntur, nervosa natura colore crassitudineque lumbricis similes. Tamen Galenus eodem in loco ait, multos auduisse qui sese vidisse dicent: ipse vero ingenue fateatur, se nunquam vidisse. Idcirco se neque de ortu, neque de essentia ipsorum exacte conicere posse refert. Ita & ego, ut veritatem proferam, hoc genus morbi (quantum Anno 1595. mense Martio instante quinquagesimus agitur annus, quod medicinam fecerim) nunquam vidi: neque quicquam nominari audiri, nisi te, qui dracunculum videri; modo idem sit malum, de quo Arabes (cum in Arabia fiat) forte scripserunt. Conferam tamen de hoc morbo cum viris doctis. Interea remedia, quibus vulgus ad hoc malum depellendum & extirpandum vitur, de quibus scribis, licet ea ipsa varia sint ac diuersa: tamen ut mihi videatur, mere empirica, & sine ratione & methodo tam inuenta, quam usurpata videntur; quamvis ea ipsa, quæ tu adieci, multo meliorem rationem sequantur: & ob hoc mihi magis placent. Non ego tamen, aliquando experimentis nos contentos esse debere, ubi ratiocinatio locum minus habeat. Recte tu quidem facis, quod nostra studia promoueas; & gratias maximas tibi habeo, quod nunquam asymbolus ad me venias. Historiam hanc addam Observationibus meis post scurbutum malum. Interea vnicuique liberum relinquemus de hoc morbo suam adferre sententiam. Vale rapim Delphis 15. Maij, Anno 1594.

Petrus Forestus, Reipubl. Delphensis Medicus.

Cum hanc Epistolam D. Henricus à Bra mihi remisisset, vna cum epistola D. Iohannis Heurnij V. Clar. Medicinæ in Academia Lugdunensi Professoris celeberrimi, nostri amici dilectissimi, ad eundem D. Hen. à Bra scripta: placuit eandem hic in gratiam studiosorum adiungere. Illius enim viri iudicium plurimum apud me semper valuit: licet, ut antea quoque ingenue fallus sum, nouum hunc morbum nunquam viderim, quamvis hoc mense Martio artem medicam 50. annis exercuerim.

I. Heurnius.
D. D. HENRICO A BRA
salutem dico.

Clarissime ac ornatissime D. Doctor, pergratam mihi fuisse tuæ literæ, & ob argumentum, & ob amorem in me tuum. Hic facis, ut tibi, quantum in me est bene velim: illud, ut te maximi faciam, qui tam accurate perpenderis atrocissimum, quod apud vos grassatur, symptoma. Vt nam cuncti naves iactant hoc agerent, ut singuli, qui singulis populis Endemij ac inquilini sunt morbi, ita examinarent, ac patria usque deprehensa remedia proderent ad illa mala. Quod de dracunculis quæris, idem mihi morbi genus olim valde monstruosum legenti visum fuit, dum viderem, Galenum id genus morbi nunquam vidisse nec eius causam intellexisse, sed in quodam Arabia loco vagari asserere. Scribit etiam Iulius Pollux in Aethiopia (& maxime, ut scribunt alij in regione ad mare rubrum) dracunculum existisse, qui crura hominum & femora edebat: Aethiopes solos fere, inquit, exercens, raro aliis molestus. Adest hic vlcus, cui eminet quid nervosum putridum. Et dubitantem notabam Aeginetam 4. lib. cap. vii. num sint animalia, vel eorum solam ideam præ se ferentia. Nam Auicenna titubatur valde de horum specie. Iurarem fere Aetium animal id fuisse existimasse: idem de Rhafe dixerim. Sed Soranus Ephesus medicus sectæ methodicæ, qui Galeni temporibus vixit, cuiusque scripta Cælius Aurelianus latina fecit, negauit dracunculum animal esse, sed tenuis cuiusdam nervi, qui medicis & agris motu quodam cieri videtur, sub cute condensatorem. Manardus hoc nasci ait ex vredine succi crassi. Gorraus negat, nos de his iudicium posse ferre, quod nunquam occurrat. Auctor definitionum medicarum & Guido, ad varices referunt. Quid tandem dicas? rem incertam. Quidquid sit, timor est tibi occupans colore ac crassitudine lumbricis similis: hoc est teres & longus. Nonnunquam puto protendi illum tumorem in obliquum & in anfractus irabi, ut dracunculorum imaginem præ se ferat. Sed patrius ille tuus Varen locum mutat, quod resedit, maculas adfert. Causam quam tu scribis eandem & ego puto esse, orgasmum succi venenosi, tenuisque ac adusta pepasimique expertis bilis flatulentiæ. Vtriusque tale quid patitur etiam, vocant (die springende Bicht) quasi articulare dicas insipientem dolorem. Ita cuique fere regioni sua sunt & mala & bona. Illi qui Americani antegere nuper littus, ibi familiare obseruauit malum Ton dictum, quod digitos pedum, pediculi animalculi idea excedit, sub vnguibus se insinuans, ac in granam conuertit, oleo rubro ex fructu succurrunt. Sic referunt Aretæus & Lucretius elephantiasin morbum Aegypto vernaculum existisse, Podagrus Athenis, in Achaia ophthalmias. Erat etiam huiusmodi morbi genus Leucophegmata, quam narrat Aethiopes, in epistolis Græcis Philocrati, se vidisse in cunctis, qui in Delo insula habitabant, qui vultus & capillos albescentes habebant, collo & pectore intumescabant,

sumebant, sine febre, sine dolore illo, nec inferiores partes quicquam immutata fuerant. Atque hac Apollinis ira sibi euenisse putabant. Nos fuga capta nocte au fugimus, nos ipsos inter abeundem percunctantes, an quisquam colorem & pilos quos domo gestauerat, haberet. Refert enim Caelius Aurelianus, huiusmodi etiam morbum Romae interdum existisse. Veteres hos morbos Inquilinos vocabant. Quin mala quadam morbifica se toto orbe spargunt: inueniunt illa Veni ex nouo orbe profecta argumento est, & maxime fuit. Quin peculiaris quadam ac inuisa mala homine interdum occupant: adeo ut recte scripserit Celsus, monstra in medicina cernere. Audi quæso, doctissime D. Bra, Crateri summi medici meministi Cicero in epistola quadam ad Atticum, de Attica tunc ægrotâ loquens: Commouet me Attica, etsi assentio Cratero; & Horatio in Satyra tertia, secundum libri. Non est cardiacus, Craterum dixisse putato. Hic æger. Et Persius: Sed quid opus Cratero magnos promittere montes? Huius Crateri seruus in nouum inauditumque morbum incidit: idemque admirabili quadam curatione sanatus est: ut memoria prodidit Porphyrius Tyrinus in primo libro *ἑξ ἑκαστοῦ παθήσεως*. Cum huius caro discessisset ossibus: nec medicamentis quicquam profici potuisset, Vipera, piscis in morem conformata, deuorataque ab eo liberatum eum ipso morbo narrat. Ita namque carnem ossibus hæere cepisse, ac conglutinata esse. Scribit Iosephus decimi sexti Antiquitatum octauo, Herodem Magnum, Antipatri filium in æterno aestu flagrasse, quam tamen foris posita partes non sentiebant; iamque illum in perpetuos cibos coquebat, pendendorum sector aderat cum satyriasi Vermiculosa. Balnea naturalia, & illa ex oleo, hunc non iuuauerunt. Tanto tadio effectus, ut tandem cutillo sibi manus intulisset, nisi ab astante cognato ictus exceptus fuisset. Mirum etiam, quod refert Plutarchus libro De Claris Mulieribus, capite undecimo, ubi de morbo, qui inuaserat Virgines Milesias, cuius nullum remedium, inquit, poterat inueniri. Fanatici eam quandam contagionem ab aere infusam putabant, quæ eas in insaniam abigeret, adeo ut mortis cupidine tabe, seipsas strangularent. Tanta, inquit, mali erat calamitas, ut neque parentum lacrymæ, neque amicorum monitus, aliquid remedij attulerint huic malo; tantaque erat furoris immanitas, ut omnem custodientium diligentiam superaret. Nullum mali huius remedium inuentum, ante quam decerneretur, ut Virgini, quæ sibi mortem consciuissent, per medium forum nuda cadauera efferrentur. Et res Virginum furor non solum compressit, Verum etiam sedauit & exstinxit. Tantum ignominie metus valuit, ut quas humorum malorum grauisima mors non auerterat ab instituto, turpitudinis species commouerit. Mirum si ab aere hoc illis euenit solis. Scimus ab aere miasmatis fœdato, & ab eo, qui propria substantia corruptione infectus est, monstrosa non raro vitia pullulare. Scribit Ammianus Marcellinus libr. 23. historie sue, monstruosam rem. Post hanc, inquit, Seleucia, ambitiosum opus Nicanoris Seleuci, quæ per duces Veri Cesaris expulsa, auulsum sedibus simulacrum Comæi Apollinis, perlaturumque Romam in ade Apollinis Palatini decorum antistites collocarunt. Fertur autem, quod post direptam hoc idem figmentum incensa ciuitate, milites fanum scrutantes inuenere foramen angustum, quo reuerato ut pretiosum aliquod inuenirent, ex adyto quodam concluso à Chaldaeorum arcanis labes primordialis exsiliuit, quia insanabilem ut concepta morborum, eiusdem Scueri Marci Antonini temporibus ab ipsis Persarum finibus ad usque Rhenum, per Gallias, cuncta contagies polluebat & moribus. Hæc ille re & verbo monstruosa. Ita quadam mala se spargunt toto mundi theatrum: quadam rursus angulo aliquo mundi habitabant, raroque in alias regiones migrant. Hoc de dracontis proficere scribit Pollux, ubi ait, *καὶ τῶν ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἐκπορεύεται*.

Αἰσίοι δὲ ἐκπορεύεται. Frustra ergo ad aliena conamur, sæpè reuocare mala nostra. Sunt certa vitia, certæ terrarum parti, membrisque hominum certis, auctore Plinio, vel ætibus & etiam fortunis: tanquam malo eligente, hæc proceres, illa pauperes sentire. Hodie in Siria & Carintia, ob aquas metallis tinctas, homines struma ac bronchocele voce fere priuantur. Ante Pompei tempora, Elephantasin non nouit Italia. Carbunculus Narbonensis provincie familiaris: & primum in Italian, venit L. Paulo, & Q. Martio censoribus. Mentagram ante Tiberij principis tempora Italia non vidit. Genuis morbus olim grassabatur, iam esse desuit. Ita noua interdum exsplendescunt in nobis, alia in nobis desinunt. Ita Pæren. Transluanis peculiarem dicemus? Sed ne *ἀπορροια* Curatim sit epistola hæc, te scire velim, optimum quoddam remedium ac *ἐν μέσῳ* nuper ad me venisse. Accipimus radicem ellebori albi crassiuscule confusam seminiam; folia indimus, ac affundimus vini Hispanici, quod Petrus Semenius vocatur, libram. Solibus assinis exponimus. Damus cochlearium vini. Valide vomitum mouet, nec affligit admodum. Interdum semicochlearium miscemus cum aliis laxantibus: præclare abducit aluum sine vomitu. Quin linthibus, in empyemate guttulas aliquot miscemus, ac copiosissime expectoratum moueri hinc videmus. Sed quid tu interim? quin pergis in lucem, quæ methodo solebas, simplicia morbis peculiariter dicata proferre? Ego totus in Hippocrate vertendo & breuib commentariis illustrando sum; sed vereor ne, antequam amphora exierint, Vita mea ut in Alexidis versus est *καὶ τῶν ἑκαστῶν*. Quod summo Deo, Iesu placuerit fiat: facilis iactura scripti nostri. Interim subsistis horis, particulares exercitationis scribo. Quas de capite nuper dedi, ac nobilissimis ordinibus Hollandia & Vestphaliae dicauit. Vale, ac me ama. Vollensem medicum si nosti, admoneas quæso, ut interdum ad me aliquid literarum mittat, ac dicas, si aliqua re ibi opus sit, quæ apud nos mea in manu, graue mihi fore, si non consecero. Is enim prope sanguine iungitur uxori meæ, cuius auus maternus erat Gerardus Lysius, magni Erasmi in studiis socius, illique amicissimus. Anno MD. IX. XCIV. die V. Maji.

CVRATIO LXIV. LIB. VI.
apud AMATVM.

In qua agitur de Dracunculo in tibia nato: quem Arabes Venam Medenam appellant.

ÆThiops maris præfectus, seruus iuuenis 18. annorum, cum primum, ex Memphi, Egypti celebri ciuitate, Thessalonice aduectus esset, illico de cruris dolore conuulsus est, in quo iuxta talum primo vlcus excitatum est, in quo venæ modo caput conspiciebatur. Quod aduerterentes Turcæ morbum cognouerunt: periculosumque esse in Egypto & India, ac reliquis regionibus quibus innascitur, significarunt, quem Arabes, præcipue Auicenna, venam medenam fen. 3. lib. 4. appellari tradit: veluti Abinzoar, & cæteri huius doctrinæ homines, quibus morbus hic satis cognitus & familiaris erat, pro cuius curatione acceptus medicus Parahyas, linguæ Arabicæ doctus, ita orsus est. Primo debita victus ratione propostâ, patiens extremum Venæ, aut verius nervosæ cuiusdam substantiæ, subtili ligno alligauit, quam paulatim ligno traheret, rotabat-ve, adeo, ut ad eius ultimam partem, hoc est, ad trium cubitorum longitudinem, post multos dies perueniret. Vnde Æthiops à doloribus & angustis, morboque ipso liberatus est nullo supraposito cataplasmate, concoquendi vim habente, aut calida superfusione aliqua: quæ ex Sorano & Leonida, Paulus ultimis verbis libr. 4. suæ medicinæ, huic morbo auxiliari tradit.

SCHO-

SCHOLIA.

Venæ, aut nervus, vel lumbricus, morbus hic sit, in dubium vertunt auctores. Ego vero oculatus testis, multis auritis verior, testor morbum hunc tanquam lumbricum conspici, album, subtilem, tinea contorta modo, qui ex se foras prodit, & pars extra missa cum arefcit, eam nervum exsiccatum quiuis dicet; qui si abrupti contingat, intensos excitat dolores, & non leues animi angustias concitat. Nascitur autem morbus hic frequenter apud Egyptios, indos & Arabes: sed præcipue apud Mediam, iuxta Persidem: unde nomen venæ Medinæ traxit, quam Galenus Dracunculum appellat, & nunquam vidit, ut memoria commendauit lib. 6. de locis affectis. Euc-

nit autem morbus hic fortè, ut in renibus pili à materia crassa lentaque, quam calor plus iusto calefecit, exsiccauit-ve: unde medicamentis & remediis atram bilem respicientibus purgantibus-ve, morbus hic curari tractari-ve debet: prout imperat Auicenna, & cæteri Mauritani illi assentiuntur.

Hæc autem pro Coronide huius libri de Lienis post nouum morbum scurbutum, de nouo hoc morbo Endemio adiungere libuit. Vnicuique tamen liberum iudicium relinquimus, num sit dracunculus, de quo Gal. tum Auicenna, præcipue, ac reliqui Arabes scripserunt. Quamquam fortasse eidem locus aptior dari poterat, de morbis externis, ut alij faciunt.

Finis Libri vigesimi.

